









Del Medico Ignario ~~del~~.

L 730.

~ ~

pag. 10. 11.

~~~~~



1800

1800

1800



*translatio Alexandri alexandri naxosii*

# ÆTII MEDICI

GRAECI CONTRACTAE EX

VETERIBVS MEDICINAE TETRABIBLOS,

hoc est, quaternio, siue libri uniuersales qua-  
tuor, singuli quatuor sermones com-  
plectentes, ut sint in summa

quatuor sermonum

quaterniones,

id est,

Sermones sedecim, per Ianum Cornarium

Medicum Physicum Latine

conscripti.



*Acceſſerunt in duos priores libros (quos de Simplicibus scripſit)  
Scholia, rei medicæ studioſis plurimū profutura, per Hugonem  
Solerium Sanionenſem, Medicū, nunc primum in lucem edita.*



anno

*[Signature]*  
*[Signature]*  
1723

LVGDVNI,

EX OFFICINA GODEFRIDI

ET MARCELLI BERIN-

GORVM FRATRVM,

M. D. XLIX.

*[Signature]*



AETII MEDICI

GRACI CONTRA EX

VERITAS MEDICINAE VERITAS

hoc est, quodlibet, seu librum, seu scriptum

in hoc, singulis partibus, seu rationibus, com-

pletur, ut in in hunc

quodlibet, seu rationibus,

quodlibet,

id est,

Germanos, sed etiam, per hunc, seu rationibus,

Medicini, seu rationibus,

consequitur,

§

Adversus in hoc, prius, librum, seu rationibus, seu scriptum  
Adversus, seu rationibus, seu scriptum, seu rationibus, seu scriptum  
Adversus, seu rationibus, seu scriptum, seu rationibus, seu scriptum.



LAGDANI  
IN OFFICINA GODEFRIDI  
ET MARCELLI BERLIN-  
GORUM, LATVAM,  
M. D. XLII.

*Handwritten signature or text at the bottom of the page.*



# AMPLISSIMIS AC

PRVDENTISSIMIS HONESTIS-

SIMISQUE VIRIS, SENATVI, POPVLOQUE

IMPERIALIS VRBIS FRANCFORDEN.

IANVS CORNARIVS ME-

DICVS PHYSI-

CVS S. D.

\*



ET IVM medicum Gracum iam decennium quum uertendum suscepissem, multum operæ precij mox ab initio facere mihi uisus sum. Tamen si enim fragmentum tantum, ueneranda tamen illud uetustatis, mihi obtigisset, attamen ex eo ipso colligebam non uulgare aliquod consilium illi uiro fuisse, sed institutum penitus optimum, & ab omnibus approbandum, totam uidelicet medicinam in breues quasdam summas contrahendi. Erat autem tum mihi, sicut plerisque omnibus autor ignotus, nisi quod Asulanorum apud Venetos familia, Græci exemplaris editionem pollicita erat, ante Hippocratis, & Galeni operum editionem. Itaque etiam si fragmentum illud meum sex sermonum, ab octauo usque ad decimum tertium, contemptibile uideri poterat, ut in publicum ederetur: & incertum esset ad quot libros uniuersales, aut sermones partiales, autor opus ipsum extendisset: tamen neutiquam suppressendum ratus inuentum thesaurum (sic enim tum mihi placebam) sex illos sermones in Latinam linguam à me conuersos edidi. Neque male successit. Nam nouum & incognitum opus studiosi benigne exceperunt, per omnem adeo Europam, ut etiam Italia uisum sit, non paruum esse incommodum, totum illum autorem non ad Latinos translatum extare. præsertim quum totum Græcum opus in aliquot exemplaribus in Italia superesset. Et tum sanè excitatus est quorundam magnorum & rectis studijs beneuolentium Heroum stimulus Baptista Montanus, non incelebris apud Veronenses medicus, qui exemplarium illorum copia confusus, & priores, & posteriores, quos ego non habueram sermones, fragmento meæ translationis adiecit: & sic translationem meam suæ apud Venetos editioni inseruit. Et quia candore quodam hoc à se factum esse, in præfatione testatus est, ego uicissim illi hoc talionis uice rependam, quod studiosis cognoscendum propono: hætenus translationem illius, unâ cum meâ lucem ferre potuisse. nam in posterum non erit, qui me iudice, uel meam priorem, uel illius conuersionem per omnia sequi debeat. Discipulus est prioris posterior dies. Honestissimum est certamen, non solum alios, sed etiam seipsum superare. Proinde totum opus Aetij etiam nos adepti, illud denuo ex toto conuertendum suscepimus, non tantum quod uideam, dum exemplaria alia plus, alia minus adscripta habent, unum aliquod certum sequendum esse: sed etiam ut ne amplius sit styli diuersorum interpretum in uno opere pugna. Et hoc meum consilium si Montano sequi uisum fuerit, adeo non improbo, ut ingentis candoris loco id habiturus sim, si etiam ipse totum Aetij opus ex sua interpretatione legendum edet. Quapropter meam operam non aliter studiosis approbare uolo, quam ut putent me nulla quam publici commodi causa commotum, huc progressum esse, & sincerè optimum medicum emendatissimum, ac optime Latinum factum (quantum eius per me fieri potuit) inuulgasse. Tantumque abest ut in præsens eius translationem, propter meæ editionem, superfluam uideri uelim, ut uehementer expetam etiam illum, totum opus de suo denuo publicare. Et nisi fallor, hæc res non tam ad illius gloriam spectat, quam publicam studiosorum utilitatem: præsertim eorum qui Latinam linguam solum nouerunt. Continget enim ipsis ex utriusque translationis collatione, ut ueram senten-



tiam aſequantur. Atq; utinam etiam hi qui ex Hiſpanis altas de montibus umbras nobis u-  
triſq; offundunt, & in alienis libris ingenioli ſunt, huc incumberent: ut ſimilem, aut potiore  
(qualem oſtendant) operam præſtarent: plenis buccis ſtudio hominum collaudarem. Iam  
quod illos facere iuuat, nemini prodeſſe uideo. Et reuera in quatuor uerſibus, ſi quando ali-  
quid è ſuo exemplari, uelut potiore citat ille, plures errores in conuertendo admittit, quàm in  
integro ſermone prioris editionis inueniuntur. Deinde leuiſſima quæque & nullius momenti  
notat. Verùm ubi nodus aliquis incidit, ibi tranſilit uelut angue conſpecto, & nihil hic ſecat  
Tenedia ipſius bipennis. Sed huc progredi nolebam. Hoc uolebam, expetendum mihi uideri,  
ut & ex Hiſpanis Latina Aëtij tranſlatio extaret: quò ſic ſtudioſi medici, uel auctã, uel de-  
curtatam, aut etiam corruptam lectionem diuerſorum Græcorum exemplarium cognoſce-  
rent. Hiſpani ſuum in hac parte ducem, itemq; Itali ſuum haberent. Profectò mihi ſatis eſt, ſi  
Germanis meis mea & placent, & profunt. Iam uerò eiſmodi cauillationibus nihil profici-  
tur, & in talibus annotationibus utcūq; ueri inueniendi ſtudio prætexitur: tamen hæc ſunt  
ipſiſſimæ maligni ac morbidæ ingeni notæ. Facile eſt aliorum errores indicare: ſed teipſum  
inculpabilem præſtes, ſi quid ſimile tentes, aut etiam in his annotandis, hic opus hic labor eſt.  
Et cognoſco pennas ex corpore commentariorum meorum medicorum in Galeni uariis li-  
bros conſcriptorum, extractas, & ſagittis illius adaptatas: ut uehementiore impetu in me fer-  
rentur. Non enim non uidebam ipſe quæ mihi in mea tranſlatione diſplicerent. Verùm ea,  
quia potioris, aut alterius exemplaris copia deerat, interim ferri poſſe ſperabam, donec clare  
à meipſo iudicarentur: id quod factum eſt mox in relatorum commentariorum editione: in  
quibus potiſſimos locos prioris meæ in Aëtio tranſlationis indicaui ac retractaui. Et iam  
amplius fiet in huius repetitæ meæ tranſlationis editione, quam ad duo exemplaria præuia à  
me conſcriptam, & ad Galeni, ac Pauli lectionem collatam, in omnibus ſequendam puto.  
Neq; curandum arbitror, ſi alicubi aliam exemplaria plura, uel pauciora habent, aut etiam  
ordine immutato. Hoc enim in eiſmodi autoribus peculiariter contingere poteſt, ut certi loci  
ab alijs atq; alijs augeantur, aut imminuantur, dum quiſq; poſtea uel ſibi approbata addit,  
aut ſuperflua iudicata detrahit. Quod ipſum fortæſſis etiã ab ipſis iuſtis ſcriptorum autori-  
bus aliquando fieri contingit. Hanc ipſam operam meam in urbe ueſtra, Uiri Francforden-  
à me perfectam, uobis inſcriptam ac dicatam eſſe uolui. Nam quum aliàs hoc inſcribendi li-  
bros magnis principibus, ac urbibus munus, publice receptum ſit: ego qui apud uos iam in  
quartum annum medicum Phyiſicum ago, neutiquam committere debui, ut ex ſcriptis meis  
nō eximium aliquod ſpecimē (quale ſanè hoc Aëtij à me Latine conſcripti opus eſſe iudico)  
urbi ueſtræ peculiariter à me deſtinaretur: quò ueſtro grauiſſimo iudicio approbatum, maio-  
re gratia ac autoritate in publicum exiret. Atq; haud ſcio an poſt ullas alias imperij Roma-  
ni urbes, ueſtra reſpublica numerari debeat, tot inſignibus ornamento præ cæteris clara. Pri-  
mum enim quid præclarius urbi alicui contingere poſſit, quàm quod urbs ueſtra iam per mul-  
torum annorum ſucceſſionem habet, aurea etiam appellata bullæ ſacramento roboratum?  
Quò uidelicet Romanus futurus rex in ſola ueſtra urbe, excitis è ſedibus ſuis Romani impe-  
rij electoribus, tanquam ad rem orbi terrarum imprimis, uelut etiam eſt, neceſſariam eligi-  
tur, proclamatur, & ex urbe orbis rex & imperator ſuus innoſcit? Quò ſi priſcos histori-  
cos omnes diligentiffimos in hoc exquirendo, deſcribendoq; eſſe uidemus, ut regum ac magno-  
rum principum ortus, ubicunque tandem contigerunt, tanquam locis in quibus contigerunt  
clarioribus inde futuris, exacte prodant ac conſcribant: & hodie in annales principum refer-  
re mos eſt natales ipſorum locos: quò monumentum ſatis amplum urbi ueſtræ ſtatui poteſt?  
Ad quam non unus aliquis magnus princeps, ſed tam multi, tot uoluentibus annorum ſecu-  
lis orbis imperatores, ueri ortus ſui primordia referunt: maxime qui non fortuito, ac incerta  
naſcendi



nascenti sorte ipsis contigit: uerum septem sacramento adiuratis principibus, totius Germania supremis, ob hoc Electorib. imperij appellatis, eius gratia conuenientibus, & summa fide, incorruptissimis iudicijs, firmissimaq. autoritate, noui regis Romani atq. orbis domini futuri, imò clementissimi imperatoris, ortum ac natiuitatem, hoc est electionem, orbi uniuerso salutarem pronunciantibus. At uerò, ut maximum est hoc urbis uestrae, uiri Francforden. decus, sic non minus ornamentum ex nobilissimo emporio uobis accedit, quod omnium totius Germania emporiorum maximum esse constat. Possint fortassis alijs alia quaedam emporia, aut ob mercium quarundam pleniorē ubertatem, aut uiliorem annonam, aut perpetuum emporij statum praefenda uideri. uerum ob mercium omnium aequalem apud uos copiam, mihi quidem nullum emporio uestro maius uidetur: praesertim quum duobus statis anni temporibus celebretur, quibus quisq. & sua commode aduehere ac diuendere, & aliena comparare potest, non dubito quin maiore utrinq. lucro, quàm si perpetuus emporij status apud uos extet. Quamquam si quis adeò extra statam duorum temporum oportunitatem uos adeat, reperire uidem possit & emptorem & uenditorem quarundam mercium ab ipso expetitarum. Quanta uerò commoditatis res sit, talia emporia esse ac celebrari, uel inde palam fit, quòd egentissimi sunt populi ad quos nihil peregrinarum mercium inuehitur: ut & hoc nomine insigniter celebris uestra urbs sit, quòd hanc commoditatem ex se in uniuersam ferme Europam deriuat. Atque sint haec quidem praecipua duo uestrae urbis praeconia. Mihi uerò neque hoc leuiter ad laudem uestram pertinere uidetur, quòd mechanicarum artium opifices per omnem Germaniam, morum, consuetudinum & rituum, unicuique arti peculiariū praescripta ac rationes, ex uestra republica uelut optime instituta, aut primum petunt, aut si prius habent, ex uestris emendant, ac confirmant. Quid uerò an non praedicandum uel imprimis erat, quòd artis gladiatoriae apud Graecos ac Romanos olim celeberrimae, hodie uerò ubique exoletae ac interceptae, nulla totius orbis parte tam insignia uestigia restant? Quum enim gymnastices partes pleraque omnes hodie sublatæ sint. Nam neque in usu sunt tam frequentia & priscis adeò quotidiana balnea. Neque defrictiones ex oleo quotidianas, aut ullas aliquas ualeitudinis conseruandae gratia hodie corporibus adhibemus. Et palaestra ferè tota intercidit, ut etiam strigmentorum ex balneis, & palaestra ueteribus medicis petitorum, aequè materia atq. usu careamus: gladiatoria ars apud uos non tantum praeclare exercetur, sed eam exercentibus etiam praemia constituta sunt: & in ea praecellentes gladiatoriae artis magistri publicè creantur. At uerò quàm utilis res sit humanis corporibus, imò etiam animis gymnastice, cuius pars est & ipsa gladiatoria: uel maxime ab ipso omnium studiorum doctissimo Galeno, in libris salubrium, siue de sanitatis tutela declaratur. Quin idem ad Thrasibulum scribens dubitare audet, num ad medicinam, aut gymnastice pertineat sanitatis tutela: intantum uidelicet commodat apta corporum exercitatio, ut non minima pars artis tutelarum sanitatis ipsa gymnastice existat. Atq. hoc sane modo, idem fuerit optimus medicus, qui optimus corporis exercitator, ad sanitatem uidelicet conseruandam: quem Graeci significantissime non medicum, sed *ὑγιαίνων*, hoc est, sanitatis tutorem appellant. Quare minus mirum mihi uidetur, fuisse semper, & esse adhuc honoratissimam apud uos artem medicam curatiuam: quum uideam etiam superesse apud uos ferè solos, aut certe non alios quàm qui à uobis transumpserunt, artem medicam sanitatis tutelarem. Haec enim duae maximae ac principalissimae sunt partes medicinae, quarum altera *ἰατρική*, altera *ὑγιαίνων* appellatur. Quamquam autem in hoc diligentia uestra omnibus admirationi sit, ut bonos apud uos medicos semper habeatis, tamen nescio quo malo fato id fiat, ut uulgius aequè apud uos, uelut nunc ubiq. gentium, ferme pessimos sequatur, hoc est, ut ego puto, sui similes. An autem hoc ex reipublicae utilitate sit, indiscriminatim quosuis ad medicinam publice exercendam admittere, id quod apud uos  
uelut



uelut in libera urbe, omnibus liberum est, ampliore consideratione opus habet. Illud certe magna laude præ omnibus Germaniæ urbibus facitis, quod tot medicos, quot nulla alia, publico salario alitis. Par est, aut etiam amplius, studium uestrum in conseruandis bonarum literarum, ac artium studijs. Nec desunt uobis præceptores, uel maximis scholis pares. Quin & celeberrimos multos respublica uestra habet Iurisconsultos, quibus omnibus tum in iure dicendo, tum etiam priuatim quibusuis ad consulendum publicis constitutis stipendijs utimini. Quod uero maximum est, pietatis studia, & renascentem uera Christianæ religionis cultum tanta prouehitis moderatione, ut etiam ipsis uera pietatis aduersarijs admirationi sitis, dum uident, ac audiunt populum à uerbi ministris ac doctoribus placate edoceri, & sedatis animis populum de sacris concionibus ad suas functiones obeundas abire, & à neutra parte tumultus cieri. Quæ res summam magistratus prudentiam declarat. Vulgo dicitur, Qualis princeps, talis populus. Sed egregie dixit pœta ille: Mobile mutatur semper cum principe uulgus. Quare amplissimi senatus imaginem, uel in ipso populo spectare apud uos licet. Sed heu cladem ingentem illam, ex quo magno illo, reipublicæ uestre principe orbatî estis PHILIPPO Forstbergero, in omnibus bonis studijs, ac uirtuosis actionibus uiro admirando. Cuius ego priuatus priuatim, & amore, & admiratione adhuc ita afficior, ut eius sine suspirijs nunquam, sæpiissime etiam lacrymis obortis, mentionem facere possim. Quanto magis putandum est uos uestrum uulnus sentire, à quorum corpore ille resectus est? Erat uir eius ætatis, ut recte immatura morte ereptus dici possit, sexagenario propior quàm quinquagenario. Sed corpus uegetum aderat, ac animus uiuidus, ingenium acre, iudicium exactum, mores mansueti, sermo suauis. Et in summa, natura ad benefaciendum omnibus, neminem ledendum nata, quod quò rarius est, eò maiorem laudem in magistratu meretur. Utranq; in super callebat linguam, Græcam supra mediocritatem, Latinam, ut cum magnis professoribus certare potuisset: quod aliquot ipsius ad me scriptæ epistolæ testantur. Et quum tota uestra respublica ex eo penderet, & perpetuis senatus curis grauaretur, tamen quantum succisui temporis suffurari poterat, id totum conuertebat ad optimorum autorum lectionem. Et hoc tempore præter reliqua, totum Homerum Græcum perlegendum, ac conferendum susceperat. Hæc facientem superioris æstatis inauditus Germanis æstus corripuit, & ardentissima febris abripuit: quam eodem tempore in me sæuientem summa difficultate ego uix à me reieci. At siue bonorum usum nobis non fauent inuida fata, uelut pœtis quibusdam placuit: siue ostendit deus magis quàm tradit optimarum rerum fruitionem: profecto uestrum luctum priuatus meus dolor proferre cœgit: quo optimi, ac sapientissimi uiri obitus reuera reipublicæ uestre immaturus, à me publice deplangeretur. Videor tamen mihi aliquanto leuius ferre illius ad meliorem uitam translationem, quum considero qualia reipub. decora post se reliquit, generos suos, uirum omnibus bonis studijs fouendis, ac prouehendis natum Iustinianum ab Holtzhusen. Et soceri uestigijs innitentes, ex ueteri familia ad Iuuenes appellata, Orthonem, ac Danielelem. Nec desunt alij egregij uobis uiri, qui certatim conentur, ut sincera pietas uigeat, & literarum, ac bonorum studiorum honos perstet, ac conseruetur. Sed quorsum tandem hæc omnia? Nimirum quum in urbe uestra uiuo tot insignibus decoris celebri, ut uidear uirtutis uestre aliquam rationem habuisse, dum & grauissimis iudicijs uestris approbatam hanc operam meam uideri uolo, & uicissim meam erga uos uoluntatem declarare cupio: quò utraque re cognita, studiosi rerum medicarum hoc Aëtij opus à me Latine conscriptum, alacrius excipiant, auidius perlegant, studiosius sequantur, & medicando de humano genere bene mereantur. Quod ubi continget, non dubito quia intelligent hoc uestrum uiri Francforden. beneficium esse, quò tantum autorem, insignem medicum, in publicum usum editum habent. Crede mihi quisquis es rerum



rerum medicarum studiose, sitotum Galenum contractum, sitotum Oribasium explicatum, si Paulum ampliatur, si omnes ueterum speciales, tum per phramaca, tum per chirurgiam aggressiones, ad omnes affectiones, in summa habere uoles, Aetium habes, unde totum hoc petere, ac ferre potes. Neque refert an sit Aetius ille Hæresiarcha, aut alius quispiam Amidenus Opsicij comes, uelut quadam exemplaria præscriptum habent. Certe Aetium hæresiarcham uarijs artibus instructum fuisse, & philosophicis Aristotelicis ratiocinationibus ingenium exercitatum habuisse, D. Epiphanius abunde declarat, in opere contra Octoaginta hæreses, quod item recens in Latinam linguam transtulimus, ut fieri potuerit, eum etiam medicinam tractasse. Nam quod comitis dignitas recentior sit, quam ut Aetio hæresiarchæ competat, penitus falsum est. Habet enim, iam citatus à me D. Epiphanius, Comitum appellationem ac dignitatem sub ipso Constantino Magno receptam. Et Iosephum quendam à Iudæo Christianum factum, ea dignitate à Constantino Magno donatum tradit. Potuit igitur fieri, ut aurifaber usque ad perfectam ætatem Aetius, & postea ad Aristotelicæ philosophiæ studia progressus, & deinceps à Georgio Alexandrino Diaconus constitutus, tandem per principem aliquem Opsicij comes factus sit, & ut uir philosophiæ doctus, hoc opus ex ueteribus Medicis collegerit. Sed nihil pronuncio, neque quicquam refert. Cæterum quod ad operis totius diuisionem attinet, manu scriptum exemplar meum habuit τετραβιβλος inscriptionem, ante aliquot sermones partiales. Velut uerbi causa, ante nonum sermonem, Ἀρχὴ τῶ θ. λόγῳ Αἰτίῳ, πρῶτος τῆς τρίτης τετραβιβλῶς. Et ante sermonem XIII. Ἀρχὴ τῷ λόγῳ Αἰτίῳ, πρῶτος τῆς τετάρτης τετραβιβλῶς.

Quam rationem sequutus, totum opus in quatuor Tetrabiblos, hoc est quaterniones uniuersales, singulos quatuor sermones siue libros partiales continentes distinxī, uelut autorem ipsum ab initio fecisse apparet. Porro quod superest precor, ut & uobis, uiri Francforden. ex huius operis editione merita gloria, & studiosis lectionis ac imitationis fructus contingat. Mihi satis est, si in huius Dramatis actu non penitus (quæ quorundam malignorum ingeniorum improbitas est) fuero ex scena ac theatro explosus. Valete. Francfordiæ, Calend. Nouembrib. Anno Christi M. D. XLI.

#### Errata in Annotationibus.

- In Acoro, penultima capitis linea, flabe, lege, flambe.
- In Aconito, linea 49. complicatis, lege, complicatas.
- In Dipsaco, διψανος, legendum.
- In Thapsia, linea 8. hapsiam, lege, thapsiam.
- In Cymino, linea ultima, appellatus, lege, appellatur.
- In Cypero, linea 12. ab ullo, lege, ab illo.
- In Ligustico, linea 6. oleus, lege, olens.
- In Malua, linea 5. quam, lege, quàm.
- In Rhu, linea 2. sumachi, lege, sumach.
- In capite 26. libri 2. femriglio, lege, smeriglio.
- Cap. 143. lin. 4. Delphinis, lege, Delphinus.
- Cap. 172. lin. 31. dysoria, lege, dysuria.
- Cap. 183. De cochleari, lege, cochlea.



*[The page contains faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side.]*

[illegible]



# CLARISSIMO ATQ.

PRVDENTISSIMO VIRO, DO-

MINO HIERONYMO MONTVO, CHRISTIA-

nissimi Galliarum Regis Henrici secundi, medico

eruditissimo & acceptissimo, Hugo

Solerius medicus.

S. P. D.

\*



MEDICINAM à ueteribus Græcis copiosissimè traditam atq; illustratā fuisse, norunt omnes: à Græcis manasse in Arabas, qui postremā eius partem, ut diligenter excoluerunt, sic, neglectis Græcorum remedijs alijsq; minoribus inuentis, nouas sibi medicaminum formulas condiderunt: quorum usum posterior ætas retinuit, approbavit, & nonnulla inuenit: quibusq; penè dixerim, solis contenta fuisse, & adhuc nunc esse uidetur. Cumq; sic ferente rerum omnium insigni uicissitudine, ab annis, plus minus, quinquaginta priorem suā maiestatem resumere, ac ueterem cultum induere cœperit: tantosq; sibi neruos ac robur nostro æuo cōpararit, ut nullo tempore celebrior magisq; culta fuisse uideri possit: mirum profectò nulli non esse debet, cur Græcorum remediorum usus, penè solus, reparata medicina antiquioris maiestate, tanquam despicatus & inutilis exoleuerit. Quod cum ego diligentius perpenderem, ac sedulo contemplarer, duas causas præcipuas fuisse comperio: inueteratum ac contumacem usum alteram: simplicium crassam ac pudendam ignorationem: è quibus ille meticulosos minusq; audentes (nullo rerum habito discrimine) & antiquitatis studiosos: hæc negligentes laborumq; ac disciplinarum contemptores homines facit. Huius itaq; calamitatis ego atq; indignitatis sedulus aestimator, cum exploratum haberem hunc uetustæ dignitatis neglectum, aut dissimulari omnino, aut à quàm plurimis saltem fieri minimi: cœpi cogitare, num arte quadā ac uia certitudine fieri posset, ut cuius medicinae studioso iudicare non esset difficile, an scilicet ueterum Græcorum formula in usum (si id exigeret necessitas) uocari posset: aut omnino, ob simplicium tum inopiam, tum ignorationem negligenda uenirent. Eam igitur ob causam consilij mei fuit, quendam è Græcis autoribus deligere, qui morbos omnis generis, à summo capitis uertice usque ad calcem, fuisset accuratissimè, iuxta ueterum normam ac traditionem, complexus: eumq; ue, si id quidem fieri posset, tam diligenter illustrare, & modis omnibus ornare, ut hac ratione prisca medicinae autoritas illucesceret, & antiqua claritudine ac celebritate tandem donaretur. Ex ijs itaque unus Aetius dignior mihi uisus est, qui reliquis omnibus, (iuniores dico) hac in parte anteponi iure optimo debuerit. is siquidem medicinam omnem ita ex ueterum libris in unum uelut corpus ac uolumen contraxit: suoq; singula loco tam appositè collocauit & accuratè distinxit, ut ingentia Galeni & aliorum uolumina hoc quasi breuiario comprehensa & disertissimè explicata uideantur. Quam ob rem, ut huic tam funestæ ac deplorandæ calamitati tandem pro uiribus reluctarer, & inducta rebus ipsis noua luce, depulsaq; ue ignorantia caligine, uiam quandam ad simplicia, tum nobiliora, tum cognita (si absit qui demonstret) ualde difficilia, studiosis pararem ac uelut sternerem: è mei instituti dignitate, rei publicæ literaria utilitate esse putavi, breues, ac, quantum per maximam diligentiam liceret, perspicuas in singula simplicium eius capita adnotatiunculas (& eas quidem Græcis, Latinis, officinarum ac herbariorum, Italicis, Gallicis, Delphinaticis, ac nostratum uulgaris nomenclationibus: necnon soli natalitij plantarum inuentu difficilium

A a

indica-



indicatione, illustres) conscribere: quarum ope ac familiaritate nouus lector adiutus, caligare  
 in expendendis & ad uiuum dijudicandis priscorum remedijs, posthac desineret, & quasi manu  
 ad grauiorū πολυχρῆστου τῶν ἀρχαίων αὐτορὺν duceretur. In quibus si quid minus tersum, minus ele-  
 gans, minus eruditū, minusq; comptū à Zoilis alieniq; cū laboris, tum industriæ sapidis uellica-  
 toribus iudicatū fuerit, curatū tamē religiosissimè est, ne diligētia ac fides alicubi nobis deesset.  
 Quapropter admonitos uelim exactiores istos, seueriorisq; nota censors, ut terq; quaterq; no-  
 stra scripta sedulo prius expendant, quàm de re, fortasse illis parū exactè cognita, temera-  
 riam sententiam ferre. Accedit tum ex Galeno Aëtioq; tum alijs non postrema classis ac  
 nominis autoribus, ea nos simplicia adnotasse, ac, quasi digito, cōmōstrasse, quæ ueterum quo-  
 rundam inopiam sarcirent, & eorum loco in usum medicum admitterentur. Ceterum, ut in  
 pauca tandem rem omnem contraham, nullis laboribus, nullis uigilijs, nulli deniq; rei familia-  
 ris iactura, cum in conquirendis ac peruestigandis simplicibus, tum in hisce conscribendis &  
 solertiore cura elimandis scholijs, pepercimus, quò vios <sup>ἐπιμαρτυροῦν</sup> promoueretur, facilioraq; omnia  
 ac expedita magis haberet. Unde, opinor, erit, quòd medicina studiosa iuuetus (eruditus enim  
 & grauib; uiris hæc non scribuntur) nobis pro tot susceptis laboribus, cū se mirum in mo-  
 dum adiutam senserit, aliquam se gratiam debere ingenue fateatur: cū nimirum multa no-  
 stris hisce (absit interim uerbo temeritas) scholijs luculenter ac dilucide explicentur, quæ è re-  
 centioribus nemo adhuc satis disertè ac pro dignitate monumentis literarū mandauit. Quam-  
 obrem cū tam multorum hominum iudicia mihi sustinenda uiderem: puderetq; tam mul-  
 tos, tamq; uiriles & publicæ rei minimè obfuturos labores, prius quàm in aliquod discrimen  
 uentum esset, suppressere: anceps quid agundum esset, tantisper animo fui, dum, superata o-  
 mni suspitione, deuoratoq; inani metu, satius fore duxi, aliquid studioso homine dignum, etiā  
 cum periculo, audere, quàm domi, sine fruge ac laude, segniter delitescere. In lucem igitur,  
 quanquàm ancipiti Marte, prodire statuimus tibiq; idcirco, doctissime Hieronyme, has nostra-  
 rum lucubrationum primitias consecrādas existimaui, quòd his regionibus nemo hoc, exi-  
 guo quidem, at non usquequaq; contemnendo, munusculo, dignior te uno uisus fuerit: tum,  
 quòd tutandis, & à sugillatorum grunnitu uendicandis nobis, aptior, uigilantior, disertior,  
 doctiorq; ue quisquam, uix in orbe Christiano, nedum hic, etiam graui doctorum testimo-  
 nio, inueniri queat. Ceterum quem, obsecro, magis decent celebrium medicorum congressus,  
 studiosorumq; medicinæ fauor, quàm eū qui doctissimus medicus sit: suaq; apud reges ac prin-  
 cipes autoritate plurimum possit: & ad studiosos omnes promouendos, officiosissimus ac na-  
 tura propensissimus iudicetur? quiq; uanos laceissentium insultus compscere, cla-  
 uumq; clauo, si opus fiet, retundere diligentissimè norit? Accipe igitur fronte  
 serena benignoq; uultu tenelli huius nostri parui, ac primogeniti opu-  
 sculi patrocinium. Is enim, quanquàm uiribus adhuc, ob ætatem  
 & exiguam corporis molem, imbecillis uideatur: quocunq;  
 tamen ire perrexeris, dum modo benignam adiu-  
 tricemq; manum non deneges, satis (quæ est  
 ἀποδυομένης παύσης ἀνιμωσύνη) expeditè se-  
 quetur. Vale. Lugduni,  
 Calendis Maij,



# HVGONIS SOLERII

## MEDICI IN II. PRIORES

### AETII LIBROS

#### SCHOLIA.

\*

ἀβρότονον, Abrotonum.



BROTONVM Græcis iuxta ac Latinis idem nomen seruat. Duū est generum: mas & fœmina. mas officinis nomen retinet: Gallis aurone, aut de la garde robbe: Italis, abrotono & ueronica: Delphinatibus, de la gabioſe: noſtratibus belambroys: fœmina uerò Gallis, Delphinatibus, & noſtris, du cypres: Italis cipreſſo & ſantolina nominatur: officinis criſpula.

ἀγνος, Vitex.

Agnos Græcis, Latinis uitex: officinis, copulata tum Græca, tum Latina uoce, agnus caſtus dicitur: Italis agno caſto: Delphinatibus, noſtratibus, & Aquitanis pebrier, quòd eius ſemen piperis modo acre ſit, appellatur. Duo uiticis genera: altera ex purpura, candicantibus floribus, quæ & notior: purpureis altera, eaq; minus nota.

ἀγρωσις, Gramen.

Agrowſis Græcis, gramen Latinis nominatur. Officina, Delphinates, noſtrates & Aquitani Latinum nomen retinuerunt. Galli autem eam herbam, dent à chien, Itali gramina uocitant. Duo rum eſt generū, uulgare & parnaſiū. Quòd pro parnaſio uulgo monſtratur, pleriq; Fuchſij centum morbia putatur. & ſimilius ueri eſt, parnaſium gramen hiſce orbiſ tractibus ignotum eſſe.

ἀγχυσα, Anchufa.

Anchyſa Græcis: anchufa Latinis. Multa anchuſarū genera: Onochelos Gallis orcanete. Lycopſis officinarum cynogloſſum cenſeri poteſt, & Gallorum bage. reliquæ ſpecies notæ ſunt, & ex delineationibus petendæ.

ἀγαρικόν, Agaricum.

Idem nomen Græcis, Latinis, & officinis habet. Galli, Delphinates, & noſtrates de l'agaric, Itali agarico appellant. duo eius genera, mas, fœmina, uulgaris tamen ambo notitiæ.

ἀγρίρατον, Ageratum.

Græcis & Latinis idem nomen ſeruat: officinis & uulgo ignotū: Italiae anonymon, noſtræ tamen officinæ herbam ſanctæ Mariæ nominant. Nam in noſtra prouincia quaſi ubiq; luxuriat: ſed præcipuè non procul ab Aquis ſextijs in uuidis & argilloſis locis.

ἀδιναν, Adiantum.

Duo adianti genera: πολυτρίχον, quòd Theophraſto adiantum album: Gazæ Theophraſti interpreti, & officinis capillus Veneris, Italis capel uenere. τριχομανές, quòd in duo genera diſtribuitur. Siquidem alterum Theophraſto adiantum nigrum, uulgo autem & officinis falſò polytrichū nominatur: alterum uerò folijs filici effigie proximis, & uulgo ſimpliciter adiantū nominari ſolet. Ad quartum adianti genus ſaluam cognomento uitam referri quidam autumant: quidam Dioſcoridis empetrum uolunt. ut ut tamen res habeat, conſtat eam multarum ac magnarū uirium eſſe, ut in noſtra ſimplicium hiſtoria, deo bene noſtris cœptis fauente, dicitur.

ἀείζων, Aezoon.

Aeizoon tum apud Græcos, tum apud Latinos dicitur. etſi Latini id quoq; ſedū uocent. Multa eius ſtatuuntur genera. maius quòd officinis ſemper uiua, noſtris ſemper uiue: Gallis iou barbe: Italis ſempre uiuo. minus Gallis de la trippe madame: noſtratibus cacachet, Italis nunc uermicularia, nunc herba graſſa, nunc granelloſa, nominatur. Ad tertium genus referri poteſt officinarum uermicularis.

αἰγύλας, Aegylops.

Sylueſtris auena eſt, noſtrisq; ſinado fero, Italis ſquala, nominat.

αἰγὰ, Lolium.

Officinis nomē retinet, loglio & giolio Tuſcis, alijs orzo di topi dicitur. Galli autem iurée, quòd ſe comedentes uelut inebriet: noſtrates uero iueil, nominant. uulgaris eſt apud omnes notitiæ.

αἰγείρος, Populus nigra.

Latinum nomē officinis retinet: Gallis peuplier: Italis oppi: Longobardis pioppe: Delphinatibus un piouou: noſtratibus pibou

lo, quaſi populus, dici ſolet. uulgo nota arbor eſt.

ἀκανθία, Acacia.

Verā acaciam deſyderat Europa: atq; idcirco eā nunc ex pruno ſylueſtri colligunt officinæ.

ἀκανθήν ἢ κνίδιν, Vrtica.

Duū eſt urtica generū: ſylueſtris, quæ Gallis ortie grièche, aut græche: Tuſcis ortica ſaluatica: noſtratibus ortigo barbarano, id eſt barbara ac ſylueſtris: altera mitior, nomenq; citra adiunctionem ſeruat. Officinæ Latinum nomen retinuerunt. Ambæ notæ ſunt.

ἀκανθα, Acantha.

Officinarum eſt branca urſina: Italarum branca orſina. in locis maritimis copioſiſſima, ut & in Gallia, prouenit. Delphinatibus inuētū rara, apud quos nuſquā, niſi in hortis quibuſdā uiſitur.

ἀκανθα λευκή, Spina alba.

Exiſtimatur à multis, etiam uiris doctis, ea eſſe herba, quam officinæ carduū beatæ Mariæ nominant: quæ, inquam, ubiq; circa urbium foſſas ac rudera pinguiſſimis locis aſciſcit, aſſatimq; luxuriat: folijs amplis, candicantibus maculis conſperſis, caule breui. Dioſcoridis autem ſpina alba folijs conſtat, quàm albus chamæleon, anguſtioribus, caule procero, capite oblongo, echinato, & in montibus prouenit. Quæ rationes ſatis couincunt, uulgatum officinarum carduum Mariæ (qui Italis cardo di ſanta maria, & herba del latte, à lacteis maculis, nominatur) ſpinam Dioſcoridis albā nō eſſe. Vidi ego in montibus Delphinatus & in ipſis alpiſ, locis aſperis, cardui gen⁹, qui Dioſcorideæ albæ ſpinæ imaginem prorſus referret. Folia enim anguſta erant, candida, profundis diuiſuris incifa, ſpinoſa. Caulis cubito longior, molli incanaq; lanugine intectus: intus cauus, ſupremo quaſi loco ramoſus: caput echinatum, ſpinis ualde horridum, oblongum, oui gallinacei magnitudine: flores, ut plurimum, candidi, nonnunquā purpurei. Radix digitalis craſſitudinis, longa, foris ex ſtauo pallida, intus candida, guſtus non inſuauiſ, tantillum tamen adſtringentis. Semen, quia nondum maturum tum eſſet, non obſeruauī. Ex quibus notis certum eſt, eam plantam, ad ſpinam albam plurimū accedere: non tamē auſim affirmare, donec res exploratio mihi fuerit.

ἀκανθα αἰγυπτία, Acantha Aegyptia.

His regionibus deſideratur, Aegypto nimirum & Aſiæ familiaris: Arabibus ſuchaa.

ἀκορον, Acorum.

Ad ueterum acorum reuocat ex doctis quamplurimi galangam minorem officinarum: Alij contrā, nō galangam (quæ illis cyperus Babylonicus eſt) ſed officinarum calamum aromaticū, ueterum acorum eſſe, multis ac ualidis argumentis affirmant: adeo ut hæc ſentētiarum uarietas difficultate minimè careat. Verū ſi guſtum ſaporum (ut oculus eſt colorum, & reliquæ formæ) certifiſſimum iudicem, conſulamur: dubium non eſt, quin officinarum calamū aromaticum, ueterum acorum eſſe exiſtimemus. Is ſiquidem non calamus eſt, ſed radix candicās, odorata, plena, geniculis multis intercepta, guſt⁹ acris, admixta (id quòd Galenus lib. 6. ſimpl. in uero acoro requirit) tantilla amaritudine. Galanga autem minor quaſi rubra ſpectatur, guſtu, quàm ſit aromaticus calamus officinarū, acriore, citra amaritudinem, geniculis uidua. Quæ omnia conuincunt, nō galangam quidem, ſed calamum aromaticum officinarū, eſſe ueterum acorum. Accedit calamum ex Lituania Ponti regione, non procul à Galatia, afferri, barbarorumq; lingua tatarſchi zelij, id eſt, tartaricam herbam uocari: galanga uerò nō ex Ponto, ſed ex Syria Alexandriam, Alexandria Venetias, Genuam ac Maſſiliam ad nos importari. Poſtremo cōſpici nonnunquā apud ſolidarios, calamum cum ſiccis folijs, quæ iridis, folijs omnino reſpondeant. E quibus colligere nō ſit difficile, calamum aromaticum officinarum eſſe ueterum acorum: ueterum autem calamum aromaticum adhuc ignotari (quòd ex India ad nos nō adferatur) eiſq; loco ſphagnū, id eſt, arborum muſcum, ex Galeni Pauliq; ſuccidaneis, poſſe ſubſtitui. Plura de acoro & calamo odorato lege apud Petrum Andream Matthiolum uirum apprime eruditum, ſuis in Dioſcoridē cōmentarijs. Habent officinæ ſuum acorum à ueterum acoro uiribus longè diſſimile: radicibus purpureis, intortis, nodoribus, guſtu,



sis, gustu, sine calfactioe, ualde adstringenti, caule & folio iridis, sed folio angustiore, flore luteo. Floret ineunte aestate. Nasctur ubiq; aquosis locis, & Gallis flabe bastarde, & glaieul d'e-aue: nostris blaniou iaulne, quasi gladiolus luteus, nominat.

*ἀκόνιτον*, Aconitum.

*Ἀκόνιτον* Græcis: Aconitum Latinis. Duo sunt præcipua aconiti summa fastigia. Pardaliâches, quod, quorundam opinione, officinis uua uersa nominatur. Id uulgo anonymum est: heremitis tamen syluæ Gallicæ quæ de liury nuncupatur, nec procul à Lutetia Parrhisiorum uersus orientem solem est, lachryma Iob dici solet. Alterum est lycoctonon, à perimendis lupis sic nominatum. Huius tria extant genera: duo ad luporum & aliarum ferarum uenationes nata: tertium, quo ad purgationes, uomitu & deiectione moliendas, utuntur alpium rustici. Ea ipsa species eorum lingua nunc antónno, nunc antólo dicitur: Lyguribus autem & rusticis terre cognomento noue (quæ agrum Delphinaticum & Pedemontanum interiacet, & usq; ad mediterraneum mare, inter nostram prouinciam & Lyguriam protenditur) anthoro, & practicis nonnullis anthora nominatur. Illi folia insunt platano similia, minora tamen, nigriora, profundè per ambitum incisa: caulis palmum aut cubitum altus: radices geminae, oblonge, utrinq; obtusæ & continuæ magnitudinis, id est, in neutra parte aut maiores aut minores: foris ex fusco colore subflauæ, intus candidæ: ubi siccatae fuerint, fractu satis difficiles, friabiles tamen. Vtriuslibet radices ad fabæ magnitudinem in iusculo aut uino derasam propinant, ad largas duriorum corporum per superna & inferna purgationes. Debilioribus autem pro uirium ratione exhiberi à iam commemoratis rusticis, scimus. Secundum lycoctoni genus herbarijs itidem anthora: Lyguribus anthoro & thoro: alpinis Delphinatibus de la thoro nominatur. Hoc radices quoq; geminas, uerum unam ex altera appendicis modo nascentem habet, ima parte ualde acutas, supernè crassas, quatuor circiter digitos longas, foris nigras, intus ex terreo cineritiis, napi modo turbinatas, eiq; effigie similimas, actoto bulbo atris fermeque capillaribus radiculis uestitas. Caulis uero bicubitalis, folia platani, subscabra, frequentibus ac profundis diuisuris incisa, nigricantia. Flos ex purpura cæruleus, lamij floribus haud absimilis. Semen in triangularibus tricuspidibusq; siliquulis exiguum, cnico quadantenus proximum, sed multò minus, uermiculorum exemplo rugosum, ima parte sessile, altera acutum. Hanc lycoctoni speciem esse officinarum napellum (ob eximiam similitudinem, quam eius radices cum napo habere, uel aspectu iudice, depræhenduntur) existimare quis possit: quanquam ex Auicenna, intra terram, iuxta napellum talpam inueniri, eius radicibus uictitantem, quidam existiment, seq; uidisse affirmant: id quod ego, fateor, non tam curiosè obseruauit (et si reliqua omnia in defossis & euulsis plantis sæpissimè fuerim in alpiibus ad unguem contemplatus) ut musculum illum inuenerim. Quartum aconitum, quod & ipsum lycoctoni quoq; tertia species est, uitigineis uel plataninis constat folijs, minus profundè, quam aliorum sint folia, incisus, sup pallidis: flore ex luteo pallido, secundi lycoctoni flori (ut semen triangularibus siliquulis contentum) effigie prorsus æmulo. Radice longa, crassa, multos in ramos siue appendices inter se complicatis, diducta, ab aliorum radicibus ualde dissimili, ut quæ nullo pacto bulbi imaginè referat. omnes tamè, & præcipuè duæ lycoctoni posteriores, species gustus horredis, supraq; modum abominabilis. Hæc postrema est herbariorum luparia, uenatoribus haudquaquam ignota: uulgo Delphinatium nota quidem, sed tamen anonyma: Italis autem luparia, & herba de la uolpe. Florent omnes mense Iunio & Iulij initio. Semen maturefcit circa finem septembris. Prima species in syluis ubiq; prouenit. Reliquæ montibus altis delectantur, & in umbrosis apricisq; nasci gaudent. Hæc tam multa de aconito literis mandanda duximus, non ut plantam alioqui uenenosam, & maxima religione uitandam (præter primam lycoctoni speciem anthoram uerè dictam, quæ usurpari à doctis & prudentibus adhibito iudicio potest) omnibus cognobilè redderemus: sed ut, historia accuratè distincta, studiosum lectorè admoneremus, ne posthac sibi, ab imperitis quibusdam tum herbarijs, tum pharmacopæis, temerario nimis ausu, lycoctoni secundi generis radices, nigri ellebori radicem (quibus nulla ex parte respōdent) uice, in usum medicum uocantibus, imponi, suo dedecore, & mortalium irreparabili danno, sineret.

*ἄμυγδα*, Sambucus: *χαμαίανθη*, Ebulum.

*Ἄμυγδα* Græcis: sambucus Latinis. Duo eius genera: maior qui *ἄμυγδα*: & minor, qui *χαμαίανθη* Græcis nominatur. Maioris duæ nobis cognitæ sunt species: uulgata ac omnibus nota, quam fœminam appellauimus: & alia in excelsis frigidisq; montibus nascens, omnibus herbariæ rei scriptoribus indicta, & pau-

cis medicis cognita, quam certioris discriminis gratiâ, maris titulo insigniuius. Vulgatiore maioris sambuci species officinis omnibus Latinum nomen seruat: Gallis du sus: Italis sambuco: Delphinatibus, ut & sambucus mas, du sus, aut sur: nostratibus sambuc aut sambucquier & samicquier dicitur. Ebuli nomen tum Latinis, tum officinis est commune: Galli uerò yeble, Delphinates & nostrates ougue, Itali ebulo appellant.

*ἁλόνιον*, Halunum.

Inter doctos ambigitur quid sit. Existimant quidam esse Gallorum blanche putain, quam nostrates ratine, & Delphinates tautoulier appellant. Verum descriptio illi parum conuenit, ut tutius inter adhuc ignotas plantas sit reponendum.

*ἁλόε*, Aloë.

Visitur herba apud Gallias eò aliunde importata, uulgoq; du per rocquet, ab insigni uirore: Italis, ut & succus, aloë appellatur. Succus ipsius, herbæ nomen retinet.

*ἁλυσσον*, Alyssum.

Si, ut auctori ex aliorum sententia placet, syderitis heraclea est, multorum peritiam haudquaquam effugit. Quorundam opinione ad alysson referri potest uulgaris cauda uulpina. Nos autem alyssum relegandum existimamus inter ignotas nostro æuo plantas: quanquam spes est maxima excitatū iri præclara ingenia, quæ in illius & aliorum, quæ adhuc latent, peruestigatione pertiacissimè incumbat, ac tandem multa tum difficilia, tum ignota, uulgarissima, mortalium omnium bono, uel maximo, sint redditura.

*ἁλίσιν*, Alsine.

*Ἁλίσιν* Græcis: alsine, & auricula muris tum Latinis, tum officinis dicitur: Gallis autem, Delphinatibus & nostratibus du morron: Tuscis centone appellatur.

*ἀμαράκων*, Amaracum.

Amaracum auctori & Galeno idè est cum Dioscoridis parthenio: qui parthenium ipsum amaracum uocari à nonnullis, quæadmodum sampluchum à Cyzicenis & Siculis amaracum quoq; nominari, commemorat. Magna est doctorum in amaraco, quod est Dioscoridis parthenium, controuersia. Quidam officinarum matricariam esse uolunt: alij cotulam fœtidam, quæ Tuscis cota, Ferrariensibus bruscicaculo, nostris, detractis tantum duobus de ueteri nomenclatione elementis, amarum nominatur. Matricaria autem officinarum Italis amarella, Gallis anonyma, Delphinatibus de blancheto, nostris l'herbo de nostro damo uocatur: ut hinc manifestum liceat agnoscere inter illos discriminè. Verum si Dioscorides rectè consulatur, parthenij delineameta cotulæ fœtidæ multò magis fauebit, quam matricarię: nam dodratalis aut pedalis herba est (matricaria plerumq; bicubitalis) folijs coriandrinis, non (ut quidam peruerse calumniantur) fœniculaceis (matricaria multò amplioribus) odore graui ac tetra (matricaria non item) sapore amaro, matricarię comuni, ut & flos intus melinus, per ambitum albus. Accedit cotulæ fœtidæ adhuc à nostrate plebe, amarum nominari. Quæ omnia efficiunt, ut ipse cotulæ fœtidæ, nostris amarum dicta, uerum Dioscoridis parthenium esse existimè. Suum tamen, aliter cogitandi, iudicium cuiq; liberum relinqui uolo.

*ἀμβροσία*, Ambrosia.

Ignota herba est: quanquam immeritò apud Gallias herbam quamdam pro ambrosia ostentent: cui sanè tam conuenit descriptio, quam ruta similis est quercui.

*ἄμι*, Ami.

Latini & officinæ omnes Græcā nomenclationem retinuerunt. Lutetia notissima ac uulgarissima plāta, adeo ut uulgo ammi uocari iā cœperit: hic tamen & apud nostrates, quāquā inuentu non difficilis, pharmacopolarum tamè desidiam, crassè ignorantie magistrā, ignota delitescit, etsi quotidie illius semen in usum medicum uocent. Quidam uolunt ignotam plantam esse.

*ἀμαράνθον*, Amaranthum.

Auctor Galenum secutus amaranthi nomine eius plaræ uires exprimit, quam Dioscorides elichryson appellat: quamq; officinæ omnes stæchadem citrinum nominat. Delphinatibus roye dieu appellatione notissimum. Est & aliud amaranthum, flore purpureo, quod uulgo Gallorum, Delphinatium & nostratium passe ueloux, appellat: Itali autem fiore uelluto.

*ἀμύργη*, Amurca.

Amurca fex est olei oliuarum, quæ in fundo uasorum residet: nostris crappe d'huyle, Italis morca & morchia uocatur.

*ἀμπέλοπρασσον*, Ampeloprasum.

Latini Græcā nomenclationem in usum suum uerterunt. Sic dictum est, quod uitium familiaritate oblectetur. Largus siquidem est illius in uineis prouentus, atq; ob id porrum uineale, cepa canina ab ipso uulgo: Tuscis autem porandello dicitur.

*ἀμπέλος λευκή*, Ampelos leuce.

Officinarum bryonia est, quæ præsertim apud Delphinates, pudèdo errore uitæ syluestre (quā Galli uiorne, nostrates aut redorto, quā



quasi retortā, q̄ arboribus uehemēter implicet, nominat) uitis  
albę appellatiōe accipiūt. Galli uitē albā colouurē: nostrates  
cocordier de serpēt. Itali uerō zucca saluatica uocitāt. Ad uitē  
nigrā referri cōtendūt: alij flāmūlā, sed falso, q̄ ea clematidis  
altera species sit: alij sigillū beatę marię, cui⁹ delineatio illi nō  
illepidē quadrat, quorū certē sentētia nobis donec melior in  
mediū adducta fuerit, pbat. Italis uitis nigra tamarodici solet.

ἀμυγδαλα, Amygdala.

Græci, Latini ac officinæ idem nomen usurpant. Duūm præcipue  
sunt generum, dulcia, & amara. Ex dulcibus quædam molli fra  
giliq̄ cortice integūtur, ac ob id nostratibus Græcum idioma  
sequitis abalanos, quasi ἀβάλανα, id est, cortice glandis desti  
tuta, & Delphinatibus metathesi syllabarū alauanes dicta fue  
rūt. Quædā internū corticē duriorē habent, & absolute cōmu  
ni nomine insigniuntur. Gallis enim ac Delphinatibus amē  
dres, Italis mandole, nostris autē amēdos & amelos dicūtur.

ἀμμωνιακόν, Ammoniacum.

Officinis Græcas uoces ignorantia partim, partim desidia adul  
terantibus, armoniacum dicitur.

ἀμύμον, Amomum.

Desyderatur uerum amomum.

ἀναγallis, Anagallis.

Latini Græcū nomen usurparunt. Officinis morsus gallinę: Gal  
lis morgelline, & petit morron. Duo anagallidis genera: flo  
re cæruleo fœmina: phœniceo mas insignitur.

ἀνδράχνη, Portulaca.

Ἀνδράχνη Græcis: Latinis & officinis portulaca: Gallis poulle pied,  
& pourpie: Delphinatibus pourchalle, nostris portolaigo, Tu  
scis procchacia: alijs Italię populis procellana nominatur.  
Duūm est generum, syluestris & hortulana: ambæ tamen uul  
garis notitiæ.

ἀνεμώνη, Anemone.

Duūm est generum: syluestre unum: alterum in cultis nascens.  
Syluestris folio est fœniculaceo, flore ex uiolaceo, suppurpu  
reo, magno, qui flantibus uentis patefit, atq; ob id herba uenti  
est appellata: (quanquā herbæ uenti appellatione parietariam  
helxinen usurpent officinæ) Gallis des coquelourdes. Hæc  
primo uere erumpit, floret, ac post paulum flos ipse uanescit  
in pappos, syluis Galliæ familiaris. Apud Delphinates in ne  
more Rossillionensi, & montibus Tincto oppido proximis  
inuenitur, nec non in agro Lugdunensi, ubi eius flos a rusticis  
des flascons nominatur. Quę uerō cultis locis prouenit, folijs  
est coriandrinis, puniceo flore, capitello rhœadis, frumenta  
ceis agris familiaris. Gallicum nomē flori est des asphlenons,  
aut des rubis: alibi des passefleurs. Tertia florem lacteum aut  
purpureum edit, & ferē est ignota, nisi ea sit, quam pascim Lu  
tetia pro argemone ostentant. nam descriptio ei non ineptē  
conuenit, & penē tota adstipulatur.

ἀνέθον, Anethum.

Latini & officinæ Græcum nomen usurparunt. uulgu tum Gal  
lorum, tum Delphinatium, tum nostratium de l'aneth appel  
lat: Itali anetho.

ἀνθεμὶς ἢ χαράμηλον, Anthemis,  
Chamæmelum.

Chamæmeli nomen Latinis, officinis & uulgo Gallico, Delphi  
natico, & nostrati celebre est: illis enim camomille: Italis autē  
camamilla uocatur. Tria statuūt anthemidis siue chamæmeli  
genera: leucanthemon chamæmelū, chrysanthemon, & eran  
themon: Ex quibus leucanthemon toti Galliæ notissimum,  
& usu multo clarissimum est: reliqua genera non item. Vult  
Fuchsius eranthemon consolidam regalem dici. Syluio præ  
ceptor nostro, Fuchsius erāthemini nomine cornuetam pingit,  
quam nonnulli ad edysarum referunt. Chrysanthemon cha  
mæmelum hic inuentu rarum, & paucis notum.

ἀνισον, Anisum.

Officinis nomen retinet, uulgu Galliæ uniuersæ de l'anis: Ita  
lia autē aniso appellat.

ἀπαρίνη, Aparine.

Officinis rebus & spargulum: Gallis du gratteron: Italis spe  
ronella. Philanthropi nomen idē sibi adoptauit, quod per  
transeuntium uestibus adhærescat: omphalocarpi autē, quod  
humani umbilici effigie semen eius sit æmulum.

ἀπιος, Pirus.

Varia ac penē innumera sunt pirorū genera: Gallis des poires,  
Delphinatibus poires & perus, nostris de peros, Italis pera di  
cuntur. Arbor poyrier Gallis, & perier nostris.

ἀρχαδία, Pira syluestria.

Notiora sunt pira syluestria, quā ut explicari debeant.

ἀριστοχία, Aristolochia.

In tria genera fastigiatur, longam, rotundam, & clematitim. Lon  
ga officinis nomen retinet: Arabibus faufel, nostratibus fau

terlo, & Delphinatibus de bloufons, nominatur: Gallis iam a  
ristolochie dici cœpit. Rotunda suam quoq; nomenclatiōē  
seruat. nostris autem fellayo ab amaritudine, quasi fellago, di  
citur. utraq; officinis notissima, & quotidiano usu clarissima.  
Italię ambę anonymæ. Clematitis autem, quantū equidem iu  
dico, adhuc ignota delitescit.

ἀρακος, Aracus.

Cicerculæ effigie auctori similis est, ut possit cicercula syluestris  
cenferi.

ἀρνέυθος, Iuniperus.

Iuniperi duo genera: maior & minor. Volūt quidā maiorē iuni  
perum cadē uulgo appellari: minorem autem genefure: no  
strates tamen utramq; speciem una appellatione, cadē nimi  
rum, complectuntur. Iuniperus maior Gallis infrequens, Del  
phinatibus inuenitur, apud nos autem copiosissime fruticat,  
& plerunq; calidioribus syluis, in arboream proceritatem as  
furgit. ambo ginepro Italis dicuntur.

ἀρνόγλωσσον, Plantago.

Duo plantaginis genera: maior & minor. maior officinis nomē  
retinet: minor quinqueneruia aut lanceolata nominatur. Est  
& altera maioris plantaginis species, quæ priuatim officinis  
arnoglossum dicitur, rotundioribus folijs, lanuginosis & sessi  
libus, usuq; multo clarissima. Omnes uulgo notæ. nā Gallis &  
Delphinatibus du plantain, nostris plantage: Italis autem pian  
tagine & centinerbia appellatur.

ἀρον, Aron.

Officinis iarrus, & pes uituli: Italis gigaro. Flos autē, q̄ in uirilis  
pudendi speciem affurgit, Gallis uit de prebstre nuncupatur.

ἀρτεμισία, Artemisia.

Artemisia Græcis, Latinis & officinis, Gallis armoyse: Delphina  
tibus & nostris arcemise. Duūm est generū: multicaulis, & u  
nicaulis. Multicaulis in maiorem ac minorem diuiditur. Ma  
ior iam dictis nominibus appellatur. Minor quorundā senten  
tia est uulgaris matricaria, quæ Italis amarella, Delphinatibus  
blancheto, nostris l'herbo de nostro damo nominatur. Alio  
rum non item, ut qui eam ad parthenium commodissimē re  
ferri putēt. Tertiā artemisię speciem monoclonon dictam,  
ignorari est certissimum: ideōq; falli eos qui tanacetum offi  
cinarū athanasiam, Gallorū thanasie, Italarū danéa, Delphina  
tiū thanéo, & nostratiū thanarido, artemisię speciem, præci  
puē tertiā esse statuunt, ut quæ sit multicaulis, & grauissimū  
spiret odorem: monoclonos contrā unicaulis, & suaue olens.

ἀσαρον, Asarum.

Officinæ antiquum nomen seruant: Gallis du cabaret: Italis bac  
chara dicitur.

ἀσπάλατος, Aspalatus.

Desyderatur ueterum aspalatus: cuius loco suffici potest uiticis  
semen, ex Galeni succidaneis.

ἀσπάραγος, Asparagus.

Latini & officinæ Græca nomenclatiōe utūtur. Duo asparagi ge  
nera. Atilis, & syluestris. Atilis ubiq; Galliarū des asperges:  
Italis autē asparago. Syluestris qui & petræus, & myacāthinus  
Græcis dicitur, Delphinatibus rouge cōniz: nostratibus (apud  
quos copiosissimus ubiq; puenit) romieu conieu, quod cuni  
culis annuū pabulū suppeditet, nominatur. Apud Delphinates  
nusq; nisi in hortis, uisit. Gallia asparago syluestri caret, nisi eō  
aliūde importetur. Illius radices magni sunt in medicina usus.

ἀστὴρ ἀττικὸς, Aster Atticus.

Quid fuerit aster Atticus, hæten⁹ dubitatū a doctis penē omni  
bus est. Nos tamē, multis laboribus & uigilijs huic disciplinæ  
insumptis, dei beneficio uerū asterē Atticum in gratiā radem  
cū suo Dioscoride primi (quod equidē sciam) in Galliā supe  
riore anno reuocauimus. Ea siquidem plāta est, quā nostrates  
officinæ Christi oculū appellāt: Galliæ ignota, Delphinatibus  
inuentu rarissima: apud nos ubiq; tam frequens & copiosa, ut  
nusquā nō pedibus, si uel tantillum in agros uel itinerū mar  
gines diuerteris, conculcetur, ut alibi copiosius dicetur. In Ita  
lia frequens, sed uulgato nomine destitutus.

ἀσάφης, Vua passa.

Vulgaris est ubiq; gētium notitiæ. Galli de la panse, ou raisin de  
panse, Itali uua passa, Delphinates raisins cōfitz, nostrates agi  
bisses nominant.

ἀσάφης ἀγρία, Astaphis agria.

Officinis staphis agria. Semē enim sub plantę appellatione usur  
pant. Planta his locis non ita familiaris. Apud Gallias in hortis  
frequens. Gallis, Delphinatibus & nostratibus de la graine de  
l'esparuier dicitur. In Italia anonyma.

ἀσφόδελος, Asphodelus.

Officinis aphrodilus. Apud Pictauios frequēs, & alendis suis  
accommodus. hic rarus. Apud nos copiosissimus nascitur, &  
uulgo de porraches, a similitudine foliorum porri, appel  
latur



latur: in Italia uerò amphodillo.

ἀτρακτύλις, Atractylis.

Ἀτρακτύλις Græcis: Atractylis Latinis: officinis & uulgo ignota. Nam cnici generibus, & acarna candidior à Theophrasto cap. 4. lib. 6. hist. plât. pingitur: cuius foliū peculiare hoc habet, ut uulium, & carni admotum sanguineum succum remittat. unde sanguinis cruentæ ue nomen herbæ inditum. graui est præterea & maligno odore. Semen tardè perficit, autumno nimirum. Quæ notæ satis sunt ad improbandam eorum sententiam, qui syluestrem cnicum primi generis, atractylidem esse autumant: ut taceam ea omnia atractylidi parum aptè assignari, quæ Theophrastus loco iam commemorato, manifestis uerbis de cnico pronunciauit. Sit igitur atractylis ex earum plantarum genere, quæ adhuc parum cognitæ sunt: & putata atractylis, atq; carduus benedictus (ex Theophrasti sententia) syluestris cnici species: hic, posterior: illa, prior, ut in cnico dicitur.

ἀτρίπλεξ, Atriplex.

Latinis & officinis idem obtinet nomen: Gallis nunc bonne dame: nunc prude femme: nunc des arroches: Italis autem trepe se, & reppese uocatur.

ἀψίνθιον, Absinthium.

Quatuor absinthij sunt genera. Ponticum, quod officinæ Romanum appellant. Santonicum officinis propè omnibus ignotum: eius tamen semen santonicæ aut seminis contra (uulgu Gallorum id mort à uers, & cum nostratibus, barboutine uocat) appellatione celebratissimum: quanquam non desint, qui absinthij marini semen id esse existiment. Seriphium seu marinum, tum officinis, tum medicorum non paucis incognitum, maritimis tractibus familiare ac copiosissimum. Et uulgare, quo solo, maximo tum errore, tum mortalium detrimento, utuntur omnes ferè officinæ: tanta est earum cæca ignorantia, & uirtutis inimica, desidia. Omnia absinthij genera Lutetia Parrhisiorum uiuentur, præter marinum, quod ipsi Tholone, & alibi passim maritimis locis millies uidimus. Ponticum in hortis Lugdunensibus copiosum diligentia Claudij Milleti, medici doctissimi, & rei herbariæ peritissimi iam luxuriat. Vulgare absinthium Lutetia de l'aloine: Belgis & Delphinatibus du fort, nostratibus d'eyssensis quasi d'absinthium, Italis assenzo nominatur. Reliqua genera, uulgata, quod sciã, nomenclatione carent.

βάλανος μυρσίνη, Glans unguentaria.

Glans unguentaria Dioscoridi fructus est arboris myricæ similis, in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra secus Iudeam. Is Arabibus ben dicitur. Duūm est Mesuæ generum: maior & minor. Maior auellanae magnitudine spectatur, triangularis quodammodo, superiore sui parte uetricosior, inferiore tenuior, & nonnunquam sessilis, interdum subacutus: & (quæ est naturæ in rebus fingendis uarietas) quandoq; multangulus, proq; sua magnitudine ponderosus: cortice pistacij, læui, sed fragiliore ac subfusco: intus carnosus, carne oleosa, leni ac pingui, quæ paulò diutius mansa nauseam proritat. Hic fructus copiosissimus nostra ætate in Hispania prouenit: iamq; inde Venetias portatur: solidarijs non ignotus: suffumigatoribus ben nomine notissimus. Est & minor myrobalanus, ciceris magnitudine, niger, malus: qui Mesuæ, si ex nigro albescit, & medulla est alba, leni, pingui, & uetus, est innocentior. Hic ambo inueniuntur. Minorem tamen nondum uidi. Maioris glâdes habeo plures uiginti, quæ ueterum tum Græcorum, tum Arabū descriptioni tam eleganter conueniunt, ut certissimum sit ben suffumigatorum & solidariorum esse Græcorum balanon myrepicam, & Arabum ben.

βάλανος, Glans quercina.

Glandis quercinæ, ut & quercus ipsius, uaria sunt genera: nota tamen, & speciei appellationem retinentia, ut de quercu dicitur.

βάλσαμον, Balsamum.

Nomine tenus cognita sunt tū liquor, tum fructus, tū lignum: tametsi uidere est apud solidarios & pharmacopolas fructum & lignum res plane à carpobalsamo & xylobalsamo diuersas. Ex Galeni tamen succidaneis opobalsami loco substitui potest myrrha stacte, quæ est purissima totius liquoris portio, & doctorum sententia, styracis liquidi nomine cognita: aut oleum irinum, aut odoratissimæ iridis radix: aut xylobalsamum oleo ueteri incoctum, Manardo. Alijs aliæ misturæ, quas in recentiorum libris inuenies. Xylobalsami autem inopiam emendant, albæ uiolæ radices. Carpobalsamo nullum succidaneum est, ut tutius sit à uulgaris carpobalsami usu abstinere.

βαλαύστιον, κύτινος, Balaustium, Cytinus.

Hoc discriminis inter se duntaxat habent, quod illud syluestris,

hichortensis punici mali flos sit. Ambo uulgaris notitiæ. Nomen enim apud officinas retinent.

βάτος, Rubus.

Bati nomen communioem nobis appellationem sortitur, buyse son scilicet, qui ad omnem spinosum fruticem se extendit. Rubus autem magis propriè accipitur ronse: nobis roumi: Italis rouo. Rubi duo genera, maior qui & celsus barbaris dicitur: minor qui bassi nomen iisdem obtinuit: humilior enim est, humi ferè ubique repens, & in medicos usus accommodatior.

βάρβαλον, Ranunculus.

In quatuor fastigia distribuitur. Vulgare flore luteo, uineis familiare, cuius flores Galli des baises appellant: herbam, hic piepou. Lacteo flore insignitum, in syluis Gallia & Delphinaticis copiosissimum. Vulgatum apium risus, in stagnantibus, aut pigro lapsu repentibus aquis frequētissimum. Purpureū, nobis non adeo familiare: quanquàm id ad pedem corui referri quidam uelint. Rari sunt his temporibus in medicina usus. Ranunculi Italis pie coruino, & pie di gallo nominantur.

βδέλλιον, Bdelium.

Officinæ, uocum adulterio gaudentes, bedelium uocant.

βλήτρον, Blitum.

Betacei generis olus est, Gallis du bleti, Italis biedoni.

βολβός, Bulbus.

Bulbus: alius esculentus, qui Gallis des appetitz, quod sit uelut quoddam gulæ cibos fastidientis iritamentum, appellatur: aut etiam oignonet, à forma cepe, quam repræsentat. Vomitorius alius, mihi ignotus. Non desunt tamen, qui utrunque bulbum ignotum esse uelint.

βόγλωσσον, Buglossum.

Vulgaris borago est. Cuius duæ sunt species: hortensis, quæ Italis borragine: toti Gallie borache: nostris borrayo: & erratica. Quæ uerò herba passim pro buglossio in usum medicum trahitur, ad Dioscoridis circium doctorum omnium consensu est referenda.

βόφθαλμον, Bupthalmum.

Cotula officinarum non foetida est. Nam uulgarem cotulam foetidam uerum Dioscoridis parthenium esse, eius delineatio demonstrat, ut suo loco, in amaraco uidelicet, diximus.

βένιον, Bunium.

Gallis nauet, aut naueau: Italis nagoni. Semen eius de la nalette: Delphinates & nostrates etiam naueau appellant: nostri tamen, frequentius rabo nominant, buniadis ac rapi nomenclationem confundentes.

βράβη, Sabina.

Officinis sauina: Gallis du saunier: Delphinatibus & nostris sauiue: Italis sauina. Duo sabinae genera: unum folijs cupressi, notum: Alterum tamarisci, non ita multis cognitum. Facit Dioscorides sabinae herbam arborē coactæ breuitatis, quod ut plurimum accidit. nos tamen anno superiore duas apud Delphinates sabinae plantas uidimus, quarum altera quatuordecim, altera duūm supra uiginti pedum altitudinem excederet, ac superaret.

βρετανική, Bretanica.

Doctorum penè omnium iudicio, officinarum & herbariorum bistorta est: Gallia & huius gentis montibus præcipue familiaris: quidam tamen bretanica ignotam putant.

βρώμος, Avena.

Vulgaris est notitiæ: officinæ nomen Latinum usurparunt: Gallis & Delphinatibus auoine: nostris suado: Italis uena, & biaua.

βρύον βαλάτιον, Marinus muscus.

Officinis corallina. Inuentu facilimus in mari, unà cum corallio, cum quo euellitur, & ab eo nomen sumpsit.

βρύον, Muscus arborum.

Is est, qui arborum caudicibus adhæret. duūm generum est: Procerior & prominentibus barbis adsimilis: umbrosarum sylvarum & uallium arboribus adnascens: hic rarus est, & ueluti per floccos sparsus ac distributus: Alius breuior, densus & crassior roborum caudicibus agglutinatus: uterque uulgo dela mouffe, officinis usnea, Italis mosco appellatur.

βρυονία, Bryonia.

De bryonia in uite alba dictum est.

βυβώνιον, Bubonium.

De bubonio supra in astere Attico diximus: copiosissimè eius historiam alibi exaraturi, si domino ita uisum fuerit.

γεντιανή, Gentiana.

Officinis nomen retinet: Gallis de la gentiane: Delphinatibus (apud quos, si usquam gentium, copiosissima progerminat) & nostratibus de genflano: Italis gentiana uocatur. In ore est



est omnibus. radix plurimis cognita, planta non ita multis. excelsis enim montibus, eorumque planiciebus delectatur. Nec facile est gentianam calidior solo, sponte natam, inuenire. Faciunt nonnulli & minorem gentianam, quæ alibi raro quàm in montibus inuenitur, gustu amarissimo, folio quasi saponariæ, flore cæruleo, radice digitali, caule dodrantali, nodoso, læui. Eam sæpius uidi in montibus, argillosis præsertim in locis. Floret æstate. Semen uix maturescit. Aiunt eam quibusdã Italiæ populis uulgo petimborsa nominari: maximamq; ac nobilissimarum uirium esse. Ea Fuchsio cruciata nominatur.

*γίνγρη*, Vinacea.

Officinæ arilli, Gallis des pepins, nostris des grignôs, ac si dicas granula, appellantur: uulgaris sunt notitiæ.

*γγγίδιον*, Gingidium.

Officinarum est chærepholiū, uulgo item Gallorū, Delphinatium & nostratiū du cerphueilz nominat, nulli matronæ olitorie incognitum. quanquàm sunt qui contendunt uerum gingidium in his regionibus ignotum esse.

*γλαύκιον*, Glaucium.

Quidam, & quidem doctiores, putant apud seplafias memithæ nomine haberi: alij ignotum esse contendunt. Nos eam litem alijs dirimendam relinquimus. Constat tamen certumq; est, multas remediorum formulas parari posse, si memitha glaucium sit, quæ alioqui nequaquam parabuntur.

*γλήχρον*, Pulegium.

Officinæ nomen seruant: uulgo du polieu aut poliot: Italis pulegio.

*γλοις*, Balnearum sordes.

Balnearum quasi obsoleuit usus, præterquàm in Italia: atq; ob id sordes huiusmodi ad usus medicos non expetuntur.

*γλυκύριζα*, Radix dulcis.

Officinis corruptè liquiritia pro glycyrrhiza: Gallis reglice: Delphinatibus & nostratibus regalice: Italis regolitia. Radix maximi in medicina usus. planta non ita multis cognita. Succus autem glycyrrhizæ inopia ut sarciaur habes cap. 52. lib. 8.

*γλυκυσίδα*, Pæonia.

Officinæ nomen retinent. Duū est generū: mas folijs iuglandis, fœmina latioribus, rotundioribus, & insigniter dentatis, adq; smyrnij folia proximè accedentibus. Vtraq; species Lutetie in hortis inuenitur. Fœmina his locis copiosissima. Galli utranq; speciem una appellatione complectuntur: nā pæonia flores des roses nostre dame nominant: hic, quod sciam, anonyma est. Nostrates de piouno uocant.

*γναφάλιον*, Gnaphalium.

Putatur uulgaris officinarum cotonaria: quibusdam tamē ignotum est.

*γαγγυλίς*, Rapum.

Latinis & officinis idem nomen seruat. Gallis & Delphinatibus des raues: Italis rape: nostris rabes: quanquàm hac appellatione buniada quoque, id est, napum complectantur: Galli itidem ea uoce raue raphanum hortensem plerunque nominant.

*δαμασώνιον*, Damasonium.

Ad damasonium referunt docti herbariorū plantaginem aquaticam, cuius penuriam sarcit eryngium cap. 29. lib. 11.

*δαυκος*, Daucus.

Officinæ nomē quidem retinent: At suspicio est uel maxima, primam dauci speciem his regionibus ignotam esse. Ad secundā reuocat Manardus lebysticiū officinarū, quod sanè assentiēte multorum doctorū uirorū iudicio ac testimonio smyrnion Dioscoridis est. Sed tamen ad secundum genus nō ineptè referrentur saxifragæ uulgares, etsi eas quidam sui generis herbas existiment. Tercium genus uulgaris est notitiæ, & solum apud officinas, dauci nomine, in usu creberrimo.

*δάφνη*, Laurus.

Officinis nomen seruat. lauri baccæ in usu sunt frequentissimo: planta rarissimo. Gallis, Delphinatibus, & nostris laurier, Italis lauro.

*δικταμνον*, *ψευδοδικταμνον*, Dictamnium, Pseudodictamnium.

Officinæ diptamum appellant. Verum dictamnion ex Creta insula (cuius unius soboles est) Venetias: Venetij Lugdunū im portatur: quo loco id mihi, sed sicum, uidere contigit: rarum tamen negotiatorum incuria hic est. Pseudodictamnion in Hispania copiosissimum: hic ignotum.

*διψανον*, Veneris labrum.

Officinis & herbarijs uirga pastoris. Duo eius genera: hortensis, Gallis chardon à bonetier, Italis cardo: syluestris nostratibus de brustis, id est, scopa uestibus emundandis dicata, nominatur.

*δωρύκειον*, Dorycnium.

Ignoratur.

*δολίων*, Dolichi.

Vulgo nostratium phaioulx rouges, Italis fagiuli turcheschi nominantur: maritimis præsertim locis assiduo cultu nobiles, & cibis propè quotidianis expetiti.

*δρακόντιον*, Dracontion.

Tria sunt eius genera: primum uidi Plinius in Hispania, nostris temporibus ignotū: alterum est uulgaris serpentaria maior: tertium, minor, seu uirile sacerdotis. Dracontio Italis dragocello & serpétaria. Ruellio placet hoc caput apud Dioscoridē ascititium esse, quod simile ueri non est. Nam id Galenus silentio minimè erat prætermisurus, quem constat lib. 6. simpl. satis amplam de dracontio mentionem fecisse.

*άγρς*, Quercus.

*άγρς* Græcis: Quercus Latinis & officinis: Gallis & Delphinatibus chaisne: Italis quercia: nostris roure. Ad quercum multæ gladi feræ arbores referuntur: *ιλεξ*, Latinis ilex, quæ duorū præcipuè est generū. Pumilla, quæ post cocco baphicum rubrum (nostris, apud quos plurimus colligitur, uermilhon appellant) glandē de se promit. Proceræ, quæ nostro sermone eulse, Italico elice dicitur. Est & tertia ilicis species aquifolia cognominata. Huius duo quoq; genera. Mas pumilla, quæ fructū ex croceo purpureū, pisi magnitudine, & effigie racemosum, autūno inclināte ad hyemem, profert. In agro Delphinatico & Lugdunensi copiosissima. Fœmina procerior, arborq; iustæ magnitudinis, naturā sterilis, folijs latioribus & magis aculeatis, quam Galli du houx, nostris greu uocant: ex cuius cortice uiscū optimū cōficiūt aucupes. Ad quā ilicis specie iure optimo suber referri potest: cuius cortex Gallis du liege: nobis tū arbor, tū cortex suæ, Italis souero nominat. Maritimis (quod Plinius minimè existimauit) nostre pūinciæ locis, circa Forū Iulij, & Gratsā, urbes nō incelebres, familiare. Ilcis species oēs perpetua fronde uirēt, & robustissima sunt materie. Quercuum generi à quibusdã assignatur fagus, quæ Gallis fausteau: Italis faggio: nostris faus. eius fructus Gallis des faines: nostris fayou: Italis ghianda di faggio nominatur. Is triangularis est, & rusticis, infatē fame, in cibis, ob dulcedinem, expetitus: præcipuumq; urforum pabulum.

*έβισκος ή άρδαία*, Ebiscus, Althæa.

Nobilissima, quāquàm syluestris, species maluæ est, & usu medico celebris: uulgo officinarū & herbariorum bismalua ab eius præstatiā, Gallis guimaulue, Italis malua uisco, nostris mailue blāche dicitur. Est & alceæ herbarijs herba symeonis, Italis nūc bismalua, muc malua saluatica, interdum buon uischio, & malua uischio nominata.

*έβνος*, Ebenus.

Autori lignū est. Dioscorides indeterminatā eius generis, lignū ne esset, an aliud, nomenclationē reliquit. Paulaniæ, in Attica historia, radix cēsetur, qui, ex herbarij cuiusdã cyprij sententiā, hæc de ebenu scriptis mandauit. Equidē audiui Cyprium quendā, qui herbarum genera omnia ad medicandos homines optimè dignoscere sciebat: is ebenum folia producere negat, neq; ullum fructum ex ea existere: deniq; sub sole nusquam apparere, sed esse radices subterraneas, quas Aethyopes fodiant, apud quos sint qui ebenum reperire sciant. hæc ille. Ex quibus colligi potest, quid sit ebenus. Apud doctos nomen retinet: Italis de l'ebeno, officinis ignotus. De hebeno plura lege apud Solinum cap. 65. ad hæc apud Plinium, & Theophrastum.

*ελία*, Olea.

*ελία* Græcis: Latinis olea. Duū est generum, urbana & syluestris: urbana Gallis, Delphinatibus & nostris oliuier, Italis oliuo: fructus oliue nominatur: arborq; est omnibus nota. Syluestris autē officinis, medicorum plurimis, & Gallis incognita: nostris & Delphinatibus nostre pūinciæ (nā frigida loca horret & calidis delectatur) conterminis alauerd, ac si dicatur olea uiridis, & d'alauerd, Italis oliuo saluatico nominatur. Folia enim quā domestica uirentiora, minora, breuioraq; habet, & per ambitum molliter crenata. In syluis frequens nascitur, unde sibi apud Græcos id cognomentū adoptauit. Apud nos copiosissima inuenitur.

*ελαφόβοσκον*, Elaphoboscum.

Officinarum & herbariorum gratia dei est, iam cognitu facilis: Gallis quibusdam de la phalouse. Lutetia innominatum, ut & Italia.

*ελεινιον*, Helenium.

Vulgaris iam est notitiæ. Officinis & herbarijs enula campana: uulgo Gallorum, Delphinatium & nostratium, de la campane, Tuscis lella, alijs enola, & enoa, usu multo celebris.



*ἑλλεβορος, Veratrum.*

Veratri duo summa fastigia: album & nigrum. Album Gallis de l'ellobore: Italis elleboro bianco: rusticis alpium de uerare & de uararou: nostris uerayre nominatur. In excelsiorum montium pratis luxuriat, humidioribusq; præsertim locis (in quibus non raro candidi ueratri caulem, tricubitalem implere longitudinem conspexi) delectatur. Frequens ac copiosum apud Delphinatium montes, & in alpiis prouenit, nulli è plebe ignotum. Nigrum officinis nomen, ut & candidum, seruat: quanquam inter doctos non constat, an ea planta, quæ nigri ellebori nomine celebratur, & in medicos usus admittitur, nigrum ueratri sit. Scio plerosq; pharmacopolas ualde deceptos lycoctoni secundi generis radices inconsulto pro nigro ueratro in suis tabernis uenales habere, eisq; quoties nigrum ueratrum expetitur, pudore omni deposito, uti. Fuchsius, placet consiliginem Plinij & Columellæ (quæ Gallis poumelée: Delphinatibus marfitre: nostris pomolueyo, quasi polmoniero, id enim nomen iam dictis autoribus quoq; habuit, nominatur) nigrum elleborum uocandam, & alterius inopia, in usum uocandam esse. Alij, etiam uiri celebres, tria nigri ueratri genera in Italia nasci contendunt: primum, cui purpurei: alterum, cui candidi: postremum, cui herbidi insunt flores. E quibus nos duo priora, lycoctoni aconiti species: postremum, Columellæ ac Plinij consiliginem esse existimamus. Siquidem Alpini Delphinates radicibus primi aconiti lycoctoni generis utuntur ad mouendas utrinq; purgationes: eorumq; lingua antonno & anthoulo, Lygurum uero anthoro dicitur: duas posteriores species ad luporum & aliarum ferarum uenationes ac perniciem reliquas faciunt. Postremum, id est Columellæ ac Plinij consiligo, Fuchsius, ut dictum est, elleborus niger adulterinus: Gallis poumelée, Delphinatibus marfitre, nostris pomolueyo nominatur, maximamque uirum est contra omnis generis inflationes, maximè uenenosas: contra ellebori albi, ouillum pecus male habentis, uiolentiam: contra pestilentiae contagia, ut quotidiana mirèque salubria rusticorum experimenta testantur. Siquidem oues quæ pullulascens candidum elleborum, una cum reliquo pabulo, deuorant, statim totæ intumescunt tantopere, ut minimè absint, quin præ immodica tensione distumpantur, uomuntq; assidue ac magnis conatibus. Unde opilio-nes, non ignorata tam perniciosa alimentum inclementia, cognitoq; salutari remedio, consiliginis ramis aliquot arreptis, malè affectarum & de uita periclitantium pecudum terga, uentre, lateraque eis tandiu percutiunt, (eas obambulare cogentes) donec totus immodicusq; ille tumor euaporarit, & uomitus sedatus fuerit: id quod duabus tribusue, ad summum, horis perficitur. Ad hæc scio nostræ prouinciæ rura, ad quauis pecoris contagionem, trunco consiliginis uti, perforatis ferro animalium auribus, truncoq; ad extirpandum uenenum, foraminibus impacto. Quamobrem simile ueri non est, consiliginem, cum ueratri candidi uitia emendet, eiusq; malignitati aduersetur, nigrum elleborum esse: nihilq; mirum uideri, si uiri docti, magno successu, primi generis lycoctono aconito, & Plinij consiliginem, ad melancholicas affectiones utantur. Ceterum si quis commemoratarum iam plantarum radices diligenter expendat, nihil illas cum nigri ueratri radicibus (quæ teste Dioscoride, cepe modo bulbosæ sunt, erumpentibus ab imo earum bulbo multis radiculis) comune habere multo euidentius coperiet, quam ut pluribus demonstrari nunc debeat. Taceo nullam ex his plantis, dum uelluntur, capitis dolore, ob uaporum halitum, concitare, ut ipse millies sum expertus. Id quod in nigri ueratri euulsione testatur Dioscorides: ideoq; citissime, ad uitandos dolores, euellendum esse. Ex his igitur constat, nullam harum trium plantarum, ad nigrum ueratrum satis aptè posse reduci, quoniam duas priores, aconiti lycoctoni postremas species esse: postremam herbam sui generis: difficilèq; his in regionibus, nigrum ueratrum inueniri, sed nomine tenus cognitum esse.

*ἑλξίνη, Helxine parietaria.*

Officinarum parietaria est. Delphinatibus de l'esparge: nostris spargoulo: Gallis paritoire: Italis uetriola.

*πανικον, Panicum.*

Panicum nomen officinis & Gallis, du panicum appellantibus, retinet: Italis panico, & panizzo.

*ἐμπετρον, Empetrum siue epipetrum.*

Vulgatam cretam marinam ad empetrum referri quidam uolunt, sed nequicquam: nam ignota his regionibus herba adhuc est. Epipetri tamen inopiam sarcit scammonium pari potest cap. 76. lib. 3. Est & Fuchsius suum empetrum seu saxifragium, quod officinæ salutem uitam: & Delphinates saue uie appellant: quodq; dominus Iacobus Syluius præceptor meus longè doctissimus, ad quartum adiantum genus reducit: quæ herba à ueterum empetro siue epipetro longè diuersissima, tum delineamentis, tum facultatibus est, quæadmodum alibi suo loco dicemus.

*ἐπιθυμιον, Epithymum.*

Officinis nomen retinet, omnibusq; in ore est: thymo & satureia adnascitur. usus est in medicina celebris, & multi.

*ἑρβυλος, Cicer.*

Officinæ Latino nomine utuntur. Gallis pois ciches: Delphinatibus & nostris ceses, Italis cece. Duo ciceris genera, album & nigrum, quod arietinum uocatur, inq; medicinam recipitur, & officinis cicer rubrum nominatur. Album, aliud maius, aliud minus. Maius fabas sua ferme magnitudine æquat: coctionem paucam sustinet, & cibum palato suauissimum præstat: meis Saniensibus familiare, qui, à magnitudine sumptæ appellatione, gros cese nominant: minus omnibus notum.

*ἑρπυλλος, Serpyllum.*

Nomen officina seruat. Gallis & Delphinatibus du serpoulet, Italis serpillio, nostris serpoulhet dicitur.

*ἑρύσιμον, Irio.*

Eruca nobilis herbarijs: Gallis noble roquette: officinis ignotum. Italiæ anonymon. Erucae species est. urbium fossis & itinerum marginibus familiare. Luteum florem promit.

*ῥοβία, Rubia.*

Duo erythrodani genera, maius quod rubia maior, aut rubia tinctorum: minus rubia minor officinis & herbarijs dicitur. maior autem rubia Gallis de la guarence: nostris autem ronio, & Italis robbia, nuncupatur.

*ῥοκκίον, Eruca.*

Officinis nomen seruat. ubique Galliarum de la rocquette, Italiæ rucchetta. omnibus nota.

*εὐπατόριον, Eupatorium.*

Officinarum est, & Italicorum, agrimonia: Gallorum agrimoine: nostratum agrimoni. Quod autem officinæ eupatorium appellant, hydropiperi Dioscoridis maximè responderet.

*εὐφώριον, Euphorbium.*

Habetur, & nomen retinet. Si recens non adsit, ueteris duplum substituitur. cap. 31. lib. 12. Sin omnino desit, sulphur aut castorium eius loco admittitur, cap. 27. lib. 14.

*ζέα, Zea.*

Est uulgaris Italicorum spelta. Gallis, Delphinatibus & nostratibus espeulte.

*ζινγίβερ, Zingiber.*

Officinis ginger, Gallis du gingembre, Delphinatibus & nostris ginger, Italis giengeuo. Officinis duplex habetur: album à uulgo magis expetitur, & minus præstans, ob adulterium dolo contractum: flauum, aut penè terreum: ambo notissima.

*ζυθος, Zythus.*

Potus genus est, ex ordeo aqua radiu macerato, donec in liquorem uino similem resoluatur.

*ζυμα, Zyma, Fermentum.*

Officinis fermentum: Gallis du leuain: Delphinatibus leuam: nostratibus leuame.

*ῥόδαντον, Menta.*

Mentæ duo genera: satia, & syluestris, quæ mentastrum Latinis, nobis mentastre, Italis menta saluatica appellatur. Satia in quatuor species distribuitur, quæ non ita multum à sese differunt. nomen omnes retinet, excepta una specie quæ balsami nomen sibi apud uulgos adoptauit. Nā du baulme passim omnibus uocatur.

*ῥοδαντον, Securigida.*

Ruellio placet edysarum, de la graue, quod frumentis sit molestum, Gallis nominari: alijs des cornuettes dicit, à similitudine quam filiquæ cum corniculis habent. Hanc, cornuetta inquam, Fuchsius, ut Syluius noster annotauit, cranthemi chamæmeli nomine depinxit, quæadmodum in Anthemide diximus. officinis q̄ sit ignoratur. In Italia autem frequens est, sed anonymon.

*ἡμεροκαλλίς, Emmerocallis.*

Quid sit, non ita inter doctos constat. quidam liliū, cui flos est croceus, hemerocallim putant uocari: quidam adhuc inconsultius, ne ineptius dicam, genus quoddam satyrij flore pallido aut subalbido hemerocallim faciunt. Italis autem giglio saluatico nominatur. Memoria teneo me, anno domini 1547. mense Maio, non procul à Lugduno herbam quandam uidisse, cui notæ hemerocallis omnes magno consensu adstipulentur. Siquidem bulbosam habet radicem, satis magnā, tuniculis ceptum exemplo intertextam, candidā, succosam: caulem rectum, teretem, caulis lilij aut asphodeli æmulum: per singulos exortus, uersus caulis summum, flores exiguos, suppalidos, florem lilij figura omnino repræsentantes: folia porracea, non numerosa, humi strata, & alia omnia, quæ eam plantam hemerocallim esse aperte conuincant. Copiosissima nascitur in monticulo, seu uerius colle terreno quodam, qui planitiem, quā Lugduno Viennam Allobrogum iter est, terminat. Floret mense Maio. Quod illi sit uulgatum nomen, me ignorare ingenuè fateor: in ea tamen sum sententia, ut eam quam depinxi herbam



bam hemerocallim esse certò existimem.

*ἡνρύριον*, Senecio.

Officinis nomen retinet: Gallis du senegon: Delphinatibus, & nostris de senigon: Italis cardoncello & spelicciofa. herba est uulgo nota, & magni Aëtio in hepatis affectibus, momenti.

*ἑρύγγιον*, Eryngium.

Officinis iringus: herbarijs centum capita: Delphinatibus pan-chault: nostris panicaut: Gallis (ut & Italis) nullū, quod sciam, apud uulgos nomen obtinuit, ut alibi fusius annotauimus.

*θάψια*, Thapsia.

*Θάψια* Græcis iuxta ac Latinis: officinis prope omnibus, Gallis & Delphinatibus ignota. Musæ Brassauolo in quibusdam Italiæ mōtibus prouenit, & à rusticis crassegnana uulgo nūcupatur. In nostræ quoq; prouinciæ mōticulis quibusdā, prope Pertusiū celebre oppidū, quos uocat Les trois freres, nascitur, phar-macopolis eius urbis cognita, uulgo ignota. plurima quoq; in Apulia luxuriat: uulgo tamen anonyma. Ne hoc loci id est de thapsia silentio obliterandū. Si quis spiratibus uentis: hpsiam (media existente inter illū & aurā herba) fossorio rastro euulferit, tā molestos illico pudendorū experietur pruritus, ut præ scabendi assiduitate ac pertinacia, absit quā minimū, quin sibi uirile membrū euellat. Id enim ab ijs q periculū fecerunt, nuper intelleximus: ut inde facile sit obseruationē cōfirmare, quam in eruenda thapsia præcipit Dioscorides.

*λύμιος*, Lupinus.

Officinis nomen seruat, uulgo ubiq; Galliarum des lupins, Italis lupino. Duorum est generum, satius & erraticus.

*θλάσιον*, Thlaspi.

CapSELLA & scandulaceū Latinis: officinis ac herbarijs nasturtium testorū, & sinapi rusticum. Duo thlaspios genera, maius & minus: utrūq; lapidosus & uineis delectatur, herbariæ rei studiosis iam notissimum, uulgo ignotum.

*λακκάδα*, Lactuca.

Lactuca alia crispa: rotūda alia: alia capitata: officinis nomen retinet. Gallis & Delphinatibus lactue: nostris lachugo: Italis lat-tuga: omnes uulgo notæ.

*θύμος*, Thymus.

Latinis & officinis nomen retinet: Gallis du thym: Italis thimo: Delphinatibus & nostratibus frigoulo: tā ubiq; notus, ut ne tri-mum puellum eum ignorare existimem.

*σάτυρον*, Satureia.

Satureia Latinis & officinis: Gallis de la thymbre ou sariette: Tu-scis conicella, in alijs Italiæ locis saureggia & penerella. Del-phinatibus de saourée: nostratibus seiruegno. Duo eius sum-ma fastigia: syluestris, quæ præstantior: & domestica, maximi in hybernis iusculis apud Delphinates usus. Iusculi genus appellant de la pouruôlo, aut pōuruora.

*ἰντύβοι*, Intybi.

*Σῆσις* Græcis: intybus Latinis. Duo summa seridis genera: sylue-stris & satia. Satia seris bifariam distribuitur: In unam quæ la-tiore constat folio, lactucæ similior: Hetruriæ corrupta ab intybo appellatione endiuiā: officinis itidem hæc pro uera en-diuiā est usurpanda, longè ualere iussā illarum endinia, quæ est syluestris lactuca: Gallis endyue: nostris endyuo. Delphinati-bus cichorée. Alterā angustioribus folijs, & gustu subamaro. Hæc quadā uocum diminutione seriola dicitur, quam corrum-pentes recentiores, scariolam dixerunt: ea Gallis scariolæ etiā nominatur, & officinis scariola, Lugduni passim cichorée, qua in acetarijs hyeme tota, maxima palati suauitate, utuntur. Syluestris item in duas species diuiditur. Alteram quæ ab insi-gni amaritudine *πικρὴ ἢ μαχόριον*, Latinis ambubeia, herbarijs & officinis cichorea: Gallis, & nostratibus cichorée: Delphinati-bus cichorée bouschasse. Alteram, quæ hedypnois nomen à somno conciliando, aut ab eleganti inter serides odoris suauitate, sibi adoptauit. Hæc dens leonis, aut rostrum porcinum officinis, Gallis pisse en list, Italis piscia al letto appellatur.

*ἰσῆς*, Viscum.

Latinis & officinis uiscū, nostris & Delphinatibus de uisch, Italis uischio: Gallis guis de chesne. Varijs in arboribus gignitur, & omnium rarissime in quercu, quanquam id solum ad medicos usus celebrari & experi uideatur.

*ἰορ*, Viola.

Hoc loci, uiolæ noīe, martiam appellatam uiolā intelligit. Huius duo inueniuntur genera, cādida & purpurea. Cādida folio est minore, nigriore, quā purpurea, subhirtuto. In hortis Lu-gdunensibus, & syluis uicinis passim inuenitur. Purpurea duū est generū. Siqdē alterius flores, quinque: alterius uerò, qua-tuordecim folijs cōstāt. Hūc uiollette double: illum simplici-ter uiollette uulgos totius Galliæ appellat. Ambo in Italia uiolæ māmole dicūtur. De reliquis autem uiolæ generibus in leucoio agetur.

*ἱππύρις*, Equisetum.

Herbarijs & officinis cauda equina: Gallis de la prele: Delphina-tibus, ab eius asperitate, d'asprette: nostris, à cōsolidandis glu-tinandisq; uulneribus, consaulde nominatur. Trium est gene-rū, sed omnes notæ, & idem nomen retinent. In Italia tamen minor asprella, maior coda di cauallo dicitur.

*ἰσάτις*, Isatis.

Officinis ignota. Duū est generum. Satia Gallis du guesde: Tuscis guado: Aquitanis, apud quos mercimonie nomine ce-lebratissima est, ac nostratibus de pastel, nominatur. Sylue-stris, quanquā doctis non ignota, nullum tamen, quod expi-scari saltem potuerim, uulgatum sibi nomen adoptauit.

*ἰτιά*, Salix.

Officinis nomen seruat. Tria salicis genera, nigra omnium maxi-mè procera, Gallis du saulx aut saule: Delphinatibus & nostris saulse, Italis salice. Candida, quæ mediæ est altitudinis, nostrati-bus uege dicitur, fluminū ripis familiaris. Viminalis, quæ in sa-tiuam & erraticā distribuitur. Erratica rursus bifariam partitur: in pumillā omnium tenuissimā & ruberrimam, & aliā proce-riorem, quæ nigrā salicē quodammodo æmulatur ac mētitur. Viminales omnes sub amerinæ nomine intelligūt & cōpre-hēdūtur, quæ Gallis oufier: nostratibus amarinier: Delphinati-b<sup>2</sup> armarinier, & stolones aut secte uiticulæ nobis amarinos, il-lis armarines, Italis uēchi nominātur. Aliam habes salicis diui-sionē apud Fuchsiū ex Theophrasto, Plinio & Lucio Columel-la. Nos hāc sumus amplexi, ut qui has oēs salicis species exactē cognitas habemus, quarūq; historiā alibi copiosē tractabimus.

*καλαμίνθη*, Calaminthe.

Tria eius genera. Primum officinis nomē retinet: Italis calamē-to. Alterū pulegij regalis (quod uerius clynopodium Diosco-ridis est) nomē sibi asciuit. Tertiū putatur herbariorū & offici-narum herba catti. Gallis, Delphinatibus & nostris l'herbe au-chat. Nepeta Italis nipotella: nec desunt (quod est uerò simi-lius) qui herbam catti calamenti speciem esse negent.

*καλαμός ἀρωματικός*, Calamus aromaticus.

Ostētant officinæ radicē quādam, quam calami aromatici nomi-ne nenditāt: quāq; nonnulli ad acorū referendā putēt: quo-rū nimirū sentētia ueterū odoratus calamus desyderet. Sub-stitui calami, cuius laboramus inopia, potest arborū muscus.

*καλαμός φραγκίτης*, Calamus phragmites.

Arundo: uulgaris est notitiæ: Gallis du rousseau: Delphinatibus & nostris de cannos: Italis canna.

*κάνναβις*, Cannabis.

Officinis nomen retinet: Gallis chanure: Delphinatibus chan-neuou: nostris cannebe, & carbe: Italis canape. In satia & syl-uestre diuiditur. Satia in marē & foeminā, quæ ad lineos usus est accommodatio: sed sterilis mas semen profert. Syluestris multorū ingenia torfit, nec tamē adhuc satis cognita est, quan-quā non me latet herba, quā pro syluestri cannabi ostentant.

*κάπνιον*, Fumaria.

Fumus terre officinis, Gallis, nostratibus, & Delphinatibus fume terre: Italis fumaria & fumo tere, omnibus nota est, & frequen-tis in medicina usus.

*κάππαρος*, Capparys.

Latini & officinæ Græcam appellationem usurparunt. Maritimis locis delectatur hic frutex. Lutetiæ quoq; in horto diuæ Ma-riæ uisitur. Fructus Gallis & Delphinatibus des cappres: Italis cappari: nostris, dictione tantillum immutantibus tapperos no-minat. in nostra prouincia frequēs, maritimis præsertim locis.

*κάρδαμον*, Nasturtium.

*Κάρδαμον* Græcis: Nasturtium Latinis & officinis. Duo sunt na-sturtij genera: hortense, & syluestre, quod quibusdam lepidiū minus, alijs iberis nominatur: & seorsim ab autoribus pingi-tur. Hortense in duo quoq; genera distribuitur. Alteri siquidē folia sunt coriandrinis quadantenus proxima, subalbida: cau-lis rectus, cubitalis, leuis, teres, iunci crassitudine: flos exiguus lactei cādoris. Hoc Gallis craifcon halenoys: Italis agretto: Del-phinatibus anitour: nostris nastours dicitur. Alterū uerò folia habet sisymbrij cardamines, aliquanto maiora, herbacea, caulē rectū, cubitū altum, crassiusculū, striatum: in cuius summo flos insidet luteus, aspectu gratus, alterius flore maior, & ei dissimi-lis. Hoc Lugdunensibus Frāciscanis, in quorū horto tantū ha-ctenus uidere nobis licuit, anitour nominat. Alterū enim illi ipsi crescō des iardins discriminis gratia appellāt. Ambobus in signis acrimonia: sed ī eo cui flores sunt lutei, aliquāto maior.

*κάρδαμωνον*, Cardamomum.

Duplex est cardamomū: maius & minus. utrūq; triāgularibus fili-quulis continetur. Verum in minori flauiores sunt filique, bre-uiiores, multoq; magis articulatę: tunice autē filiquarū tenues sunt, flauę, colore & cōsistentia maci officinarū similes. E ma-iori cardamomo eruitur uulgaris grana paradisi: ē minori aut

B b uulgatum



vulgatū cardamomū minutis acinis, colore ex terreo flauis, & ita inter se compactis, ut sua effigie muscerdam ualde imitentur. Maioris semina multāgula sunt, colore fusca, uinaceis minora, gustus acerrimi, sine ulla adstrictione, cuius, quāquam exigue, uidetur particeps esse minoris cardamomi fructus: & gustus est cum acrimonia minimē insuauis atq; tantillum aromatici. Quibusdam placet officinarum hoc cardamomum, nō quidem Græcorum, sed Arabum esse cardamomum: alijs neutrorum, sed aliquid tertium. Alij piper Indicum, quibusdam Plinij siliquastrum existimatum, ad cardamomum reuocare contendunt: sed quā appositē uiderint ipsi.

καρών, Caron.

Officinis carui. montibus huius gētis herba familiaris, macilentis locis dodrantalis, caule anguloso, non usquequaq; , ut Fuschio placet, quadrangulo, lætioribus & riguis bipedali, plurimum brachiato, flore albo, aut in purpura candido, in summis cauliculis semē angulosum ac copiosum. Folia staphylini, subalbida. Radix cādida, intorta, gustu aromatico. floret æstate. nascitur, ut dictum est, in montium pratis, uulgoq; cheruy nominari ab indigenis solet. Nam illi eius seminis assiduo esu corpora ab hybernīs frigōribus tutantur.

κασία, Casia.

Vulgaris canella est. officinis falso cinamomum dicitur. Nam uerum cinamomum desyderatur. cuius tamen loco optimæ casia duplum capitur cap. 91. & 101. lib. 13.

καρία, Caria nux arbor, nux iuglans siue regia, nux parua, pontica, auellana.

Nux iuglans siue regia, uulgo Gallorum Delphinatiumq; noyer: nostris noguyer: fructus illis noix, nobis nose aut noye: Italis noci. Huius innumera penē sunt genera. Auellanae nucis duo genera. Nā altera edomita, altera syluestris statuit. Syluestris Gallis coudrier: nobis & Delphinatib<sup>9</sup> oulagnier: fructus oulagne: domestica auellanier: fructus utriusq; Gallis auellaine aut noisette: nobis & Delphinatibus auellane: Italis auellana, nocella aut nociuolla. Sūt & Indicae nuges, uomicæ, metel, & anacardi, de quibus recētiore multi abundē scripserunt: ad quos te remitto.

καστανία, Castanea.

Castanea tum Latinis, tum officinis dicitur: Gallis & Delphinatibus des chataignes: nostris castagnos: Italis castania: multorū sunt generum. Nam alię syluestres, alię domesticæ: aliæ maiores, minores aliæ: alię gustui suauiores, alię min<sup>9</sup> suaues. Quæ maiores & suauiores sunt, Lutetię marons de Lyon appellantur. Maximus hic apud Delphinates castanearum omnis generis proventus. In Gallia rarus: apud nos nullus, aut saltem minimus. Pedemontanorum quoq; ac Lygurū ager castanearum feracissimus est, nec non & Aruernorum.

κίχρεος, Milium.

Officinis nomē seruat: Gallis & Delphinatibus dū milhet, & Delphinatibus iuxta ac nostratibus etiam de melh, Italis autem miglio, uocatur.

κέδρος, Cedrus.

Cedri duo genera: maior, & minor. Maior his regionibus nomine tenus cognita. minor ea planta est, quam nostrates ormin appellant, folijs cupressinis, baccis iuniperi maioris, rotundis, pilorum magnitudinē æquantibus, subflauis, gustu acri & aromatico. Planta huiusmodi ulnarū duarū, triūmue, aut ad summum quatuor (in tantā enim proceritate assurgere interdum apud nos uidetur, quāquam rarissimē) longitudinem, & uirilis tibie magnitudinē non excedit, materie dura est, uenis quibusdā santalinis intercurrentibus distincta, suauiter spirās, fronde sempiterna, cortice rimoso, non supra modum duro. Nascitur in mōtib<sup>9</sup>, saxosis præsertim locis, calidisq; duntaxat regionibus. Cedri liquor cedri est, qui primus, dū pix ex cedro sit, ui ignis elicitur. eo liquore his regionibus carem<sup>9</sup>.

κένταυριον μέγα, Centaurium maius.

In Gallia infrequens. Lutetiæ tamē in hortis quibusdam uisitur. Audio à familiaribus rei herbariæ peritis, in albis nasci, in mōte qui cameraco Sabaudorum metropoli ad septentriones adiacet: tum à docto quodam herbario apud Hispaniam, in montibus ei urbi finitimis, quam uulgo nostram dominam de finibus terræ nominant. Doctorum penē omnium consensu radix, quā officinæ rhapōtici nomine uenditāt, centaurij maioris radix est. Explodendus igitur officinarū de cetaurio maiore absurdissimus error: admonendiq; sunt, ut doctos de simplicibus medicamentis consulant, desinantq; tam impudenter in tempus reliquū delirare.

κένταυριον μικρόν, Centaurium minus.

Vulgo herbariorū & officinarum cetaurea minor: Gallis du sacotin: Delphinatibus de repairet: Italis biondella. Vbi que frequēs. Duo huius inueniuntur genera: uulgatū, & aliud monta-

nū, humilior, flore cæruleo, calathi aut campanule effigie representante, caule item quadrangulo, gustu amarissimo. monticolis gentis Delphinaticæ uulgo repairet etiam nominatur. Sed de his alijs copiosius agemus.

κέρασος, Cerasus.

Multa cerasi genera. Nā aliæ acidū fructū, aliæ dulcem ferūt. quæ acidum fructū edūt, Gallis cerisiers, fructus cerises: nostris & Delphinatibus agriottiers, fructus agriottes, Italis ciregie. Huius duo genera. Dulces in multas species distribuūtur. Nā alia duracina, quæ Gallis & Delphinatibus des cœurs, nostris grafions. Alia nigra quæ Italis corbine: nostris ceyrieros negros. Alia ex albo rubroq; mixta spectātur. hæc Gallis des guines: Delphinatibus & nostris cerises appellantur. Præstātius cerasi genus officinæ agriottam nomināt. De cerasi generibus uide plura apud doctissimum Ruellium cap. 64. lib. 1. suæ de stirpium natura historiæ: & Matthiolum cap. de ceraso.

κερατύνια, Siliqua.

Ea planta est, quam recentiores Græci ζυλονίριον καὶ καρρόβια appellant, nostrates de carrhubios: Italis carobe, & carobole. Lyguribus maritimis familiaris, & tam frequens, ut apud nos in prouerbiū abierit, carrhubia auenā esse asinorū Lygurū. Raro in nostra prouincia inuenitur, apud Niceā & Villā cognomēto Francā, passim. Saxosis enim asperisq; locis delectatur.

κετρον, Betonica.

Dux betonica species. Prior officinis nomen retinet: Gallis de la betoine: Delphinatibus & nostris betoni: Italis betonica. Altera bifariam diuiditur, in alilem & syluestre. Altilis Gallis oilhet: Delphinatibus giroflée: nostris giroflado. Syluestris officinis tunicis, Gallis des ameris. Inuenitur & in syluis altera agrestis betonica flore suppalido, mirē eleganti, quam Delphinates giroflée boschasse appellant.

κινία, Galla omphacitis.

Galla duplex habetur. Alia ab oriētis partibus ad nos inuehitur, & uulgo galle de romanie appellatur: in Italia autē galla. Alia hic ē quercu nascēs nobis familiaris, quæ simpliciter gallæ nomen retinet.

κέρος, Cera.

Officinis nomē seruat, uulgo de la cire. Cera species notiores, quā ut in his explicandis immorandum existimeni.

κισσός, Ciburium.

Pocilli genus est, ex Aegyptia faba conflati.

κινάρα, Cinara.

Cogitāti mihi ac memoria repetēti, quā incerta sit & obscura carduorū nostra etate cognitio: uix succurrit quid de illis, pro re pbabili, nedū certa, sit pronūciandū. Nā, ut agrestes omittamus, duo fecit Theophrastus, cap. 4. lib. 6. hist. plāt. cardui genera: alterū, cui scolymi: alterū, cui cacti nomē insit. Scolymō hoc sibi peculiare uēdicasse, q; radicē tum crudā, tum coctam, uescēdā subministret: sed cibo gratissimā, cūm florescit. Cūm solstitiū agitur, eius florē erūpere. Eundē senescētem in pappos fathiscere: partū oblōgū esse, nec spinosū. Eius quoq; folia spinis carere, quāuis plāta ipsa acanī specie gerat. Cactō uerō statim à radice caules humi reptātes, pducere, quos uocent cactos, & foliū spinosum. Desquamatos eos esculētos esse, tātillūq; subamaros, & in muria seruari. Emittere præterea alterum caulē rectū, quē uocēt pternicē: esculētū & ipsum quoq;, at uetustatis impatiētē. Seminis inuolucrū, forma quidē spinosum: qd', detractis lanuginosis seminibus, uescum sit, & palmæ cerebro persimile. Dioscoridi autē scholymos chamæleonis folia obtinet, aut albæ spinæ, nigriora & crassiora: caulē lōgū, foliosum: spinosum caput: radicē nigrā & crassā. Ex quibus liceat, inter Theophrasti, & Dioscoridis scolymō, manifestū agnoscere discriminē. Accedit, Galenū lib. 2. de facultatib. alimēt. Paulū, cap. 74. lib. primi, & Aetiū hoc loco, cinarā à scolymo (de quo in simpliciū cēsu meminerūt) distinxisse. Cinarā aut Athenēo, lib. 2. Dipnosophistarū, nihil aliud esse, quā Siculorū cacton, quæ à Romanis eorū uicinis, leui quadā litera rum mutatione, carduus nomine ē. Vnde ex illorū scriptis hoc colligi possit, cinarā & scolymon, plantas quidē congeneres: sed hūc (præcipuē Dioscorideū) erraticū: illā, hortēlem esse: quæ, in quā, à Siculorū cactō diuersa planta non sit. Ad cacton igit reuocari posset cardui genus illud, quē Itali cardone: Galli aut cardon & carde nomināt. Siquidem radice est crassā, candida, folijs amplis, in ambitu profundē incisis, multis ac rigētibus aculeis armatis: caule recto, nō admodū procero: capite satis amplo, spinis horrido: flore purpurascēte: semine uario, id est, ex cæsis, fusco, & nigro mixto, oblongo, cnicī hortēcis crudæ ac coctæ in usum ciborum ueniunt: & inflexi deorsumq; nutātes caules, cacti dicti (nisi cactorum nomine foliorum pediculi ueniant, qui quasi humi reptant, uesci sunt, & modicē



modicè amari) desideratur. Vt inde colligi possit eā, aut non uerā cacton, sed quandā eius speciē esse: quanquā urbanam, & lauioribus mēsis expetitur: aut, si uera cactus sit, ob regionū & cultus uarietate, aliqua nūc deesse, quæ in ea olim uidebantur: & adesse alia (uesca radix scilicet, tū cocta, tū cruda, & foliorū pediculi, sed cocti) quæ olim ignota fuerint. Ad scolymon aut Theophrasti, Italorū carcioffi, q. Lōgobardis archiochi: nostris carchofles: Gallis & Delphinatibus artichault dicuntur: quanquā omnia illa nomina corruptā quandā cacti nomenclationē testent. Huic radix est crassa, cādida, folia ampla, multo minus, quā priora, in ambitu incisa, nullis spinis horrida, molli lanugine incana: dorsum pediculi foliorū pminēs, ac ualde striatū: caulis procerus: caput in cacumine ex rotunditate oblongū, nucis pineæ quasi æmulū: flos nūc purpureus, nunc ex purpura cādidus: Semē cnici, alterius semine breuius, crassius, & minus nigrū. Huius præsertim esculentū est pomū. Radices (quas in scolymo esculentas facit Theophrastus) & reliquæ eius partes, uelut amariores, à mēsis abdicantur. Prioris autē pomū, pediculi foliorū, & radices expetuntur. Verūm foliorū costæ minus, ob tantillā amaritudinē. Audio in Italia secundi huius generis, scolymi uidelicet, quosdā spinosos esse: ut inde elici possit cardui genus illud, quod Dioscoridis scolymo respōdet: nisi Italorū presura, & Gallorū chardonnette (ex cuius florib⁹ lac cogitur, unde ab Italis inditū nomē) quæ scolymos syluestris est, ad Dioscorideū scolymon referatur. Radicē enim crassā ac nigrā habet: caulē rectū, longū, foliosum, spinosumq: in cuius summo insidet caput multis spinis horridū: flores cerulei, aut ex ceruleo purpurei: Semē reliquis min⁹: folia quasi albæ spinæ aut chamæleonis, nigriora & crassiora. Hæc sunt q. de scolymo, cacto, & cinara, ex pbatiorū autorum lectione intelligere ac depromere potuimus, adhibita interim plātārū nostri temporis oculari fide. Aequū tamē ac beneuolū lectorem optamus meliora in mediū adducere, si ueri similia, & lecturis utiliora apud eosdem inuenierit.

*κικίς*, Ricinus.

Ricinus herbarijs & officinis palma Christi, Gallis & nobis paul me Christ: quibusdā tamē officinis cataputia maior nominat.

*κισθος*, Cisthus.

Aquitanicis officinis præsertim Monspeffulanis cognitus: Gallis ignotus: uulgo Gallorū, ut quibusdā placet, garrues aut englentier. Duo eius genera: mas flore rubro: fœmina pallido: ambobus roseo effigie. Altitudo fruticis cubitalis, rami multi, folia numerosa, ramorū summitatē uestientia, rotūda, hirsuta. Frequēs uterq: in nostra prouincia, & in Aquitania, syluosis, aridis & asperis locis prouenit. Vulgatum illi quod insit apud eosdem nomen, adhuc me later. Fœmina cisthus apud Delphinates & in Gallia quoque multis locis inuenitur.

*κισθος ἢ λάδανον*, Cisthus siue Ladanum.

Officinis lapdanum.

*κίανος*, Hedera.

*κίανος* Græcis: hedera Latinis, officinis & Italis: practiceis quibusdā cussus, ineptē pro *κίανος*: Gallis hierre: Delphinatibus ere: nostris heurre. Tria Dioscoridi hederæ præcipua genera: Candida, nigra, helix. Cādida, candidū fructū parit. Nigra, nigrum aut croci æmulū, quā Dioscoridis ætate, uulgo Dionysia nominabat. Helix fructū nō gignit, sed tenues emittit uiticulas, folia parua, angulosa, rubra. Hæ oēs species notæ hodie sūt, & generis nomen retinet. Longē plures hederæ species fecerūt Theophrastus cap. 18. lib. 3. hist. plant. & Plinius cap. 34. lib. 16. nat. hist. ad quos autores breuitatis studio te remitto.

*κύνος*, Cnecus.

*κύνος* Græcis, Cnecus Latinis. Duo ei⁹, autore Theophrasto cap. 4. lib. 6. hist. plāt. genera: urbana, & agrestis. Satiua officinis carthamus: Italis zaffarano saracinesco: Gallis & nostris, à crocatis floribus, saffran bastard. Syluestris duūm itē generū. Altera hortēsi cneco similis, sed caule magis recto, quo antiquæ mulieres colus uice utebātur. fructū edit nigrū, magnū, amarum. Altera species hirsuta, caulibusq: soncho proximis, qui ob foliorū mollitiem terrā uersus inclinētur, & humi quasi reptare cogātur. Semen profert amarū, hirsutū. Hæ duæ species syluestris cnici tā apertē putatā atractylidem & carduum officinarū benedictū (q. Italis cardo benedetto, cardo santo, & herba turca: Gallis chardō benict: Delphinatib⁹ l'herbo dau uerin: nostris cardū benict nominat) exprimūt, ut significatiū nō possint. Vnde mirari subit, Pliniū & alios quosdā Latinos scriptores eum sequutos, ea uni atractylidi attribuisse, quæ cneco dilucidē adscribit Theophrastus. Sed inde, opinor, suæ argumentū sententiæ deprompserūt, quod eadē Theophrastus primæ cneci syluestris (q. ad colus rationē attinet) speciē penē adscripserit, q. atractylidi Dioscorides: nec ineptē quidē, nisi (interferta acatnæ historia) atractylidis ilicō meminisset. Ex cui⁹ delineamētis non minus proptū sit colligere, uerā atractylidē

esse adhuc ignotā: aut, si cognita sit, sine honore iacere. Nō est interim hoc silētio oblitterandū, syluestre cnicū secundi generis, nostra ætate in hortis coli, & cultus māgonio, deposita feritate, in domesticā cōsuetudinē iam transiisse. Quamquā scio quosdam leuibus argumentis permotos, nolle carduum benedictum, ad syluestris cnici speciē alteram reuocari: quā si tātula in una aut altera nota dissimilitudo, reliquis omnibus exactē consentientibus, herbæ speciē possit immutare.

*κόκκος ενιδίος*, Coccus enidius.

Coccus enidius semen thymelææ est. Thymelæa autē officinarū mezereō, & herbariorū leo terræ. Ea folio est hortēsis lini, flagellis cubitalibus, multis ab una radice cōsurgētibus, rotūdis, foliosis: fusco colore: flore albo, copioso: semine myrti penē magnitudine, primō uiridi, ubi maturuerit rubro. Floret ineūte æstate. Semē maturefcit circa mēsem augusti. In nostra prouincia ubiq: inuenitur, sed præcipuē apud Aquas sextias urbē clarissimā, & quā inde Malsiliā itur, in locis saxosis, aridis, & penē sterilibus: facilisq: uel hac nota inuētū esse potest, quod nullā pede uno aut altero, prope se uirentē herbam patiat, quin omnes sua perniciosa natura interimit, ut nō immeritō leo terræ fuerit ab herbarijs cognominata. Inopiā interim radicū thymelææ sardit chamelæa cap. 78. 79. lib. 16.

*κόκκος βαφικῆς*, Coccus tinctorius.

Nostratibus & Gallis du uermilhon: Italis grana, fructus est arbuti ilicei generis apud nos frequentis, ut suprā in quercus mētionē annotauimus.

*κοκκυμυλῖα*, Prunus.

Varia prunorum genera, sed quæ in duo præcipua reducūt. Syluestre & satiuū. Satiuo adscribuntur nigra multiplicia, alba, cerea, & rubentia: quorum item plures sunt species, ut alibi suo loco à nobis dicetur. Syluestria Asianis *πρῦμα*, & Galen. lib. 2. facult. aliment. *ἀργιουκοκκυμυλῖα*: Gallis autem, Delphinatibus & nostris prunes: Italis Tuscis succine dici solent.

*κολοκασιον*, Colocasion.

Radix est Aegyptiæ fabæ.

*κελαινύθη*, Cucurbita.

Multa cucurbitæ sunt genera, sed quæ omnes nomē generis seruent: Gallis de courges: Delphinatibus & nostris coucourdes: Italis zucca. Est & colocynthis in usu frequens: Gallis colocynthe: officinis colocynthidos, aut colocynthida.

*κίμαρος*, Arbutus.

*κίμαρος* Græcis, arbutus & unedo Latinis, incolis Corsicæ insule árbyto: Italis álbato: Delphinatib⁹ & nostris arboux, & d'er boussiere: eius fruct⁹ d'arbofflos, q. Græcis, teste Dioscoride, *μημάνηλη* nominatur. Arbor est coactæ breuitatis, cotoneæ malo similis, folio numeroso, lauri figurā, p. summa tamē obtusiore, & in ambitu lentē fimbriato: flore subherbaceo: fructu é lōgis pediculis inequaliter depēdēte, pruni aut galleg (aliquādo tamē parui mali arācij) magnitudine, rotundo, fragum sua effigie penitus exprimente, primū uiridi, ubi maturuit ex saturata purpura fuluescēte, gustu cū quadā acerbitate dulci, largioreq: esu nausēā proritante, intus granuloso, qui autumnō maturefcit. Plurimus nascitur in Corsica ac nostra Prouincia maritimis locis: & apud Delphinates in syluis: in quibusdā itē Sabaudie mōtib⁹, ubi d'arbesse noīatur. Galliē infrequēs & parum cognitus. Lugdunī, Valētiē, & Tournone in hortis quibusdam plantatus uisitur. Dioscoridi nullius est in medicina usus. Nostrā tamē memoriā à quibusdā fructus maturus in capitellum conijcitur, liquorq: qui inde ui ignis elicitur, recondito, aut prorsus ignoto multis experimento, ad renum & uescicæ calculos atterendos, felicissimē usurpatur.

*κίμι*, Gummi.

Gummi nomine Arabicum puto intelligi: quod quidem habetur, & officinis nomen seruat, uulgo gomme.

*κοξία*, Lixiuum.

Officinis nomen retinet. Gallis du lexis. Delphinatibus lexien nostris leixieu.

*κόνυζα*, Conyza.

Pumicaria, & cimicaria, & herba sancti Rochi dicitur, Gallis l'herbe aux pulces: Italis pulicaria. Duūm est generum, maior & minor. ambę notę: officinis herba pulicaris. Tertium addit Dioscorides, hodie aut ignotum prorsus, aut paucis cognitum.

*κορίαννον*, Coriandrum.

Vulgaris est notitiē. Ab oīb⁹ coriādre: Italis coriādroli nominat.

*κόλλα*, Colla, glutinum.

Galli, Delphinates & nostrates Græcū nomē retinet, de la colle.

*κορνιόπιδιον*, Pes cornicis.

Doctorū propē omnium sententiā cornu cerui officinarum est. Gallis corne de cerf: Italis herba stella. Ad coronopodium reuocari potest herba, quam Galli uocant du targon.

*κόστος*, Costus.

Costi unicū genus Dioscoridi fuit: uerū colore, cōsistentia ac re-



gionib<sup>9</sup> distinctū. Arabicū em̄ candidū facit, leuē, eximia odo-  
ris suauitate p̄ditū. Secundū locū tribuit Indico, leui, uberi, &  
ferulē modo nigro. Postremā sedē assignat Syriaco graui, q̄  
colore buxeus sit, & odore feriens. Galenus aut̄ costū modicē  
amarū dicit. Arabū scholæ duo costū genera faciunt: dulcē & a-  
marū. Dulcis sapore quadatenus mētū glycyrrhizā, colore fu-  
sco, gustu acri, substantia radice solida & pōderosa. Amarus ex  
flauo pallidus est, leuis, lignosus, dulci crassior, minime acri-  
moniaē particeps. Ex qbus intelligit Arabū utrūq; costū à Gr̄-  
corū costo alienū esse. Vnde tutius sit ex Galenī succidaneis  
ammoniacū, aut helenij radicē costū inopia usurpare. Aiūt do-  
cti nōnulli ueterū costū Venetijs iam haberi. Habet & uulgu-  
sū costū qui Gallis Delphinatibus du coq; nostris cost: Italis  
piperella dicit. Radice numerosa, implicata, multis hinc & in-  
de adnatis appēdicib<sup>9</sup>, exigua: caule cubitali: flore in cacumi-  
ne luteo, florū uulgaris athanasiaē simili: folijs maioris lepidij,  
candidis, minime crassis, in ambitu serratis, gustu feruido, sa-  
pore aromatico ac grato. In hortis ubiq; inuenit. quidā putāt  
costū uulgarē ad Plinij siliquastrū aut piperitū reuocādū. A-  
lij nōnulli p̄ter omnē rationē ad Pauli & Plinij lepidiū, quasi  
uulgaris costus odore sit & sapore nasturtij: unde constat le-  
pidium Gr̄cis, agriocardamon & cardamanticē fuisse uoca-  
tum. Verū in lepidij mentione, hac de re pluribus agemus.

νοτιλιδιον, Umbilicus Veneris.

Officinis & Gallis ignotus: apud nos frequēs uulgōq; aureilhe-  
tos nominat, quod, meo iudicio, quadatenus humanas aures  
sua effigie emuletur. Delphinatib<sup>9</sup> de bloudo: Italis cuptiuola.

κράμβη, Brassica.

Duū est generū, Satiua, cuius plurimæ sunt species: & syluestris  
quæ officinis soldana aut soldanella nominatur, Aquitanix &  
nostræ prouinciæ maritimis præsertim locis familiaris. Sati-  
ua, ab insigni ac penē arboreo caule, Gallis & Delphinatibus  
chou: Tuscis caulo: Longobardis uerza: nostris caulet nomen  
obtinuit.

κρέθμυον, Crethmum.

Batis duo genera: syluestris, cui<sup>9</sup> meminerūt antiqui, & crethmū  
appellarunt, quod officinarum creta marina, Gallorum crethe  
marine est. id Romanis sinocchio marino: alijs quibusdā Ita-  
liæ populis herba di san pietro nominatur. Hortensianā batin  
neglexerunt ueteres Gr̄ci. Eius mentionē fecit Columella.  
Ea Italis baticula, Gallis bacilles: nostris tum basilhes, tum ba-  
siques, maximē à maritima plebe, dicitur.

ορδον, Ordeum.

Officinis nomē seruat: Gallis & Delphinatibus orge: Italis orzo:  
nostris orge & ordi. Diuidit in polystichū, & distichū, quod a-  
liud in duos, aliud in plures uersus siue ordines distribuatur.

λίλον, Lilium.

λίλον ἢ λιλίον Gr̄cis: lilium & rosa iunonia Latinis: officinis lilij.  
Tria habentur præcipua lilij genera, candidū, purpurascens &  
croceum. Candidū in hortulanū & syluaticum diuiditur. Syl-  
uaticum à nemine hactenus depictū. Constat autē radice can-  
dida, succosa, in manus effigiem conformata, radiculis oblon-  
gis, radicibus albi ueratri æmulis, nō numerosis, caule dodra-  
tali aut proceriore, folio porri aut narcisci, lōgō, angusto, flo-  
re hortēsis lilij, minore, in summis cauliculis prodeunte. floret  
mense Iulio. Nasctur apud Delphinates in mōtibus altis, præ-  
cipuē in mōtis cuiusdā pratis, qui eorum lingua Chironno ap-  
pellatur. Situs est autem ad septentriones ei urbi quæ Die uul-  
gō dicitur. Croceū & purpurascens Fuchsius cognita, distincta  
& depicta: Gallis hominibus nondum exactē cognita. Nos  
omnium historiam seorsum exarauimus. Sed ad rem. Lilium  
officinis nomē seruat: Gallis du lys, Delphinatibus ile, nostris  
yeli & ili: Italis giglio. Croceū, purpurascens & candidū syl-  
uestre, quia montibus sunt peculiaria, ideo uulgō ignoratur:  
purpureū tamē, ut quidā uolunt, Italis martagon dicitur. Cro-  
ceum autē & purpurascens iam in hortis quibusdam maximē  
Lugdunensibus haberi cœperunt. Cœleste uerō officinarum  
lilium, iris Dioscoridis est.

κροκοδείλιον, Crocodilium.

Spinosa plāta, in aquatilibus syluarū pratis nascens pro crocodi-  
lio ostēdit: de qua tamē statui certi, meo iudicio, nihil potest.

κρόκος, Crocus.

Officinis crocus: Gallis, Delphinatib<sup>9</sup> & nostris, Mauritana imi-  
tatione saffram, quasi zaffaram, Italis zaffarano nominatur.

κεράκον, Cera.

Ceparū duo præcipua genera: Albæ mitiores, minorisq; acrimo-  
niæ participes, ac, ut plurimū, maiores. Rubescens, aciores,  
& sensum gustus magis ferientes. hæ Gallis & Delphinatibus  
oignon: nostris, Latinum nomen tantillum uitiantibus, cebo:  
Italis cipolla. Habentur ceparum species quædam perexiguæ,  
& in cibis magis expetita, quas Galli ciboules appellant, alij  
ciues.

νόστος, Faba.

Vulgaris est notitia: Gallis faue: Delphinatibus & nostris faue:  
Italis faua.

κυκλάμιον, Cyclaminus.

Duū est generum: prior officinis cyclamen & panis porcinus:  
herbarijs panis porcinus: uulgō Gallico pan porcin: Italico au-  
tē pan porcino. Hæc species copiosa nascitur apud Diuū Clau-  
dium nō procul à finibus Helueticū, & in montibus Aruer-  
niæ, & alibi multis in locis. Altera species quæ sit, nondū do-  
ctis compertū est. Ruellius tamen contendit esse Gallicarum  
officinarum sigillum Mariæ, quo nomine Delphinaticæ po-  
lygonatum intelligunt.

κυμινον, Cuminum.

Aliud Aethyopicū, nobis ignotum. Aliud his regionibus nascēs,  
quod officinis nomē seruat: Gallis & Delphinatibus du com-  
min: nostris cumin: Italis cimino appellatus.

κύνερος, Cupressus.

Vbiq; Galliarum cypres: In Italia cipresso. arbor est notissima.

κύπερος, Cyperus.

Cyperus officinis nomē retinet: Gallis du fouchet. Dioscorides  
cyperi radices oliuarū tuberculo facit tumētes, inter se cōmis-  
sas, nigro colore, iucundē spirātes. Inueniunt tamē nōnullis in  
locis oblōgæ, nec à prioribus gustu differētes. Cypero caulis  
nūc triagulus, nūc quadragul<sup>9</sup>, ut ob id angulosus Dioscoridi  
fuerit dictus. Herba est notissima, ubiq; in paludosis & humi-  
dis nascēs. Est & cyperus Indicus zingiberi similis, gustu leni-  
ter, aut nihil prorsus, amaro, qui cōmanducatus croceū remit-  
tit colorē: & pilosis partib<sup>9</sup> illitus, p̄silothon efficacissimū est.  
Hic assentiente descriptione, & doctorū omniū iudicio, nihil  
aliud est, quā radix illa, quæ ex India cum zingibere affertur,  
uixq; ab ullo, nisi à peritis, discernitur, quā Italicæ officinæ  
curcumā (non quidē radicem maioris chelidonij, quæ in Se-  
rapionis codicibus curcuma corruptē pro chelidonia legitur),  
Gallicæ terram meritam nominant. Tertium cyperi genus  
herbarum coniectores fecerunt eam radicem, quæ officinis  
& medicis recentioribus, galanga dicitur: quod subrubra sit,  
geniculis scatens, surculosa, in quosdam nodos crassiores ex  
intervallis intorta, sapore acerrimo, linguā admodū uellican-  
te, odore quadatenus cyperum imitante. Hanc cyperū Ba-  
bylonicum cognominant. Quidam contendunt eam esse  
ueterum acorum. Verū multæ notæ repugnant, quo minus  
galanga dici acorum ueterum possit, ut in acori mentione  
dictum est.

λίγιστρον, Ligustrum.

Officinis alkanna, Gallis du troyne: Delphinatibus & nostris oli-  
uier sauluaige. Tuscis guistrico, alijs quibusdā Italiæ locis oli-  
uetta, alijs oliuella, alijs nōnullis chēbrossene, nominatur. Nec  
me mouet, quod Fuchsius cyprum plātā peregrinā ex Plinio  
esse uelit. Nā multa plerunq; ē lōginquo petūt, quæ domi ci-  
tra magnum negocium inueniri possunt. Siquidem plātā nō  
paucæ his in regionibus affatim luxuriant, quas antiqui soli,  
pene dixerim, Crete peculiare existimarūt, ut de tordyllo ap-  
paret, quod ipsemet Fuchsius copiosissimum nasci in Germa-  
nia prodit: quodq; in huius Delphinaticæ gentis montibus, &  
alpius ipsis, uel ad nauseam usq; luxuriare certō scimus, quē-  
admodum alibi copiosius dicemus.

κύτισον, Cytisum.

Κύτισον Gr̄cis: Cytisum Latinis: officinis & uulgō ignotum.  
Antiquis tum medicis, tum rei rusticæ scriptoribus celebratū  
fuit, & in precio habitū. Nostris temporibus à paucissimis no-  
tum. Hic tamen Lugduni in horto Franciscanorum habetur  
frutex quidam, qui cytiso antiquorū omni ex parte respōdet.  
Spectatur autem hac forma. Frutex est sesquiulnæ altitudinem  
petens, nulla ligni gratia, brachio minus crassus, flagellis exi-  
guis, oblongis, aspectu incano, folio sempiterno, folij sceni-  
græci aut loti trifoliæ æmulo, dorso medio prominente, su-  
perne herbaceo, inferne candicante, quod digitis confractum  
erucam olet, commanducatum uerō, ciceris recentis gustum  
resipit. Flore quasi pisi luteo, nigricantibus uelut punctis ma-  
culoso: quo decusso semen in siliquis, spartij Dioscoridei si-  
liquis, aut anagyridos (quæ uera Theophrasti cap. 17. libr. 3.  
hist. plant. colutea, & Plinij cap. 18. lib. 16. laburnum est) cor-  
niculis non absimilibus, recondit. Floret hyeme tota & usq;  
ad uernum æquinoctium, aut etiam mensem Maium: sed ur-  
gente hyemis inclementia, magis appetente æquinoctio, mi-  
nus: Maio uerō, minimum: quo nimirum tempore non tam  
multi sanē flores apparent. Exin sensim æstate siliquatur, ac  
tandem Autumno, in siliquis spartij Dioscoridei, aut colu-  
teæ Theophrasti, quæ Dioscoridi anagyris est, & Plinio la-  
burnum, siliquis non dissimilibus maturum semen recon-  
dit. Rarissima planta in Gallia est, & crediderim unica, ut  
quæ ante annos aliquot Roma à perito quopiam medico  
huc



huc allata fuerit. Olim iuxta aluearia serēbatur, tum in Italia, tum in Hispania. Verum Plinij ætate (ut ipse testis est cap. 24. lib. 13) iam in Italia erat rarissima. Nostris temporibus aut nulla, aut (si Virgilio Marcello credimus) ignota sine honore iacet. Vnde mirari subit eorum sententiam, qui cytisum faciūt plantam toti Italiæ notissimam, quodq; patrio ipsi sermone trifoglio, di cauallo & tribolo nominari dicant: & Fuchsius (ut ipsi dicunt) trifolium aspalion inconsulto existimari. Verum an ruta capraria herbariorum, quæ nostris l'herbo de la cabrière, & Fuchsius odoratum trifolium dicitur, trifolium illud sit, an cytisum, capite de trifolio exactius in examen adducemus. Nunc autem, quoniam in coluteæ mentionem inciderimus, minimè alienum ab instituto nostro fuerit, huic orationi pauca de illa subnectere. *Κολυτρία*, Theophrasto: *ἀναγυρίς*, Dioscoridi: laburnum, Plinio: quibusdam Italiæ populis, eghelo: Delphinatibus, Sabaudis, & terræ nouæ incolis, metathesi quadam literarum à Latina nomenclatione minimum uariantibus, albour & aulbour nominatur. Arbor est fruticosa frutēxue arbo rescens, in quatuor nimirum ulnarum altitudinem assurgens, caudice non admodum crasso, ramis hinc & inde diffusis. Aut nonnunquam (quia plerumq; cæditur, & coryli modo ab imo caudice regerminat) fruticosa spectatur, stolones numerosos ab una radice fundens, longos, rectos, ex uiridi candicātes, agni uirgis similes: è quibus per certa interualla erumpunt folia terna, longo pediculo nitentia, fœnigræci folijs effigie ac numero similia, maiora tamen adq; uiticis folia plurimum accedentia, læuia, supernè uiridia, infernè candicantia. E ramis ipsis prope foliorum pediculos emergunt flores lutei, ut flores genistæ aut brassicæ, è longis pediculis inæqualiter dependentes, rarioreq; illa ac prælonga textura cubitalem æquantes longitudinem, olentes grauiter, atq; ob id, profecto, apibus in grati. Floribus decussis prælonga succedūt cornicula filiquæ, uel, nō prætumidæ quidem, & multo spiritu distentæ, sed pisorum hortensium filiquis adsimiles, aliquanto tamen breuiores ac pressiores, fractu contumaces, in medio interdum inanēs ac compressæ. In extremis autè ac nonnunquā intermedijs spatijs cōtinetur semen lentis magnitudinem æquans, ex latitudine subrotundum: imo loco, quā filiquæ per petiolum hæret, tantillū excauatum, renis prorsus æmulū: quod, antè quā maturuerit, uiret: post maturitatē uarium est, durū, & ob læuorē splēdidū. Floret mēse Maio & Iunij initio. dein sensim filiquatur ætate, actandē durefcit maturefcēte uua, & circa calend. Octob. integrè perficitur. Nasctur in alpijs & montibus ferme omnibus Delphinatus, Sabaudie, & terræ cognomento nouæ, umbrosis & syluosis locis humidisq; & nonnunquā siccis, aque eorum locorū indigenis albour & aulbour nominatur. Ex quibus notis constat Dioscoridem, Theophrastum ac Plinium unam & eandem plantam uarijs nominibus descripsisse. Verum obijciat aliquis: Si Laburnum Plinij & Dioscoridis (id quod negari nō potest) anagyris cēseri hæc plāta debet, q fieri potest, ut de anagyride seorsim Plinius tractarit? Sed his respōderi potest, Plinium anagyrin è Græcorum libris, ut pleraq; alia, transtulisse: & laburni historiam, qualem auditione à rusticis alpijs cognouerit, aut fortè etiā plantam uiderat, summam cōscripsisse: argumēto inde sumpto, quod nunquam Theophrastus, nunquā Dioscorides laburni meminerit: ut interim taceam illum, cap. 34. lib. 16. eadem de hedera: quæ cap. 10. lib. 24. de cistho: & alibi de marthubio, quæ de porro dicenda erant, tradidisse. Ceterū, ne longior sim, certò (præter reliquā historię similitudinē) ac indubitato scio, laburni alpinorū corticem siccatum, in pollinē redactum, & drachma plus minus una, ex quopīa liquore potui exhibitū, maximas uacuationes moliri. uerum diuersa ratione. quandoquidē, si ab infernis ad superna procedendo corticem euulsum porrigas, uomitū: sin uerò à supernis ad inferna descendendo, deiectiones uel insignes mouebis. Quæ omnia fidē faciūt Plinij laburnū à Dioscoridis anagyri, quæ est Theophrasto colutea, nulla in re differre: eosdemq; autores unam eandemq; plantam uarijs nominibus expressisse & adumbrasse. Esto igitur, ut tādē huic disputationi finem imponamus, Theophrasti *κολυτρία*, eadem ipsa planta, quæ Dioscoridis anagyris, & Plinij laburnum: quæ, inquam, Italij quibusdam eghelo: incolis terræ nouæ, Delphinatibus & Sabaudis albour & aulbour uulgo nominatur. Sena autem officinarum Arabum magis inuētum est existimanda: quā quā coluteæ cōgenerem, & ab eius uiribus non usquequaq; abhorrentem, defendere quidam uoluerint. Verum de his alibi latius ac pluribus (si opus fuerit) agetur.

*κύνειον*, Cicuta.

Officinis nomen retinet: Gallis de la cigue: Aquitanis cegudo: Italij cicuta: nostris de fenoihas aut fenolh de serp nominat.

*πύνυκαριος*, Nux pinea, Cocalus, Strobilus.

Officinis nux pinea: Gallis & nostris pommie de pin: fructus ipse

id est nucleus nostris, præsertim in maritima prouincia, de pignons: Italij pinochi & pignoli appellatur.

*καρχήνιον*, Cancaniradix.

Quidam putant esse carui syluestre.

*καυκαλίσ*, Caucalis.

Gallis, ex Ruellij sententia, persilij bastard: Senis Italiæ urbe petrosello saluatico. Verum domino Ioanni Vassæo, medico doctori Parrhisiensi peritissimo, placet caucalidem eam esse herbam, quæ Gallis l'herbe aux gouttes appellatur. Eius namq; uidentæ copiam nobis fecit anno domini 1543. cū adhuc Lutiæ essemus. Nam tum unicam illius plantam in suo horto studiose, unā cum maiore centaury (quod itidem ibi uidimus) colebat.

*καρχήσιον*, Carpesium.

Officinis cubebe: nomen ex Arabum disciplina obtinuit. Quidā negant cubebas carpesiū esse, quod eē fructus sint: carpesiū autem caulis aut radix: cuius inopia augeri uolunt phu, aut ueram cassiam minui.

*λάβυροι*, Cicerculæ.

Officinis ignotæ. Gallis, Delphinatibus & nostris iaysses.

*λαθύρις*, Lathyrus.

Officinis cataputia minor: Gallis & Delphinatibus de l'espurge: nostris, officinarum nomen usurpantibus cassapuce: Longobardis cacapuzza uocatur.

*λαμψάνη*, Lampfana.

Herba est officinis ignota. nostri à Græca nomenclatione tantillum euariantes, de lassenos: Itali lassana: Galli des armoiries appellant. In frumentaceis agris ubiq; copiosissima nascitur.

*λάπαθρον*, Rumex, Oxylapathum.

Oxylapathum officinæ lapathium acutum, Galli de la pabelle, aut de la patience: Itali rombece. Secundū genus ea herba est, quā omnes hodie rheubarbe & putant & nominant. Tertiū syluestre lapathū est, exiguum, ubiq; copiosissimū, & nostris lapas, Gallis & Delphinatibus du lapais dictū. Quartū oxalis dicitur: cuius duo sunt genera, syluestris & hortensis. Hortensis etiam bifariam distribuitur: in eam, quæ oblongis & nigricantibus folijs: & eam, quæ albicantibus & rotundiusculis constat. Est & syluestris oxalis omnium minima, & in medicos usus, plusquam cætera lapathi genera, expetita. Officinis & Italij acetosa: Gallis oxaille: Delphinatibus & nostris aigretto, Lugdunensibus sallette: tum hæc, tum reliquæ oxalidis species dicuntur.

*λεμόνιον*, Limonium.

Latinis beta syluestris, limonium, terræ tintinabulum, quibusdam pyrola: Gallis, nostris, Delphinatibus, & officinis ignotum.

*λεγχύς*, Lichen.

Officinis hepatica: ubiq; in locis riguis frequens.

In calce huius libri habes Leontopodij & Lepidij capita, quæ hic per imprudentiam omiſsa sunt.

*λευκόιον*, Leucoium.

Trialeucoij genera colore inter se disparata. Nā aliud luteum, quod keiri officinis nominatur: Aliud candidū: & tertiū quod purpureum florem emittit. Gallis & Delphinatibus des giroflées aut uiolettes: Italij uiolabianca: plante des uoliers: nostris de garranos, sumptā, ni fallor, à Mauritanis nomenclatione, quasi keiranes, appellantur. Luteū leucoion aliud spōte naturæ prouenit, aliud in hortis studiose à mulierculis colitur. Cetera hortensia sunt. Ceterum nostra memoria haberi cœpit planta, quæ radicibus constat exiguis, confibratis: caule cubitali, rotundo, molliter uilloso, folioso: folijs nigris, oblongis, folijs lysimachię proximis, acutioribus tamen, in ambitu lētē & ex interuallis fimbriatis: flore in cacumine albo, exiguo, agglomerato, barbulis prius quā aperiatur molliter hispido, copioso, leucoij floris æmulo (ubi id nominis sibi apud uulgos adoptauit. Nam maxima ex parte uolier d'espaigne, aut uolier muscat appellatur) odoris suauitate præstanti, & à styrace calamitide minimè alieno. Floret uerno tempore. In hortis ubiq; iam inuenitur. Violæ Hispanicæ aut moschatæ (aptius tamen styracina uiola diceretur) nomenclationem cum uulgo retinimus, quod ex Hispania primum huc allata fuit, & re uera, species uiolæ cēseri possit. Nullum tamen eius in medicina usum nouimus: etsi ex odore constet herbam esse uiribus ac dignitate præstantem, & ad multa utilem.

*λευκή*, Populus alba.

Officinis populus alba: Gallis du tremble & peuplier: Delphinatibus piouou: Italij alberi: nostris piboulo & aulbero nominatur.

*λευκωνίς*, Thus.

Vulgaris est notitiæ: uulguis encens: Italia incenso, quod passim in templis, & alibi incendatur, appellat.

*λεβαννίδης*, Rosmarinus.

Coronaria rosmarinus ubiq; & frequēs & cognita: Gallis & Delphinatibus du romanin: nostris romain: Italij rosmarino. Reliq;



eius species non item. Maximi usus olim fuit in medicina prima roris marini speciei semen, quod canchry dicit, eiusque mentione scaturit ueterum medicorum formulæ. Verum tamen eius inopiâ substitui potest tantundem pyrethri cap. 5. lib. 12. seu pyrethrum aut astaphis agria cap. 65. lib. 8. & cap. 34. lib. 9. Audio tamen Venerijs in quibusdam hortis primâ roris marini speciē inueniri, & doctorū studio ac diligentia coli.

λυγύς, Fuligo.

Varie sunt fuliginis species.

λυγύστιον, Ligusticum.

Verum ligusticū adhuc desideratur. Brassauolus nequicquā conatur herbariorū & officinarū imperatoriā, quæ est Delphina tium alegros, & Dioscoridis laserpitii, ad ligusticū reuocare, argumēto inde uel firmissimo sumpto, quod imperatoriæ semen oblongū nō est, subnigrū, fœniculaceo maius, acre, & aroma oleus (quæ sunt ueræ ligustici seminis notæ) sed latum lenticulæ modo, membrana in ambitu cinctū, & admodum pressum, quemadmodum alibi copiosius dicemus. Quidam docti affirmant se in montibus Lyguriæ uerū ligusticū uidisse: nomē tamen genti peculiare illius plantæ non exprimunt, ut ex illorū scriptis quod sit, cognosci possit, & postmodum haberi.

λινόσπερον, Lini semen.

Officinis nomen seruat, & usu multo clarum est. uulgo semence aut graine du lin. Italis seme di lino.

λοβοί, Lobi.

Sunt dolichi, nostris phaioulx. de quibus in dolichis iā dictū est.

λινόσπρις, Mercurialis.

Officinis mercurialis: Gallis de la mercuriale: Delphinatibus panareaulx & uignolane: nostris corrupte marturiau pro mercuriale: Italis mercorella dicitur. Duū est generum, mas & fœmina: ambæ notæ.

λογχίτις, Lonchitis.

Ignoratur.

λύμιον, Lycium.

Verum lycium his regionibus desideratur: ut factitium haberi possit. uide cap. 63. lib. 8.

λυσιμάχιον, Lysimachium.

Herbarij corneolā uocāt: Galli poulse aut pelle bosse, quod paulo super pestilētes tumores adalligata eius folia, præfens remediū laborantibus suppeditet. Duo statuūt eius genera: alterū flore luteo, quod habem⁹, nā caule constat iūceo, lōgo, nodoso, folijs salignis ut plurimū ternis, gustu ualde adstringentibus, flore in cacumine luteo, specioso, radice purpurascēte, copiosa. Nascitur in pratis humidis, & iuxta alueorum margines ubiq. Alterum purpureo, adhuc ignotum.

λῶτις, Trifolium.

Officinis andacoca, & corona regia.

λῶτις τὸ ἄνδρον, Lotus arbor.

Officinis ignota: Gallis alifier: nostris aliquier dici solet. Italis quibusdam balogaro: alijs perlaro.

μάκρη, Macer.

Macer ueterum desideratur: in usum tamen eius loco uenit cortex nucis moschata, quem macis officinæ appellant.

μαλαβάδρυ φύλλον, Malabathri folium.

Veterum malabathrum non amplius extat. foliū autem quo nūc utimur, inuentum Arabum est.

μαλάχη, Malua.

Maluæ tria genera. uulgaris siue domestica, quæ officinis Latinū nomē seruat. & uulgo mauue dicit: syluestris, quæ althæa siue ebiscus nūcupatur: officinis bismalua: Gallis & Delphinatibus guimauue. Italis maluanisco: nostris mauue blanche. Tertia alcea est, folijs quā reliquæ articulationib⁹, caule procero & lignoso: officinis incognita: herbarijs herba symeonis: doctis nō ignota. Est & arborescens malua, quā opinor antiquis hortulanam fuisse, caule quaternūm quinūmue cubitorum, folio amplo, circinnatæ rotunditatis, flore albo aut purpureo, inodoro. Hæc passim in hortis inuenitur.

μανδραγόρας, Mandragoras.

Duo eius genera. mas, mihi cognitus: & fœmina, quæ nōdū uidi. Officinis nomē seruat: uulgo mādragore: Galli tamē metathe si quadā syllabarū mōt de gloire, p mādragore nomināt. Aiūt qui se uidisse testant, marē mādragorā, uirilī: fœminā, fœminēi pudēdi imaginē i radice habere: eosdē meli⁹ adolescere, & fœcundiores esse, si mas iuxta fœminā, plāteat, & cōtrā: alioqui steriles esse. Mādragoras hic in multis hortis inuenit: & satū facili mē prouenit. Quidā mala insana, quæ uulgo pommes d'amours uocātur, ad mādragorā referri debere cōtēdūt. Si desint poma mādragore, cortex radicū ei⁹ usurpat cap. 107. lib. 7.

μαράθρον, Fœniculum.

Duū est generū: domesticū, & syluestre, quod hippomarathrum, idest, magnū fœniculū. Domesticū aliud satiuū dulcius & humilius: uulgare acius. officinis Græcum nomē insedit: uul-

gō fenoilh: Italis finocchio.

μαστήκη, Mastiche.

Duo mastiches genera: Aegyptia nigra, inuētu rarior: cuius inopiā chia usurpari debet, cap. 14. lib. 15. Est & chia mastiche, mastix officinis, & Gallis du mastic appellata, candida, usu celebris, & uulgo nota. Hoc tamē silētio prætereūdū nō duxi, mastiche uires deijciendæ alui ab antiquis nūquā attributas fuisse. Aëtius autē mastichen scrupulorum nouem pondere aluū mouere, scriptis mandauit cap. 67. lib. 8. & cap. ultimo eiusdē: eandēq; duodecim scriptulorum pondere alui excrementa deijcere, cap. 117. & 155. lib. 3.

μελάνθιον, Melanthium.

Officinis nigella Romana: Gallis de la poiurette: Delphinatibus de barbues: nostris fenoilh de saint Ieā: Italis niella. Est & syluestre melāthiū, quod quibusdā officinis temerē pro uero usurpatur, & à Fuchio nō multo cōsultius pro lolio Græcorū accipitur. Gallis de la noyelle: Delphinatibus & nostris nielle. Habetur quoq; iam passim Lutetiæ aliud ueri melāthij genus, semine subflauo aut rufo, quā ipsū nigrū sit, odoratiore.

μελίλωτος, Melilotum.

Latinis sertula cāpana, & corona regia: officinis Græcū nomē insedit: Gallis du melilot. Tria hodie inueniunt meliloti genera. Primū odore suauissimo præditum, folio fœnigraci, lentē fimbriato, flagellis oblōgis, flore luteo, auenæ fere exēplo spicato. Id à doctis penē oībus uerū Dioscoridis melilotū existimatur. Quidā id luteā saxifragā malūt appellari. Alterū aspectu incano, folijs minutis, crocato flore. Id pro uero meliloto in hæc usq; tēpora usurpatū ab officinis fuit. Tertiū Italicū, quod nōnullis uerū melilotū putatur. Primi, id est, ueri generis duæ sunt species, solo floris colore distinctæ. Siquidem unius flos, luteus: alterius, cādīdus est. In cæteris, caule nimirū, radice, folio, floris effigie, & pēdulo semine plantæ omnino similes: adeo, ut si saxifragæ titulo insigniri debuit, nihilo fecius saxifraga alba, q̄ lutea appellari poterat: cū uidelicet plurimis nostræ, puinciae locis, uberior sit albi meliloti, q̄ lutei puentus.

μέλι, Mel.

Præstantius Atticum, nostrū & Narbonense uiribus & præstantia Attico responderet. Reliqua quæ frigidioribus locis proueniūt, inferiora sunt. Officinis nomen retinet: Gallis & Delphinatibus du miel: Italis melle: nostris meu & miel dicitur.

μελισσοφύλλον, Melissa phyllum.

Officinis melissa: Gallis de la melisse: Delphinatibus & nostris melize: Italis cedronella & mellissa.

μήμνη, Papauer.

Quinq; præcipua cōperiūtur papaueris genera: albū, nigrū, purpureū, rei herbariæ scriptoribus intactū, & de quo abunde alias suo loco. Rhœas, cui⁹ duo genera: mas, cui⁹ flos purpure⁹: fœmina, cui⁹ pallidulus: & cornutū. Prima genera officinis nomē retinet: Gallis du pauot: nobis papari: Italis papauero. Purpureū autē officinis ignotū. Rhœas officinis papauer rubrū: Gallis du ponceau aut coquelicoc: nostris, corruptā Græcā nomēclatione, rhoello: Italis papauero saluatico. Cornutū officinis nomen seruat: Gallis & nostris anonymum, quod sciam, est.

μίσπιον, Mespilum.

Latinis & officinis Græcū nomen insedit: Gallis meslier & nespier, Delphinatibus nespoulier, nostris nespier: Italis nespulo. fructus Gallis mesles aut nefes, Delphinatibus nespoulos, nostris nēsplos. Duo mespili genera facit Dioscorides. Primum quod à quibusdā aronium dici cōmemorat. Id, ut autor est Manardus epist. 1. lib. 10. uulgō in Italia azarolo nominatur. Alterū quod in Italia nascit, & à quibusdā setaniū, ab alijs epimelis uocatur. Theophrastus autem, cap. 12. lib. 3. histo. plant. & Plinius cap. 20. lib. 15. nat. hist. tria mespili genera fecerūt, anthedona, setaneā, & Gallicā: ad quos autores breuitatis studio te remitto. De epimelide uaria est doctorū sentētia. Nam Dioscoridi mespili: Galeno arbuti genus esse uidetur: quāuis ipsi Galeno lib. 2. aliment. idē sit amamelis quod Dioscoridi epimelis: in censu autē simpliciu epimelida arbuti genus esse dicat, quæ Græcis κίμαρες uocetur: adeo, ut, in tāta sententiarū ambiguitate, quid certi pronūciari possit, sit prorsus difficile. Sed siue mespili Dioscoridi species sit epimelis, siue arbuti rusticis Italiæ, Galeno & Paulo autoribus, unedo, & Græcis κίμαρες nominata, non est huius loci cōsiderare. Verū in præsentia hoc tantū addidisse sat fuerit, mespilorum apud Galias duo haberi fastigia: maius, quod & mitius: minus, horridius. De comaro autem quibus nominibus uocetur, quibusq; in locis proueniat, abunde suo loco diximus.

μυρία περσική, Malus persica.

Persicæ mali genera non pauca. Quædam enim duracina uocantur, & sanguinolenta sunt, nucleoq; tenacissimē adhærescunt. Quædam nucleum deferunt, & hæc duū sunt generū. nā ficiora alia, friabili & solidiore carne, non postremæ inter persica



persica dignitatis : alia humidiora , omnibus uulgatissima. Corbelliana Lutetiae in magno sunt honore. Officinis omnia nomē retinent: Gallis & Delphinatibus pesches: nostris persegēs, ac si dicas persica: Italis pesche : quæ autem multum lutea sunt, pesche cotogne appellantur.

μυλῆα ἀρμενιάκη, Malus armeniaca.

Romanis Galeni sæculo præcocia dicebantur: unde, opinor, Galli ac Delphinates, deprauatâ priscorū appellatione, abricotz: Itali autē bacoche & moniache, appellāt: nostri auant persegēs, quod nimirum sint persicorum malorum uelut anteambulationes quidam, ac præcursores. Varia his regionibus spectantur armeniacorum genera. Nam quædam hic habentur, quæ galli nacei oui magnitudinem æquent, subfulua, carnosâ, & palato gratissima. Alia minora sunt, & multo minus suauia.

μυλῆα μινδυν, Malus medica seu citrea.

Ab insigni fructuū, tā in colore, sapore, quā forma ac uarietate arbores horum feraces appellationē sibi cōpararunt: quāquā congeneres, & ita inter se similes sint, ut distingui, nisi magna difficultate, nequeant. Mala igitur fulgoris auri æmula, aures Gallis: Delphinatibus & nostris aranges: Italis arāci, parēs uulgo aurengier, & arangier. Quæ ex uiridi in luteum lingue scunt, uulgo citrōs, Italis cedri & citroni: arbor citronier. Her baceo uirentia colore, limons: Italis limoni: arbor limonier. Prægrādia instar melonum, orbiculatāq; facie turgentia, poncires dicuntur: arbores ponciriers. De his plura apud Ruellii. cap. 69. lib. 1. Et nos quoq; singulorū tum fructuum, tum arborū mali medicæ faciem tuis oculis scripto aliquando ita subiiciemus, ut etiam absens, quasi præsens, de illis iudicare possis.

μυλῆα, Malus omnis.

Pomorū infinita genera, sed quæ in tria quatuorue præcipua reduci possint: austera nimirum, acida, acidodulcia, & dulcia. Nomē retinent officinis, Gallis, & nostris: priuatas tamē nomenclationes, aut à locis, aut ab imponentium arbitrio acceperūt, ut aliās explicabitur.

μυλῆα, Meon.

Officinis fœniculus tortuosus: uulgo ignotum. Locis calidis gaudet. Inueitur hic in agro Valentino: & in Gallia non procul à Lutetia copiosissimum apud nostrates prouenit: uulgo tamen nostrati, anonymum.

μυλῆα, Mora.

Mora duū sunt generum, alba & nigra officinis mora: Gallis & Delphinatibus des meures: nostris amouros: Italis more: arbor illis meurier: nobis amourier: tum arbor, tum fructus, uulgaris sunt notitiæ.

μύκητις, Fungus.

Fungi Gallis des champignons: Delphinatibus bracoules: Italis prignoli: nostris bourigoulos: nullius in medicina usus. Alia multa sunt fungorum genera, sed planē inutilia ac pernicioſa.

μυρὸς ὠτὸς, Auricula muris.

Officinis auricula muris: uulgo du morron. Italis anonyma.

μυρίκη, Tamarix.

Officinis tamariscus: uulgo du tamarix. Italis tamarigio: Copiosa nascitur in Narbonensi Gallia, apud nos passim in hortis: apud Delphinates in sylua Gratianopoli ad orientem posita. Adhuc in quibusdam Rhodani insulis.

μυρρίνη, Myrtus.

Officinis myrtus: Gallis, Delphinatibus & nostris de la nerte: Italis myrto. Duo myrti genera: maior, cui maris nomen: minor, cui fœmina discriminis gratia adaptari potest. Plurima Lutetie uisitur in fœtilibus uasis. In nostræ prouinciæ maritimis tractibus uberrimē luxuriat.

μωλῶν, Moly.

Quid sit syluestris ruta, nisi ea cēseatur, quæ passim in agris, tum apud nos, tum alibi inuenitur, nescio. Scio tamē eam herbam, quam Lutetiae syluestris rutæ nomine ostentant, moly non esse. Audio tamen Plinianum moly (nam Dioscorideū ignotū est) in Cāpania Italiæ inueniri, radicibus eius pedum triginta longitudinem equantibus. nasci saxosis locis.

ναρδὸς σπῆκα, Nardi spica.

Officinis Græcū nomē insedit: quāquā illis nō infrequēter turpi ter imponitur. Nā infitiores quidā ac callidi nebulones hoc adulterio nardi spicā mētiuntur. Accipiūt enim superiorē radicis seseleos cretici (quod Delphinates ceitre, Lygures ceistre uulgo appellāt) partem siccis ac uelut comantibus staminibus refertam, truncoq; caulis & inferioris radicis amputatis, macerant, aut modicā aquā, in qua dissoluta est rubiæ maioris radix, respergūt: dein cinamomi decocto aromatizant, sicq; diligēter siccantam pro nardi spica dāt uenum. Nam hunc fucum mihi nuper detexit quidam, qui eodem ipso quotidie multorum detrimēto uteretur. Volunt docti nonnulli nardi spicam officinarum, non Indicam, sed Syriacam nardum esse.

ναρδὸς κελτικῆ, Nardus Celtica.

Si doctis creditur, à paucis hodie nota est. quanquam non desunt, qui Gallorum & nostrorū aspiciad Celticam nardū referendū putent, pseudonardū uulgarem lauandulam esse uolūt: uerū nardus celtica in alpiū summitatibus prouenit, & à rusticis aspiciadhuc nominatur. Et pseudonardi duo sunt genera: mas Italis spigo: Gallis & nostris aspici: fœmina omnibus Galliæ populis lauande: Italis lauanda.

ναρθηξ, Ferula.

His regionibus ignorat. In Apulia frequēs ac copiosa prouenit: uulgatū tamē gētis nomē nullū ex autoribus scire potuimus.

ναπυ, Sinapi.

Officinis sinapi: uulgo moustarde, aut uerius, graine de moustarde, Italis senape & mostarda.

ναρκισσος, Narcissus.

Νάρκισσος Græcis: narcissus Latinis: officinis ignotus. Duo præcipua narcissi genera: Cādidus & luteus: Cādidus in marē distribui potest & fœminā. utriq; flos est cādidus: sed mari in medio purpureus: fœminā uerō, croceus. adhuc in mari narcissi maiora sunt oīa, flos, caulis, folia, radix: in fœmina, minora. Ambobus tamē idē nomē. Nā flos Gallis des narcis: Lugduni des ieānettes: Alpinis Delphinatibus (nā in alpiū pratis copiosissimus luxuriat) nunc fleur d'oye, nūc gonnette, nūc donnet te: nostris courbo donno, quod, more decrepitarum mulierū, caput deorsum inclinet: Aquis sextijs tamen, Malsiliæ, & alijs nostræ prouinciæ tractibus maritimis, de iuyeuſues, id est, iudeæ, aut iudaicus flos nominatur. Hæc species ubiq; in pratis uuidis tempore uerno florere inuenitur. In alpius autē floret mensibus Iunio & Iulio. Obseruatione interim dignū est, ab uno candidi narcissi, præcipuē fœminæ, cauliculo eodemq; loco sepe duos, nonnunquā tres simul flores erumpere: id quod ego ualde, mehercle, sum, paucis ab hinc diebus, admiratus. Luteus narcissus in maiore & minore diducitur. Maior paucis medicis cognitus: officinis prorsus ignotus. Lugduni & locis circum uicinis, uulgo notissimus. Nam quibusdam illorum des ieānettes, alijs des campanettes, alijs des coculz, nominatur. Radice, caule, & folio cādido similimus est. flos euariat. Siquidem longus est, media sui parte calathi effigiē representans, crispatis in ambitu fimbriatus, appendicibusq; septē in eius medio inclusis. in ambitu autem folia sex obtinet, stellæ modo radiata, molliter acuta, ab ipsoq; floris calathio, paulo infra medium, prodeuntia, sup pallida. Floret statim primo uere, nondumq; bene exacta hyemis inclemētia: adeo, ut huius flores tum maximē appareāt, cū candidi narcissi folia è terra erūpere cœperint. Reliqua omnia illi similima habet. Minori luteo narcissi folia croci insunt: cauliculus quaternū digitorū. Radix bulbosa, nucis auellanae magnitudine, foris nigra, intus candida & succosa. flosculus aurei penitus fulgoris, cādidi narcissi floribus effigiē omnino similis: semē atrū, exiguis siliquulis cōtentū. floret mēse Martio, & Aprilis initio. Nascitū dū taxat, q̄ equidē explorare hactenus potuerim, in nostra prouincia, apud Aptā Iuliā, saxosis locis ad occidentē urbi adiacētib;: quos patria lingua, q̄ cauernosi sint, les baumos appellant: in quib; terebinthus idæa, cedrus humilis, meon, thymus, clematis utraq; onitis origanos, asterq; atticus maximē luxuriant.

νήριον ἢ ῥοδὸδάφνη, Nerium aut Rhododaphne.

Quid sit his regionibus ignoratur. Fuchsio placet nerium in Germaniæ locis quibusdā inueniri. Audio Italiæ familiare esse, & uulgo oleādrio nominari. notum quoq; iam est in Aquitania.

νυμφαία, Nymphaea.

Officinis nenuphar. Duo eius genera: alia candido, alia luteo flore. ambæ notæ.

ξανθήιον, Xanthium.

Lappa minor officinis: Italis lappola minore dicitur. uulgo anonymum: frequēs ubiq; in rudibus, urbium fossis, lacunosis ac stercoreatis locis prouenit.

ξιφιόν, Gladiolus.

Officinis spatula segetalis: uulgo Gallorum des espées: flos, Turcis monacuccie.

ῥῖνος, Vinum.

Varia ac penē infinita sunt uini genera, sed nota.

ῥῆξ, Acetum.

Aliud album, aliud rubrum. uulgo du uin aigre. Italiæ aceto.

ῥῆς, Laser, succus cyrenaicus.

Verus cyrenaicus ueterū succus, uix habetur. Syriacus officinarū beniuin aut belzuin: Italicus belgioino: si doctis creditur, est qui laseris purior ac nobilior portio uidetur. Est & officinis asa cognomento fœtida, purioris illius recrementum: aut certē laser è Media Syriæ allatum, Dioscoridi olens grauior, & putorem resipiens. Aëtio tamen laser à cyrenaico laser separatur, siue quia laser succus ipse sylphij, non lac esset, siue, quia



siue, quia laferis appellatione persicum aut medicum, ut cognobilia, & uiribus ac dignitate posteriora, non cyrenaicū, uenirent: argumento inde sumpto, quod cyrenaici succi inopiam emendari tradit laferis duplo cap. 40. lib. 8. & cap. 18. lib. 13. Vnde constat lafer cyrenaico succo uiribus infirmius esse (quāquam congener sit) & ob id duplum illius, alterius inopia, ad usus medicos desiderari.

#### *ὀρίανον*, Origanon.

*ὀρίανον* Græcis ἡ ὀρίανος: origanum Latinis. Triā sunt origani genera: heracleoticum, onitis, & syluestre. Heracleoticū origanon officinis generis nomen seruat: Gallis (ut nonnulli uolunt) mariolaine d'angleterre: Delphinatib. ouriam: nostris l'herbo de nostro damo, nominatur. Quod in his regionibus adolefcit, non usquequaq; uiribus ipsi ab antiquis adscriptis, respondet. Quare onitis origanos aut satureia cōmodius eius loco usurparetur. Onitis autem officinis omnibus ignota: paucis adhuc medicis cognita: nostrati uulgo notissima. Appellatur enim in nostra prouincia pebre d'ase, id est, asini piper: seruato nimirum Græco cognomento, assumptoq; ab acrimonia, piperis nomine. Herba est pedalis altitudinis, radice capillari, nigra, inutili, numerosis ramulis ab eadem erumpētibus: folio hyssopi, aliquanto angustiore: flore ex dilutissima purpura cādido, semine exiguo, nigro. tota herba gustus est feruidi, unde sibi piperis nomen adoptauit, odore suauis, fragrantis & ualde aromatico. floret quasi æstate tota. Nascitur in asperis, aridis & sitientibus ubiq; in nostra prouincia & alijs calidis regionibus. in frigidis enim nusquam sponte natum inuenitur. Syluestre origanum quod sit, nondum mihi est comperitum. Tragoriganum esse uolunt eam herbam, quā Galli l'herbe du mastic appellant.

#### *ἰγύσχευος*, Iuncus acutus.

Iuncus alius holoschoenus, mollissimus & ad utilia utilissimus, qui Latinis marisca, Ruellio autore, dicitur: alius nobis acutus, Græcis ἰγύσχευος: tertius melancranis, quasi atriceps, fructum gerens uuarum coherētium modo. Hoc nihil in uliginosis locis occurrit frequentius. uulgo ionc: Italis seruato generis nomine giunco.

#### *ὄροβος*, Eruum.

Officinis Græcum nomen insedit: nostris erre.

#### *ὄροβάγχη*, Orobanche.

Cuscuta quibusdā est: rusticis Galliæ tigne: Italis herba lupa, & coda di leone: alijs herba tora. nomē à strangulādo lino sumpfit.

#### *ὄρυζα*, Oryza.

Officinis nomen retinet. practicis non paucis ryzum: uulgo du ryz: Italis riso.

#### *ὄρχις, ἢ νυνὸς ὄρχις*, Testiculus canis.

Officinis testiculus canis, & nonnunquā satyrium, quāquam id minus propriè: Gallis, maximè Parisinis, du satyrium. Italis anonymos.

#### *ὄρχις σερᾶπιας*, Testiculus serapias.

Triorchis à triplici radice dicitur. Huius duo genera. mas flore purpureo: scemina uariiegato. officinis ignoti, aut saltem anonymi. in montium pratis copiosissimi. Testiculi præterea species sunt illæ plantæ, quas Fuchsius satyrij basilici nomine describit. nam satyriū radice est bulbosa: illæ radices habēt multifidas, ut aptius inter testiculares numerentur.

#### *ὄσυρις*, Osyris.

Est officinarum & Italorum linaria. uulgo ignota: frequens tamen ubiq; prouenit.

#### *πανκράτιον*, Pancratium.

Radix est scille similis, quam scillam maioricam uocant: multorum tamen sententia uulgaris scilla uerū pancration est. Italis scilla minore.

#### *παλιύρος*, Paliurus.

Ambigitur inter doctos de paliuro. Quidā Gallorum aulbe spine paliurum putant: quidam diuersū sentiunt, quod nimirū uulgaris illa alba spina semē in siliquis minimè recondat. Verū, si ueteris ac clarissimi autoris Theophrasti de paliuro scripta paulò accuratius in examen adducantur, faciliè ueritas erui, horumque componi discordiæ poterunt. Siquidem ex capite 17. lib. 3. de plant. hist. nulli non manifestum ac perspicuum existit, plures Theophrastū paliuri species nouisse, sed duas præcipuè: Alteram cuius semen in siliquis contineatur, quam ignotam existimamus: Alteram uerò (ut ipsemet autor est cap. 4. lib. 4. eiusdem historię) cui semen rotundū, rubrū, cedridum magnitudine, aut paulò minus: nucleum habens nō mandendum, modo acinorum punici mali: & hæc est uulgata Gallorū aulbe spine, & nostratium aubrespin. Accedit Dioscoridem fructui paliuri uires exterendi uesciæ calculi assignare: quæ quidem uires tam manifestis experimentis in albæ spinæ uulgaris semine inueniuntur, ut inde uel liquido cōstet, eam à

Dioscorideo paliuro diuersam plantam nō esse. Sinto igitur duo paliuri genera: Alterum quod semen in siliquis recondit, idq; adhuc ignotum, & Dioscoridi intactum: Alterū uulgaris alba spina, cuius fructum Galli & Delphinates poyres saint Martin nominant: nostris autem generis, id est, seminis nomenclationem seruat. Meminit & Plutarchus cuiusdam paliuri, ab his longè diuersi: sed is nobis ignotus.

#### *παναξ ἡράκλειον*, Panaces herculeum.

Quid sit, non ita constat. Nam huic conuenit (delineamentis saltem, si non uiribus) ea planta, quam sphondilij nomine Lutetiæ uulgò ostentant: quāmq; Gallica plebs panaiæ appellat. Ea, inquam, ubique locis pinguibus & humidis uberrimè luxuriat. Inuenitur quædam herba in maritima nostra prouincia, cuius notæ herculeo panaci omnes responderent, si eius caulis lanugine quadam incanesceret. Nam folia humi strata iacent, aspera, oblonga, à ficulneis non multum abhorrentia. Caulis rectus, cubitum excedēs, infernè candidus, supernè luteus, læuis. Flos illi lutens, sphaericæ rotunditatis. Radix candida, longa, succo prægnans, gustu feruida. Floret mēse maiore. plura nō obseruauit. Nascitur in asperis & sitientibus soleq; illustratis locis. Hæc interim nō ineptè ad Peloponnesense teseli reuocaretur, ut suo loco dicef. Herculeus panax in Apulia & in Apennino plurimus nascit, sed anonymus apud uulgos est. Reliqua panacis genera ignorantur. Quæ uero Lutetiæ chironij panacis appellatione falsò ostenditur, syluestre silarum, quod & cheruilla herbarijs, officinis baucias, Delphinatibus chiroulo: nostris giroulho dicitur, est.

#### *πενταφυλλον*, Quinquifolium.

Ad pentaphyllum uulgarem tormētillam (quæ Gallis & Delphinatibus tomentille dicitur: nostris autem penè ignota est) ferè omnes referunt. Quidam tormētillam herbam sui generis faciunt, quod septem, non quinque folia habere oculorum iudicio eam constet. uolunt tamen pentaphylli inopia in usum tormētillæ uocari. Alij pentaphyllum in Italia nasci cōtendunt, sed uulgo anonymon: & uulgare faniculam pentaphylli speciem quartam faciunt.

#### *πέπλον*, Peplium.

Πέπλον Aëtio cū Hippocrate: πέπλος Dioscoridi: utrumq; Latinis: officinis herba incognita. Nascitur in quibusdam maritimis nostræ puinciæ locis, sed in eo præcipuè, qui uulgo Istres dicitur. in faucibus enim amplissimi, & nobilissimi lacus maritimi est, qui nostro sermone le Mârtegue appellatur, stadijs plus minus sexaginta, à Mafilia urbe antiquissima & clarissima, uersus occidentē solē. Herba est pumilla, portulacæ similis, folijs supernè uirētibus, infernè suppurpureis, à domestica portulaca minimum ab similibus. Officinis quibusdam nostratibus egregiè nota: quibus, ob similitudinem domesticæ, portulaca marina nominat. Est & peplos herba, appellatione ab hac nō omnino dissimilis, quā officinæ esulam rotundā appellant.

#### *πέπων*, Pepon.

Cucumerum generi assignatur pepones: Italis meloni & peponi dicti: quorum uaria genera existunt: de quibus lege Ruellium & Fuchsium. officinis nomen retinet. uulgo pompon.

#### *πίπερις*, Piper.

Triā piperis habentur genera: album, nigrum, & longum. omnia nota, Gallis poiure: Delphinatibus peure: nostris pebre: Italis pepe. Admonendus est mihi lector, haberi Lutetiæ in pleriq; hortis frutices quosdam, quinū plus minus cubitorum altitudinis, caudicosos, ramis plurimis illustres, folio mori, aut rubi idæi (ribes officinæ appellant) non amplo, fructu iulorū modo à ramulis per pediculos propendente, ex herbaceo cādido, quod piper appellant: fruticibus nimirum eo iam pridē ex peregrinis admodum regionibus importatis. Lōgi interim piperis inopiam sarcit album, & albi nigrum cap. 24. lib. 9.

#### *περιστεριον*, Verbenaca.

Duo summa uerbenacæ fastigia tradūtur, officinis nota, ut apud quas nomen seruēt. uulgo ueruene: Tuicis uerminolaca: alijs Italiae populis berbena.

#### *περσέα*, Persea.

Ignota his regionibus arbor est, Aegypto familiaris.

#### *περδινία*, Perdicias.

Officinarū parietaria est. Gallis paritoire: Delphinatibus espargue: nostris espargoulo: Italis uetriupla: de qua supra in helixine dictum est.

#### *παονία*, Paxonia.

Duo eius genera: mas & scemina: illius flores Gallis roses nostre dame appellantur. officinis herba, paxonia: nostris piouono nominatur. nam copiosissimus est paxoniæ prouentus, in finibus nostræ prouinciæ & huius Delphinaticæ gentis, in montibus ignobilis uici, qui nostra lingua les Amergues dicitur: in Galliæ hortis multa quoq; inuenitur.



*πιτροσέλινον*, **Petroselinum.**

**Selini multa genera.** Hortense: quod Latini apiū: officinæ petroselinon: Itali petrosello: Galli persil: Delphinates pereseil: nostri iuverd, nomināt. Hippofelinon Latinis equapiū & olus atrū: officinis apiū: Gallis & Delphinatibus ache: nostris api. Oreoselinō & eleoselinō officinis ignota. Est & aliud selini genus, magnū quidē & amplū, quod officinæ petroselinon macedonicon uocant: cui nulla prorsus ex parte conuenit descriptio. Apud Delphinates in hortis quibusdā uisitur herba, cui petroselini macedonici historia, quāquā breuis admodum, mirē adstipulatur. Ea uulgo l'herbo de la grauello nominatur. Radicem habet digitalem, non longam, radicis apij æmulam, uerū duram, lignosāq; (plantā nimirū ad seminis maturitatem appropinquante) odoratā, gustu acrem, quiq; diu linguam uellicet, suauem tamen, & ad cheruillæ hortensis gustum nonnihil accedentem. A radice erumpit caulis cubitalis, aut procerior, teres, geniculat<sup>9</sup>, inauis, intus medullaceus, læuis, uirens, multis alarum sinibus concauus: ramulis ē singulis geniculis erumpentibus, inq; alios etiam ramulos diductis. in quorū omniū summitatibus flos insidet albus, minutulus, sparsus, nulla umbellæ aut muscarij seruata ratione. Florē illicō subsequitur ipsum semen, duobus granulis inter se coherentibus, semini ameos uulgaris similitum, odoratus tamē, initio uirens, post maturitatem ex flauitie pallidulum, acre, aroma olens, diuq; os ipsum gustantis mira odoris suauitate comendans: folia quæ ē singulis caulis erumpunt alis, magna sunt, hortensis cheruillæ folijs similia, aliquoties utrinq; pinnata, & in ambitu serrata: & quo magis ad suum caulem accedunt, eo minora sunt. quæ uerō ē ramulorū sinibus exeunt, parua sunt, folijs hortensis apij effigie similia, pinnata semper, & per ambitum serrata. Cæterum quæ ē summis exiliūt, minutissima sunt, & quasi fœniculacea, nisi plana essent, & ut ceruinū cornu uulgare, perpetuo dentata. floret æstate. Semen mature scit circa autumnū initia. Inuenitur in paucis Delphinatū hortis (& iam hic quoq; nostra cura, ut terebinthus idæa ac macedonica, philyra, phillyrea, lotus arbor, cedrus humilis, & rhamni tertia species) diligentiq; matronarum studio, & seruatur ad exterendos renum calculos. Nam constat modicam eius seminis portionem tritam, & ex albo uino potui datam, magnam uim arenularum per urinas exigere. Vnde ab effectis uulgis eam l'herbe de la grauelle nominare cōsueuit. Adhæc certum est huius herbæ semina ē Macedonia, superioribus annis fuisse allata: ut uel hinc probari possit, illam ē genere selini macedonici esse.

*πυκέδανον*, **Peucedanum.**

Ad peucedanum meo iudicio reuocari potest ea herba, quæ passim Lutetiæ, Mafsiliensis seseleos nomine, ostenditur: cuiusq; maximus est prouentus in prato Gentilitio propter Lutetiam: necnon in tota Gallia: nam si (ut Ruellio, & alijs doctis placet) officinarum filer cognomento montanum, Mafsiliense fefeli existimandum sit, ē duobus alterum erit necessarium, aut duo Mafsiliensis seseleos statuere genera, aut alteram ē plantis illis (quod ueri similis est) fefeli Mafsiliense nō esse. Accedit, quod ea planta à multarum gentium officinis peucedani nomine in usum medicum uocatur. Succo peucedani usi sunt ueteres medici: atq; idcirco, si illius copia non adsit, tantum siccæ herbæ, & dimidium sagapeni coniiciendum monent, cap. 47. lib. 12.

*ρίγανον*, **Ruta.**

Officinæ & Itali Latinum nomen usurparunt. Galli & Delphinates da la rue: nostri rudo nominant. Duo rutæ genera: hortensis, & syluestris. Syluestris apud nos calidis siccisq; locis copiosissime prouenit: quæ autem planta Lutetiæ syluestris rutæ loco ostenditur, ruta syluestris, saltem ueterum, non est. Satiua ubiq; in hortis inuenitur.

*πίσα*, **Pix.**

Officinis nomen seruat: Gallis de la poix: Delphinatibus peio: nostris pego: Itali pece. Multa picis genera, liquida, arida, brutia, cedria, & similes, de quibus copiosissime ac doctissime Ruellius cap. 113. lib. 1. sui operis de stirpium natura.

*πιστάμιον*, **Pistacium.**

Arbor est peregrina, folijs rotundis, capparinis proximis, odoratis, gustu aromatico. Lutetiæ uisitur in horto diuæ Mariæ. Fructus Græcis & Latinis pistacia: officinis fistica: Itali pistachi dicuntur.

*πινίς*, **Pityides, nux pinea, nux picea.**

Nomen seruant officinis. uulgo pomme de pin.

*πίπυρος, ὁ φλοιός*, **Pini cortex.**

Officinis Latinum nomen insedit. Gallis escorce de pin: Delphinatibus rusche de pin: nostris rusco de pin. Hic cortex loti arboris cortici substituitur, si ille desit, cap. 48. lib. 9.

*πλάτανος*, **Platanus.**

*πλάτανος* Græcis: Platanus Latinis: officinis ignotus. Duo eius stui possunt genera. fertilis & sterilis, qui pseudoplatanus discerniminis gratia dicitur. Ferax platanus Gallorum paucissimis cognitus: Delphinatibus & nostris ignotus. Hic Lugduni hac forma in horto quopiam spectatur. Arbor est adhuc non procerat, trium aut quatuor ulnarum longitudine, caudice uirilis tibie magnitudine, candida ligni materie, cortice crasso, spadicei coloris, ramis oblongis, à pseudoplatano non absimilibus: fronde uitiginea, longo eoq; purpureo pediculo nitente: flore racemoso, ex luteo pallido, semidodrantem longo, la brusca magnitudine, multis appendicibus, ex pallido in luteū languescantibus, ornato. In summis illis petiolis mox oriuntur siliquulæ, breues, triangulares, membranosis & pressis uelut corniculis, in tripodis formam, singulis eius angulis adnatis. Floret uere: fructus exin sensim increfcit: ac tandem maturescit ad autumnum. Florem ipsi uidimus: & plantam totam. Fructum uerō cernere nondum licuit: uerū quæ de eo scriptis mandamus, ab œconomo intelleximus. Audio in Sabaudia montibus inueniri, aque indigenis platin nominari: id quod à ueritate alienum non uidetur, cum ea planta quæ hic uisitur à Pictauis Gallia populis huc fuerit allata. Habetur & apud Neapolim in hortis quibusdam. Pseudoplatanus autem ubiq; luxuriat, & Gallis du plan: Delphinatibus playe: nostris blaye: Sabaudis uerō planou uocatur. Huic folia quoq; uitis insunt, ligni candida materia, cortex crassus, spadiceus, ut ob similitudinem pseudoplatanus non ineptē appellari possit.

*πολύγωνον*, **Polygonum.**

Duo polygoni genera: mas & fœmina. mas Latinis sanguinaria: officinis centinodia, corrigiola, lingua passerina: Apuleio proserpinaca: Parisinis autem herba sancti Innocentis (quod frequens ac copiosum in eo cœmiterio luxuriat) nominatur. uulgo anonymum. Fœmina officinis ignota. Quod autē in aquis stagnatibus aut pigro lapsu repentibus adolescat, idcirco Gal lis pin d'eaue dicitur.

*πολεμώνιον*, **Polemonium.**

*πολεμώνιον* Græcis, Latinis polemonium: officinis planē ignotū, nisi ea planta sit, quam herbarij bosci saluiam, & quædam Gallia officinæ ambrosiam nominant. Verū non ausim affirmare bosci saluiam, idest, syluaticam saluiam polemonium esse. Quidam se id nosse prædicant, quorum sententiam nec probo, nec improbo. Quibusdam alijs rutæ herbariorum cognomento capraria polemonion existimatur: uerū parū probabiliter. quando quidem omnes illius notæ, ne minima quidem reclamante, asphaltiti trifolio tam adstipulantur, ut absurdissimum putem eam ad aliud genus reuocare. Sit igitur polemonion ex earum plantarum numero, quæ parū adhuc exactē cognitæ sunt.

*πόλιον*, **Polium.**

Duū est generum: montanum, quod officinis uomen retinet: alterum fruticosius, minus notum.

*ποταμογέτωρον*, **Potamogeton.**

Paludibus & stagnis familiaris: officinis & uulgo ignotus.

*πολυπόδιον*, **Polypodium.**

Latinis filicula: officinis polypodium. Quercinum laudant, quorū rarō, herbariorum incuriā, utuntur.

*μαράσιον*, **Marrubium.**

Duo prasij genera: album, officinis prasium album: Gallis, Latinā nomenclationem usurpantibus, du marrubium iam dici cœpit: Itali marrubio: Delphinatibus & nostris corrupta uoce lapsuq; facili bon robin, pro eo quod est marrubium, nominatur. Nigrum officinis prasium fœtidum, balote Dioscoridis est, uulgo ignotum. Habet & prasium officinæ, cui uiridis nomen indiderunt, albo congener, & uiribus eisdem præditum.

*πορέον*, **Porrum.**

Officinæ Latinum nomen seruauit. Gallis porreau: Delphinatibus porreau & por: nostris porre: Itali porro. Duo eius genera: hortense, & uineale. ambo nota.

*πρόπολις*, **Propolis.**

Quid propoleos nomine accipiendum sit, ambigitur. Scribonio Largo cera uirginea dicitur. Alijs tamen rudis est & crassa materia in apum officinis nondum cera, odore graui, qua pro galbano ueteres utebantur. Emendari potest eius teneræ inopia, si terebinthinæ, aut, deficiente terebinthina ipsa, picis brutiæ par pondus substituat, cap. 42. lib. 12.

*πύλη*, **Ulmus.**

Officinis ulmus: Gallis & Delphinatibus orme: Itali olmo: nostris oume. Duo faciunt ulmi genera, domesticum & montanum. Italia, ut Ruellio placet, quatuor ulmi fastigia habet. Est & apud nos arbor montana, quam uulgas nostrum, quasi ulmo congenerem putet, oume teilh appellat. Ea species tilia



Latinorum est. De tilia autem arbore variatum sententijs ab antiquis fuit. Dioscoridis namq; *φίλυρα*, quam nostri tiliam uerterunt, longè diuersa à Theophrasti (cap. 10. lib. 3. de plantarum historia) *φίλυρα*, quæ item nostris tilia nomen sibi adprauit, uel sensu iudice, est. Nam Dioscoridis *φίλυρα*, id est, tilia, dubio procul, si notæ omnes diligenter expendantur, ea arbor est, quam nostri patrio sermone amelanchyer, fructus autem amelancos nominant. *φίλυρα* uerò, hoc, est tilia Theophrasti, lōgo ab illa interuallo dissidere, cuius, uel mediocriter oculato, comperietur. Siquidem *φίλυρα* Theophrasti duo summa statuuntur genera: fœcundum, & sterile: fœcunda tilia fœminæ appellatione dotatur: officinis ignota: Gallis anonyma: Delphinatibus, præsertim montanis, notissima: Eam enim uulgata eorum lingua terlier, eius autem fructus terlis appellant. Sterilis tilia maris nomen obtinuit, Gallis tiller: Delphinatibus teilh: nostris, ut dictum prius est, oume theilh uocatur. Accedit tilia Dioscorideæ (quam nostris amelancuier nominari diximus) fructus nigros racematim cōgestos ac gustu subdulces: tilia autem fœminæ Theophrasti (quæ huius gentis hominibus terlier dicitur) sorborum colore & figurâ penè æmulus, gustu (quanquam ad summam maturitatem peruenerint) austeros, intus granulosos, semine, ut solanum halycacabum, copioso prægnantes esse. Quæ omnia etiam si reliqua silentio prætereatur, manifestum inter has plantas discrimen ostendere possunt. Sed harum prolixiorē atq; exactiorē, ne longior sim, tractationem in aliud tempus differendam institui. Nunc ad ea quæ sequuntur properemus.

*φίλις*, Filix.

Duo filicis genera: mas, officinis osmunda regalis: Gallis osmunde. Fœmina officinis nomen seruat: Gallis & Delphinatibus de la feugiere: nostris faugiere: Italis felce dicitur.

*πύρεθρον*, Pyrethrum.

Pyrethri planta his occiduis regionibus desyderatur. Radix in usu frequentissimo est, & nomen officinis retinet: Gallis pied d'alexandre. Habent & herbarij suum syluestre pyrethrum, quod doctorum ferme omnium sentētia, ad Dioscoridis ptarmicam referri debet.

*τρίσις*, Triticum: *ἀμύλον*, Amylum.

Triticum uaria genera: quanquam eius communi nomine omnia semina, quæ in panificium assumuntur, complecti uidentur. Vulgus Gallorum & Delphinatium froment: Tusci grano: Lō gobardi formento: nostris blad & annono appellant. Amylum officinis, & uulgò amydon, ideo hoc nomen obtinuit, quod citra molæ usum ac operam fieri soleat.

*ῥάμνος*, Rhamnus.

Trium est generum. Prima species mihi adhuc ignota. Secunda exigua copia prouenit apud Geruanum Delphinatium propè Tinctum ignobile uicem in sepibus, ubi ab indigenis l'espine de nostre Seigneur nominatur. Tertia, quæ fructum uerticillo similem gestat, & in ambitu membranosum, copiosissima luxuriat in nostra prouincia ubiq; maximè apud Aptā Iuliam, & quā Aptā Iulia Auenionē & Caballionem itur: & uulgò ab omnibus arnaueau: Italis autem marruche nominatur.

*ῥαφανίς*, Raphanis.

Duū est raphanus generum. Satiuus, qui Gallis raue: nostris & Delphinatibus raiffort: Italis quibusdam radice: alijs rauanello. Syluestris etiā non rari est in medicina usus: quanquam inuentu non usquequaque facilis. officinis Græcum nomen seruatur. Italis ramoraci.

*ῥιον ποντικόν*, Rheon ponticum, Rha.

Verum rha ponticum occiduis hisce regionibus desyderatur. Quæ uerò radix à seplasiarijs rha pontici appellatione ostēditur, centaurij magni radicem esse, longè plura argumenta conuincunt, quam ut pluribus demonstrari nunc debeat. Ruellio & Manardo rha cognomento barbaricum siue sceniticū eiusdem generis & uirium cū pōtico statuitur. discrimen tantum in odore est, quod hoc, id est, ponticum inodorum sit: illud autem, præsertim tritum, grauem spiret odorem. Rha pontici si quando non adfuerit copia, centaurij magni radix in usum uocari potest, cap. 57. lib. 3.

*ῥητίνη πᾶσαι*, Resinæ omnes.

Resinarum multæ species. Terebinthina, abietina, laricea, picea, pinea, lentiscina, cui mastiche nomen est, iuniperina, cedria. Terebinthina è Cypro & Rhodo Venetias aduehitur: Venetijs in Galliam transmittitur, apud quam terebinthina Venetæ nomen inuenit. Apud nos quoq; mensibus augusto & septembri uera terebinthina sudare ac stillare conspicitur, neglectaq; plebeiorem & aliorū ignorātia, adhuc manet. Abietina multa in alpebus colligitur, & occiduis his regionibus terebinthina nomine

nomine ostenditur & usurpatur. Vulgus alpinorum appellat biuquin: officinæ terbinthinā: plebs tormentine. Lariceam cum abietina permisceri suspicor ab his, qui omnia dolo uiuant. Picea huc adfertur in calathis è corticibus arborum (ut fraga reponi solent) contextis. Lentiscina mastiche est. Pineæ calidis in locis uisitur, ut & iuniperina. Hanc postremam officinæ Arabas secutæ sandaracham nominant, quam à Græcorum sandaracha (quæ chymistarum auripigmentum rubrum est) diuersissimam esse constat. Resina igitur iuniperi officinis sandaracha & uernix dicitur. Vulgo autem du uernix aut de la glasse. Cedria his locis ignota. Plura de resinis lege apud Ruellium cap. 113. lib. 1.

*ῥόδον*, Rosa.

Rosarum tria præcipua genera: Rubra, candida, & ex rubro dilutæ. Hæ postremæ uulgo incarnades, quod floridum uiuidæ carnis colorē representent, dicuntur. Rubræ nostris rosos encros: Italis rosè rosse uocantur: officinis singulæ suum seruant nomen. Vidi ego admodum adolescens apud Saltum prouinciæ nostræ oppidum bifera rosæta. Nam nihilo minor rosarum prouentus autumnō in illis habebatur, atq; uerno tempore solet. Habentur & damascenæ rosæ, odore suauissimo ac fragrantissimo præditæ, aliæ albæ, aliæ rubræ: quæ Tusci damaschini alijs moschette uocantur. Hic rosas de damasc.

*ῥοδόδᾶφνον*, Rhododaphne.

De rhododaphne supra in nerio dictum iam est. Dissimulandum tamen hoc loco nequaquam est, maritimis nostræ prouinciæ tractibus copiosissimum nasci fruticem, cui folia sint amygdalinis effigie proxima, gustu insigniter dulcia, cū salugine quadam, foliorum saluæ modo aspera, glutinosa adeo, ut pressa tenaciter digitis hæreant. Flores edit caninis rosas adsimiles, ex rubro dilutos. Floribus succedit semen nigrum, melanthij semini non dissimile, colore nimirum, figurâ & magnitudine, pilulis, aut, si mauis, corniculis quibusdam auellandarum magnitudinem æquantibus conclusum, collectis hinc inde tegminis asseribus, & in unum (ut in pæonia fœminæ nucibus apparet) cōeuntibus. Frutici binū ternūue cubitorū altitudo inest, rami multi, lignosi, cortex asper atq; horridulus. Radix lignosa, acuta, longa. Plura nondum obseruauim. Ex his tute iudicato, num hæc planta ad rhododaphnen possit reduci: quod ipse nolim affirmare. Verum, ut te ad eius apud ueteres inuestigationē incitarem, historiā apposui. Plurima Tholone & Areis, & tota maritima prouincia inuenitur. Floret ineunte æstate, ac subinde semen profert.

*ῥίον*, Malum punicum.

Malum punicum triplex: dulce: acidum, & inter ea medium, acidodulce, officinæ malum granatum, à granorum siue acinorū multitudine: Galli des grenades: nostri migranos: Itali pomigranati appellant. Inueniuntur & syluestria punica mala.

*ῥύς*, Rhus.

Planta quæ sit, à paucis scitur. Fructus seu semen in usu frequentissimo est. officinis sumachi.

*ῥύπος*, Sordes.

Sordium hodie nullus usus, atq; ob id, in Gallia præsertim, mini habentur, nec inueniuntur omnino, quod balnearum usus apud nos penè obsoleuerit.

*Σάγαπνον*, Sagapenum.

Officinis corruptè, ut pleraq; alia, serapinum dicitur.

*Σάμψυχον*, Sampsuchum.

Latinis & officinis maiorana: Gallis & Delphinatibus de la marjolaine: nostris maiorano: Tusci persā: alijs Italiae populis maiorana: uulgaris apud omnes notitiæ.

*Σαργέτης ξύλον*, Caries lignorum.

Caries illiusmodi nostris coucrosso: Italis tarlatura di legno, dicitur: Cariem experiri coucrosso: Delphinates chironnar.

*Σαρκοκόλλα*, Sarcocolla.

Officinis & Gallis nomen retinet.

*Σατύριον*, Satyrium.

Duplex est satyrium: trifolium & erythronium: neutrum officinis satis notum, ut quæ testiculi canis speciebus, quem satyrium abusuē uocant, loco satyrij utantur. Addunt recentiores genus tertium, quod basilicum cognominant. Exiguū, flore saturata purpura nitente, cauliculo quaternū digitorum, aut paulo altiore, radice in manus effigiem conformata: unde Auicennæ digiti citrini: officinis autē palmæ Christi cognomentū accepit: quāquam palmæ Christi appellatiōe ricinus herba uulgo intelligatur. Huius duo genera. Purpureum, quod iam diximus, minus, quod mas dici potest: & uariiegatum, aliquanto maius, fœmina. In classes tamen testicularium aptius relegantur, ob dissimilitudinem quam habent cum uero satyrio. Hoc montes præcipuè amat, alpiū indigenis minimè ignotum. Vidi



tum. Vidi ego postremis annis uerum satyrium in montibus Delphinatium: radice bulbosa, oui gallinacei ferè magnitudi-  
ne, foris ruffa, intus candidissima, succosa, gustus suavis ac præ-  
dulcis: folijs lilij, caule dodrante altiore, læui, terete: flore py-  
ramidalit ac penè rotundo, ex saturata purpura candicante, qui  
tamen calathodem uulgaris lilij effigiem non repræsentaret.  
Floret mēsisbus Iunio & Iulio. Semen, quia maturū tum haud-  
quaquam esset, non obseruauit. Copiosissimum adolescit in al-  
pibus: & in eo Delphinatus monte, qui ex omnibus, quos un-  
quā uidi, herbarum medicarum feracissimus est: patria eorū  
lingua Chironno uocatur, nec procul à Dia urbe ad septētrio-  
nes est. Nam, præter satyria, illic uidentur testiculares omnes,  
gentiana utraq; selseli tum Malsiliense, tum Creticum, acon-  
ita: lilium purpurascens, & candidum syluestre, lunaria minor  
(quæ eorum lingua l'herbo de la routo nominatur) chamæ-  
leones, asarum, carui, petasites, narcissus candidus, centaureū  
minus utrumq; bistorta, oxyacantha, anagyris, & alia innume-  
ra quæ recensere longissimum esset. Distat & ab hoc monte  
uersus orientem solem milliaribus circiter octo, planities am-  
plitudinis admirandæ, aquis abundans, monte excelsissimo ab  
oriēte: locis præruptis & plane inaccesis à septentrionibus  
& occasu, saxosa uero planitie à meridie circumscrip-  
ta: cuius angustissimum ingressum elegantissimus fons exornat. Ea  
priuata gentis lingua les pres de cheuallieres nominatur, &  
monti inaccessio (quem rustici indigenæ l'aigulle appellant)  
admodum uicina est. In quam, inquam, planitiem si quis stu-  
dio simplicium adductus, concesserit: illi simplicium (& maxi-  
mè seseleos Cretici, quod illic, si usquā gentium aut locorū,  
copiosissimum & pulcherrimum luxuriat) copiam, uarietate,  
nobilitatem, raritatem, & in his diuinam prouidentiam admi-  
rari licebit: quæ loca tam deserta, tam inuia, & quasi mortali-  
bus inaccessa, tanta herbarum preciosissimarum uarietate atq;  
ubertate locupletarit.

#### Σάπυρον, Apium.

De apio supra in petroselino diximus.

#### Σέρη, Seris.

De seride copiosissimè in cichorio dictum iam est.

#### Σεσέλι, Selseli.

Σεσέλι Græcis: Selseli Latinis. Quatuor sunt & inueniuntur sese-  
leos genera. Malsiliense Stœchadibus insulis, & maritimis no-  
stræ prouinciæ tractibus familiare: necnon in alpi-  
bus Delphinatium nostrisq; montibus frequens ac copiosum:  
officinis filer montanum: uulgo alpinorum sire mōtan. Quod  
Fuchsius Aethyopici seseleos nomine pingitur, iam dictis in  
montibus, alpibus nimirum, copiosum prouenit: inuentu &  
cognitu (si quis uigilantior fuerit) non difficile. Aut uerius  
Aethyopicum (quia in alio multæ notæ reclamant) selseli eam  
plantam dixerim, quam Lutetiæ, in hortis quibusdam, parū  
consulto, pro terebintho ostentant. Cuius, inquam, largissi-  
mus est prouentus, propter Druentiam, rapacissimum nostræ  
prouinciæ flumen, saxosis locis, iuxta Orgonum Caballioni  
proximum oppidum. Siquidem delineatio uniuersa illi fauet,  
nulla reclamante notâ. Nam frutex est binū ternūue cubito  
rum, caudice digitali, flagellis cubito lōgioribus, iuncoq; cras-  
sioribus ac lignosis, folio demestice oleæ, nigriore, molliore,  
& ad periclymeni folia satis accedente. Flos in ramorum ca-  
cuminibus insidet luteus, speciosus, circinnatæ (ut cepæ porri-  
ue flores) rotunditatis. Semen fœniculo crassius, nigricans,  
dēsum, solidum, & feruentis gustus. Radices ualidæ, in pro-  
fundum astæ. Vulgatum nomen mihi nondum scire licuit. Flo-  
ret mense Iunio & Iulio. Semen maturescit Autumno. Nasci-  
tur Orgone & Celone, oppidis nostræ prouinciæ, aridis, saxo-  
sis, & macilentis locis. Peloponnesense, in maritimis nostræ pro-  
uinciæ luxuriat, folio cicutæ latiore, crassiore, subaspero &  
contrectatu ingrato, nullis tamen spinis horrido, humi strato.  
Caulis illi inest rectus, cubitalis, aut procerior, fœnicula-  
ceus, prope terram candicans, à medio sursum uersus auri ful-  
gore nitens, læuis ac depilis, tereti forma. Summo cauli insi-  
det umbella, orbiculatæ planè rotunditatis, floris Aethyopici  
æmula, flos luteus. Radix subest longa, recta, crassitudine digi-  
tali, teres, succo prægnans, candida. Floret mensibus Maio &  
Iunio. Plura nondum uidi. Naschitur in montibus & collibus  
terrenis mari propinquis, & aliquantum remotioribus, cali-  
dis tamen & sitientibus locis, & in humidis nonnunquam. Tu-  
tò interim hanc plantam inuenies in agro ignobilis cuiusdam  
uici nostræ prouinciæ, qui uulgo Meunos appellatur: secusq;  
uiam est, quæ Tholone urbe maritima Sanctū Maximinū du-  
cit. Vulgi nomenclationem non didici. Ex iam dictis itaq; tibi  
constare potest, hanc quā depinxi plantam, uerum selseli Pelo-  
ponnesense esse. Quartum est Creticum, quibusdam tordylium,

Paulo gordylium: officinis, & medicis ferè omnibus igno-  
tum: Fuchsius cognitū & bellè depictū. Hoc Lygures & Hispa-  
ni ceistre: alpini Delphinates, Sabaudi, & qui agro Pedemōta-  
no sunt uicini, de la ceitro nominant. Herba fruticosa est, do-  
drantalit Dioscoridi (nos tamē pinguibus locis cubitalem fre-  
quētissimè in alpibus uidimus) radice crassa, longa, buxea aut  
ex buxeo candida, omnium maxime aromatica, gustu acri ac  
suauissimo: folio fœniculi, tenuiore tamen & ferè capillari.  
Caulis rectus est, palmo, aut cubito nonnunquam longior, in  
summo brachiatus: umbella coriandri: flos lactei candoris. Se-  
men primò ex rotunditate oblongum, & quadantenus angu-  
losum, quod, ubi exactè maturuit, in duo ueluti scutula scindi-  
tur, gustu feruidum est, odoratum ac iucundum. Floret æstate.  
Semen maturescit, in alpibus, circa finem Augusti. Herba tota  
tantæ profectò suauitatis, ut si æstiuis ardoribus euellatur, &  
cōfracta manibus attrectetur, uix aliud sis multo tempore pal-  
paturus, quod tibi Cretici seseleos inusitatā, & uix satis expli-  
cabilem, suauitatem non resipiat: id quod ipsi frequentissimè  
sumus experti. Naschitur, ut dictum est, in alpibus ubiq; nulli  
non è plebe notissimum.

#### Σήσαμον, Sefamum.

Sesami planta non ita multis nota est. Semen officinis sisamum di-  
citur. Italiæ anonymon.

#### Σιδερίτης, Sideritis.

Sideritidis tres species Dioscoridi statuuntur: ex quibus prima tā-  
tū cognita est, & officinis tetrahil aut herba Iudaica nuncu-  
patur: reliquæ species ignotæ: quanquā non desint qui uul-  
garem carpentariam, Gallis mieulx uault qu'or, dictam, ad si-  
deritin referendam putent, quorum sententia explodenda  
prorsus uenit.

#### Σίνωρ, Cucumeres.

Cucumeris satiui multæ species. officinis nomen seruant. uulgo  
concombres: Tuscis cedriuoli: Longobardis cocomeri.

#### Σίνωρ σύλvestρης, Cucumis syluestris.

Cucumis syluestris Latinis nomen seruat: officinis cucumer asi-  
ninus: Gallis concombres faulage: Italis cocomero saluatico:  
nostris cocourmasso. Succus eius Græcis, Latinis & officinis  
elaterij nomen inuenit.

#### Σίλαριον, Laspitium.

Quorundam opinione officinis & uulgo osteritium: quibus ne-  
quaquam probatur eorum sententia, qui herbam quæ ab her-  
barijs, nunc imperatoria, nunc angelica, nunc sancti spiritus  
radix nūcupatur, eandem cum laserpitio existimarunt: ut quæ  
foliorum effigie à sylphio diuersissima, uel sensum iudicio  
ac testimonio appareat. quando quidem hoc folia uulgaris ap-  
pij, ex pallido in luteum languescencia, caulem ferulaceum ha-  
bet: illi autē subnigra folia, per ambitum serrata infint: caulis  
concauus, flos ex purpura candidus (his tamē regionibus can-  
didissimus). Veruntamen, cum in floribus, semine, caule, radi-  
cibus, & quod omnium præcipuum est, facultatibus ipsis, tam  
inter se consentiant hæ plantæ, ut nullum, aut minimum saltē,  
statui discrimen possit: non erat, meo quidem iudicio, cur ob  
tantillam foliorum diuersitatem, plantæ inter se alioqui simi-  
limæ disungerentur, notamq; tanti discriminis subirent. Nam  
si radix utrique foris nigra intus candida, aut uerius buxei co-  
loris, semen latum, foliaceum, flos candidus, facultates omni-  
no eadem: quæ, obsecro, exigua illa foliorum uarietas, & di-  
similis utcumq; effigies, congeneres plantas, genere diuersis-  
simas efficere potuerit? quid? nonne utriq; folia sunt in ambi-  
tu serrata? nonne oblonga? sed illi quadantenus nigricantia, &  
septipartito diuisa: (nam medius pediculus folium in tria dis-  
sectum: laterales singuli singula in duo distributa folia susti-  
nent) huic ex luteo suppalida, & (nisi tergiuersari consilium  
est) in septenarium quoque numerum quodammodo dispen-  
sata. Suntu igitur duo Europei laserpitij summa fastigia: alte-  
rum, cui apud uulgos & Germanicas officinas osteritij nomen  
insit: alterum uerò quod Gallicis officinis & herbarijs impe-  
ratoria, angelica aut sancti spiritus herba: uulgo autem Del-  
phinatium alpinorum alegros nuncupetur. Vtraque species  
Parisijs in hortis uisitur: prior tamen in alpibus inuentu  
rarior: posterior nullibi gentium aut locorum copiosior.  
Sed hæc alio loco accuratius demonstrabuntur. Nā quia hic  
specierum diuisionem omisit: ille plantas genere easdem, di-  
uersas esse uoluit: nos generis (ut ita dixerim) idētitate serua-  
ta, speciebusq; exactè distinctis, eorū discordias cōponemus.

#### Σίνωρ, Sinon.

Ignoratur.

#### Σίον, Lauer.

Officinis berula. uulgo de la berle. Sic enim metathesi syllaba-  
rum pronunciat.

Impatoria  
Angelica



*Σισυμβριον, Sisybrium.*

Sisybrij duo genera. prius officinis balsamita: uulgo du crescon: Italis crescione. Alterum, quod & cardamines, à nasturtij odore, cognomentum accepit, officinis nasturtium aquaticum, Senis autem Italiæ urbe gorgolestro dicitur.

*Σκάνδιξ, Scandix.*

Quidam uolunt Romanis aciculam dictam fuisse. Quid tamen sit ignoratur. Dioscoridea enim breuitas eam nobis ignotam reddidit.

*Σκίλλα, Scilla.*

Officinis squilla marina, quanquam & pseudoscilla alibi passim inuenitur. uulgo nostratum cebo marino. Italis scilla.

*Σκώλυμος, Carduus.*

Scolymi meminit Theophrastus cap. 4. libr. 6. hist. plât. meminit & Dioscorides. Ex quorum scriptis uix aliud elicere possis, quam Theophrastu de hortensi (q Italis carcioffi: Longobardis archichiochi: nostris carchoffes: Gallis & Delphinatib<sup>9</sup> artichaultz, nominatur: ) Dioscoridem uero de erratico (qui Italis, à ui cogendi lactis, presura: Gallis autem chardonnette, dicitur) fuisse locutum: ut in cinaræ mentione dictum fuit.

*Σκώρδιον, Scordium.*

Officinæ seruata Græca nomenclatione, multis sæculis pudendo nimis errore ophioscorodon rudi plebeculæ obruserunt. Nunc iam tamen uerum scordium nosci cœpit: In hortis siquidem Parisinis frequens inuenitur. Adhæc propter Gratianopolim Allobrogum ab occidente, & in nostra prouincia passim, maxime Tholone iuxta mare, luxuriat.

*Συρόδορον, Allium.*

Duûm est generum, hortense, & syluestre. Syluestris duo genera. Nam aliud est folio latiore, oblongo, molli, uirentissimo, flore albo, capitello paucioribus glebis conformato: radice non admodum bulbosa, candida: syluis umbrosis gaudet, & Plinio atque herbarijs allium ursinum dicitur. Aliud in excelsis ac nudis montibus luxuriat, ab aquilone, hortensi simile, nisi minus. nomen seruat. Gallis ailb: nostris alhet.

*Συρίνα, Myrrha.*

Officinis myrrha: uulgo de la myrre.

*Συρίνιον, Smyrnium.*

*Συρίνιον* Græcè: Smyrniû Latinè. Duo eius ex Galeni lib. 8. simpl. sententia genera: Alterum, quod à quibusdam agreste hipposelinon uocari commemorat: non autem, ut quidam perperam interpretantur, hipposelinon syluestre à quibusdam uocari smyrnion. Id officinis lybisticum: Gallis leueche: alpinis Delphinatibus, nostra etiam memoria, api, nominatur. Est & aliud smyrnion Amano monti familiare, quod olim Ciliaces petroselinon cognominabant. Id in Italia copiosum inuenitur: uulgoque (ut autor est Manardus epist. 24. lib. 9.) alexandrum, quasi olusatrum (sic enim Romæ Galeni ætate uocabatur smyrnium, ut ipse testis est lib. 2. de aliment. facult.) & Florentinis macerones, appellatur. Ea quoque species iam hic Lugduni, & apud Delphinates, omnibus nota: uerum illic alexandre & alexandrine: hic macerons à quibuslibet uocatur. Ambæ plantæ in hortis habentur, & iam dictis nominibus uulgo cognitæ sunt.

*Σύγχος, Cicerbita.*

Officinis rostrum porcipum, & pastus leporis: nostris de cardellos: Gallis, à lactis, quam reddit, copia, lacteron: Delphinatibus lacheiron: Italis cicerbita, nominatur.

*Σπάρτον, Genista.*

Spartium quod à Dioscoride pingitur, genista est: sed ea, quam Galli genest, nostri genesto fero, Lugdunenses geneste de florence, Itali genestra, appellant. Est & iuncus quidam Hispanicus, qui, quia funibus, rudentibus ac ficarijs corbis conficiendis sit commodus, à quibusdam ad sparti genus alterum reuocatur: uulgo autem sport, & ficariæ corbes ex eo conflata sportins, quasi spartins, dici solent.

*Στάξις, Staete.*

Doctorum sententia officinarum styrax liquidus, ueterum staete est.

*Σταφιδίνος, Pastinaca, Daucus.*

Duo pastinacæ genera: hortensis, quæ officinis pastinaca: Gallis carrote: Delphinatibus pastenade & pastenaiye: nostris pastenargo: Syluestris quæ & daucus appellatur, de quo suo loco dictum iam est. quorundam tamen sententia pastinaca satia candida: erratica autem carne est purpurea.

*Σταχάς, Stœchas.*

Officinis stœchas Arabicus: plebi nostræ maritimæ morranilh. Citrinus officinarû stœchas elychryssum Dioscoridis & Galeni amaranthum à doctis penè omnibus censetur, ut in amarantho dictum est.

*Στράβιον, Struthium.*

Latinis radícula & herba lanaria dicitur. putatur esse officinarum saponaria. Alij uolunt esse ignotum.

*Στύραξ, Styrax.*

Officinis, mutata unâ litera, storax dicitur. Duo faciunt styracis genera: Liquidum, qui doctorum opinione myrrha stacte est: Siccum, cui calamitæ nomen indiderunt, & is uerus styrax existimandus est. Siquidem Arabes duûm styracis generum, Græci autem unius duntaxat meminerunt.

*Σταφυλή, Vua.*

Vuarum innumeræ species, quæ ab imponentium arbitrio uaria nomina acceperunt. officinis nomen retinent. uulgo raisin. Italis uua. Vnde nostri principis & innocentioris uuarum speciei emphasticon nomen semper retinuerunt, eam uni aut uinio, id est, uuam appellantes: Eam speciem Delphinates pachurelle nominant.

*Σύμα, Ficus.*

Ficum ex uarijs antiquorum scriptis infinita genera obseruauit & annotauit Ruellius, ad quem breuitatis studio te remitto. officinis Latinum nomen insedit. uulgo figues.

*Σύμφυτον πετράϊον, Symphitum petracum.*

Herbarijs bugla: Gallis du bugle, nuncupatur: quamquam in hæc usq; tempora non defuerint, qui herbam Fuchsio prunellam dictam, ad petræum symphytum referendam, nec id satis consulto, existimarint. Est & symphytum magnum, quod officinis consolida maior dicitur. huic flos est albus, & ex purpura dilutus. Symphytum medium est officinarum consolida media, uulgo des marguerites. Restat minimum, quod & bellis dicitur, consolida minor: uulgo Gallorum des pasquetes: Delphinatium & nostratum de marguerites.

*Συκόμωρα, Sycomora.*

Fructus sunt Aegyptiæ ficus, si Theophrasto credimus. his regionibus non habentur.

*Σχοίνος ἰβάκμος, Lentiscus.*

*Σχοίνος* Græcis: lentiscus Romanis & officinis: Gallis & Delphinatibus ignotus: nostris lentiscole: Italis lentisco. Plurimus in maritimis nostræ prouinciæ tractib<sup>9</sup> adolescit, frigida loca naturâ horret. E lentisco resudat mastiche, sed apud Chium, Rhodum, Cyprum, Cycladas insulas, Aegyptium, aliaque calidiora loca. Apud nos enim nulla colligitur, quod locus ob remissionem (sic cum prædictis conferatur) calorem resudationibus, quam illa, minus sit aptus.

*Σχοίνος ἄνθος, Iunci odorati flos.*

Officinis corruptè omnia pronunciantibus squinantum dicitur.

*Σχοίνος λεῖα, Iuncus leuis.*

De iunci speciebus suprâ dictum est.

*Τερεβίνθος, Terebinthus.*

*Τερεβίνθος*, ἢ *τερεμίνθος* Græcis: terebinthus Latinis: officinis & Gallis ignota. Tria sunt Theophrasto & Plinio terebinthi genera. Syriaca mascula ac procera, Idæa & Macedonica breues. Syriaca his regionibus ignota est. Idæa ac Macedonica, quæ breues sunt & fœminæ, multis sunt notæ. Alteri enim fructus inest lentis magnitudine & figura, & folium propè cappari simile, uerum longè maius. Alteri uero racemosus, piperis magnitudine, primò uiridis, dein rubens, postremò nigricans, resinofusus furfurosusue, folia angusta, oblonga, lauri æmula, in uersus, ut sorbus, digesta, cui apud nos petelin uulgatum inest nomen: prior autem à rhus Latina seminis appellatione Rhous nominatur. Frequens utraque apud nos luxuriat, & iam dictis appellationibus uulgo est notissima. Quæ autem planta Lutetiæ Parrhisiorum inconsulto pro terebintho ostenditur, non terebinthus, sed seseli Aethyopicum est.

*Τῦτλον, Beta.*

Vulgaris est notitiæ. officinis Latinum nomen insedit: Gallis de la poyrée: Delphinatibus de reparas: nostris bleto: Italis bieto la, nuncupatur.

*Τίφρα, Cinis omnis.*

Nomen retinet, uulgo cendre.

*Τίλιν, Fœnum Græcum.*

Officinis fœnugræcum. uulgo du senegræc corruptè pro fœnogræc.

*Τιθύμαλλοι, Tithymalli.*

Septem tithymalli genera. Characias, qui hodie passim ab herbariæ rei studiosis amygdaloides: quibusdam espurge: Gallis reueille matin, dicitur: eiusque in syluis largissimus est prouentus. Paralios peculiariter reueille matin. Cyparissias passim inuenitur, & officinis tithymallus coronatus: Italis herba mora, nominat. Reliquæ species nō ita cuius notæ. Tithymallo-

rum



lorū genera nota Delphinatibus thymonet: uulgo nostratiū de chousclo, à lactis dum franguntur eiulatu, uocantur: qua appellatione lathyrides plerunq; comprehendunt.

τραγάκανθος, Tragacanthus.

Officinæ uitiosis pronuntiationibus assuetæ dragaganthum, aut adhuc ineptius draganthum appellant.

τρίβολος, Tribulus.

Duo tribuli genera. Palustris, officinis ignotus: Galliæ rusticis chastaigne d'eau. Terrestris, qui esse putatur herbariorum calcitrappa: Gallorum chauchetrappe: nostratium caucotrep-po, aut auruolo.

τρίφυλλον, Trifolium.

Τρίφυλλον ἢ ἀσπάλτειον Græcis: trifolium Latinis & officinis. Duo- rum habetur generum. Pratense officinis trifolium: Gallis trefle: Delphinatibus & nostris triolet. Odoratum siue aspalti- te, paucis adhuc medicis notum, Fuchsis cognitum & elegan- ter depictum: officinis, ut quidam uolunt, trifolium odora- tum, quanquam illis ignotum suspicor: Italis, quantum conie- ctare licet, lauane & galega: herbarijs ruta capraria: nostris Pherbo de la cabriero, nominatur: ut hinc constet rutam ca- prariam herbariorum uerum trifolium odoratum esse. Nam eius folia, dum primum erumpunt, rutam olent: ubi uerò ado- leuerint & æstate grauem ac uiolentum bituminis odorem spi- rant: maximè, si digitis atterantur, aut uulsæ herbæ inter lapi- des cōfringantur. Accedit notas trifolij aspaltitis omnes tam apte nostratium caprariæ respondere, ut nulla ita in contra- rium adduci possit, quin perpetuò, ad stipulantibus eisdem omnibus, capraria nostræ prouinciæ uerum trifolium aspal- tite existimanda sit. Siquidem nostratium capraria supra cubi- ti altitudinem attollitur, uirgas habens tenues, iuncea & ni- gras, unde ramulares nascuntur appendiculæ: in quibus singu- lis terna exeunt folia lato trifoliæ aut meliloto similia. Ijs recenter enatis rutæ odor inest: adultis autem, bituminis, id- est, odor grauis, fortis ac sua acrimonia sensum feriēs. Florem edit purpureum, aut ex purpureo cæruleum, agglomeratum. Semen quadantenus latum, subhirsutum, ex altera extremita- te exertum. Radix tenuis, longa, ualida. Ex quibus notis est per- spicuum nostratium caprariam esse odoratum ueterum trifo- lium. Floret ineunte æstate. Semen maturescit augusto, & septembri decedit. Nascitur ubique in nostra prouincia, uul- go quæ l'herbo de la cabriero dicitur: & in alijs regionibus ca- lidis, in frigidis autem nusquam sponte naturæ nasci constat.

τρύχον, Solanum.

Solani multa genera. Hortense, officinis solatrum & morella: cu- ius duo genera faciunt: candidius alterum: alterum ad nigre- dinem magis tendens. Halycacabum, cuius duo genera habentur, nam aliud simpliciter nomen retinet: & officinis alkekē- gi: Gallis (communi cum alijs rebus multis appellatione) ba- guenaules & cocrette: Delphinatibus bonne bue: nostris de bons hommes nominatur. Alterum recentis notitiæ, quod di- scriminis gratiā peregrini nomen obtinuit, uulgo parisino pois de merueilles, ob elegantiam illius fructus dici cœpit. Habetur iam & his regionibus multis locis in hortis. Tertium somniferum, paucis adhuc notum: tractibus maritimis tum mediterraneis, tum occiduis frequens. Nam apud Niceā pro- uinciæ nostræ conterminam, maximum eius prouentum sa- xosis locis uidere est: tum in Gallia apud Turonenses & Ro- chellanos. Est & manicum, de quo inter doctos ambigitur. Quidam enim uolunt eam plantam esse, quam hodie Luteriæ solani nianici nomine ostendunt: quidam contrariam senten- tiam tuentur, utcumque tamen res habeat, negari non potest, quin ea ipsa herba solani (crediderim autem ego somniferi) species quæpiam sit. Quod autem solani lignosi nomine uul- go ostenditur, circæa Dioscoridis existimatur. Quidam tamē solani genus esse uolunt, ea planta Italis herba bella donna no- minatur.

ἵαννυθος, Hyacinthus.

Ἰάννυθος Græcis: Hyacinthus Latinis: officinis ignotus. Tria sunt hyacinthi summa fastigia. Purpureus, cæruleus, ex cādido pal- lidus. Purpurei Dioscorides meminit, reliquis duobus inta- ctis. Cæruleū agnoscunt rei herbariæ studiosi. Is Gallis oignōs des boys & ualsiel nominatur. Cæruleum hyacinthum esse, confirmatur ex Philostrati lib. 3. de uita Apollonij, his uerbis. Arbor Indica lauro similis, siliquam calycis instar formatam, mali punici magnitudine, profert. Siliquæ autem pomum in- est colore cæruleum, ac ueluti pulcherrimus hyacinthus: gu- statu uerò suauissimum omnium, quæ in illo monte nascun- tur. Hæc ille. Ex quibus colligitur esse & hyacinthum, cuius flores cærulei sint coloris. Est & tertium eius genus floribus pallidis, & in singulis foliorum floris summitatibus ex cādido pallidōue herbidis, ut macula lentis magnitudine unicuiq; in-

sculpta uideatur. Omnibus folium inest porri, minus tamen, radix bulbosa, candida, succo prægnans. Primum genus credi- derim parum notum esse. uolunt tamen nonnulli cepam ca- ninam, quæ Italis cepola dicitur, esse primam hyacinthi spe- ciem. Quorum sententiæ (et si reliqua omnia non malè conue- niant) reluctari uidetur, quod eius flores, nostris coculz dicti, nunquam pendere deorsum appareant, quod in hyacintho cum primis requirit Dioscorides. Secundum in syluis frequēs: in quibus, uerno tempore: & in admodū umbrōsis locis, æsta- te, cæruleos flores emittit. Postremum in hortis Lugdunēsi- bus uisitur, & uulgo (communi cum alijs multis floribus no- menclatione) des campanettes, nominatur. Primus hic florū, post ingentia hyemis frigora, erumpit, odoris non insuauis: qui tamen promptissimè marcescit, & minimum temporis du- rat: quanquam siccatus (expertus loquor) longo tempore in- sitam ac uerè suauem odoris gratiam seruat.

ὑδνα, Tubera.

Gallis des truffes: Italis tartuffi: Delphinatibus & nostris tartif- les. nullibi gentium, opinor, eorum maior uberiorue prouen- tus, quàm apud Delphinates.

ὑδροπίπερι, Hydropiper.

Officinis eupatorij nomen falsò multis sæculis obtinuit. doctis hodie cognitum, & nomen seruat.

ὑοσσύαμος, Hyoscyamus.

Tria hyoscyami genera. album, flauescens, & nigrum. officinis iusquiamus: Gallis hannebane. Primi generis usus frequens, reliquæ species improbantur.

ὑπερικόν, Hypericum.

Duo eius genera. terrestre, omnibus notum. officinis hyperi- cum, & Italis perforata, Gallis mille pertuis: Delphinatib<sup>9</sup> tru- cheran: nostris herbe de la saint Iean. Aquaticum caule qua- drágulo, crassiusculo, cetera terrestri simile, in alueorum mar- ginibus frequens: officinis & uulgo ignotum.

ὑσσώπον, Hyssopum.

Duo hyssopi genera, hortense & montanum. Hortense officinis hyssopum: uulgo hyssop: Italis hissopo. montanum in regioni- bus calidis frequens, & odore fragrantissimo præditum, no- strisq; uulgata appellatione meirarmo nominatur.

φακοί, Lentesc.

Duū sunt generum: maiores & minores. officinis lentesc. uul- go lentilhes: Italis lenticie. Apud nostros Græcæ lentis appel- lationis scomma in hodiernū usque diem est relictum. Appel- lant enim ineptum & nullius precij momentū hominem phacquin, id est hebetem, ineptum ac lentis pabulo dignum.

φακός, Lens palustris.

Officinis lenticula aquæ nominatur. inuentu ubique facilis.

φασκόλι, Phaseli.

Dioscoridi hortensis smilax appellantur. nostris phaioulx: Italis fagiuli.

φλώμος, Verbascum.

Multa habentur uerbasci genera. Album cui fœminæ: nigrum cui masculi nomen inest. Vtrumque officinis rapsus barbatus. Candidum autem Gallis du boughon blâc, nostris de torchos. Hæc duo uulgo nota sunt. Est & tertium uerbascum angustis folijs, oblongis, fragilibus, ex herbaceo nigricantibus, flore albo, aut pallido, calathi formam repræsentante, caule recto, folioso, cubitali aut ampliore, in syluis frequens, anonymum adhuc, & officinis ignotum. Quartum illud genus, quod mar- rhubio simile facit, uulgaris stachys esset, nisi ea subrubro flo- re prædita spectaretur. Triallis siue lychnitis, quæ sit, ignora- tur. Ad phlomidis referunt uulgarem herbam, quæ quibus- dam herba sancti Petri, alijs herba paralytis, omnibus simul pri- mula ueris (quanquam, primulæ ueris appellatione, scio bel- lides, id est, primo uere erumpentes margaritas, quæ sunt Gal- lorum pasquetes, intelligi à quibusdam & uocari) nomina- tur, tum eam quæ odorata est, tum quæ odore caret. Putant etiam nonnulli ad phlomidis referendam eam herbam, quæ Fuchsius ueronicæ fœminæ nomine depinxit: quam, inquam, nostrates corruolo blanco nominant, quæque nulli ex uulne- rarijs herbis est dignitate secunda,

φοίνιξ, Palma.

Arbor est transmarina, saltem quæ fructum parit: cuiusq; fructus ad nos importatur. Is officinis dactylus: uulgo dates solet no- minari. Quæ autem in Italia, Lyguria & nostra prouincia ado- lescit, sterilis est, palmaq; uulgo nuncupatur.

φῆ, Phu.

Doctorum omnium testimonio officinarum ualeriana est, quæ in maiorem & minorem distribui solet. In Gallia & Delphina- tu frequens. Apud nostros in hortis tantum inuenitur. Vnde eam minus calentibus delectari, & in eis sponte nasci constat. Vulgus iam ualeriane eam appellat.



*φύκος*, Alga, Fucus.  
Maritima prouincia aulgo nominat, eaq; stercorandis uineis pro  
fimo utitur. Italia alga.

*γαλβάνον*, Galbanum.  
Officinis galbanum. Vulgo garbane, nostris bon gaume.

*χαμαίδριον*, Trixago.  
Officinis Græcum nomen insedit. Gallis & nostris germandrée:  
Delphinatibus gelimandry: practicis non paucis germandrea.  
Italys calamandrina.

*χαμαίλεα*, Chamælea.  
*Χαμαίλεα* Græcis: Latinis chamælea: recentioribus, ut autor est  
Ruellius, oliuella: officinis mezereon Arabum more dicitur.  
Sed interim non est hoc loco silentio dissimulandum, quas-  
dam officinas ausu, me hercle, parum sobrio thymæleam pro  
chamælea usurpare. Nam chamælea (cuius ramum Viennæ Al-  
lobrogum, apud doctissimum Guidobaldum, medicum, illi ex  
Italia allatum, uidi) folijs est oleæ domesticæ, minoribus ta-  
men aliquanto, & aspectu incano aut subcineritio. Mezereon  
autem, quo utuntur officinæ, folijs constat angustis, oblon-  
gis, foliorum lini hortensis æmulis, numerosis, crassiusculis,  
summos ramos præsertim uestientibus, gustu uiscoso gummo-  
soq; ac non uulgariter acri: flagellis cubitalibus aut longiori-  
bus, multis ab una radice erumpentibus: flore exiguo, candi-  
do, copioso: fructu primum uiridi, cum autem maturuit, ru-  
bro, myrti ferè magnitudine. Quæ notæ omnes satis arguunt  
eam plantam, id est, officinarum mezereon, non chamæleam,  
sed thymæleam esse. Floret mense Maio. Semen maturescit  
mense Iulio & Augusto. Copiosissima nascitur, in nostra pro-  
uincia ubiq; maximè apud Aquas sextias in montosis, asperis,  
calidis ac sitientibus locis. Quo uerò apud eos nomine uulga-  
to nuncupetur, nondum mihi compertum esse, fateor. In qui-  
busdam Italiæ locis fructus tam chamæleæ quàm thymæleæ pe-  
pe montano nominatur.

*χαμαίλευον*, Chamæleuce.  
Latinis farranum aut farfugium: herbarijs populago. Herba  
est rotundis folijs molliter per ambitum serratis, uulgari allia-  
riæ effigie proximis: cauliculo recto, herbacei coloris, rotun-  
do, pedali altitudine aut ampliori: flore luteo aut candicante,  
radice fibrosa, inutiles: floret æstate. Humidis ac uliginosis lo-  
cis, maximè pratis, gaudet. Toti Galliæ familiaris. Vulgo, si  
non ignota, saltem anonyma. Quidam tusilaginem chamæleu-  
ce congenerem putant: in qua sententia fuisse autorem uerifi-  
mile est, ut qui de becchio nobili herba nusquam antea memi-  
nerit. Accedit becchium barbaris farfar appellari: officinis un-  
gulam caballinam. Gallis pas d'asne: Delphinatibus de la pate:  
nostris unglo cauallino. Chamæleuces interim penuriam sar-  
cit conyza parua aut capparitis cortex cap. 56. lib. 8.

*χαμαίλεον*, Chamæleo.  
Albus ubiq; frequens: doctis non ignotus: officinis & uulgo car-  
lina. Niger montibus fere delectatur, latoq; eius flos ambitu  
circumscriptur, qui ædium liminibus, ad arcendas fascinati-  
ones, clauo affigi, à plebeijs, solet.

*χαμαίπιτυς*, Chamæpitys.  
Tres eius sunt species, è quibus una desyderatur. Ex his quæ  
habentur, altera iua muschata: altera iua arthetica & chamæpi-  
tys officinis dicitur: nostris iuo: Italys iua.

*χελιδόνιον*, Chelidonium.  
Duo chelidonij genera: maius, & minus. Maius officinis chelido-  
nia: alchymistis donum cæli: Gallis de l'esclaire. Delphinati-  
bus soulongne, apud quos certissimo experimento constat,  
eius radices, si dentibus affricentur, aut manducantur, eos pu-  
trefacere, & ore, corruptos, euocare: tantum abest, ut eorum  
dolores, cum Dioscoride, finiant. Minus chelidonium offici-  
nis & herbarijs scrofularia. Parisijs uulgo l'herbe sainte gene-  
uiefue. Tuscis fanoscello. Nec est silentio prætereundum mi-  
noris chelidonij radices salutari experimento duriorum cor-  
porum hernias sanare, si earum succus ex albo uino extra-  
ctus, sesquicyathi mensurâ, supinis in lecto reclinatis hernio-  
sis, diebus circiter duodecim, ieiuno uentriculo, propinetur.

*χονδρίλλα*, Chondrilla.  
Seridis species est, de qua in intybo dictum est.

*ψύλλιον*, Psyllium.  
Officinis nomen retinet: nostrati uulgo de badassos. ubiq; in  
macilentis & arenosis prouenit.

*ώκυμον βασιλικόν*, Ocymum  
regale.  
Duo ocymij genera: maius, & minus, cui caryophyllati nomen  
officinæ indiderunt. Antiquis ocymum duntaxat dictum fuit:  
posteriores Græci basilicum, id est, regium addiderunt, unde  
euenit, ut basilici nomen apud uulgos obtinuerit. Nam Gallis

du basil: nostris basilico: aut basili: Italys basilico gentile, no-  
minatur.

Quia suis sedibus exciderant Leontopetali & Lepidij annotationes,  
eas hic attexendas duximus, ne forte prætermittas à scholiaste arbitra-  
rere.

*λεοντοπόδιον*, Leontopodium, siue  
Leontopetalon.  
Ambiguum est quid sit. Nam Ruellio placet esse patam leonis  
officinarum, quam Galli poumelée, Delphinates marstire, no-  
stri poumouleyo nominant. Eandem rursus cum Plinij consi-  
ligine confundit, non nominibus quidem, sed re ipsa, si dili-  
genter consideretur. Fuchsius, ne ambagibus implicaretur,  
eam plantam leonis patam officinarum uidelicet ad ellebo-  
rum nigrum adulterinum syluestrem relegauit. Verum siue  
consiligo Plinij, siue leontopetalon Dioscoridis, siue adul-  
terinus Fuchsi elleborus censeretur, iam in ellebori men-  
tione diximus. Hoc tamen nunc addere præter rem ac institu-  
tum non erit, uulgarem officinarum patam leonis (quam Gal-  
lis poumelée, Delphinatibus, marstire, nostris pomouleyo  
nominari diximus) tantillum attritam, horisq; aliquot aqua  
maceratam, præcipuo ad omnis generis inflationes, præsertim  
uenenosas, remedio esse, si ex ea aqua cyathi tres aut quatuor  
ipsis inflatis ieiuno stomacho diebus aliquot continuis pro-  
pinentur.

*Λεπίδιον*, Lepidium.  
Lepidium Galeno, cap. 2. lib. 10. compos. pharm. part. ea herba est,  
quam Damocrates in Clinico (ut Archigenes apud Aëtium  
cap. penult. lib. 3.) iberidem siue cardamanticen nominauit,  
ac nasturtio per omnia fecit similitudinem. Paulus item cap. 77.  
lib. 3. ex Galeni sententia: & lib. 7. iberidem syluestre nastur-  
tium Græcis siue cardamanticam appellari commemorat: ean-  
demq; genere cum Lepidio esse affirmat. Verum Græcorum  
lepidio folia lauri ascribit, multo tamen ampliora ac mollio-  
ra. Quinetiam Paulo assentitur Plinius, cap. 8. lib. 19. lepidiū,  
inquiens, in cubitalem exire altitudinem, folijs esse laurinis,  
sed mollioribus. Ex quibus liceat duo lepidij genera statuere: ma-  
ius scilicet & minus. Maiori radix satis longa, candida, intor-  
ta, crassitudine digitali, gustus acris ac feruida, nasturtium re-  
dolens. Caules in cubitalem, aut paulo ampliorem, exeunt  
longitudinem, iuncto crassiores, læues, per summa brachiaty,  
ex candido cæsi actantillum per autumnum rubescentes. Fo-  
lia longa, hortensis uulgarisque costi folijs similia, laurinis  
multo ampliora ac molliora, primum uiridia, dein supalli-  
da, aut quasi cineritia, nasturtium redolentia. Flos summis uir-  
gis insidet albus, racemosus oliuæ modo. Semen copiosum,  
minutulum, gustu feruens. Minus autem lepidium ternos,  
quaternos, plures aut pauciores cauliculos ab una radice fun-  
dit, teretes, rectos, cubitales, sæpe breuioribus, ramosos, folia  
nasturtij, gustus acris, nasturtij sapore, gustu, & odore. Florem  
lacteum, copiosum. Semen exiguum, teres, oblongum, folicu-  
lo lanceæ cuspidi simili geminatum contentum. Radix candi-  
da est, oblonga, minimi digiti crassitudine, feruentis gustus,  
odore nasturtij. Floret utrumq; æstate. Semen maturescit au-  
tumno. Minus in uiarum marginibus, sepibus, rudibus, iuxta  
parietes ac murorum ruinas, apricis & soli expositis locis lu-  
xuriat. Maius in uuidis humentibusque, & in siccis nonnun-  
quam ubique, potissimum in nostra prouincia. Hoc à gustus  
acrimonia nostris bon raphy, id est, bonus raphanus, dici-  
tur: Gallis anonymum. Minus officinis & uulgo adhuc igno-  
tum. Ruellio tamen & Hermolao raræ eruditionis uiris, Rha-  
phanus officinarum ueterum lepidium existimatur. Verum si  
raphani nomine eam plantam intellexerint, quæ prælongis,  
latis, in dorsum, ubi adoleuerint, quadatenus recuruis, herba-  
ceisq; constat folijs, radice crassa, acri, caule cubito longiore,  
flore quasi brassicæ, & in hortis inuenitur: certum est illos  
cum sibi, tum alijs imponere. Sin uerò eam notent, quæ no-  
stris bon Rraphy nominatur, repræhensione omnino carere  
debent. Nam quod maius lepidium nostræ prouinciæ uulgo  
bon raphy appelletur: ueri simile est, eam nomenclationem  
ab herbarijs in uulgos nostrum manasse: ut inde duo rapha-  
ni genera subindicari uideantur: Alterum laurinis folijs, gu-  
stu & sapore nasturtij, & id uerum lepidium maius esse: Al-  
terum helenij aut uerbasci folijs, gustu acri quidem, sed uulga-  
ris raphani, quod non lepidium, sed raphani species existi-  
mandum sit. Non desunt alij qui uulgarem piperellam lepi-  
dium maius esse putent, sententia minimè probanda, nisi aliud  
Italys (quod magis suspicor) aliud Gallis piperitidis piperel-  
leue nomine intelligatur. Nam quæ harum gentium officini-  
nis piperitis dici solet, Gallico & Delphinatico uulgo du coq,  
nostris costi uocatur: folijsq; spectatur laurinis, multo tamen  
amplioribus,



amplioribus, minimè crassis, in ambitu ferratis, gustu cum quadā amaritudine acri ac suavi: caule cubitali: flore luteo, specioso, athanasæ, aut scæminæ abrotoni floribus æmulo: radice numerosa, candida, acri. Quæ notæ si conferantur cum ijs, quas nostratum bon raphy inesse diximus: conspicuum, nī fallor, inter ambas plantas agnoscent discrimen: cum alterius flos candidus sit, racemosus, folia incana, læuia, pinguiuscula, gustus feruidi, & nasturtium, omnibus suis partibus, prorsum redolentis: quam ob id à Græcis cardamanticam & agriocardamon nominatam fuisse, constare, uel cuius mediocriter erudito, potest. Quare, ne longius excurrat oratio, in ea ipse sum sententia, ut nostratum bon raphy ueterum lepidium maius certò existimem. Nec obstat, quòd in pinguibus & humidis locis folia quæ radicibus propiora sunt, maiora aliquāto, quàm à Paulo Plinioque picta fuerint, nōnunquā uisā-

tur: Alioqui eadem ratione, ea rutæ planta, quæ in Herodio Iudææ nobilissima atque munitissima arce, ingentem ficum arborem sua cum proceritate, tum magnitudine æquabat, (ut est autor Iosephus libris de bello Iudaico) ruta non erit, quòd in magnitudinem & altitudinem prorsus inuicem adoleuerit: Nec ueratrum album, Dioscoridi pedalis altitudinis, ueratrum erit, quòd illud tricubitalem implere lōgitudinem, in alpibus, umbrosis & uuidis locis, oculis nostris sæpe (non tamen citra admirationem) uiderimus: Nec item sabina plāta una pedum duum supra uiginti, alia quatuordecim lōgitudinis (quas ipsi superiore anno apud Delphinates conspeximus) sabina erit, quòd Dioscoridi arbor sit coactæ breuitatis.

## FINIS LIBRI I.

# H V G O N I S S O L E R I I

## SANIONENSIS, MEDICI,

### IN II. AETII LIBRUM

#### SCHOLIA.

\*

Σφράγισ λεμνία, Sigillum lemnium. Cap. 4.



**H**ODIE ut plurimum desyderatur. Venditant tamen officinæ faciitiam terram, quam uocant sigillatā, pro lemnia terra: cuius uiribus & delineamentis parum respondet. Euenit tamen nonnunquā, ut propter cōmercia, adulterina lemnia Constantinopoli in Gallias importetur. Siquidem affirmant docti bolum armeniam orientalem cognominatam esse, uerā lemniā terram, nullo sigillo impresso. Quæ uerò sigillata uisitur auaritia negotiatorum adulterata est.

μύλος, Rubrica. Cap. 5.

Vera desyderatur, quanquam est & Gallis rubricæ genus quod sinople appellant, fabris lignarijs egregiè cognita, quam nostras uulgo aucano nominat.

Σαμία γῆ, Samia terra. Cap. 6.

Ignoratur. putat tamen Musa Brassauolus officinis talchum appellari.

γῆ σελινυσία καὶ χία, Terra Selinusia & Chia. Cap. 7.

Non habetur.

κιμωλία, Cimolia terra. Cap. 8.

Vera desyderatur. figulina tamen eius uiribus respondet: atque ob id, quando cimoliæ inopia premit, usurpari in usus medicos potest.

ἀμπελίτις, Ampelitis. Cap. 9.

His regionibus desyderatur. quanquā si etymon spectes, ubiq; inueniri poterit.

κρητική, Cretica. Cap. 10.

Putant eam esse, quam Galli de la croye nominant. uerū uulgaris croye lapis est cādidiissimus, friabilis, & ē fodinis erut⁹.

βόλος τῆς ἀρμενίας, Armenius bolus. Cap. 12.

Facilius tantum his in regionibus habetur. Is attamen præparatus contra pestilentie contagia usurpari felici successu à multis solet: propinata nimirum ipsius præparati drachma una, ex stillatitij liquoris oxallydis cyathis tribus, diebus sex aut septem in aurora. Eruitur hodie ē monticulis quibusdam prope cœnobium Montis maioris, nō procul ab Arelatis urbe nobilissima & antiquissima nostræ prouinciæ, & uulgo boli armeni dicitur. quæ autem terra boli armenie orientalis uenditur uerissima, Galeni terra lemnia est.

λίθος αἱματίτις, Hamatites lapis. Cap. 13.

Quibusdam sanguinarius dicitur: quod nomen ambiguum est: officinis hæmatites, sic ideo dictus, quòd in aqua dissolutus colorem sanguineum reddat. Est & alius hæmatites, qui coti attritus, colorem quendam sanguini non absimilem remittit.

σχιστός, γαλακτίτης, μελιτίτις. Scistus, Galactites, Melitites. Cap. 14.

Schistus est officinarum & lapidarium specularis. In gypsarijs inuenitur. reliqui duo ignorantur. uolunt tamen nonnulli eū ignotū esse: sed quòd hæmatitis uiribus respondeat, hæmatitem eius loco substitui.

λευκογραφίς ἢ μέροφος, Leucographis aut Moroxus. Cap. 16.

Dioscoridi morochthus & galaxias dicitur: quis autem sit ignoratur.

γαλακτίτης, Galactites. Cap. 17.

Aëtio duo galactitis genera, sed ambo nostris temporibus sunt ignota.

θύτης, Thyites. Cap. 18.

Lapis mortariorum alioqui dicitur, ignotus tamen est.

τεκολίθος, Tecolithus. Cap. 19.

Galeno Iudaicus dicitur, eoque nomine officinis cognitus est.

πυρίτης, Pyrites. Cap. 20.

Officinarum & solidariorum marchasitam utramq; ad ueterum pyriten referri uolunt: Mesuæ stellatus lapis dicitur. Est & silicis quoddā genus igni excutiendo efficacissimum, quod nostrates peyrart, corruptā tantillum pyritis nomenclatione, appellant: quod an ad pyriten reuocari possit, pluribus non contendo. Molaris tamen pyriti substituitur cap. 4. lib. 15.

φρυγίος, Phrygius. Cap. 21.

Ignoratur.

ἀγέρετος, Ageratus. Cap. 22.

Desyderatur.

ἀσίος, Asius. Cap. 23.

Asius lapis, & ipsius flos desyderantur. lapidis tamen loco substituitur pyrites, capit. 34. lib. 15. floris autem inopiam emendat sal ammoniacus ustus pari ad florem pondere, cap. 45. lib. 12.

γαγάτης, Gagates. Cap. 24.

Officinis ignotus. Gallis du geet: Delphinatibus, nostris & Aquitanis iayet, ex quo texuntur preculæ mulierum. Extant nobilissima gagate lapidis fodinæ in montibus Pyreneis, è quibus maximæ glebæ eruntur, & in uaria utensilium genera tū scalpro, tum torno ab indigenis conformantur. nomen prius tum genti est la conté de foy.

μαγνήτης, Magnetes. Cap. 25.

Vulgo de l'aymant: Marinarijs autem calamita.

σμίρις, Smiris, Pumex. Cap. 26.

Smiris uulgo esmeri: Italis femriglio. Pumex, pierre ponce.

λίθοι ἐν τοῖς σπύγγαις, Lapides in spongijs. Cap. 27.

Nomen retinent, & uulgo pharmacopolarum notissimi sunt.



*ὄστρακις, γέωδες,* Ostracites,  
Geodes. Cap. 28.

Ostracites lapis durus est, quo marmora poliuntur: geodes autem sic, quod terram in medio sui corporis contineat, dicitur. An habeatur, necne, compertum nondum mihi est. E' cote naxia lapis uulgo un acueur: mola est qua rasorij gladij acuuntur, nostrisq; molo dicitur.

*ὄφεις,* Ophites. Cap. 29.

Coloris propè terrei est, serpentinae cutis æmulus, punctis creberrimis ac minutissimis notatus. uulgu lapidiorum serpentine appellat.

*ἱερακίτης, καὶ ἰνδικός,* Hieracites &  
Indicus. Cap. 30.

Ignorantur, aut saltem alijs longè diuersis nominibus uenduntur.

*ὕαλλος,* Vitrum. Cap. 31.

Nomen retinet. Gallis uerre. nostris ueyre.

*ἀίτης,* Aëtites. Cap. 32.

Duo eius genera, colore, magnitudine ac forma inter se distincta. Nam quidam maiores sunt, subrotundi, coloris penè terrei aut ex terreo pallidi, tuberculis quibusdam inæquales, ouo Gallinaceo magnitudine pares, interdum maiores. Alij rubiginoso colore, oblongi, amigdalæ aut oui figura, quodammodo pressi, & subasperi. Officinis lapis aquilæ: lapidarijs & uulgo pierre d'aigle nominatur.

*ἀλαβάνδιος,* Alabandinus,

Cap. 33.

Quis sit ignoratur,

*ἰλυστρον ἢ λυγέριον,* Succinum seu Lin-  
curium, Cap. 34.

Electri nomen à solis colore sortita est hæc lacryma. Vulgus & rura ambram citrinam appellant, ambre: officinæ autem charabe, more Arabum. Diuersa tamen res est à recetiorum ambaro seu amparo: cuius tria habentur genera: fuluum & præpingue, supallidum, & nigrum, quod è piscium uentribus e-rui prædicant: cuiusque portio, quæ dorsi spinæ adhæsit, ambræ grysea nominatur. Tradunt recentiores Græci fontes quosdam esse, qui ambarum, ut sulphur, bitumen, & picem eructent, multisque in locis scaturire. De his tamè plura apud doctissimum Ruelliū legito cap. 27. libr. 1. & cap. 29. eiusdem.

*ἰάσπις,* Iaspis. Cap. 35.

Tria hic statuit Aëtius iaspidis genera: uiridem, subuiridem, & iaspachatem. Duo priora genera habentur, & nomen retinent: Iaspe: Italis diaspro. Iaspachatem facillè crediderim esse eum lapidem, quem nonnulli magna religione uelut thesaurum preciosum seruant, uocantq; agathe. Aiunt enim eum lapidem pestilentibus carbunculis admotum ægrotantes à perniciæ uendicare: uiridem autem Iaspidem collo appensum sanguinis è naribus profluua sedare.

*Σάφειρος,* Saphirus. Cap. 38.

Habetur, nomenq; retinet, sapphyr. Italiæ saphyro.

*Σμάραγδος,* Smaragdus. Cap. 39.

Nomen retinet: esmeraulde. maximæ nobilitatis est, & uulgatæ notitiæ. Sunt & alijs multi lapides non contemnendæ autoritatis, Aëtio & uetustioribus medicis aut incogniti, aut inditi, ut granatus, chalcedonius, turcicus, & alijs cōplures: quos, quia de illis autor nullam fecit mentionem, silentio præterimus.

*ἀδάργος,* Adarces, Cap. 41.

Spuma est, ut quidam uolunt, lacustrium harundinum, in alarum cauis concreta, spongijs non absimilis. Inuenitur æstiuis solibus, exiccatis, ob ardores, stagnorum, palustriumue locorum aquis. Facillè ubique haberi potest. officinis ignotus.

*ἀλκυόνιον,* Alcyonium. Cap. 42.

Quinque Dioscoridi Alcyonij genera. Si, ut quidam uolunt, alcyonium est maris spuma in corpus spongiosum concreta, atque in littus uel undarum & perpetui motus eiecta, duo priora genera in littore mediterranei maris passim inueniuntur, reliqua minus nota sunt, etsi quidam uolunt quatuor alcyonij species inueniri. Brassauolo placet maris spumam, quam Ferrarienses officinæ dant uenum, uerum alcyonium esse,

*ἅλς,* Sales. Cap. 43.

Sal fossitius, qui mineralis est, officinis sal gemmæ nuncupatur. Armeniacus officinarum factitius est: uerus antiquorum, ut & Cappadocius, ignoratur: ueri tamen Armeniaci loco usurpatur communis albiissimus, lotus, & exiccatus, cap. 97. libr. 13. Indus olim excidebatur è monte Oromeno Indiæ. Est tamen sal Indus Arabū saccharū candum naturale: cuius loco nos cando factitio utimur. Factitius duplex est, ex aquis nimirum, ut mari: puteis, ut in Hispania: fōtib⁹, ut in Burgūdia:

è nitroforū lignorum cineribus. Nā è quercu aut corylo adustis, donec carbo appareat segregatus, deinde p̄fusā aquā interdū salia, interdum dulci, sal fit. Siquidem cinis ille qui postea relinquitur, cōsumptis penè carbonibus, sal est. Verum sal omnis è stirpium materia factus nigrescit. Salis flos ignoratur. Salis spuma haberi maritimis locis potest.

*ἀρμενιάκον,* Armeniacum pictorum.

Cap. 47.

Desyderatur, nisi sit officinarum lapis lazuli, quem docti cæruleum Dioscoridis lapidem uolunt. Is ad melancholicas affectiones accommodatur, ut pictorum armeniacum: adstipulatur & color, qui, Dioscoride teste, cæruleus in armeniaco expetitur ac cōmendatur. Quidā uolunt, nos armeniaco lapide carere. Color tamen & facultates conuincunt aliquid esse, quod cæruleo (qui lapis lazuli transmarinus nominatus est) lapidi uiribus respōdeat. Quibusdam placet lapidem inueniri in fodinis metallicis, qui armeniaco ueterum respondeat. Is uerdasur nominatur.

*ἀρσενικόν,* Auripigmentum.

Cap. 48.

Arsenicum officinis nomen retinet. Vulgo de l'arsenic. Vocatur & auripigmentum: Gallis de l'orpin, du realgar, aut risagal. Sublimatum enim ab arsenico diuersum est. Est & apud officinas auripigmentum rubrum, quod putatur ueterum sandaracha. Aduertendum est recentiores chymistas arsenici nomine tria intelligere, auripigmentum rubrum scilicet, risagalum, & quod peculiari nomine arsenicum uocatur. Nam chymistarum nomina hæc sunt. Arsenicum croceum, quod est auripigmentum: arsenicum rubrum, quod est sandaracha: & arsenicum album, quod priuata appellatione sic uulgo dicitur. Discrimen hoc faciunt docti nonnulli inter auripigmentum & sandaracham ueterum: quod sandaracha, magis: auripigmentum, minus in terræ uisceribus coctum est, & idcirco minus rubicundum uideri.

*ἀσφάλτος,* Asphaltus, bitumen.

Cap. 49.

Officinis omnibus bitumen iudaicum nominatur. Duo iudaici bituminis genera: liquidū, quod Musa officinis petroleum dici putat, & sterco daemonis. Liquidum bituminis fontem admirandum esse aiunt in Aruernia: siccus idem uult officinarum & uulgi mummiæ censeri. Alij uolunt mummiæ esse ueterum pissasphaltum.

*ἀφρονίτρον,* Aphronitrum, & Nitri

spuma. Cap. 50.

Nitrum, aphronitrum, & nitri spuma obsoleuerunt, & in tantam uenerunt desuetudinem, ut, quid nunc sient, penitus ignoretur. Horum loco supponunt officinæ salem petrae purgatum, in panes coactum. Id, inquit Syluius præceptor meus, mentiri satius esset cineribus betæ, brassicæ, & aliorum nitroforum. Aliorum quorundam sententia baurach nitri loco à pharmacopolis substituitur: mentiri tamen posse sale, uini facce, aut aceti facce torrefactis. Aëtius cap. 56. libr. 2. uult salis fossilis (quem gemmam appellari diximus) inopiam pari nitri pondere emendari. Quod si illius loco hoc substituatur: pari ratione, ille huius pernuriæ supplere poterit. Sal quoq; nitri loco sufficitur cap. 66. libr. 8.

*γύψος,* Gypsum. Cap. 51.

Latinis & officinis idem nomen seruat. Gallis & Delphinatibus du plâtre: nostris de gyp. Musæ Brassauolo gypsum nondum coctum alumen scaiole officinarum est: cum uerò decoquitur, id alumen in gypsi naturam transit.

*διφρυγίς,* Diphryges. Cap. 52.

Nisi sit scoria lota fusi eris, ignoratur. Quidam se uidisse in fodinis Tridentinis aiunt, nullum tamen uulgi nomen afferunt.

*διαφανής,* Lapis specularis. Cap. 53.

Habetur hodie specularis lapis, in gypsarijs inuentus, quem tamen ad scisthum lapidem referri contendunt.

*θείον,* Sulphur. Cap. 54.

Duo sulphuris genera: uiuum, & ex uiuo fractitium uulgatissimum, ambo nota. officinis nomen retinent. Vulgo du soulfhre. Italiæ solfo.

*ῥίς ξυστός,* Aerugo rafa.

Cap. 55.

Viride æris à recentioribus appellatur: uulgo du uerdet: Italiæ uerde rame. Vermiculata autem duplex est: naturalis, & factitia, ambæ tamen ignotæ.

*καδμεία,* Cadmia. Cap. 57.

Barbaris catimia: officinis climia nuncupatur. Contendunt tamen multis argumentis docti quidam. ueram cadmiam esse officinarum tutiam,



*κίανος*, Cyanus. Cap.58.  
Dioscoridi cæruleus: officinis & barbaris lapis lazuli (unde sunt Mesuræ catapotia de lapide lazulo tam celebra ad melancholicas affectiones): uulgo da l'azur. Agricola tamen, libello, quem de metallis edidit, putat lazulum lapidem cæruleæ argillæ speciem esse. Nos, cum ex scriptis ueterum constet easdem penè uires inesse huic lazulo atq; antiquorum armeniaco pictorum, suspicamur lazulum armeniacum congenerem esse, liberum interim suum cuiq; iudicium relinquentes.

*Λαπίς*, Squama æris ac ferri.

Cap.59.

Obsoleuit utraq; , quamquam haberi, si opus fuerit, potest.

*Αιδάργυρος*, Argenti spuma.

Cap.60.

Arabibus merdasengi: officinis lithargyrus: uulgo du litharge. fuit & auri plumbiq; spuma quædam, quam antiqui improprie lithargyri nomine appellarunt: officinis siquidem hæc nomina feruantur, lithargyri auri, & lithargyri argenti.

*Νίτρον*, Nitrum. Cap.61.

Galeno & antiquioribus nitrum: nostris temporibus nomine tenus cognitum. Quid autè litri loco substituât officinæ, quidq; aptius suffici possit, dictum est in aphrolitro.

*μελαντηρία*, Melanteria. Cap.62.

Atramentum metallicum dicitur. Scribonio Largo medicorum Latinarum antiquissimo, & Galeno celebratissimo, sutoria creta est. Agricola argentum quoddam rude esse in fodinis ait. Hodie Parisijs ostenditur quidam lapis colore uehementer atro, denigrandisq; calceis aptissimo, quem uulgo de la pierre noy re: fabri autem ferrarij de l'armarie nominant: qui an ad ueterum melanteriam referri possit, aut debeat, non contendo. Nonnulli se uidisse melanteriam in fodinis Tridentinis affirmant. nec tamen quæ, qualisq; sit explicant.

*μέλαν γραφικόν*, Atramentum scriptorium. Cap.63.

Habetur. Sed an idem sit cum atramento ueterum, iudicari non potest. Dioscorides de eo satis abundè tractat cap. ult. lib. 5. Deq; fuligine Vitruuius cap.10. lib.7.

*μύσι, σόρι, χαλκίτις*, Mysi, fori, chalcitis.

Cap. 64.

Pro ueterum mysi uitriolum Romanum in usum uocatur: quod uulgo coupe rose appellat. Serapioni zeg uiride dicitur: Sori autem eidem zeg rubrum. ueterum fori, ut & chalcitis ignoratur.

*μολύβδανα*, Plumbago. Cap.65.

Duplex est: alia flaua: alia plumbea. Plumbea uidetur is pharmacopolarum lapis, quem pro minio ostendunt: qui quidè molybdæna non est: nam ea funditur ac colliquatur: hic autem nequaquam, nec ex eo conflare potest argentum aut plumbum, sed minium duntaxat. De molybdæna tamen uide Plinium cap.6. lib.33. cap.16. lib.34. & cap.18. lib.24.

*μέλυβδος*, Plumbum. Cap.66.

Habetur, nomenq; retinet uulgo du plomb.

*πομφόλυξ*, Pompholyx.

Cap.67.

Officinis thutia nominatur: Germanis (ut Manardus epistola 5. lib.12. est autor) uulgo nil. Alij negant thutiam pompholygem esse, sed ueram cadmiæ eam multis argumentis esse affirmant:

*Σανδαράχη*, Sandaracha.

Cap.69.

Galeno lib.9. simpl. *σανδαράχη*, id est, sandaraca. Alia est ueterum, alia recentiorum, siue Arabum sandaracha. Ad ueterum sandaracham referunt docti auripigmentum rubrum. Arabum autem sandaracha gummi siue resina iuniperi est, quæ alio nomine officinis uernix dici solet: uulgo autem eam du uernix aut de la glasse appellat.

*Σάνδιξ*, Sandix. Cap.70.

De sandice agetur in cerussa.

*Σκορία*, Scoria. Cap.71.

Recrementum metallorum est. officinis generis nomen seruat, Ferri recrementum uulgo mache fer, quasi magma ferri dicitur. Plumbago, si desit argenti recrementum, eius loco admittitur. cap.38. lib.15.

*Στίβις*, Stibium. Cap.72.

Syluio nostro, & reliquis doctis penè omnibus, officinarum antimonium est.

*Σπογγίς*, Spongia. Cap.73.

Nomen retinet uulgo esponge.

*Στοπήλινος*, Alumen. Cap.74.

Tria aluminis genera: rotundum, quod habetur, & aluminis nomine uenum datur: liquidum, quod alumen rochæ: scissile quod alumen plumæ officinis dicitur: quamquam non de-

sint, qui alumē plumæ ad amianthū lapidem referri uelint, qui amianthus lapis uulgo Gallorum meche sans sin nominatur, & propè solus pro alumine scissili magno errore uenditur.

*τίτανος*, Calx. Cap.75.

Officinis Latinum nomen infedit: Gallis de la chaux: nostris de caulx: Italis calcina. Viuæ autem calcis præparatio dilucidè explicatur Dioscoridi cap.80. lib.5.

*φύκος*, Fucus. Cap.76.

De fucis infra in cerussa agetur.

*χάλκανθος*, Atramentum sutorium.

Cap.77.

Colchotar Arabum est. Pro tribus chalcanti generibus ostendunt officinæ tria uitriolorum genera. Candicans, quod uulgo coupe rose blanche: uiride uersus cæruleum, quod uitriolum romanum: tertium solidius, & partibus quibusdam uiride aut æruginosum, quod citrium appellant. Ad quartum genus potest referri officinarum colchotar, quodq; zegis & dragantum nominant. Nonnulli tamè uolunt duo chalcanti genera haberi: naturale, coppa rosa dictum: & arte factum quod uitriolum nominetur.

*χαλκίτις*, Chalcitis. Cap.77.

Volunt cholcotar Serapioni dici. Vera tamen ueterum chalcitis desyderatur. uerum cupam rosam candidam (quæ uitrioli species est) eius loco usurpare solent.

*χαλκός πυκνωμένος*, Aes ustum.

Cap.79.

Officinæ, & reliqua barbarissimi familia, chalcumenon, pro eo quod est *χαλκός πυκνωμένος*, id est, æs ustum nominant.

*χαλκός αέρας*, Flos æris. Cap.80.

Vulgo Gallorum du uerd de gris: fiore del rame Italis.

*χρυσόκολλα*, Chrysocolla. Cap.81.

Putat Musa Brassauolus boracem officinarum ad chrysocollam referri. Omnium tamen fermè doctorum sententia ignota his temporibus est. Potest tamen haberi facticia, ut fusilime docet Plinius cap.5. lib.33. & Vitruuius. cap. ult. lib.7.

*ψιμύδιον*, Cerussa. Cap.82.

Officinis cerussa: Gallis du fard aut ceruse: Delphinatibus & nostris ceruso. usta pura cerussa in syricum, quod medicis sandyx nuncupatur, transit. Ut autè fiant cerussa, erugo, & sandaraca, lege Vitruuium cap.12. lib.7.

M E T A L L I C I S absolutis pauca de piscibus, & alijs hoc libro secundo complexis sunt addenda, quod, quæ nouo lectori negotium facessere poterant, quàm fieri poterit breuissimè ac facillimè explicentur. Nam, ut sanis medico non est opus: sic, nec doctis, & his qui longè plura & accuratius elaborata præstare possunt, hæc scribuntur: quamquam nostram hanc diligentiam, & propensam in omnes studiosos uoluntatem, doctis quoq; (modò æquos se iudices præbeant) acceptam fore, ut spero, sic non dubito.

De cephalo seu mugile. Cap.137.

Mugil nomen retinet. nostris muiau.

Lupus, Trigla. Cap.139.

Ignorantur, aut reuera alijs nominibus cognoscuntur.

De petrosi piscibus. Cap.140.

Scarus ignotus est: nisi sit Italarum zaphyrus. Merula Gallis ung merlang, aut merlan: atq; idcirco falluntur qui putant esse uulgarem merlus. Turdus incognitus est. Iulæ, quanquam sint merulæ similes, uulgato tamen nomine carent. Perca Gallis esperlinge. duorum sunt generum: marinæ, & fluuiatiles, marinis bonitate longè inferiores.

Gobius. Cap.141.

Gobij apud Gallos uocantur des gourgerons.

De piscibus mollis carnis. Cap.142.

Aselli sunt uulgares merlus, qui iidem cum merulis essent, nisi carnem haberent duriorē. Sub passerum autē genere tria piscium genera continentur. Rhombus, qui Gallis un turbot: nostris un rhomb nominatur. Solea uulgo cognita, une sole, sic à soleæ pedis similitudine appellata: quamque quidam eam ligulam, & Græci βέγλωσαν, id est, bouis linguam appellant. Qui uerò tertio loco complectuntur pisces, generis nomen sibi adoptarunt. passerēs enim dicuntur: qui, si magni sint, Gallis une pleye: sin parui, ung carrelet dicitur. Est & apud Gallos piscis quidam barbue nominatus, qui toto corpore, & carnis duritie ad rhombum proximè accedit. Inter mollis carnis pisces etiam hi Galeno adnumerantur: hamia, quam uulgarem truttam esse uolunt. uulgo truitte. Iecorarius, Gallis aiglesin: cytharus Gallis rouffete: umbræ, une ombre.

De piscibus duræ carnis. Cap.143.

Pelamides nomen retinet: nostris palamidos. Hi autem ex Galeno accedunt: galexia olim Romanis dicta, quam putant uulgarem lampetram esse. ea Gallis, & Delphinatibus lamproye, nostris



nostris lampreso uocatur. Delphinis Gallis marsuyn. Nostrates appellat daulphins, pisces e cetaceorum genere, magnos, oblongo rostro, dorso, ut cameli, multum protuberante: totoque corpore quasi in cemicirculi figuram conformato. Sardini pisces, des sardines: Iberici des enchoyes. reliqui sunt ignoti.

#### De crustatis. Cap. 145.

Gammari Gallis hommar & hammar. Locustæ nostris langousto de mar.

#### Molles. Cap. 146.

Polypus un pourpre. Sepia nomen retinet: Gallis seiche: Delphinatibus une seypo. nostris sepo, aut sipio. Loligines Gallis calamartz.

#### Echini marini. Cap. 148.

Gallis erissons: maritima nostra plebs orfins de mar nominat. Italia riccio marino.

#### De garo. Cap. 150.

Garum sanies est salitorum piscium, siue liquamen, quod ex piscibus aut carnibus sale maceratis defluit. Varias garorū compositiones habes cap. ultimo lib. 20. Dionysij Vticēsis de agricultura, qui, auctoris suppresso nomine, Constantino imperatori attributi ac dicati fuerunt.

#### Adeps, Pinguedo, Seuum.

##### Cap. 152.

Adipis, pinguedinis ac seui uariæ sunt differentiæ, pro animalium, e quibus extrahuntur, uarietate: quorum uicissitudines annotare necessarium instituto nostro duximus, quo nouum medicinarum tyronem rerum inopia non perturbaret, & a cœptis cu rationibus nonnunquam auocaret. Vrsini igitur aut uulpini adipis loco, si hi desint, suffici potest caprinus, taurinus, equinus, aut butyrum recens, cap. 125. lib. 13. Anserini inopia, gallinaceus aut phasianin<sup>9</sup>, cap. 118. lib. 5. Gallinace<sup>9</sup> quoque anserino, & gallinaceo porcinus succedit, cap. 4. lib. 15. Vrsino itē Vulpinus: amborum penuria taurinus, cap. 123. lib. 13. Adipum autem recentium gallinæ, anseris, phasiani, aut butyri, in infusis anodynis, inopiam emendat scœnogræcum, & althææ radices oleo incoctæ, cap. 5. lib. 11.

#### Medulla. Cap. 153.

Vitulina medulla ceruinæ inopiam sarcit æquo pondere, cap. 1. lib. 13. & cap. 83. lib. 16. Adhæc ceruinus adeps, ceruinæ medullæ penuriam reparat, cap. 42 lib. 12.

#### Succidæ lanæ. Cap. 159.

Lana succida deficiente, quæcunque alia usurpatur. cap. secund. libr. 15.

#### De terræ intestinis.

##### Cap. 168.

Intestina terræ, ut auctor est Aëtius cap. 6. lib. 4. sunt lumbrici piscatorum, qui in limo fluminū inueniuntur. Hæc cocta, cumque myrrha trita, ac ex passo sumpta icterum sanant, cap. 18. lib. 10. aquas hydropicorum ducunt, cap. 25. eiusdē. diabetem sanant, cap. 1. lib. 11. renum calculos comminuunt, cap. 5. lib. 11. uesicæ calculos atterunt, & urinam mouent, cap. 10. & 22. eiusdē. suppressas item urinas mouent ex hydromelite pota, cap. 23. eiusdē. podagricis opitulatur, cap. 35. lib. 12. mammarū profundas duritias sanant, cap. 37. lib. 16. earundem abscessibus, opitulatur, cap. 39. eiusdē. uberibus illita lac promouent, cap. 142. lib. 3. & lumbricos ducunt, cap. 156. lib. eiusdē. sumpta lac augent, cap. 6. lib. 4. Aurium inflammationes mulcent cum rosaceo cocta, & instillato deinde oleo, cap. 12. lib. eiusdē. earumque dolores leniunt eodem modo parata, cap. 120. lib. 5. Trita autem, & dolenti tempori adhibita, hemicanicos dolores mirè leniunt, cap. 49. & 50. lib. 6. Auriumque dolores instillata mitigant, cap. 80. lib. 6. & externas aurium affectiones imposita sanant, cap. 88. lib. eiusdē. in testa autē usta, trita, & præuulsis pilis superpersa, eos renasci prohibent, cap. 67. lib. 7. Oculorum fluxiones & albugines sanant, cap. 99. lib. eiusdē. Dolores dentium mitigant, cap. 27. & 33. lib. 8. eosdēque dolentes citra doloris sensum extrahunt, cap. 34. libri eiusdē. Ad alia item multa utilia sunt, ut ex auctoris contextu habere potes.

#### Draco marinus.

##### Cap. 169.

In littore Græco ἀρναίικα: Neapoli trachæna: Mafsilæ aragno de mar. Hunc uolunt nonnulli esse Gallorum uiue. Draconem marinum uidere est Viennæ Allobrogum, in ædibus doctissimi Guidobaldi, medici: cuius uidendi ac tractandi copiam mihi fecit anno superiore.

#### Vipera. Cap. 170.

Vipera accuratè auctori describitur, cap. 21. & 90. libr. 13. & Galeno in libr. de Theriaca ad Pisonem. Iam in Italia recognosci cœpit, & a serpentarijs marasso nominatur.

#### Erinaceus marinus. Cap. 171.

Supra in echino marino dictum est, eum à nostris uocari oursin de mar. Pisciculus est magnitudine oui gallinacei, fusco colore, circinnatæ rotunditatis, spiculis quamplurimis horridus, qua uerò parte humi hæret, tantillū pressus. (nā ea parte humi pronus decumbit, & alimentū capeffit) caruncula intus humida, incundi cum salugine quadam saporis, intercurrentibus intus subrubetibus, per certa interualla, membranis. Crudus coctusue estur, delectamque mirè excitat appetitiā. Frequēs inuenitur in littore mediterranei maris ubique: saxosis præsertim locis: præcipuè in saxis Bergansonis arcis loci natura munitissima, tribus circiter miliaribus à Stœchadibus insulis, quas uulgo les isles d'yeres nominant.

#### Erinaceus Terrestris.

##### Cap. 172.

Vulgo Erisson. animal omnibus notum, armentis bouum, pecorum gregibus, & non raro ipsis mulieribus infestum ac noxium. Tradunt enim rustici (id quod experientia superioribus annis confirmauit (uaccam, ouem aut simile fœminei sexus animal, si herbas aut fructus, super quos genitale semen erinaceus effuderit, fortè fortuna pauerit ac deuorarit, erinaceum concipere, gestare, tandemque parere, aut (si id ob spicula non possit) emori. Paucis enim ab hinc annis id compertum fuit in uacca, & oue (dissectis post mortem earum corporibus, & erinaceo in matrice inuento) in eo Delphinatus tractu, quem uulgo Royans appellant, non procul ab Isara flumine amplissimo, & antiquis scriptoribus celebratissimo. Fidem hisce rebus abrogandam censerem, nisi adhuc oculati ac fide dignissimi testes extarent, qui id ipsum in mulieribus hic accidisse, uel iureiurando affirmant. Nam uisæ sunt mulieres aliquot, quæ erinaceos multos, cum diu uterum gestassent, pepererint. Alia quæpiam nobilis genere in monte Cemenio (is enim est, qui Lugduno Belicadrum usque ab occidente Rhodanum comitatur) cum alius menses iam nouem intumisset, sperans egregiam se marito sobolem parituram, quatuor cuniculos infantis loco est enixa. Alia quæ scrophulā animal (sic enim uocant animalculum quod ætate in algidioribus fontibus inuenitur: oblongum est & gracile, semicirculare, multis pedibus præditum, colore quasi millepedum, quæ in hydrijs stabulantur) quæ cubitum longitudine, & brachium magnitudine æquaret, edidit. Alia postremo (dictu mirum & horrendum uisu) monstrum peperit triceps, cubitale, capitibus domestici felis, corpore lacertæ, colore uario, brachijs ac tibijs orbis, cauda breui. Nec item quæ sequuntur sua carent admiratione. Refert Plutarchus grauissimus auctor cap. 9. lib. 8. symposiacion, quendam in dytoria hordeaceum culmum, geniculis aliquot cinctum, cum urinis expulisse. Alium uerò quendam hospitem ephebum Athenis bestiolam hirsutam, multisque pedibus uelociter ambulantiem, unā cum multo semine excreuisse. Noui præterea ego, apud Aptam cognomento Iuliam, quendam e primatibus urbis Bertrandum Rizium, qui deuoratis intempesta nocte, ad aluum largiter sollicitandam catapotijs, uenereo: quodam furore percitus, mox cum uxore rem habuit: undè accidit, ut, ui purgantis medicamenti cum uirili semine in uterum coniecta, indeque per uniuersum mulieris corpus transfusa, illa plus minus decies aluum, intra horas pauciores septem, exonerarit: uir autem, qui catapotia deuorauerat, nihil omnino excreuerit. Id enim à medico primū: dein à uiro: postremo ab ipsa muliere, maximo risu simul & admiratione, anno abhinc quarto, didici. Quinetiam noui Aruernam quendam iureconsultum, ætatis mediæ, claris ortum parentibus, qui, ob quendam infimorū intestinum morbum, ab annis iam pluribus quatuor, nihil prorsus per sedem excreuerit. Verum præcluso inferiori meatu, immutatoque naturæ ordine, quoties fecalibus excrementis grauatur, ea putria omnino & olentia grauitur, per os quasi uomitu expellit. Audio præterea quendam alium (id enim accepi ab ijs qui frequenter uiderunt) mensibus singulis, fœminarum more, largam sanguinis copiam per genitale membrum excernere cōsueffe. Quæ iam dicta omnia ideo adnotare & scriptis mandare uolui, partim quia rara aut inaudita: partim ut mecum discat beneuolus lector, multa quotidie in rerum euenire natura, quæ humanæ sagacitatis captum excedunt, fidemque omnem superant.

#### Hippocampi marini.

##### Cap. 173.

Hippocampus Mafsilæ cheual de mar dicitur, quod capite & collo sit equino, rostro oblongo, fronte, ut equus, comosa, pilosa ceruice, cauda draconis: gallis une chenille.

#### Cantharides. Cap. 174.

Nomen ubique uulgo retinent cantharides.



**Cancris fluuiales. Cap. 175.**

Gallis escreuices: nostris chambres.

**Locustæ. Cap. 176.**

Locusta alia terrestris: marina alia. Terrestris multæ sunt species, magnitudine & paruitate distinctæ. uulgo langoustes aut sauterelles. Marina nostris langousto de mar.

**De castoris testibus. Cap. 177.**

**Κάστωρ** Græcis & medicis: Latinis fiber: Delphinatibus uibre. An cipitis uitæ animal, lutræ simile, crassum, longum, pilo ceruino, crassiore tamen & asperiore: capite breui, rotundiusculo, rostro simo, dentibus binis, tum superiorem, tum inferiorem maxillam armantibus, oblongis, robustis, & aliquantum incuruis, auribus contractis, rotundis, breuibus: tibijs anterioribus dodrantis longitudinem æquantibus, pedibus simiæ ursiæ æmulis: posterioribus autē breuioribus, & pedibus anserinis: cauda lōga, satis lata, densa, soleæ piscis æmula, squamosa, aspera, & ubi prouectioris ætatis fuerit animal, pilis quibusdā breuibus (presertim uersus eius summum) munita: testibus (quod falsū est à plerisq; putatum) nusquam foris prominentibus, quin potius ita retractis, ut egerime tractari (tantum abest, ut periculo urgente eius dētibus amputari) possint, corpore uni uerso graueolente. Mirum est, castorem nocturno tēpore, relictis fluminum ripis, in uicinos locos concedere: & arbores omnis generis, maxime salices (quia teneriores opinor) duobus supra terram pedibus, adeo circumrodere, ut breui temporis interuallo eas excindat, & in miserabilem ruinam adigat. Hominum tamen cōspectum & strepitum ualde pertimescit: atq; ob id, repente, si quid insidiarum sibi moliri suspicetur, in uicina flumina se recipiens, salutis fuga cōsulit. Inuenitur in Sabaudia: in Isaræ & Rhodani fluminū ripis, maxime in ea Rodani insula, quæ uulgo la Camargo dicitur: uicina enim est mari, & Arelatis urbi nostræ prouinciæ antiquissimæ & nobilissimæ. Multi de castore multa fabulantur: nos quæ urdimus, ea tibi bona fide liberoq; animo explicam. De fibro uide Aristotelē cap. 5. lib. 8. de historia animalium, Pliniū cap. 30. lib. 8. & cap. 3. lib. 32. & Solinum eiusq; enarratorem Camertem cap. 24.

**De buccinorum testis ustris. Cap. 181.**

Bij cornuti buccina uocantur in Gallia: in Hispanico mari thelamonas purpuras appellant. Apud officinas duo genera inueniuntur: dentale, quod quorundam opinione, os est buccinorum, ut entale purpurarum: Syluio tamen entale uox & res barbara est.

**De galerita uolucris. Cap. 182.**

**Καρίδαλος** Græcis: Latinis galerita, est ea auicula, quā Galli aloëte aut cochenix, nostri coculhado, quasi cuculatam, uocant. Meminit etiam Aëtius cap. 11. lib. 11. passeruli cuiusdam, cuius caro elidendis deturbandisq; renum calculis sit præcipuæ dignitatis: qui, inquam passerulus, quantum ex delineamenti colligere possum, nostris lardeyreto: Delphinatibus lardeo nominatur: quanquā multorum opinione ea est auicula, quam nostri gingno quouo: Galli branle queue appellant. Verū nō multum refert utranuis in usus medicos admittas.

Congeneres enim inter se uidentur, nisi huic tremula, illi firma cauda inesset. Ego tamen re uera priorem anteponendam ducerem: & posteriorem, prioris inopia, in usum uocarem.

**De cochleari terrestri. Cap. 183.**

Eius multa genera. Alia enim oui gallinacei magnitudinem implent, rotundæq; sunt, subcandidæ, syluis & aquaticis locis familiares. Alia depressæ: Alia candidæ, in uineis & uepribus degentes, omnium delicatissimæ. Alia rotundæ quidem, sed magnitudinis mediæ, ac uulgares. Gallis limaces & escargots: Delphinatibus & nostris limaces.

**De mænulis. Cap. 184.**

Mænulæ uulgo debogues. Mænularum item nomine completur, omnes pisciculi, qui Gallis de la menuyse, nostris menudalho dicuntur.

**Torpedo. Cap. 185.**

Piscis est Gallicæ plyæ similis, maior tamē, & laterib⁹ magis pinatis, pressus, latus & penē circinnatæ rotunditatis, suo attrectu totus egelidus, naturalem eam uim habēs, ut stuporem repentinum manibus & toti brachio afferat, quemadmodum experiētia me, in mari Lygustico, docuit. Massiliæ un tourpillon, quibusdā tremorfa, quod suo contactu tremorē inducat. Nautæ tamen qui mecum tum erant (erant autem Frontinianses, patria Aquitani) gallino de mar, nisi me fallit memoria, appellabant. Venetijs autem tremolo: Romæ batti potta & fotterigia nominatur.

**Asellus. Cap. 186.**

Vulgaris est merlus.

**De ostreorum & purpurarum testis.**

**Cap. 187. & 188.**

Ostreorum testæ sunt uulgares cocquilles. Testæ autem purpurarum uix inueniuntur.

**Squatina. Cap. 189.**

Ignoratur.

**Scincus. Cap. 191.**

Duo scinci genera: maior ignotus: minor officinis stincus.

**Cicadæ. Cap. 193.**

Vulgares sunt cigales. frigida loca horrent, calidis delectantur, æstiuis ardoribus prætereūtium aures suis clamoribus ac garulitate obtundentes. Hoc interim notatu indignum nō fuerit, cicadas in partu mori, discisso in fœtus exitu parentis uentre, ut de uipera memoriæ proditum est. Id enim obseruatione multa ac longa cognouimus.

**Hyæna. Cap. 194.**

Quod qualēque sit animal tradit Aristoteles cap. 5. lib. 8. de historia animalium. Hodie, his saltem regionibus, ignoratur. Illius stercus olim in usu fuit, quo deficiente, suillum usurpari debet, cap. 6. lib. 13.

**Hirundines. Cap. 195.**

Nomen retinent. Gallis & Delphinatibus hirundelles: nostris dindoletos.

*Scholorum in loca difficiliora libri secundi Aëtij finis.*



1. *Delphinium* & *Veronica*  
 2. *Delphinium* & *Veronica*  
 3. *Delphinium* & *Veronica*  
 4. *Delphinium* & *Veronica*  
 5. *Delphinium* & *Veronica*  
 6. *Delphinium* & *Veronica*  
 7. *Delphinium* & *Veronica*  
 8. *Delphinium* & *Veronica*  
 9. *Delphinium* & *Veronica*  
 10. *Delphinium* & *Veronica*

1844. The meeting. Cap. 1844.

1871

1881

On the right side of the page, there is a vertical line of text that reads: "The end of the world is near." This text is written in a small, handwritten font and is positioned along the right margin of the page.

11/11/11

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

~~CONFIDENTIAL~~

1944

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1950

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

*[Illegible text]*

...and the ...

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1944

1944

10. The Commission has also received information from the Government of the Republic of the Congo that the Government has been unable to identify the authors of the attacks on the press and the judiciary.

1. Содержание

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
BUREAU OF PLANT INDUSTRY  
WASHINGTON, D. C.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1944-1945

1. The first group of people who are interested in the study of the history of the United States are the people who are interested in the history of the United States.

...and the ...



# AETII MEDICI GRAECI CONTRACTAE MEDICINAE

CINAE TETRABIBLI PRIMAE SERMO

PRIMVS, PER IANVM CORNARIVM MEDICVM

PHYSICVM LATINE CONSCRIPTVS.

\*

De simplicibus pharmacis ex plantis, iuxta ordinem literarum  
Græcarum. Item de multorum oleorum præparatione.

\*

## DE SIMPLICIVM MEDICA- MENTORVM VIRIBVS.



**D**IFFERENTIAE particularum actionū in singulis pharmacis fiūt, ex eo quod singula ex ipsis ad tantam caliditatem, aut frigiditatem, aut siccitatē, aut humiditatem, aut partium tenuitatem, aut earūdem crassitudinem accedant. At uero ad quantā tandem accedant singula, enarrari non potest iuxta exactam sanē ueritatem. Sed nos tamē etiam hoc ipsum manifestis, & ad artis usum sufficientibus distinctionibus compræhendere tētauimus, unum quidem genus esse demonstrando, quod ad simile corporibus nostris temperamentum perueniat, ubi à caliditate quæ ipsis corporibus inest, transmutationis & alterationis principium quoddam assumpsit. Alterum uero calidius fieri quàm pro nostro temperamento. Atq; huius quatuor ordines facere mihi uisum est. Primū qui adhuc ad sensum obscurus est, ut ratione depræhendere oporteat. Alterū ab eo secundum, qui iam ad sensum manifestus est. Tertiū qui fortiter calfaciat, nondū tamen urat. Post hūc quartum & ultimum qui uisiorius sit. Sic & frigefacientium primum ordinem eorū quæ ratione indigent ad demonstrandum quod frigefaciant. Secundum eorum quæ sensibilibus frigefaciunt. Tertium fortiter frigefacientium, nondū tamen mortificantium. Quartum mortificantium. Iuxta eandē proportionem etiam humectantium & siccantium. Fiat autem clarioris doctrinæ gratia harum distantiarum à temperamento ordo, ita ut frigidiorū primus sit, in quo quis locauerit rosaceū oleum, aut ipsam rosam. Secundus ab eo sequens proximē, in quo rosæ succus. Deinde tertius & quartus, donec ad frigidissima perueniamus, cicutā & papaueris succum, & mandragoram, & hyoscyamum. Rursus in calidis anethum & fœnum græcum primo ordine ponamus. In secundo quæ secunda apparent: ita & tertia & quarta, donec ad uisoria deueniamus. Iuxta eūdem modū in humectantibus ac siccantibus medicamentis, initio rursus à temperatis sumpto, ordines consequenter usq; ad summa faciemus. huiusmodi enim cognitio non parum ad medendi methodū confert. Conuenit porrò præexercitatū esse in sensu gustus, & proprietatem unicuiusq; qualitatis saporum in memoria habere, uelut uerbi causa: Quum corpus

aliquod linguæ admotū uehementer siccet, & constringit, ipsamq; ad multā profunditatē exasperat, uelut pira syluestria immatura, & corna, ac similia: omne tale Acerbum nominatur, hoc est intense austerum. Quæcunq; uero in contactu linguæ, ipsam non constringunt, neq; cōtrahunt, uelut adstringētia solent, sed contrarium facere uidentur, extergere & eluere, talia omnia Salsa appellamus. Quæ autem his adhuc amplius extergent, simulq; moleste exasperant, Amara uocantur. Quæ uero mordēt & cum ualida caliditate erodunt, Acrīa. Quæ uero absq; caliditate mordent, Acida dicuntur. Habētq; præterea uim fermentandi terram si ad ipsam effundantur. Quæcunque autem uelut sublinunt & replent & sedant exasperatas & quasi erosas linguæ partes, ipsas cum manifesta iucunditate contingētia, Dulcia nominantur. si uero sine manifesta iucunditate id faciant, Pinguia appellantur. Si quidē igitur Acrimoniam manifeste percipere uelis, in allio & cepis ac similibus frequēter degustatis ac diu cōmanducatis discēs, ita ut affectus ex his sensum diligenter memoriæ commendes. Si uero adstringēdi uim palām percipere uoles, in Galla & Rhoē ac similibus assequere. si Amaritudinem, nitri ac fellis gustu. si Dulcedinem, sapæ ac mellis. Præterea siue qualitatis expers, siue qualitate ad gustū mediū cognoscere uelis, aquam accipe, eiusq; gustum diligēter in memoria retine, & maxime purissimæ aquæ, & nullam prædictarum qualitātū respicientis, neq; dulcedinem, neq; acrimoniam, neq; acorem, neque amaritudinem, insuperq; neque multum calidæ, neque nimium frigidæ. Inde enim progressus, promptus ad obscurorum saporum cognitionem peruenies, & eorum quos ego mediocriter dulces, alij a quosofos uocare malunt, qualis est harundinum uiridiū & graminis succus, itē tritici & ordeī, & aliorum multorum moderate dulcium. & qualis est aqua qualitatis penitus expers, inter caliditatem ac frigiditatem manifestam, mediam quantū eius fieri potest constitutionem habens, aut etiam paululum ad frigiditatem declinans. Quod si quid eiusmodi sapore præditum, non liquidam sed siccā compagem habeat, id ipsum necesse est terreum esse, & citra mordacitatem siccare. Nominantur autem talia Emplastica Græcis, hoc est meatus obducentia, uelut est amyllum, & plurima ex metallicis diligenter lota, pomphilyx, cerussa, Cadmia, terra Cimolia, Samius Aster, & similia. Quædā uero ex ipsis non solum terrea, sed etiam aquosa natura sunt, aliqua

a

etiam



etiam aërem non modicum intra se habent, uiscosa quidem hæc, & ob id meatus oblinētia. Duplex est enim medicamentorum meatus obducentium natura. Altera terrea exacte & sicca, altera uiscosa penitus, uerum mixta ex aqua & terra, & plerumque etiam aëre, uelut oleum dulce. At uero candidū oui simile quidem quodāmodo est, uerum magis terreum quā oleum. Caseosum etiā in lacte meatus obducit, & pinguedo suis. Tauri equidem & hirci pinguedo siue adeps, acris & magis terrea quā suis pinguedo est. Anseris autē & galli calidior quidem & siccior quā suum est, sed tenuiū partiū, & nequaquā terrea. Itaq; pinguedines si non acrimoniam aliquam habent, meatus obducunt, & magis sicciores, & amplius terreæ. Talis est & cera probe lota. Et talia quidem sunt medicamenta Emplastica appellata. Quæ uero adstringūt terrea sunt, & crassarum partiū cōpagis suę mole, frigida autē qualitate. At uero Arida tenuiū partiū corporibus sunt, frigida autē similiter ut adstringētia. Quæcūq; autē in sapore terreas partes repræsentant, quę colliquatæ & contrahunt & resiccant humectiores sensiles linguę partes, siquidē asperiora sunt, Acerba dicuntur: minus uero aspera, Austera: & recte taliū saporum tēperamentū Frigidū dicemus. Quādoquidē autem inæqualiter resiccant, hoc est enim exasperare, fuerint utique omnino etiam terrea. Omne enim aquosum æqualiter permeat corpora, & diuulsum rursus facile unitur. Terreum uero diuellitur quidem, non tamen facile rursus coit. Et sanē si sensus proprietatem in utraq; affectione in memoriā reuocaueris, isdem testimoniū præbebis. Etenim Acidorum saporū transitus, uelox est in sensilibus partibus: Acerborum autem, tardus. Et Acida per profundum corporū actionem suam magis ostendūt, Acerba uero in superficie. Cæterum ubi experiri uoles sinceræ acerbitalis actionē, si quidem eadē res gustanti tibi apparuerit acerba simulq; mordens, hanc speciem me monente relinques, & acerbum absq; mordacitate requires, & quod neq; acidum, neq; dulce, neq; amarum est, sed quātum eius maxime fieri potest, nullam omnino qualitatem & uim adstrictioni permixtam habēs. Superuacuum enim & uanum est, tale pharmacū experiri. Incertū namq; est an ob adstrictionem, siue aliam quādam ei permixtam qualitatem, siue per utraq; circa corpus cui admotum est, efficax fuerit. Chalcitis igitur & misy, atramentū sutorium, & squama æris, fori, & Armeniacum pictorium, argentū uiuum, & innumera alia adstringentia, simulq; mordētia, iuxta utraq; qualitates in singula corpora quibus adhibentur agunt. & tamen impossibile sit docere palam, num per adstrictionem, an per acrimoniam, urendi uim habeant. Nam si intra corpus sumatur talia crassarum partium existentia, & uiribus magis calida, & propterea temporis progressu in permutatione intra animalis corpus ignescentia, ad cādefacti igne lapidis aut ferri similitudinem exulcerant & urunt uētris partes, & neq; distribui in corpus possunt, ob grauitatem. Præstabilius igitur est plura alia consequenter degustare, ac diligenter cōsiderare sincerā adstrictionem seorsim per se, quantum eius fieri potest, atq; ubi talē repperis, iam tan-

dem ad iudicandum illud medicamentū iuxta prædictā methodum progredere. Velut si gustanti tibi balaustium, aut gallam, aut cytinum, aut hypocyfidem, aut acaciam, aut rhoēm, aut aliud quid eiusmodi, appareat exacte acerbum esse, ita ut palam sit nullam aliam qualitatem habere, in eiusmodi iam expendere ac explorare adstrictionis actionē oportet. Acerbum itaq; corpus terreum est & frigidum. Resoluetur autē necessario tripliciter, aut calefcens, aut humescens, aut utrumque simul perpetiens. Si igitur calefcet solū, non euadet neq; humidius, neq; mollius, sed durius existens dulcedinem acquireret: quemadmodū quercinæ glandes, & præsertim quę castanæ nominantur. Si uero humescat solum, & humiditas crassarum partiū ac aquosa existat, austerum euadet. Nam acerbū exolutum, austerū producit saporem. Omnis enim saporis uim aquosa humiditas hebetat. Si uero humiditas tenuiū partiū & aërea accedat, Acidū reddetur. Frigiditas enim tenuiū partium existens, acidam qualitatem efficit. At uero si humescat simulq; calefcet, cū aquosa quidem humiditate, in dulcedinem transibit, cum aërea uero in pinguitudinem. Etenim arborum fructus qui natura iā facti dulces nobis apparent, acerbam primum & siccam compagem habent, singuli iuxta arboris suę naturā, progressu uero temporis fiunt quidem humidiores. uerum aliqui aciditatem insuper ad acerbitalitatem assumunt, quam paulatim deponentes, rursus dulces euadunt maturitatē adepti. Quidam neq; in arboribus, sed decerpti post tēpus aliquod dulcedinem acquirunt. Alij quidam neq; media interueniente aciditate, sed statim ab acerbitalitate in dulcedinem transeunt, quemadmodum oleæ fructus. Ceterum calore maturi fiunt omnes, qui duplex natura existit: Alter proprius & singularis à natura insitus: Alter forinsecus à sole allatus. Atqui si ab initio quidē acerbiores sunt, maturi autem dulces fiunt, ex caliditate utiq; dulcedo, ex frigidityte aciditas & acerbitas ipsis adest. Et sanē manifestum iam factū est, quod fructus ab initio acerbī existentes, progressu temporis partim dulcescūt, partim acescunt, partim austeri fiunt. Aliqui uero semper acerbī permanent. Quidam etiā redduntur pingues. Quin & iuxta dictarū qualitātū mixturas, multiplicem habent uarietatem. Acerbī itaq; in finem usq; permanēt, illicis, arbuti & corni fructus, & cōsimiles. quoniam frigidi & sicci, uelut ab initio erant, permanent, nullam aliā alterationem præterquam solius augmenti acquirentia. Acerbus autē simulq; dulcis est, myrti & piri syluestris & glandis fructus. Austerus tantum, uitis amineæ uua, & uinum, & quę his similia. Austerus simulq; dulcis, palmæ fructus, & uinum Surrentinū, & quęcūq; dulcedinem adstrictione permixtam habent. Dulce autem solum est Theræum & Scybelites, & Sirēū, siue hepsēma quod nos sapam appellamus, & quęcūq; alia his similia. Pinguis uero exacte tum fructus, tum succus oleæ est: Imò etiam alij omnes ex quibus oleū paratur. Quemadmodum autem acerbis succus progressu tēporis dulcior primum, deinde etiam acrior & amarior euadit, & postremū penitus amarescit. Eodē modo etiā frigidus succus acidior statim fit, & si perfectē perfrigescat, citius adhuc



adhuc acceſcit: fructus quoque ſtatim inter colligendum multa humiditate repleti, item qui alias aquam adſumpſerunt, promptè ex leuiſſima occaſione acidi ſunt. Si enim uua immatura acida eſt, matura uero dulcis, & maturū fieri fructibus omnibus ex ſolari caliditate contingit. Maniſteſtum eſt imperſectiorem ac frigidiorē, acidū eſſe, perfectiorem uero & calidiorē, dulcem. Quum igitur uinum ex perfrigeratione acceſcat, cōſpicuum eſt quod ad eundem rursus redit ſaporē, ex quo prodit, uua immaturæ inquā. Diſtat tamen acetum ab uua immaturæ ſucco uiribus, in eo quod acetum acrimoniā quandā ex putredinoſa caliditate adeptum eſt. Vua autem immaturæ ſuccus non habet acquiſitiuā caliditatē, & propterea neque acetū acridinem: Vnde etiam magis tenuium partium eſt acetū quā uua immaturæ ſuccus, uelut ſenſus quoque teſtatur. At uero acrimonia acetū frigiditatem aciditatis euincere non poteſt, uerum ad penetrandi celeritatem ipſi inſeruit. Quanto enim citius meatus penetrat calidum quā frigidū, tanto promptius acris ſapor quā acidus ſenſilium corporum meatus pertransit, ut acris uelut præuius iter ſtruat, frigidus uero nō ita longe poſt ſequatur. Et propterea ſanè ſenſus mixtus ac ægre explicabilis non permittit pronuntiare, Acetū ſimpliciter frigidum eſſe. Percipimus enim in ipſo igneam quādam acrimoniā. Verum frigiditas ex ſequenti aciditate deſtruit & exſtinguit eueſtigio acrimoniā, quare etiam multo maior ſenſus frigiditatis quā caliditatis nobis cōtingit. Porro quidam æſtatis tempore poſcam bibentes palām refrigerātur, & ſine ſiti permanent. Quādoquidem uero ſitis dupliciter ſit, altera ex humiditatis inopia, altera caliditatis redundantia: eam quæ ex ſiccitate oboritur non ſanat acetum: eam uero quæ ex caliditate oborta eſt, ſanat. Humectare enim nō poteſt acetū per ſe, ſed non ingeneroſe perfrigerat. Igitur neque ſitim ex ſicca interperie, neque ex calida & ſicca obortam, acetum potatū unquam ſanare poteſt. Si uero concurrant aliquādo ſimul humiditas cum caliditate, eiſmodi ſanè ſitis optima medela acetum erit, aliter ſitiētibus, tum in febribus ardentibus alijsque omnibus adurentibus, tū in æſtate ac calore uehementi, cōpoſita affectio eſt ex caliditate ac ſiccitate, ut merito cōpoſitam medelam requirant ex aceto & aqua: Acetū quidem ut non inſtrenue refrigerās, & partium tenuitate facile penetrans, Aquā uero ut quæ ſupra id quod refrigerat, & humidifiſſima omniū exiſtat. Nihil enim humidius aqua. Cæterum in ardore præcordiorum potior aceto eſt uua immaturæ ſuccus forinſecus impoſitus, tum quod nullam habeat uiolentiā & offendentem frigiditatem, tum quod neque permixtam mordacem caliditatem. Qui enim ita affecti ſunt, lenimento inuiolento opus habent, quod forinſecus nullam mordacem acrimoniā inducat. Vua itaque immaturæ ſuccus, non ſolū acidus eſt, ſed etiam acerbus. Nam ut dictum eſt, omnes ferè arborū fructus circa primam generationem gultu acerbis ſunt. Non autem acidū ſolum frigidum eſt, ſed etiam acerbum ac auſterū. Et ſi quis aliquando gultauit mala cydonia, aut myrti baccas, aut meſpila, is ſanè maniſteſtè nouit aliū eſſe ſenſum ab acidis in lingua noſtra productum, alium ab acerbis aut auſteris. Acerba enim intus protrudere particulā uidentur, quā ex omni

parte æqualiter contingunt, uelut exprimentia conſtringentiaque ac contrahentia. Auſtera uero in profundum ſubire uidentur, & aſperum quendā ac inæqualem ſenſum inducere, ita ut reſiccando omnem ſenſilium partiū humiditatem expellant. Quare alia eſt affectionum proprietas, nō ſatis clare explicabilis, & in acerbis, & in auſteris ſaporibus. Sed nō puto tamen hominē eſſe qui nō ex iam relatis incitatus intelligat quid dicam. Omne igitur corpus acerbum & ab alijs qualitatibus purum, omni experimento factū frigidum inueni. Omne autem dulce calidum eſt, & non immodice ſuperexcellit caliditatē quæ in nobis exiſtit: Sed quemadmodū calidæ aquæ cōtactu delectamur, et maxime ubi fuimus frigefacti, donec corporis partes à frigore congelatæ diffundantur, excaſcit enim nos, & neque diſſoluens, neque ſcindens partium cōtinuitatē, iucūdiſſima eſt & utiliſſima. Sic etiā omne dulce edulium, calidum quidem omnino eſt, non tamen ad tantam caliditatem peruenit ut offendant, ſed intra terminos diſfundendi & æquādi demulcēdi ac molliēdi manet. Omnia enim alimenta his quæ aluntur natura conuenientia & tota ſubſtantia familiaria exiſtūt. Statim autem oportet & moderate calida eſſe hæc, iuxta corporum quæ aluntur proportionem. Et propterea eduliorum ac medicamentorū non una ſpecies omnibus hominibus cōuenit. Vnusquisque enim iuxta propriam ſubſtantiam ſimulque affectionem, ab utriſque tum utilitatem, tum uoluptatē percipit. Verū quum hæc ita habeant, Edulium ſanè minus dulce, minus calidū eſt: magis dulce, tūto calidius eſt, quāto dulcius. Si uero modū caliditatis excedat, neque dulce tale eſt, ſed iam amarum apparet, uelut mel inueteratū, & quod diutius coctum eorum eſt, & ſingula alia dulcia. Quæ enim temperamentis corporum quæ aluntur ſimilia ſunt, citra cocturam & præparationē, iam dulcia apparent. Quæ uero diſſimilia, omnia iniucunda ſunt prius quā præparentur. Opus eſt autem calida caſtigare frigiditatem, frigida uero caſtaciendi cōdimentorum mixtura, & igne. Eodē modo per humiditatem emendatur quæ terrea ſunt & ſicca, magis quā cōuenit. Siccitate uero quæ plus humida & aquoſa. Dulci igitur ſupra hoc quod calidum magis aut minus exiſtit, neceſſariō etiam humidum magis aut minus eſt. Quod uero uelut ſuperaffatum amarum euadit, ſimile calci & cineris, ſiccū & calidum neceſſariō redditur. Et ſanè ob id omnia amara extergere ſolēt, ſcindere diſſecareque uiſcoſos ac craſſos humores, quæ admodum cinis & nitrum. Quod autem amarus ſapor ſicci ac terrei temperamentis eſt, tum ex eo quod ægerrime omnium amara putreſcunt, tum quod nequaquā uermes & alia animalia gignant, qualia uidelicet in radicibus & herbis & fructibus putreſcētibus innāſci ſolēt, colligere datur. Nam in humidis corporibus maxime uermes & putredines gigni uidemus. Porro exacte Amara (uoco autem ſic quæ nulla alia ſenſibili qualitate participāt) omnia ferme animalia, non homines modò, in cibis auerſantur. propterea quod omne animal humidum magis aut minus exiſtat, Amara autē ſicca ſint ad cineris ac calcis ſimilitudinē. Quemadmodū igitur exacte quidē Dulce nutrit, exacte autem Amarum nō alit: ſic quod inter hæc mediū eſt nutrit quidē, ſed minus quā dulce. Propinquus autem amaro eſt ſapor ſaluſ.



7  
 sus, nam & terrei utriq; sunt & calidi, differunt tamē inter se non obscura differentia, quod amarus à caliditate & siccitate magis sit attenuatus & elaboratus ac quasi subactus. Sed & in salis generibus sic habet. Quæ enim dura sunt & densiora & magis terrea, qualia fere omnia fossilia existūt, minus calida ac tenuiū partiū sunt. Quæ uero friabilia ac laxa, magis tenuium partiū & uiribus calidiora sunt, & aliqua ex ipsis subamara, mediū quodammodo obtinentia inter salē & spumā nītri. Et sanē quicquid salsum diutius calfeceris, statim amarum euadet. Atq; sic etiam Asphalticidis stagni aqua, quam mare mortuū appellāt, in cauo & calido loco cōtenta, & à sole exarsata, amara redditur: & ob id etiā æstate magis quā hyme amara existit, & si haustā eam in uase cauo ad solem exponas tēpore æstiuo, confestim magis amara seipsa facta tibi apparebit. Quare in illa aqua neque animal innascitur, neq; plāra. Sed & quum flumina magna multumq; piscosa in ipsam influant, & præsertim id quod prope Hierichuntē est, quod Iordanē appellāt, nullus piscis oras fluminū superegreditur: & si quis captos stagno immittat, statim corrumpi ipsos uidebit: & propterea stagnum mortuum, siue mare mortuū appellāt. Adeo exacte Amarū omnibus plantis & animalibus inimicū est, squalidumq; ac siccum natura, uelut fuligo ex adustione factum. De Amarorum igitur saporum uiribus satis dixisse uidemur, dissectorios & extensorios ac attenuatorios ipsos esse declarantes, atq; adeo calidos in tantū, ut nondū urant. Ad Acres tam sermonem conuertamus, eosq; primū calidos exacte esse dicamus, deinde erosiuos & ustorios, crustāq; inducētes, & colligatorios, forinsecus cuti impositos, si uero intra corpus assumantur, qui tota substantia quibusdā animalibus aduersantur, eos omnes putrefactorios esse, & infectorios illorū animalium, uelut cantharis & buprestis hominis. Qui uero secundū solius caliditatis excelsum, si quidem crassiores sint & terrei, uelut auripigmentū & candaracha, ac similia, eos exulceratorios internarū partium pronūciamus, si uero tenuiū partiū sint, qualia familiaria nobis semina existunt, daucus uidelicet & anisum, ac similia, urinam ciētes & exudatorios, & simpliciter ac summam loquendo, sectorios ac discussorios. Conferunt etiā quidam relectionibus ex thorace, & mēstruorum fluxionibus. Cæterum acres sapes, non solū forti caliditate ab amaris differre uidētur, sed etiā in eo quod amari omnes non modo calidi sunt, sed etiā sicci ad cineris similitudinē. At uero in acris, quicq; nō sunt amari, multa aliquando permixta est humiditas, & propterea nō pauca acris nobis in ciborū usum ueniūt. Quando uero iam & de saporibus, quæ dici par erat relata sunt, reliquū utiq; fuerit & de uaporibus dicere. Pleriq; certe uapores similiter ut sapes nos afficiunt. Nam acida omnia ipsumq; etiā acētū, & olfactum & gustum eodē modo excitant. Acris autem, uelut alliū & cepa & consimilia, non minus olfactū quā gustū stimulant & recitāt. Eodem modo & in singulis alijs, similis ferme odoratus ac gustus sensus est, adeo ut quorundā corporum quæ nunquā gustauimus, ueluti stercoreis, persuasum habeamus nō scire qualitatē. & ob id neq; omnino talium rerū gustū attentamus, quod olfactui ualde multū fidei habeamus. Quin & odorata edulia quæ cōputrefacta mo-

lestum odorē nobis afferunt, statim abijcimus, ne tētato quidē gustu. Et ferme in omnibus mutuo cōspirant odoratus & gustus. Ad duas autē appellationes pleraq; odorabilia reducimus, odorata aut fœtida nominātes. Odorata quidē iuxta proportionē dulcium ad linguā, fœtida uero non dulcium. Videtur porrò de corporibus non odoratis aut omnino parū quid uaporis defluere, aut multo minus quā pro molis symmetria, uelut in salis & maxime acerbis. Crassarum enim partiū & frigida est substantia acerborū, quare uerisimile est etiā quod defluit ab ipsis, modicū esse & crassum, & mole uelut terreū, ut neq; cerebrū sua respiratione petere possit. Quare nihil certū ex odore coniectare licet de ipsorū tēperamento, uelut ex gustu. Nam inodora crassarū partium substantiam habent, sed inde nō manifestū est, quārum caliditatis aut frigiditatis possideant. Odorata autē tenuiū partiū aliquo modo sunt & calida, quantitas tamen tenuitatis aut caliditatis, nō etiā ex odore indicatur, sed ex gustu. Quod uero nihil certū de tēperamento indicent odorata, in causa est inæqualitas substantiæ ipsorū. Et propterea in Rosa ex odore coniecturam facere non possumus de omnibus in ipsa qualitatibus. In gustu uero omnes gustabiliū corporū partes æqualiter linguæ obueniūt, mouentq; singulæ sensum iuxta suam ipsarū naturā. nimirum Acerbū in ipsa, quod est terreum & crassarū partiū ac frigidū, item Amarū, quod tenuium partiū est ac frigidū. Et tertium insuper Aquosum, necessariò frigidū: ut nō sit certum, uelut dictum est, de simplicium pharmacorum uiribus omnibus ex odore cōiectare. Amplius uero nihilo magis ex coloribus conijcere possumus, de ipsē. In singulis enim coloribus inueniuntur et calida & frigida, & sicca & humida. Possibile tamen est in singulis generibus aut seminū, aut radicū, aut succorum, etiā ex colore indicationē quandā sumere tēperamenti. Velut uerbī causa, cæpa & scilla & uinum, quanto fuerint albiōra, tātō minus sunt calida. subflaua uero & fulua, calidiora. Quin & triticū & cicera, & phaseoli, ac cicer. iridis quoque radix & asphodeli, & multorū aliorum, simile quiddā perpetiuntur. In singulis enim generibus in uniuersum quæ fulua & ruffa & flaua sunt, calidiora albis existunt. Quare si quid etiā inde de medicamentorum uiribus coniectare licet, etiā hoc auctarium habes. Optimum quidē igitur, ut dictum, & sepe demonstratū est, singulorum uires ab exacto experimēto inuenire. neq; enim in hoc falli potes. Priusquā tamen experimento uim cognoscas, gustus multum indicat, cui attestatur paululum etiā ipse odor. Horum autem omnīū, quemadmodum etiam aliorum quorundā utilissimorum, in summa cōpendium contrahā, postquā sanē speciatim quantū possibile fuit, uniuersales uires & uniuscuiusq; actiones explicui. Quandoquidē uero medicamenta partim ex animalibus sunt, partim plantæ aut fructus, aut horum succi siue liquores existunt, partim uero ex metallicis sumuntur. Præstabilius mihi uisum est de plantis primū differere, non omnibus scilicet totius terrarū orbis, sed de quibus compertum per experientiam habemus: nam & plurimum ipsarum genus prouenit, facultateq; potentissimum habetur (atq; id iuxta ordinem literarum Græcarū) Deinde consequenter etiam de metallicis dicere, atque sic ad animalium partes peruenire.

Abroto



*Abrotonum.*

**Abrotonum** calida & sicca uel præditum est, in tertio ordine & discessu à moderatis locatum, gustu multum amaro, qui sapor indicatus est terreæ substantiæ esse, & à largo calore attenuatus esse, ut non instrenue calfaciat & siccet. Quare coma huius herbæ unâ cū floribus in oleo coquitur, quo illito ante accessionem his qui rigore per circuitum repetente apprehenduntur, minus rigeant. Eiusdem decoctum potum aut per clysterem infusum, lumbricos occidit amplius quàm absinthium. Modica autem participat acerbitate abrotonum, & ob id stomacho incommodum est. Species habet duas, marem & foeminam.

*Abrotonum ustum.*

**Abrotonum ustum** calidum & siccum uiribus est, magis quàm cucurbita sicca usta, & anethi radix: illa enim ulceribus humidis & sine inflammatione perfectis cōueniunt, & propterea maxime ulceribus præputij pudendi apta uidetur. Abrotoni autem usti cinis omnibus ulceribus mordax est, quare alopecij confert, oleo cicino, aut raphanino, aut sicyonio, aut lentiscino, aut ueteri dilutus.

*Agnos, Vitex.*

Huius arbuti folia, flores & semē tertio ordine calida & sicca sunt, & multū tenuium partium. Fructus in cibo assumitur, calfacitq; manifestè, simulq; capitis dolorem infert. Frictus minus caput tentat, sed modicū alimentū corpori sufficit, atq; id siccans ac calfaciens, minime uero flatuosum. Et propterea etiam impetus uenereos inhibet. Vnde non solū in cibo ac potu acceptus ad castimoniam cōferre creditus est, sed etiam substratus. Et ad hepar ac splenem indurata ac obturata, uicinis semen magis conuenit quàm ruta.

*Agrostis, Gramen.*

**Graminis radix** moderate frigida est & sicca, & ob id cruenta uulnera glutinat, ipsa herba imposita cataplasmatibus uice non fortiter frigefacit, uerum in medio humiditatis ac siccitatis consistit. Mordacitas & partium tenuitas in radice modica est, ut aliquando calculos conterere cognita sit decoctū eius bibentibus. Semen uulgo nascentis debile est: Parnasiacæ autem urinā ciet, et fluxiones uētris ac stomachi siccant: Estq; uis ipsius siccatoria, tenuium partium, & subacerba.

*Anchusæ quatuor.*

Non eiusdem facultatis omnes **Anchusæ** existunt. Quæ enim **Onoclea** appellatur adstringentē simulq; subamaram abunde radicem habet, ut etiā corpora densare, & moderate attenuare, extergereq; ac abluere biliosos falsosq; humores possit: atq; sic & ictericis & splenicis ac nephreticis utilis existit. Frigefacit etiā multum, unde cum polenta in cataplasmate imposita, erysipelatis medetur. Exterget autem non solū pota, sed etiam forinsecus imposita, & ob id uirilignes & lepras sanat cū aceto. Folia huius herbæ debiliora radice sunt, non tamen siccandi & adstringēdi uicarent. unde & uentris profluuiū sanant cum uino pota. At uero **Lycopos** appellata similiter erysipelatis cōducit & radicem habet magis adstringentē quàm onoclea. **Onochilos** autem quæ etiam **Alcibiadium** appellatur, uim habet magis medicatam, & morsus à uipera multū conducit in cataplasmatibus imposita appensa, & in cibo sumpta. Quarta parua est & ferè sine nomine, consimilis **Alcibiadio**, uerū plus amara & magis medicata, & propterea ad lumbricos latos

apta, acetabuli mēsurā cū hyssopo & nasturtio pota.

*Agaricum.*

**Agaricum** uim habet calfactoriam & discussoriam & dissectoriam crassorum humorum, & obturationes in uisceribus repurgat, & ob id arquat morbum sanat, in his qui ex hepatis obturatione eū morbum contraxerunt. Prodest & comitiali morbo laborantibus, & rigoribus per circuitum repentibus, qui ex crasis & uiscosis humoribus sunt oborti. Prodest & commorsis aut pūctis à bestiis quarum frigidum uenenum existit, forinsecus ad locū affectum impositum, itemq; potum hexagij pondere, hoc est drachmæ unius ex uino. Est & purgatorium.

*Ageraton.*

**Ageraton** facultatis est discussoriæ, & leniter quodammodo inflammationem arcens.

*Adianton.*

**Adianton** siccant, attenuat, discutit. Nam & alopecias densat, & strumas & abscessus discutit, & calculos frāgit in potu sumptum, & reiectionibus crassorum ac uiscosorum humorum ex pectore ac pulmone non parum confert, & fluxiones alui sistit. Mediū temperamenti inter caliditatem & frigiditatem existit.

*Aizoon, Semperuiuum.*

**Semperuiuum** utrunq; & paruum & magnum modicè siccant, moderate item adstringit. Verū non moderate frigefacit: est enim tertij ordinis frigefacientium, & propterea ad erysipelata ac herpetas, & inflammationes ex fluxionibus conducit.

*Aegilops.*

**Aegilops** discutiendi uim habet. Itaque inflammationes induratas & ægilopas ac alopecias mirabiliter sanat.

*Aera, Lolium.*

**Lolium** calfacit & siccant efficaciter, ut propè ad acrum uim accedat, & magis quàm iris: non est autem uelut illa tenuium partium, sed ab illa longè præuertitur, & propterea locauerit ipsam quis in principio tertij ordinis calfacientium, & in fine secundi siccantium.

*Aegiros, Populus nigra.*

**Populi nigre flores** calida uel præditi sunt, in tertio discessu à temperatis ordine. In differentia autē siccandi & humectandi paululum à temperatis ad siccitatem populus secessit, & magis tenuium quàm crassarum partium existit. Folia ferè floribus similē uim habent, sed ad omnia debiliora & inefficaciora. Resina etiam similem floribus uim possidet, & est adhuc aliquanto calidior. Semen magis tenuium partium & siccatorium est, quàm resina & flores: calidum autem non adeò ualide.

*Acacia.*

**Acacia** tertij ordinis siccantium est, & secundi frigefacientium, si quidem lota fuerit: illota enim primi est. Nam quum non sit similariū partium, partes quasdam dispersas habet tenues & calidas, quæ ab ipsa per loturam decedunt.

*Acalyphe, siue Cnide, Vrtica.*

**Vrticæ folia & semen** multum discussoriæ facultatis habent, citra uehementem calfactionem. Sanant itaq; panos & parotidas, & crassos ac uiscosos humores ex pectore ac pulmone educunt. Habent autem & flatuosum quiddam, ut etiā impetum ad Venerem excitent, & præsertim semen si cum passo bibatur. Alium subducit moderate, uelut extergendo ac tiillā



do, non purgando. Gangrænosa item & cancrofa, & omnino quæ ficcari opus est, absque mordacitate conuenienter sanat.

*Acanthus, Melamphyllon, Pæderos.*

*Acanthus*, quem alij *Melamphyllū*, alij *Pæderota* appellant, folia habet discussoria ui moderatè prædita. Radicem uero siccatoriam & tenuium partium.

*Acantha leuce, Spina alba, Leucacantha.*

*Spina alba*, quam aliqui *Leucacantham* uocant, radicem habet siccantè moderatè & adstringentè. Quare & coeliacis & stomachicis prodest, & sanguinis reiectionem cohibet, & tumores taxos in cataplasmate imposita coërcet: item dentium doloribus conducit, si quis decocto eius colluat. Semen tenuium partium & calidum est, unde in potu sumptum conuulsis medetur.

*Acantha Aegyptia, Spina Aegyptia.*

*Spina Aegyptia* ex qua acacia preparatur, adstringendi ac siccandi uim habet: quare & fluxui muliebri prodest, & ulcera sedis insufflata ad cicatricem perducit.

*Acorum.*

*Acori* radix tertij ordinis calfacientium ac siccantium est, & tenuium partium compagem habet. Ciet itaq; urinas, & splenes iuuat induratos. Succus eius deterget & depurgat crassitudinem corniformis oculorum tunicæ.

*Aconitum, Pardalianches.*

*Aconitum*, siue *pardalianches*, simile quidem est *serpenti* syluestri, uerum putrefactoriam & uenenatam uim habet. Quare uitandum ne in cibo aut potu accipiat. Attamen ad erodendum ac putrefaciendum externas corporis partes, aut circa sedem utile est, & ad hanc rem commodior est radix eius. Dicitur herbæ succus, pilorum exortum inhibere.

*Acte, Sambucus, Ebulus, Chamaecte.*

*Sambucus magna* & arborea, quæ *acte* appellatur. itemq; *humilis* & herbacea, quæ *Ebulus* & *Chamaecte*, ambæ siccantis facultatis sunt, glutinatoriæq; ac moderate discussoriæ. Decoctum radicis in potu hydropicis prodest.

*Halimon siue halmyris.*

*Halimi* fruticis germina quidā comedunt, & recondita asseruant. Vim habet lactis & seminis generatiuam. In sapore salum quid & adstringens habet, ex quo manifestum fit dissimilariū partium esse: plurima tamen eius substantiæ pars tēperatè calida existit, cum humiditate imperfecta ac incocta, leniterq; flatuosa. Radicis drachma una ex aqua mulsā pota, cōuulsā, rupta, ac tormina mitigat, & lac attrahit & auget.

*Aloë.*

*Aloë* tertij ordinis est medicamentorum siccantium, primi autem intensi, aut secundi exoluti calfacientiū. In gustu mediocriter adstringit, et fortiter amarescit. Subducit uentrē ex genere eorum medicamentorum existens, quæ stercorū eductiua appellantur. Est autē medicamentum stomacho commodū si quod aliud, & sinus glutinat. Sanat ulcera ægrè cicatricē recipiētia, maximè circa sedē & pudenda, propter uim siccandi citra mordacitatem: prodest etiam inflātionibus earundem partiū aqua diluta, & uulnera glutinat, iuxta eundem modum. Simili modo conuenit & ad inflammationes in ore. & naribus atque oculis, & omnino repellere ac discutere solet, simulq; exterget paululum, quantum sanè puris ulceribus citra

offensionem commodum existit. Oculis propterea iugī humore madentibus, maximè puerorum, præter opinionem medetur. Debet autem crassiore modo dilui, & oculorum angulis adhiberi.

*Alysson.*

*Alysson* aiunt esse *Sideritim heracleum* appellatā, quæ iuxta uias nascitur ubiq; purpureum florem habēs, & folia crassiora. Nomen inuenit ex eo, quod comoris à cane rabido mirabiliter succurrit. Vim habet moderatè siccantem & discussoriam. Habet etiam quiddam extersorium, quo uirilignes & maculas faciei à sole prouocatas depurgat.

*Alfine.*

*Alfine* siue *Auricula muris*, herbula similē habet uim helxinę frigefaciētē ac humectantem. Est enim substantia eius aquosa frigida, quare etiam citra adstrictionem frigefacit. Ideoq; ad seruētes inflammationes conducit, & ad mediocria erysipelata.

*Amaracum.*

*Amaracum* calfacit non ingenerose, siccatur autem non uehementer. Verum in caliditate est tertij ordinis, in siccando secundi.

*Ambrosia.*

*Ambrosia* pro cataplasmate imposita, uim habet adstringentem & repulsoriam.

*Ammium, Ammi.*

*Ammij* semen maximè in usum uenit, calfactoriæ & siccantis facultatis in tertio ordine. Est & tenuium partium, & sapore subamarum ac acre, atque adeo urinam ciet, & discussorium est.

*Amarantum.*

*Amarantum* uim habet attenuandi ac dissecandi. Quare menses ducit coma eius ex uino pota. Grumos etiam sanguinis liquare creditur, non in uentre modo, sed & in uesica, si cū uino mulso bibatur. Omnes autem in uniuersum fluxiones resiccat in potu accepta: uerum stomacho incommoda est.

*Amurca.*

*Amurca* secundi ordinis est calfacientium ac siccantium intensi. Atq; hinc sanè corporum tēperamento siccorum ulcera sanat, reliquorum omnium exacerbat.

*Ampeloprason, Porrum syluestre.*

*Ampeloprason* uim inter allium & porrum mediam obtinet. Stomacho magis incōmodat quā satiuū. uiscosos quoq; humores amplius eo dissecat, & organa obturata ab obstructione liberat. Quapropter etiam urinas & menses sæpe mouit, ubi uiscosorum & crassorum humorum culpa fuerunt suppressa.

*Ampelos leuce.*

*Ampelos leuce*, quæ & *bryonia*, itemq; *psilothrū* appellatur, & Latinis *Vitis alba*, germina habet quæ recens producta omnibus familiarem cibum exhibent uerno tempore, tāquam edulium stomacho cōmodum propter uim adstringendi. Habent autem subamaram & acrem leniter adstrictionem, quare etiam urinam cient. Radix uero extersoria & siccatoria tenuiumq; partiū facultate prædita est, & moderatè calida. unde etiam lienes induratos eliquat, tū in potu accepta, tum forinsecus cum ficibus imposita. Item scabiem & lepras sanat. *Vitis* porro nigra, per omnia ei consimilis est, sed debilior.

*Amygdala.*

*Amygdala amara* attenuatoriam uim palām præ se ferunt, ut etiam maculas solares depurgent, & ad reiectiones



etiones ex pectore ac pulmone uiscosorum & crassorum humorum plurimum conferant. Sed & obstructione liberant ac depurgant hepar, splenem, colum, ac renes. Laterum item dolorem sedant. Arbor quoque uniuersa similem uim habet, ut eius etiam radices coctas, maculis solaribus in cataplasmatibus modum imponentes, eas depurgent. At uero dulcia amygdala amariora debilia sunt.

*Ammoniacum.*

Ammoniacum mollioris intensae facultatis est, ut etiam articulorum callosas duritias dissoluat, & lienes induratos sanet, & strumas discutiat.

*Amomum.*

Amomum uiribus acoro simile est, praeterquam quod siccior est acorum, magis autem concoctorium est amomum.

*Anagallis.*

Anagallis utraque, & quae caeruleum, & quae puniceum florem habet, abstersoria uim abunde habet, & praeterea subcalidi ac attractoria quippiam, quo etiam aculeos e corpore euellit. Succus ipsarum caput per nares purgat, ob eandem causam, & in summa siccandi uim habent citra mordacitatem, unde & uulnera glutinant, & putrescentibus ulceribus auxiliantur.

*Andrachne, Portulaca.*

Portulaca in frigefaciendo tertij ordinis est, in humectando secundi. Modicam autem austeritatem complectitur, quapropter fluxiones repellit, maxime biliosas & calidas, earum qualitatem transmutans, alterans, & multum frigefaciens. Atque ea gratia etiam aestuosis febribus, ut si quid aliud commodat, super os uentris totaque praecordia imposita. Sed etsi probe teratur, adiecto quo crudo una cum uitello ac candido, amixtoque modico rosaceo, aceti que momento, euestigio non uulgarem lenitudinem inducit in ardentibus febribus, si corpus uniuersum inde illinatur, imò penitus extinguit, ut neque amplius ulla exacerbatio contingat. Dentium quoque stuporis medela est. Succus eius similem uim habet, quare non solum forinsecus impositus, sed etiam in potu sumptus perfrigerat. Quod ipsum contingit etiam, si quis totam herbam in cibo sumat. At uero propter uim subastringendi, etiam dysentericis commodum edulium est, & fluxui muliebri & sanguinis reiectioni: uerum ad haec omnia multo efficacior est ipsius herbae succus.

*Anemone.*

Anemonae omnes acris & extensoriae attractoriaeque ac uenarum oscula aperiendis facultatis sunt, unde radix quoque commansa pituitam prouocat, & succus ex naribus purgat, et cicatrices in oculis attenuat. Quin & sordida ulcera Anemonae purgant & lepras remouent, & appositae menses prolestant, & lac attrahunt & augent.

*Anethum.*

Anethum calfacit in tantum ut aut secundi ordinis intensi, aut tertij exoluti esse deprehendatur. Verum secundi ordinis principio est inter siccantia, aut primi fine. Si in oleo incoquatur, discussorium est, & dolores sedat, & somnum inuitat, & crudos ac incoctos tumores concoquit. Vsum tertium ordinem calfacientium ac siccantium obtinet, & propterea ulceribus humidis inspersum prodest, & maxime in pudendo. Nam in praeputio etiam inueterata ad cicatricem perducit. Porro uiride humidius est ac minus calidum,

utpote adhuc succulentum, quare magis concoctorium est ac somnificum quam siccum, minus autem discussorium.

*Anthemis, Chamamelum.*

Anthemis, quae & Chamamelum appellatur, calfacit ac siccant in primo ordine. Est autem tenuium partium, & propterea discussoria & rarefactiua ac laxatoria uim praedita: si quidem igitur fuerit uiridis, in oleo ipsam incoquere oportet, non praesente uidelicet oleo chamamelino, in quo maceratus flos insolatus est. Si uero sicca fuerit, modico aceto premadefacta, deinde in oleo cocta, comoda fit his in quibus nondum desinit materia ad caput afferri. Nam ea quae iam adest, discutit, & alteram non attrahit, quae commoditas nulli alteri medicamento contigit. Nechepson Aegyptius ipsum Chamameli florem purum in summo uigore colligere iubet, & in mortario tundere, ac probe conterere, ac pastillos mediocres fingere, eosque in umbra diligentissime siccare ac reponere. Vsum autem reponere unum ex ipsis terere, oleo primario quod satis est affuso, indeque uniuersum corpus a capite usque ad pedes illinere, in omnibus febricitantibus, ac egrum stragulis coopertum fouere: sudor enim inquit mouebitur bonus in his qui euasuri sunt, & a febre liberabuntur. Nam in plurimis experimento hoc cognitum est, & in peregrinationibus maxime congruum existit, ob circumscribendi facilitatem. Praecipit etiam in potu pastillos exhibere febricitantibus fabae quantitate ex aqua calida.

*Anisum.*

Anisi semine maxime in usu est, acre & subamarum existens, ut propè accedat ad caliditatem uisiorum. Est enim in tertio ordine calfacientium ac siccantium: ob id & urinam ciet, & discussorium est, & inflationes circa uentrem sedat.

*Aparine, Philanthrophos, Omphacocarpos.*

Aparine, quam alij philanthropon, alij omphacocarpum uocant, moderate extergit ac siccant. Habet etiam quid tenuium partium.

*Apios, Pirus.*

Piri folia & ramuli austeri sunt, fructus dulcedinem quandam aquosam habet, ex quibus manifestum fit temperamentum inaequale iuxta partes existens. Quae propter in cibo quidem stomacho commodant, & sitim sedant: uerum in cataplasmatibus imposita pira, siccant & mediocriter frigefaciunt, ut uulnus per ipsa conglutinatum esse sciam.

*Achrades, Pira syluestria.*

Quae uero syluestria pira nominantur magis adstringunt & siccant, & ob id uulnera maiora glutinant, & in cataplasmatibus imposita fluxiones reprimunt, quae admodum in malorum tractatu absolutissime trahuntur.

*Aristolochia.*

Aristolochiae radix ad medicinam commodissima est, amara & subacris existens. Rotunda ex his maxime omnium tenuium est partium, & ad omnia efficacior: iccirco ubi crassus humor fortiter attenuandus est, rotunde usus expetitur, atque inde adeo dolores ex obstruktionibus, aut crudorum crassitie obortos curat, & infixae extrahit, & putrefactionibus medetur, & sordida ulcera purgat, & dentes ac gingiuas illustrat. Auxiliatur etiam anhelantibus & singultientibus comitialibusque morbis ac podagricis, ex aqua pura, ruptisque ac conuulsis medicamentum, ut si quod aliud, commodum est. Ex reliquis duabus clematidis odorator est, ut etiam unguentaria ea in ungenta assumat: uerum ad



medendum minus ualet. Longa autem Aristolochia minus tenuiū partium est quā rotunda, non tamen inefficax, sed exterforiā ac calidā uim habet, & ob id ulcera incarnat, & ad uterī fōtus cōmodior habetur.

*Aracus.*

Aracorum semē simile est cicerculis & usu & uiribus, uerum durius quā cicerculæ, & propterea etiā ægrius concoqui potest.

*Arceuthos, Iuniperus.*

Iuniperus calida est & sicca tertij ordinis in utroq; genere. Fructus eius calidus quidem similiter est, sed in primo ordine siccatur.

*Arnoglossum, Plantago.*

Arnoglossum frigefacit ac siccatur in secundo ordine. Habet & austeri quippiā, quare fluxionibus & putrefactionibus ulceribusq; malignis conuenit, atq; ea gratia etiam ad dysenterias; nam sanguinis eruptionem compescit, & si quid perustum est frigefacit, & sinus glutinat. Est præterea etiam aliorum ulcerum recensium ac ueterum curatrix. Citra mordacitatē enim siccatur, & frigiditatem possidet nondum stupefacientem. Semen eius itemq; radix similem uim habent: uerum sicciorē & minus frigidam. Et semen quidem tenuissimarū partium est, radices uero crassiorum. Ipsa autē folia siccata, tenuiorum partiū uim, sed minus frigidam acquirunt. Propterea radicibus etiam ad dentium dolores utimur, tum commanducantes, tum decocto ipsarum colluentes. Ceterum ad hepatis ac renum obturamentā & radicibus, & folijs, & multo magis semine utimur.

*Aron.*

Ari radix primi ordinis calfacientium ac siccantium est. Habet & uim exterforiā, sed non adeo fortiter uelut draconion. Radices etiā in cibo acceptæ humorum crassitiem moderatē dissecāt, ut etiam ad reiectiones sputorum ex pectore commodēt. Verum draconion in hos usus præstabilius est. Aliās præparatur ac editur eo quo draconion modo feruefacta.

*Artemisia.*

Artemisiæ ambæ calfaciunt in secundo ordine, siccant autem uel in primo ordine intenso, uel secundi principio. Sunt autem moderatē quoq; tenuium partiū, quare ad renum lapides moderatē conueniunt, & ad uterī fōtus.

*Afarum.*

Afari radices in usu sunt, acori radicibus uiribus con-similes, uerū magis intensæ, quare ex his quæ de acoro diximus, etiā de afaro nouionem sumere oportet.

*Aspalathus.*

Aspalathus ex dissimilaribus uiribus constat, acribus & adstringentibus. Et acribus quidem partibus sui calfacit, austeris uero frigefacit, utrisq; siccatur, & propterea ad putrefactiones & fluxiones utilis existit. Ad putrescentes in ore gingiuas in uino cocta utiliter colluitur.

*Asparagus, siue Aspharagus iuxta Athenienses.*

Asparagus petreus siue Myacanthus, exterforiam uim habet, nec tamen ualidē calfacit, nec frigefacit. Idcirco renes & iecur obstructione liberat, maximē radices herbæ ac semen. Et sane etiam dentiū doloribus medetur siccando citra calfactionem.

*Aster Atticus, Bubonium.*

Aster Atticus, quem alij Bubonium appellant, quod non solum in cataplasmate impositus, sed etiam ad-

alligatus bubonas ac inguinum tumores sanare cre-datur. Habet etiam quid discussorium, ut mixtarum uirium sit, uelut rosa, sed bubonium non ita ad-stringit.

*Astaphis, Vua passa, Caricæ.*

Vua passa satiuā concoctoriā simulq; adstringentē & moderatē discussoriā uim habet: eadē enim est ratio uuarū passarum ad uuas, quæ est caricarū ad ficus. Et dulciores quidē calidiores sunt: Austeriores uero frigidores, & adhuc magis acerbæ. Stomachum itaq; roborant austeræ, & aluū adstringunt, atq; his amplius etiam acerbæ. Medium uero statum inter has dulces tenent, neque palam exolumente stomachum, neq; aluum subducentes. Vim tamen contemperandi humores semper habent dulces, itemq; moderatē extergendi, unde paruos circa os uentriculi morsus obtundunt. Nam maiores morsus generosioribus morsibus opus habent. Præstant uuæ passæ pinguis-simæ & tenui cortice præditæ. Cæterum uuæ passæ minus quā caricæ aluū subducunt ac extergunt: ue-rum stomacho commodiores quā caricæ existūt.

*Astaphis agria.*

Staphis agria ualde acrem uim habet, ut fortiter pituitam de capite trahat ac extergeat. Quare & ad scabiē confert: Et uistoria quadam ui participat.

*Asphodelus.*

Asphodeli radix in usu est, uelut ari, & afari, ac draconij. Vim habet exterforiam ac discussoriam. Vnde in uino albo uetere cocta, & uino calido meraco ciathi mensura hausto, menses suppressos celerrimē ciet. Vstæ cinis calidior & siccantior, magisq; tenuium partium ac discussorius euadit, & ob id etiam alopecias sanat.

*Atractylis, Cnicus syluestris.*

Atractylis, siue Cnicus syluestris, uel Androsæmon, ut alij uocant, ex spinosarum plantarū genere est, & siccantis ac moderatē calidæ facultatis existit.

*Atraphaxis, Atriplex.*

Atriplex secundi ordinis est humectantium, primi frigefaciētium, adstrictionis nihil habet, sed aquosa est uelut malua, & faciliē uentrem permeat. Hortensium genus humectius & frigidius syluestri est. Quapropter inflammationibus ac furunculis incipientibus & augescentibus hortenses, uigentibus & declinantibus syluestres commodiores sunt. Semen exterforiā uim habet, unde ad morbum regium ex iecoris obstructione obortum utile existit.

*Absinthium.*

Absinthium calidum est primo ordine, siccum tertio. Succus eius multo calidior quā herba est, participat & adstringendi ui non obscura, maximē Ponticum, quare extergit, roborat, siccatur: & propterea biliosos uentriculi humores ad infernam excretionem deducit, & per urinas euacuat. Magis autē biliosum intra uenas humorem per urinas expurgat. Idcirco ubi pituita in uentre continetur, nihil conducit. Sic etiam si eadem circa pectus aut pulmonem hæreat. Adstrictoria enim facultas in ipso fortior est quā amara. Quoniam uero acrimoniā quandam possidet, calidum amplius quā frigidum existit.

*Balanos myrepfica, Glans unguentaria, Myrobalanum.*

Glans unguentaria quæ myrepfica balanos, & myrobalanon appellatur, exterforiam & incisoriā uim habet



habet cum aliqua adstrictione, & propterea exterioriam ac adstringentē contrahentemq; ac coactoriam habet actionem, quapropter & ad uaros & lentigines, maculasq; solares, pruritus, lepram, scabiem, achoras & manantia capitis ulcera, ulcerosaeq; papularum eruptiones, & omnia crassi succi uitia conueniens est, maximè cum aceto. Cicatrices etiā illustrat. Facit quoq; ad hepar induratum in cataplasmate imposita, & lienē consumit, praesertim si farina aliqua siccatoria ipsi commisceatur, uelut est Ioliacea ac eruina. At uero cortex ualde efficax est, ut eius usus ubi uehementi adstrictione opus est requiratur. Si uero quis carnis eius drachmam unam bibat cum aqua mulsa, facile uomet. Sæpe & per inferna aluū largè subducit. Vnde si hepar aut splenem purgare uoluerimus per huius medicamenti usum, in posca ipsum exhibemus. Stomacho enim incommodat. Verum aceto gaudet tum forinsecus impositum, tum per os acceptum.

*Balanos siue Glans quercina.*

De quercina glande in quercus tractatu commode dicemus.

*Balsamum.*

Balsamum calfacit & siccatur secundo ordine, est & tenuium partium. Liquor eius adhuc magis tenuium partium uim habet, non tamen adeo calidus est, uelut quidā opinantur per partium subtilitatem decepti. Fructus eius consimilem iuxta genus facultatem obinet, sed partium tenuitate ab illis praeuertitur.

*Balaustium, Cytinus.*

Balaustium syluestris mali punicae flos est, uelut sativae Cytinus, gustum autem fortiter adstringit, & sanè siccantis ac frigefacientis facultatis est: quare si intertriginibus ac alijs ulceribus ipsum aridum tenuissimè tritum insperferis, citissimè uidebis ipsa cicatricem recipere citra mordacitatem. Idcirco non est medicus quispiam qui non hoc pharmaco & in his qui sanguinem reiectant, ac dysentericis, uentrisq; ac uteri fluxionibus utatur.

*Batos, Rubus.*

Rubi folia maximè tenera itēq; germina mediocriter adstringunt, ut commansa oris ulcera cum alia, tum quae aphthae appellantur, curent. Imò & uulnera glutinent. Fructus maturus moderatam quandā caliditatem habet. Immaturus frigidam terrē substantiam possidet, & propterea acerbus & ualde siccatorius est. Siccatus autem reponi solet, & humido magis siccatorius euadit. Flos eandem uim quam fructus immaturus habet. Itaq; ad dysenterias & uentris fluxiones ac debilitatem, & sanguinis sputum commodus est. Radix supra uim adstringendi, etiam tenuium partium substantiam habet, quare renum lapides atterit.

*Batrachion, Ranunculus.*

Batrachion quatuor speciales differentias habet, omnes autē fortiter acrem uim possidet, ut cū dolore exulcerent. Quare si quis moderatè utatur, scabies ac lepras excoriant, ungues item leprosos remouent, & stigmata siue notas incussas discutiunt & uerrucas ac myrmecias ex earū gente dictas, auferunt. Quin & alopecij profunt modico tempore impositae. Nam si diutius sinantur, non solum excoriant, sed etiam crustam cui inurunt, atque hæc quidem folia uiridia unā cū cauliculis imposita faciunt. Radix

autem siccata sternutatorium est medicamentum, quomodo omnia alia fortiter siccantia. Sed & dentium dolores mitigat, simulq; ipsos confringit.

*Bdellium.*

Bdellium Scythicum appellatur quod et nigrius & resinosis est, mollientē abunde & efficacē uim habet. Alterum Arabicum, quod etiā pellucidius est, magis siccatur quā mollior. Vtuntur aliqui his, & maximè Arabico, ad ramices gutturis ac hernias aquosas, bronchocelas & hydrocelas Græci appellant, ieiunij hominis saliuā ad emplastri compagem redigentes. Arabicum etiā calculos renū atterere uidetur, urinasq; ciere in potu acceptum. Sed & crudorum flatuum insultus, & laterum dolores, ac rupta sanat.

*Blitum.*

Blitum olus est cibarium, temperamento humidum ac frigidum in secundo ordine locatum.

*Bulbus.*

Bulbus comestus frigidioris & crassioris uiscosiorisq; humoris genitor est: nam & ægrè concoquitur, & inflat, ac uenerem stimulat. In cataplasmate impositus glutinat & siccatur. At uero qui uomitorius Bulbus dicitur, multo calidius temperamentū quā prædictus habet.

*Buglossum.*

Buglossum humidum & calidum temperamentum habet, unde uino iniectum lætitiā facere potantibus uidetur. Conducit & tussientibus propter gutturis asperitatem, in aqua mulsa decoctum.

*Bupthallon.*

Bupthallon appellatum uidetur à floribus, qui figura oculi bouis similitudinem referunt. Nam colore chamæmeli floribus quā similibus existunt. Multo autē maiores ipsis sunt, & acriores, & propterea magis discussoria sunt, usque adeo ut etiam duritias sanent ad ceratum permixti.

*Bunion, Arction, Pseudobunion.*

Bunion quod quidā Arction appellant, calfactorij generis in tantum est, ut urinā cieat, & menses ducat. Sed & Pseudobunion similiter ipsi calidum est.

*Brathy, Herba Sabina.*

Herba Sabina calefacit & siccatur tertio ordine: est autē tenuium partium, & propterea discussoria, & mensium ductrix si quid aliud, & per urinas sanguinē trahit, & uiuētes foetus perimit, ac immortuos eicit. Cōuenit putrefactis maximè malignis & inueteratis. Nā quæ diu durauere citra molestiā pharmaci uim tolerat. Quin & denigrata ac ualde sordida, cū melle expurgat, & carbunculos destruit. Quidā etiam duplum ipsius pro cinamomo coniungunt.

*Britannica.*

Britannicae folia adstringunt, & uulnera glutinant, suntq; similia folijs syluestris rumicis, præterquam quod nigriora & hirsutiora existunt. Succus foliorum similiter adstringit, quare quidā coctū ipsum reponunt, ut pharmacū ad putredines oris efficacissimū.

*Bromus, Avena.*

Bromus paulò frigidiorē temperamento præditus est, & adstrictionis nonnihil habet, ut etiā uentris profluuijs commoder.

*Bryon Thalassion, Muscus marinus.*

Muscus marinus adstringit et frigefacit, unde in cataplasmatibus uicem impositus, ea quæ calida sunt manifestè perfrigerat, ac iuuat.

Bryon



*Bryon, Muscus arborum, Splanchnon, Hypnon.*  
Muscus arborum qui Bryon & Splanchnon ac Hypnon Græcis appellatur, adstringit & frigefacit moderate, ut propè ad temperata accedat. Quare & discutiendi ac emolliendi facultatis particeps est, maxime qui in cedrinis lignis reperitur.

*Bryonia.*

Dictum est de Bryonia, quum de uite alba nobis sermo esset,

*Bubonium, siue Aster Atticus.*

De Bubonio dictum est in secunde appellatiōis elemēto.

*Gentiana.*

*Gentianæ* radix efficax est, ubi opus est attenuare & depurgare, extergereq; ac ab obstructionibus liberare,

*Gigarta, Vinacea.*

Vinacea sicca sunt in secundo ordine, frigida in primo. Acerba autem gustu sunt, proptereaq; fluxidis ventris affectionibus plurimum prosunt.

*Gingidium.*

*Gingidiū* ut gustu amaritudinis & adstrictionis particeps est, ita temperamento caliditatis & frigiditatis. Iuxta utranq; autē qualitatem siccatorium est, imò etiam stomacho ualde commodum, ob adstrictionis non modice participationem. Euadit autē multo magis stomacho commodū, feruifacit & ex aceto comestum. Caliditatem itaq; non ualde manifestam obtinet, uerum in secundo ordine siccatur.

*Glaucium.*

*Glaucium* adstringit cum quadam iucunditate, sed & frigefacit manifestè, adeo ut erysipelata nō adeo fortia sanet,

*Glechon, Pulegium.*

*Pulegium* calfacit & attenuat uehemēter, unde humoribus crassis ac uiscosis ex pectore ac pulmone reiectandis facilem uiam facit. Menses ciet cum uino albo coctum, ita ut uinum ipsum meracum bibatur. Forinfecus cataplasmati modo impositum, tum ischiadicos, tum alios perfrigeratos rubificat.

*Glaos, Sordes balnearum.*

Sordes balnearum moderate emollic.

*Glycyrrhizon, Radix dulcis.*

*Glycyrrhizi* fruticis radicū succus maxime in usum uenit, dulcis existens cū modica quadā adstrictiōe, quapropter asperitates lenit nō solum arteriæ, sed etiā scabiosæ uesicæ. Quandoquidē uero omne dulce moderate, etiam humido temperamento prædictum est, pro eius sanè ratione, suū quoq; eximit.

*Glycyfide, Pæonia, Pentorobos, Ephialtia.*

*Glycyfiden* etiā pæoniā, & pentorobon, & ephialtiā nominant. Radix eius tenuiū partium & siccatoria ac mediocriter calida est: habet enim uim adstringentem leniter, cū aliqua dulcedine. Quod si quis eam diutius mandet, etiā acrimoniā subamarā percipiet, iccirco sanè & menses mouet, magnitudine amygdali contusa cū aqua mulsa pota. Expurgat quoq; iecur obturatū, lienemq; ac renes. Per adstrictionem autē fluxiones uētris sistit, in uino quopiā austero-rum generis cocta, & uino poto. In summa resiccandi uim fortiter possidet, ut non improbauerim id quod à multis rationabiliter creditū est, eā uidelicet etiā adalligatā puerorū morbu comitiale sanare. Aliquando enim puerulo octimestri comitiali apprehenso, magnā radicis recentis partē de collo sus-

pēdimus, iussione facta ut perpetuò eā cōtineret appensam, & de cetero ex hoc facto puer pfectè sanus euasit, neq; amplius apprehensus aut conuulsus est.

*Gnaphalium.*

*Gnaphalium* adstringentis moderate facultaris est, & propterea dysentericis ipsum cum uino aliquo austero potandum exhibent.

*Gongylis, Rapum.*

*Rapi* semen ad rē uenerēā stimulos addit, flatuosi spiritus generatiū existens, sic & radix ægrè concoctilis, & flatuosa, ac seminis gignitiua est, succū autē in corpus distribuit crassiorem. Quare si quis in nimio eius esu perduret, & maxime si ipsam nō probe in uentriculo concoquat, humorē crudum appellatum congregabit, si uero crudior in coctura maneat, ægrè cōcoctilis & flatuosa & stomacho incōmoda existit, quandoq; etiam morsus circa uentrē excitat: melior autē fit si bis coquatur, multa enim coctura opus habet. Porro ad uentris deiectionem neque conducit, neque officit.

*Δ Damasonium, Alisma.*

*Damasonium* etiā *Alisma* appellatur. Eius radicem experti sumus coctā in aqua, & aqua pota, calculos in renibus consistentes ac coactos confringere.

*Daucus, Pastinaca, Staphylinus.*

*Daucus* quē & *staphylinum* ac *pastinacam* appellat, duorum generū est. Alter syluestris minus comestibilis quā satiuus, uerū in omnibus uehemētiōr. Satiuus autē in cibi usum aptus est, sed aliās imbecillior existit, facultatē habent acrem & calfacit, & propterea etiā attenuatoriam. Radix itaq; possidet etiam flatulentum quippiā, & ob id Veneris stimulatium. Semen satiuū quidē habet item aliquid in se uenerem stimulant, sed syluestris omnis flatus expers est, quare & urinam ciet, & menses mouet.

*Daphne, Laurus.*

*Lauri* arboris folia & fructus siccant & calfaciunt uehementer, & magis ipse fructus. Cortex radicis minus quidem acris & calidus est, magis uero amarus, & aliquid adstrictionis habens, iccirco & lapides atterit, & hepaticis conducit. Bibitur in uino odorato pondere obolorum trium.

*Dictamnium, Pseudodictamnium.*

*Dictamnium* magis tenuium partium est quā *pulegium*, in cæteris ipsi cōsimile. Quod uero *Pseudodictamnium* dicitur, debilius est.

*Dipsacos, Labrum Veneris.*

*Dipsaci* radix secundi ordinis est siccantium. Habet etiam quid exterforium.

*Dorycnion.*

*Dorycnium* temperamento simile est papaueri & mandragoræ, & alijs eodem modo frigefacientibus. parum itaq; ex eo sumptū soporem inducit, amplius occidit.

*Dolichi, Lobi, Smilax hortensis, Phaseoli.*

Qui nūc ab omnibus *Lobi* nominantur, apud omnes ueteres *dolichi* & *phaseoli* appellabatur, & ab alijs quibus *smilax hortensis*, nutriunt quidem non minus quā pisa, consimiliterq; flatus expertes sunt, uerum iucunditate & in alui deiectione illis cedunt. Appellantur autem *Lobi*, hoc est, siliquæ præ alijs præcipuè, quoniam ex omni siliquarū genere quæ indumento intectæ sunt, hæ solæ unā cum siliquis siue tegumentis suis ut plurimum comeduntur.

*Dracon*



*Dracontion.*

**Dracontion** acrius est quam Aron, & amarius, & magis caloricum ac tenuium partium. Habet autem quandam breuem adstringendi uim, cum acrimonia & amaritudine permixtam, ut uel inde efficacissimum pharmacum existat. Nam radix uiscera & omnes crassos ac uiscosos humores expurgat, & malignorum ulcerum optimum medicamentum est. Depurgatque ac extergit generose cum alia extersione indigentia, tum uutilignes cum aceto. folia autem ulceribus & uulneribus recētibz cōueniunt, quantoque minus fuerint sicca, tanto magis glutināt. Quae enim sicciore sunt, acriora quam uulneribus conueniat existunt. Creditur etiam caseum à putredine asseruare forinsecus ipsi circumpositum. Semē autem radice fortius, cācros & polypos cōsumere creditur. Succus seminis oculorum albugines deterit.

*Drys, Quercus.*

**Uniuersae** quercus partes adstringentis qualitatis particeps sunt. Amplius autem omnibus membrana quae sub cortice trunci reperitur, & quae sub cortice glandis super fructus carnem inducta est. Quare & ad fluxum muliebrē, sputaque sanguinis ac dysenterias & uentris fluxiones diuturnas, utilis esse creditur. Vtuntur autem ipsa decocta. Vehementius adhuc adstringit phagus & ilex. Caeterum folia ex omni quercus genere pro cataplasmate imposita, uulnera recētia glutināt, quēadmodum ego ruri expertus sum. Glandes quercinae comestae alimentum quidem abunde corpori suppeditāt. Sed tardi transitus est id ipsum, & crassum ac aegre concoctile. Ex omni glandium genere optimae sunt Castaneae, quae & Lopioma appellantur. Solae enim ex syluestrium fructuum genere, memorabile alimentum corpori sufficiunt. Sunt tamen etiam ipsae capiti graues, utpote dolorem eius inducentes, sed multo magis his supradictae.

*E. Ebiscus, Althaea.*

**Ebiscus** malua syluestris, est discussoria, laxatoria, inflammationem arcens, mitigatoria & concoctoria crudorum panorum ac tuberculorum. Radix eius itemque semen, reliqua similiter faciunt uelut herba. Verum facultatem magis tenuium partium, ampliusque siccatoriam & extensoriam ex se ostendunt, adeo ut etiam uutiligines deterant, & semen calculos renum confringat. Decoctum radice & ad dysenteriam & alui profluuium, & sanguinis reiectionem utile est, ut quae uim quandam adstringentem habet.

*Ebenus.*

**Ebenus** lignum est ex eorum numero quae in succum resoluuntur, uim habet calfactoriam, extensoriam, ac tenuium partium. Vnde & ea quae pupillis tenebras offundunt uitia, extergere creditur, & in alias oculares compositiones ammiscetur, quae uidelicet ad ulcera uetera, & fluxiones, ac pustulas conueniunt.

*Elea, Olea.*

**Olea** germina tantum frigiditatis, quantum adstrictionis habent: fructus exacte maturus moderate calidus est, immaturus adstringentior est, & frigidior. Oliuae drupae pinguem succum habent, & modicum alimentum corpori praebent. Colymbades uero muriae innatantes, adstringentem succum habent, & stomachum corroborant, appetentiamque cibi excitant, & ad hoc commodissime sunt quae cum aceto sunt

asseruatae. Ex his enim quae ex aequo salubria sunt, id quod iucundius est facilius concoquitur.

*Eleon, Oleum.*

**Oleum** ex oleae fructu expressum, quod etiam propriissime oleum appellatur, humectans & moderate calidum est. Tale est dulcissimum ex oliua maxime drupa factum, quale est sabinum. Est autem calidum moderate medi temperamenti, & magis discussorium quam quod ex crudis oliuis expressum est, quod omotribes & omphacinum appellatur. Nam hoc tanto frigidius est, quanto plus adstrictionis habet. Oleum autem uetus, si quidem ex dulci oliua factum uetustate contraxit, calidius est & magis discussorium. Si uero ex cruda, quousque sane aliquid adstrictionis seruauerit, mixtae facultatis existit. Vbi uero adstrictionem penitus abiecerit, alteri assimilatur. Lucernarium autem a medio ac temperato, dulci inquam, in tantum ad calidiorē qualitatem progreditur, quantum omphacinum ad frigidiorē. Vtuntur omphacino, capite calidiore facto. Dulci, sicciore facto & circūtenso. Lucernario, eodem frigefacto. Manifestum est autem quod omphacinum aliquando etiam frigidum adhibere oportet, reliqua semper calida. Atque hic quidē usus ad caput est. Caeterum si uniuersum corpus praeter naturam siccius reddatur, dulce oleum commodissime illinitur. Sed & si defatū sit ex adstrictione, aut frigiditate, aut mordacitate, aut acris pharmacis, aut humore, aut etiam pruritu, idem oleum omnium aptissimum est, maxime cum exercitationibus aut etiam post exercitia. At uero stomacho & iecori inflammatis maxime congruit omphacinum irrigatum, ob adstringendi facultatem. Reliquis partibus dulce magis prodest.

*Oleum Cicinum.*

**Oleum Cicinum** in Aegypto paratur, ex ricini arboris semine, quod croton appellatur, sicut arbor ipsa cici, tuso & expresso, & oleo ex aqua calida electo. Est autem tenuium partium ac discussorium, uelut oleum uetus. Exterit uutiligines, maculas solares, lentigines, asiduo illitu. Consimile raphanino est, quo etiam uiri licet, cicino aut uetere non praesente.

*Oleum seminis Lini.*

Sed & ex lini semine oleum preparatur, quomodo praedictum est. Et usus eius iam est pro cicino. Nam cicinon non amplius affertur, sed hoc pro ipso afferunt.

*Oleum Raphaninum.*

**Raphaninum** oleum in reliquis simile cicino est, uerum calidius.

*Oleum Populi nigrae.*

**Oleum** ex nigra populo in estate paratur, quum multa circa semen est resina. Sumunt itaque eius grana modiceque confringunt, & ad podere expensum inde trientem, olei dulcis sextarium immittunt, & ad dies quadraginta insolant, atque ita excolatum reponunt. Est hoc oleum calfactorium, tenuium partium, mollitorium, cum odore iucundo.

*Oleum Amygdalinum.*

**Amygdalinum** oleum ex amygdalis amaris fit, estque tenuium partium, & calidius dulci uno gradu. Conuenit maxime auribus a crassis flatibus obturatis, & ad auditus grauitatē, & sonitui ex frigiditate. Vermes quoque aurium enecat. Experiētia enim nos docuit ipsum auribus maxime prodesse, reliquarum partium



partium comparatione.

*Oleum nucum.*

Nucis oleum similiter ut amygdalinum preparatur, nucibus aut tuis & expressis, aut post contusionē in aquam feruentē coniectis. Commodū est in eosdē quoq; usus. Insuperq; hoc priuatim habet, quod inaurantibus aut inurentibus conducit: Siccat enim & ad multum tempus inurationes ac inustiones continet & adseruat.

*Oleum Myrobalaninum.*

Oleum ex myrobalanis uim habet depurgandi maculas faciei, lentigines, uaros, & omnem nigredinem. Sed & aluum purgat, prodest & aurium dolori, & ad sonitus, cum adipe anserino instillatum. Præparatur ut amygdalinum, glande unguetaria molita.

*Oleum Laurinum.*

Laurinum ex bacca lauri fit, quo modo iam dictum est. At uero mixtum hoc modo præparatur. Ad sextarios quinque oliuarum maturarum, baccarum lauri pinguium & recetium sextarium unum adiungimus, atq; ita omnia simul conteruntur ac exprimuntur, uelut oleum aliās ex oliuis solet. Calidū ualde est & mollitorium quod purum ex solis lauri baccis factum est, quare uehementē perfrigeratis quadam corporis parte conducit. Multum quoque siccat, & propterea scabrosis, & asperæ cuti, impetiginibusq; asperis, in balneo illitum medetur. fusiendum est autem in impetigine inflammata, aut scabiē inflammata, & in temperaturis calidis ac biliosis. Humidis autem & pituitosis conuenit, & omnibus articulis à frigore infestatis. Est & ischiadicis ex coxendicibus laborantibus commodum. Occidit uermes & pediculos tum feros, tum mansuetos, itemq; lendes ac furfures capitis, & ophiales ac alopecias. Vtus est in balneo ieiunis, ita ut postea cū ouo ac melle & foeni græci farina detergeatur. Cauendum ne capiti calido adhibeatur.

*Oleum Sesaminum.*

Sesaminum oleum ex sesamo fit cōtrito & in aquam iniecto. Viribus non longe abest ab oleo dulci. Caliditatē enim moderatam habet, & saporē omnino leuiter adstringentem: aptum est cibis, nam & saporis iucūdi est, & facile concoquitur, & aluum subducit. forinsecus illitū uim obstructoriam meatuū habet, propter crassitudinem. Cæterum ad præparationem oleorum quæ odoris gratia fiunt, aptius est quàm oleum commune, propter durabilitatem, & quod non facile putrescat.

*Oleum Lentiscinum.*

Et hoc ex lentisci fructu præparatur eo quo in alijs dictum est modo. Paratur etiam uelut in laurino diximus, fructu lentisci oliuis permixto. Vtile est purū & immixtum ori ex fluxionibus infestato, & gingiuis inflāmatīs, calidum in ore detētum, tum in balneo, tum citra balneum, repellit enim & roborat citra exasperationem. Mixtum autem magis mitigat, simulq; robur conseruat: Quare in iecoris ac stomachi foris ac rigationes commodē assumitur.

*Oleum Oenanthinum.*

Oenanthinum eadem efficacia est cum melino & rosaceo, præterquàm quod aluum non mollit. Compositur hoc modo. Oenanthem, hoc est uitis syluestris fructum florentem, accipe odorem & marcescere

sine, ac in nouū uas unā cum omphacino oleo mitte, & ad dies xl. quotidie agita, ac excolato utere. Sit oenanthēs sextans, olei sextarius unus.

*Oleum Melinum.*

Melinum paratur ex malis cydonijs, fit etiam ex alijs malis, corium habentibus acerbius & odoratus, hoc modo. Adimitur pediculus ad exortum, & festuca ad fundum, & pars interior unā cum seminis granis, deinde secantur mala unā, cum adhærēte cuticula. Nā in ipsa & odoris gratia, & adstringendi uis cōtinetur. fiunt autem parua frusta, quorū quadrans in olei omphacini sextarium iniicitur, & insolata ad dies xl. reponūtur. Vis melini olei magis ad frigiditatem nutat, non tamē ualde, propter mali uinositatem. Adstringit autem multū, uelut lentiscinum. Magis uero stomacho familiare est, propterea quod ex duplici materia nutritiua componatur, olei uidelicet ac mali. Quare consequens est ipsum stomacho inflammato ac debili competere, irrigatum, & in epithematis impositum, ac potum. Commodius est rosaceo, propter mali familiaritatem. Nam stomacho robur addit, & insitos in uentriculo acres humores uehementius propellit. Inijcitur etiam per sedem, quibus cōlum & crassa intestina ab acri bile uexantur. Cauendus est eius usus in affectionibus frigidis. In his enim magis conuenit, si absinthium habuerit simul incoctum.

*Oleum Rosaceum.*

Rosaceum oleum sic præparatur. Accipitur floris rosarum rubrarum exunguium, & per diem ac noctem siccatarum quadrās, olei omphacini sextarius unus: Rosas iniectis, os uasis occludere oportet, intrinsecus linteolo, forinsecus pellicula, propter imbres repētinos, & insolare ad dies xl. atq; ita excolato reponere, uasis super tabulas locatis in domo temperata. Quidam alia quædā rosas adiungunt. Verum optima est præparatio ex solis rosas & oleo constans. Alij non insolant, sed uas in puteum aquæ frigidæ ad dies xl. suspendunt. Conducit capiti calfacto ex sole, aut febribus, aut alia quadam eiusmodi causa, humectat enim & mitigat, ac somnium inducit. Et in febribus ex calfactis uisceribus, conuenit ceratum ex ipso paratum, lotum ex frigida aqua, in æstate sæpe alterata, ita ut ceratum hoc uisceribus imponatur. Præparatur autem hoc modo. Accipitur ceræ uncia una, rosacei quadrans: Cera liquefit cum modico rosaceo in duplici uase, & in aquam diffunditur, & manibus emollitur per aquam eluta, mox rursus, ac tertio liquatur, diffunditur, aquaq; eluitur: Deinde reliquum rosacei additur, liquatur, tollitur, agitur, frige fit, & in mortarium inditur ac teritur, & aquæ quantum expedierit instillatur, mox sublatum medicamentum in frigidam subinde permutatam reponitur. Si uero pro aqua acetum instillaueris in mortario ad ceratum, optimum medicamentum efficies ad erysipelata, carbunculos & herpetas. Habetur etiam hoc ceratum Sermone quinto, capite nonagesimo primo. Quin & potum optimum rosaceum cū aqua calida aut frigida, magnam utilitatem de se præbet his quibus stomachus ex acri bile, aut lūbricis, aut ascaridibus infestatur. Verum ad lumbricos maxime puerorum, melius facit sapæ permixtum & potum



potum, ita ut sapa ex uino coctura ad tertias redacta sit præparata. Celerrime enim ipsos expellit. Infunditur etiam colo uexato ex prædictis causis. Cauendus usus eius est his, qui non multam caliditatem habent, & quorum corpus superfluis excrementis redundat.

*Oleum Chamæmelinum.*

Chamæmelinum oleum sic præparatur. Olei dulcis sextarius Italicus unus, florum chamæmeli diem unum præficcatorum sextans, in uas mittuntur, cuius osculum raro linteolo integitur, quo perspirationem habeat oleum, & sic per dies x l. insolatur. Etenim si non perfletur ac transpiret chamæmelinum oleum, odorem garo similem acquirit. Post insolationem seruire ipsum oportet excolatum, uase locato in tabulis in domo temperata. Usus eius est ad caput mediocriter densatum ac dolens ex febribus non ualde ardentibus. Rarefacit enim meatus, & uapores discutit, ac acrimonias contemperat, & in summa magis mitigatorium est quam rosaceum, in febribus non ualde calidis.

*Oleum Anethinum.*

Anethinum ex anethi coma fit adhuc uirgine, prius quam semine folium reddatur & acre, inutile enim ad usum hunc fit floribus abiectis: Resecare autem mollia tantum germina, & unciae unius pondere expensa, ad sextarium Italicum unum olei dulcis iniungere oportet, & osculum uasis probe obturare, & diebus x l. insolare. Calidius hoc est quam chamæmelinum. Itaque fatigatis in hyeme commode adhibetur, mollit enim & humectat. Utendum est eo & in febrientibus leniter à pituita, & omnino ægrotantibus ex causis frigidis, maxime circa tendines ac musculos conuenit.

*Oleum Liliorum, Liliaceum, Susinum, Lirinon.*

Liliaceum siue Susinum, aut Lirinon oleum, fit ex albis lili folijs exunguibus: & solum iniectis, citra ipsorum croceum filamentum, ad sextarium Italicum olei dulcissimi, pondere sextantis. Siccare autem etiam hæc oportet in umbra per diem ac noctem: Deinde uasi iniungere, & diligenter obturata insolare per triduum: Deinde excolare, & alium sextantem foliorum immittere, prioribus uidelicet uelut inutilibus electis. Ternis enim alterationibus folia iniungere expediat, quare ubi rursus per triduum insolaueris, rursusque excolaueris, tertium sextantem liliorum immittes, similiterque per triduum insolabis, & sic excolatum in umbra repones. Si quis enim mox à principio sexuncem foliorum immittat, putrefacta oleum foetidum reddent. Commodum est affectionibus mulieribus. Soluit enim duritias, & morsus ex acrimonia obtundit, & robur utero addit. In Susinis testimonium præbent ipsi, quod prægnantibus facilem partum faciat. Sed & alijs illitum, lassitudines eximit fatigatis, & mollientibus medicamentis adiectum molliorium est. Et in summa tepefactorium est, & mitigatorium ac rarefactorium, odoratumque, ac facile partum procurat.

*Oleum Telinum, siue ex fœno græco.*

Oleum telinum ex fœno græco uim habet mollificandi. Commodum est ad furfuris, & achoris ulcuscula capitis manantia, depurgat & maculas solares, & faciem dealbat ac extergit & innouat, prodest & ad ueteri duritas ac abscessus, & ægre parientibus opitulatur. facit & ad sedis intestinorumque inflammationes,

Infusum soluit renalimos, facit & ad perniones. Præparatur hoc modo. Fœni græci libræ quinq; olei sextarii octo, cyperi libræ duæ, calami odorati libra una, macerantur hæc in oleo ad dies septem ter quoti die agitata, deinde expressa ac excolata reponuntur.

*Oleum Narcissinum.*

Ex albis Narcissi floribus fit oleum Narcissinum, nocte ac diem præficcatis, ita ut sextans ex ipsis in sextarium unum Italicum olei dulcis coniiciatur, & uas diligenter obturatum ad dies quatuor insolatur. Oportet autem & hos alterare quemadmodum in lilio diximus, & reddetur oleum magis odoratum, præsertim si moderate insolatur. Nam si diutius insolaueris Narcissinum, aut etiam liliaceum, uel uiolatum, aut aliud quoddam eorum quæ non fortem & permanentem odorem habet, inoderatum euadet. Vim habet Narcissinum calidiorem anethino. Quare ad eadem conducit in reliquo corpore, capite excepto. Acris enim est Narcissini fragrantia.

*Oleum Violatum.*

Violatum oleum præparatur ex purpureis uiolæ floribus, itemque ex albis, quadrante ex ipsis in olei sextarium Italicum dulcissimi coiecto, ac tertium alterato, ueluti in lilio prædictum est. Vis eius paulo calidior est quam rosacei. Quare si quis æstate fatigatus & insolatus rosaceo careat, uiolaceo uti potest, maxime ex purpureis floribus præparato, ita ut in balneo ex eo illinatur. Nam supra hoc quod lassitudini medetur, etiam squalorem ac situm animi, odore suo in mansuetudinem ac uoluptatem transmutat, & somnum imperturbatum inducit.

*Iasmoleum.*

Oleum apud Persas Iasme appellatum præparatur hoc modo. Candidorum nimirum uiolæ florum sextante in Italicum sextarium unum olei sesamini iniecto, ac alterato quemadmodum in lilio dictum est. Usus eius in epulationibus apud Persas odoris gratia receptus est. Conducit uniuerso corpori à balneis, in corporibus calore ac laxitate indigentibus. Grauiorem autem odorem habet, ut multi non libenter ipsum tolerant.

*Oleum Myrteum.*

Fit & hoc folijs myrti uiridibus pondere sextantis, in olei omphacini sextarium Italicum unum iniectis, addita uini odorati adstringentis quarta sextarii parte. Coquantur hæc ad lentam prunam, donec folia arefiat ac confringantur, & uinum consumatur. Deinde oleum purum excolatur, & uitreo uase excipitur, ac reponitur. Adstringit & frigefacit hoc oleum, amplius quam lentiscinum ac melinum, & propterea irrigationibus stomachi & hepatis non competit, sed neque alia uiscera benigne tractat. Experientia plurima usum eius reperit in ceratis ac emplastris, per quæ densare ac repellendo adstringere oportet. Commodat allabentibus fluxionibus, & humectis ulceribus cicatricem inducit. Cohibet pilos capitis mulierum, & est odoratum.

*Oleum Mastichinum.*

Mastichinum oleum fit, mastiches uncia una, in olei ualde acerbi sextarium unum immissa. Coquitur autem in duplici uase. Calidum est moderate, & densandi ac obstruendi meatus uir præditum, si quidem partibus moderate firmari adstringique ac calfieri indigentibus adhibeatur.

*Oleum Styracinum.*

Styracinum præparatur sic: Olei dulcis optimi sextarius

*il toti & dianor.*

*id est 2 an*

*2 p. 2 an*



rius unus, styracis pinguis sextans, coquuntur in duplici uase, donec styrax uim suam in oleū deponat. Paulo calidius hoc est quam anethinum. Verum ualde mollitoriū, & propterea corpora indurata prædare attenuat & emollit.

*Oleum Sicyonium.*

Sicyonium oleū sic præparatur. Olei dulcis sextarij decem, foenigræci sextarius unus, libanotidis quadrās, polij quadrans, sampsuchi quadrans, tædarū triens, aristolochiæ libra una, meliloti semissis, cucumeris syluestris radicis libræ duæ, aquæ quod satis est. Coquantur hæc uelut oportet, & excolata in usum ueruntur.

*Oleum Metopium.*

In Aegypto præparatur oleum Metopium appellatū, propter galbani lignum, fit ex oleo omphacino & amygdalis amaris, cardamomo, iunco rotūdo odorato, melle, uino, calamo odorato, carpobalsamo, galbano, & resina. Est calfactorium: Venarum oscula aperit, attrahit, & purgat ulcera. facit ad musculos ac neruos cōcisos. facit ad hernias aquosas, & in summa uim mollitoriam habet.

*Oleum Mendesium.*

Mendesium oleum maxime emollit, & corpora laxat, & pus facit. Componitur ex oleo myrobalanino, & myrrha, casiaq; ac resina. Quidam spissandi gratia etiam cinamomum inspergunt.

*Oleum Megaleum.*

Quod Megaleum oleum appellatur, quondam præparabatur, nunc autem in usu non est, præparatur similiter ut amaracinum, nisi quod resinam recipit, & ad eadem efficax est.

*Oleum Amaracinum.*

Amaracinum oleū sic præparatur, herbæ sabinae, ligni balsami, calami aromatici, floris iunci odorati, nardi celticæ, costi, singulorum libras v. amomi, casia, carpobalsami singulorum lib. i. i. myrrhæ lib. i. Vini odorati sextarios v. Coquito uelut Nardinū. Vis eius calfactoria sicut nardini, non autē adeo corroborat, uerum magis tenuiū partium est magisq; mitigatorium ac lene, propterea quod opobalsamum non recipit. Mulieribus in uteri sinu iniectū menses ducit. Estq; omnino calidū, emollit, ac aperit ora uenarum. Commodat fistulis, & ramici aquoso post chirurgiam. facit ad crustas & ulcera efferata, facit ad urinæ difficultatem circumlitū sedi, facit ad uteri inflammationes ac duritias, & hæmorrhoidum oscula aperit.

*Oleum Cyprinum.*

Cyprinum oleum recipit olei sextar. x v. cyperi, helenij, iridis, singulorū libram unā, sampsuchi, hyssopi utriusq; quadrantē, seminis uiticis quadrantem, saluiae quadrantē, floris cypri siue ligustri libram unā. Et hoc duabus cocturis coquitur. Nam reliquæ omnes species uino odorato rigatę pridie, postea oleo infarctæ coquuntur ad horas sex, sequenti die oleum excolatur, & affusa aqua pura tertia olei parte, flos cypri inijcitur, unā cū tenerioribus ramulis non cōtusis, si uero siccus sit, contusis, atq; ita coquitur hora una. Calfacit cyprinū non instrenuē, estq; tenuiū partium, & ad uteros amplius perfrigeratos ualde cōmodum. Nam crassos in ipsis humores attenuat. Cæterum ubi copia fuerit herbarū uiridium, cyprinum sic præparatur. Nimirum ex olei sextarijs x v. cyperi, helenij, iridis, singulorū semisse. sampsuchi, hyssopi,

saluiae, singulorū sextante. uiticis foliorum uiridium sextante. citri foliorū uiridium quincunce. chamælibani uiridis triente. lauri foliorum uiridium quincunce, cypri florū dextate, opobalsami semisse.

*Oleum Irinum.*

Irinum oleum recipit iridis, aspalathi, cyperi, helenij, singulorum lib. v. opopanacis semissem, quidā uero quadrantē, anchusæ sextantem. Olei sextarios x x x. aquæ sextarios x v. Cōtunduntur omnia crassius, & macerantur biduo, deinde coquuntur horis sex, deinde inijcitur opopanax uino præmaceratus ac tritus. Aliquando ad prædicta additur floris iunci odorati semissis, casia quadrans, ligni balsami, nardi celticæ utriusq; semissis. Vis huius calfactoria est, sed non acris, propterea perfrigeratis partibus commodat roborandiq; ac molliendi uim quandam possidet.

*Oleum Nardinum Cyzicenum.*

Nardinum Cyzicenum quod in Alexādria præparatur, ualde cōmodum est, & recipit olei acerbi sextar. x ii. Italicos, aspalathi, cyperi, iridis Illyricę. Seminis cardamomi, aristolochiæ, casia lignæ, singulorum sextūcem, helenij, ligni balsami, floris iunci odorati, casia, costi, singulorū semissem. amomi, folij malabathri, spicæ nardi, styracis, carpobalsami, singulorum quadrantē. opobalsami quadrantē. herbæ sabinae unciam unā. Præparatur hoc modo. Aspalathus, cyperus, helenium, xylobalsamum, iridē, aristolochiam, decorticato & crassius cōtundito, ac triduo aqua calida macerato. Deinde affuso oleo coquito assidue agitando, & aquā paulatim instillando, prout prior consumitur, & ubi tres aut plures coxeris horas, connecta iam cocta pernoctare finito. Sequenti die extractis his quę cocta sunt, & aqua ab oleo separata, rursus coquito alia aqua pura, ac modico uino affuso, et ubi ebullierint primum cardamomū adijcito, deinde florem iunci odorati, & casiam ligneam contusa, coquitoq; ad horas duas, ac rursus pernoctare finito. Tertia die similiter extractis his, & alia aqua rursus addita coquito, & quum efferbuerint, casia, costum & reliqua singula seorsim cōtusa ac trita, seorsim inspergito, postremum autem spicam nardi, & folium malabathri, & styracem, in tenuissimas partes cōminutum, & ubi eliquatus fuerit, statim ab igne tollito & opobalsamū addito, diligenterq; agitato, & operculo imposito ac probe uelatū ad biduū finito, atq; ita conclula excipito. Porro Secundarium sic præparatur. His quæ ex tertia coctura superfuerint, olei sextar. v i. adijcito, & duabus horis ebullire finito, deinde casia tenuissimē trita sextantē. nardi celticæ sextantē. herbæ sabinae drach. i. i. i. styracis unciam unam. opobalsami sextantem addito. Nardinū uim habet calfactoriam, roboratoriam, ac mitigatoriam. Quare stomacho perfrigerato, & inualido, item uentriculo atq; iecori eodem modo affectis commodissimum est. Infunditur per sedem quoq; in intestinis perfrigeratis. Item in uteros muliebres. Vsus est omnino præstantis & eximij.

*Præcoctura Nardini.*

Vini ueteris lib. x v. foliorum dendrolibani lib. i. rasdi lib. i. i. i. calamocrini lib. i. i. i. brullocyperij. lib. i. i. i. Hæc omnia in præcocturā mitte, ferueant horis x ii. & ubi euacuata fuerint in uas purū, & cacabus per spongiam deterfus, rursus infundis ulni lib. x v. & illud oleum desuper.

Nardini



*Nardini præparatio alia.*

Nardinum quod in Ecclesia præparatur. Tachis librā, cinamomi librā, caryophyllorum librā, amomi librā, florum iunci odorati librā, calami aromatici librā, ligni aloës librā, nucum myristicarū librā, cachrii librā, xantocaryorum, hoc est, nucum flauarum librā, maceris librā, galangæ librā, balsami librā, carpobalsami librā, xylobalsami librā, myrobalani librā, folij indicis librā, casia librā, ligni caryophylli librā, piperis longi librā, piperis albi librā, piperis communis librā, laseris chaldaici librā, nardi celticæ librā, thymiamatis librā, myrrhæ troglodyticæ librā, costi librā, musci librā, ambræ librā, gomphiti librā, ladani librā, terebinthinæ librā, uini odorati quod satis est.

*Nardini alia præparatio.*

In præcoctura uini ueteris lib. xv. foliorum dendrobani librā i. foliorū myrti lib. i. rasdi lib. iiii. calamocrini lib. iiii. brullocyperii lib. iiii. Hæc omnia in præcocturā mitte ut ebulliant horis xii. & ubi euacuata fuerint in uas purū, & cacabus per spongiā deterfus, rursus infundis uini li. xv. & oleū illud desuper. Sit autē intrita siue intrimentū, cinamomi lib. iiii. galangæ semissis, caryophyllorū triēs, spice quadrans, nucū flauarū quadrans, ladani puri quadrans, terebinthinæ uncia xviij. xyloaloës sextans, costi triens, laseris bucellarij libræ quatuor, thymiamatis regij quadrans. Hæc contusa & cribrata ac cum oleo præcocturæ unita coquito iuxta experimentum, ut neque comburantur, neque rursus defectuosa coctura fiat.

*Alia Nardini præparatio, Ioæ Vngentarij.*

Olei sextar. xii. aspalathi lib. iiii. xylobalsami lib. ii. costi quadrantem, casia lignæ trientem, carpobalsami semissem, amomi trientem, styracis calamitæ sextantem, opobalsami sextantem.

*Alia præparatio Nardini, Ioæ Vngentarij.*

Costi sextantē. foliorū indicorum trientē. casia semissem. myrrhæ semissem. ligni caryophylli semissem. carpobalsami trientē. spice nardi trientē. calami aromatici unciam unā. iridis sextantē. styracis pinguis dodrantem. croci drach. iiii. olei sextarios vi.

*Oleum Salcas.*

Olei Salcæ præparatio quā in Alexādrīa parauit, optima est, & recipit, Aspalathi semissem. xylobalsami dodrantē. cyperi trientē. helenij, iridis utriusque semissem, calami aromatici uncias xviii. floris iunci odorati sextantem & uncia dimidium. styracis pinguis sextantē. nuces Indicas duas. folij uncias xviii. spice nardi unciam unā. caryophylli, arnabo, utriusque sesquunciam. amomi quadrantē. casia sextantem. costi unciam unā. myrrhæ unciam unā. hypni, xylocasiae utriusque quadrantē. Olei sextar. x. Coquitur modo relato in nardino, ita ut in prima coctura inijciatur xylobalsamū, iris, cyperus, helenium, xylocasia decorticata & crassius cōtusa, & aqua ad bīdium aut triduum macerata. In secunda autem coctura inijciatur calamus, flos iunci odorati, hypnon, prærigata uino ueteri odorato. In tertia reliqua: sit & secundariū hoc modo. His quæ à tertia coctura superfuerūt adiunguntur olei sextarij sex, & quantū satis est coquuntur. Deinde inijciatur myrrhæ stactæ bonæ albæ quadrans. Siromatis, hoc est, aquæ opobalsami semissis. mastiches semissis. styracis boni uncia una. Utuntur

oleo Salcæ mulieres caput ex eo ungentes. Est autem relata præparatio longe optima.

*Foliati siue malabathrini præparatio optima.*

Foliatum oleum recipit aspalathi uncias xviii. ligni balsami lib. ii. cyperi lib. v. helenij lib. v. foliorū malabathri trientem. amomi semissem. xylocasiae trientem. myrrhæ trientem. costi dodrantem. styracis primarij lib. i. cassami siue carpobalsami semissem. calami aromatici lib. v. spice nardi sextantē. caryophylli trientē. Siromatis quæ est aquosa sex ac residentia opobalsami semissem. arnabo semissem. cardamomi semissem. iridis librā unā. Olei sextarios xx. Vini odorati quod satis est. Coquitur uelut Nardinum.

*Vngenta odorata quibus commodent.*

Vngenta odorata frigidioribus capitibus magis conueniunt, quā moderatē calidis, atque illis hyeme. Nā calidioribus nō sunt apta. Si uero quis odoris gratia talibus uti uelit, rosacei parē modum ammiscabit. sic enim par pari ammixtum non amplius nociuū est. Quandoquidem uero multæ mulieres tam calida capita habent, ut nullum calidū oleum perferre queāt, his consultum est solo omphacino uti, quandoque uero etiā rosaceo. Quædam uero ex ipsis omnino non utuntur oleo, propterea quod capita ipsarum cito humectentur, & destillationibus obnoxia fiant, quas sanè ad unguentorum illitionem cogere non oportet. Nam hæc siccatione capitum opus habent, per commodas puluisculorum aridorum insersiones, non humectatione per illitionem oleorum.

*Olei suffumigabilis præparatio.*

Oleum quod suffumigabile appellatur sic præparatur. Vnguium aromaticorū magnorum quincuncē. thuris masculi, styracis primarij, bdellij puri, costi, singulorum quincuncem. olei boni dulcis sextar. v. hypni quod satis est. Costū in crassas partes secato, similiterque styracē ac bdellium, deinde simul permixta in uas nouū testaceum ansis carens immittito, & osculū eius hypno integito, ac forinsecus ad hypnū aspalathi ligna, aut alicuius alterius odoratorū generis succulos addito ac obrurato, ut nihil ex uase excidere queat. Deinde aliud testaceū uas ansis carens, & longi colli osculū habens accipito, ita ut osculo eius congruat quod prædictas species in se continet, & in ipsum olei dulcis sextarios v. mittito, & effossa terra uas quod oleum habet usque ad collum obruito, ut ne ignescat. mox alterū uas in caput resupinātū osculo eius quod oleū continet adaptabis, forinsecusque totū circūcirca luto oblines, similiterque oscula utriusque compactata, & sicca resines, sequenti die carbones multos circūpones, integesque ex ipsis undiquaque totum uas, ignemque accendes ac uentilabis. Ignem autem accensum marcescere ac extinguī finito, ut paulatim cades factæ per osculum uasis species oleum suppositum ipsis suffumigent, qua gratia suffumigabile appellatur. Deinde postera die aperito, oleumque tollito ac seruato in uitreo uase, ac utitor. Hoc utuntur mulieres quibus menses retinentur, illinentes ex eo pectinem & lumbos. Conuenit etiā his quæ nō pro ratione in partu purgantur similiter illitum. Virile est etiā perfrigeratum pectus habentibus, & tenasmiis infestantibus prodest, calidum lana conuoluta exceptum, & pectini ac lumbis impositum.

*De ugentis reliquis.*

Ex his iam facile est etiam de alijs oleis iudicare, quæ  
b 4 Vngen



Vngentorum quoque cognominationem habent. Etenim iuxta naturam eorum quæ iniiciuntur, oleū alterabitur, quorum singulorum uim in hoc sermone deinceps condiscas. Cæterum de reliquis remittentibus ac laxantibus unguentis, in sermone de medicamentorum compositione, post auxilia articularia dicetur, uelut est gleucinum & consimilia.

*Elaphoboscon.*

Elaphoboscon calidam & tenuium partiū uim habet, ideoq; secundo ordine siccatur. Conuenit ad uenenatarum bestiarum plagas, & in potu, & in cibo.

*Elenium siue Helenium.*

Helenij radix maximè in usu est. Dicitur potest calida & sicca, non tamen exactè uelut piper, sed cū humiditate superflua, & propterea in linctus ac eclegmata, ad crassos & uiscosos humores ex pectore ac pulmone educendos, commodè miscetur.

*Eleliphacos, Saluia.*

Saluia calfactoriā uim euidenter habet, & leniter subadstringentē. Quidam narrant suffitā super prunas, menses immodicè fluidos mulieribus sistere, itemq; muliebrem fluxum. Agrippa autē inquit, saluiā herbam sacrā leænæ prægnantes uorant. Nam uitalem conceptū continet. Quare si succi eius heminam unā cū modico sale mulier bibat, quarta à puerperij purgamentis die, & uiro condormiat, infallibiliter concipiet. Aiunt cū in Copto Aegypti pestis grassaretur, eos qui superfuerunt in ea regione coëgisse mulieres & uxores suas, ad huius succi potentem adeo usum, & ad plurimā sobolem peruenisse. Orpheus autē inquit, Sanguinem spuentibus succi saluæ cyathos duos cum mellis uncia una dato, ieiunis in potu, & statim sistetur. Verum phthisicis ac tabidis ait, catapotia præpara hoc modo: Spicæ nardi drach. ii. seminis saluæ tosti tussu ac cribrati drach. xiiii. piperis drach. xii. excipe succo saluæ, & redige in catapotia, ac exhibe drachmam unā mane ieiunis, itemq; in uesperam, & aquam puram insuper bibendam.

*Elleborus, Veratrum.*

Veratrum album & nigrum extensoriæ ac calidæ facultatis sunt, quapropter & ad uirilgines & impetigines psorasq; ac lepras cōueniunt. Et sane uirga etiā nigri in fistulā immissa callosam, in duobus aut tribus diebus callum consumit. Ponantur autem in tertio ordine calfacientium ac siccantium, purgat nigrū humorem atræ bilis, magisq; per uentrem infernè. Album uero per eundem supernè, crassos ac uiscosos humores per uomitum expurgās, mouet autem & uentrem infernè.

*Elxine, Muralium, Parthenium, Perdicium.*

Hanc aliqui parthenium, alij perdicium, alij muralium siue herbā muralem appellant. uis eius est extensoria, & leniter adstringens cum subfrigida humiditate, unde omnes inflammationes sanat in principio ac augmento usq; ad uigorem, & maximè calidas. Sed & furunculis incipientibus imponitur. Et succus ipsius cum rosaceo ad aurium dolores modicè inflāmatos conuenit. Quidā succum gargarizant ad tonsillas inflāmatas. Quidam medici etiā in tussi inueterata exhibuerunt, propter manifestam uim extensoriæ. facit & ad alopecias ac impetigines ipsa herba per se assidue affricata. Aperit & hæmorrhoidas sedis, & fistulas sanat, & sinus occludit, cum modico sale trita & cataplasmatīs modo imposita.

*Elymos, Panicum, Meline.*

Panicum Græcis elymos & meline uocatur. Est autem simile milio forma ac facultate, parum nutrit & siccatur, & sanè uentris fluxiones sistit, quemadmodum etiā milium, si uero forinsecus in cataplasmate imponatur, siccatur & perfrigerat.

*Empetrum siue Epipetrum, Prasoides*

Empetron solis purgationibus cōmodum esse uidetur, pituitam ac bilem ducens. Saporem habet salsum, ut etiā ad alia eo quis uti possit, ad quæ uidelicet falsæ substantiæ usus est. Appellatur etiā prasoides.

*Epithymum.*

Epithymum per omnia fortiores thymo facultatem habet, siccans ac calfaciens in tertio ordine sine distantia à temperatis, purgat humorem atræ bilis.

*Erebinthus, Cicer.*

Cicer legumen est flatuosum, probè nutriēs, uentri cōmodum, urinā ciens, lac & semen generās, mensesq; ducens. Decoctum ipsius etiā calculos in renibus atterit, maxime nigri. Alterum ciceris genus orobiæū appellatum, uim habet attractoriā, discussoriā, sectoriāq; ac extensoriā. Quare & lienem & iecur & renes expurgat, scabiemq; ac impetiginē exterit. Item parotidas ac testes induratos discutit. maligna quoq; ulcera sanat cum melle.

*Erpylos, Serpyllum, Zygis.*

Serpyllum calfactoriā uim usq; adeo habet, ut menses & urinas moueat. Est autem & gustu satis acre. Duæ eius species sunt. Altera hortensis sampsuchum odore referēs. Altera syluestris quæ & zygis appellatur, non serpens, sed ramulos erectos, tenues, sarmētosos habens, folia ferme similia rutæ, subangusta & longiora, ac duriora, flores gustu acres, odoris iucundi. Radix autē inutilis est. Nascitur in petris, efficacior & calidior quàm hortensis, itemq; ad usum medicū accommodatior. Menses enim & urinas ciere pota. Prodest & ad tormina, conuulsa, rupta, hepatis inflammationes, & ad reptilia ac serpentes, tum in potu accepta, tū cataplasmatīs modo imposita. Mitigat & capitis dolorem cum aceto cocta, capite ex ea irrigato, rosaceo ammixto. Maximè autem in lethargicis ac phreniticis inueteratis congruit. Sedat & sanguinis sputum, drachmæ unius pondere cum aceto pota.

*Erysimon, Irio.*

Erysimi semen uelut sapore nasturtio simile est, sic etiā facultate ipsi adsimilatur, feruens & calfactoriū existens. Quādo uero usus eius in eclegmate expeditur, præstat ipsum aqua maceratum torrere. Commodat in eclegmatis ad crassorum ac uiscosorum humorū in pectore ac pulmone educationem ac per spurū expurgationem. Iuuat parotidas induratas, & duritias ueteres mamarum ac testium. Dioscorides ait in cataplasmate cum aqua aut melle impositum, etiā occultis cancris mederi.

*Erythrodanum, Rubia tinctorum.*

Erythrodani radix rufa qua tinctorum utitur, acerba est & subamari saporis, unde & iecur & splenē purgat, & urinas crassas, ac multas, aliquando etiā cruentas euacuat. itemq; menses propellit. Moderatè quoque extergit ea quæ extersione opus habet. Itaq; uirilgines albas exterit illita cū aceto. Quidā & in potu exhibent ipsam ischiadicis ac resolutis ex aqua mulla.

*Euzomon, Eruca.*

Eruca olus palam calfacit, sed & semen generare creditur



cur, & impetus ad uenerem excitare. Capitis autem dolorem inducit, atq; hoc magis si quis ipsam solam edat. Quapropter cum lactucae folijs ipsum edere oportet.

*Eupatorium.*

Eupatorium tenuium partiū uim habet, extensoriamq; ac sectoriā, citra manifestam caliditatem. Quare obturationes iecoris expurgat. Est etiam modicę adstrictionis particeps, per quam hepatis firmitatem addit.

*Euphorbium.*

Euphorbium ustoriam & tenuium partiū uim habet, similiter ut alijs succi.

*Z. Zea.*

Zea media quodammodo est inter triticum & hordeum, ut ex illis cognobilis fiat.

*Zingiberi.*

Radix zingiberis fortiter quidem calfacit, sed non primo statim occurſu uelut piper, propterea quod crassiorum partiū uim, aquosamq; ac excrementitiam substantiam possidet, ob quam etiam facile a teredinibus perforatur.

*Zythus.*

Zythus acrior est quam hordeum ex quo fit, & mali succi, nimirum ex putrefactione factus. Est autem & flatuosus.

*Zima, fermentum.*

Fermentum tenuium partiū est moderatē calidum, & propterea citra molestiam ac mordacitatem, ex alto extrahit simulq; discutit. Compositum est autem ex contrarijs facultatibus, aciditate frigida, & caliditate putredinosa, insuperq; salis & farinae, iuxta utriusq; naturam.

*H. Edyosmon, Menta, Minthe.*

Mentam Graeci hedyosmon, aliqui minthen odoratam appellāt, uim habet calidā ut propē attingat tertium ordinem, uerū ex hortensi cultu humiditatis superfluae particeps est, quapropter & ad uenerem moderatē stimulat, & ob hoc tēperamentum etiā cum posca lenta in cataplasmata uenit. Caeterum ob amaritudinem lumbricos necat, & decoctum eius per triduum consequenter potū, colicis ualde prodest. Acerbitas porro ipsius recens sanguinis sputū cohibet, si cum posca bibatur. Tenuium partiū ut si qua alia herba existit.

*Edysarum, Securigida, Pelecinus.*

Hedysarum etiam pelecinus dicitur, itemq; securigida, & inuenitur fuluum aut pallidum colore semen ancipiti acie ad similitudinem securis. Amarum autem & subacribum apparet, unde in potu stomacho commodum est. Expurgat uiscerū obturationes, id quod & totius fruticis ramuli faciunt.

*Emerocalles.*

Hemerocalles radicem habet similem lilij radici figura ac uiribus, quare similiter ut illa ambustis prodest. Nam discussoriā leniter uim habet, simulq; repulsorium quiddam possidet.

*Erigeron, Senecio.*

Senecio uim habet mixtam, frigidā, simulq; moderatē discussoriā. Et propterea medicamentis sedis commode miscetur, cohibet & sanguinis sputum succus potus, & lumbricos occidit, & hepaticis prodest, & inflammatis efficax cataplasma est.

*Eryngium.*

Eryngium caliditate aut parum quid a temperatis, aut

omnino nihil abscedit, siccitatis autē tenuiū partiū non modicę particeps est. Radix eius aqua feruefacta & ipsa aqua in potu sumpta, colicos sanat, cum aqua multa feruefacta, calculosos, urinae stillicidium, eiusq; emittendę difficultatem, & nephreticos curat. Bibendum est autē hoc eius decoctum per dies xvi. ieiunis, itemq; ad noctem dormituris. Si uero lauer simul cum ipsa incoxeris, & potandum dederis, melius res procedet. Affirmauit mihi quispiam se ex assiduō eius usu, calculos per lorium eicere desisse, cum antea frequentissimē eo uitio diuexaretur.

*Thapsia.*

Thapsia acris & fortiter calfactoriā unā cū humiditate facultatis est. Itaq; ex alto uiolenter attrahit, & attractum discutit. Verum longiore tempore opus suū perficit, propterea quod superflua humiditate largiter redundet, ob quam etiam facile corrumpitur.

*Thermus satiuus, Lupinus.*

Lupinus edulcatus per cocturā, in cibo acceptus aegrē cōcoquitur, & alimentū corpori præbet crassi succi, & crudos humores generat. Aluum autē neq; ducit, neq; sistit. At uerō ut pharmacū, edulcatus quidem, uim obducēdi meatus habet. Qui uero insitam a natura amaritudinē habet, extensorius & discussorius existit. Occidit lumbricos cū melle delinctus, aut cū posca potus. Sed & decoctū ipsius lumbricos expellere solet potū, & per clysterē infusum. Farina quoq; eius forinsecus cum bubulo felle umbilico imposita idē præstat. Et sanē decocti fomentum foris admotū uiriliginibus prodest, & capitis ulcusculis manantibus, eruptionibus papularū, scabiei, gangrænis, ulceribus malignis, partim extergēdo, partim discutiendo, & citra mordacitatē siccādo. Expurgat etiā iecur & lienē cum ruta & pipere, iucunditatis gratia adiectis. Extrahit & menses, & foetus, cū myrrha ac melle appositus. Farina etiam lupinorum discussoria est. Non enim liuida tantum, sed & strumas & tubercula dura sanat, sed tūc in aceto, aut aceto mulso, aut posca eam coquere oportet, iuxta ægorū uidelicet temperamenta, & affectus differentiā opportuno liquore inuento. Discutit & liuida farina ipsa, reliquaq; omnia quæ prius in decocto relata sunt. Quidam & ischiadicis in cataplasmatibus imponunt.

*Thermus syluestris, Lupinus erraticus.*

Syluestris Lupinus amarior & fortior est ad omnia satiuo: aliās in genere eandem uim possidens.

*Thlaspi.*

Thlaspios semen uim acrem adeo possidet, ut etiam internos abscessus potum rumpat, & menses ducat, & foetus perimat. Per sedem immisſum coxendicū morbis prodest cruenta euacuando, & aliās quoq; purgatoriā uim habet supernē ac infernē humorū biliosorum, acetabuli mensura potum.

*Thridax, Lactuca.*

Lactuca humidū ac frigidum olus est, non tamē externē, sed iuxta fontanarū aquarum frigiditatē, quapropter ad inflammationes conuenit, & ad parua ac leuia erysipelata. Edulium est sitim sedans, & somnū concilians, maximē feruefacta cū posca diluta sola comesta. Sed neq; incōcoctilis est uelut alia olera, neq; excretionem per aluū inhibet, neq; promouet, & propterea neque mali succi sanguinē generat, non tamen perfectē boni succi. Semen potum seminis effluxum cohibet, unde & his quibus per somnum id effluit



datur. Cæterum sylvestris lactucæ succus cum muliebri lacte illius, argemata & inustiones, quæ oculorum ulcera sunt, itemq; caliginem depurgat.

*Thymus.*

Thymus incidit ac calfacit manifestè ut tertij ordinis sit calfacientiū, & propterea urinas ac menses ducit, ac foetus detrahit, & uiscera purgat potu, adiuuat pectoris ac pulmonis excretiones. Atq; hæc quidē Galeanus. Verū experimento sequentia cōstāt. Arthriticis thymī sicci minutissimè triti drach. 1111. cū aceti mulsi hemina dimidia dato ieiunis: purgat enim bilē, & acres serofos humores, & quæ circa uesicam herent. Ventre autem eleuato, quū intumescere iam incipit, drach. 1. cū aque mulsæ hemina exhibeto ieiunis. Ad lumborū ac coxendicum dolorem laterisq; ac pectoris, & præcordiorū eleuationes ac inflationes, drach. 111. cū aceti mulsi diluti hemina una dato ieiunis. Similiter & melancholicis & mente perturbatis, & timore percussis drach. 111. dato cū aceti mulsi diluti hemina una. Lippientibus & in uehementi oculorū dolore similiter dabis ieiunis & ante coenā. In podagricis doloribus ita auctis ut moueri non possint ægri, similiter dato cū uino diluto. In testibus eleuatis similiter drach. 111. ieiunis dato cū hemina uini una. Verū tamen à nigro thymo elleboro appellato penitus abstinendū est. Corruptoriā enim uim habet, & bilē generat. Vtere autem eo qui florem purpureum habet ex natura, & album quid amplius complectitur.

*Thymbra, Satureia.*

Satureia hortensia consimilem thymo uim habent, sed sunt multò debiliora.

*I Intybi.*

Intybi lactucis consimilem uim habent, sed tamen iucunditate multum inferiores existūt: item ad reliqua omnia de lactucis relata minus efficaces sunt.

*10xos, Viscum.*

Viscum ex plurima aërea & aquea substantia calida, minima autē terrea constituitur. Itaq; plus acrimoniæ in se habet, quàm amaritudinis. Quapropter humores ex alto fortiter trahit, non tenues solū, sed etiā crassiores, eosq; diffundit ac discutit. Est autē ex medicamentis nō statim calfacientibus post primā impositionē, sed quæ tēpore indigent, uelut etiā thapsia.

*10n, Viola.*

Violæ folia aquosam & subfrigidam substantiam prædominantem possident, propterea & per se & cū polenta in cataplasmate imposita, inflammationes calidas mitigant. Imponuntur & in ardore oris uentris, itemq; oculorum.

*1ppuris, Equisetum.*

Hippuris adstringentē cum amaritudine qualitātē habet, et propterea siccatoriā fortiter simulq; citra mordacitatem. Vulnura igitur maxima in cataplasmate imposita glutinat, etiā si nerui dissecti sint, itemq; herniam intestinorū. Sed & sanguinis sputū, & fluxum muliebrē, maximè rufum, insuperq; ad dysenterias aliasq; uentris fluxiones, generosum pharmacū existit herba ipsa cū aqua, aut uino pota. Quidam de ea produnt, uesicæ etiā aliquando ac tenuium intestinorum uulnura curasse. Succus eius sanguinis è naribus eruptiones iuuat, & foeda uētris uitia, cum uino aliquo austero potus, aut in febrientibus cum aqua.

*1satis, Glastrum.*

Isatis satia qua tinctores utuntur, fortiter siccantis fa-

cultatis est, nondū mordentis, amaræq; simul ac adstringentis. Quapropter magna uulnera durorū corporum glutinat, etiā si in muscutorū capitibus existant. Sanguinis eruptionibus utile cataplasma præbet, & tumores laxos mirabiliter discutit, simul ac cōtrahit, & aduersus omnia maligna ulcera efficaciter resistit, siue cōputrescant, siue erodantur. Quod si pro ægri natura ac uiribus fortior appareat, ad folia ipsius trita, aut panē, aut ordeaceā farinā, siue triticeā, aut etiā polentā ammiscere oportet, iuxta prædominantē in unoquoq; dispositionem ac affectionem.

*1satis sylvestris.*

Sylvestris Isatis acre quid habet manifestū iā in gustu & actione, & propterea magis siccatoria quàm satia existēs, aduersus humiditas putrescētias fortius reuoluitur. Verū ad alia prædicta deterior est: immodicè enim & cū mordacitate hæc siccatur, iritatq; & inflammationes excitat. Cæterum fortitudinis facultatis suæ gratia, etiā splenicis utilis existit, quibus satia non profuit.

*Itea, Salix.*

Salicis folijs uti quis potest ad uulnerū cruentorū glutinationē, imò & flore ipsius quo omnes Medici ferme utuntur ad emplastri siccantis compositionē. Est enim uis ipsorū siccatoria citra mordacitatē: habent autē & adstrictionis aliquid. Quidam succū ex ipsis exprimunt, eumq; pro pharmaco habent mordacitatis expertæ ac siccantæ, ad multa utili. Cortex quoque arboris cōsimilem floribus ac folijs uim habet, præterquàm quod sicciore tēperamēto præditus est, quemadmodū omnes ferè cortices. Quidā hunc exurunt, & cinere utuntur ad ea quæ forti resiccatione indigent. Itaque clauos ac callos, insuperq; uerrucas myrmecias appellatas, eo eximūt aceto acri subactō. Aliqui tēpore floris corticē incidunt, succumq; quēdam inde colligunt, quō utuntur ad uitia quæ pupilis tenebras obducunt: est enim medicamentū exterforium ac tenuiū partium. Quare etiā ad alia multa eius usus assumi queat, quum tali facultate præstet.

*Calaminthe.*

Calaminthe tenuiū partiū substantiā habet, estq; calida & sicca tertio ordine: sicca per se ex aqua mulsā pota manifestè calfacit, & sudores ciēt ac discutit, & siccaturū corpus, quapropter aliqui ipsa usi sunt & ad rigores per circuitū repetentes, cocta in oleo, & illito inde toto corpore cū frictione strēnua, intra corpus uero assumunt uelut dictum est. Quin & coxendicis cataplasma est in ischiadicis generoso omnino auxilio: trahit enim ex alto ad superficiē, & totū articulū calefacit, & cutem manifestè adurit. Insuper & pota apposita menses efficaciter prouocat. Bonū est & in elephantiasi medicamentum non solū ob id quod tenues humores discutiat, sed & quod crassos attenuet & fortiter dissecet, qui sanè hoc morbi genus generāt. Sic & cicatrices nigras illustrat, & sugillata discutit. Præstat autē in talibus coctā in uino cataplasma: tis uice imponere, uiridē magis quàm arefactā: siccata enim fortior euadit & prōptius inurit. Est & cataplasma in morsibus animalium uirus eiaculantiū. Ac uero ob amaritudinē & ascaridas & lūbricos succus eius perimit tū potus, tū per sedē infusus, imò & uermes qui in auribus itemq; ulceribus nasci solēt. Prodest & anhelosis & ictericis extergendo ac expurgando iecoris obturationes. Cæterū ad omnia prædicta efficacior



efficacior est mōtana. Orpheus ait succū eius cū pari rosaceo & cerussa tritū ad strigmenticiā crassitudinē ac illitum, ambustis mederi, & quod omnē opinio- nem superat, neq; cicatricem apparere, & locū pilos producere. Si uero cū cimolia terra & aloē, paribus portionibus acceptis succus teratur, indeq; frons ac tēpora illinantur, capitis dolores euestigiō sanātur.

*Calamus aromaticus.*

Calamus aromaticus modicā adstrictionem & quā minimā acrimoniam possidet, maxima autem pars eius substantiæ terreæ ac aëreæ est, moderatæ calidi- tatis ac frigiditatis. Vnde & urinam moderatē ciet, & compositionibus stomachicis ac hepaticis quæ fo- ris ipsis imponuntur ammiscetur, & in uterī fetus utiliter assumitur, qui inflammationibus, aut men- sium irritationis gratia adhibentur. Ponatur itaque secundo ordine calfacientium ac siccantium, magis tamen siccantium quā calfacientium.

*Calamus Phragmites, Arundo Sepiaria.*

Calami phragmitæ radix exterforiam uim non mo- dicam habet, minimē acrem, folia tamē uiridia mo- deratē perfrigerant, itemq; non modicā exterforiam uim possident. Cortex eius ustus tenuium partium ac discussoriam uim abūde acquirit, & exterforium quid habet, ut calfaciat ac siccet tertio ordine, plus ta- men siccans quā calfaciens.

*Cannabis.*

Cannabis semen ægrē concoquitur, dolorem capitis inducit, & malum succum gignit. Si uero torreatur etiam sic caput tentat, multum calfaciendo, & uapo- rem calidum ac medicatum ad ipsum delegando. Ex eo uero quod sicco temperamento præditum est & flatus expers, genitale semen extinguit.

*Capnion, Fumus terræ.*

Herba fumaria acrem simulq; amarā habet qualitatē, neq; omnino expers est acerbæ. Quapropter urinam multā biliosam promouet, & iecoris obturationes ac debilitates sanat. Succus eius uisum exacuit dela- crymationē faciēs. Ipsa herba arida trita aque mulsæ inspersa ac pota, uētre mollit. Vino autē diluto si- militer inspersa, stomachum corroborat. Dato cōfi- denter & decoctū ipsius quomodocūq; febriētibus.

*Capparis.*

Capparis radicis cortex prædominantē habet amaram qualitatem, secundo loco acrem, & deinceps acerbā, ex quo palam fit ex diuersis ac pugnantibus uiribus ipsum compositū esse. Etenim extergere & expurga- re ac incidere potest ob amaritudinē: calfacere autem & discutere ac attenuare per acrimoniam, cōtrahere uero ac cōstringere & cogere per acerbitatē. & pro- pterea lienes induratos si quod aliud medicamētum curat, tum forinsecus cataplasmatibus conuenientibus ammixtus, tum intra corpus acceptus, siue coquatur in aceto ex aceto mulso ac similibus, siue aridus tri- tus ipsdem inspersus: euacuat enim apertē uiscosos ac crassos humores sic acceptus, non per urinas solum, sed etiam per uentrem. Sæpenumero uero & cruen- ta egerunt hi in quibus lien opem sentit, & coxendū cum dolores minuuntur. Quin & menses ciet, & pi- tuitā à capite per os detrahit, & malignis ulceribus inspersus minutissimē tritus commodum pharma- cum est, utpote extergere ipsa ualēs & fortiter resic- care. Sed & dentium doloribus prodest cū uino co- ctus aut aceto. Strumas quoq; et tumores duros dif-

cutit, si aptis ad hæc medicamentis permisceatur. Fo- lia porro & caulis, itēq; semen siue fructus, consimi- lem cortici uim habent, nisi quod debiliora existūt. Et sane ego memini me aliquādo folijs solis strumo- sam duritiē intra paucos dies discussisse. Ammiscetur autem ipsis aliquid quod uehemētiā facultatis ipsorum obtundat. Nihil uero miri est, si etiam au- rium uermes succus enecat ob amaritudinē. At uero fructus in muria cōpositus, deinde lotus ac macera- tus, donec omnem salis uim deponat, medicamētum est ad excitandum appetentiam prostratā, extergen- dumq; ac subducendum uentris pituitam, & ad ex- purgandum obturationes lienis ac iecoris. Utēdum est autem eo cum commodo liquore, aceti mulsi, aut aceti oleo permixti, præ omnibus alijs cibis.

*Cardamum, Nasturtium.*

Nasturtij semen uistoriā uim habet uelut sinapi, & pro- pterea ischiadicos, & capitis dolores, & quicquid ru- bescione opus habet id ipsum calfacit, quēadmodū sinapi. Ammiscetur cōmodē & medicamētis ad an- helosos destinatis, nimirum ut medicamentū crassos humores dissecare potēs. Herba ipsa similem semini uim possidet: uerum imbecillior est. Quare comesta ualde calfacit. Capitis autē dolorem eadem inducit.

*Cardamomum.*

Cardamomum calidam facultatem abundē possidet, ut etiam exulceret in cataplasmate impositū, minus tamen quā nasturtiū. Habet & amaritudinis quide- dam in sese, ob quam etiam lumbricos enecat, & sca- biem fortiter extert cum aceto.

*Caroum.*

Caroi semen siccatur & calfacit tertio ordine: acrem au- tem qualitatem moderatē possidet, & propterea fla- tus leuat discutitq; & urinam ciet, non modo semē, sed tota planta.

*Casia.*

Casia calfacit ac siccatur tertio ordine, estq; multū tenuiū partiū: in gustu autem plurimum acrimoniam habet, paruaq; quandam adstrictionem. Quare propter hæc omnia siccatur simulq; discutit corporis superflui- tates, & præterea robur organis addit. Cōmodat & ad suppressos menses, ubi præ copia simulq; crassitu- dine superfluitatū, sufficienter euacuari prohibetur.

*Carya, Nux arbor, Nux iuglans siue Regia,*

*Nux parua, Pontica, Auellana.*

Nux arbor habet quidē tum in germinibus, tum in fo- lijs aliquid adstringens, uerum insigniter & copiose in ipso nucis suæ cortice, & recenti & arido. Utitur itaq; ipso etiam tinctores. Nos autem eūdem expri- mentes, succumq; similiter ut mororū ac rubi, mo- rorum cum melle coquētes, stomachicū præparamus oris uitijs cōmodum medicamentum, quo etiam ad alia omnia utimur, ad quæ prædicti succi commodi existūt. Cæterū ipsius nucis nucleus qui in cōbi usum uenit, oleosus est & tenuiū partium, particeps est au- tem & adstringentis qualitatis, sed modicæ & quæ temporis progressu euanescit, tota ipsius substantia in pinguem succum transeunte, qui oleo ueteri similis apparet, & propterea omnino tandem edi non po- test. At uero uiridis adhuc & recens nucleus, neque adstringentem qualitatem manifestē possidet, ne- que oleosam. Vnde ad alui excretionem commo- dior est quā siccus, & maximē si cum garo, quē admodum aliqui faciūt, accipiatur. Sed & siccum



nucum in aqua maceratarū, uelut quidam facere solent, consimilis uis est ut uiridium. Concoquitur tamen melius nucis fructus, & stomacho commodior est, si cum caricis edatur. Aiunt si quis caricas cum nucibus ac ruta prae reliquis cibis comedat, eum non magnopere à letalibus medicamentis lædi posse. Porro ex inueterata nuce oleum quoque exprimi potest, quod abunde discussorium existit, ut quidam eo etiam gangrænas & carbunculos ac ægilopas curēt. At uero putamen eius aridum ustum, tenuium parrium siccatoriumque & lene pharmacum euadit. Cæterum nux parua, quæ & Pontica, & Auellana appellatur, frigidior est & austerior, utpote magister rea existens. In cæteris regiis, siue iuglandi similis est. Capitis autem dolorem in cibo sumpta inducit.

*Castanea.*

De castanea eiusque fructu dictū est in querci tractatione.

*Cenchros, Milium.*

Milium frigescit primo ordine, siccatur aut tertio exolutum, aut secundo intecto. Est & modice tenuium parrium. Vnde comestum instar edulij, omnium ferme eduliorum frumentacei generis minimi nutrimenti est, sed & aluum exiccat. Verum forinsecus impositum in marsupijs siue sacculis, fomentum est aptissimum his qui leni resiccatione opus habent.

*Cedrus, Cedria, Septica.*

Cedri species duæ sunt, utraque tertio calfacit ac siccatur. Cedria uero quæ ex ipsis fit, etiam quartū iam ordinem attingit. Est autem primi ordinis erodentiū, septica Græci appellant, multum calida ac tenuium parrium existens. teneras sanè carnes promptè simulque citra dolorem corrodit caliditas ipsius, per caliditatem quæ in corporibus est aucta: uerū in duris corporibus longiori tempore & uix tandem efficaciam suam ostendit. Vnde mortuorum corpora incorrupta cōseruat, humiditates ipsorum superfluas depascēs, solida autem corpora nō attingens, propterea quod non tā fortem uim habet, uelut alia erosua appellata. Nihil uero miri est si eiusmodi ui pollet, quod etiā pediculos, & lēdes, & aurium uermes, & ascaridas in recto intestino enecare potest. Foetus insuper apposita uiuos quidem necat, mortuos autem eicit, quēadmodum etiam ipsum semen genitale, in coitu pudendo oblita, & propterea sic usurpata medicamentū conceptum impediens est nulli alteri posthabendum. Sed & dētiū foraminibus instillata dolores quidē minuit, ipsos autem dentes confringit. Attenuat & oculorum cicatrices, & hebetē uisum ob crassitudinem humorum sanat. Quod uero pinguisimū est ex ipsa & exacte oleosum, quod superextentis lanis dū concoquitur colligitur, tenuiorū quidem partū est quam tota cedria, uerum minus acre ac mordax, quāquam nō minus, sed magis etiā quam cedria efficax sit. Vnde & hoc idiotæ utuntur ad uulnera ouium in tōsura per forcipes illata, item ad scabiem, & ad ricinos. Cedri porro baccae & fructus cedrides Græcis appellati, moderationem uim habent, ut etiā in cibi usum ueniāt. Si quis tamē plures ex ipsis ingerat, & caput dolet, & excalefacit, & oris uētris morsum percipit.

*Centaurea magna.*

Centaureæ magnæ radix ex contrarijs uiribus cōposita est. Itaque in gustu acris simulque adstringens apparet, cum quadā dulcedine. In actione uero acrimonia caliditatis opera exercet, menses promouens, &

foetus mortuos detrahens, & uiuentes corrumpens, simulque eiciēs. Adstrictio autem frigiditatis crassioris ac terreæ opera designat, tum uulnera glutinando, tum sanguinem spuentes iuuando. Dare autem oportet ex ea drachm. i. febrientibus cum aqua, febre carentibus cum uino. At uero iuxta omnium qualitatum actionem & ruptis, & conuulsis, & spirandi difficultatibus, & inueteratæ tussi conuenit: nō enim euacuare solum in his oportet quod præter naturam est, sed roborare etiam ac firmare expurgata. Succus ad eadem ad quæ radix ualet. Quidam etiam eo pro lycio utuntur, illo non præsentē.

*Centaurea parua.*

Centaureæ paruæ radix omnino inefficax est, ramuli uero & magis folia, & ipsorum flores in usum ueniūt. Dominatur in ipsis qualitas amara, parū quid adstrictionis possidens, & propterea fortiter siccatorium est pharmacū absque mordacitate. Magna itaque & recentia uulnera glutinat herba ipsa uiridi in cataplasmate imposita. Vetera uero & ægrè cicatricem recipiētia, ad cicatricē perducit simili modo adhibita. Quin & sicca glutinatorijs ac siccatorijs cōpositionibus miscetur, quæ sinus ac fistulas curare solent. Sed & ueteres duritias mollire creditur, et maligna ulcera sanare. Miscetur & eis quæ fluidas affectiones sanāt. Decoctum herbæ quidā ischiadicis infundunt per sedē, uelut quod biliosum & crassum humorē ducat. Nā & purgat, & sanè ubi uehementer operationē suam exercebit, cruenta euacuat, & magis prodest. Succus eius consimilem uim habet, hoc est, siccatoriā & exterforiā, & tum alia prædicta probè efficere solet, tū cū melle oculis sublinitur, & appositus mēses ac foetus educit. Quidā ipsum bibendū dant in affectis neruis, uelut euacuantem ac citra molestiā siccantem infarcta. Cæterum & ad hepatis obturationes bonum pharmacū est. Bonum & lieni indurato, forinsecus impositus, neque minus si quis bibere uelit. Herba ipsa exsuccanda est circa summum uigorem, & flore prægnans. Datur succi cochleariū unum cū aqua calida, & sale modico, ac pauculo aceto, & purgat generose humorem atræ bilis. Coma eius contusa & cū melle cocta, aut sapa in collyria formata, fistulas circumscribit, & callos eximit, collyrijs in fistulas immisis. Corymbi eius tussi ac cribrati cochlearij mēsurā ischiadicis datur ieiunis cū aqua calida, ad tri duū aut plures etiā dies. Eius certe pharmaci efficacia magno miraculo sæpe fuit. Et ad polypodas in naribus excrecentes idē medicamentū siccū inspergitur.

*Cerasus.*

Cerasus fructum fert moderatè adstringentē cum dulcedine; matura itaque cerasa & dulcia magis per intestina subeunt, minus uero stomacho commodant, immatura & austeriora uice uersa. Gummi arboris uino potum calculosis prodesse quidam tradiderūt.

*Ceratonia, Siliqua.*

Siliqua arbor siccatoriā & adstrictoriā uim habet, quemadmodum etiam fructus eius, ceratia Græcis, nobis siliquæ appellatæ. particeps est autem & alicuius dulcedinis. Siliquæ aliquam cum cerasis similitudinem habent. Virides enim & humidæ aluum magis subducunt: Siccæ magis sistunt.

*Cestron, Betonica, Psychotrophon.*

Betonica cestron & psychotrophon appellatū, uim habet sectoriā uelut gustus indicat: amara enim & acris herba



herba existit, uelut etiam particularis actio ostendit. Nam & rhenum calculos confringit, & pulmonem ac pectus & iecur purgat ac extergit, & menses mouet, & comitiali morbo prodest, & ruptis ac coeui-  
lis medetur. Acidum item ructum sedat, & ischiadici-  
cis conducit pota.

*Cicis, Galla, Omphacitis.*

Galla quæ omphacitis uocatur, abūde acerbū pharma-  
cum est, substantiæ terreæ frigidæ plurimæ particeps,  
ob quam & siccatur, & fluxiones repellit, & cogit ac  
adstringit laxas ac inualidas partes. omnibus etiam  
fluidis affectionibus resistit. Ponatur autē in tertio  
ordine siccantiū, in secundo uero frigeficientiū. Al-  
tera galla flaua laxa ac magna siccatur quidē, sed tanto  
minus, quāto minus acerbæ qualitatē particeps est.  
Cocta itaq; per se ac trita, & in cataplasmate adhibi-  
ta inflammationū sedis ac prolapsus eiusdē insigne au-  
xilium est. Coquere autē oportet si moderata adstri-  
ctione opus est in aqua, si uehementi in uino, maximē  
austero. Gallæ uim supprimēdi sanguinis habent, &  
manifestū satis est quod caliditatem et acrimoniam ex  
ustura acquirunt, & magis tenuiū partiū quā non  
ustæ euadunt, itēq; siccatoriæ amplius. Oportet autē  
cādefactas super prunas, aceto aut uino extinguere.

*Cera.*

Cera in medio quodammodo est calfacientium, frige-  
facientium, humectantiū ac siccantiū, habet & cras-  
sarum partiū quid & meatus obturatoriū, quapro-  
pter non solū siccatur, sed & per accides humectare ui-  
detur perspirationes prohibendo. Vnde & materia  
est aliorū pharmacorū. Ipsa autē per se ex concocto-  
riorū debiliū numero fuerit, quæ forinsecus imponū-  
tur. Habet enim parū ex discussoria ac calida faculta-  
te, cuius quā plurimæ mel ipsum particeps existit.

*Ciborium.*

Viridem fabarum Aegyptiarum fructum ciboriū ap-  
pellant. Quare in fabarum tractatione, etiam de hoc  
considerandum est.

*Cinara.*

Cinara mali succi eduliū est, maximē ubi durior euase-  
rit. Nam et biliosum humorē in sese tunc uberiorem  
colligit, & totam substantiā lignosiorē habet. Quare  
ex hac quidem humor atræ bilis generatur. Ex succo  
uero ipsius tenuis & amaræ bilis humor producit. Præstat  
igitur præcoctam ipsam in cibo absumere.

*Cicis arboris fructus, Ricinus, Croton.*

Cicis arboris fructus, quem aliqui crotonem ac ricinū  
appellant, quicq; purgandi uim habet, extersoria ac  
discussoria facultate præditus est, folia eius imbecil-  
lora sunt. Oleum quod ex fructu fit, calidius & ma-  
gis tenuium partium est quā commune, & propter  
ea etiam discussorium.

*Cisthus siue Cistharus.*

Cisthus frutex adeo adstrictorius est, ut & folia ipsius  
in cataplasmate imposita uulnera glutinent. Flores  
efficaciores sunt, ut cū uino poti dysenterias, & uen-  
tris imbecillitatem, ac fluxiones, & humiditates sa-  
nent, in cataplasmate autem impositi putrefactis ul-  
ceribus conducunt, propter generosam siccandi uim  
ferē in secundo ordine. Ipsius fruticis frigiditas tepi-  
dæ quoq; qualitatē particeps est. Cæterum quæ hy-  
pocysthis appellatur, multo magis quā folia ad-  
stringit, estq; efficax pharmacum ad omnes fluidas  
affectiones, uelut sanguinis reiectionē, fluxum mu-

liebrem, coeliacas & dysentericas affectiones. Sed &  
corroborare partes solet, & a plurima humiditate  
exolutis firmitatē addit, atq; sic sanē & stomachicis  
& hepaticis conducit. Firmat enim ac roborat non  
instrēnuē, epithematis aut antidotis aptis ammixta.

*Cisthus siue Ladanum.*

Cisthus hic in calidioribus regionibus nascitur, nō ge-  
nere alius ab his qui in alijs locis nascuntur. sed a re-  
gione præcipuā quādam propriam discussoriā qua-  
litatē adeptus est deposita frigiditate. In reliquis igitur  
conformis est præcedenti. Verū ex ipso fit lada-  
num medicamentum calidū primo ordine iam com-  
pleto, ut etiā secundū attingat, particeps est autem &  
adstrictionis cuiusdā modicæ, & tenuium partium  
substantiā habet, & propterea moderatē emollit, &  
similiter discutit, itemq; cōcoquit. Itaq; non mirum  
est uteri affectibus hoc præcipuē cōuenire, propterea  
quod aliquid adstringens habet, per quod etiam de-  
fluos capillos retinet. Nā & uitiatos humores iuxta  
pilorū radices attenuat ac cōsumit, & meatus quibus  
impacti erant, adstringendi ui cogit & constringit.

*Cissos, Hedera.*

Ex contrarijs facultatibus hedera cōponitur: habet enim  
quid substantiæ adstrictoriæ, quā frigidā ac terreā  
dicimus. Habet & quid acris, quā calidam esse gu-  
stus testatur, sed & aquosæ substantiæ tepidæ uiridis  
particeps est. Viridia itaq; folia cum uino cocta, etiā  
magna uulnera glutinant, & maligna ulcera sanant.  
Ulcerationes quoq; ex igne cicatrice includūt. Cum  
aceto autem cocta folia splenicis opitulantur. Flo-  
res eius fortiores quodammodo sunt, ut cum cerato  
triti ambusta curent. Succus ipsius per nares purgat,  
& antiquas aurium fluxiones sanat, & ulcera uetera  
tum aurium, tum narium ad cicatricem perducit. Si  
uero acrior appareat, rosaceo aut oleo dulci tempe-  
retur. Lacryma hæderę pediculos necat, & pilis nu-  
dat, in tantum calidam uim habens, ut etiam leniter  
urat. Prodest etiam lacryma calculosis in potu.

*Cnicus.*

Cnici semine ad purgationes tantum utimur. Est au-  
tem tertij ordinis calfacientium, si quis forinsecus  
admoto ipso uti uelit.

*Coccus enidius, Granum enidium.*

Cnidius coccus purgatoriam uim habet, estq; faculta-  
tis acris & ustoriæ.

*Coccus tinctorius, Granum tinctorium.*

Coccus tinctorius adstringentem simulq; amarā qua-  
litatem habet, & per utranque leniter siccatur, & ob id  
ad magna uulnera conducit, & ad sauciatos neruos,  
cum aceto aut aceto mulso tritus.

*Coccymelea, Prunus.*

Pruni fructus recens magis aluū subducit, siccatus mi-  
nus. Sunt autem damascena pruna magis adstringē-  
tia, Hispana dulciora, & propterea magis aluum du-  
cunt. In folijs autem manifesta quædam adstrictio  
apparet, unde decocta utiliter gargarissantur in in-  
flammationibus gurgulionis ac tonsillarum. Cæte-  
rum syluestrium prunorū fructus adstrictorius est  
& uentrem sistit. Et in Asia sanē hæc planta prunus  
nominatur. Gummi omnis pruni cum uino potum  
lapides frangere quidam produnt, uerum cum aceto  
impetigines puerorum exterit.

*Colocasion, siue Manzianion.*

Colocasion radice similis uis est rapis ac cepis, uiscosum  
autem



autem corpus ipsius est. Vnde exterforiæ facultatis particeps est, & uentri in cibo sumpta commodat.

*Colocynthe, Cucurbita.*

Cucurbita humidi & frigidi temperamenti est, utroque secundo ordine. Vnde & ramentorum eius succus auribus inflāmatīs & dolentibus conuenit cum rosaceo. Sic & tota in cataplasmate imposita, calidas inflammationes mediocriter refrigerat. In cibo accepta nimia humectatione corpus implet, & sitim eximit, & alimentum humidum ac frigidum, & propterea etiā modicum corpori præbet. Concoquitur autem non male, ubi non prius fuerit corrupta, id quod accidit ipsi propter malam præparationem, & ubi uisiosus humor in uentre fuerit coaceruatus. Imò si etiā diutius in uentre moretur, quemadmodum reliqua quoque humida edulia. Gaudet organi cōditura propter aquosam in ipsa qualitatem. Omnia enim huius generis acris aut acidis, aut austeris, aut salis saporibus miscere oportet, si modo neque insuauiter sumi debeant, neque sumentes nauseabundos efficere.

*Comarus, Arbutus, Memæcylon.*

Arbuti fructus memæcylon appellatur, estque stomacho incommodus, & capitis dolorem inducit. arbor ipsa simul cum fructu acerbam qualitatem possidet.

*Commī, Gummi.*

Gummi uim habet siccatoriam, meatus obducit, & asperitates sanat.

*Conia stacte, Lixiuum.*

Quod uelut ablutio est materierum ad cinerē redactarum, conia stacte Græcis, nobis lixiuum uocatur. Ex omnibus autem maximè exterforium est & siccandi ui præditum, quod ex cinere ficulneo & tithymallis fit, ut ferè uim erosiuam sortiatur. Verum ob substantiam tenuium partium citra dolorem urit.

*Conyza.*

Conyza & maior & minor consimilis temperamenti ac facultatis existunt, gustui acris & amaræ apparentes. Calfaciunt & siccant euidenter, ut utriusque qualitatis tertio ordine locetur. Decoctæ itaque in oleo, rigoribus per circuitum repetentibus salutarē medelā præbent. Quidam flores ipsarum unā cum folijs terentes cum uino bibendos exhibent, ad menses ciendos ac fortis efficiendos. Est & tertium conyzae genus, in humectioribus locis proueniens, magis foetidum & imbecillius.

*Corianum, Coriandrum.*

Corianon item corion appellatur, & ex contrariis facultatibus compositum est, multum habens substantiæ amaræ, quæ tenuium partium est & terrea, nec parum aqueæ humiditatis tepida ui præditæ. Habet & parū quid adstrictionis, ex quibus omnibus multariam efficax est facere ea quæ Dioscorides prodidit, uerum non ob solam frigiditatem.

*Colla, Glutinum.*

Glutinum quod ex similagine aut polline ad libros cōficiunt, facultatem habet meatus obducentem & concoctoriā. At uero de taurino glutine ac similiū in sermone de animalibus agetur.

*Coronopodium, Pes cornicis.*

Coronopodij radix in cibo accepta coeliacis opitulari creditur.

*Costus.*

Costus modicæ amaritudinis, plurimæ uero acrimoniæ ac calidæ qualitatis particeps est, ut etiam exul-

ceret. Vnde ex ipso cum oleo perfricant corpus ante accessiōem in rigoribus per circuitum redeuntibus. Alij idem & in resolutis ac ischiadicis faciunt, & omnino in his quibus aut partem aliquam calfacere uolumus, aut humorem aliquem ex alto ad cutem attrahere, usus eius competit. Ob eandem causam & urinam ciēt, & menses ducit, & ruptis ac cōuulsis, & laterum doloribus confert. Verum ob amaritudinem, etiam latum lumbricum necare creditur, & ad solares maculas ipso utuntur, cum aqua aut melle. Inest præterea ipsius temperamento flauosa quædam humiditas, ob quam & uenerem stimulat cum uino mulso potus.

*Cotyledon, Umbilicus ueneris.*

Cotyledon mixtam uim habet, humidā & frigidam, & quandā obscurè subadstringentē & modicè amarā. Vnde frigefacit, & repellit, & extergit, & discutit. Inflammationes itaque erysipelatas, & erysipelata inflammata sanat, & in stomachi ardore cōmodum cataplasma existit. Creduntur folia cum radice comesta lapides atterere, & urinam ciere.

*Crambe, Brassica.*

Brassica comestilis siccatoriam uim habet, & in cibo accepta, & forinsecus imposita, nō tamen manifestè acrem, sed ut uulnera glutinet, & maligna ulcera sanet, & inflammationes curet iam induratas ac ægrè solubiles, eiusdemque generis erysipelata. Sed & epinyctidas ac herpetas sanat. Habet & quid exterforium, per quod etiā lepras exterit. Succus itaque ipsius quid purgatorium habet, corpus autem eius alui excretionem cohibet, eaque gratia in quibus humectum uentrē siccare uolumus, moderatè ipsam coquimus, & priore aqua diffusa, statim in alteram calidā præparatam immittimus ac seruacimus. Non oportet enim neque aërem, neque frigidam aquam contingere quod his coquitur. Neque enim exactè flaccidū fit, etiam si diutissimè coquas. Itaque in aliam calidam immissam coquimus donec flaccida fiat. Nam si uentris subducendi gratia sumitur, non ualde discoquitur. Siccat igitur brassica quemadmodum lenticula, & propterea uisum hebetat, & atræ bilis humorem generat. At uero asparagus brassicæ minus siccatur, & magis urinam ciēt. Semen autem potum lumbricos enecat, & maculas solares ac lentigines, & quæcunque alia moderata extersione opus habentia exterit. Cauliculi eius usti cinerem efficiunt fortiter siccantem, ut & ustoriæ facultatis particeps sit. Quapropter eo cum ueteri adipe ammixto, quidam ad ueteres laterum dolores, & sicubi eiusmodi alius dolor infestet, utuntur. Fortiter enim discussorium medicamentū efficitur. Brassica porro syluestris siccior & calidior multo est quàm satiuā, quæadmodū omnia alia ferme syluestria satiuis fortitudine præstāt. Vnde neque citra offensionē intra corpus sumuntur. Discutit autē & extergit uehementius quàm satiuā. Cæterum marina brassica ultra hoc quod uentrē emollit, subsalsum nimirum ac subamarum saporem habens, commoda quoque fuerit ad externos corporis usus, ad quos sanè eiusmodi qualitates conueniunt.

*Chrethmon.*

Chrethmon salsum quodāmodo in gustu est, unā cum modica amaritudine, propterea & uis ipsius exterforia simulque siccatoria existit. Vtraque tamen facultate amaris cedit.

*Crithæ,*



*Crithæ, Ordeum.*

Ordeum primi ordinis est siccantium ac frigefaciens, habet & modicum quid exterforiū, & paulò magis siccatur quàm fabarum farina à cortice depurgata. In reliquis omnibus forinsecus usu consimilia existunt. Verum in cibo acceptum ordeum, hoc amplius fabis habet, quòd in coctura flatuositatem deponit, fabæ autè quomodocumq; coquatur flatuositas permanet. Crassioris enim substantiæ faba est quàm ordeum, & propterea etiam magis quàm ordeum nutrit. Ordeum uero succum generat tenuem & exterforium quid habentem. Nihil igitur calfacit corpus quomodocumq; tandem præparetur. Verum humectat & siccatur diuersimodè præparatum. Etenim polenta ex ordeo tosto facta, manifestè apparet siccare. Pisana uero humectat, quū uelut conuenit, præparatur. Panes autè ordeacei omnes minus nutriūt quàm triticeī, & magis uentrem subeunt quàm illi. Cæterū polenta ex ordeo tosta facta magis quàm ordeū siccatur, & modicum alimētum corpori sufficit quomodocumq; coquatur. Eadem ex uino Aminæo austero pota aluum siccatur. At uero maza (uocāt autè sic polentam ordeaceā liquore aliquo subactā, uelut sapa, aut melle, aut alio quopiam) quæ etiā cruda comeditur, quomodocumq; præparetur, minus quàm panes ordeacei concoquitur, & uentrē magis flatu implet, & si diutius in ipso moretur, turbationē efficit. Quū enim ordeum ex natura non parum furfuris habeat, torrefactum ordeū idipsum furfuraceum & siccus, & magis difficulter confringi potens habet, imò & id quod utile ex ipso in corporis alimentū cedit, siccius euadit. Quicquid igitur furfuraceū & durum in ipso est, quemadmodum forinsecus apparet quòd aqua non dissoluatur, eodē modo neq; in uentre dissoluitur maceratū, sed permanet inconfectū uelut est acceptum. Quū igitur neq; concoquatur neq; in uenas distribuatur, per uentrē secedit, & præsertim quū extergēdi uim ex ordeo habeat: magis autem secedit infernè sepius subacta ac trita. Si uero & mel assumpserit, adhuc citius subit. Porro quod crimnō Græci uocant, crassiorq; farina tum tritici, tum zæ existit, magis alit quàm polenta, sed ægrius concoquitur. Vocatur ex ea sorbitio puls, & quæ ex zea fit uentrem lenius aliquanto sistit, magisq; si torreatur.

*Crinon, Lilium.*

Lilij flos temperamentum mixtum habet, ex substantia quadam tenuium partium terrea, ex qua etiam in gustu amaritudinē offert, & quadam aquosa temperata, unde & oleum ex ipso lenis tum discussoriæ, tum mollientis facultatis existit, et ad uteri duritias aptū. Radix etiā ac folia per se trita, siccant & extergunt ac moderate discutunt. Est enim radix primi ordinis exterforiū, qua gratia & ambustis conducit. Radicem itaq; assatam, deinde rosaceo trita ambustis imponunt usq; ad cicatricis inductionem. Nam & alias omnia ulcera optimè cicatrice includit. Sed & uterū emollit, & menses promouet. Folia quoq; præcocta usq; ad cicatricem inductā imponunt, non ambustis solū, sed etiā ulceribus. Reponimus aliquando & foliorum succū coctum cū aceto & melle ad liquidioris mellis cōpagem, ita ut succi partes quinque sumantur, mellis autem & aceti utriusq; pars una, siq; commodum pharmacū ad omnia uehementi resiccatione indigentia citra mordacitatē, uelut sunt uulnera ma-

gna, & maximè quæ circa capitis musculos fiunt, itē ulcera inueterata, fluidaq; ac egre recipiētia cicatricē.

*Crocodilion.*

Crocodilij semen acre est, & aromaticum, urinā ciens, & menses ducens, ut & calidæ facultatis sit discussoriæq; ac siccatoriæ. Succus caulis & seminis cōsimilem uim habet, & nephreticis prodest. Radix expuitiones è pectore fortiter adiuuat. Estq; minus acris quàm semen, uerum non minus amara. Sanguinem quoque per nares ducit.

*Crocus.*

Crocus habet quidem aliquid modicè adstrictorium, quòd terreum frigidum esse ostensum est. Dominatur autè in ipso calfactoria uis ac qualitas, ut ex tota substantia sua secundi ordinis sit calfaciētiū, primi siccantium, & propterea etiam concoctorium quid habet, quòd modica illa adstrictione adiuuatur.

*Crommyon, Cēpa.*

Cēpa quarti ordinis est calfacientium, substantia ipsius magis crassarū partiū existit. Vnde & hæmorrhoidas aperit apposita, & cum aceto illita in sole uiridines extergit, & alopecijs affricta citius quàm alcyoniū pilos prouocat: comesta calfacit corpus acrimonia sua, & crassos ac uiscosos humores attenuat. Inflat autè uentrē propter crassarū partium substantiā.

*Cyamus, Faba.*

Faba frigefaciendo ac calefaciendo mediū temperamētū propinquissimè accedit, caro eius modicæ cuiusdā exterforiæ facultatis particeps est, quemadmodū cortex adstrictoriæ. Quapropter aliqui medicī fabā integram cum corio suo in posca decoctam, dysentericis & coeliacis ac uomentibus exhibent. Est autem edulij ratione, si quod aliud. ægre concoctile & flatuosum, etiam si quàm diutissimè coquatur, & quomodocumq; præparetur, ad excreationes tamē pectoris ac pulmonis cōmodum. Et uiridis quidem faba comesta, magis aluū subit, uerum minus quàm arida ingesta nutrit. Torrefactæ tamē fabæ flatuosum deponunt, sed ægrius concoquuntur, & tardius comedant, & crassum succū generāt. Pharmaci autè loco faba forinsecus imposita, citra molestiā siccatur. Et sanè ad podagricos sæpe ea usi sumus cocta ex aqua, deinde adipe suillo ammixto. Ad neruos uero cōtusos & ad ulcera, farinam eius imposuimus aceto mulso, aut uino mulso coctā, rosaceo etiam addito, si inflāmatio adesset. polēta uero addita, ad inflāmatos iam ex plaga. Est & testium ac mamarum uule cataplasma: Solet enim has partes inflammatas modicè perfrigerare, maximè ubi lacte in ipsis in casei speciem coagulato ubera fuerint inflammata. Nā lac ab eiusmodi cataplasmate extinguitur. Quemadmodum etiam puerorum pubes, farina fabacea cataplasmatismodo intacta, diutissime impubis permanet.

*Cyclaminus.*

Cyclaminus uariā uim habet. Nam & extergit, & disciscat, & uenarū oscula operit, & attrahit, & discutit: Succus enim ipsius hæmorrhoidas aperit, & aluum irritat uiolenter, appositus. Sic & tubercula, & strumas, & alias duritias discutit, compositionibus discussorijs ammixtus. conuenit & suffusis oculis cum melle sublitus, & præterea per nares purgat. Adeo autem forti uī præditus est, ut etiam imo uentri illitus, aluū subducatur & fœtus corrūpat, sed & in pessi forma appositus similiter fœtū perimit. Tota radix succo



succo imbecillior est. Est tamen etiam ipsa uehemens: Nam pota & apposita menses ciet, & ictericis confert, non uiscus solum ipsum uidelicet iecur expurgans, sed bilem in toto corpore per sudores euacuans. Quare ab eius potu adiuuare omnibus modis oportet sudorum excretionem, corpore coniecto ac uberius calfacto. Copiam eius drachmas tres, aut summum quatuor excedere non oportet, ex passo aut aqua mulla. Exterget & cutem, quapropter maculas solares, & alopecias ac similia sanat, prodest & indurato lienitum recens, tum sicca in cataplasmate imposita. Quidam aridam radicem etiam anhelatoribus exhibet. Eadem arida tusa & per tenuissimum cribrum excreta, una cum caryophyllis, ita ut radicis sit uncia una, caryophyllorum grana x x i. naribus insufflata, crassos & uiscosos humores à capite purgat, unde antiquos capitis dolores sanat, & morbo comitiali magnopere opitulatur.

*Cuminum.*

Cymini semine præcipue utimur. Est autem facultatis calfactoriæ, urinam ciet, & flatus dissipat, tertij ordinis calfacientium existens.

*Cyparissus, Cupressus.*

Cupressi folia & germina pilulæque recentes ac teneræ, magna uulnera in duris corporibus glutinât, ex quo manifestum est quod siccatoriam uim habent, absque manifesta acrimonia ac caliditate. Plurimam autem habet amaritudinem, & multo ampliorem acerbitatem uniuersa planta. Tantum uero est in ipsa caliditatis, quantum satis est ad deducendam acerbitatem in altum, citra calfactionis aut mordacitatis inductionem. quapropter humiditates in profundo, in humectis putredinosisque affectionibus consistentes, citra molestiam simulque securè depascitur, altera non amplius attracta. Atque sic herniosis confert in cataplasmate imposita. Siccatur enim & robur addit corporibus ex humiditate laxis, mergente se nimirum in altum uis adstringendi, quum deducatur per ammixtam ipsi moderatam caliditatem. Vtuntur ipsa quidam & ad carbunculos ac herpetas polenta ammixta.

*Cyperus, Iuncus quadratus.*

Cyper radices maxime in usum ueniunt calfacientes ac siccantes citra mordacitatem: Vnde & ulcera ob nimiam humiditatem ægre recipientia cicatricem, mirabiliter sanât. Habent enim quid adstrictorium, & propterea oris ulcerationibus commodant. Habent & uim quandam sectoriam, qua & calculosis prosunt, & urinas ac menses ciet.

*Cypros, Ligustrum.*

Ligustri arboris folia & uirgulta ac flores in usum ueniunt, mixtæ facultatis ac temperamenti existentia. Habent enim quid discussorium ex aquosa substantia moderatè calida: Habent & quid adstrictorium, ex terrea frigida. Vnde decoctum foru ambustis prodest. Commodat & ignitis inflammationibus ac carbunculis, citra molestiam ac mordacitatem siccans. Sed & commanducata ulceribus oris sponte productis, & maxime ignitas aphthas referentibus conducunt. Folia siccata in umbra tusaque ac cribrata, mox in aqua ad calidum cinerem cocta, modico rhoë culinario inspersa, & aceti momento, bonum cataplasma præbent in podagricis ac chiragricis, in ipsis maximis inflammationibus imposita. Nam & inflammationes sedat, & fluxiones repellit, & quod iam in locis continetur

discutit per meatus oculos, quemadmodum per sudorem. Lædit tamen hoc cataplasma colorem, & maxime ungues. Quapropter prælinere locos oportet, liquido rosaceo cerato. Ipsum autem cataplasma integendum est ricini folijs, aut carpasi, si adsint.

*Cytisum.*

Cytisi folia discussoria sunt facultatis ammixta tepida aquosa, quemadmodum folia maluæ.

*Conion, Cicuta.*

Quod cicuta extremè frigidam uim habeat, omnes norunt, & propterea ex summa illa frigefactione etiam enecat ac occidit.

*Coni fructus, Nux pinea, Cocalus, Strobilus.*

Coni fructus, quem & Cocalum, & Strobilum, ac Pineam nucem appellant, integer quidem uiridis, amaritudinem quandam & acrimoniam cum humiditate habet, & propterea pectore suppuratis commodus est, itemque alijs quibuscunque ex pectore ac pulmone facilis screatus ac per tussim relectio experitur. Nucleus eius qui in cibi usum uenit, alimentum præbet ægre concoctile, ualidum, ac multi succi, propter oleositatem. Verum medicamenti loco asperitates læuigat, maxime ubi aqua maceratus omnem suam acrimoniam deposuerit.

*Cancani radix.*

Cancani radix uim habet moderatè siccatoriam citra mordacitatem, substantiam autem crassarum partium meatus obducentem. Vnde uino macerata uelut tragacantha, & delineta, arteriæ asperitates sanat. Nihilominus si quis ipsam manducet, succus præterfluens arteriæ prodest, similiter ut glycyrrhizes succus.

*Caucalis.*

Caucalim aliqui daucum syluestrem uocant. Est autem similis ipsi & gustu & uiribus, calfacit enim uelut ille, & siccatur, & urinam ciet, et muria codita reponitur.

*Carpesium.*

Carpesium simile est ei quod phu appellatur, & gustu & uiribus, uerum amplius tenuium partium existit, quapropter & magis quam illud exterget uiscerum obturationes, & urinas mouet, & renes expurgat calculosos. Non tamen in tantum tenuium partium est ut pro cinamomo in usum assumi possit, si cinamomum haberi nequeat, quemadmodum Quintus fecit. Præstat quidem igitur Ponticum Laertico, non tamen etiam hoc ipsum uiribus cinamomo par est, sed etiam ab optima casia non modico intervallo relinquitur. Vtraque appellatio à quibusdam Pamphyliæ montibus est, in quibus plurimum prouenit.

*A. Lathyri, Cicercula.*

Cicerculae consimilem ochris & phaselis substantiam habent, itemque similem succum, sed compage crassior, & propterea aliquo modo magis hære quam illæ alunt.

*Lathyrus.*

Lathyridem tithymalli speciem esse quidam aiunt. Semen eius purgatoriam uim habet.

*Lapsana.*

Lapsana in cibo accepta mali succi est, in cataplasmate imposita exterforium quid ac discussorium habet.

*Lapathum, Rumex, Oxylapathum.*

Lapathum moderatè discussoriam uim habet, & sanè caliditatis particeps est. Renum calculos radix eius confringit, & scabiem ac corporis asperitates sanat ex aceto cocta & affricata. At uero Oxylapathum mixtam uim



uim possidet. Habet enim repulsoriam unā cum discussoria facultatē. Semen ipsorum manifeste adstringit, unde & dysenterias & alui profluvia sanat, praesertim oxylapathi. Ceterum Hippolapathum in paludibus nascitur, eadem ui praeditū, uerum imbecilliore. Syluestris porro lapathi radix, quam mylen appellat, ex aceto cocta siue uino, dentes corroborat, eorūq; dolores sedat, si eo decocto calido colluatur.

*Limonium, siue Cynoglossum.*

Limonij semen austerum existens cum uino exhibent coeliacis, & dysentericis, & haemoptoicis. conducit & ad fluxum muliebrem.

*Lichen siue muscus petrarum.*

Lichen petrarum exterforiae simulq; frigefaciētis moderate facultatis est, & siccantis iuxta utramq; facultatem. Sanat impetiginem cognominem sibi apud Graecos morbum.

*Leontopodium siue Leontopetalon.*

Leontopodij radice maxime utimur, discussoria & calfactoria ac siccatoria, in tertio ordine.

*Lepidium.*

Lepidium quarti ordinis est calfacientium.

*Leucoion.*

Leucoij uniuersus frutex exterforiam & tenuium partium uim habet, maxime tamē flores praesertim sicciores. Quare & cicatrices oculorū crassas attenuant, & decoctum ipsorū menses ac secundas promouet, & foetus immortuos expellit. Nam & uiuum perimit foetum in potu acceptū. Quod si quis uehementiam facultatis ipsius multae aquae mixtura aut aliquo alio eiusmodi liquore mitiget, habebit et ad inflammationes commodum medicamentum. Sic & decoctum ipsius si non meracū fuerit, fomento uteri inflammationes sanat, & maxime diuturnitate induratas. Idem cum cerato ulcera aegre cicatricem recipientia curat. Semen ipsius uiribus praedictum cōmodissimū est potum duarum drachmarū pondere, aut appositum cum melle, ad ciendos menses, & foetus uiuos quidem corrūpit, mortuos autē eiicit. Radices cum aceto in cataplasmate impositae, lienes induratos sanant, itemq; induratas inflammationes.

*Leuce, populus alba.*

Populus alba arbor temperamentum mixtum habet, ex substantia aquosa tepida, & terrea attenuata. Vnde & exterforiam uim habet. Gustu autem subamara existit.

*Libanotus, Thus.*

Thus calfacti ordine secundo, siccatur primo. Habet & quid adstrictorium, quod in albo uix percipere est. Cortex ipsius uim adstringendi manifeste habet, ob quam etiam praclare siccatur, ut secundi ordinis siccantium completi existat. Est & crassarum partium & minime acrimoniae particeps. Ob has igitur qualitates ac uires, usus eius frequens est medicis, in haemoptoicis ac stomachicis, profluuijsq; alui, coeliacisq; ac dysentericis, nō solum his quae extrinsecus imponuntur, sed & quae intra corpus sumuntur ipsum ammiscuentibus. Fit ex eo & fuligo hoc modo. Granum thus singulatim forcipe apprehensum & à lucerna accēsum, in uas fictile cauum nouū imposito, deinde aeneum operculum concauū probe detersum superposito, suppositis tamen ad utrumq; operculi labrū lapillis quatuor digitorū altitudinis, ut locus sit alterum supponēdi granum, prius quā penitus

extinguatur, donec sufficiens fuligo fuerit collecta. Ceterū externa operculi aenei pars assidue per spongiā ex aqua frigida extergeatur, ita enim omnis fuligo adhaerebit, operculo nimirum non ualde concalfacto. Dersa itaque priore fuligine per pinnam, idem facias, quousq; collibuerit. Sed & exusti Thuris cinerem priuatim colliges. Melior est autem fuligo. Vim habet mitigatoriam inflammationum in oculis, sedat fluxiones, repurgat ulcera, replet concaua, sistit carcinomata. Eodem modo parantur fuligines & ex myrrha, & ex styrace. Conueniunt ad eadem omnes. Quin & aliarum lacrymarum fuliginem eodem modo colligere licebit.

*Libanotides.*

Libanotides omnes similem uim habent mollitoriam ac discussoriam. Succus autem & radices & herbae melle ammixto, hebetudinibus oculorum medetur ex humorum crassitudine obortis. Sunt enim libanotides participes exterforiae ac incisoriae facultatis.

*Lignys, fuligo.*

Omnis fuligo siccatur, quapropter & substantiā terream habet, & reliquias ignis à materia exusta, sed has tamen tempore modico. Tota autem natura ipsius siccatoria est, terrea & tenuium partium. Partiales eius differentiae sunt iuxta materiam exustam, prout ea ipsa calidior aut frigidior aut mordacitatis experta existit. Thuris porro fuligine utuntur ocularibus compositionibus ammixta, maximē his quae ulceribus conferunt. Nam & haec expurgat ipsaq; carne explet. Terebinthinae quoq; ac myrrhae fuligo similiter ut thuris nihil offendit. Verum styracis his fortior est, atq; adhuc magis quae ex pice liquida fit, quam superat adhuc cedriae fuligo. Utuntur autem & acrioribus, & in palpebris glabris, & angulis oculorum corrosis, oculisq; humectis absq; inflammatione.

*Ligusticum.*

Ligustici radix & semen ex calfacientium ordine sunt in tantum ut & menses moueant, & urinas propellant, flatusq; discutiant.

*Lini semen.*

Semen lini comestum flatuosum est, etiamsi sit torrefactum, ita recrementosa humiditate plenum est. Est autem calidū in primo ordine, humiditatis ac frigiditatis in medio consistens. Stomacho incommodatur & aegre concoquitur. particeps est tamen facultatis ciēdi urinā. & torrefactū uentrem aliquatenus sistit.

*Lobi.*

De lobis scriptū à nobis est quū de dolichis ageremus.

*Linoxostis, Mercurialis.*

Mercuriali utuntur omnes ad uentris purgationes, ueruntamē si quis eius usum in cataplasmatibus experiri uelit, reperiet eam multum discussoriam. Et semen huius nondum siccatum experientia docet, tubercula & eminentias in corpore, uulgo Carphila dicta, dissipare, si quis ipsa diligentius semine eo confricat.

*Lonchitis.*

Lonchitidis triangulare semen haste simile habetis, radix urinam ciēt. Eius uero quae scolopendrio similis est, folia uiridia uulneribus glutinandis conducunt. Sicca eadem ex aceto pota, lienes induratos sanant.

*Lycium, Pyxanthos.*

Lycium siue pyxanthos spinosa est planta, ex qua quod Lycium appellat fit, quo ad sugillata utimur, & ad sedis ac oris inflammationes ac ulcerationes,

c. herpe



herpetosq; ac putrefactiones, & ulcera maligna, & intertrigines ac paronychias qui sunt unguum abscessus. Habet enim vim siccandi ex secundo ordine, alias ex diuersi generis substantijs compositum: Altera tenuium partium, ac discussoria & calida: Altera terrea frigida, ex qua & moderata adstrictionem habet. Quapropter & ad diuersos effectus hoc medicamento utuntur, ut exterforio quidem, adsumentes ad ea quae pupillis tenebras offundunt, ut adstrictorio uero, coeliacis & dysentericis ac fluxui muliebri exhibentes. Caeterum Indicū Lycium ad omnia commodius existit.

*Lysimachium.*

Lysimachium predominantē habet qualitatem adstrictoriam, per quam & uulnera glutinat, & eruptiones sanguinis narium compescit inspersa, sed & alias sanguinis eruptiones supprimit tū ipsa, tū succus ipsius adhuc amplius, Quare & potus & infusus dysenterias ac sanguinis reiectionē, & fluxum muliebrem sanat.

*Lotus, Trifolium.*

Lotus satiuus, quem aliqui trifolium uocant, moderate extergendi vim habet, itemq; siccandi, uerum in coniugatione caliditatis ac frigiditatis temperatus est. At uero syluestris lotus in Aphrica plurimus prouenit. Semen eius secundi ordinis est calfacientium. Habet & quid exterforium, Semen autem Aegyptij etiam ad panificium accipitur.

*Lotus arbor.*

Lotus arbor adstrictoriae qualitatis non multae particeps est. Est autem tenuium partium ac siccatoria. Ramentum itaq; lignorum eius, & ad fluxum muliebrem, & dysenterias, ac coeliacas affectiones conducit. Coquitur aliquando in aqua, aliquando in uino, prout usus postulat. & non solum infunditur, sed etiam bibitur. Atqui & defluos pilos cohibet moderate adstringendo ac siccando.

*M. Macer.*

Macer cortex est qui ex India affertur, adstringens cum modica acrimonia, quapropter & siccatur: Est & tenuium partium, propter odorem. & propterea coeliacis ac dysentericis compositionibus ammiscetur, in tertio ordine siccantium locatus. Iuxta caloris & frigiditatis differentiam nihil insigniter praestans.

*Malabathri folium.*

Folium malabathri spicae nardi cōsimilem vim habet.

*Malache, malua.*

Malua syluestris leniter discussoria, & paululum molitoriae facultatis particeps est. Satiuā pro eo quod aquosa humiditate participat, etiam uiribus debilior existit. Subit autem uentrem non solum ob humiditatem, sed & ob uiscositatē, maxime ubi cum oleo & garo accipiat, uino modico cibi tempore irrorato. Semen ipsorum tanto fortius est, quanto siccus. Quin & Dēdromalache appellata huius generis est, sed magis quam praedictae discussoria. Nominatur autem & Althaea.

*Mandragoras.*

Mandragoras predominantem frigidam vim habet, ut tertij sit perfrigerantium ordinis. particeps est tamen & modicae caliditatis ac humiditatis in malis suis. Vnde & soporatoriam vim haec possident. Radicis cortex fortissimus existens, non solum frigefacit, sed etiam siccatur. Reliquum internū debile existit.

*Marathrum, foeniculum.*

Foeniculum fortiter calfacit, ut ex tertio ordine censeri

possit. Siccatur ordine primo. & propterea etiam lac generat, & suffusis oculis iuxta eandem rationem opitulatur. Ciet & urinas & menses ducit.

*Mastiche.*

Mastiche alba & chia, ex contrarijs quodammodo facultatibus composita est, adstringente & molliente. Quapropter & stomachi, & uētris, & intestinorum ac hepatis inflammationibus conuenit, secundo ordine calfaciens ac siccans. Nigra mastiche quae Aegyptia appellatur, magis exiccat quam illa, & minus adstringit, unde & commodior est quodammodo ad ea quae fortiore discussione opus habent.

*Melanthium, Nigella.*

Melanthium calfacit ac siccatur tertio ordine, apparet & in eo partium tenuitas. Sic itaq; & destillationes sanat, calidum linteolo illigatum naribus admotum, ut assidue odor eius nares percellat. Sed & potum flatus uel maxime discutit. Occidit & lumbricos, non modo comestum, sed etiam foris uentri impositum, ob amaritudinē. Lepras & clauos ac uerrucas myrmecias, hoc est, fornicarias dictas abolet, & menses promouet ob crassitudinem & uiscositatē humorum suppressos, prodest & alopecijs uustum, & cum oleo tritum, ac illitum. Sic etiam recta ceruice spirantibus. Et in summa ubi disseccare & extergere ac siccare calfacereq; opus est, commodissimum medicamentum existit.

*Melilotum.*

Melilotum mixtas vires habet. Nam & adstringit, sed & discutit & concoquit. Amplius enim de calida substantia quam de frigida in se complectitur.

*Mel.*

Mel calfacit ac siccatur secundo ordine. Est autem simplicis quam maxime cum facultatis, tum temperamenti, exterforiae uidelicet appellatae. Estq; maxime tenuium partium, praesertim quod prouenit ubi thymus plurimus nascitur. Quum autem tenuium partium sit, necessario etiam quid acre possidet, per quod uentrē ad excretionem impellit. Diximus autem quod extergit, haec itaq; exterforia uis si ipsi adimatur, magis ad urinam ciedam commodum reddetur, itemq; ad alimenti distributionem ac nutritionem accommodatus. Adimi autem optime potest, aqua plurima ammixta, & cocto melle, donec spumare desierit, ita ut spuma assidue auferatur. Aqua uero mulsa non cocta uentrem subit antequam concoquatur. Itaq; senibus & frigidis corporis temperaturis mel commodum est. Verum in aetate uigente constitutis ac calidis, in bilem transit ante concoctionem. Mel porro coctum per se, minus acre ac mordax euadit, unde & magis nutrit, & ad sinus glutinandos commodissimum existit.

*Melissophyllum.*

Melissophyllum marrubio uiribus simile est, sed multo tamen ipso inferius, & ob id neq; usus eius ualde expetitur: Quum enim ubiq; marrubium abundet, superuacaneum est melissophyllo uti. Si tamen non adsit marrubium, pro ipso succedere potest in eisdem usus, ut tamen efficaciae eius mance memores simus.

*Mecon, Papauer, Thylacitis, Rhoeas.*

Papauer omne perfrigerantem vim habet: Sed hortensis, thylacidis Graecis appellatae, semen moderate somniferum est. Verum Rhoeadis semen fortius frigefacit: Quare citra laesionem eo quis non utitur. Syluestris autē semen nigrum existens, medicatum iam est multum



multū frigefaciens, maxime Thebanī. Sed & succus fortiter perfrigerat, usq; ad stuporē & mortificationē. Est enim quartī & extremī ordinis perfrigeratiū.

*Mecon ceratitidis, Papauer cornutum, Paralium.*

Papauer cornutum Græcis etiam paralium uocatur, quoniam serē circa mare nascitur. Vim habet secto-  
riam & extersoriā. Quare radix eius cocta in aqua ad dimidias, hepaticis affectionibus prodest, folia & flores sordida ualde & maligna ulcera iuuāt. Sed ab ipsorum usu recedendum est, ubi ulcera fuerint depurata. Nam usq; adeo extergere solent, ut & depura carne aliquid eliquent ac consumant, & ob id etiam crustas ulcerum tollunt.

*Mespilum.*

Mespili arboris fructus acerbus est, & uentrem plurimum supprimit.

*Melea persice, Malus persica.*

Malus persica & folijs & ramis amaram qualitatem prædominantem habet, quare & lumbricos occidit trita umbilico imposita, & aliās discussorium medicamentum existunt. Fructus eius persicum appellatum, humidioris & frigidioris est temperamenti. Caro eius comesta facile corrumpitur, & omnino uitiosa est. Quare nō oportet ipsa, uelut aliqui faciunt, à reliquo cibo ingerere. Corruptur enim & uentri innatant. Porro uniuersalis huius regulæ perpetuū memoriē esse oportet: Quod quęcūq; mali succi sunt, humida autē & lubrica, & quæ facillē alio secedere possunt, ea prius quā alia comedere oportet. Sic enim & ipsa cito subeunt, illisq; uia præstruunt. Quæ uero postrema sumuntur, etiā alia simul corrumpunt.

*Melea Armeniace, Malus Armeniaca.*

Armeniaca mali fructum præcocia appellant. Est autem humidus ac frigidus hic fructus secundo ordine, ubi sanē fuerit maturus, à persico in hoc differt, ipsoq; præstat, quod non similiter in uentre corrumpitur, neq; acescit. Multis uero et iucundior apparet, & propterea stomacho accommodator.

*Malus medica, siue citrea.*

Mali medicæ fructus ab omnibus citrium appellatur. Id in semine acidam qualitatem & uim siccatoriam prædominantem habet, ut tertij ordinis sit siccantiū ac perfrigerantium. At uero in cortice habet quidem siccatoriam uim in secundo ordine, nō tamen frigidam qualitatem, propter aromaticitatem. Caro ipsius crassi succi est & frigida, ob duritiem: semen autem penitus edi non potest, neq; quod acidum esse diximus, neq; eius nucleus qui reuera semē existit, amaram qualitatem, & discussoriam ac siccatoriam uim in secundo ordine habens. Sed & folia siccandi ac discutiendi facultatem habent.

*Mala omnia.*

Cæterū in alijs malis magna est differentia. Quæcūq; enim adstringunt, frigidum ac terreum succum habent; Quæ uero acida apparent, frigidum quidem, sed tenuium partium habēt, mediæ autem temperaturæ sunt dulcia, ad caliditatem repentiā. Austerorū igitur malorum usus est, quum aut ob intemperiem calidam aut humiditatem multam, ueter debilis est. Acerborum uero, ubi eadem multum fuerint aucta, nam adstringentiā quantum in ipsis est, supprimunt infernas excretiones. Acida autem cient. Quum igitur suspicio fuerit crassum humorem in uentre collectum esse, non ualde frigidum, hæc exhibebis. Nam

& hunc diffecant & infernē subducunt, & propter ea excrementa humectant. Vbi uero purum repere-  
rint uentriculum, ipsum amplius supprimunt.

*Meon.*

Mei radices in usu sunt in tertio ordine calfaciētes. Siccant in secundo, humiditatem retrimentitiā in sese complexæ. Vrinās itaq; cient, & menses prouocant potu: Amplius acceptę capitis dolorem inducunt, & propter humiditatem, flatu.

*Morus, Mora, Sycamina, Sycomora.*

Mori arboris fructus, sicamina & sycomora frequenter à plerisq; Græcis uocatur. si quidem igitur matura & ante reliquum cibum in uentriculum purum ingerantur, celerrimē per intestina secedunt, & alijs cibis uiam præstruunt. Verum post cibum acceptæ, aut uiciatum humorem in uentre reperientia, celerrimē corrumpuntur, & peregrinam quandā, quæ dici commodē non possit corruptionem inducunt, similiter ut cucurbitæ & pepones, ubi non fuerint cōcocti. Tempus usus moris est itidem ut peponibus & cucumeribus, ubi siccum & calidum fuerit uentriculi corpus, & ex necessitate etiā hepatis. Tunc enim solummodo omnibus huiusmodi utiliter quis utetur, & ubi quis lōgo itinere aut multo ardore fuerit defatigatus. Tunc enim prosunt squalorem corporis rigantia, & moderatē perfrigerantia. Mora imma-  
tura sole siccata diligenter ac reposita, cōmodum adstrictorium medicamentum exhibent, ut etiam dysenterias sanent, & affectiones coeliacas, & alias fluidas. Tunduntur autem & obsonijs miscētur, quemadmodum Rhodis fructus. Bibuntur etiam cum aqua & uino. Cæterum cortex radice arboris purgatoriam uim habet cum quadā amaritudine. Quare & latum lumbricum occidit seruefactus cū uino, eoq; calido meraco poto cyathi mēsurā, & diu suppressos menses prouocat.

*Mycetes, Fungi.*

Fungi frigidum ac humidum abunde edulium sunt, unde & propē ad uenenatricem uim accedunt, & sanē quidam ex ipsis occidunt.

*Myos otis, Auricula muris.*

Muris auricula siccatur ordine secundo, nullam manifestam qualitatem habens. Succus eius cyathi mensura cum zytho potus, lumbricū latū efficaciter expellit.

*Myrica, Tamarix.*

Myrica incisoriā & extersoriā uim abunde possidet, citra manifestam siccationem. habet & quid adstrictorium, & ob has facultates lienibus induratis conducit, radicibus aut ramulis aut folijs cum aceto aut uino coctis. fructus & cortex non modicæ adstrictionis participes sunt, simulq; extergent, & tenuium partium existunt. Vtæ myricæ cinis siccandi uim acquirit.

*Myrsine, Myrtus.*

Ex contrarijs hæc planta composita est substantijs, prædominatur tamē in ipsa terreum frigidum. Habet & quid tenuium partium calidum, unde fortiter siccatur, & omnes partes ipsius restringendi uim habēt, tum forinsecus corpori impositæ, tum intrā assumptæ.

*Moly, Ruta sylvestris, Harmala, Besasa.*

Moly aliqui rutam syluestrem uocant, aliqui harmala. Syri Besasa. Vis eius tenuium partium & calida est tertio ordine, Vnde & secat & discutit crassos & uiscosos humores, & urinam promouet. Qui ruri ha-



bitant utuntur eo in diuturno capitis dolore, aqua coquentes, & caput inde rigantes. Similiter & ad reliquas corporis partes perfrigeratas.

N *Nardostachy*, *Nardi spica*.

*Nardi spica* primo ordine calfacit, siccatur secundo completo. Composita est ex substantia multum adstringente, & acri calida non multa, & quadam modica subamara. Quare & ad iecur & ad stomachum merito conducit, pota & forinsecus imposita. Urinas citet quoque, & stomachi morsus sanat, & fluxiones ventris ac intestinorum resiccatur, ite capitis & pectoris, fortior est Indica, nigrior quam Syriaca existens.

*Nardus Celtica*.

*Celtica nardus* consimilem in genere uim cum praeditis habet, sed ad omnia debilior est, praeterquam ad urinas ciendas. Est enim calidior illis, sed minus adstringit.

*Narthex*, *Ferula*.

*Ferulae* semine attenuat & calfacit. Interna eius pars, medulla appellata, adstringentis cuiusdam qualitaris particeps est, ob quam haemoptoicis & coeliacis prodest.

*Napy*, *Sinapi*.

*Sinapi* calfacit ac siccatur quarto ordine. Optimum est Aegyptium aut Syriacum, & quod mole minus est, & minus cruentum coloratum.

*Narcissus*.

*Narcissi* radix siccatoriam in tantum uim habet, ut uulnera magna glutinet, etiam si tendines sint concisi. Habet & quid exterforium ac attractorium.

*Nerium*, *Rhododaphne*.

*Nerium* aut *Rhododaphne* frutex est omnibus notus, qui si forinsecus corpori in cataplasmate imponatur, discussoriam uim habet. Si uero intra corpus sumatur, perniciosus & uenenatus non solum hominibus, sed & plurimis pecoribus existit.

*Nymphaea*.

*Nymphaeae* radix & semen uim habet siccatoriam leuem: Itaque & uentris fluxiones, & seminis per somnum effluxum, aut si etiam alias immodice feratur, sistunt. Prosumt & dysentericis. Caeterum *Nymphaea* quae albam radicem habet, uehementioris facultatis est, ut & muliebrem fluxum sanat. Bibitur & ipsa & quae nigram radicem habet, in uino nigro austero. Possident & quid exterforiae facultatis, unde & uirilignes sanant aqua rigatae, & alopecias cum liquida pice, praestat ad haec quae nigram radicem habet, ad reliqua quae albam.

Ξ. *Xanthium*, *Lappa*, *Phasganion*, *Philantropos*, *Choeradolethron*.

*Xanthium*, quidam phasganium, quidam philanthropon, alij choeradolethron appellant. Semen eius discussoriam uim habet. Decoctum corticis radicis positum lienes consumit, & dentes motos firmat eiusdem decoctum ex uino collutum.

*Xiphion*, *Gladiolus*.

*Gladioli* radix praesertim superior, uim attractoriam, discussoriam, atque adeo siccatoriam habet.

O. *Oenos*, *Vinum*.

*Vinum* ex secundo ordine est calfacientium. Antiquum ualde, ex tertio, quemadmodum nouum mustum, ex primo. Eadem proportio est siccitatis ad caliditatem. Quandoquidem uero plurimas in uino differentias reperimus, distinguendum est de ipsis quam breuissimis id fieri potest. Rufa itaque & crassa ex

omnibus ad sanguinem generandum commodissima sunt, ut quae parua egeant in sanguinem transmutatione. Deinceps nigra simulque dulcia ac crassa. Deinde colore quidem rufa aut nigra, compage uero crassa & habentia simul adstringentem qualitatem. His minus ualent alba, simulque crassa, ac acerba, ad nutritionem: Minime uero omnium alium colore alba, compage tenuia, & quodam modo aquae similia. Concoquuntur autem in uentriculo & magis distribuantur dulcia quam austera, utpote calidioris uis praedita, sed & uentrem magis subducunt. Caeterum ualde crassa, & tardius concoquuntur, & tardius in corpus distribuuntur, ubi autem uentriculum robustum nata fuerint, ut probe concoquantur, amplius nutrimentum corpori praebent. Manifestum est autem quod & aluum sistunt, & urinae ciendae incommoda existunt, in quibusdam crassum succum generantia. Quaedam ex ipsis etiam iecur & lienem ac renes obturant, atque inde aliqui in aquam inter cutem incidunt, aliqui calculo laborant ex nimio ipsorum usu, & praesertim senes. Optimum uinum est, & sanis, & ex morbo se recolligentibus commodissimum, quod colore rufum, compage tenue, & leniter subadstringens existit.

*Oxos*, *Acetum*.

*Acetum* mixtas substantias frigidam & calidam, utraque tenuium partium habet. praedominatur tamen in ipso frigida substantia, quemadmodum in principio huius libri praediximus. Est autem medicamentum abunde siccatorium, ut tertij ordinis sit completi, ubi sane forte extiterit.

*Opos*, *Lasus*, *Succus Cyrenaicus*.

*Lasus* siue succus Cyrenaicus, omnibus alijs calidior & magis tenuium partium existit, & ob id etiam magis discussorius. Verum tamen & alij calidi sunt ac flatuosi, hoc est Medicus & Syriacus, quem *Lasus* appellat.

*Origanum*.

*Origani* herbae tres sunt species, omnes incisoriae & attenuatoriae, siccantisque ac calfacientis facultatis in tertio ordine. *Tragoriganus* autem aliquid adstrictorium assumpsit.

*Oxychoenos*, *Iuncus acutus*.

De iūco acuto dicitur in schoeni, hoc est, iūci mentione.

*Orobis*, *Eruum*.

*Eruum* siccatur secundo ordine intenso, calfacit primo. Quantum autem amaritudinis particeps est, tantum siccatur, & extergit, & obstructione liberat. Amplius sumptum sanguinem per urinam expellit.

*Orobanche*.

*Orobanche* frigidi ac siccis temperamenti in primo ordine est.

*Oryza*.

*Oryza* habet quid adstrictorium, quapropter uentrem suppressit. Et est edulium aegre concoctile.

*Orchis cynos*, *Testiculus canis*.

*Orchis* herba, quae cynos orchis, hoc est canis testiculus dicitur, duplicem radicem bulbosam habet, humidam & calidam, quapropter etiam sapore dulcis est, & maior quidem radix ob multam humiditatem, ad uenerem stimulat pota. Minor uero ad siccitatem repens impetus ueneris compescit.

*Orchis altera*.

*Orchis altera*, quam serapiada uocant, siccioris prioris uim habet: quare ad uenerem non similiter comoda est, Laxos



est. Laxos autem tumores in cataplasmate discutit, & ulcera sordida purgat, & herpetas sanat. sicca uero & putrefactis & malignis ulceribus medetur. Nā & subadstringens quid habet, per quod aluum superimit cum uino pota.

*Osyris.*

Osyridis herbæ ex qua scopæ fiunt, amara est qualitas. Verum uis obturatione liberans. unde & malignas circa iecur obstructions resoluit.

*Pancration.*

Pancratij radix & sapore & uiribus Scillæ similis est: quare aliqui etiam utuntur ipsa, scilla non præsentem, uerum multo debilior existit.

*Paliurus.*

Paliuri folia & radix adstringentem non obscure uim possident, quapropter & fluidum uentrem sistunt. Discussoriam autem in tantum habent, ut & tubercula curent, quæ sanè non ualde inflammata ac calida existunt. fructus incisoriae facultatis eousque est particeps, ut uesicæ calculos & confringat, & expurgat, & reiectionibus ex pectore ac pulmone auxilietur.

*Panax Herculeus, Opopanax.*

Panaces Herculeus est, ex quo Opopanax appellatus fit. qui succus calidus est & discussorius in tertio ordine, siccus in secundo. Cortex radice siccatur & calcificatur, sed minus quam succus. extergit tamen, & propterea ad ossa denudata, & ulcera maligna conducit. Exterget enim & siccatur, & carne replet citra mordacitatem. Semen calidum existens menses ducit.

*Pentaphyllum, Quinquifolium, Mercurij herba.*

Quinquifolium, quæ Mercurij herba dicitur, radicem habet siccantem in tertio ordine, minime uero acrem. quapropter multi usus est & tenuibus partibus prædicitum.

*Peplion.*

Peplij semen in usu est: Ducit bilem unā cum pituita. flatus quoque discutit uelut Hippocrates scribit.

*Pepon.*

Pepon maturus substantiæ tenuioris est: Immaturus crassioris, absterforia autē et incisoria facultate participat. Vnde & urinā ciet, & corpus illustrius reddunt, præsertim si quis semen siccet, deinde tuso & cribrato pro smegmate utatur, ad maculas solares, & faciei lentigines, ac uirilgines in superficie herentes. Dominatur in ipsis humida & frigida temperatura, suntque secundi ordinis in utraque. semen & radix sicca secundi ordinis initio consistunt. Vis extersoria amplior est in radice quam carne. Caro comesta unā cum extersione & urinas ciet, & infernè secedit magis quam cucurbitæ. at uero semen magis extergit, ut etiam calculosis renibus conducatur. Cæterum uisiosum succū in corpore gignit pepo, magisque si non probè concoquatur. Tunc enim cholericos quibus & supernè & infernè bilis prorumpit, efficere solet. Nam & prius quam corrumpatur ad uomitum aptus est, si amplius edatur, & si quis non ab eius esu boni succi edulium ingerat, omnino uomet.

*Piper.*

Piper recens pullulans, longum est, quapropter & humidius existit. Quod uero uelut fructus immaturus est, album piper est, acrius nigro existens. Nigrum enim uelut superassatum iam & superreficatum est. Vtrumque autem fortiter calcificat ac siccatur.

*Peristereon, Verbenaca, Veneris herba, Sacra herba.*

Verbenaca, quam peristereona, & ueneris herbam, ac sacram herbam appellant, capitis dolorem egregie tollit, inquit Archigenes, coronæ modo imposita, trita quoque cum aceto & rosaceo illita, & cocta cum oleo, indeque rigato capite, omnem ueterē capitis dolorem sanat, & defluos capillos cohibet. Decoctū radicis calidum ore retentum, dentium dolorem sedat. & motos dentes firmat, & oris ulcera sanat. Cæterū ad colicos radicem crassius tufam ex aqua ad dimidias coquito, & ad dies quinque potui dato. Constat hoc experimento. At uero calculosis & incipienti elephātiāsi, decoctum similiter dato ex aqua mulsa. Vtere similiter & ad comitalem morbum, & ad febres quotidianas ac quartanas. Verū ad podagricos & Ischiadicos in uino decoctā exhibebis. Radice exuccata fistulæ optime colluuntur, maxime mori succo & melle ammixto. Eadem radix usta itemque sicca inspersa, fistulas sanat. Quin & melle cocto excepta, fistulæ collyrij modo inditur, & præter opinionem opitulatur.

*Persea.*

Perseæ folia astringentis facultatis moderate participia sunt, ut & partibus è quibus sanguis erumpit, commodè imponi possint. Eadem arida trita pruritus sedant affricata.

*Perdicias.*

Perdicias relata est in quinto elemento, ubi Elxinen ipsam appellauimus.

*Pæonia.*

Pæonia relata est in tertio elemento, ubi glycyfiden ipsam appellauimus.

*Petroselinum.*

Petroselini semen maxime in usu est. Herba ipsa imbecillior existit. Semen calidum est & siccum tertio ordine, & incidendi uis prædicitum. Itaque menses ciet & urinas ubertim, insuperque flatus discutit.

*Peucedanum.*

Peucedani radice maxime utuntur, liquoreque ac succo eius. Omnia eandem uim habent, fortior est autem succus multum calcificans ac discutiens. Vnde & neruorum affectionibus conuenit, & morbis pulmonis ac pectoris, ex crassitudine aut uiscositate humorum obortis, tum intra corpus sumptus, tum odoratu. Quo modo & lienes induratos sanat. Radicis usus ad eadem competit, sed & ossium squamas celerimè disparat. & sicca malignis ulceribus inspersa optime medetur. purgat enim & incarnat, & usque ad cicatricem perducit, calcificans quidem ordine secundo, siccans autem tertij initio.

*Peganum, Ruta.*

Ruta syluestris quarti ordinis est calcificantiū ac siccantiū, satia tertij. Estque non solum acris, sed & amara, unde & uim secandi ac discutiendi crassos & uiscosos humores habet, & per urinas euacuat. Et sanè tenuiū quoque partium est, & flatus discutit, & ob id inflationibus conducit, & uenereos impetus suppressit, ac præclare siccatur. nā inter medicamenta fortiter siccantia censetur. Rufus hæc uerba prodiit: Syluestris rutæ uis ignea est & ulceratoria, maxime uesicæ. Quapropter etiam qui podagricum pharmacum bibunt, ex ruta syluestri constans male affectam uesicam acquirunt. quicunque tamen hoc medicamentum sustinuerint, manifestam opem ferunt. Nam ad arthriticos præci-



puè cōmodum est. Quod si de satīua ruta quid am-  
mīscueris, securius erit, quanquam & ipsa satīua ue-  
sicā incōmodet, sed minus quā syluestris. Vtimur  
syluestri in quibus perfrigeratum quid refouere vo-  
luimus. prodest & hydropi flatuoso, & ei qui sub-  
tercus appellatur. prodest & morsis à uipera aut mu-  
re araneo, & magis si prāgnans mus araneus mo-  
rderit, & prāsertim animalia subiugalia. Est &  
forte medicamentū ad papaueris succū potum, & ad  
aconitū cū uino. Satīua ruta rigores per circuitū re-  
petentes mitigat pota ante accessiones. mitigat & co-  
licos dolores potū & infusum, itemq; uteri strangu-  
latus. Vīsum acuit in cibo sumpta, & propterea pi-  
ctores assidue eam degustantes, acutius cernūt. Quin  
& melle mixtus succus ipsius, medicamētum euadit  
uisum exacuēs. Auxiliatur & urinā difficultati co-  
cta ex oleo, indeq; uesica fota, neq; est aliud medica-  
mētum quod huic hac parte prætuleris. Cæterum in  
lumborū dolore & spirādī difficultate, data ex aqua  
mulla confestim opitulatur. In lethargicis pota &  
infusa per clysterem, ualde cōmodat. Sed & tritam  
cum rosaceo & aceto capiti ipsorū illinere oportet.  
Solut & coxendicum dolores pota, & in cataplas-  
mate imposita, & infusa per sedem. In cataplasmate  
imposita podagricis gēua inflata habentibus, citò  
auxiliatur, & dolores mox lenit. Crustas etiam car-  
bunculorum citò disparat, in cataplasmate imposita  
cum melle aut uuis pāsis.

#### Pix.

Pix arida siccāt & calfacit secundo ordine, plus autem  
siccāt quā calfacit. Liquida cōtrā plus calfacit quā  
siccāt. Habet & quid tenuiū partiū, quō & anhelos-  
sis, & suppuratis pectore opitulatur. Satis est delin-  
xisse cyathī unius mensuram melle ammixto. Habet  
utraq; & extersorium quiddam, & cōcoctōrium, ac  
discussorium. Quare & scabros ungues extrahunt  
addita cera, & impetigines exterunt. Cōcoquunt &  
duros ac crudos tumores omnes cataplasmatīs am-  
mixtæ. Ad omnia hæc præstat liquida. Sicca ad hæc  
deterior est, sed ad uulnera glutināda accōmodatior.  
Fuligo ex liquida pice sic paratur. In lucernā nouam  
funiculo instructā ellychnio, liquidā pice in mittes,  
incensamq; ac fictili uasē opertā, uelut in thure dictū  
est, fines. & priore cōsumpto liquore, aliū infundes,  
donec fuliginē sufficiētē collegeris. Vīsus est ad palpe-  
bras ornādas, & ubi pilos producere oportet, & ad  
oculos imbecillos ac lacrymosos & ulcerosos.

#### Pistacia.

Pistaci fructus substantiam tenuiū partiū habet, quē  
& subamarum quiddam & aromaticum in se com-  
plectitur. Quapropter obturata expedit & expur-  
gat, prāsertim circa iecur, imò & pectus & pulmonē.

#### Pityides, Nux pinea, Nux picea.

Pityides appellantur fructus pinorū, quidam etiam  
picearum sic appellant. Sunt autem mixtę facultatis,  
nimirum & adstringentis, & acrimoniā quandam  
cum amaritudine possidētis. Vnde & reiectionibus  
ex pectore ac pulmone conferunt.

#### Pini cortex.

Pini cortex prædominātem uim adstrictoriam habet,  
in tantum ut intertrigines inspersus optimè sanet, &  
ambusta ad cicatricem perducatur, & aluum fluidam  
supprimat si potetur. Sed & piceæ cortex huic simi-  
lis est, uerū uiribus debilior. Vtriusq; arboris folia

uim glutinandi uulnera habent. Fuligo porrò ex his  
ad palpebrarū defluuia, & humectos ac erosos ocu-  
lorum angulos, itemq; lacrymosos utilis est.

#### Platanus.

Platanus humidior ac frigidior substantia non mul-  
tum à moderatis abscedit. Vnde et folia uiridia trita  
in cataplasmate imposita, inflammationibus quæ ad-  
huc generantur non obscurè opitulatur. Cortex eius  
& pilulę sicciorē uim habent. Quare cortex quidem  
aceto coctus, ad dentium dolores adhibetur. Pilulæ  
uero cum adipe, ad ulcera ambustorum. Quidā cor-  
ticem exurunt, & medicamentum extersorium effi-  
ciunt, quod cum aqua quidem sanat lepras. Ipso au-  
tem cinere per se insperso, ulcera uetera & ob nimiam  
humiditatem sordida curantur.

#### Polygonum.

Polygonum habet quidē & adstrictorium quiddam.  
Dominatur autē in ipso aquosa frigiditas, ut secūdi  
ordinis sit completi, aut tertij incipientis inter frige-  
facientia. Vnde et stomacho exusto prodest, foris in  
cataplasmate imposito, quemadmodū & calidis in-  
flammationibus. Fluxiones enim repellit. Quare &  
herpeti commodum pharmacum est, & ulcerum o-  
mnium, maximè inflammationum & fluidorum, item  
quæ in auribus sunt, nam pus resiccat. Sistit & flu-  
xum muliebrem, & dysenterias, ac sanguinis reie-  
ctionem. Ad omnia uero masculinum ualidius est &  
præstantius.

#### Polemonium, Philetæron, Chiliodynamon.

Polemoniū aliq; philetæron, aliq; chiliodynamon uocāt,  
tenuium partiū & siccatoriā uim habet. Quare qui-  
dam radicem ipsius cū uino ischiadicis, & dysenteria-  
cis, & ad induratum lienem bibendam præbent.

#### Polium.

Polium amarū est & mediocriter acre, itaq; omnia ui-  
scera obturatione liberat, & menses ac urinas ciet, &  
uiride quidem glutinat uulnera, siccum autem mali-  
gna ulcera sanat. Prāsertim minus poliū, quō & ad  
antidotos utimur. Nā & amarius est, & acrius quā  
maius, ut tertij ordinis sit siccantium, secūdi comple-  
ti calfacientium.

#### Potamogeton.

Potamogeton adstringit & frigefacit, similiter ut po-  
lypodium. Verum crassiorum partium substantiam  
quā polygonum habet.

#### Polypodium.

Polypodium dulcem simulq; austeram qualitātē præ-  
dominantem habet, ut uim habeat multum siccātem  
citra mordacitatem.

#### Prasion, Marrubium.

Marrubium calfacit secundo ordine cōpleto, siccāt ter-  
tio cōpleto. Iecur & lienem obturatione liberat, pe-  
ctusq; ac pulmonem expurgat, & menses prouocat,  
& ictericos per nares purgat. Facit & ad aurium do-  
lores iam inueteratos. In cataplasmate impositū ex-  
terget & discutit.

#### Prasum, Porrum.

Porri acré uim possident uelut cepæ, & iuxta propor-  
tionem calfaciūt corpus, & crassos in ipso humores  
attenuant, & uiscosos secant. Cient & urinā & san-  
guinem expurgant. Optimus usus est ipsorū bis co-  
ctorum. Nam sic comesta acrimoniā exuunt, & suc-  
ci uitium non amplius habent. Abstinedum est autē  
à frequēti usu omnium acrium, & prāsertim si is qui  
accipiat



accipiat natura biliosior existat. Solis enim his qui pituitosum humorem, aut crudum, aut crassum, aut viscosum coaceruarunt, hæc edulia comoda existunt.

*Propolis.*

Propolis exterioriam vim non ualidam habet, attractoria autem satis ualentem. Est enim substantię tenuium partium, & calfacit secundo ordine completo, aut tertij initio.

*Ptelea, Vlmus.*

Vlmi folijs aliquando uulnus recens glutinauimus: adstringunt enim & extergunt. Cortex eius amarior est, & magis adstringit, quare & lepram sanat cum aceto. Radices eandem vim habent. unde quidam decocto earum fracturas fouent ad callum recipiendum.

*Pteris, Filix.*

Filicis radix in usum uenit: occidit enim lumbricos latos quatuor drachmarum pondere in aqua mulsa posita. Fœtus quoque uiuos quidem enecat, mortuos uero expellit, sed & ulceribus inspersa, ea citra mordacitatem siccatur.

*Pyrethrum.*

Pyrethri radix maximè in usu est, uisoria vim habens, per quam dentium perfrigatorum dolores lenit, affricatur & cum oleo in rigoribus per circuitum repetentibus, ante accessionem. Stupefactis etiam ac resolutis conducit.

*Pyri, Triticum, Amylum.*

Triticum extra impositum primi ordinis est calfacientium, & tamen neque siccare manifestè neque humectare potest. Quod ex ipso fit amyllum, frigidius & siccius ipso euadit. Amyllum ideo dictum, quod sine mola fiat. Panis triticeus cataplasma discussoria vim habet, nimirum quum sal & fermentum panis assumplerit. Habet enim fermentum vim attractoriam ex alto, simulque discussoriam.

*Rhamnus.*

Rhamnus secundo ordine siccatur, frigefacit primo completo, aut secundi initio. unde & herpetas sanat, & erysipelata non ualde calida.

*Raphanus.*

Raphanus calfacit tertio ordine, siccatur secundo. Discussoria vim habet adeo ut sugillata diuturna, aliaque liuefacta sanet cataplasmatibus modo impositus. uerum ut obsonium magis quam alimentum, attenuantis facultatis est simulque calfacit. Quare merito mirari subit illos qui à cœna ipsos crudos edunt, bonæ cōcoctionis ergo. Etenim ipsi magnam eius rei experimētum se fecisse iactant, uerum nemo citra læsionem ipsos imitatus est.

*Rheon Ponticon, Rha.*

Rheon ponticon aliqui rha appellant, mixtam autem facultatem habet, adstringentem & calfacientem, & tenuium partium. Vnde & rupta, & couulsa, & erecta ceruice spirationem emendat potum. Hæmoptoicis item ac coeliacis & dysentericis prodest. Impetigines quoque & liuefacta per sanat, cum aceto illitum.

*Resinæ omnes.*

Omnes resinæ siccant & calfaciunt. Differunt inter se secundum quod magis aut minus habent acrimoniæ in sapore, & calidæ facultatis, & simili modo iuxta alias qualitates, quod aliarum magis, aliarum minus participes existunt. Omnibus autem præfertur lentiscina, mastiche appellata, propterea quod parum adstrictionis possidet, ut & stomachi & uentris ac hepatis debilitati conducatur, insuperque & citra molestiam siccet. Est autem maximè tenuium partium, mi-

nimeque acris. Inter reliquas terebinthina principatum obtinet, non similiter ut mastiche adstringens, sed discutit magis quam mastiche, & extergit in tantum, ut & scabiem deterat, & ex alto attrahat, magis quam ceteræ resinæ, quod etiam magis tenuium partium existat. Habet & quid mollitoriū amplius quam mastiche. Aliæ porro omnes resinæ acriores hac sunt, pro maioris ac minoris acrimoniæ ratione. Siccissima omnium resinarum est sicca pinus resina, quam priuatim pinus physema appellant.

*Resinæ quomodo urantur.*

Vritur omnis resina liquida in quadruplici uase, liquoris infundendi respectu. Oportet enim resinæ quidem congiū unum, duos uero pluuiialis aquæ in cacabum diffundere, & ad prunas leniter coquere, assidue agitando, donec resina odorem perdat, friabilisque fiat, & penitus exarescat, ut etiam digitis confringi possit. quod ubi contigit, refrigeratam in fictili uase repones. Fit autem hoc modo excellenter alba. Oportet tamen urendam resinam prius excolare, & sordes ab ipsa separare. Vtuntur & citra aquam, primum quidem eliquatæ ac colatæ, deinde coctæ ad prunas per totum diem, assidue agitando, & ubi penitus expirarint tolluntur, ac reponuntur uelut dictum est. Excipitur ex resina etiam fuligo, ueluti in thure prædictum est, & confert ad calliblephara, quæ ornatis palpebris deseruiunt, & ad lacrymosos oculos, & corrosos ipsorum angulos, & glabras oculorum genas. Torrefacta uero resina utilis est ad odorata malagmata iteque acopa appellata.

*Rosæ.*

Rosarum facultas ex aquosa calida, duabus alijs qualitibus ammixta, adstringenti uidelicet & amaræ, composita est. Flos ipsarum adhuc magis quam rosæ adstrictorius est, & propterea etiam siccandi ui præditus.

*Rhododaphne.*

De rhododaphne diximus, ubi nerion ipsam appellauimus.

*Rhoa, malum punicum.*

Omne malum punicum adstringentis facultatis particeps est, non tamē ut ea omnino prædominetur: sunt enim aliqua ex ipsis acida, quædam dulcia, quædam austera. Quare ex his quæ in malorum tractatu diximus, etiam de his cōiectare licet. Succum autem uberiores habent quam mala aut pira, saporemque insuper iucundiores quam illa habent, & aliquando ad plures affectiones quam illa comodant, cum alias, tum si quando stomachus ob uitiorum humorum redundantiam morsum percipit. quo sanè tempore succus ipsorum cum polenta exhiberi debet, uelut Hippocrates in foemina cardialgusa faciendum præcepit, quæ uidelicet oris uentris morsum & dolorem percipiebat. Acini puniceorum magis adstringunt quam succus, magis quoque siccant. his uero amplius adhuc cortices. Quibus consimilem vim etiam cytini possident.

*Rhus.*

Rhois folium adstringit et siccatur, hoc coriarum tinctores utuntur. Medicis fructus & succus magis in usum ueniunt, multum austera qualitate habentes. Siccant enim ordine tertio, perfrigerant secundo.

*Rhypos, Sordes, Patos.*

Sordes à statuis gymnasiarum discussoria est & mollitoria crudorum tuberculorum. Quæ uero in palæstris colligitur, patosque Græcis appellatur, optimum



medicamentum est inflammatarū mammarum. Nā & feruorem extinguit, & influenza reprimi, & cōtentum discutit.

*Sagapenum.*

Sagapenum succus est calidus & tenuium partium, uelut reliqui succi. Habet & quid exterforiū, per quod cicatrices in oculis depurgat & attenuat. Quin & suffusionibus & hebetudini uisus, ex humorū crassitudine obortis commodum pharmacum existit.

*Sampsuchum.*

Sampsuchum tenuium partium ac discussoriam uim habet: siccatur enim & calfacit tertio ordine.

*Saprotes xylon, Caries lignorum.*

Caries ac putredo lignorum, maximè eorum quæ adstrictionis simulq; extersionis participia sunt, uelut est ulmus, humida ulcera optimè purgat ac replet.

*Sarcocolla.*

Sarcocolla lacryma est arboris persicæ, mixtis uiribus prædita, ex substantia quadam meatus obducete, & modica quadam amara. Vnde leuiter siccatur, & sic uulnera glutinat.

*Satyrion.*

Satyrion quidā etiam trifolium uocant, humidum est & calidi temperamenti, quapropter & gustantibus dulce apparet. Superflua tamen & flatuosam humiditatem possidet, & propterea ad uenerē stimulat. Quod etiam radix herbæ facere solet. Quidam tradunt etiā opisthotonum, hoc est, neruorum retrorsum distentionem per ipsam sanare è uino austero potam.

*Selinum, Apium.*

Apium in tantum calidum est, ut & urinas & menses cieat. Flatus quoq; discutit, & magis ipso semine.

*Seris, Cichorium, Picris.*

Seris siue cichorium subamarum olus est, & magis utriq; syluestre, quod propterea picris Græcis appellatur. Est autem syluestris, frigida ac sicca temperaturæ primo ordine. Satiua magis frigefacit quàm syluestris, uerum ob multæ humiditatis mixturam, siccandi uim perdit. Vtraq; autem adstringentis qualitatis particeps est, quæadmodum & chondrilla. Nā & hæc seridis species existit.

*Seseli.*

Seselis & radix & semē in tantū calfaciūt, ut urinae ciedæ sufficiant. Est autē tenuiū partiū, ut & morbo comitiali, & spirationi quæ recta ceruicē sit, conducatur.

*Sesamum.*

Sesamum nō modicā uiscositate & pinguitudinē in se habet, unde & meatus obducit & mollit, & moderate calidū est. Eandē uim habet & oleum ex ipso.

*Sideritis.*

Sideritis habet quidem quid exterforium, sed maior pars ipsius humida est, & moderate frigida, estq; modicæ cuiusdā adstrictionis particeps. unde & inflammationes arcet, & glutinandi uim habet.

*Sicya, Cucumeres.*

Cucumeres satiui urinā ciēt, uelut etiā pepones, sed minus quàm illi, propterea quod & substantia ipsorum minus humida quàm illorū existat, & ob id neq; ita facile corrumpuntur in uentre uelut pepones. Quidā ipsos cōcoquūt familiaritate quadā naturæ ad ipsos, & ubi in hoc consiliū securè eos ingesserint, ignorant quod tēporis progressu uitiosum & moderate crassum succū, ex ipsorū esu in uenis coaceruarūt, qui sanè succus ubi putrescere inceperit, febres malignas

inducit. Quapropter ab omnibus mali succi eduljjs abstinere cōsultū esset, etiā si aliq; facile ipsa cōcoquāt. *Sicyos agrios, Cucumis syluestris, Elaterium.*

Cucumeris syluestris seminis succus siue liquor, qui elaterium appellatur, imò etiam radicis & foliorū succus, utiles sunt ad medendum. Elaterium itaq; menses ciēt, & foetus appositum perdit. Summè enim amarum est, & modicè calidum, ut secundi ordinis sit calfacientium. & ob id etiam discussoriā uim habet. Itaq; & angina laborantes quidam ex ipso illinunt. Infunditur & ictericis in nares cum lacte muliebri, atq; hoc modo etiam capitis dolores sanat. Ceterum succus radicis & foliorū imbecillior est quàm seminis. Sed & ipsa radix consimilem uim habet. Nam & extergit, & discutit, & mollit. Verū cortex ipsius maiori siccatoria uī præditus est.

*Silphium.*

Silphij calidissimus quidē succus est, sed & folia, & caulis, & radix generose calfaciūt. Suntq; omnia flatuosis & aëreæ substantiæ, & propterea etiam ægrè cōcoquuntur. Forinsecus tamē imposita efficaciora sunt, & maximè omniū succus, attractoriā uim habens, corporis itē molem consumens ac colliquans.

*Sinon.*

Sinon calidi & subamari saporis est, unde & urinam ciēt, & cōcoctorius existit, & menses prolicit, & oburationes uiscerum expedit.

*Sion.*

Sion in quantum aromaticum saporem habet, in tantū calfacientis & siccantis facultatis particeps est. Discutit autem, & urinam ciēt, & calculos renū atterit, & menses ducit.

*Sisymbrium.*

Sisymbrium tenuium partium & discussoriam, calfacitoriamq; ac siccatoriā uim tertio ordine habet. Semen quoq; ipsius tenuium partium & calidum est. Quare quidam id cum uino singultientibus & torminosis bibendum præbent.

*Scandix.*

Scandix syluestre olus est consimile gingidio, subacre & subamarum, ut in siccando ac calfaciēdo tertij ordinis sit exoluti. Urinam etiam ciēt, et uiscera obturatione liberat.

*Scilla.*

Scilla incisoriā uim abunde possidet, non tamen fortiter calidam, sed in secundo ordine calfacientium.

*Scolymus, Carduus.*

Cardui radix multam urinam foetidam ducit, si uino decoctam quis bibat, & propterea alarum & totius corporis foetores sanat. Calida est tertij ordinis initio, sicca secundo.

*Scordion.*

Scordiū ex multiformi facultate constat. Nam & amarum quid & acerbū & acre habet. Expurgat itaq; simulq; calfacit uiscera, & menses & urinas mouet, & uulsa & rupta ac laterum dolores ex obturatione factos sanat potū. Viride cataplasmatibus modo impositum, uulnera magna glutinat. Aridū inspersum, sordida repurgat, & maligna ad cicatricem perducit.

*Scorodon, Allium.*

Allium calfacit ac siccatur quarto ordine. In cibo sumptum flatus dissipat, & sitim extinguit, & crassos uiscososq; humores secando obturatione liberat. Habet & quid medicatum & mali succi, quod abijcit aqua coctum.



coctum. Fugendus est eius assiduus usus, praesertim in calidioribus habitudinibus.

*Smyrna, Myrrha.*

Myrrha secundi ordinis est calfacientium ac siccantium. Insuper capitis uulneribus, ea glutinare potest. Amaritudinis autem non modicae particeps est, per quam & lubricos, & foetus occidit ac eijcit. Habet & quid exterforium, unde & ocularibus compositionibus additur, quae ad ulcera & cicatrices crassas compositae sunt. Miscetur & in anhelosorum ac tussientium auxilia, item in arteriacas compositiones: non enim exasperat arteriam.

*Smyrnium, Hippofelinon.*

Smyrnium, alij hippofelinon uocant, ex eodem genere est cum apio & petroselino, uerum semine nigrum & multo maius habet, & est apio ualentius, petroselino imbecillius. calfacit ac siccatur ordine tertio, menses ducit, & urinas ciet.

*Sonchus, Cicerbita.*

Sonchus uiridis adhuc & tener, uelut alia syluestria olera, comeditur. Componitur ex aquosa & terrea substantia, utrisque frigidis, & adstrictionis quid habet. Manifeste itaque perfrigerat, tum stomacho cataplasmatibus uice impositus, tum in cibo acceptus.

*Spartum, Genista.*

Sparti quo uites apud nos ligant, & fructus, & uirgarum succus attractoriam uim non instrenuam possident.

*Stacte.*

Stacte appellatur recentis myrrhae pinguitudo, si cum aqua modica tundatur, & per organum exprimatur. Est autem ualde odorata & preciosa, & per se unguentum, quod stacte appellatur. Probatum quod nihil olei admixtum habet, & modica sui parte multam uim calfactoriam possidet, ad proportionem myrrhae & unguentorum calfacientium.

*Staphylinus, Pastinaca, Daucus.*

Pastinaca satiuia imbecillior est, syluestris, quam et daucum appellant, ad omnia fortior, urinas mouet, & menses prouocat. Habet & quid exterforium in sese.

*Stachas.*

Stachas amarum & adstringentis qualitatibus particeps est. Est & tenuium partium ex odoris argumento. Itaque & obturatione liberare, & attenuare, & roborare, tum uiscera omnia, tum totum corporis habitum potest.

*Struthium, Herba lanaria.*

Struthii radix in usu est, calida & sicca quarto ordine existens. Est autem exterforia & irritatoria, propterea etiam sternutamenta mouet.

*Styrax.*

Styrax mollit, calfacit, concoquit. Quapropter & tussis, & destillationes, & grauedines ac rauedines sanat, mensesque promouet potius & appositus. Fuligo ex ipso fit uelut ex thure, quae eandem quoque uim habet.

*Staphyle, Vua.*

Vua magis quam omnes temporarii & subcanculares fructus, horae Graecis appellati, nutrit, & maxime ubi probe fuerit concocta. Minus autem nutriunt uuae quam ficus, & quod in ipsis precipuum est cito secedunt. Quare si quando retineantur, satis multum offendent. Neque enim probe concoquuntur retentae, sed & iuxta distributionem in hepar ac uenas, crudum succum generant, qui non facile in sanguinem transmutantur, tum propter externam cuticulam, tum propter uinacea, quorum substantia sicca & adstrictio-

ria existit. Quapropter recte faciunt qui haec ipsa uelut inuilia expuunt, & omnem internam carnem una cum succo exugunt, & sane uenter his magis subit. Reponuntur autem uuae in hyemem uariis modis. Alij in olla componunt, olla uidelicet diligenter operata, & operculo pice oblito, ut nullatenus perspiraret aut perflectentur. Atque talis uua exolutum uentrem firmat, & ciborum appetentiam excitat, non tamen alio secedit, & uberius ingesta, caput recitat. Sed adhuc magis capitis dolore inducit quae in musto seruatur. Pensilis autem caput nihil omnino laedit, uentrem uero neque sistit, neque promouet. Similiter neque infirmam appetentiam excitat, neque firmam exoluit. Vuae quidem igitur dulces calidiorum succum habent. Quapropter si uim inducunt, & uentrem subducunt, praesertim ubi humectiores fuerint. nam inter calfacientia ac perfrigerantia medio modo habent. At uero acidae & austerae, & quae cuticulam crassiorum habent, non solum praedicta uitia habent, sed & concoctionem in uentre & distributionem ac nutritionem impediunt. Caeterum in summa de escariis fructibus id nosse oportet: Humidos, humidum & tenue alimentum corpori praebere, & quod uniuersum corpus transeat ac cito penetret, facileque & per urinam & per cutem euacuetur. Contra solidorum compage fructuum, alimentum quod corpori accedit crassum est, & transitus tardiores, praesertim ubi crassum aut uiscosum aut adstringentem succum in se habuerint.

*Syca, Ficus.*

Quod non solum autumnales, sed etiam temporarii ac aestiui & subcanculares fructus, horae Graecis appellati, commune habent, id & ficibus adest. nam neque ipsae succi malitiam effugere potuerunt. Verum hoc commo- di ficibus inest, quod facile per uentrem transeat, & totum corpus penetrat. Nam & uim exterforiam memorabilem habent, & nephritici ex ipsarum esu multa arenosa excernunt. Alimentum autem praebent corpori non solidum, sed laxum, & ipsum uentriculum flatu implent. Verum ob transitus celeritatem, flatu illi non durant: & ea gratia minus quam reliqui fructus nocet. Et sane ficus exacte matura fere nihil noxii habet. Ficus uero siccae calidiorum uim possident secundi ordinis initio. Habent & quid tenuium partium, quod ad multa conducit. Illud tamen mali ex nimio ipsarum esu accedit, quod non ualde bonum sanguinem caricae gignant. Vnde & pediculorum copia ad earum esum consequitur. Si uero uiciosus succus iam tum in uentre contineatur, caricae comestae extreme laedunt, augent autem humorum maliciam in uentre corruptae, & inferne non secedentes. Vim habent attenuantem & incisoriā, ob quam etiam uentrem ad excretionem incitant, & renes expurgant. Iecori & lienī inflammatis quidem noxiae sunt, quae admodum etiam uirides ficus, iuxta communem rationem omnium dulcium. Iisdem uero obturatis aut induratis, cum thymo aut pulegio, aut thymbra, aut calamintha, aut origano, aut pipere, aut zingibere, multo ante reliquum cibum tempore intercedente medici praebent. Qui uero cum aliquo crassiore edulio ficus edunt, itemque caricas, non paruum lesionem incurrunt. Ficus siccae dueros tumores concoquunt ac discutunt, ob partium tenuitatem, si in cataplasmate imponantur. Decoctum quoque ipsarum com- similem uim habet. Caeterum ubi concoquere uelis, triticeam farinam ammisceris, ubi discutere, ordeaceam.



ceam. Et pinguiore quidem carica, tumores concoquunt, acriori uero sapore præditi extergent ac discutiunt. At uero mellitum ex ipsarum in aqua coctura paratur, uim melli similem habet.

*Symphytum petraeum.*

*Symphytum petraeum* ex contrarijs facultatibus constat: habet enim quid incisoriū, quo pus in pectore ac pulmone contentū expurgat. Habet & quid adstrictorium, quod ad sanguinis reiectiones auxiliatur. Verum ob humiditatem, commanducatum sitim extinguit, & arteriæ asperitates lenit. At uero ob omnes prædictas facultates, etiā intestinorum hernijs imponitur, & ad cōuulsa, ac rupta cū aceto mulso bibitur.

*Sycomora.*

*Sycomorum* fructus forma ficibus similis est, sed acrimoniam nullam possidet, modicæ dulcedinis particeps, humectior & frigidior quodāmodo uis sua exstans, uelut mora. Et sanè in medio mororū ac ficū merito locatur, unde etiam nomen habet.

*Schinus, Lentiscus.*

*Lentiscus* arbutum ex substantia aquea leniter calida, & terrea frigida nō multa compositum est, propter quam etiam moderate adstringit. Siccat igitur tertij ordinis initio, iuxta caliditatem uero & frigiditatem temperatū est. Simile uim in omnibus uis partibus possidet, unde & per se, & cum alijs medicamentis bibitur, ad coeliacas affectiones, & dysenterias, & sanguinis sputa, & sanguinis ex utero eruptiones, prolapsæ quoque sedi ac utero præcipitato commodat, propemodum uelut hypocyitis.

*Schoeni siue iunci rotundi odorati flos.*

*Iunci odorati flos* calfacit moderate, & adstringit moderatius, particeps est & tenuium partium facultatis, unde & menses ciet, & urinas ducit, in fomentis, & potu, & cataplasmatibus adhibitus. prodest & hepatis & uentris ac stomachi inflammationibus.

*Schoenos lea, Iuncos leuis, Oxyschoenus, Holoschoenus.*

*Iunci leuis* altera species *oxyschoenos*, id est, acutus iuncus; altera *holoschoenos*, hoc est, tota iunce appellatur. Gracilior quidem & durior est iuncus acutus, crassior autem *holoschoenus*, & laxior. Huius fructus somnum inducit. *Iunci acuti* species duæ sunt. altera sterilis, & medicinæ inutilis. Altera fructifera, cuius item fructus somnum conciliat, sed minus superiore. hæc & capitis dolorem inducit. Vtraque species torrefacta ex uino pota, fluxiones uentris siccat, & fluxum muliebrem rufum sistit. Et propterea temperamentum ipsarum terream leniter frigidum esse indicatur, & aqueum leniter calidū, quapropter inferna siccat, & leniter ad caput decurrēs perfrigerat, atque sic somnolentos eos qui utuntur facit.

*T Terebinthus.*

*Terebinthi* folia, cortex & fructus habent quid adstrictorium, sed & calfaciūt ordine secundo. Fructus est propinquus tertio ordine siccantium. Quapropter & urinam ciet, & lieni prodest.

*Teutlon, Beta.*

*Beta* nitrosam quandam uim possidet, qua extergit & discutit, & per nares expurgat. Cocta nitrosum & acre deponit, & ad discussoriā leniter facultatē, uis arceendi inflammationes ipsi accedit. Alba extersioni ac discussioni efficacior. Nam nigra adstrictionis particeps est, & magis in radice. Quum autē extersorium

succum habeat, etiam uentrem ad excretionem excitat, & stomachum quandoque mordet, præsertim illis quibus subtiliore sensu præditus est. & propterea incommodum stomacho eduliū est, si uberius ingeratur. Præstantior autē est quā malua ad hepatis oburationes, atque id magis ubi cū sinapi, aut aceto edatur, quomodo comesta etiam splenicis conducit.

*Tephra, Cinis omnis.*

*Lignorum* exustorū aut aliarum materierū reliquiae, cinis appellantur. Constat ex contrarijs substantijs & qualitatibus. Habet enim in se quiddam terream, & quid fuliginosum. Fuliginosæ itaque partes tenuium partium sunt, & ubi cinis aqua maceratur & excolatur, simul decedunt. Quod autē relinquitur terreū, debile ac lene euadit, ut quod calidā uim in aquā deposuit. Porro non omnis cinis eandem uim exacte habet, sed iuxta uisæ materiæ differentiā uariant. Nā ex lignis acerbis, uelut quercinis & similibus, nō parum adstrictionis habet in terrea sui parte, unde & sanguinis eruptiones cohibet. Cæterum ficulneus cinis multū acrimonie ac uistoriæ facultatis in fuliginosa sui parte possidet: in terrestri uero parte uim extersoriam. Cōsimilis huic est & cinis ex tithymalibus. Est autem & titanus, hoc est, calx cineris species, magis tenuium partium existens, quā is qui ex lignis reliquus est. Calx itaque aqua exacte ter aut quater lora, & aqua diffusa, medicamentum euadit siccatorum citra mordacitatem. Quod si eadē aqua marina lauetur, discussoriam uim acquirit.

*Telis, Fœnumgræcum.*

*Fœnumgræcum* calidum est ex secundo ordine, siccum ex primo, participat & extersoria facultate, & propterea feruentes inflammationes exacerbat. minus calidas & induratas discutit. In cibi usum uarijs modis uenit, sed caput tentat amplius sumptum, præsertim absque pane ingestū. quibusdam etiā stomachum subuertit. Succus decocti fœnogræci, cum modico melle acceptus, omnes uisiosos humores intestinorū commodè subducit. Sed parum omnino mellis ammisceri debet, ne mordax existat. Cæterum in uetustis pectoris doloribus citra febrē, palmulas pingues simul cū fœnogræco decoquere oportet, & expressum succū ammixto melle rursus decoquere ad prunas donec moderate crassescat, atque ita eo uti multo tempore ante reliquum cibum intercedente. Vitādus tamē eius usus est in his qui caput læsioni obnoxiiū habet. Nam & palmulæ ipsæ caput tentant.

*Tithymalli, Galactides, Characias.*

*Tithymalli* omnes, qui & galactides appellantur, acré & calidā uim habent prædominantem. Inest ipsis & amaritudo. Fortissimus igitur est succus, deinceps fructus & folia. particeps est & radix prædictarum facultatum, sed non ex æquo. Ipsa quidem igitur cū aceto cocta, dentium dolores & maxime erosorum sedat. succus quarti ordinis est calfacientium, qui iam uistorius existit. Quapropter illi succi pilos denuant, sed uehemens ipsorum uis oleo ammixto mitigatur, & si frequenter id fiat, radices pilorum exuste penitus extirpantur, & corpus glabrū redditur. Eodem modo & uerrucas, ac thymos ex eadem uerrucarum gente appellatos tollunt. Impetiginē quoque ac scabiē extergit. Cortex radicis eius qui priuatim *Characias* appellatur, in umbra siccatus, tusus & cribratus, generose purgat potus. Oportet autem quatuor scrupu



scrupulorum pondus à uespera in uino dulci macerare, & manè excolatum uinum per panniculum tepidum potandum exhibere.

*Tragacanthus.*

*Tragacanthus* succus est plantæ spinosæ, similem gummi uim habens, quæ & meatus obducit, & acrimoniam obtundit, & sanè siccatur quoque similiter illi.

*Tribulus.*

*Tribulus* ex moderata humida, & frigida ac sicca substantia constat. Cæterum in terrestri terrea frigiditas prædominatur, ob quam & magis adstringit. In aquatili uero aquositas. & propterea feruentibus inflammationibus conueniunt. Terrestris fructus renū calculos atterit potus.

*Triphyllon, Trifolium.*

*Trifolium* Græci asphaltion è bituminis odore appellant, estque calidæ ac siccæ facultatis in tertio ordine ueluti bitumen, & propterea potum laterū dolores ex obturatione obortos sedat, & urinā ac menses ciet.

*Trychnon, Solanum.*

*Trychnon* aliqui adiecto ad caput uocis litera & *strychnon* appellant, & hortense quidē adstringit & frigefacit ordine secundo. Quod uero *halicacabon* appellatur in foliorū facultate simile est hortensi. uerū fructus eius urinā ciet. At uero cortex somniferi appellati de radice detractus, frigefacit similiter ut *papaueris* succus, ut tertij sit ordinis perfrigerantium. Fructus etiam huius urinam ciet, sed si plures quam duodecim corymbi sumantur, furorem inducit.

*Y Yacinthus, Hyacinthus.*

*Hyacinthi* radix bulbiformis primi ordinis est siccantium, secundi perfrigerantium. Creditur pueros diu impuberes adseruare, si cū uino in cataplasmate imponatur. Semē moderate adstringit & extergit, unde ictericis datur ex uino. Siccatur ordine tertio, uerū caliditatis & frigiditatis in medio consistit.

*Y dna, Tubera.*

*Tubera* terream substantiam prædominantem possident, modica tenuium partium ammixta.

*Ydropiper, Hydropiper.*

*Hydropiper* herbula est in aqua nascens, & folijs & ramulis mentæ similis, maior tamen, gustu acris uelut piper. semina fert parua iuxta singula folia, herba calida quidem est, sed non quantū piper. Viridis imposita sugillata & duritias sanat. Utuntur quidam ipsa unā cum semine pro condimento piperis loco.

*Y oscyamus, Hyoscyamus.*

*Hyoscyamus* cōmodissimus est ad medicinas, qui florem & semen album habet tertij ordinis perfrigerantium existens. Reliqui uenenati sunt.

*Ypericon, Hypericum.*

*Hypericum* calfacit ac siccatur, substantiam tennium parium habes, ut & urinas & menses prouocet. Ad hæc uero non modo semen, sed etiam folium conducit. Viride in cataplasmate impositum, ulcera ad cicatricem perducere potest, præsertim ambustorum. Siccū tritum inspersum, humore flaccida & putredinosa ulcera sanat. Quidam etiam ischiadicis ipsum bibendum præbent.

*Yssopus, Hyssopus.*

*Hyssopus* calfacit ac siccatur ordine tertio. Estque tenuium partium substantiæ.

*Phaci, Lentesc.*

*Lentes* nō ualidè adstringūt, in caliditatis autem & frigiditatis medio consistunt. Siccant ordine secundo.

Itaque corpus ipsarum siccatur ac sistit uentrem. Decoctum autem promouet. Quapropter ubi sistendi uentris gratia sumuntur, prima aqua diffunditur.

*Phacos palustris, Lens stagnorum.*

*Palustris lens* humidæ & frigidi temperamenti est, ex secundo ordine.

*Phaseli.*

*Phaseli* itemque ochri, mediæ quodāmodo edulia sunt, inter ea quæ boni sunt, aut mali succi, facileque concoquantur aut ægrè, tardèque commeant, aut citò, flatus expertia aut infantia, parum nutrientia aut multum.

*Phlomos, Verbascum.*

*Verbascum* tres species habet, quarū radix acerbæ est, unde & fluidis affectionibus auxiliatur. Quidā dentes in dolore colluunt. Folia omnium diffusoriam & extensoriam uim habent. Tertiæ usus est lucernarum lumina, quæ propriè thryallis appellatur.

*Phoenix, Palma.*

*Palma* arbor abstringentis qualitatis particeps est in omnibus suis partibus, ramorū succus austerus est. similiter quod cerebrū uocatur, quod in cibi usum uenit, fructus ipsius maximè dulcis, non modica caliditate participat, escarius & multi usus, tum forinsecus adhibitus, tum intra corpus sumptus, ubi robore rare, & siccare, & cōstringere ac densare, & obturare opus est. Omnes palmulæ ægrè concoquantur, & capitis dolorem inducunt amplius comestæ. Quidam ab earum esu morsum percipiūt in ore uentris, qui sanè etiam magis capite dolent. Succus qui ex ipsis in corpus distribuitur, crassus penitus est. Habet & uiscosum quiddam, ubi pinguis palmula fuerit. Quando autem crasso & uiscoso succo dulcedo permixta fuerit, iecur celerrimè ab ipsis obturatur. Si uero aut inflammatum fuerit iecur, aut induratum, ab ipsarum esu extremè læditur. Consequenter autē cum iocinore etiam lien obturatur, ac læditur. Cæterum multò magis lædunt palmulæ uirides etiā paulò uberius ingestæ. nam & flatu uentrem implent, & crudis humoribus, & qui esitarunt rigoribus ægrè calescentibus corripiuntur. Porro germen tenerum quod *Elaten* uocant, uim eandem cum cerebro habet. Quod uelut tegmen & uelamen ipsius est, adstrictorium quidem est, uerum magis prædictis siccatur. Est autem & radix arboris siccatoriae citra mordacitatem facultatis, & modicè adstrictoria.

*Phu, Nardum creticum.*

*Phu* radix nardo similem uim habet, debiliior tamē ad alia est, uerum urinam magis ciet.

*Phycos, Alga, Fucus.*

*Fucus* siue alga, muscus est marinus, qui uiridis exemplis frigefacit & siccatur ordine secundo. habet & quid adstringens moderate.

*X Chalbana, Galbanum.*

*Galbanum* succus est ferulaceæ plantæ, mollitoriam & diffusoriam uim habens. Calfacit ordine tertio, siccatur secundo.

*Chamædrys, Trixago.*

*Chamædrys* amaram qualitatem prædominantem habet, est & aliquo modo acris, unde & lienem colliquat, & urinas & menses mouet, & crassos humores secatur, & uiscerū obturationes expurgat. Tertij ordinis est



est calfacientium ac siccantiū. Decoctum ipsius diu-  
tius coctum, & assidue potum, febre quartana corre-  
ptos liberat.

*Chamelæa.*

Chamelæa amaram qualitatem prædominantem ha-  
bet. Quapropter & sordida ualde ulcera, & quæ ma-  
ximas crustas habet, cum melle repurgare potest. Est  
& pota ex purgantium numero.

*Chamæleuce.*

Chamæleuce calidam uim habet ordine tertio, siccam  
primo. Vnde suffita super carbones manifestè opitu-  
latur ægrè spirantibus, si per infundibulum fumum  
inde hauriant.

*Chamæleon.*

Chamæleonis nigri radix uenenosum quid habet, unde  
eius usus forinsecus receptus est ad scabiem & im-  
petiginem, ac uittiginē, & in summa ad ea quæ ex-  
terfioe opus habet. Particeps est & mollitoriæ ac dis-  
cussoriæ facultatis. Siccatur ordine tertio, calfa-  
cit secundo completo. At uero albi chamæleonis ra-  
dix pota ex uino austero, acetabuli mensura, latum  
lumbricum expellit. Dant ipsam & hydropicis.

*Chamæpitys.*

Chamæpitys tertij ordinis est siccantium, secundi calfa-  
cientium. Quum autem plurimum amara sit, & ter-  
get uiscere magis quàm calfacit. unde in regio mor-  
bo exhibetur, & omnino quibus iecur facile obtura-  
tur, cōmodum medicamentum existit. Ducit & men-  
ses pota & cum melle apposita. Ciet quoq; urinam.  
Quidam ischiadicis ipsam præbent coctam in aqua

mulsa. herba ipsa uiridis magna uulnera glutinare  
potest, & putredinosa ulcera sanare, & mammarum  
duritias discutere.

*Chelidonium magnum.*

Chelidoniū magnū extersoriā & calidam uim abunde  
possidet, succus eius uisum exacuit, his quibus cras-  
sum quid quod discuti oporteat, circa pupillā colligi-  
tur. Quidā radice usi sunt in morbo regio ex iecino-  
ris obstructione oborto, ex uino albo dātes cū aniso.

*Chelidonium paruum.*

Chelidonium paruum maiore acrius est, unde in cata-  
plasmate impositum cutem exulcerat, & ungues le-  
proso extert. succus eius per nares fortiter purgat  
est enim quarti ordinis calfacientium ac siccantium.  
Malus tertij in utrisque.

*Chondrilla.*

De chondrilla diximus quum de seride ageremus: est  
enim seridis species.

*Psyllium.*

Psyllij semen maximè in usu est. Secundi ordinis est fri-  
gescientium. Verum in siccando & humectando  
medium locum occupat.

*Ocimum Basilicon, id est, regale.*

Ocimum secundi ordinis est calfacientium, habet & hu-  
miditatem superfluam, unde neq; utile est ipsum in-  
tra corpus sumere. uerum forinsecus in cataplasmate  
impositum ad discutiendum ac concoquendum cō-  
modat. Decoctum ipsius lippientibus ob crassioris  
materiæ copiam, calidum pro fomento adhibitum,  
magnopere prodest, præsertim pueris.

AETII TETRABIBLI PRIMAE, SERMONIS  
PRIMI, FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN  
SECUNDO SERMONE AETII  
CONTINENTVR.

\*

|                                        |             |                                         |               |                              |              |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| <b>D</b> E terræ differentijs.         | Caput I.    | Lapis Ageratus.                         | cap. xxii.    | Salustus.                    | cap. xliiii. |
| Quomodo terram lauare oportet.         | Cap         | Lapis Asijs, & flos ipsius.             | cap. xxiii.   | Salis flos.                  | cap. xlv.    |
| Quas medelas agrorum terra præstet.    | II.         | Gagates.                                | cap. xxiiii.  | Salis spuma.                 | cap. xlvi.   |
| Cap.                                   | III.        | Magnetes lapis.                         | cap. xxv.     | Armeniacum pictorum.         | cap. xlvii.  |
| De terra Lemnia.                       | cap. iiii.  | Smiris, pumex, testæ clibani.           | ca. xxvi.     | Auripigmentum.               | cap. xlviii. |
| Rubrica.                               | cap. v.     | Lapides in spongijs.                    | cap. xxvii.   | Bitumen.                     | cap. xlix.   |
| Terra Samia.                           | cap. vi.    | Ostracites, geodes, Naxia cotis retris- | cap. xxviii.  | Aphronitrum & litri spuma.   | cap. l.      |
| Terra Selinusia & Chia.                | cap. vii.   | mentum.                                 | cap. xxviii.  | Gypsum                       | cap. li.     |
| Cimolia terra.                         | cap. viii.  | Ophites lapis.                          | cap. xxix.    | Diphryges.                   | cap. lii.    |
| Terra Ampelitis.                       | cap. ix.    | Hieracites lapis & Indicus.             | cap. xxx.     | Diaphanes, lapis specularis. | cap. liii.   |
| Terra Cretica.                         | cap. x.     | Vitrum.                                 | cap. xxxi.    | Sulphur.                     | cap. liiii.  |
| De omni terra usta.                    | cap. xi.    | Lapis ætites.                           | cap. xxxii.   | Aerugo rasa.                 | cap. lv.     |
| De bolo Armenia.                       | cap. xii.   | Alabandicus lapis.                      | cap. xxxiii.  | Aerugo uermiculata.          | cap. lvi.    |
| Lapis hematites.                       | cap. xiii.  | Electrum siue succinum seu lyncurium.   | cap. xxxiiii. | Cadmia.                      | cap. lvii.   |
| Lapis schistos, galactites, melitites. | cap. xiiii. | cap.                                    | xxxiiii.      | Cyanus.                      | cap. lviii.  |
| Communis doctrina de omnibus lapi-     | xiiii.      | Iaspis uiridis.                         | cap. xxxv.    | Squama æris ac ferri.        | cap. lix.    |
| dibus.                                 | cap. xv.    | Iaspis subuirdis.                       | cap. xxxvi.   | Argenti spuma.               | cap. lx.     |
| Leucographis aut moroxus.              | cap. xvi.   | Iaspachates.                            | cap. xxxvii.  | Litrum.                      | cap. lxi.    |
| Galactites.                            | cap. xvii.  | Sapphirus lapis.                        | cap. xxxviii. | Melanteria.                  | cap. lxii.   |
| Thyites lapis.                         | cap. xviii. | Smaragdus lapis.                        | cap. xxxix.   | Atramentum scriptorium.      | cap. lxiii.  |
| Tecolithos.                            | cap. xix.   | De metallicis & quæ ex aqua generan-    | cap. xl.      | Misy, Sori, & chalcitis.     | cap. lxiiii. |
| Pyrites.                               | cap. xx.    | tur.                                    | cap. xli.     | Molybdæna.                   | cap. lxv.    |
| Lapis Phrygius.                        | cap. xxi.   | Adarces.                                | cap. xlii.    | Plumbum.                     | cap. lxvi.   |
|                                        |             | Alcyonia.                               | cap. xliii.   | Pompholyx.                   | cap. lxvii.  |
|                                        |             | Sal.                                    | cap. xliii.   | Rhoidarij preparatio.        | cap. lxviii. |
|                                        |             |                                         |               | Sanda                        |              |



|                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sandaracha.                                                          | cap. LXIX.     | De renibus.                                                         | cap. CXXV.     | De canis fluuiatilis testibus.                                    | cap. CLXXVIII.  |
| Sandyx quæ & Syricum.                                                | LXX.           | De cerebro.                                                         | cap. CXXVI.    | De canis terrestres catulo.                                       | cap. CLXXIX.    |
| Scoria.                                                              | cap. LXXI.     | De terrestrium animalium uisceribus.                                | cap. CXXVII.   | De Cygni pullo.                                                   | cap. CLXXX.     |
| Stibium.                                                             | cap. LXXII.    | De aluo, intestinis ac utero terrestrium animalium.                 | cap. CXXVIII.  | De buccinorū testis ustis.                                        | cap. CLXXXI.    |
| Spongia.                                                             | cap. LXXIII.   | De syluestrium animalium carne.                                     | cap. CXXIX.    | De galerita uolucres.                                             | cap. CLXXXII.   |
| Alumen.                                                              | cap. LXXIV.    | De uolucrum animalium carne.                                        | cap. CXXX.     | De cochlea terrestri.                                             | cap. CLXXXIII.  |
| Calx.                                                                | cap. LXXV.     | De anseribus & struthocamelis.                                      | cap. CXXXI.    | De menulis.                                                       | cap. CLXXXIIII. |
| Eucus.                                                               | cap. LXXVI.    | De gruibus.                                                         | cap. CXXXII.   | De torpedine.                                                     | cap. CLXXXV.    |
| Atramentum sutorium.                                                 | cap. LXXVII.   | De partium uolucrum animalium differentia.                          | cap. CXXXIII.  | De asello marino.                                                 | cap. CLXXXVI.   |
| Chalcitis.                                                           | cap. LXXVIII.  | De ouis.                                                            | cap. CXXXIIII. | De ostreorum testis.                                              | cap. CLXXXVII.  |
| Aesustum.                                                            | cap. LXXIX.    | Ouorum uis medicamentaria.                                          | cap. CXXXV.    | De purpurarū testis.                                              | cap. CLXXXVIII. |
| Aeris flos.                                                          | cap. LXXX.     | De alimento ex animalibus aquaticis.                                | cap. CXXXVI.   | De squatinæ marina.                                               | cap. CLXXXIX.   |
| Chrysocola.                                                          | cap. LXXXI.    | De cephalo.                                                         | cap. CXXXVII.  | De sepia.                                                         | cap. CXC.       |
| Cerussa.                                                             | cap. LXXXII.   | De lupo.                                                            | cap. CXXXVIII. | De scinco.                                                        | cap. CXCI.      |
| Psoricum.                                                            | cap. LXXXIII.  | De trigla seu mulo.                                                 | cap. CXXXIX.   | De tellinis.                                                      | cap. CXCI.      |
| De materia medica ex animalibus.                                     | cap. LXXXIIII. | De piscibus petrosus.                                               | cap. CXL.      | De cicada.                                                        | cap. CXCI.      |
| De sanguine.                                                         | cap. LXXXV.    | De gobio.                                                           | cap. CXLI.     | De hyæna.                                                         | cap. CXCI.      |
| De lacte.                                                            | cap. LXXXVI.   | De piscibus mollis carnis.                                          | cap. CXLII.    | De harundinibus.                                                  | cap. CXCV.      |
| De lactis differentia.                                               | cap. LXXXVII.  | De piscibus duræ carnis.                                            | cap. CXLIII.   | De electione optimorum medicamentorum.                            | cap. CXCVI.     |
| De lactis differentia ab animalium habitu.                           | cap. LXXXVIII. | De piscibus testa intactis.                                         | cap. CXLIIII.  | Ex Oribasio. quæ sint media inter calfacientia ac frigefaciëntia. | cap. CXCVII.    |
| De lactis differentia à temporibus anni.                             | cap. LXXXIX.   | De crustatis.                                                       | cap. CXLV.     | Quæ moderatè calfaciunt.                                          | cap. CXCVIII.   |
| De lactis differentia à pabulo.                                      | cap. XC.       | De piscibus mollibus.                                               | cap. CXLVI.    | Quæ calfaciunt primo ordine.                                      | cap. CXCVI.     |
| De lactis differentia ab ætate.                                      | cap. XCI.      | De piscibus chartilagineis.                                         | cap. CXLVII.   | Quæ calfaciunt secundo ordine.                                    | cap. CC.        |
| Quibus lac conueniat.                                                | cap. XCII.     | De echinis marinis.                                                 | cap. CXLVIII.  | Calfactoria tertij ordinis.                                       | cap. CCI.       |
| De modo, tempore, ac mensura utendi lactis.                          | cap. XCIII.    | De falsamentis omnium animalium pedestrium, uolucrum & aquaticorum. | cap. CXLIX.    | Calfactoria quarti ordinis.                                       | cap. CCII.      |
| Quibus lac noceat.                                                   | cap. XCIIII.   | De garo.                                                            | cap. CL.       | Quæ frigefaciunt.                                                 | cap. CCIII.     |
| De lactis coctura.                                                   | cap. XCV.      | De muria.                                                           | cap. CLI.      | Quæ frigefaciunt primo ordine.                                    | cap. CCIIII.    |
| De sero lactis.                                                      | cap. XCVI.     | De adipe pinguedineq; ac seuo.                                      | cap. CLII.     | Quæ frigefaciunt secundo ordine.                                  | cap. CCV.       |
| De his quæ iucunditatis gratia cum lacte coquuntur.                  | cap. XCVII.    | De medulla.                                                         | cap. CLIII.    | Frigefactoria tertij ordinis.                                     | cap. CCVI.      |
| De lacte acido.                                                      | cap. XCVIII.   | De pulmone.                                                         | cap. CLIIII.   | Frigefactoria quarti ordinis.                                     | cap. CCVII.     |
| De primario lacte.                                                   | cap. XCIX.     | De capitibus.                                                       | cap. CLV.      | Quæ siccant citra mordacitatem.                                   | cap. CCVIII.    |
| De lacte concocto.                                                   | cap. C.        | De cornibus.                                                        | cap. CLVI.     | Quæ simpliciter siccant.                                          | cap. CCIX.      |
| De caseo.                                                            | cap. CI.       | De ungibus.                                                         | cap. CLVII.    | Quæ primo ordine siccant.                                         | cap. CCX.       |
| Pharmacum ex caseo uetere ad callosas concretiones podagricorum.     | cap. CII.      | De impetigine in pedibus equorum.                                   | cap. CLVIII.   | Quæ secundo ordine siccant.                                       | cap. CCXI.      |
| De efficacia recentis casei foris adhibiti.                          | cap. CIII.     | De lanis succidis & puris & ustis.                                  | cap. CLIX.     | Quæ tertio ordine siccant.                                        | cap. CCXII.     |
| De butyro.                                                           | cap. CIIII.    | De pilis ustis.                                                     | cap. CLX.      | Quæ quarto ordine siccant.                                        | cap. CCXIII.    |
| De coagulo.                                                          | cap. CV.       | De ossibus ustis.                                                   | cap. CLXI.     | Quæ media sunt inter siccantia ac humectantia.                    | cap. CCXIIII.   |
| De felle.                                                            | cap. CVI.      | De pellibus & corijs.                                               | cap. CLXII.    | Quæ primo ordine humectant.                                       | cap. CCXV.      |
| De sudore.                                                           | cap. CVII.     | De uentriculo mergi.                                                | cap. CLXIII.   | Quæ secundo ordine humectant.                                     | cap. CCXVI.     |
| De urinis.                                                           | cap. CVIII.    | De uulpibus.                                                        | cap. CLXIIII.  | Quæ aquosam frigiditatem habent.                                  | cap. CCXVII.    |
| De salina.                                                           | cap. CIX.      | De araneorum telis.                                                 | cap. CLXV.     | Quæ tenuiū partiū sint.                                           | cap. CCXVIII.   |
| De stercore.                                                         | cap. CX.       | De ranis.                                                           | cap. CLXVI.    | Quæ crassiū partiū sint.                                          | cap. CCXIX.     |
| De stercore canino.                                                  | cap. CXI.      | De mustela.                                                         | cap. CLXVII.   | Corroborantia.                                                    | cap. CCXX.      |
| De stercore humano.                                                  | cap. CXII.     | De terre intestinis.                                                | cap. CLXVIII.  | Concoctoria.                                                      | cap. CCXXI.     |
| De stercore lupino.                                                  | cap. CXIII.    | De dracone marino.                                                  | cap. CLXIX.    | Suppuratoria.                                                     | cap. CCXXII.    |
| De stercore caprino.                                                 | cap. CXIIII.   | De uipera.                                                          | cap. CLXX.     | Mollientia.                                                       | cap. CCXXIII.   |
| De stercore bubulo.                                                  | cap. CXV.      | De herinacio marino.                                                | cap. CLXXI.    | Quæ indurant.                                                     | cap. CCXXIIII.  |
| De stercore ouillo.                                                  | cap. CXVI.     | De herinaceo terrestri.                                             | cap. CLXXII.   | Extensoria.                                                       | cap. CCXXV.     |
| De stercore columbino.                                               | cap. CXVII.    | De hippocāpis marinis.                                              | cap. CLXXIIII. | Quæ uasorum oscula aperiant.                                      | cap. CCXXVI.    |
| De gallinaceo stercore.                                              | cap. CXVIII.   | De cantharidibus.                                                   | cap. CLXXV.    | Rarefacientia cutem.                                              | cap. CCXXVII.   |
| De stercore anseris, accipitris, ciconiæ, & terrestriū crocodilorum. | cap. CXIX.     | De cancris fluuiatilibus.                                           | cap. CLXXVI.   | Densantia cutem.                                                  | cap. CCXXVIII.  |
| Sordes ouium ex qua æsypus.                                          | cap. CXX.      | De carabo siue locusta.                                             | cap. CLXXVII.  | Corrodentia.                                                      | cap. CCXXIX.    |
| De carnibus.                                                         | cap. CXXI.     | De testibus castoris.                                               | cap. CLXXVIII. | Reprimantia eminetias.                                            | cap. CCXXX.     |
| De extremis terrestriū animalium partibus.                           | cap. CXXII.    |                                                                     |                |                                                                   |                 |
| De glandulis.                                                        | cap. CXXIII.   |                                                                     |                |                                                                   |                 |
| De testibus.                                                         | cap. CXXIIII.  |                                                                     |                |                                                                   |                 |



|                                                                                                   |                                                       |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cicatricem inducentia. cap. CCXXXI.                                                               | CCXLIII.                                              | Quæ stomacho incommoda sunt. cap. CCLVII.               |
| Exulcerantia in superficie. cap. CCXXXII.                                                         | CCXLIV.                                               | Flatus expertia. cap. CCLVIII.                          |
| Vstoria. cap. CCXXXIII.                                                                           | Quæ atrabiliarium succum generant. cap. CCLVI.        | Flatuosa. cap. CCLIX.                                   |
| Attractoria. cap. CCXXXIII.                                                                       | cap. CCLVI.                                           | Quæ extergent, secant, obturatione liberant. cap. CCLX. |
| Discussoria. cap. CCXXXV.                                                                         | Quæ biliosum humorem generant. cap. CCLVII.           | Quæ obturant. cap. CCLXI.                               |
| Adstringentia. cap. CCXXXVI.                                                                      | Quæ superfluitatibus redundant. cap. CCLVIII.         | Quæ tardi transitus sunt. cap. CCLXII.                  |
| Quæ semen generant ac prouocant in cibis ac medicamentis, & cibis medicamentarijs. cap. CCXXXVII. | Quæ superfluitatibus careant. cap. CCLIX.             | Quæ facile corrumpuntur. cap. CCLXIII.                  |
| Quæ semē inhibeat. cap. CCXXXVIII.                                                                | CCXLIX.                                               | Quæ difficulter corrumpuntur. cap. CCLXIII.             |
| De alimētōrū uiribus. cap. CCXXXIX.                                                               | Multum nutriunt. cap. CCL.                            | Quæ uentrē subducunt. cap. CCLXV.                       |
| Attenuatoria alimenta. cap. CCXL.                                                                 | Quæ parum nutriunt. cap. CCLI.                        | Quæ uentrem supprimunt. cap. CCLXVI.                    |
| Craſſi succi alimenta. cap. CCXLI.                                                                | Quæ boni succi sunt. cap. CCLII.                      | Quæ calfaciunt. cap. CCLXVII.                           |
| Media inter attenuatoria & craſſefaciencia. cap. CCXLII.                                          | Quæ mali succi sunt. cap. CCLIII.                     | Quæ frigefaciunt. cap. CCLXVIII.                        |
| Quæ uiscosum sanguinem generant. cap. CCXLIII.                                                    | Quæ facilia cōcoctu sunt. cap. CCLIII.                | Quæ siccant. cap. CCLXIX.                               |
| Quæ crudum humorem generant. cap. CCXLIII.                                                        | Quæ agrē concoquuntur. cap. CCLV.                     | Quæ humectant. cap. CCLXX.                              |
|                                                                                                   | Quæ stomacho commodant eumq; corroborant. cap. CCLVI. | Quæ caput ledunt. cap. CCLXXI.                          |

## AETII MEDICI GRAE- CI CONTRACTAE ME-

DICINAE TETRABIBLI PRIMAE

SERMO SECVNDVS.

\*

*Quaecunque sunt plantarum partes, & fructus, & succi, & liquores, superiore sermone relatum est. Nunc uero de reliquis medicamentis, terræ uidelicet speciebus, & metallicis iuxta propositum agemus: Deinceps etiam de animalibus.*

### DE TERRAE DIFFERENTIIS. Cap. I.



**T**ERRAM omnes homines familiariter usurpatione illam substantiam solum nominant, quæ liquore subacta, lutum euadit. Nam quæ inter metalla reperitur, non liqueſcit, dico autem liqueſcere, per totam substantiam in humorem resolui. madesſeri autem in superficie, rigari tantum humore ad corporum profunditatem non penetrante. omnis terra uim siccandi habet, quoniam corpus ipsius natura durum existit, & ubi penitus nulla igneae substantiae mixtura habuerit, leuissimè citra omnem mordacitatem siccatur. Conducit ipsi ad hoc præstandum locura. Itaque quædam lotura non habent opus, quædam iterum atque iterum lauari expetunt. Quod si circa sensum gustus fueris exercitatus, ipse iudex esse potes, num lauare oporteat, siue non, id quod ex acrimonia aut adstrictione depræhendes. Quandoquidè uero impossibile est inuenire substantiam penitus immixtam ac simplicem, amplius cōsiderare ipsam mixturam oportet, ex his quæ accidunt ipsi, iuxta leuitatis ac grauitatis, itemque saporis differentias. Siquidè enim adstringens apparuerit, tanto magis particeps est frigiditatis, quāto plus habuerit adstrictionis. Si uero acrimonia præ se tulerit, tantum habet caliditatis quantū acrimoniae. Et leuis quidè terra sit, quum per omnem suam temperaturā, aëreæ substantiae multae particeps est. Contrā grauis, quāto fuerit grauior, rāto magis sine cera terra existit. Calida quidem igitur terra calfacit, frigida & adstringens, perfrigerat & repellit. Quæ uero extensoriū quid possidet citra manifestā caliditatem, leniter siccatur. Quæ autē glutinositatem amplio-

rem habet, non extergit, sed glutinositas substantiam meatibus obducendis aptiorē efficit, ut extergere non possit, ubi nulla alia acrimonia uiscositati affuerit, uelut in ouo uidere est. Porro necessariū est neque hoc ignorare, sed eius per omnem materiam quæ in medicum usum uenit meminisse. etenim plurimi opinantur, omnia uisita frigidiora seipsis euadere, quidā uice uersa calorem in uisitis augeri putant. Vtrique autem errant. Acrīa quidè igitur omnia uisita, multum de calore suo perdunt. Quæ uero talia non sunt, uisita caliditate acquirunt. Nullum autē uisitum penitus frigidum euadit. relinquitur enim in ipsis uelut igniculus quidā tenuium partium, atque hoc est quod per loturam uisita deponunt, quo per aquā decedente, quod reliquum est uisiti, substantia terrea frigida fit, quæ citra mordacitatem siccare potest. Aqua uero in qua medicamentum lotum est, calidam uim tenuium partium acquisiuit. His itaque declaratis, tempestiuum iam est dicere, quo modo omnem terram non uisitam lauare oporteat, si quidem lotura indigeat. Nam quædam, uelut dictum est, lotura non egent.

Quomodo terram lauare oporteat. Cap. II.

Omnis terra hoc modo lauatur. Aqua primum subigitur, quæ nullam medicamentariam qualitatem præ se ferat, deinde ubi lutum desedit, aqua superflans diffunditur, postea reliquum à subsidetibus inferne calculosis ac arenosis repurgatur.

Quas medelas agrorum terra præstet. Cap. III.

Agrorum terra quæ colitur, omnis quæ pinguis est, utilis est ad curationem omnium partium reficcatione indigentium. Quare & in Alexandria & Aegypto ipsa utuntur. In Alexandria itaque uidi hydropicos & lienosos aliquos terræ Aegyptiacæ luto uti. Multi



Multi uero etiā suras, & femora, & cubitos, & brachia, dorsumq; ac latera & pectus, eius terræ luto illinentes, opem senserunt. Quin & ueteres inflammationes & laxos tumores hoc lutū sanat. Et sanè noui quosdam toto corporis habitu aquosos, ex immodica hæmorrhoidum euacuatione redditos, inde manifestū auxilium sensisse. Quidam etiā diuturnos dolores iuxta partem aliquam firmatos, hoc luto perfecte sanarūt. Atq; hæc quidē Galenus. Verum Strato de terra sic scribit, Ad uetustū capitis dolorē, sordes balnearū aut aquæ calidæ, cum terra nigra lora misceto, ac utitor. Aut terram cū decocto caputū rosarū subigito ac utitor. Aut testam amphoræ acetariæ tritam terræ addito, cum lauri decocto. Aut clibanī testam cū nigra terra cōmittito, affuso sampsuchi decocto. Cæterū ad pustulas ex corpore erumpentes scabiosas ac impetiginosas, terrā nigram cum amygdalarū aut lupinorum amarorū decocto subigito, ac utitor. Aut amphorā aceti cū rutæ decocto eluito, eoq; terram subigito, ac utitor similiter. Aut glebular salis quæ in fundo amphorarū gari reperiuntur terito, ac terræ ammisceto, & utere uelut efficaci. Aut columbinū simū terræ misceto, & cū halicacabī decocto subigito ac utitor. At uero ad tulsim uetustam unā cū uidiato corporis habitu, terrā olisium uitulinorum decocto subigito, & pectus illinito. Aut amphoram mellariā eluito, & terrā subigito ac utitor. Potes & cumini, & nigellæ, ac sampsuchi decocto similiter terram subigere ac uti. Porro ad lenosos, cinerem sarmentitiā, & grumos fecis uini cum terra subigito, ac utitor. Aut foliorum capparis decocto subigito. Aut cremētum argenti leuissimè tritum, cum luto permisce ac utere. Aut decocto herbæ serapiadis tritesticularis subigito ac utitor. Ad hydropicos aut testas amphoræ muriariæ inueteratas terito, ac terræ ammixtis utitor. Aut suillæ carnis siue uitulinæ garum ammisceto, ac similiter utitor. Aut sampsuchū aqua marina coquito, eoq; terram subigito ac utitor. Aut salsamentum cū lupinorū amarorū decocto conterito, terræq; ammisceto ac utitor. Aut alumen ustū, & pulegij usti cinerē, cū luto committito, & cum aceto mulso subigito ac utitor. Aut bubulū simum siccū tritū terræ ammisceto, & aceto mulso subactis utitor. Ad Ischiadicos, & omnes neruolarū partiū perfrictiones, sampsuchum uitulinorū olisium decocto coquito, eoq; terram albam subigito ac utitor. Aut anguillam cū sale & nitro coquito, & decocto terram subigito ac utitor. Aut sordes strigmētitiās cum calce uiua terræ ammisceto ac utitor. Aut porri siue allij decocto terrā subigito ac utitor. Aut costum, cassiam, iūcum odoratum, aspalathum, xylobalsamum, & sampsuchum contusa, in aqua & oleo coquito, lutoq; permisceto ac utitor. Aut caprarū simum ac bubulum, simul cum sorde cerati raphanini terito, ac ad terram ammixtis utitor. Ad podagram, à capite usq; ad inguina ex prædictis æger integatur, ab inguine autem infra usq; ad digitos pedū & ungues, ex subscriptis. Vituli pedes posteriores unā cum ungulis exurito, terito ac terræ misceto, & utitor. Aut lapidē leucographidem cum aqua in qua ferrū sæpius extinctū est terito, & aluminis unciam unam addito, ac cum terra subigito & utitor. Aut decocto foliorum cypri, id est ligustri terram subige ac utere. Aut gallas

donec flaccescat coquito, & terram eo decocto subigito ac utitor. Aliud. Aluminis liquidī uncīā unā, aluminis scissi unciam unā, gummi sexcūcē, cærusæ dodrantē, melantheriæ quincuncem, misyos sexcuncem, soliorum salicis dodrantem, olei myrtei aut cici uncias x x i i i i. aceti sexcūcem. terito simul ac tū terra subactis utitor. Aliud. Acaciæ, atramenti sutorij, utriusq; drach. i i. aceto trita siccato, & ad terram ammixtis utitor. Aliud. Aluminis, spumæ argenti, misyos assati, singulorum drach. i i i i. excipere cerato myrteo liquido, & cum terra subige ac utere. Aliud. Cerusæ, spumæ argenti, utriusq; drach. x x i i i i. olei myrtei drach. x x x i i i i. aquæ quod satis est subigito cum terra ac utitor. Aliud, quo curatus est præses Philinus. Succī mororū, aluminis scissi, ligustri, uiticis, gallarum, croci, fructus myricæ, thuris, singulorum sexcuncem. Omnia simul tenuissimè trita reponito. Vsu expetente necessario aqua dilutis ac cū terra subactis utitor. Cæterū lauare non oportet, sed persicorū immaturorū decocto perfundi ac foueri. Atq; hæc quidē de agrorū terra sufficiūt,

De terra Lemnia, Sigillum Lemnium, Sphragis

**Lemnia.**

Cap. I I I I.

Lemniā terrā, quam & lemnium sigillū, siue sphragidem uocant, præparatam accipere est, semel lotam in patrio loco, ut altera lotura non habeat opus. Verum aliās alio liquore dissoluta, diuersimode operatur. Et sanè in malignis ac putredinosis ulceribus semper feliciter & magno fructu, lemnia terra usus sum. Vsus est pro magnitudine malicie ulceris. Quod enim ualde foetidū est, humectumq; ac sordidum & inueteratū, lemniam requirit acerrimo aceto dissolutā ad lutosam compagem. Vīno autē diluta, recentia uulnera glutinat, pota ad sanguinis reiectiones conducit, & ad letalia medicamenta, & ad morsus uenenatorū animalīū. Infusa quoq; per clysterem cū plantaginis succo, dysentericis magnopere auxiliatur, præablotis uidelicet ulceribus muria infusa. Datur isdem & sanguinem spuētib; in potu cum posca.

*Miltos, Rubrica.*

Cap. v.

**Rubrica** siue miltoſ uim habet adstringendi, meatus obducendi, resiccandi, quapropter etiam emplastris ammiscetur ac pastillis siue trochiscis siccantibus ac adstringentibus. Sistit aluum cū ouis in sartagine frictis accepta, itemq; infusa. Lumbricos etiā pora detrahit, primas omniū habet Sinopica appellata, uerum in Cappadocia nascens, densa existens & grauis, & colore iocineris, unicolor, & quæ diluta in multum succum diffunditur.

**Terra Samia.**

Cap. vi.

**S**amīa terra non lauatur. Vtūmur autem altera eius specie frequētius, quam sanè Samiam Asterem siue stel-  
lam uocant, quæ ad sanguinis sputum facit pota, &  
undecūq; feratur idem, & pota & apposita. Vtūmur  
& ad exulcerationes dysentericas & nomas serpēdo  
depascentes, infundentes eam cum plantaginis succo,  
maximè in ulceribus quæ inflammatio præoccupauit,  
& acriora pharmaca non sustinēt, & in corpori-  
bus molli carne pręditis. Mitigat enim humectiores  
pręsertim & laxiores partes. Vnde in māmārū ac te-  
stium inflammationibus adhibetur, trita cum aqua,  
rosaceo tanto adiecto, ut pharmacum exarescere non  
sinas. Bonum est hoc modo præparatum medica-  
d                  mentum



mentum etiam ad alias inflammationes calidas, & ad inguinum abscessus incipientes, ac fluctiones podagricas, & in summa ubi moderatè frigefacere unaq; mitigare uolumus. ut ex hoc adeò manifestè appareat, samiae terrae uim moderatè frigefactoriam esse. Est enim aërea & glutinosa. praestat autem stella samia, terrae samiae, eò quòd glutinositatem & uim obducendi meatus ampliorem possidet.

*Terra Selinusia, & Chia.*

Cap. VII.

Selinusia & Chia terra exterforiā uim ualde moderatè habent. Quapropter aliquæ foeminae ad faciem his utuntur. Verū cum leui siccatione ac extersione, neq; caliditatis neq; frigiditatis manifestè participes sunt. & propterea ad ulcera in superficie corporum commodæ existunt, qualia sunt ambustorū. Ceterū quæ substantiam meatuum ualde obducatoriam habent, nō extergēt, prohibet enim hoc ipsum glutinositas.

*Cimolia terra.*

Cap. VIII.

Cimolia terra mixtæ facultatis est, habet enim uim frigefactoriam & repulsoariam, habet & modicā discussoriam. Lota discussoriam deponit. Verum iuxta naturā eorū quæ ipsi ammiscuntur, manifestè utrāq; uim demonstrat. Nam repulsoarijs ac frigefacientibus permixta, lutum quod inde fit perfrigerans ac repulsoarium efficit, discussorijs discussorium, atq; ita ambustis cōducit aceto subacta & illita. Memineris tamen commune hoc in omni leui terra esse. Omnes enim ambustis profunt euestigiò ex posca illita, bulas exurgere prohibentes.

*Terra Ampelitis, Pharmacitis.*

Cap. IX.

Ampelitis terra etiā pharmacitis appellatur, eò quòd efficaciorē alijs uim possidet, & quòd agricolæ uere appetente ipsam diluant, ex eaq; radices uitium quæ germen emiserūt illinant, ut animalcula uitibus noxia eas non cōtingant. Ex eo uero quod cnipas uermiculos perimat, satis indicat quantū medicamentariæ facultatis possideat. At uero lenitatē & uim mitigatoriam non habet, sed magis siccatur. Quapropter & mixtam his medicamentis reperies ipsam, quorū scopus est siccare quippiam ac discutere.

*Terra Cretica siue Creta.*

Cap. X.

Cretica terra similis quodam modo est samiae & consimilibus, Sed ualde debilis est, multum aërositatis habens, quapropter etiam uim extergendi citra mordacitatem magis habet, per quam etiam argentum exterit ac depurat.

*De omni terra usta.*

Cap. XI.

Quandoquidem uero quidam medici terrā urunt, neq; id male excogitatum in usum ulcerū quæ leniter resiccari oportet. Nolle expedit quòd ustu terra tenuiorū partium & acrior euadit, ut ad discussoriam facultatem delabatur. Si uero usta lauetur, acrimoniā quidem in aquam deponit, uerum partium tenuitatem ex ustura conseruans, magis siccatoria fit. Quapropter quum omnis terra non usta ulceribus comoda sit, ea quæ post usturam lota est, magis adhuc ad ulcera ægre carnē ac cicatricē recipientia cōducit.

*De bolo Armenia.*

Cap. XII.

Data nobis est in hac magna peste etiam alia quædam terra ex Armenia Cappadociæ cōtermina, maximè siccatoriam uim habens, colore pallida. Qui dabat ipsam, lapidem appellabat. Est autem friabilis, uelut calx & stella samia, non tamen similiter stellæ leuis. Nā & magis densa est, minus aërea, quapropter qui

negligētius inspicit, imagine lapidis offertur. Valde autem siccatur, tum in dysentericis, tum in fluxionibus uentris. Insuperq; sanguinis sputo, & destillationi, & putredinis oris ulceribus conducit. maximè autē defluxionibus à capite ad pectus prodest. Quare etiam his qui ob eam causam ægrè spirant ualide auxiliatur, nec non his qui tabe laborāt. sic enim resiccatur ulcus, ut ne tussiant quidem amplius. Ceterū si fortè quis à malo liberatus, per licetiorē diætā recidiuam sentiat, is itidem ex Armenia bolo opem sentiet, præsertim difficili anhelitu iam diuturno. Porro in magna hac peste omnes qui de hoc pharmaco biberūt, celerrimè sanati sunt, quibus uero nihil profuit, omnes mortui sunt, neq; ab alio quopiam opem senserunt, ex quo palam cōstat, quòd solis his qui incurabiles erant non profuit. Bibitur cum uino substantia tenui, mediocriter diluto, si febre penitus careat homo, aut parum febricitet, sin ualde, cū aquato penitus. sed neq; sunt adeò uehementer feruidæ pestilentes febres. At uero quid attinet dicere quantam uim habeat hæc Armeniaca bolus siue gleba in ulceribus siccatione indigentibus? Appellatur autem illorū lingua uernacula zarinaca, Syrorū uero zarnacha, mons in quo nascitur, iuxta urbem est appellatā Bagana. Ager in quo mōs est, nominatur Agaraces.

*Lapis hematites.*

Cap. XIII.

Hæmatites à coloris similitudine nominatus est. affricus enim ad cotem, uel in pila tritus, sanguinolentū succum remittit. tātæ autem frigiditatis particeps est, quantæ adstrictionis. merito itaq; ausi sunt medici hæmatiten lapidem ocularibus cōpositionibus addere. Ego uero etiam solo per se usus sum ad aspretudines palpebrarum, si unā cum inflammatione essent oborta, per oui candidum diluto, aut potius per fœnograci decoctum. si uero citra inflammationē, per aquam. Initium semper faciendum est à moderatè liquido per specillū infuso, deinde ubi æger ferre uim eius potest, crassitudinem augere oportet, & postremum ita crassum facere medicamentū, ut specilli nucleo subdito palpebræ illinere possis, aut euersæ affricare. Idem lapis ad cotem tritus ac potus, sanguinis sputo omnibusq; ulceribus conducit. Aridus autem tritus & ad puluillum redactus, reprimat carnē exerescens, nemo autem ipso per se utitur. ego uero ad ea quæ dixi usus sum, uiribus ipsius ex saporis qualitate cognitis. Quin & ipsa ulcera oculorum ad cicatricē perducit per se solus tritus, uelut paulò antè dixi, siue infundatur, siue sublinatur. Nam & hoc ipsum experimento cognoui.

*Lapis schistos, galactites, melitites.*

Cap. XIII.

Consimilem hæmatitæ, sed debiliore uim schistos, hoc est, scissilis appellatus lapis habet. Ad cotē tritus colorem pallidum reddit. Ab eo consequens est Galactites, lactis colorē dilutus reddens. melitites autē caliditatis cuiusdam particeps est. Nam à similitudine saporis mellis nomen inuenit. Singuli itaq; hi paululum ab hæmatite uiribus descuerunt, & ad oculos similiter in usum ueniunt, sed leniores existunt. Leniora autē medicamenta semper sunt inflāmati paribus accommodatiora, uerū debiliora quàm ut depulsa inflānatione ad perfectā sanitatē perducere queāt.

*Communis doctrina de omnibus lapidibus.*

Cap. XV.

Quum communis sit omnibus lapidibus uis siccandi, quicunq;



quicunque ex ipsis aut in succum resoluti, aut aliàs tri-  
ti, nullam manifestam gustui qualitatem exhibent,  
eos putandum est debilissimos esse & leuissimos, &  
mordacitatis penitus expertes. Qui uero manifestā  
qualitatē gustantibus offerunt, iuxta qualitatis pro-  
portionem etiā uim habent. si quidem enim adstrin-  
xerint, ad reprimendū, & constringendum spissan-  
dumq; ac cogendū commodi erunt. si uero momor-  
derint, ad calfaciendū & discutiendum ac colliquan-  
dum ualebunt. Inter hos mediū sunt qui solummodo  
extergent, citra adstrictionem ac mordacitatem.

*Leucographis aut moroxus.*

Cap. xvi.

Ex lapidum qui in succum resoluuntur numero est &  
qui in Aegypto nascitur, quo utuntur ad linthea illu-  
strāda, quē alij moroxum, alij leucographidem uo-  
cant. Nam quum subuiritidis appareat hic, si ad cotem  
affricetur, aut asperius pallium, locum inalbat. Ex-  
pers est autem omnium qualitātū magis quā prae-  
dicti, non adstrictionem, neq; extersionem, neq; mor-  
dacitatem in gustu exhibens. Vnde hoc tantum ipsi  
adeſt quod citra mordacitatem siccatur. & propterea  
cerato ipsum ammiscet, & ad ulcera cicatrice inclu-  
denda utuntur in corporibus mollibus. miscet eun-  
dem & ocularibus compositionibus. Quanto uero  
mollior est & qualitatum magis expers, tanto mo-  
deratior & mitior existit.

*Galactites.*

Cap. xvii.

Galactites quoq; consimilem praedicto colorem subui-  
ridem habens, lacteum succum remittit. Est autem al-  
bior leucographide. Mulieres lacte multo implet, si  
à balneo tritum lapidem cum aqua aut uino dulci bi-  
bant. Miscetur & ocularibus compositionibus. Tra-  
dunt eundem dentientium puerorum collo adalliga-  
tum, facilem dentium exortum efficere.

*Thyites lapis.*

Cap. xviii.

Omnibus relatis lapidibus fortiolem uim habet, lapis  
qui ex Aethiopia apportatur subuiritidis aliquo mo-  
do uelut iaspis, nominatus thyites. Dilutus hic succū  
reddit lactei coloris, saporis mordacis, & propterea  
solum ad repurganda & extergenda ea quae pupillis  
tenebras citra inflammationem offundunt, cōducit.  
ex quo numero sunt & recētes oculorum cicatrices,  
quas attenuare solet. extergit & pterygium, oculorū  
uitium Vnguem Latinis appellatum, si nō ualde du-  
rum existat.

*Tecolithos quem Syriacum appellant.*

Cap. xix.

Est & alius lapis fortis facultatis in Syria Palēstinae na-  
scens, colore albus, figura cōcinnus, lineas habens ue-  
lut à torno exsculptas. appellatur Iudaicus & tecoli-  
thos. Cōfringit calculos in renebus natos, dilutus in  
cote, & ex aqua calida potus. Verum in uesicae lapi-  
dibus nihil eximij praestat. Nechepson tradit hec uer-  
ba: Tecolithum lapidem cū aqua terito ad sordium  
strigmentulorum tenuium crassitudinem, & derasis  
circa uesicam ac pubem pilis illinito, & cōfringit ac  
liquefaciet calculos in uesica. Vnde & canulena or-  
ta est.

*Salue pelagus Arabiae,*

*Cladum medelam proferens*

*Insigniter, tecolithum.*

*Idem oleo myrteo dilutus, podagricis commodè il-  
linitur.*

*Pyrites.*

Cap. xx.

Est & pyrites ex lapidum numero qui fortem uim ha-

bent, colore argēto similis, cuius usus est discussorio  
emplastro ammixri, adijcitur ipsi etiam schistus. hoc  
pharmacum saepe pus, saepe & grumosas concretio-  
nes, in medijs musculorum regionibus consistentes  
disculsit. Oportet autem lapides qui in usum uertun-  
tur omnes leuissimos facere, ac conterere consimili-  
ter ut eos qui in oculares compositiones miscentur.

*Lapis Phrygius.*

Cap. xxi.

Phrygius lapis fortiter siccatur, habēs quid adstrictionis  
simulq; mordacitatis, unde et repellit ac discutit. Ego  
autem uſto semper usus sum, ad putredinosa quidem  
ulcera aut per se, aut cum aceto, aut posca, aut uino  
mulso. Ad oculos uero siccum ex ipso facio medica-  
mentum, de quo in opere ubi de compositione medi-  
camentorum dicitur, agam.

*Lapis Ageratus.*

Cap. xxii.

Lapis Ageratus quo coriarū utūtur, gurgulionem in-  
flammatum euidenter sanat.

*Lapis Alsus, & flos ipsius.*

Cap. xxiii.

Est & lapis Alsus in Asso nascens, unde & nomen in-  
uenit, rosacei coloris ac cōpagis, friabilisq; ac laxus.  
Innutritur autem in ipso quippiā simile tenuissimo  
pollini, qui parietibus molendinorū inhæret, quod  
petrae Alsiae florem appellant. Est autem tenuiū par-  
tium, ut humore flaccidas carnes eliquet ac resciet,  
citra fortē mordacitatem. habet & quid salsum in sa-  
pore: ut coniectare liceat generationem ipsius salsum  
esse, rore quodam ex mari petrae insidente, qui post-  
ea à sole siccetur & obarescat. Similem flori uim ha-  
bet & petra in qua nascitur, sed efficacia debiliorem.

*Gagates.*

Cap. xxiiii.

Estq; alius quidam lapis colore niger, qui igni admo-  
tus, bituminis odorem de se praebet. Hunc tradūt re-  
periri in Lycia circa fluuium Gagen, unde etiam Ga-  
gates appellatur. Caeterū ego crustaceos & planos  
lapides nigros, debilem flammā generantes igni ad-  
motos, ex Cana Syria attuli prope Hierichuntē, qui  
nati erant in uertice mortuū mare ambiente, ad partē  
eius orientalem, ubi & bitumen prouenit, unde &  
odorem huiusmodi acquisierunt. Vſus sum autē his  
ad inflationes genuum diuturnas & aegrē sanabiles,  
compositionibus ad hoc accidēs experimento cogni-  
tis ipsos ammiscens, & sanē uisi sunt mihi uim illarū  
longē efficacissimam reddidisse. Ammiscui eisdem  
& emplastro Barbaro appellato, & euasit pharma-  
cum manifestē amplius siccatoriū, ut & sinus cōmita-  
teret ac contraheret, non solum cruenta uulnera glu-  
tinaret, ad quae barbarū emplastrum maximē com-  
modum esse creditur. Aiunt Gagaten aqua coctum,  
& cū aqua potum, lumbricos expellere, adalligatū  
autem capitis dolores inueteratos sedare. Accelerat  
partū mulieribus aegrē parientibus, si parturiētis mā-  
nu contineatur. Admiranda uis gagatae igni admoti  
& accensi, deinde uino extincti existit. Nam uinum  
hoc cardiacis in potu datum, statim ipsos leuat, & su-  
dore cōpresso, & pulsu excitato. Alj in puluillū con-  
terunt gagatē lapidem, & per dies septem cū uino co-  
licis exhibent, & penitus malū tollunt. datur in diem  
drachma una. Quin & poculum ex ipso suffumigāt,  
ex quo cum uino bibendus datur. Idem praestat effi-  
caciter bitumen quoq; potum, fugat serpentes ac res-  
piles bestias suffitus gagates, & menses ac secundas  
detrahit, depræhendit item ac arguit comitiales mor-  
bos. strumas quoque dissoluit tritus, commodis ad  
d 3 ipsas



ipsas medicamentis ammixtus. sanat & sedis affectio-  
nes, quam leuissimè tritus, & uuarum acerbarum  
succo ad tertias decoctus. Quo modo etiam alias om-  
nes corporis fluxiones compescere potest.

*Magnetes lapis.*

Cap. xxv.

Magnetes lapis qui & Heraclius appellatur, consimi-  
lem hæmatitæ uim habet. participat & attractoria  
facultate. Tradunt de rentum manu chîragricorum  
ac podagricorum, dolores ipsorum sedare. æque &  
conuulsis opitulatur.

*Smiris, pumex, teste clibani, & similia.* Cap. xxvi.

Smiris extensoriam uim habet. Dentes itaq; mûdos fa-  
cit si ex ea confricentur, uelut experientia cognoui-  
mus. Et pumex extensoriam uim habet uelut smi-  
ris. Et figulina testa eadem uim præstat, maximè cliba-  
norum. Cæterum smiris etiã acre quippiam habet,  
& propterea ustorijs ac siccatorijs compositionibus  
miscetur. Item eis quæ curant humore flaccidas gin-  
giuas. Sed & pumex affricus dentes illustrat, non  
solum extergendo, sed etiã per asperitatem. Vstus au-  
tem pumex nihilo inferior est smiride, ad eosdè usus.  
Lotus idem post usturam, caua ulcera optimè carne  
replet. At uero clibanorum testa, una cum extergen-  
di facultate & siccatoriam possidet. Quapropter em-  
plastra ephestias & magos, ex hac testa composita,  
optimè elatricem ulceribus inducunt.

*Lapides in spongijs.*

Cap. xxvii.

Lapides qui in spongijs reperiuntur uim atterendi ha-  
bent, non tamen adeò ualidam ut uesicæ lapides cõ-  
fringere possint, uerum renum calculos cõminuunt.

*Ostracites, Geodes, Naxiæ cotis retri-  
mentum.*

Cap. xxviii.

Ostracitem lapidem quosdã laudare audio, uelut qui  
multam siccatoriam uim habeat ex adstrictione &  
acrimonia permixtam. quemadmodum & eum qui  
Geodes appellatur: ita ut pupillas depurget, & miam  
marum ac testium inflammationes sanat aqua dilu-  
tus. Naxiæ tamen cotis retriementum frigefactoriam  
uim habet: ut etiam podagris opituletur, cum cerato  
rosaceo adhibitum.

*Ophites lapis.*

Cap. xxix.

Ophites lapis ustus extergendi ac atterendi & confrin-  
gendi uim habet. Quare potus ex uino albo ac tenui,  
lapides uesicæ cõfringit. Adalligatu ad uiperæ mor-  
sus conducit.

*Hieracites lapis & Indicus.*

Cap. xxx.

Hieracites & Indicus lapis hæmorroidas resiccat dex-  
tro fœmori adalligati, cuius rei & nos periculum  
fecimus. Diogenes autem de lapidibus libro sic ait:  
Lapis hieracites subuiritidis est ad nigredinem uer-  
gens, & alijs coloribus respersus, ut uariis existat.  
Vim autem habet hæmorroidas resiccantem dextro  
ægri fœmori adalligatus. Probatio ueri hæc est. Vbi  
habueris ipsum in manibus, melle manus inunge, &  
muscæ non appropinquabunt tibi lapidem ferenti.  
At uero Indicus colore subfuluus est, tritus autem  
purpureum colore succum remittit, & neque densus  
neque rarus est, & cum uino potus hæmoptoicis  
prodest. Qui uero ex albidis coloris est & cineris ima-  
ginem repræsentat, etiam alias sanguinis eruptiones  
sistit.

*Vitrum.*

Cap. xxxi.

Vitrum tenuissimè tritum, ex uino albo tenui potum,  
uesicæ calculos potenter confringit.

*Lapis Aëtites.*

Cap. xxxii.

Aëtites lapis agitatus sonitū edit, uelut ex altero lapide  
prægnans. fœtus uuluarum lubricarum retinet sini-  
stro brachio adalligatus. Verū tempore partus adi-  
mendus est de brachio & fœmori adalligandus, pa-  
rietq; prægnans citra dolorem. Fures deprehendit,  
si quis ipsum in panem qui comeditur imponat. nã  
qui furtum fecit, commansa deuorare nequibit. Tra-  
dunt etiam simul cum eduljs coctum fures arguere.  
Neq; enim poterit fur deuorare quæ cum ipso cocta  
sunt. Tritus autem & cerato cyprino aut gleucino  
exceptus, aut alio quopiã calfaciēte, magnopere pro-  
dest arthriticis ac paralyticis.

*Alabandicus siue Alabandinus lapis.* Cap. xxxiii.

Alabandicus coloris subnigricatis est fuluo ammixto,  
pellucet quasi segmentis quibusdam aut fissuris dis-  
criminatus. Tritus hic superficiem pilorum alborū  
nigram efficit.

*Electrum siue succinum, seu lyncuriū.* Cap. xxxiiii.

Electrum quod & succinum, & lyncuriū appellant,  
potum dysenterias sanat, & stomachicis opitulatur.  
Chryselectrum quoq; cum mastiche potum dolori-  
bus stomachi medetur.

*Iaspis uiridis.*

Cap. xxxv.

Viridis iaspis proprietate quadam, uelut alia quædam,  
auxiliatur stomacho & ori uentris pro amuleto ap-  
pensus. Quidam & anulis ipsum includunt, & dra-  
conem radios habentem in ipso sculpunt, quemad-  
modum Nechipso rex scripsit. Huius itaq; lapidis  
etiam ego experimentum ingens habeo, & sanè ca-  
tenulam ex talibus lapidibus concinnatam de collo  
suspendi, ea commensuratione ac modo ut lapides  
os uentris contingant. Cognoui autem nihil minus  
ualere ac prodesse eos qui sculpturam non haberent,  
quam Nechipso tradidit.

*Iaspis subuiritidis.*

Cap. xxxvi.

Iaspis subuiritidis adalligatus, stomachi dolores sedat, et  
paralyticas resolutiones ac dolores mitigat. Qui ue-  
ro capnias appellatur, hoc est fumosus, turbulētum  
ualde habens colorem, magna tutela ægrè parientes  
mulieres asseruat. Sed & hydropicis adalligatus cõ-  
modat, & maxima uulnera ab inflammationibus  
asseruat, eosq; qui uulneratur dolore liberat itidem  
adalligatus.

*Iaspachates.*

Cap. xxxvii.

Iaspachates ex iaspide smaragdeo, & achate compo-  
situs est. Vim habet leniendæ sius, & hydropicis au-  
xiliatur, hepaticisque ac peripneumoniacis & pleu-  
riticis potus. corpus quoque floridum ac speciosum  
facit.

*Sapphirus lapis.*

Cap. xxxviii.

Sapphirus cum lacte tritus potus, omnes internas ulce-  
rationes sanat, & sudores sedat. Externas ulceratio-  
nes idem cum lacte illitus curat. fissuras quoque lin-  
guæ aridus tritus inspersus sanat. In summa siccato-  
riam uim habet.

*Smaragdus lapis.*

Cap. xxxix.

Smaragdus assatus & tritus cum melle Attico permi-  
xtus, oculorum hebetudines sanat. Cum melle uero  
& gummi illitus, elephantias laborantibus utilissi-  
mus est. idem quoq; potus ab eo malo in totum libe-  
rat. sistit & sanguinem undecunq; feratur.

*De metallicis, & quæ ex aqua generantur.* Cap. xl.

Metallica appellare mos est medicis ea quorum gene-  
ratio





ratio in metallis est, siue sponte naturæ, siue per for-  
nacem producantur, insuperque tertij generis quæ  
rursus ex illis ipsis homines suo ingenio faciunt, ue-  
lut est cerussa, ærugo, sandix, & similia. Itaque con-  
sequenter de omnibus iuxta literarum Græcarum  
ordinem trademus.

A. Adarces.

Cap. xli.

Adarces acerrimus ac calidissimus est. Quapropter  
hebetantibus uim ipsius miscetur. & sic multi usus  
fit, affectionibus calferi indigentibus forinsecus  
admotus.

Alcyonia.

Cap. xlii.

Alcyonia omnia extergent, ac discutiunt, habetque acrem  
qualitatem aliqua magis, aliqua minus. Quod ex  
hoc genere Asperum appellatur, externam superfi-  
ciem leuem habet, & internam substantiam asperam,  
estque calidissimum omnium Alcyoniorum, ut etiam  
pilos exurere possit. Quapropter ad lepras, uiriligi-  
nes, scabies ac impetigines, alijs mitioribus medica-  
mentis utimur. Nam Asperum Alcyonium non so-  
lum extergit ac depurgat cutem, sed etiam excoriat  
ac ulcerat. Quod uero Milleium uocatur, figura uer-  
mi simile, purpurei coloris, & compage substantiæ  
molli, omnium tenuissimum est. Quare ustum alo-  
pecias sanat, cum uino fuluo ac tenui illitum.

Ales, Sal.

Cap. xliii.

Sal omnis & fossilis & marinus, eandem in genere uim  
habet. Differentia in eo est quod ex terra effossi sub-  
stantia magis sit coacta, quapropter crassitudo par-  
tium, & uis adstringendi, in his maior existit. Fossi-  
lis generis optimus est Ammoniacus & Cappado-  
cicus. At uero marino specie similis est qui in qui-  
busdam stagnis generatur. Omnis tamen sal in com-  
muni calfacit, discutit, adstringit, siccit, cogit ac den-  
sat substantiam corporum quibus adhibetur. Nam  
quicquid est in corporibus humiditatis id ipsum de-  
pascitur, & quod reliquum est solidæ substantiæ ui  
adstrictoria spissat. Vnde & siccant, & incorrupta  
adseruant, quæ ob superfluam humiditatem putrefe-  
cere solent.

Sal ustus.

Cap. xliiii.

Sal ustus discussoriam uim magis habet quam non u-  
stus, quanto sanè tenuius corpus ex ustura acquirit.  
Non tamen similiter ut non usta cogere ac densare  
solidam substantiam ualet.

Salis flos.

Cap. xlv.

Salis flos compage quidam liquidus est, colore uero cro-  
ceus, partium tenuitate uisum salem superat, & acrem  
qualitatem ac uim multum discussoriam habet. Col-  
ligitur sub æstum caniculæ. Est enim uelut flos qui-  
dam talibus aquis super stans.

Salis spuma.

Cap. xlvi.

Salis spuma spumofus quidam flosculus salis est, uicinis  
petris adhærens. multo autem tenuiorum partium  
naturam habet quam ipse sal, quare & attenuare &  
discutere multo magis potest, uerum quod reliquum  
est substantiæ densare uelut sal non potest.

Armeniacum pictorum.

Cap. xlvii.

Armeniacum quo pictores utuntur ex Armenia ap-  
portatur, unde quoque bolus Armeniæ, de quo di-  
ctum est, affertur. Vim habet Armeniacum exterfo-  
riam cum modica acrimonia & paucissima adstri-  
ctione. Itaque quum tale sit ocularibus medicamentis  
ammiscetur. Quin & ipsum per se terunt in tenuissi-

imum puluillum, utunturque sicco ad augmentum pi-  
lorum in supercilijs, ubi ob quandam humorum acri-  
moniam aliqui ipsorum excidunt, aliqui uero non au-  
gescunt, sed ob alimenti inopiam marcescunt. Nam  
acrimonia consumpta, particulam ad naturalem ha-  
bitum reducit. Etenim uitioso humore consumpto,  
natura ad proprias actiones redit, quum nihil sit am-  
plius quod ei impedimento sit. Nehepsus de eo sic  
tradit: Armenium quo pictores utuntur, duodecima  
drachmæ parte melancholicis & crassum sanguinem  
habentibus dato. Datur & pueris pectoris morbo in-  
festatis, reuomunt enim, nā uomitorium existit. *Pueris*  
tur & morbo sacro obnoxius, ac furiosis, hoc modo:  
Centaurij fasciculos manipulares tres in aquæ mari-  
næ heminis tribus coquito, donec una supersit, &  
cum excolato decocto Armuthei lapidis quæ Græci  
Armenium uocant, tertiam drachmæ partem terito,  
ac confidenter exhibero. Nihil enim periculi est. Ita-  
que nosse operæ precium est quod Armenium peni-  
tus reuomitur, nihil memorabile sursum efferens, sed  
& infernè modicum quid paulatim, & in pluribus  
secessibus effert.

Arsenicum, Auripigmentum.

Cap. xlviii.

Arsenicum uistoriam uim habet tum ustum, tum non  
ustum. Manifestum est autem quod ustum tenuio-  
rum partium euadit.

Asphaltus, Bitumen.

Cap. xlix.

Bitumen ex numero eorum est quæ in aqua marina aut  
consimili generantur. Optimum est quod in mortuo  
marî iuxta Hierichutem prouenit. Vis est omni bi-  
tumeni siccatoria ac calfactoria, ordine secundo. Me-  
rito itaque ad cruenta uulnera glutinanda adhibetur,  
itemque ad alia quæ siccari expetunt cum moderata cal-  
factione. Quapropter in tenasmi ad egerendum irri-  
tamentis, in quibus pituita crassa infarta est ut ægre  
auelli queat, ipsius utimur suffitu. Similiter et ad dy-  
sentericos ex tali causa intestinis ulceratis. Potum  
bitumen nucis ponticæ aut fabæ magnitudine cum  
uino tritum, cardiacis qui animo linquuntur, ma-  
gnopere euestigio prodest. Maxime autem foeminis  
& pueris & corporibus mollibus conducit. Eodem  
modo datum & quartana citius liberat. Experimen-  
to constat uis eius poti ex aqua, in his qui a rabioso  
cane morfi sunt: præseruat enim eos ne in timorem  
aquæ delabatur, & eos qui iam inciderunt cōseruat.

Aphronitrum, & Litri spuma.

Cap. l.

Aphronitrum, hoc est, nitri spuma, & litri spuma inter  
se differunt, quod litri spuma medicamentum est ma-  
gis siccatorium, aspectu farinæ triticæ simile. Nam  
alba quoque existit. Aphronitrum autem non farino-  
sum neque dissolutum, sed compactum est. Differt au-  
tem a sale aphronitrum, in quantum unum solum  
prædominantem saporem manifestè in ipso uidere  
est, amaram uidelicet, qui discussoriam uim habet, den-  
satoriam uero non habet, quemadmodum sal possi-  
det. Aphronitrum itaque exterforiam uim habet ut  
non solum sordes depurget, sed pruritum quoque sa-  
net. At uero litri spuma eandem uim quam litrum  
habet, sed tenuiorum partium existit.

Gypsum.

Cap. li.

Gypsum unum cum siccatoria facultate, uim quoque ob-  
ducendi meatus assumpsit, lapidescit enim aqua ma-  
ceratum. quapropter puluillo farinæ triticæ molen-  
dini parietibus adhærenti mixtum, & oui candido

d 4 sub



subactum, ac pilis leporinis exceptū, sanguinis eruptiones præclare sistit.

Δ *Diphryges*. Cap. LII.

*Diphryges* mixtam facultatem adstringentē cum acrimonia habet. Quapropter & malignorum ulcerum bonum medicamentum est, & ad putredinosa oris ulcera, tum per se, tum cum melle despumato. Item ad anginam, maximè ubi iam per adstringentia humorū influxus fuerit repressus. Quin & gurgulione resecto, ipso solo mox usq; ad cicatricem inducā sæpe usus sum, utpote pharmaco omnia ulcera exactè cicatrice includente.

Diaphanes, *Lapis specularis*. Cap. LIII.

*Diaphanes* siue lapis specularis appellatus, ustus tritus fistulosis ulceribus inspersus celerrimè incarnat.

Θ *Theion, Sulphur*. Cap. LIIII.

*Sulphur* omne uim attractoriā habet, temperamento calidum, substantia tenuium partium existens, ut & ad multa uenenum efaculantia animalia resistat, Ego autem & ad pastinacæ marinæ & draconis morsus ac ictus eo sæpe usus sum, arido uulnere insperso, aliquando etiam salua ammixta, aliquando oleo uetere, aut melle, aut terebinthina. Sed et scabies ac lepras & impetigines sæpe cū eo curauī addita terebinthina. Deterit enim tales affectus, nec materiā in altum repellit, quemadmodū multa medicamenta faciunt.

I *Ios xystos, Aerugo rafa*. Cap. LV.

*Aerugo rafa* acrem qualitatem habet, discutitq; ac consumit & liquefacit omnem carnē. Quod si ad multam ceram ammisceatur, exterforium & cicatricem inducens pharmacum.

Λ *Aerugo uermiculata*. Cap. LVI.

*Aeruginem uermiculatam* ita facies. In pilam cyprij aeris, quæ & pistillum æreum habeat, aceti albi acris dimidiam heminā infundito, & in sole terito donec strigmentitiam spissitudinem acquirat. Deinde aluminis rotūdi drach. i. & salis fossilis pellucidī albiq; ac solidi drach. i. addito, aut si hoc nō adsit, nitri tantundem, & postea ad solem sub cāniculæ æstum terito, donec colore æruginosum, compage uero strigmentosum euadat, atq; sic ad uermicularem figurā effingito, ac reposito. Efficacior sit ærugo, si aceti partem unam, urinæ ueteris duas contriueris.

K *Cadmia*. Cap. LVII.

*Cadmia* optima est botrytis. Vim habet omnis cadmia siccatoriam, participans & exterforia. In caliditatis ac frigiditatis differentia moderata est. Vsta uero & lota medicamentum siccans & extergens citra mordacitatem euadit, ad ulcera explenda tum oculorum, tum totius corporis commodum.

Λ *Cyanus*. Cap. LVIII.

*Cyanus* acrem & discussoriam ac demolientem cōsumentēq; carnē uim habet, participat & adstrictoria.

Α *Lepis, Squama aeris ac ferri*. Cap. LIX.

*Squama* alia aeris est, quæ sanè heliis uocatur, alia ferri. Heliis itaq; in siccando primas habet, utpote tenuiorū partium, & quæ aliquid æruginis assumpsit, uerum ferri squama maiore adstringendi ui participat, atq; ea adhuc amplius ferri stomomatis appellari, hoc est, chalybis, siue in aciem efformati. Quapropter hæc abæ ad maligna ulcera meliores quàm squama aeris existunt. Aeris autē squama cōsumit & eliquat carnes. Omnes uero squamæ multum mordaces sunt.

*Lythargyros, Argenti spuma*. Cap. LX.

*Argenti spuma* moderatè siccatur, quemadmodum alia omnia consimilia, calfacit quoq; partimq; perfrigerat, ac extergit, atq; hæc omnia moderate facit. Quapropter uelut materia sæpe ipsa utimur, eamq; alijs ammiscemus, quemadmodum etiam cera uelut materia quadam utimur.

*Litrum*. Cap. LXI.

*Litrum* inter aphronitrum & salem mediam uim habet. Vstum autem ad spumę litri substantiam propè accedit. Siccatur itaque & discutit, & si quidem intra corpus sumatur, secat & attenuat crassos ac uiscosos humores, multò magis quàm sal. Aphronitrum autem nisi magna urgente necessitate, nemo deuorari, ut quod stomacho incommodum existat. Et tamen ruralis quidam in strangulatu fungorum ipso utebatur magno successu.

M *Melanteria*. Cap. LXII.

*Melanteria* medicamentum adstringens est, simulq; tenuium partium, serè omnium maximè pharmacorum quæ adstringunt.

Melan, *Atramentum scriptorium*. Cap. LXIII.

*Atramentum scriptorium* abunde siccatur aqua dilutum, aut potius posca, & ambustis euestigio illitum prodest.

Misy, *Sori, & Chalcitis*. Cap. LXIIII.

Iuxta Cypri metallum in Solorum montibus, magna quædā domus erat in monte effossa, iuxta cuius dextram parietem, ad ingrediētes uero sinistrū, introitus erat ad ipsum metallum, in quo quædā uidi plurimum extentas uelut zonas alternatim positas tres numero, infimā quidem foreos, supra ipsum chalcidis, deinde misyos. Et progressu sanè tēporis chalcitis paulatim transmutatur in misy, & diutior adhuc tempore potest etiam sori in chalcitidem permutari. Quare nihil miri est, tria hæc eiusdē generis uim habere, & tenuitate ac crassitudine partium tantum differre. Crassissimarum enim partium inter ipsa est sori: tenuissimarum misy. Mediam uero inter ambo uim chalcitis possidet. Vsta hæc tenuiorum partium fiunt, sed minus adstringunt.

Molybdæna, *Plumbago*. Cap. LXV.

*Molybdæna* siue plumbago similem argenti spumæ uim habet, ad frigiditatem uergentem, sed neq; exterforiæ facultatis particeps est.

Molybdos, *Plumbum*. Cap. LXVI.

*Plumbum* uim habet frigefactoriā, nam liquidā substantiam possidet à frigiditate coactā. Vnde & mole & pondere augetur plumbum, in domibus subterraneis turbidum aërem habentibus repositū. Itaq; si pilam plumbeā unā cum pistillo plumbeo paraueris, & in ipsam uinū tenue, & oleum rosaceū, aut myrteum, aut melinū infuderis, et ad solē siue ignem triueris, ut succum quēdam plumbū remittat. Optimum pharmacum habebis, si eo succo ad sedis inflammationes ulceratas, aut pudendorum, aut testium, aut mammarum uteris. Item ad omnes influxiones quę inguinibus, aut pedibus, aut alijs articulis incumbunt. Est & mirabile medicamentum ad maligna & cancrofa ulcera. Ad multos usus idem commodum erit, si ex adstringentibus ac perfrigerantibus succum aliquē addideris, uelut est seridis, cotyledonis, semperuiui, portulacæ, psyllij, uuæ acerbæ. Quęcūq; uero ex his succū non facili remittunt, uelut portulaca, his alio



his aliorum succū ammiscere oportet, uelut uue acer-  
bæ. Lamina porro ex plūbo facta & lūbis imposita,  
ueneris impetus cohibet in his qui exercitare se uo-  
lunt. At uero ustū & lotū plumbū, ad maligna ulce-  
ra, & chironia, & cancerosa, optimū pharmacum est  
cicatricē inducens tum per se, tum alijs ammixtum.

**P** Pompholyx. Cap. LXXVII.

Pompholyx lota ferē omnium primas obtinet quæ ci-  
tra mordacitatem siccant. Vnde ad cancroſa ulcera  
commoda est, & alia omnia maligna, & corrosas  
dentium gingiuas.

**P** Rhoidarij præparatio. Cap. LXXVIII.

Rhoidariū uariē præparatur. Optimus modus hic est.  
Rhun olus accipito, & in aqua macerato, & lapidem  
cupholithon appellatū terito, rhois cremore affuso,  
siccari finito. Deinde anchusæ radicem cum oleo co-  
quito donec oleum ruffescat, & ex oleo parum ada-  
dito ac terito, & ad dies xv. siccari finito, & tūc rur-  
sus ex cremore rhois affundito ac siccari finito. De-  
inde in uas testaceum mittito, obturato ac assato, &  
erit bonum rhoidarium. Cæterū cupholithos à Cæ-  
sarea Palæstinæ affertur. Qui cupholitho carent, calce  
uiua ad medicamentum præparandum utuntur.

**E** Sandaracha. Cap. LXXIX.

Sandaracha uistoriam uim habet uelut arsenicum, unde  
in compositiones discussorias & extersorias ipsam  
ammiscunt.

**S**andyx quæ & Syricum. Cap. LXX.

De Sadyce siue Syrico ubi de cerussa agemus dicetur.

**S**coria. Cap. LXXI.

Scoria omnis multum siccatur. Si itaq; ferri scoriā siue  
recrementum quā leuissimē contriueris in acerrimo  
aceto, & postea coxeris, pharmacum maximē  
siccatorium ad inueteratas aurium purulentias ha-  
bebis. At uero argenti scoria appellatur helcysma,  
itidem siccandi uim habens.

**S**tibium. Cap. LXXII.

Stibium ultra siccatoriam uim omnibus metallicis cō-  
munem, habet & adstrictoriam facultatē. Quapro-  
pter & ocularibus medicamentis ammiscetur.

**S**pongia. Cap. LXXIII.

Spongia pice liquida ac bitumine imbuta & usta, acré  
& discussoriā uim habet, sanguinemq; sistit. Spongia  
noua aqua frigida aut posca, aut uino madefacta,  
pro corporum uidelicet differentia, uulnera cruenta  
glutinat, uelut alia ad hanc rē idonea medicamenta.

**S**typteria, Alumen. Cap. LXXIII.

Alumen omne uehementissimam adstringēdi uim ha-  
bet. Scissile omnium maximē subtilium partiū est.  
Deinde rotundum. Crassarum partiū est liquidū,  
itemq; crustaceum ac laterarium, placitū & plintia  
in Græci appellant.

**T**itanos, Calx. Cap. LXXV.

Calx uiua uehementer urit, ut crustam inducat. Extin-  
cta euestigiō quidem & ipsa crustam infligit, uerum  
post unam aut alterā diem, & minus urit, & minus  
crustam inducit. & progressu temporis penitus cru-  
stam non infligit. Calfacit tamen adhuc & carnes cō-  
sumit. Si uero lauetur, mordacitatem deponit, & li-  
xiuium facit: ipsa uero citra mordacitatem siccatur. &  
si bis aut ter, aut pluries lauetur, penitus lenis euadit,  
& generose citra mordacitatem siccatur.

**P**hycos, Fucus. Cap. LXXVI.

De fucis referam ubi de cerussa tractabo.

**X** Chalcanthus, Atramentū sutoriū. Cap. LXXVII.

De hoc pharmaco meritō mirari licet, quomodo for-  
tissimæ adstrictioni caliditas non ignaua in ipso mi-  
xta sit. Quare manifestum est quod omnium maxi-  
me humiditas carnes siccare potest, humiditatē calore  
consumēs, adstrictione uero densans ac spissans sub-  
stantiam. Fit & hoc in Cypro prope locum ubi mi-  
sy, chalcitis, ac fori reperiūtur, ut ex his intelligi pos-  
sit, aquam pluuialem per collem illum excolatam,  
omnem illam terram circumluere ac abluere. Vidi  
autē hanc paulatim coaceruari quotidie in lacu quo-  
dam, & erat sanē tepida ac uiridis, chalcitidem & æ-  
ruginem odore repræsentans. Quidam autē ipsam  
exhaurientes aquam, in urnas quadrangulares ficti-  
les transfundunt, in quibus plurimis diebus coacta  
ac densata chalcāthus fit. Verum temporis progressu  
etiam chalcanthus in chalcitidem transit.

**Chalcitis.** Cap. LXXVIII.

De chalcitide iam diximus ubi de misy egimus. Nunc  
satis est illud tantum dicere, quod adstrictoriam &  
acrem uim mixtim habet. Prædominatur autē acris,  
uehemens adeo existens, ut & carnem inurat, & cru-  
stam inducat. Vsta chalcitis mordet quidem minus,  
sed non minus siccatur. Deponit & adstrictionis non-  
nihil. Quare penitus melior est usta chalcitis quā  
non usta, tenuiorum partiū uelut alia usta euadēs,  
acrimoniam autem non adsumens. Nam quæ natu-  
ra acris sunt, usta mitiora fiunt, reliqua acriora. Lo-  
ta insuper chalcitis adhuc lenior euadit.

**Chalcos, Aes ustum.** Cap. LXXIX.

Aes ustum habet quiddam acre in se, sed & adstrictio-  
nis particeps est. Et propterea si lauetur, optimum  
pharmacum est ad ulcera cicatrice includenda. Verū  
ante usturam, in his qui duras carnes habent usus  
eius assumitur.

**Chalcu anthos, Aeris flos.** Cap. LXXX.

Aeris flos tenuiorum partiū uim habet quā æs u-  
stum, & squama eris, participat & extersoria ui, unde  
ad magnas asperitudines palpebrarum conducit,  
sycoſes Græci appellant.

**Chrysocola.** Cap. LXXXI.

Chrysocola ex eorū numero est quæ carnes eliquant,  
non tamen fortiter mordet, discussoria uicē satis est  
& siccatoria. quidam eam solam ita appellant quæ  
inter metalla reperitur. Verum præstat arte parata,  
in pila ænea eris rubri, pistillo quoq; similiter ereo,  
urina pueri impubis addita, ita ut diutius in sole ca-  
lido teratur. Nam quod inter terendum resoluitur,  
id siccatum commodissimum medicamentum fit ul-  
ceribus malignis, tum per se, tum idoneis ad eandem  
rem pharmacis ammixtum.

**Psymmithium, Cerussa.** Cap. LXXXII.

Cerussa ex plumbo acris aceto dissoluto paratur, & ta-  
men neq; acris neq; mordax est, neq; discussoria, sed  
& meatus obducit, & perfrigerat. Vsta autem pura  
cerussa, in id quod Syricum appellatur trāsit, medici  
sandycem nominant. Et usta quidem cerussa tenuio-  
rum partiū euadit, non tamen calfactoria. At uero  
fucus frigiditatem cerussæ seruans, partiū subtili-  
tatem insuper assumpsit, ut per ipsam in altum cor-  
porum penetrare queat.

**Pforicum.** Cap. LXXXIII.

Pforicum fit dupla chalcitide ad argenti spumam  
ammixta, ita ut hæc primum acerrimo aceto te-  
rantur,



rantur, deinde in ollam nouam indantur, quæ media æstate per dies quadraginta in sterquilino defoditur. Hoc medicamentum magis siccatorium, & minus mordax fit quàm chalcitis, palam est autem quod & tenuiorum partium euadit.

*De materia medica ex animalibus. Cap. LXXXIII.*

Plantarum materia explicata, non omni uidelicet per totum terrarum orbem, sed quantæ nos experientiã habemus. Imò & terrea & lapidea materia medica enumerata, superest adhuc materiam ex animalibus persequi, siue ea in aqua, siue in terra uitam degant. Quemadmodum autem in plantarum materia, etiam de succis qui ex ipsis fiunt mentionem fecimus, sic etiam nunc non solum solidarum in animantibus partium uim trademus, sed etiam in ipsis contento- rum, uelut sanguinis, bilis, urinæ, stercoreis, et simili- lium, relictis tamen abominandis ac detestandis, & quibusdam lege prohibitis, de quibus cum alij qui- dam, tum Xenocrates scripsit, uelut est homines co- medere, urinas bibere, ac menses muliebres, et similia. Imò relictis quoque medicamentis certa morbum ge- nera inducentibus, itemque compositionibus ueneno- forum pharmacorum. Qui enim talia scribunt non minori sed maiori odio digni sunt, quàm qui perpe- trant, quanto maior iniuria est cum multis malum aliquod quàm unum solū perpetrare: Et cum actore quidem flagitiosarum speculationum experientia commoritur: Scribentium uero malefactū immor- tale est, arma maliciæ improbis suppedians. Dice- mus itaque nos de commodis hominibus rebus, qua- rum experientiam habemus, & sanè primum humo- rum in animalibus mentionem faciemus.

*De sanguine.*

*Cap. LXXXV.*

Columbinum sanguinem solent hi qui ossa capitis fra- cta perforant, crassæ membranæ infundere, quod si columbinus nō adsit, palumbi aut turturis sanguine uti licebit. Quidam & ad sugillatos oculos eodem utuntur calido instillato de recens mactato animali, aut de uenis alarum dissectis. Ego uero sexcetos uidi ossibus capitis perforatos, & nihil læsos ex rosacei usu, circa sanguinem columbinum. Sunt autem & su- gillatorum oculorum medicamina multa ex colly- riorū genere, & maxime Damocratis ex myrrha, ite- quod ex thure constat, & quod ex croco. Sed et foe- nigræci succus in hunc usum potior est sanguine co- lumbino. At uero caprinum sanguinē quidā hydro- picis pharmaci loco dederūt, & ad uentris fluxiones aut dysenterias eodē assato usi sunt. Hircinum quoque sanguinē aliqui siccant, & alijs ad hanc rem commo- dis ammixtum, calculosis exhibent. Itaque licebit ruri- degenti & alijs auxilijs carēti, etiā hunc in usum uer- tere, nam experientia periculo uacat. Quin & hœdi- nus sanguis in usum uenit, de quo Xenocrates sic scri- psit: Hœdinus sanguis spuendibus sanguinem ualde cōmodus est. Oportet autem nondum congelato di- midia hemine mensura, aceti acerrimi tantundē am- miscere, deinde seruefactū in tres partes diuidere, & singulis diebus partem unā absorbendam præbere. Vespertilionū porro & ranarum ac ricinorū sangui- nem pilos extirpare falsum reperi, quū experientiā id explorarem. Quemadmodū etiam aliorū animalium sanguinis uanas promissiones cōperi, & partim ex- periri ne tentauit quidē, quū pharmaca habere aptio- ra & parabiliora ad singulos affectus, cauebā autem

simul ne præstigiatoris opinionem incurrerem.

*De Lacte, ex Rufo & Galeno.*

*Cap. LXXXVI.*

Duplex lactis utilitas est, altera ut alimenti, altera ut medicamenti, saluberrimum lac est purum ac synce- rum, neque amaritudinis, neque aciditatis, neque salsedi- nis, neque acrimoniæ, neque graueolentiæ particeps, sed ut ita dixerim, odoratum, aut odoris expers, aut si quidem modice odoratum fuerit, palam est quod & gustantibus dulce erit, utpote modicæ dulcedinis particeps. Primum autem differentias ipsius consi- derare oportet. *quasi odor dulcis*

*De Lactis differentia.*

*Cap. LXXXVII.*

Quantum natura inter se distant uacca & equa, ac alia animalia, tantum & lac ipsorum inter se differt. Bu- bulum enim crassissimū est ac pinguisimum, com- modeque nutrit ac partes subit. Liquidissimum autem & tenuissimum ac minime pingue camelinū est, & uentrem minus subit, quamuis multum feri habeat. Sed uice uersa equinum magis aluo secedit, similiter & asininum, quod minimū pinguis succi possidet. Quapropter etiam rarō in uētre in caseum mutatur. Caprinum moderatā compagem habet, & ad pur- gandum debilius bubulo est, de cætero æquē cōmo- dum & multum nutriens. Ouillum hoc crassius est, uerū uirilignes albas sub cute inducere solet, si quis assidue iplo utatur. Suillum crassissimum est, ut ne- que coagulo opus sit ad id coagulandum, & serum modicum secernat, & in coctura celerrimē coeat. Quare nec ad alui excretionem commodum est, & uentriculo nauseam mouet.

*De lactis differentia ab animalium habitu. Cap. LXXXVIII.*

Manifestum est autem quod omne sanum animal me- lius lac quàm morbidum præbet. At uero morbos animalium ex tenuitate cutis depræhendere licet, & pili raritate, tuberculis, impetigine, scabie & inedia. Nigriora quoque in brutis ferè in totū fortiora sunt. Quod & carnes ipsorum testatur, utpote iucundio- res. Alba contra imbecilliora.

*De lactis differentia à temporibus anni. Cap. LXXXIX.*

Iuxta anni tempora liquidissimum & tenuissimū est lac uernum, hoc est, post partum: spissatur autem tē- poris progressu, ut media æstate siccus ac crassius reddatur, Laudatur æstiuum ut concoctu facilius, & iucundi odoris.

*De lactis differentia à pabulo.*

*Cap. XC.*

Quin & circa pabulum plurima differentia in lacte re- peritur. Nam alias aliā herbam animalia depascun- tur, & uiridis quidem herba, & iuxta aquas nascens, liquidius & modicum lac suggerit. Durior uero & montana, apta est ad boni ac multi lactis generatio- nem. Omnia pabula adstringentia, acerbum & aluū sistens lac præbent. Acria uero & præsertim purgā- tia, uelut est scammonium, & ueratrum, & tithy- malli, uentrem turbans lac exhibent. Cytisus autem pingue ac dulce.

*De lactis differentia ab ætate.*

*Cap. XCI.*

Animalium in uigore ætatis consistentium lac opti- mum est. iuniorum liquidius, seniorum siccus.

*Quibus lac conueniat.*

*Cap. XCII.*

Ex omnibus ferè edulij optimum lac optimi succi est ac alimenti ex contrarijs substantijs ac facultatibus compositum, subducente ac sistente aluū, obturante ac attenuante. Et sanè ubi qualitas ipsius nihil cōtra- rium uteris naturæ habuerit, & uiscerū ipsius exitus ob uaso



ob uasorum amplitudinē spatioſi fuerint, utilitas ex lacte conſequetur, & nihil mali ille ex eo experietur. Vtilitates autem lactis etiā ueteres medici reſenſerunt. Ventrīs moderatā ſubductionem, ſucci bonitatem, & alimoniam, & quod cōcoctum probē carnem meliorē reddit, & mordaces ſuccos expurgat. Vnde in urinæ difficultate, & acri egeſtione alui, nō ſolum bibere conducit, ſed etiam infernē per clyſterem infundere. Ad acres enim & mordaces fluxiones cōmodiſſimū eſt, non ſolum abluens ipſas de partibus infeſtatis, atq; hoc per exteſoriā humiditatē, quam in ſeroſa ſui parte complectitur, ſed etiam craſſitie ac pinguedine ſua corporibus oblitū ac inductum, nō ſinit influxum acris nudis ipſis allabi. Ad pulmonis itaq; ac inteſtinorum ulcera, item renum, ueſicæ ac uteri, & ad papularum eruptiones, ac furunculos, & alias cutis aſperitudines, conuenientiſſimū eſt in potu. Item ad eos qui cantharidas hauſerūt, aut bupreſtin, & in ſumma ad medicamenta erodētia ac exulcerantia, & ad hyoſcyamum uelut peculiare remedium eſt. Non ſtatim reſipiſcere affectos facit. Cæterum in gutturis exulcerationibus, quæ cum ob alias multas cauſas, tū ex anginis fiunt, & his qui ephemerum ſumpſerunt, lac gargariffare conducit. Idem potum magnopere prodeſt alimentum non ſentientibus, & ſiccoribus, ac qui ægrē uires reſolligunt. Commodum eſt & ad oculorū fluxiones acres, & ad oculos ſugillatos. Quin & forinſecus palpebris impoſitum lippientium, ubi dormire uolent, cū roſaceo & oui candido, inflammationes ipſorum concoquit. Eodē modo utimur & ubi ſedis ulcera mitigare uolumus, propter acres ſeroſos humores ac inflammationes dolore affecta, ſimiliterq; ad pudendorū ulcera, & in ſumma ad omnia lenimento opus habentia, ob inflammationem, aut mordacitatē, aut ulceris malignitatē. Quapropter et cancerofiſ adhibetur ulceribus in medicamēta dolorē eximentia ammixtū, qualia maximē ſunt quæ ex pompholyge fiunt. In uniuerſum igitur mitigatoriū eſt lac, leuē naturam habens, atq; multo magis, ubi ſeroſi humoris maior pars per cocturam, aut aliā artem fuerit conſumpta.

De modo, tempore, ac menſura utendi

lactis.

Cap. xciii.

Omniſ qui lac bibere uolet, à reliquis cibis ac potibus abſtineat, donec concoctum ſit ac ſecellerit: ſi enim ante eiſ concoctionē, aliū cibum quiſ ſumat, neceſſe eſt & ipſum lac corrumpi, ſimulq; corrumpi & cibum qui ſuperiugeſtus eſt. Præſtat autē mane bibere recens mulctum, & tunc plures labores detrāhere, quietē ac ſenſim ambulare, & interim ceſſare citra ſomni admiſſionem. Qui enim hoc modo ſe geſſerit, potum lac excernet, idq; inutilia ſecum educet. Opus eſt enim ſi quid aliud, primum acceptum ſecedere, quo facto aliud bibere. principio igitur ſecedit aluo cōmodē purgans, non totam corporis molem, ſed quæ in aluo & inteſtinis ſunt partibuſq; uicinis. Poſt hæc iā in uenas deſertur optimeq; nutrit, & nō amplius ſecedit, ſed uentrem liſtit. Menſuram ſumēdi deſignare omnibus, impoſſibile eſt, quēadmodum in alijs quoq; edulijs, ſatis eſt igitur quantum facile quiſq; ferat. Cæterū ad mordaces humores & maximē infartos, cū modico melle bibere conducit. nā ſic & utiliſ & magis exteſoriū eſt, & citius aluo ſecedit, ammiſcenda eſt & ſapa & uinu dulce. Ita enim

*vinu' dulcu' lacti admuſcet*

commodius ſtomacho euadit. Quod ſi ſalem accipiat, magis etiam aluo ſecedit, ſed iniucūdius exiſtit.

Quibus lac noceat.

Cap. xciiii.

Lac quod plurimū ſeri habet, periculo maximē uacat, etiam ſi quiſ ſemper ipſo utatur. quod uero modicū ſeroſi humoris, nō parū autem caſeoſæ craſſitudinis habet, non ſecuri uſus omnibus eſt, qui frequenter id ſumunt. Renes enim lædit qui apti ſunt ad calculorū generationē, obturationes quoq; & affectiones circa hepar efficit, in hiſ qui prōptē affici poſſunt. Eiſmodi ſunt quibus anguſti ſines ſunt uasorum traſſumētium alimētum ex ſima hepatis parte in gibboſam. Sed neq; capiti cōmodum eſt, niſi quiſ ipſum ualde ualidū habeat. Quemadmodū neq; præcordijs quæ facile inflantur pleriq; omnibus enim in uentre inflatur, ut pauciſſimi ſint qui non hoc perpetiantur. Aſiduus quoq; eiſ uſus dentes lædit, unā cū circūſita carne gingiuarū. Hanc enim humore flaccidam efficit, dētes uero putredini & eroſioni obnoxios facit, id quod craſſiori lacti maximē ineſt. Nā aſininū lac propterea quod ualdē tenue exiſtit, non ſolū non lædit dentes, ſed etiā ipſis cōmodat, propter uim extergēdi. Oportet itaq; ab eſu lactis, uino mulſo aqua diluto dentes colluere: ita enim omne caſeoſum dētib; ac gingiuis infartū extergetur. Cæterū qui caput non facile læſioni expoſitū habent, cōmodius eſt uino mulſo meraco citra aquę mixturā os colluere.

De lactis coctura.

Cap. xc v.

Si quiſ præcocto lacte ſerū conſumpſerit, omnino uentrem nō ſubducit. dant autem hoc ipſum hiſ quibus uenter ac inteſtina ab acribus ſuperfluitatibus mordētur, & qui ieiunum inteſtinū bilioſis fluxionibus infeſtatum habent, & dyſentericiſ. Modus præparandi duplex: Aut enim diutius cocto lacte ſerū inſumitur, aut ſilicibus iniectis, ſed quod per ſilices iniectos ſit, craſſius preparatur, & propterea uitioſius euadit cum alijs, tum quod cinis ex ignitis lapidibus lacti cōmiſcetur. Habet autem tale lac aliquid commoditatis in putredinoſis ulceribus, quare hiſ exhibere oportet lac per ſilices præparatum, reliquis coctum. Coctura ſit ad ignem aſiduē agitando ne dirimatur, & ſi quid ollæ labro adheſerit, etiā id ſpongia munda auferre oportet. Nā ſæpe hoc ipſum lacti ammixtum totum corrumpit. Porro per ſilices ſic præparatur. Lac præcoquitur donec plurima humiditas conſumatur, deinde lapides ſilices igniti in lac mittuntur, quot omnino ſuffecerint ad ſerū cōſumendum. Nec minus, imò magis idem efficiunt laminæ ferri ignitæ lacti immerſæ. Eſt enim ferrū adſtrictoriæ facultatis particeps, & proinde plures cylindros ferreos parauit, qui uerū ad finem aditū habent, ut hac quaſi anſa facile quiſ ferrum ignitū tollere queat panniculis detentum, uelut in cauterijs facere ſolemus. Lac tamen hoc modo præparatum facile in uentre caſei figuram accipit. quapropter ſecurius eſt aquā affundere, quemadmodum Medici non pauci faciunt, ubi ſerum primum conſumptum eſt, rurfus aquam puram affundentes: non enim humiditatem ſeri fugiūt, ſed acrimoniam per quam uentrem ſubducit.

De ſero lactis, Ex Galeno.

Cap. xcvi.

Serum lactis exteſoriā uelut uim habens, ſubducendi uentris gratia aſſumitur, tum in potu, tum per clyſterem immiſſum. Nam acrimoniam inteſtinorū citra mordacitatē abluat & exterget. Poſſe & pro aqua commo

*agua affundenda*



commodissimè assumi ad ulcera acri sanie infestata eluenda. Quin & medicamēta discussoria ad sugillata liuoresq; ac nigredines, ex corpore melius eluuntur per serum quam per aquam. Sic quoq; eodem ad contusa suffusa ac liuefacta utimur, cōmodis ad hæc pharmacis ipsum ammiscentes. Serum autē sic præparare oportet. Lac in ollam funditur, sed nō ouillū neq; suillum, utrūq; enim ineptū est ad serum detrahendum, coquiturq; igne concitatore, & assidue ac æqualiter mouetur, & ubi efferbuerit, à motu cessatur, & ubi adhuc amplius efferbuerit, aqua frigida in promptu sit in profundiore quodā uasculo sita, in quam olla in qua lac coquitur immittitur: statim enim sedatur. Sedato autē feruore, rursus coquitur, et ubi efferuescit, acētū mulsum aut aqua mulla bis aut ter irroratur, quo facto caseus statim à sero disparatur, serum itaq; mox per panniculū excolatur. Vbi igitur crassas & pituitosas superfluitates abū dare suspicatus fueris, acētū mulsum irrorabis, ubi acres & biliosas, aquam mullam. Quin & immisso in ollam, postquā lac bis aut ter efferbuerit, uase frigidissimā aquam habente, fissuram ac secretionē facimus. Vtēdum est sero ad debiles & cibos auersantes. Oportet autem sero quod primum bibitur salem ammiscere, ubi uero purgare cōperit citra salem dato: atq; hoc per interualla quædā facito, donec satis æger purgatus fuerit. Copiā iuxta uires expendere oportet, neq; tamen magnopere deliqueris etiam si quid amplius præbueris. In summa autem copiā sit feri potus heminarum quinq;. Et modus quidē parandi feri talis est. Cares autem sic præparant. Onici semen contundunt, eoq; lac coagulāt, & ualidum serum efficiunt. Deinde excolant, & salē aut aquā marinam addunt, rursusq; coquunt ac exhibēt. Fortiter itaq; hoc purgat, sed omniū iucundissimè bibitur. Omnino autem longæ cocturæ medicatius serum efficiūt. Et his quidem qui forti euacuatione indigēt, thymi drachmas tres aut quatuor unā cū sero dabis in prima portione, si uero adhuc amplius purgare uelis, epithymi tussiac cribrati drachmas tres dabis. Vitare tamen medicamēta oportet in quibus non magnū est id quod molestat, Cæterū simplicius preparato sero uti oportet in corporibus mollibus, & in quibus euacuare & eluere solū ea quæ in uentre ac intestinis hærent uolumus, & in quibus intestinū exulceratur à quibuscūq; uulgaribus purgatorijs medicamētis, & in quibus bilis pura uentrem infestat, & in quibus inanes uentrē ad egerendū stimulant cupiditates, & in quibus periculum est renes aut uesicā aut uterum exulcerari, & in macilentis ac tenuibus, purgatione tamē egentibus. Maximè omnium autem sero uti oportet in his qui imbecillum stomachum habent, & tamen purgatione indigent. His omnibus exhibendum est serū, neq; sale, neq; alio quopiam medicato ammixto. Sed & puero, & mulieri, & senī, hoc serum citra omne periculum exhibetur, & in caniculæ æstibus intrepidē datur, quāquam tunc temporis alia medicamenta suspecta sint. At uero fortiori sero uti quis potest, & ad corpora & ad uitia uehementioribus medicamentis egentia. Præsertim ad inueteratas papulas, & uaros liuidos & uitiatos sub cute humores, uelut lepras & similia. Item ad ulcera uetera & efferrata, & ad ulcera capitis manantia, ac similia. Ad oculos quoq; assidua fluxione uexatos, et ad scabiem

palpebrarum, & maculas solares in facie, potest & quis eo in longis febrium circuitibus uti, & in quibus periculum ut ex morbis in aquam intercutē delabantur. Atq; hæc quidem de sero sufficiunt.

De his quæ iucunditatis gratia cum lacte

coquuntur. Ex Gal.

Cap. xcvi.

Lac cum aliquo crassi succi edulio diutius coctum, flatuositate deponit, & magis nutrit, & alui fluxionibus, & tenuibus ex capite in pectus destillationibus conuenit, sed & in hoc considerandū est, ne clām nobis alia quædā uiscera lædat. Quorundā enim natura ab hoc abhorret, et aliās periculo eiusmodi edulia non uacant. Nam & iecur obturant, & calculos in renibus generant. Quæ autē cū lacte coquuntur hæc sunt: Amylū, similago, alica, tragus, oryza, lagana, placentæq; & panes quidā, neq; probe assati, neque probe præparati, neq; fermenti, neq; salis participes.

De lacte acido. Ex Galeno.

Cap. xcvi.

Lac acidum oxygala appellatum, dentes quidem non lædit qui naturali modo habent. Qui uero frigidiores aut debiliores sunt, uelut ab alijs frigidis, sic etiā ab hoc læduntur. Aliquādo autē & dentium stupor inde oboritur. Et uenter quidem frigidus, nō probè concoquit lac acidū, qui uero moderatè habet, ægrè quidem sed tamen concoquit. Qui uero calidiores æquo sunt uentres, suprā hoc quod nihil læduntur, etiam commodi nonnihil ex eiusmodi edulij percipiunt. Atq; tales uentres etiam per niuem circumdatam perfrigeratum oxygala citra molestiam ferunt, nisi pectus frigidū fuerit, aut caput aut alia particula. Neq; enim calidā & acrem feri qualitatem oxygala habet, neq; pinguem & calidā butyri. Sed solū in ipso reliquum est caseosum, unde frigidum est & crassi succi, & crudos humores generat, & in frigidioribus uentriculis etiā calculos in renibus gignit.

De primario lacte.

Cap. xcix.

Primarium lac appellatur quod statim à partu mulatū est, id calido cinere modicè calfactū, citra coagulum statim coagulatur. Veteres Pyriaton hoc uocabant, alij pyriephthon, comeditur hoc ipsum cum melle. Melle enim non addito, ægrius cōcoquitur, & crassioris succi est, & tardius transit.

De lacte concreto. Ex Galeno.

Cap. c.

Quidam lac etiam concretum exhibent, per coagulum uidelicet coactū, & sero ablato, melleq; addito. Quidam uero etiam feri plurimam partem absorbent, & contingit sanè his uentrem magis aut minus subduci, pro absorpti serosi humoris quantitate.

De caseo. Galeni.

Cap. ci.

Casei omnes mali sunt, excepto oxygalactino qui ex acido lacte fit: nullum enim laudare possum, omnes ægrè cōcoquuntur, acidū ructum generant, & flatu uentrem implent, improbè alio secedunt, pituitā & æstum uentri inducentes. Nam in præparatione ab immisso coagulo acrimoniā assument, & omnē humorem deponūt, præsertim inueterati, qui & aciores fiunt, & seipsis calidiores & æstuosiores, sitimq; amplius inducentes, & ægrius cōcoctiles, & peioris succi euadūt. Quapropter illud cōmodi quod crassi succi edulia attenuantibus medicamentis ammixta attrahunt & acquirunt, neq; caseus obtinet citra detrimentū. Maius enim ex succi malitia & æstiosa humiditate damnū accedit, quā utilitas ex crassitudine attenuata emergat. Itaq; fugiendus maximè talis caseus



caseus qui penitus nihil boni in se habet. At uero recens caseus appellatus oxygalactinus, omnium optimus censendus est. Nam & in cibo iucundissimus est, & stomacho innoxius præ omnibus alijs caseis existit. minus ægrè concoquitur, & minus egrè transit, neque uero ualdè crassi succi est, quo crimine in cōmune omnes casei sunt infames. Inter reliquos porrò caseos recens melior uetere est, & mollis duriore, & rarus ac laxus ualdè denso & coacto, & qui præcellèntem dulcedinem habet falso præstat, & qui moderate falsus est, potior est eo qui plurimum salis, aut penitus nullum salem accepit, iucundus iniucundo, asarus crudo præfertur. Caseus coctus multò solidior est, sunt tamen omnes mali.

*Pharmacum ex caseo uetere ad callosas concretiones podagricorū. Galeni. Cap. cii.*

Quū arthriticus in sella ad me delatus esset, qui callosas duritias in articulis haberet, statim in mētem uenit mihi ut pernam suillam ueterem falsam coquerē, eiusq; decocto caseū uetustissimū rigarē subigerēq; ac in pila probè unirē, & duritiibus callosis imponerem, quo facto sponte rupta cute citra sectionem, quotidie callorū particulæ emergebant. & quū commoditatē homo ille experiretur, talē de cætero sibi parans caseū adseruabat, & inueterato utebatur, atq; sic in eius usu pseuerabat. Quin & alios similiter affectos ex amicis suis medicamēti eius uim edocebat.

*De efficacia recentis casei foris adhibiti.*

*Galeni.*

*Cap. ciii.*

Recens & humidus caseus magnopere auxiliari uideatur his qui spumam argenti hauserunt, si quis ipsum in cibo accipiat. Potest & uulnera cruenta simpliciora glutinare in cataplasmate impositus, superimpositis solijs uiris, aut lactucæ, aut betæ. Caseus autem oxygalactinus etiam magna uulnera glutinat. nam & discussoria ui participat.

*De butyro. Galeni.*

*Cap. ciiii.*

Butyrū ex pinguisima lactis præsertim bubuli parte fit, concoctoriā autem uim habet, modica quoq; discussoria participans. Has uires tamen in medijs inter mollitiem ac duritiem corporibus exercet. Nam ubi hæc fuerint inflammata, concoquit ac facillè discutit. Quare parotidas aurium, & bubonas inguinū abscessus, ipso solo sepe perfectè sanauimus, puerilibus corporibus ac muliebribus affectis. Durorum enim penitus corporum tumores præter naturales butyrum discutere non ualet. Idem reiectionibus ex pulmone, in pulmonis ac lateris affectionibus magnificè confert cum melle datum, easq; cōcoquit. Si itaq; solum delingatur per se, magis concoquit, minus educit. Si uero unā cum melle & amygdalis amaris, magis sursum educit, minus concoquit.

*De coagulo. Galeni.*

*Cap. cv.*

Coagulum omne acrè & attenuatoriā uim discussoriāq; & siccatoriā habet. Optimū coagulum est leporinum, dissoluit omne coagulū cum aptis ad hanc rem medicamentis potum, sanguinē in uentre in grumos concretum. Cætera quæ de coagulo à multis prodita sunt, superuacaneum adscribere existimo.

*De felle. Galeni.*

*Cap. cvi.*

Humorem qui in uesica bilis susceptrice coaceruatur, nunc fel ac bilem nomino, non quam atrā, sed quam flauam appellant. Et est sanè humor hic omnium animalis humorū calidissimus. Differētiæ sunt in ipso

plurimæ, tum iuxta naturam animalium, tum iuxta uictum. Nam pallidior colore bilis moderate calida est, subalbida uero in quantū colorem exolutum habet, tantò caliditate inferior est. Flaua autē tantò calidior quàm pallida est, quāto crassior & flauior existit. Etenim flaua fit ex pallida amplius calfacta. Si uero adhuc amplius superincalescat, ad atriorē colorem transmutatur, qui aliquando eruginosus fit, aliquando cæruleus, interdum etiam ad isatidis colorem transit. Itaq; & tu colorem bilis expendes, ubi pharmacum præparas in quod fel recipitur. Fit & bilis differentia circa corpus utriusq; ipsa, prout subtili aut hebetè sensu præditū est. Et suillū quidem fel omnium aquosissimū est, & propterea debilissimum, exceptis agrestibus suis. Vtuntur autē felle suis domesticæ ad ulcera aurium, non cōtemnendo pharmaco, quo & tu uti poteris, si non aliud compositum adfuerit. Fel ouillum paulò acrius suillo est, atq; eo adhuc magis caprinum. Consimile huic est ursinum & bubulum. Taurorum his fortius est, sed inferius hyenarū felle. Callyonimi piscis & scorpij marini ac testudinis fel hoc etiam superant. Est & uolucrum animalium fel omne acrius ac siccius quàm in quadrupedibus. Ex uolucris gallinarum ac perdicum fel in usum medicum præstat. Accipitrum & aquilarum fel multum acre est & corrosiuum. Has itaq; ubi noueris fellis differētiās, sciuerisq; quæ affectiones magis, quæ minus siccatione opus habent, uix contingere potest ut circa curationem aberres.

*De Sudore.*

*Cap. cvii.*

De sudoribus aliqui superuacanea conscripserunt, quæ per aliam materiā parabiliorem fieri possunt. Ammiscetur autem sudor eorum qui in palæstris exercentur, substrato pulueri, atq; hoc paton Græci uocant. Estq; pharmacum discussorium. Itaq; inflammationis mammis auxiliū efficacius est solus is patos impositus. Si uero aridior est, cyprino aut eo non præsentē, rosaceo emollire ipsum. Hoc pharmacum illis tum lac in uberibus redundans extinguit. Et ego sanè aliquando ipso in inguinum abscessu usus sum, & breuī tumorem sedatum uidi.

*De Vrina.*

*Cap. cviii.*

Vrina hominis ferè omnium aliarum debilissima est, excepta suilla porcorum domesticorum castratorū. Vim habet extergendi hominis urina, si quod aliud urinae genus, quod satis indicant fullones. Vnde & medici ad scabies ac lepras adhibent, ulceraq; multa humiditate sordeq; ac spurcitia plena, ea perfundunt, idq; multo magis si quid putredinosum habuerint. Manantia item capitis ulcera & porriginem eadē fouentes curant. Nos autē abominati sumus talia facere, quum alia pharmaca sint ad manum. Cæterū ulcera in digitis pedum præsertim ex offensione, ubi non fuerint inflammata, etiam ego sæpe urina curauī, & sanè iter faciētib; ac peregrè proficiscentibus linamentū urina tinctū in ulcus imposui, deinde foris secus linamentū circūdedi, & quoties meiere uellēt, urinam ad digitū demittere præcepi, & non soluere priusquam exacte curati essent. Permissi & ruri degētib; non præsentē medico ulcera urina perfundere, ubi in partibus infernis essent à pectore usq; ad summos pedes. At uero bibere urinā, in difficili spiratione quæ erecta ceruice contingit, quæadmodum aliqui prodiderunt, non est necesse, quum sint plurima

e alia



alia pharmaca, quæ huic malo opitulantur. Et sanè quidam etiam pota urina ab effectu non conualuit.

*De Saliva.*

*Cap. cix.*

Salivæ vires diuersas esse nosse oportet, tum iuxta animalium species, tum prout singula ex his sana sunt aut morbida, prout comederunt aut ieiuna sunt, potaruntq; aut non potauerunt. quemadmodum enim urinæ & fel & sudores, sic & salivæ, debiles quidem sunt eorum quæ cibum & potum sumpserunt. fortes autem & acres eorum qui sitim nimiam itemq; famem tolerarunt. Medium locum occupant eorū quæ probè quidem concoxerunt, nondum autem cibum aut potum ingesserunt. Hac itaq; saliva postremum relata, nutrices infantium impetigines curant, madefacto ex ea paruo digito, deinde loco perfrieto, atq; hoc assidue faciunt. Sed & triticum quidam rurales manducant, & furunculis imponunt, qui sic ex salivæ viribus discutuntur & cito concoquuntur. At uero iuxta omnem suam substantiam saliva siue sputum hominis reptilium uenenatorum generi maxime contraria est. Ego enim citra omnem incantationem, ex solo ieiuni sputo, scorpionum pereuntem uidi.

*De stercore.*

*Cap. cx.*

Stercus summam discutiendi uim habet. Humanum ob foetorem abominamur. Verum boum, caprarū, ac canum, ubi ossa comederint, neq; foetidum est, & magna experientia commendatum non nobis solū, sed multis ueteribus medicis existit. Ego itaque mirandam uim humani itemq; canini stercoreis experimento cognoui.

*De stercore canino.*

*Cap. cx i.*

Dicendum autem primū de canino stercore, quo frequenter quidam ex præceptoribus nostris utebatur. dabat autem cani ossa tantum biduo comedere, tertia die excretum stercus accipiebat, siccabat ac reponerat, & usus tempore terebat. Utebatur autem ad anginas alijs huic malo cōmodis pharmacis id ammiscendo. Dysentericis idem aridum tritum in lac per filices coctum inspergebat, & præbebat multos ita fallēs. Hos itaq; duos canini stercoreis usus multa experientia, uelut mirabilis medicamenti, didicerat. Sed & in malignissimis ulceribus parum de eo stercore addebat in pharmaca alijs ad eiusmodi ulcera cōmoda, & palam fortius seipso redditum pharmacum uidebatur. Quin & si quid discuti ac siccari opus esset, etiam illis medicamentis ammiscerat.

*De stercore humano.*

*Cap. cx ii.*

Stercoris humani eiusmodi experimentū habeo. Quidam faucibus assidue inflammatis uehementer uexabatur, ut periculum suffocationis ipsi immineret. & sanè uenam secare propter periculū cogeatur. Huic quidam obuiam factus promisit se pharmacū datum experimento constans, & uocari se iubeat ante uenæ sectionem, si rursus fauces essent inflammatae. Itaq; accersitus, & illito pharmaco quodam, celeriter hominem sanauit. Erat autem pharmacū stercus pueri aridum, quod cum melle Attico illinebat. Nutriebat autem puerum cuius stercus accepturus erat, uelut idem ille medicus docebat, lupinorū esu, eorum uidelicet qui in frequenti cibi usu sunt, cum optimo pane. Dabat & uinū bibendū uetus. Omnia hæc moderata mole, ut probè concoquere puer posset. Tertia die excretum pueri stercus sumebat, siccabat, ac utebatur uelut de canino stercore prædictū est.

*De stercore lupino.*

*Cap. cx iii.*

Lupinum stercus quidā colicis bibendū dabat, non solum in exacerbationibus, sed etiam in interuallis, si quidem citra inflammationem affecti erant, uidēq; quosdā non amplius morbo hoc correptos, & correptos etiam non ita fortiter afflictos, neq; frequenter. Sumebat autem & ille albius luporū stercus, quod ab ossium esu excreuerat. Sumebat autem nō quod in terram cecidisset, nam in fruticibus ac floridis herbis hoc stercus sepe reperitur. Miratus sum porro de ipso, quod etiam adalligatū sepe prodesset. Inuenitur & in ipso quid ex ossibus deuorati animalis quod manducationem effugit, itemq; cōcoctionem, quod ipsum etiam tundens ac conterens colicis bibendum dabat, salem & piper aut tale quippiam ammiscens odoris commendandi gratia. Dabat autem cū uino substantia tenui, aliquādo cum aqua. Quod uero lumbis ægri ex stercore adalligaretur, id ligamentū habere iubeat ex lana agni à lupo discerpti, aut si id haberi nō posset, ex corio ceruino. & sanè tum lortū quod lumbis circumdaretur, tum id in quo stercus inuolueretur, ac contineretur, ex eo parare iubeat. Nos autem in ollulam argenteā stercoreis lupini fabæ magnitudinem inieciimus, & quibusdam experimenti gratia appendimus, & ammirati sumus quū uideremus manifestam opem inde eos consequi.

*De stercore caprino.*

*Cap. cx iiii.*

Stercoris caprini usus frequentissimus est, acré & discussoriam uim habet, induratis tumoribus cōuenit, non lienis tantum, sed aliarum partium. Itaque ego in genuum tumore inueterato & ægrè solubili, ipso usus sum ex posca, cataplasmate parato ex ordeacea farina stercore, ammixto & qui curabatur homo mirificè sanatus est, erat autem ruralis. Nam mollibus corporibus pharmacum acrius est. Equidem uisum tenuiorum partiū redditur, quare ad alopecias competit, & omnia quæ extergentibus indigent medicamentis, uelut lepras, impetigines, & similia. Quin & cataplasmatibus ad parotidas et inguinum abscessus ammixtum, discussorium existit. medicus certè quidam ruralis ipso ad uiperarum morsus, multoq; magis aliarum bestiarum utebatur cum aceto, & ualde multos seruauit. Idem ille etiam eiusdem stercoreis pilulas ictericis ex uino bibendas dabat. & ad musculi fluxum cum thure apponebat.

*De stercore bubulo.*

*Cap. cx v.*

Boum stercora exigua habet inter se pro pabuli ratione differentiā. Nam & ipsa siccandi uim habent, possident & attractoriam. Medicus quidam rei medicamentariæ expertus hydropicos stercore bubulo oblitos ad solem exponebat, & multis opitulatus est. Accipiebat autem humidum adhuc uere quum boues herbā depascunt, & exiccatum reponebat. Utebatur eodem & ad strumas, & ad omnes induratos tumores cum cataplasmatibus modo imponebat.

*De stercore ouillo.*

*Cap. cx vi.*

Idem medicus & ouillo stercore utebatur ad uerrucas, & specialiter myrmecias appellatas, thymos itē uocatos, & clauos, aceto autem id diluebat. Sed & ambustorum ulcera ad cicatricem eodem perducebat, rosaceo cerato ammixto.

*De stercore columbino.*

*Cap. cx vii.*

Columbarum foris uictum quærentiū stercore, uelut calfactorio pharmaco, ego ipse sæpe ad multa uxor cum



cum nasturtij semine, quod leuissimè tritum pro si-  
napi admisceo, in ueteribus affectionibus rubifica-  
tione opus habentibus, qualis est, coxendicum mor-  
bus, hemisrania, cephalæa, uertigo, & inueterati do-  
lores iuxta spurias costas, aut scapulas, aut tendines,  
aut lumbos. Item renum, pedum & articularum,  
ubi callosæ concreciones nondum fuerint coactæ.

*De gallinæ stercore.*

*Cap. cxviii.*

Gallinarum stercore usus sum etiā ipse, ad eos quibus  
strangulationis periculum ex esu fungorum immi-  
nebat, inspergebam autem ipsum tritum cyathis tri-  
bus aut quatuor poscæ aut acetī mulsi, & breui con-  
spicuam opem senserūt. Paulò post enim pituitosum  
crassissimum humorem euomebant, à quo perfectè  
suffocationis accidens conquieuit. Medicus qui me  
hoc remediij docebat, etiā inueterato colico dolori id  
ipsum stercore ex uino mulso dabat. Quidā & in an-  
gina bibendum præbent. est autem gallinaceum ster-  
cus debilius colubino. sed & hoc ex gallinis in agris  
uictū querentibus, & non inclusis, accipere oportet.

*De stercore anseris, accipitris, ciconiæ, &*

*terrestrium crocod.*

*Cap. cxix.*

Stercus anseris, accipitris, ciconiarum, & reliquorum  
de quibus quidam delirantes scripserunt, ipso expe-  
rimento cognitum est inutile esse. terrestrium uero  
crocodilorum etiā ægrè parabilis est.

*Sordes ouium ex qua œsypus.*

*Cap. cxx.*

Sordes quæ ouium lanis innutritur, ex qua œsypum  
fit, concoctoriā uim similiter ut butyrū habet, & pa-  
rum quid de discussoria. Oesypus uelut Dioscorides  
tradit sic præparatur: Sumito lanas sordidas ex alis  
ouium tortas, crispas, & molles, & calida aqua elui-  
to, omni sorde ipsarū expressa, deinde ipsam loturā  
in craterē amplioris mitito, & alia feruente aqua af-  
fusa cōturbato, ita ut poculo uel alio simili uase hau-  
rias, & ex alto uiolenter illidas donec spumescat. De-  
inde aquam marinam, uel frigidam illa non præsen-  
te, irrorato. & desidere finito, atq; ubi perfrigeratū  
fuerit id quod superstat conchula tollito, & in aliud  
uas mitito. & affusa modica frigida aqua manibus  
subigito. Deinde diffusa aqua, aliā calidā affundito,  
& similiter ut prius cōturbato, & aquā maris uel fri-  
gidam irrorato. & desidere finito, atq; ubi perfrige-  
ratū fuerit, rursus id quod superstat cōchula tollito,  
& similiter manibus subigito. Rursusq; tertio calidā  
aquam affundito, & idem uelut prædictū est facito,  
donec cādidus & pinguis œsypus reddatur, & nihil  
impurū habeat. atq; ita fictili inditū ad dies aliquot  
in solem exponito ac adseruato. Sed & omnia præ-  
dicta ad solē æstiuum facito. Sic enim commodior  
reddetur, & albus, nihilq; duri ac contorti habens.  
Quemadmodum qui cerato, aut adipe adultera-  
tur. Facit ad ulcera sedis & uuluarum cum meliloto  
ac butyro, itē ad plurima alia. Oesypus ustus fuligi-  
nem ex se reddit cōmodissimā ad erosos ac scabros  
oculorum angulos, & ad palpebras callosas & pilo-  
rum defluuio laborantes. Vritur autē in testa noua.  
donec in cinerem redactus omnē pinguitudinē depo-  
suerit. Testa ipsa carbonibus imponitur, deinde exu-  
stū colligitur, teritur, et ad prædictos usus adhibetur.

*De carnibus. ex Galeno.*

*Cap. cxxi.*

Non omnes animalium carnes hominē alunt, sed aliquæ  
etiā sunt letales. Quædam uero non solū ut cibus,  
sed etiā ut auxillare medicamen assumuntur. Et ex

his quæ alunt non omnes eandē uim habent. Omnium  
quidem igitur eduliorum caro suilla maximè alit,  
boni succi est, & melius omnibus concoquitur, cum  
aliās, tum ob similitudinem ad homines. Carnes bu-  
bulæ non modicum & ipsæ alimentū præbent, neq;  
facile transpirans, sanguinem tamen crassiorē quàm  
conuenit generant, & si quis natura atrabiliarium  
habuerit temperamentum, affectu quoque melan-  
cholico corripitur, ex frequenti bubulæ carnis esu.  
Tales affectus sunt, cācer, elephas, impetigo, scabies,  
febris quartana, & quæ priuatim uocatur melācho-  
lia. Sed & lien quibusdam ex eius succo intumuit,  
unde deprauatus corporis habitus & hydropisis sæ-  
pe insequuntur. Sicciore enim & multo calidioris  
temperamenti est bos quàm porcus. Cæterū uituli  
carnes concoctu faciliores habent quàm perfecti bo-  
ues, sunt enim temperamenti humidioris. Sic etiā  
hœdi capris præstant. Et capra quidem minus sicco  
temperamento prædita est quàm bos, sed homini ac  
sui comparata multū euariat. Humidissimā autē &  
pituitosam carnem agni habent. uerū ouilla caro ma-  
gis superfluitatibus redūdat & peioris succi est. Mali  
succi est caprina, cū acrimonia, hircina autē pessima  
est & ad boni succi generationem, & ad cōcoctionē.  
Deinceps est arietina, deinde taurina. In omnibus  
autem his castratorum melior est. Vetusorum pes-  
sima est concoctu, succo & alimento. Quare & sues  
quamuis humidum temperamentū habeant, senes-  
centes fibrosam, & duram ac aridam, & propterea  
ægrè concoctilem carnē habent. Leporina quoq; ca-  
ro crassiorē sanguinem generat, sed melioris succi  
quàm bubula aut ouilla. mali succi est & ceruina,  
duratq; ac ægrè cōcoctilis. At uero asinorum sylue-  
strium caro: Nam & hanc quidā comedūt, uelut do-  
mesticorū asinorum in Alexandria: crassissimi succi  
est & ægerrimè concoquitur, & stomacho incōmo-  
dat. Insuperq; esu iniucūda est. quemadmodū etiā  
equina & camelina. nam & horum animalium carne,  
tum animam, tum corpus, asinini ac camelini homi-  
nes uescuntur. Quidam etiā ursinas carnes edunt,  
& quæ his adhuc deteriores sunt, leoninas ac pāthe-  
rinas. Quid uero attinet dicere de canibus, quorum  
catulos pingues, pleriq; homines edūt. Horū omnium  
animalium carnes siccissimæ natura sunt, & acre ali-  
mentum corpori apponunt. Et pro modo præpara-  
tionum etiā magis aut minus nutriunt, & magis aut  
minus cōcoquuntur. Nā quæ assatæ aut in sartagine  
frictæ comeduntur, siccius alimentum corpori suffi-  
ciunt. Quæ coctæ, humidius. Quæ uero conditæ su-  
muntur, mediū inter utraq; locū obtinent. Sed & ha-  
rum ipsarū non parua differentia est iuxta cōdituræ  
modum. Quapropter ubi siccare corpus uoles, sic-  
ciorum temperatura animalium carnem dabis, ubi  
calfacere, calidiorum, frigidiorū item & humectio-  
rum similiter conuenienti proportionē exhibebis.

*De extremis terrestrium animalium par-  
tibus.*

*Cap. cxxii.*

Hæc itaq; in summa de terrestrium animalium carne di-  
xisse satis est. Verum de alijs partibus consequenter  
quam uim habeant discite. Extremas partes appellāt  
in familiari usu homines, rostra, pedes, & aures. nam  
hæc minimè pinguedinem habent, minimè item car-  
nosam naturā. prædominatur autem in his neruosa  
& coriacea species. Suntq; hæ partes multo motu  
e 2 magis



magis exercitatae, & propterea etiā uiscosiores. Merito itaq; paucius nutrimentum corpori praebent, & ob uiscositatem facilius aluo secedunt. Praestant autē pedes suilli rostro, quemadmodū hoc auribus. Lingua laxioris & exanguioris carnis substantiam habet. Venter uero adhuc laxior & exanguior est quā lingua, & propterea etiā friabilior, & concoctu faciliior, citra adiacentium intestinorum ammixtionē.

*De glandulis.*

*Cap. cxxiii.*

Omnes glandulae hoc commune habent, quod iucundae & tenerae edentibus appareant. Mammarū uero glandulae quum lac habuerint, etiā illius dulcedinis nobis quid repraesentant, maximē in suis. Alimētum ex ipsis probē concoctis, ad carnī naturā propē accedit. Si uero defectuose cōcoquantur, crudum siue pituitosum humorē generant, & humidā quidē glandulae pituitosum, siccae crudum producent.

*De testibus.*

*Cap. cxxiiii.*

Ex glandulosis corporibus sunt etiā testes. Suilli itaq; & ouilli & hircini comesti aegrē concoquuntur & malum succum gignunt, propter uisositatem quē in ipsis existit. Quāto autem suilla caro alijs melior est, tanto testes probē concocti magis alunt. De cætero soli gallorum testes per omnia optimi & iucundissimi sunt, & bonum alimentum corpori sufficiunt, praesertim saginatorum.

*De renibus.*

*Cap. cxxv.*

Renes palam est mali succi esse, ac aegrē concoqui, quādo etiam in gustu urinæ qualitatem nobis repraesentant.

*De cerebro.*

*Cap. cxxvi.*

Pituitosius edulium cerebrum est, crassiq; succi ac tardi transitus, & aegrē concoquitur. maximē uero sto macho incommodum est omne cerebrum. Quidam autem mollicie eius decepti infirmis ipsum exhibēt, quum sit praeter alia etiā nauseosum. itaq; potius ubi uomere aliquem uolueris ab accepto cibo, cerebrum ipsi pinguius conditum postremum exhibebis. Verum uitabis ne cibum auersantibus praebas. At uero cum calefacientibus ac incisuiis medicamentis praeparatum, melius seipso euadit.

*De terrestriū animalū uisceribus.* *Cap. cxxvii.*

Iecur omnium animalium crassi succi est, difficilis concoctionis, ac tardi transitus, praestat ex ipsis non solū ad uoluptatem, sed ad alia quoq; porcinum, eorum uidelicet porcorum qui ficibus aridis sunt saginati, quod iecur propterea Græcis sycotum, hoc est ficatum appellatur. Lien mali succi esse creditur, ut qui attrahiliarium sanguinem generet. Pulmo utroque facilius cōcoquitur, quanto etiā rarior est. Verum multo minus quā iecur alit. Alimentum igitur quod corpori inde accedit pituitosius est, propter cartilagineum asperae arteriae corpus in ipso sitū. At uero cor aegrē concoquitur ac tardi transitus est. si uero concoquatur probē, alimentum non modicum neque mali succi corpori exhibet.

*De aluo, intestinis, ac utero terrestrium animalium.*

*Cap. cxxviii.*

Aluus & uterus & intestina, in terrestribus animalibus, duriora carnibus sunt. propterea etiam si probē concoquantur, non exquisitum & inculpatum, sed frigidiorē ac crudiorē sanguinem gignunt.

*De syluestrium animalū carne.* *Cap. cxxix.*

Omniū animalium per montes ac syluas uictū quē

rentium caro durior est, & paucissimae pinguitudinis particeps. quapropter alimentum minus excrementitium ex ipsis quā ex domesticis animalibus corpori accedit.

*De uolucrum animalium carne.* *Cap. cxxx.*

Omne uolucrum animantium genus minus alimentum corpori suppeditat, si terrestribus, & maximē suis bus comparetur. faciliior tamen cōcoctu uolucrum caro est, maximē perdicis, & atragenae, columbae, gallinae q; ac galli. Verum turdorum, & merularū, & paruorū passerulorum, item eorū qui in turribus degunt, durior est, atq; his adhuc amplius nutritis, & palumbi, & anatis. Gallinarū carni similis est phasianorum, quantum ad concoctionē & alimentum attinet, sed iucunditate cibi praecellit. His durior est & aegrē concoctilis magis ac fibrosior pauonis. In cōmune autem in omnibus uolucris animantibus, uelut etiam in quadrupedibus, id nosse oportet: Quod caro crescentiū adhuc multo melior est quā decrecentium. In uigore consistentium medium locum obtinet. Mala item est caro uetustorum, & infantium adhuc siue paruulorum. nam haec mucosa, & humida & excrementis redundans est, & facile aluo secedit. Vetustorum autē dura, & sicca & nervosa est, & propterea concoctioni resistit. Atq; huius memineris in uniuersum de omnibus animalibus. Neq; uero parua differentia est eorū quae in stagnis, aut paludibus siue palustribus locis degūt, ad ea quae per montes ac siccos locos uictum quærunt. Etenim iuxta locorum proportionem, carnes animalium aut sicca, & superfluitatibus carentes, & cōcoctu faciles, aut contra humidā & superfluo excremento refertae & aegrē concoctiles redduntur.

*De anseribus & struthocamelis.* *Cap. cxxxi.*

Harum caro excrementitia est, & difficilius concoquitur quā praedictarum uolucrum, non tamen alas praedictis peiores habent.

*De gruibus.*

*Cap. cxxxii.*

Gruum caro tota dura est & fibrosa, alae uero adhuc carne ipsarum duriores existunt.

*De partium uolucrum animalium differentia.*

*Cap. cxxxiii.*

Viscera in auisbus eandem proportionē habent ad carnes, quā in pedestribus habere dictū est. Intestina uero omnium ferme ad esum inepta sunt. Ventres uero esiles sunt & bene nutriunt. Quidam ipsorum etiam in cibo iucundi sunt, uelut anserinus, deinde gallinaceus. Aliqui falso collaudant struthocameli uentriculum, uelut pharmacum concoctorium. Alij multo magis praedicant praefereuntq; huic mergi uentrem. Verum neque ipsi facile concoquuntur, neque aliorum ciborum concoctionem uelut pharmacum adiuuāt. Alae in iuuenibus ac pinguibus uolucris optimae. in macilentis contra ac uetustis pessimae existunt. Testes optimi gallorum praesertim saginatorum, atque adhuc magis eorum qui ex seroso lacte cibos sumūt. Sunt enim boni succi, probēq; nutriūt, ac facile concoquuntur. Cæterum alui excretionem neque proritant, neque inhibent. Cerebrum porro in uolucrum genere longē praestantius est quā in pedestribus, quanto sanē etiam siccus est, praesertim auicularum montanarum.

*De ouis.*

*Cap. cxxxiiii.*

Oua gallinarum & phasianorum meliora sunt, deteriora



riora anserum & stirothocamelorum. Optima ad corporis alimoniam sunt tremula appellata. Sorbilia minus nutriunt, sed facilius alio secedunt. Iguigant autem faucium asperitudines ex clamore, aut humoris acrimonia obortas. nam affectus partibus oblinuntur & adhærent uelut cataplasma quoddam, & substantiæ totius lenitate asperitatem curat. Eadem ratione etiam stomachi ac uentris & uesicæ asperitates sanant. Ouum in aceto coctum & comestum, uentris fluxiones reficit, quod si ammiscueris ipsi quid ex medicamentis ad dysenteriam uel coeliacam affectionem commodis, deinde ad prunas in sarragine frixeris, & in cibo præbueris, non parum egris opitulaberis. Commoda ad hanc rem medicamenta sunt, uuæ acerbæ succus, & rus inspersus, & cinis cochlearum integrè ustarum, uinacearum uuarum, & myrti baccae, ac similia. Oua cocta ægre concoquuntur, tardi transitus sunt, & alimentum crassum corpori præbent. His autem adhuc magis tardi transitus sunt, crassiorisq; succi, in calido cinere assata. Fricta pessimum ad omnia alimentum præbent, nam in concoctione in nidore transiunt, & crassum humorem gignunt uitiosumq; ac excrementitium, coctis & assatis meliora sunt quæ desata, uel, ut alij malunt, suffocata appellantur, cum oleo & garo, & uino modico subacta, & in duplici uase ad moderatè desam copagem cocta. Quæ enim amplius spissantur, coctis & assatis similia euadunt. Idem facere oportet & in ouis quæ patinis infunduntur, nam adhuc succulenta sunt, patinam ab igne tolles.

*Ouorum uis medicamentaria.*

Cap. cxxxv.

In coeliacis ac dysentericis affectionibus, ouum prædicto modo datum, commodum pharmacum existit. Candidum & tenue in recentibus ouis leuissimum & omnis mordacitatis expers medicamentum est, non solum oculis adhibitum, sed etiam alijs omnibus partibus leuibus pharmacis indigentibus, uelut sunt sedis & pudendorum ulcera, omniaque maligna, si ad ea quæ citra mordacitatem siccare illa solent ammisceatur, qualis est pompholyx, & similia. Vitellus eandem facultatē habet, & propterea lenibus ceratis additur, ouis præcoctis aut assatis. Quanto autem sicciora fiunt, tantum de leniendi ui perdunt. Testæ ouorum uisæ medicamentum sanguinem sistens euadunt.

*De alimento ex animalibus aquaticis.* Cap. cxxxvi.

Animalium in aqua degentium & genera multa, & species differentiæq; plurimæ existunt. Hoc loco referetur, uelut in superioribus fecimus, ea saltem quæ ad usum medicum & ad sanitatem conseruandam assumentur. In uniuersum igitur illud scire oportet, quod optima caro est piscium in puro mari degentium, magisq; ubi locus is uentorum procellis agitur, & neq; terrea, neq; leuia littora aquam ambient, sed arenosa aut aspera & lapidea. Si uero etiam ad aquiloniæres uentos loci conuersi sint multo melius est. manifestum est autem mare mari præstare, in eo quod aliud perfectè purum est, aliud magnos et multos fluctus excipit. Nam pisces qui in eiusmodi mari degunt, quanto meliores sunt palustribus, tanto deteriores sunt his qui purum mare incolunt, nam & hi qui in protecto tranquillo mari degunt, peiorem carnem habent. At uero in stagnanti mari uiuentium piscium caro, medium inter fluuiatiles & marinos locum obtinet. Recrementitia uerè & multum mucosa est caro eorum qui in limosa ac sordida aqua degunt, hac ad-

huc deterior est caro in stagnis degentium. Si uero & parua sint stagna, neque magnos fluuios suscipiant, neq; fontes habeant neque effluxum largum, multo sanè deteriores piscium carnes sunt. Si uero in totum nihil aquæ defluat, sed stagnum perpetuò stans sit, omnino deterrimæ. cæterum in paludibus & cœnosis locis degentium extreme uitiosa caro est. Porro ex fluuiatilibus meliores sunt, quæ eiusmodi flumina incolunt, quorum uelox est & multus fluxus, nam stagnantium fluminum pisces carnem habent concoctu difficilem, & bonum alimentum quam paucissimum habent, pessimi autem sunt qui in ostijs fluminum degunt, quæ sterquilinia, aut balneas, aut culinas, & uestium ac linteorum sordes expurgant, & si quæ alia sunt recrementa urbis quam præterlabuntur, & quæ in ipsa flumina expurgantur, maximè si populosa urbs existat. Cæterum & iuxta nutrimentum pisces meliores & deteriores fiunt. Quidam enim herba & optimis radicibus abundant, & propterea meliores sunt. Quidam & limosam herbam & radices mali succi edunt, & aliqui in fluminibus magnam urbem præterlabentibus degentes, stercore hominum & quosdam consimiles cibos uorant, atq; hi omnium pessimi, uelut dixi, existunt. & si paulò ampliori reppore mortui permanerint, euestigio computrescunt, ac pessimè olent. Suntq; hi omnes esu iniucundi, & ægre concoquuntur, & bonum alimentum paucissimum habent, sed non modicam recrementitiam superfluitatem, & uitiosum succum in corporibus eorum coaceruant qui ipsis quotidie uescuntur.

*De cephalo siue mugile.*

Cap. cxxxvii.

Cephalus maximè omnium piscium utrisq; aquis utitur, fluuiatilibus & marinis. Qui igitur in mari uersatur, paruas & multas spinas non habet, iucundiorq; est, & pinguitudine carens ipsius caro. Verum in fluminibus degentes cephalii, spinis referti sunt, & pinguem saporem habent, esuq; & concoctu deteriores sunt, stomacho incommodant, mali succi & uirosi existunt. At uero sale inueteratus cephalus melior seipso euadit.

*De lupo.*

Cap. cxxxviii.

Lupus ex pelagiorum piscium numero est, hoc est eorum qui in profundo mari degunt. huius itaque caro, uelut reliquorum pelagiorum piscium, tenuiorem sanguinem generat. Si uero ad flumina ascēdar, cephalo similis euadit.

*De trigla siue mulo.*

Cap. cxxxix.

Ex pelagijs piscibus est & mulus. Aestimationē apud homines reperit, tanquam excellenter iucundus in cibo sit, habet autem duriores omnibus pelagij generis carnem, non pinguem, & friabilem, & propterea magis quam alij pisces nutrit, ubi probè concoquatur. Quidam iecur eius & caput, uoluptatis gratia magni faciunt. At uero muli qui carcinadas: animalcula sunt hæc, ualde minutis cancris similia, colore fulua, uorant, foetidi sunt, & iniucundi, ægreq; concoctiles ac mali succi. Cognoscuntur hi ex odore & sapore, sed si quis uentrem ipsorum discerpar, carcinadas in ipso inueniet. Quod si quis in frequenti mulorum marinorum esu perseveret, hebetudinē uisus incurret.

*De piscibus petrosis.*

Cap. cxi.

Petrosos & saxatiles appellant pisces, degentes ubi petrae sunt & littora saxosa. In hoc genere optimus ceter



setur uoluptatis gratia scarus, deinde merula & turdi, & postea iulides, phucæq; ac percæ. Alimentum ex his non modo concoctu facile est, sed & saluberrimum, sanguinem generans compage mediocrem.

De Gobio.

Cap. cxli.

Gobius littoralis piscis est, semper parvus manens, sicut etiam alij plures. optimus est & ad uoluptatem & concoctionem, distributionemq; in corpus ac humoris boni generationem, qui circa arenosa ac petrosa littora capitur. Qui uero in fluuiorum ostijs, aut stagnis degit, neque similiter iucundus est, neq; boni succi, neq; concoctu facilis. Si uero aqua uitiosa sit, etiã in ipsa pessimus gobius euadit. Si iure albo decoctus sit donec flaccidus fiat, ius ipsius potum aluum subducit. Assatus citra salem comestus, promptitudinem egerendi inanem sanat.

De piscibus mollis carnis.

Cap. cxlii.

Ex piscium mollis carnis numero sunt, aselli, murænæ, buglossæ ac passerres, & ex his aliqui in fluminibus & stagnis degunt, aliqui in mari. Et propterea aliquando iucundi & probe nutrientes reperiuntur, aliquando uitiosi & mali succi.

De piscibus duræ carnis.

Cap. cxliii.

Ex duræ carnis piscibus sunt dracones, cuculi, scorpij, orphi, glauci, congri, pagri, amia, & parui thunni ac pelarnides, ægrius concoquuntur quàm pisces mollis carnis, & crassum humorē generant, & propterea fortiore uentre indigent ad concoctionem.

De piscibus testa intestis.

Cap. cxliiii.

Buccina & purpuræ & reliqua ostrea ac chamæ, ostracoderma, hoc est, testa intacta appellantur. his omnibus cōmune est, falsum saporem & qui uentrem nostrum molliat, in propria carne habere. Verum in unoquoq; genere magis aut minus talis actio inest. Nam ostrea siue conchæ inter alia mollissimam carnem habent & magis uentrem subducunt. & quidam ipsa citra cocturam edunt. At uero purpuræ, & purpuræ, buccinæq; ac murices & similia, duram & ægrius concoctilem carnem habent, & minus quàm illa uentrem subeunt. Quemadmodum autem ægrè concoctilem carnem habent ostracoderma duræ carnis, sic etiam ægrè corruptilem habent. Quapropter exhiberi ipsa solent sepe his qui ex humorum prauitate cibum in uentre corrumpunt, coquunt autem ipsa, & aqua iterum atq; iterum diffusa, donec falsa qualitas deponatur. Sic præparata etiam uentrem sistunt. Si uero coquas & primam aquam diffundas, deinde sale aut magis garo condias, & ius bibendum præbeas, aluus bibentis multum subducetur.

De crustatis siue molli testa intestis.

Cap. cxlv.

Gammari, paguri, cancri, locustæ, & squillæ, & quæcunq; alia crusta intacta, tenuem quidē habent ambientem testam, uerū durā, minus superioribus falsum saporem habent, habent tamen, eumq; non modicum. Omnia autem carnis duræ sunt, ægrè concoquuntur, & multi alimenti, præcocta uidelicet. Horum caro uelut etiam ostreorum uentrem sistit, ubi præcocta falsum humorem in aquā deposuerit. Sed & hæc ægrè corruptilem carnem habent, similiter ut duræ carnis ostracoderma.

De piscibus mollibus.

Cap. cxlvi.

Molles appellantur pisces, neq; squamas habentes, neq; cutem asperam aut testaceam, sed mollem. Suntq; tales polypi, sepia, loligines, & qui his similes sunt.

Habent autem carnem duram, ægrè concoquuntur, & falsum humorem modicum in se continent. Si tamen concoquantur, alimentum non modicum corpori præbent. Plurimum autem crudum humorem hi ipsi gignunt.

De piscibus chartilaginis.

Cap. cxlvii.

Asperam & nocte splendidam cutem hoc genus pisciū habet. quapropter aliqui à Græcis selachia appellata uolunt, quod selas, hoc est, splendorem emittat. Mollem in se carnem habent torpedo & pastinaca, alio moderatè subeunt, & non ægrè concoquuntur, & moderatè quoque alunt.

De Echinis marinis.

Cap. cxlviii.

Echinos siue herinaceos marinos quidā ex uino mulso præsumunt & garo, subducendi uentris gratia, sed & patinas ex ipsis præparant. Referuntur autem inter edulia modici alimenti, & quæ mediam facultatem inter spissantia & attenuantia humores habent.

De Salsamentis omnium animalium, pedestrium, uolucrum, & aquaticorum.

Cap. cxlix.

Non modica differentia salsarum carniū est, prout quædam ex ipsis saliantur. Nam adeo immutantur, ut sæpe animalis temperamento humidi caro salita longè siccior euadat, quàm caro animalis natura sicci non salsa. Aptæ itaq; ad salsuram sunt animalium corpora, quæ duras simulq; superfluitate redundantes carnes habent. Quæ uero aut ualde mollem, aut ualde durum, aut siccum & superfluitatū expertem corporis habitum habent, ad salsuram ineptæ sunt. Quemadmodum enim sicca corpora salita corijs similia euadunt, sic ualde humida diffluunt, & salis familiaritate colliquescunt. Itaq; manifestum est, quod dura & neruosa, & uelut pelliculosa accoricea omnia, salita ægrè concoquuntur. quæ uero ad salsuram idonea sunt, tenuim partium fiunt, & comesta crassos ac glutinosos humores attenuant. Cæterum uetera salsamenta omnia uitiosa sunt.

De garo.

Cap. cl.

Garum uim habet multum calidam & siccam. Et propterea quidam medici usi sunt ipso ad putredinosa ulcera. Quin & dysentericis & ischiadicis per clysterem infundunt.

De muria.

Cap. cli.

Muria salsorum pisciū, similiter ut garum, putredinis ulceribus conuenit, & ad ischiadas ac dysenterias per clysterē infusum. Acrimonia enim sua humores coxendicem infestantes attrahit, & per intestina euacuat. In dysentericis autem putredinosa ulcera abluit & siccatur. Maxime uero filuxorum salitorum & mænularum muria ad talia medici usi sunt, & nos ad putredinosa oris ulcera adhibuimus. At uero oliuarum colymbadō muria frequenter in dysentericis utimur, præmittimusq; eam hora una ante quàm crustifica infusa immittamus, ad ulcera uidelicet præmundanda.

De adipe pinguedineq; ac seuo.

Cap. clii.

Omnis pinguedinis uis est humana corpora humectandi ac calfaciendi. Verum singulæ inter se differunt, prout magis aut minus eas uires habent. Differt pinguedo à seuo crassitudine. Quapropter animalia tota natura magis terrea, seuum habent, uelut humectiora pinguedinem. Et propterea adeps siue pinguedo



guedo facile liquefcit ab igne, non facile autem congelatur. Seuum contrà non liquefcit facile, & liquefactum celerrimè cōgelatur, & multo durius adipe apparet. Humidiffima omnium ferme animalium pinguedo est fuilla, magis molliens ac cōcoquens oleo, quare cataplasmatum inflammationum ammiscetur. Ceterum his qui in recto intestino aut colo morsum percipiunt, item in dysentericis & egerendi cupiditate inani, caprinū seuum magis inijcimus, non quòd acrimoniam obtundat, sed quòd congeletur ob crassiciem. Nam fuillus adeps defluit uelut oleū. At uero anserinus adeps fuillo quidē calidior est, & ualde tenuium partium, & propterea insundimus ipsum his qui in alto corporū morsum sentiunt. Nam paritū tenuitate tota corpora penetrat, & omnibus mordentibus serosis humoribus ammiscetur, & mordacitatem hebetat. Medium inter fuillum & anserinū locum obtinet gallinaceum ac gallorum. Porro taurorum seuum multo calidius & siccus est pinguedine fuilla. Vitulinum inferius taurino est caliditate & siccitate. Similiter hœdinum inferius est caprino ac hircino. Rursus hircinum inferius est leonino. Maxime enim discussorium est leoninum, & tenuissimarum partium ferme præ omnium quadrupedum seuo. unde tumoribus inueteratis induratis, & cōtractis articulis adhibetū, ualidissimam uim discutiendi habet. Taurinum medium locum obtinet inter fuillum ac leoninum, & propterea utriq; medicamento rum generi miscetur, tum his quæ induratis medentur, tum quæ inflammata cōcoquunt, quale est tetrapharmacum & regium appellatum. Quidam uiperarum adipem in principio suffusionum cōuenire tradunt. Verum ursinum alopecijs prodesse uere scripserunt. Quidam piscium pinguedinem collaudant ad suffusiones & auritū dolores, aiuntq; omnium piscium adipem ad hæc pollere. Omnis adeps ueterascens calidior ac tenuiorum partium euadit, & ob id etiam magis discussorius. id quod omnibus ueterascentibus contingit, quæ non putredo præoccuparit. Summa autem huius sermonis in commune hæc est, cuius meminisse oportet. Nempe iuxta animalium temperaturam, semper differentias adipis ac seui in ipsis fieri. Item iuxta differentiā generis. Nam masculum semper siccus & calidus est foeminino. mas autem castratus similis est foeminæ. Ita etiam omne iuuenile animal foeminæ assimilatur. Sic autem & syluestre calidius est & siccus domestico.

## De medulla.

Cap. CLIII.

Omnis medulla uim dura & indurata corpora emolliendi habet, siue muscoli, siue tendines, siue ligamenta, siue uiscera, hoc modo sint affecta. Optimam autem semper expertus sum esse ceruinam, deinde uitulinam: taurorum & hircorū acrior est magisque siccatoria, & propterea duritias in scirrhu induratas dissoluere nequit. Cæterum methodum reliquarum differentiarum, ex his quæ de adipe relata sunt, coniectare potes.

## De pulmone.

Cap. CLIIII.

Pulmo agninus & porcinus usti ac triti impositi, attritus calciamentorum sanant. Vulpis pulmo siccatus & tritus paulatim potus, anhelosos sanare creditur.

## De capitibus.

Cap. CLV.

Capita mænularum fassarum urebat quidam, utebaturq; ad rimas sedis, & putrescentes gingiuas, & ad

gurgulionem induratum. Vis ipsorum siccatoria est non ualde acris, alius quidam caput integrum leporis urebat, & utebatur ad alopecias cum adipe ursino. Viperarum capita usta in olla ad cinerem, deinde trita cum decocto lupinorum amarorum crassissimo, & temporibus illita, fluxum oculorū diuturnum sistunt. Cinis ipsorum per se leuissimè tritus, & ut aridum collyrium adhibitus, hebetem uisum magnopere corrigit.

## De cornibus.

Cap. CLVI.

Cornibus cerui ac capræ ustis sæpe ufi sumus ad illustrandos dentes, gingiuas quoq; flaccidas adstringunt. Aiunt cerui cornu si post usturam lauetur, dysenteriam ac sanguinis sputum, & coeliacas affectiones sanare. Ictericis quoq; utiliter præbetur. Datur omnibus duorum cochleariorum mensura. Vstum & lotum collyrijs ocularibus ad fluxiones oculorū destitatis ammiscetur. Est autem horum collyriorum uis siccatoria. Capræ cornu ad pruritus facere aiunt, itemq; ad scabiem, ulcera, affricatum.

## De unguibus.

Cap. CLVII.

Quidam ungues caprarum urunt, deinde cinerem aceto subigunt, & alopecijs illinunt. Sunt autē attenuatoris facultatis. Alij suum ungues urunt, & cinerem colicis in potu præbent. Aliqui asinorum ungulas ustas, comitiales morbum sanare aiunt, si assidue bibantur. Easdem oleo subactas, strumas discutere. Cinerem quoq; earundem cum muliebri lacte probè tritum, & in collyria redactum, oculorum cicatrices detergere, si cum lacte item illinatur.

## De impetigine in pedibus equorum.

Cap. CLVIII.

Impetiginem equorum aceto tritam ac potā, comitiales morbum curare aiunt. Aliqui & ad omnis reptilis bestię morsum eadem uti iubent.

## De lanis succidis, &amp; puris &amp; ustis.

Cap. CLIX.

Lanæ sordidæ ac succidæ appellatæ, utiliter adhibentur ad contusas aut quomodocunq; percussas partes, fomentis excipiendis aptæ, quanquā non desit & ipsis sua utilitas, ob sordium efficaciam. Quomodo autē ex his cœsypum parare oporteat, iam dictū est in hoc sermone secundo, ubi de ouium sorde tractauimus. Lanæ lotæ ad suscipiendas fomentorum humiditates materia apta existunt. Eadem ustæ uim habent acrem & calidam, cum quadā partium tenuitate, ut etiam humectas in ulceribus carnes celerrimè consumment. Conijciuntur & in pharmaca siccatoria. Vritur in fictile nouū missæ, operculo addito multa foramina habente.

## De pilis ustis.

Cap. CLX.

Pili usti consimilem lanis ustis, calfactoriam ac siccatoriam uim habent.

## De ossibus ustis.

Cap. CLXI.

Ossa usta omnia discussoria & siccatoria uim habent. Quidam tamen de hominū ossibus id maxime prædicant. Talum utiq; fuillum ustum, deinde potum, inflationes ac tormina sanare prodiderunt. Er noui fanē ego quendam nostrorū hominum, qui ossa usta potanda dabat, ignorantibus bibentibus quid potarent, ne abominarentur, atq; sic in multis & morbum comitiales ac articulares curabat.

## De pellibus &amp; corijs.

Cap. CLXII.

Pellis ouilla recens excoriata, flagris cæsis circumdata, manifestè auxiliatur præ omnibus alijs auxilijs, ut in una die ac nocte ipsos curet, concoquit enim &





discutit subcruenta. Hyænæ pellem quidam domi repositam adseruant, & usu experēte ipsam à rabioso cane commorsis circūdant. Nam proprietate quadam prohibet ne commorsus in aquæ timorem delabatur, sed & iam illapsis auxiliatur. Coria uetera maximè solearum usta, cinere ipsorum trito insperso, attritus calceamentorum non inflammatos sanant. Nam inflammatos exacerbant.

*De uentriculo mergi.*

*Cap. CLXIII.*

Mergi uentrem torrefactum & sali modico ammixtū, crudis bonam concoctionem facere tradunt.

*De uulpibus.*

*Cap. CLXIII.*

Quidam uulpes uiuas in oleo coquunt, eoq; articulares morbos sanant. Solia enim oleo calido replent, atq; sic arthriticos totos insidere faciunt, & diutius immorari iubent. Maximè autem discussorium fit hoc oleū, ut ad superficiem trahat in alto corporum contenta, isticq; dolores facientia, aut ob substantiæ crassitudinem, aut ob frigiditatem, aut uehementem acrimoniā, aut ob flatuosum spiritum egressum non habentem. Ex hoc enim non solum tumores in articulis ipsorū, sed etiam totum corpus repletionē affectum euacuari cōtingit, & propterea maxima utilitas inde cōsequitur, nimirum quā causæ in articulis contentæ discutiantur, & nihil amplius affectis partibus influat, toto corpore à superfluitatibus liberato. At uero si quis improba diēta utatur, affectio redire solet, non tamen ita uehementer uelut antea. Nā & antea quā illæsum ab eo affectu esset corpus, uitiōsa diēta malum id induxit. Idem facit & hyena tota oleo uelut uulpes cocta.

*De araneorum telis.*

*Cap. CLXV.*

Araneorum telis quidam scripserunt ulcera in superficie ab inflammatione adseruare.

*De ranis.*

*Cap. CLXVI.*

Ranæ palustres coctæ, & modico sale ac oleo modico conditæ, magnā medelam afferunt à reptilibus uenatis cōmorsis, si ius ipsum in potu sumatur. Aliud, Rana in oleo cocta, & oleo pro fomento admoto, diuturni tendinum dolores sedantur. Idem oleum articulare morbum mitigat, & duritias emollit. Ranæ ustæ cinis membranæ cerebri sauciata, aut uenæ raptæ inspersus, sanguinis eruptionem sistit.

*De mustela.*

*Cap. CLXVII.*

Mustelam arefactā & potā, morbum sacrū curare aiūt. Si tota uiua uratur in olla, cinis eius strumas sanat cū melle, aut terebinthina, aut butyro impositus.

*De terræ intestinis.*

*Cap. CLXVIII.*

Terræ intestina trita & neruis dissectis imposita, euestigiō mirabiliter auxiliantur, omnē quoq; ferri aut lapidis aut alterius rei plagā glutinant, præsertim in neruosis & ægrè glutinū admittētibz partibus, aut naribus, aut auribus, & similibus. Oportet autē ea se uigare cū terra in qua reperiuntur, si non acrem aut salam habeat qualitatē. Terræ intestina pota numero quinq; aut septem, cū passō urinam ciēt, & omne genus lumbricorum eiciunt eodem modo pota, aut quocunq; uelis. Verum latū lumbricū expellunt cū aceto mulso pota. Sed & morbum regiū ægrè curabilem per urinas expurgāt, similiter cū passō septem numero pota, aut etiā per se, & cū myrrha troglodytide magnitudine ciceris. Vtere confidenter. At uero in rosaceo cocta, aurīū dolores sanat, oleo calido infuso. Oportet autē terræ intestinorum drach. vi. esse,

& rosacei librā unam. Dentium quoq; dolores idem oleū sedat, propinquo dolenti denti aurī calidū instillatum. Eadem super prunas suffita dentiū dolores sedant, ægro per infundibulū fumum suscipiēte ad dolentem dentē. Molares quoq; quos tollere oportet, citra forcipem tollunt usta trita, circum dolentē dentem inspersa, prius tamen dentē exactē circūscarificare cōuenit. Cinis eorundem in testa exustorū leuissimè tritus, & ut collyriū aridum admotus, incipientibus suffusionibus magnificè opitulatur. Auxiliatur idem palpebris in pilos eluxuriantibus, præeulsis antea superfluis pilis, deinde insperso cinere in loca ipsorū per specillum. Prohibet enim pilorum præternaturā regenerationem. Septem autē terræ intestina trita, ex uīno mulso ad plures dies pota, calculos in uesica cōfringunt, & paulatim emingere faciūt. Rumpunt & internos abscessus, & ad excretionē deducūt septem aut nouē pota pro uiribus, trita in aquæ cyathis tribus. Si uero quis ipsa trita in melle reposita asseruer, optimū auxiliū ad percussos à scorpiō habebit. Neruorū nodos quos gāglia uocamus, eadē perse trita in cataplasmate imposita dissoluūt. Itē māmārū abscessus per se cataplasmatibus uice imposita: suppurāt enim attrahūtq; & rūpunt, & ad cicatricē perducunt. Profunt & erysipelatis usta trita cū aceto illitæ. Podagrarū inflāmationes soluūt trita cū melle, ad cerati crassitudinē, locis illita & tertiā diē soluta, locis rosaceo antea sublitis. Sed & rosaceo cerato trita excepta, optimè pedū dolores mitigāt. Cæterū in capite nō sinūt leucas, uirilignes albas aliū insidētes nasci, si fuerint cōsuetis medicamentis præadstrictæ, & pili postea ex ipsis tritis cum urina pueri illinantur. Oportet autē in testa prius exurere ipsa, et sic in urina uti. Dato & hydropicis septem cū uīno mulso. uerum exulceratæ uesicæ aut renibus, septē item dato trita cum sapa diluta. Strumas porrō paulatim minuunt, uiua locis adalligata tot numero in pāniculū illigata, quot strumæ existūt. Sedāt omnē capitis dolorē et hemicraniā trita tēporibus illita. Subterranea autē sunt hæc terræ intestina, prodeuntia igitur & ad solem conspicua, tempestates ac pluuias significant.

*De dracone marino.*

*Cap. CLXIX.*

Draconis marini squamas urito, et tenerrimè tritū cinerem sublinito, & turbatos ac hebetes oculos sanabis, item eos quibus animalcula uelut culices, præ oculis uolitare uidentur.

*De uipera.*

*Cap. CLXX.*

Viperæ caro comesta palām calfacit ac siccatur. oportet autē capite & cauda amputatis ipsam excoriare, & omnia interanea eximere, aquaq; triplici carnē eluere. deinde in aqua uelut anguillam coquere, addito marrubio, & anetho modico, paucoq; oleo. atq; ubi iā cocta fuerit, moderato sale cōdire, & edenda præbere, itemq; ius absorbendū. Quod autē uiperæ carnes sic comestæ purgent per cutē totū corpus, ex his cognoscere licet, quæ quā adhuc iuuenis essem, expertus sum. Homo quidā elephantiasī correptus abominabilis erat & graueolens. Itaq; casa prope uicū exstructa in ipsa degebat. Metebant autē in uicino messores, quibus uinū in amphora apportabatur. Vbi ergo tēpus bibēdi adesset, messores uinū in craterem effundebant, atq; sic mortua uipera simul excidebat. Itaque plenum humanitatis opus se facturos rari, uinum ægrotati elephantiasī largiuntur: melius enim esse

numero, ut  
erit ut  
de Cicadis



esse iudicabant ipsum mori, quam talem uiuere uitā. Verum is epoto uino mirabili modo sanatus est. Et enim uniuersa eius tumescens cuticula. uelut ostreorum tectorium decedebat, & quantum eius reliqui fieret, satis molle apparebat, uelut in locustis ac cancris uidere est, ubi testam exuerunt. Quin & in alijs plurimis cōsimiliter accidisse, ueteres memorię prodiderunt. Et nos multos ex uiperis curatos uidimus, unde etiam theriacę ipsas miscemus.

De herinaceo marino.

Cap. CLXXI.

Herinaceus marinus comestus superiori uentriculo cōducit, & cibos auersantibus, appetentiā excitat. Vrinam laxat idem uescicam expurgans, unaq; aluum leniter emollit.

De herinaceo terrestri.

Cap. CLXXII.

Herinacei terrestris caro siccata & paulatim pota, elephantiacis auxiliatur, & uitiatō corporis habitu prædijs, conuulsisq; ac nephreticis, insuperq; aqua subtercutē laborantibus: habet enim uim discussoriā ac siccatoriā. Sed & iecur ipsius sole siccatur ac potū, elephantiacis opitulatur. Cæterū utriusq; herinacei terrestris ac marini ustorū cinis exterforius est ac discussorius, & carnē consumit. Quapropter & ulcerū superexcrecentē carnē demolitur ac cōpescit, & sordida ulcera expurgat. Verū herinacei terrestris usti cinis pice liquida exceptus alopecias sanat. Eiusdē cinis potus cū uino mulso calculosos renes sanat. & aquā intercutē. Bibitur cineris cochlearij dimidij mensura. Omnē urīnę difficultatē ex quacūq; causa obortā, soluit herinaceus, si intestina ac interanea ipsius suffiatur, ægro undiquaq; cooperto: celerrimē enim sic malū soluitur. Ad hāc rē interanea inueterata esse oportet, & sicca asseruata: quibus nō præsentibus caro aut pellis sicca sufficēda est. Multā urīnā ciēt interanea sicca trita pota, quantū tribus digitis apprehendi potest, ex uino. Eiusdē caput ustu, & cū adipe ursino illitū, non modo alopecias per sanat, sed etiā pilos excicatricibus producit. Corium autē ustum itidem cū adipe, maximē ursino illitū, similiter alopecias sanat. Totus porro terrestris herinaceus uiuus in oleo ad mollem ac lētum ignem coctus diutiusculē, oleū ex ipso coxendicum dolores ueteres, illitu sanare facit. Fit ex ipso & psilothrū pilis denudandis hoc modo. Herinaceū uiuū in ollam densissimum operculū habentē, & duodecim sextarios capientē mitto, & ad ipsum olei sextarios sex tantū affundito, & ollæ osculū diligenter gypso oblinito, ut nullatenus trāspirare possit. deinde ad dies x l. ad solē sub caniculæ æstibus exponito. Postea apertā tudicula noua diligenter agitato, & mox excolato per panniculū, utitor. Illinatur ex eo locus in sole, & diu cōfricetur donec exudent. postea aqua dulci affusa proluet. Cauendū autē ne alios locos cōtingat, quos depilare nolis.

De Hippocampis marinis.

Cap. CLXXIII.

Hippocampi marini & assati comesti, & morsui impositi, à cane rabioso commorsos sanant. Verum cum aceto mulso & melle ipsos conterere oportet.

De cantharidibus.

Cap. CLXXIII.

Cantharidum magnificū experimentum habemus ad scabros ungues. Extrahunt enim ipsos cōmodis medicamentis ammixtæ. Miscentur autem alijs erodentibus compositionibus, & excoriatorijs leprosorū. Quidam ex præceptoribus nostris in pharmacum urinam ciens parum de cantharidibus addebat, reie-

ctis alis ac pedibus. Ad hos usus commodiores sunt, uelut ego expertus sum, quæ in tritico reperiuntur, & uirgulas trāuersales melini coloris in alis habēt. Magis autem adhuc idoneæ fiēt, si uiuas ipsas in uas fictile mittas. Deinde osculo uasis rarum linteolum obducas, deinde acetū in olla feruefacias, & uas cantharidum inuersum supra ollam detineas, ita ut uaporem ab aceto elatum, per linteolū cantharides excipiant, donec emorianiur.

De cancris fluuiatilibus.

Cap. CLXXV.

Cancros fluuiatiles crudos tritos & lacti mixtos in potu præbe, & omnis reptilis morsum curabis, & præsertim scorpj plagæ medeberis. & eum qui potu lepore marino iam perit, statim restitues. Manifestum autem est, quod internam eius carnem cum lacte terere oporteat. Similiter exhibitū auxiliantur etiam phthiisicis cōtabescentibus. Itemq; iure albo cocti & comesti, absorpto insuper iusculo. Cæterum cinis cremati cancri similiter ut alia uita siccatur. Verū quædam totius substantiæ proprietate, ad rabiosi canis morsum efficax est, tū solus, tum multo amplius gētiana & thure additis, ita ut sit thuris pars una, gētianæ quinq; cineris cancrorū partes decem. Vbi sumus autē uitis aliquando quidem alio modo, ferē tamen quomodo præceptor noster utebatur. Patinam habebat is ex ære rubro, in quam uiuos cancos missos urebat, lignis uitis maximē subiectis, donec ad cinerem redigerētur, ut cōmodē teri possent. Atq; sic habebat semper præparatum domi suæ pharmacum. Vrebat autē ipsos cancos mense Augusto sub caniculæ æstibus luna decima octaua. Ex eo uero quotidie à rabido cane cōmmorsis dabat usq; ad quadragesimum diem cochlearium satis amplum in aquā inspergens. Si autem nō à principio, sed post aliquot dies à morfu commorsi curam suscipiebat, bina cochlearia quotidie dabat, ut quadraginta dierū exhibitio expleretur. Vrebat uero & ad uulnus ipsum medicamētum ex brutia pice, in quod recipiebat picis libram i. aceti acerrimi sextariū i. opopanacis quadrātem. Porro cinere cancri fluuiatilis usti melle addito, plantas pedum à frigore ruptas, & digitorum rimas sanabis. Eodem etiam maligna & cancerosa ulcera curabis.

De carabo siue locusta.

Cap. CLXXVI.

Locustæ testam uistam ac tritam cum meraco bibendā dato, & alui infernum fluxum compescet. Expurgat eadem & calculosos renes, multam arenosam urinam deducens.

De testibus castoris.

Cap. CLXXVII.

Castoris testes castoriū appellant, celebrē et multi usus medicamentū, hic in uniuersum uim eius referemus, ad quā si quis respiciat, particulares usus sibi ipsi exquirere poterit. Calfacit itaq; & siccatur, estq; multum tenuium partium medicamētum, siue quis humido corpori adhibeat egente siccatione, siue frigido indigo caliditatis, siue his qui ex repletionē conuelluntur, ubi ea quæ præter naturam in neruis cōtinentur euacuare oportet, magnam quidem utilitatem ex se ostēdit, & nulli parti ullum aliquod detrimentum affricat, præsertim si homo non uehementi aliqua febre laboret. Eadem ratione & tremulis ob crassorum ac uiscosorum humorum multitudinem, commodissimum est potum, utile est & singultui, ex humorū frigidorum ac uiscosorum copia osculo uētris infarta oborto,



oborto. Si uero ex siccitate, aut immodica euacuatione, aut acriū humorum mordacitate, singultus aut conuulsio oriantur, castorij usum uelut infestissimū fugere oportet. Sed & febrientibus non adeo calida febris, sed ut ita dixerim tepida, uelut in altiore sopore, ac lethargo fieri solet, ualde multis castorij exhibuimus cū pipere, utriusq; cochlearij ex aqua mulsa, & nemo ex ipsis ulla parte laesus est. At uero in lethargicis ac alti soporis febribus, castorium rosaceo dilutū capiti imposuimus ac ceruici. Ad suppressos autem menses ob copiam ac crassitiem sanguinis, sanguine à talo moderatè detracto, cochlearium castorij cū pulegio aut calamintha exhibui, cognouiq; medicamentum ipsum purgationem menstruam ciere. Eijcit & secundas detentas, & morantes, similiter cū aqua mulsa potū. Inflatos uētres & torminosos propter crassum ac flatuosum spiritū conclusum, ex posca potum sanat. Datur & orthopnoicis recta ceruice spirantibus, cū aceto mulso aut posca. Suffitur & in carbonibus, hiante ægro & uaporem excipiente.

*De canis fluuiatilis testibus.* Cap. CLXXVIII.

Canis fluuiatilis testes ad eadem cōmodi ad quē castoris testiculi existunt, sunt tamen debiliores, eiusdem canis pellis ad calceamentum redacta, pedum ac neruorum morbum egregiè mitigat.

*De canis terrestris catulo.* Cap. CLXXIX.

Catulus canis terrestris probè saginatus iuxta ægrum accliuatus, siue stomacho, siue alia interna parte egrotet, morbum eximit ac sanat, affectu in ipsum transeunte. A iunt eundē mortuū diligenter lepelli oportere.

*De cygni pullo.* Cap. CLXXX.

Cygni pullus tener in oleo coctus, neruis affectis præter omnem opinionem medetur.

*De buccinorum testis ustis.* Cap. CLXXXI.

Buccinorum testæ ustæ uim multum siccatoriam habent, unde commodis medicamentis ammixtæ inflammationes induratas discutiūt. Consimilem uim habent purpurarum ac ostreorum testæ.

*De galerita uolucres.* Cap. CLXXXII.

Corydalis Græcis appellatur, & Latinis galerita, uolucres animal paruū, quod sæpe iuxta uias uidemus. id simplici iure coctum ac comestū colicis prodest. Oportet autē assidue & frequēter id edere, unā cum iure. Nam utilitatem ex ipso sæpe expertus sum. Habet autem eminentiam quandam in capite uelut cristam, ex primis sponte naturæ productam.

*De cochlea terrestri.* Cap. CLXXXIII.

Cochlea terrestris durā carnem habet, & propterea comesta ægrè concoquitur. Verum iusculū ipsius coctæ ex aqua & anetho, oleoq; ac garo, aluo secedit si potetur. Si uero prima & secūda aqua in qua coquitur diffusa, in tertia coxeris donec exactè flaccescat, & in fluxione uētris exhibebis, uentrē sistet. At uero cochlearum humiditas sola per se citra carnē accepta (uocat autē eā ipsam cochleæ mucū) & thuri ammixta, aut aloæ, aut myrrhæ, aut aliquibus ex his, aut omnibus, donec cerati crassitudinē habeat, pharmacum euadit glutinatoriū, & submucosos aurij tumores probè siccatur. Glutinat itē ac siccatur oculorū fluxiones frōti impositū. Quum itaq; multū eius mucī colligere uoles, carnē ipsarū stylo perforato. nō modicā enim humiditatē emittunt, præsertim si nō ante multos dies capte fuerint. Hæc autē humiditas palpebrarum pilos reglutinat. Ego autem aliquando in agro

cuidam neruos fauciato unā cū tendinis contusione, carnē cochlearum imposui cū farinæ polline qui molendinis adheret trita, & citra inflammationē uulnus glutinatum est. Erat autē homo duræ carnis. Quod si ad manū sint, præstat ammiscere in talibus myrrham aut thus, aut resinā frictam leuissimè trita. Cæterum caro ipsa in pila prius cōtusa, deinde trita & imposita, omnes partes superfluam humiditatē habētes siccatur, ut etiā hydropicis prodest. Sed & unā cū testis suis tritæ cochleæ uentri uniuerso hydropicorū imponuntur, & super articulorū tumores in arthriticis, & appositio quidē ipsarum difficulter auferri potest, uerū multum siccatur, & sanè sinendæ sunt donec sua sponte decidant. Idem facere expedit & in tumoribus ægrè solubilibus ex plaga, aut cōtusione factis in auribus. Nam omnes hos exiccat, etiam si uiscosum & crassum in alto cōtineatur. Integræ porrò cochleæ unā cum testis ustæ, galla omphacitide ac pipere ammixtis, magnopere profunt dysenterijs, in quibus ulcera nondum sunt putredinosa. Oportet autem esse pipere partē unā, gallæ duas, quatuor cineris cochlearum. Quæ omnia exactè leuigata ac mixta, reposita seruabis, & usu expetente cochlearij plenī mensuram obsonijs insperges, aut cum aqua calida aut uino bibendam dabis. Citra uero ullam admixtionē ipse cinis cochlearum ustarum siccandi uim habet, cui & quiddam caliditatis propter usturam inest.

*De mænulis.* Cap. CLXXXIII.

Mænulæ falsæ caput ustum, excrecentes in ulceribus carnes, maximè in dentiū gingiuis, reprimunt inspersum, & callos eximit, quos clauos uocant, & extuberantes sedis eminentias tabefacit ac consumit.

*De torpedine.* Cap. CLXXXV.

Torpedo uiua apposita, diuturnum capitis dolorem depellit, & prolabantem sedem intro pellit. Mortua uero aut omnino non, aut modicè hæc facit.

*De asello marino.* Cap. CLXXXVI.

Asellus marinus aqua coctus cum anetho, & modico sale conditus, oleoq; pauco, omnem interaneorum morbum sanat, maximè alui ab acris humoribus infestatæ.

*De ostreorum testis.* Cap. CLXXXVII.

Ostreorum testæ omnes leuissimè tritæ & ad puluillū redactæ, ulceribus malignis conueniunt, & præsertim in ulceribus corrodentibus labiorum optimum pharmacum sunt, citra mordacitatem ad cicatricem perducentes: participes enim sunt facultatis adstrictoriæ, per quam duræ ac terreae existunt. Eam autē per usturam amittunt. Eadem cum aceto aut posca aut uino mulso tritæ, putredinosis commodè fiunt, pro habitu uidelicet ægroti, cōueniente humore ammixto. Quod si uratur ostreorum testa, tenuiorum partiū euadit quā buccinorum testa. nam & minus durū est ipsarum corpus. Si uero lauatur hic cinis, commodus fit ad humectiora ulcera explenda & ad cicatricem perducenda. Atque ego sanè ostreorum testa hoc modo præparata semper utor, ad cauitates ac fluxiones diuturnas & ægrè carnem recipientes, etiam si fistulosæ essent ac profundæ. Circumpono autem eam forinsecus cum adipe suillo uetere, & in ipsum sinum quid indo ex his quæ talia carne replere solent, quale est pellucidus lapis, specularis appellatus. Quin & dētes ostreorū testa illustrat, uelut etiā buccinorū, & purpurarum, nō solum ui extersoria, sed etiam



etiam substantiæ aspretudine. Quapropter nō est necesse ad hanc rem ipsas ualde leuigare. eadem lotę ac tenuissimè tritæ humore flaccida ulcera exiccant.

De purpurarum testis. Cap. CLXXXVIII.

Purpurarum testæ cum aceto potæ lienes tumentes sanant. Suffitæ uero uteri strangulatus curant, & secundas morantes detrahunt. Vstarum cinis ad eadem facit ad quæ buccinorum adhibetur.

De Squatina marina. Cap. CLXXXIX.

Squatinam marinam uistam crassioribus corporibus in balineo inspergito.

De Sepia. Cap. CXC.

Sepia suffocata in aceto, si cum oleo acetum bibendum dederis, cum qui hippocampi marini uenenū sumpsit seruabis. Testa sepiæ exterforiam & siccatoriam uim habet, estq; tenuium partium. Quapropter uita utimur ad uirilignes, maculas solares ac lentigines, & scabiem. Sed & sale ammoniaco ammixto, oculorum ungues exerit. Eadem non uita, dentes illustrat, & affricta oculorum cicatrices deterit, & ulcera in ipsis siccant. Magnas quoq; palpebrarum aspretudines, sycofes Græcis dictas, consumit.

De Scinco. Cap. CXCI.

Scinci circa renes partes, ad tentiginem pudendorum ciendam bibuntur. Neq; aliud magis contrariū huic facultati destruendę uidetur, quàm lactucæ semen ex aqua potum. Quidam etiam lenticulæ decoctum cū melle potum, tentiginem sedare tradunt.

De Tellinis. Cap. CXCI.

Tellinarum fassarum uistarum cinis cum cedria adhibitus, superfluos palpebrarum pilos renasci prohibet.

De Cicada. Cap. CXCI.

Cicadis siccis quidam utuntur in colicis affectionibus, cum pari numero granorum piperis, exhibentq; aut tres, aut quinq; aut septem, tum in interuallis, tum in exacerbationibus. Alij tostas in uesicæ dolore, ac calculosis, edendas præbent.

De Hyena. Cap. CXCI.

Hyena uiua in oleo cocta, uelut de uulpe dictum est, oleum discussorium efficit, arthriticis utilissimū, Vtus fiat uelut de uulpe indicauimus.

De Hirundinibus. Cap. CXCV.

Hirundinū uistarum cinis cū melle illitus, anginā sanat, & omnino omnes affectiōes quæ in faucibus ac gurgullone cū tumoribus fiunt. Quidā & ad acuendum uisum cinere utuntur, collyrii siccī modo adhibētes.

De electione optimorū medicamentorū. Cap. CXCVI.

Agaricum præstat quod strias rectas habet.

Acaciam elige fuluam & odoratam.

Aloēn elige purā, non lapidosam, ualde splendīdam, densam, subflauā, friabilem, hepatis colore, facile liquecentem, odoratā, amaritudinis intensæ. Nigra uero & ualde dura reprobatur.

Amomū elige recens & albū aut subruffum, non coactū, sed soluiū & diffusum, semine plenum, simili racemulis, ualde graue et odoratū, nō cariosum, acre & gustu mordax, colore simplex nō uariū. Adulterat qdā id amomide simili existēte. Sēper aut fragmēta reprobāda sunt, electis ramis pfectis ab una radice.

Ammoniacū thymiamā eligēdū est nō lignosum, granis thus referens, purū, densum, nihil sordidū habens, castorei odorē præ se ferens, gustu amarum.

Aspalathus bonus est grauis, & post decorticatiōnem subruber aut purpuram referens, densus, odo-

ratus, saporis amari.

Abinthium melius est quod in Ponto & Cappadocia nascitur.

Bitumen optimum est purpurei coloris, splendīdum, intenti ac grauis odoris. Nigrum autem uitiosum est. Nam pice ammixta adulteratur.

Bdelliū præstat gustu amarū, colore glutinis, pingue in altum & facile molliri potens, nō lignosum, non sordidum, iucundi odoris in suffitu, & ungui simile aromatico, onychi appellato.

Elleborū nigrum eligito probè coactū, tenuem habentem medullam, acrem gustu ac feruidum. talis est qui in Helicone prouenit ac Parnaso & Anticyra.

Elleborū album elige moderatè extentū, & albū fragilem q; ac carnosum, nō acuminatū & iunceum, aut puluerulentā lanuginē remittentē dum frāgitur. quiq; medullā tenuē habeat, gustu feruido nō ualdè neq; acruatim, saluā attrahentē: qui enim talis non est suffocatorius existit. Primas obtinet Cyrenaicus.

Euphorbiū elige pellucidum & acre.

Viscum optimum est recens, coloris prasinī intrinsecus, foris subflauum, nihil asperum aut fursuracū habens, colligitur ex quercu, maloq; ac pyro, & alijs arboribus.

Gluten piscium bonum est non glaucum, subcrassum, non scabrum, facile liquefscens.

Calamus aromaticus bonus est fuluus, dēsis geniculis, & qui in multas scissuras & segmenta assulose frangitur, fistula telis aranearū repleta, subalbidus, in manducando uiscosus, adstringens, & subacris.

Cardamomū optimū est quod ex Armenia afferatur. Elige quod ægrè frangitur, plenū & conclusum.

Cassiam elige fuluā, boni coloris, corallium referentem, arctam ualde, longam, crassam, fistulis plenam, gustu mordacem, & adstringentem cum quodam aromatico feruore, uinum redolentem, uerum purpurea & crassa zigir appellata, rosam odore referens, ad medicum usum maximè apta est.

Cera optima est subpinguis, odorata, pura, pōtica.

Glutinū quod aliqui xylocollam uocant, optimum est Rhodianum, estq; album & pellucidū. Nigrum uero deterius est.

Gummi elige uermiculatum, uitriforme, pellucidum, non lignosum. ab eo proximum est album, resinosum uero ac sordidum inutile est.

Costus optimus est Arabicus, albus existens ac leuis, plurimum habens & iucundū odorē. secundum locū obtinet Indicus densus existēs ac leuis & niger uelut ferula. Tertius est Syriacus coloris buxei, odore nares percellens. Optimus est recens, albus, plenus ex toto, densus, siccus, teredinem non sentiens, gustu mordax ac feruidus. Quidam adulterant ipsum helenij radicem ammiscentes, facilis est cognitio. Nam helenium linguam non feruefacit, neq; odorem intentum & nares percellentem exhibet.

Crocus optimus corycius est, recens ac boni coloris, parū albedinis in capreolo habens, oblongus, integer, probè coactus, plenus, nō friabilis, nō pinguis, & tamen in attritu digitos facile tingens, non cariosus, imperuosi odoris, & acris. Qui enim talis nō est, aut uetustus est, aut maceratus. Quo uero facile teri possit, in sole ac fictili nouo siccare oportet.

Crocomagma sic præparatur: Croci drach. centū, rosarū siccārū drach. quinquaginta, amyli drach. l. myrrhæ



myrrhæ troglodyticae, gummi utriusque drach. l. uno odorato terito, & pastillos formato, eisq; in umbra siccat, utitor.

Cyperî radix optima est quæ grauissima & densa ac plena, ægrè friabilis, aspera, odorata, cum quadam acrimonia.

Thus primas obtinet masculum, rotundū, non sectum, album, & ubi incisum est intus pingue. Adulteratur resina pinus aut gummi, facilis est cognitio.

Thuris cortex præstat crassus ac pinguis, odoratus, nō scaber aut pelliculis refertus; adulteratur cortice strobili aut pini ammixto. deprehēditur id igne: alij enim cortices suffiti fumum edūt. Verum hic ardet odore iucundo uelut thus.

Malabathri folium bonum est recens, in nigrore subalbidum, nō friabile, integrum, odore nares percellens, & dum diluitur odoratum, nardum sapore non falsuginem referens, quod uero in tenues partes contusum cariosum odorē repræsentat uitiosum est.

Medulla optima est ceruina, deinde uitulina, post taurina. Bona est quæ æstate accedente ad autumnū colligitur: alij enim temporibus cruenta uestigia in ipsa reperiuntur. curatur ad repositionem, recēs molitus aqua affusa, deinde per linteam excolatur, rursusq; lauatur, donec aqua pura fiat, postea in duplici uase liquatur, sordibus innatantibus penna ablatis, postquam autem congelata fuerit, in fictili nouo reponitur, derasa diligenter fece quæ post liquefactionem & excolationem subsidet.

Panacis radices meliores sunt siccae & albæ, extectæ, & incorrosæ, gustu feruidæ, & aromaticæ. Succus panacis commodus est gustu amarissimus, forinsecus uiridis, intrinsecus albus, pinguis, citò solubilis, grauis odoris, & gustu calfaciens.

Myrrha primaria est Troglodytica, subuiridis & pellucida, odorata, acris. quæ uero colore picea est, inutilis existit.

Stacte myrrha bona est odorata, leuis, oleum admixtum non habens.

Styrax præfertur flauus & pinguis, resinofus, grumosus habens subalbidus, ualde odoratus, & dū molitur, humiditatem melleam remittens.

Tragacantha optima est pellucida & leuis, tenuissima & pura, subalbida.

Hyoscyamo utendum est eo qui albos flores producit.

Galbanum optimum est thuriforme, grumosum, purum, non lignosum, quod & ex semine quid ammixtum habet, odore graue, & neq; summè liquidum, neq; ualde siccum.

Gagates lapis præfertur qui facile accenditur, & odorem bituminosum repræsentat.

Melanteria optima est sulphurei coloris, leuis, æqualis, pura, & contactu aquæ citò nigrescens.

Pompholyx optima est Cypria, & quæ aceto subacta æris odorem refert, colorem autem picis. Est autem & cœnosi saporis, & carbonibus ignitis imposita, ardet colorem aëreum repræsentans.

*Ex Oribasij libris ad Eustathium & Eunapium, de simplicium pharmacorum facultatibus.*

*Quæ media sunt inter calfacientia ac frigefacientia.*

Cap. cxcvii.

Adiantum, asparagus myacanthinos, muscus qui &

splanchnon dicitur, glycyrrhizæ succus, oleū dulcisimum, cera, faba, lycium, lotus siue trifolium, citrij cortex, filicis radix, nuclei nucis pineæ, lentiscus, lēs, terra chia & samia, cadmia, spuma argenti.

*Quæ moderate calfaciunt.*

Cap. cxcviii.

Vitidis folia & semen, urticæ semen & folia, amygdala dulcia, anagallides ambæ, atractylis, glycyrrhizæ radix, oleæ radix, & fructus maturus, fermentum, eryngiū, resinæ omnes, cicerbita sicca, iunci odorati flos, palmæ fructus, cochlearū cinis, cynocrambe, batrachij herba & radix, pulegiū, lauri folia, & magis bacca, minus autē radice cortex, dictamnium, pseuododictamnium, salvia, erysimum, lanæ uistæ, bryoniæ radix, aristolochiæ radix, asphodeli radix, daucus, chamædaphne, dracūculi radix, oleum raphaninum, cicerum species tres, uiscum, caucalis, ligusticum, ferulæ semen, sagapenum, satyrion, apium, sion, sinon, styrax, hydropiper, hypericum, sal, sanguis, fel, urina, salia, sulphur, uiperarum carnes, adeps, salforū piscium muria.

*Quæ calfaciunt primo ordine.*

Cap. cxcix.

Aloë, chamæmelon, agaricum, absinthium, ladanum, lini semen, malabathri folium, spica nardi, nardus celtica, uinum nouum, serum lactis, caseus, ficus sicca.

*Quæ calfaciunt secundo ordine.*

Cap. cc.

Amurca, anethum siccum, sed uiride minus, artemisia, balsamum, elaphoboscum, calamus aromaticus, crocus, thus, mastiche chia, mel, uinū, pix, melissophyllum, marrubium, propolis, cucumeris syluestris succus, scandix, scilla, cardui radix, myrrha, terebinthi cortex foliaq; ac fructus, fœnumgræcum, chamæleontis utriusq; radix, chamæpitrys, ocymum.

*Calfactoria tertij ordinis.*

Cap. cci.

Abrotonum præsertim ustum, lolium, populi nigrae flores & resina, acorus, amomum, amaracum, ammiū, anethū ustum, anisum, iuniperus, asari radix, sabina herba, ueratrum utrunq; epithymum, menta, calaminthe, thymbra, harundinis uallatoriae cortex uustus, caroum, casia, cedrus utraq; cnici semen, conyzæ, cuminum, thuris fuligo, fœniculum, melanthiū, mei radices, moly siue ruta syluestris, aut besasa, rhododaphne, uinum uetus, origanū omne, opopanax, petroselinum, ruta, smyrnium, hyssopus, galbanum, chamædryes, raphanus, sampsuchus.

*Calfactoria quarti ordinis.*

Cap. ccii.

Adarce, ampeloprasen, euphorbium, oleum cedrinū, costus, cepa, lepidium, sinapi, allium, sthruthij radix, tithymallorum succi, & omnia uistoria ui prædita.

*Quæ frigefaciunt.*

Cap. cciii.

Gramen moderate, auricula muris, citra adstrictionē, pira in cataplasmate imposita moderate frigefaciūt, balauitium, rubi folia & germina & fructus uiridis ac flos ipse. Avena moderate, muscus marinus, glaucum moderate, dorycnion ualde frigefacit, harundinis sepiariae folia moderate, cicuta summè, lichen in petris nascens, papauer omne, mali fructus, oleæ fructus & folia, oleum myrteum, sesaminum, balaniū, helxine siue perdicias moderate, panicum, uiole folia & succus, mali perfici & citrij caro, fungi multum frigefaciunt, item omphacij succus, amyliū moderate, rosaceum mediocriter, sordes ex palæstra, cicerbita non sicca, tribulus uterque, ramorum palmæ succus. Samia terra moderate, cimolia terra, naxiæ cotis detritum siue retrimētum, plumbago mediocriter,



diocriter, plumbum, cerussa, sandyx, caseus mollis recens coactus moderate perfrigerat.

*Que frigefaciunt primo ordine.* Cap. CCIII.

Acacia illota, atriplex citra adstrictionem, uinacea, milium, ordeum, platanus, rhamnus, seris.

*Que frigefaciunt secundo ordine.* Cap. CCV.

Acacia lota, plantago, blitum, galla, omphacitis, cucurbita, cucumis, pepo, solanum hortense, lens palustris, alga uiridis, circa praeputia maris littora collecta, psylli semen.

*Frigefactoria tertij ordinis.* Cap. CCVI.

Semperuium utrunque, portulaca, mandragoras, citri pars acida, polygonum, potamogeton, hyoscyamus qui & florem & semen album habet.

*Frigefactoria quarti ordinis.* Cap. CCVII.

Succus papaueris, cicuta.

*Que siccant citra mordacitatem.* Cap. CCVIII.

Urticae semen & folia, amurca, anagallis utraque, auena, plantago, oleum dulce insulsum lotum, fermentum attrahit ex alto ac discutit. Lupinus amarus, hippuris fortiter, isatis, salicis flos & folia cum quadam adstrictione. Quidam & succum ex ipsis faciunt, & phar macum habent citra mordacitatem siccans ad multa commodum. Verum multo amplioris usus est phar macum siccans & adstringens, nucis cortex ustus, si mulque tenuium partium existit, miliu, centauriu tenue fortiter siccatur, cerasi gummi, liliu, faba, forinsecus imposita, cupressi folia ac reliquae partes, cyperi radix, nucis pineae nucleus aqua macerati, nymphaeae radix, sirau siue sapa, quinquifolij radix, polypodiu, myrrha, sarcocolla, stoebe, tragacantha, terra omnis, cadmia, asiae petrae flos humore flaccidas carnes consumit, pompholyx saepe usta, calx strennuè, oui candidum ac tenue, eadem uis & uitellorum est.

*Que simpliciter siccant.* Cap. CCIX.

Vitidis folia & semen, graminis radix moderate, adia thum, semperuium utrunque, amarantum fluxiones sistit potum, bryoniae radix, anagyri folia sicca, pira in cataplasmate imposita moderate, aristolochia, asparagus myacathinus, asphodeli radix, & magis cinis, balauustum ualde, ruborum fructus immaturus, quercus partes omnes, phagi similiter, bulbus in cataplasmate, eryngium, isatis, salicis corticis cinis ue hementer, cannabis semen, paeoniae radix, lauri folia uehementer, & magis baccae, oleum cyprinum, laurinum, panicum in cataplasmate impositum, nasturtiu, caucalis, pastinaca syluestris siue daucus, lixiuium, praesertim ex cinere ficulneo, brassica, caules autem eiusdem cinerem fortiter siccantem faciunt, crethmu, illi folia & radix, omphacium, platani cortex & pilulae moderate, polypodium, amyllum, sal, nitrum, gypsum praecipue ustum, cadmia omnis, omnia metallica & lapidea ac terrea, testa clibanorum, coagulum omne, stercus, anserum tamè & accipitrum inutile est propter multam acrimoniam, sordes, siue strigmenta, carnes uiperarum, capita menularum sal sarum, cornu cerui ac caprae, castorium, ossa usta fortiter, capilliusti, sepiae testa, lanæ usta, cancrorum cinis, garum abunde, muria.

*Que primo ordine siccant.* Cap. CCX.

Chamaemelum, iuniperi baccae, caroum, ordeum, polenta, crocus, thus, foeniculum, rhododaphne, uinum nouum, cucumeris & peponis semen, & radix sicca, foenum graecum.

*Que secundo ordine siccant.*

Cap. CCXI.

Lolium, amaracus, bitumen, anethum, balsamum, uinacea, gingidium, elaphoboscum, calamus aromaticus, thuris cortex, & folia arboris, itemque semine, meum, mastiche, mel, spica nardi, nardus celtica, uinum, eruum, opopanax, pix, rhamnus, raphanus, scandix, cardui radix, myrrha, lentiscus, terebinthi fructus & folia, lentes, alga humida & uiridis, malabathri folium, galbanum.

*Que tertio ordine siccant.*

Cap. CCXII.

Abrotonum praesertim ustum, acacia, acorus, aloë, amomum, anethum ustum, anisi semine, iuniperus, asarum, absinthium, herba sabina, ueratrum, epithymum, thymbra, calamintha, harundinis sepiariae cortex ustus, caroum, casia, cedrus, conyza, thuris fuligo, nigella, citri semen, uinum satis uetustum, acetum, origanum, quinquifolij radix, petroselinum, smyrnium, ruta hortensis, marrubium, rhus, sampsuchus, seriphium, hyssopus, chamaedrys, chamaeleontis utriusque radix, chamaepitys.

*Que quarto ordine siccant.*

Cap. CCXIII.

Ampeloprason, oleum cedrinum, sinapi, ruta syluestris, allium.

*Que media sunt inter siccantia & humectantia.*

Cap. CCXIII.

Graminis radices in cataplasmate impositae, oleum dulcissimum.

*Que primo ordine humectent.*

Cap. CCXV.

Auricula muris, buglossum, succus glycyrrhizae, lactuca moderate, uiolae folia moderate, mali persice fructus, fungi, rosaceum, satyrium, stratiotes fluuiatilis.

*Que secundo ordine humectent.*

Cap. CCXVI.

Portulaca, atriplex, blitum, cucurbita, mali armeniacae fructus, cucumis, pepo, lens palustris.

*Que aquosam frigiditatem habent.*

Cap. CCXVII.

Acacia, auricula muris, portulaca, plantago, atriplex, rubi folia, blitum, muscus marinus, glaucium, dorycnium, uiscum, salix, cucurbita, cotyledon, cicuta, picea arbor, malua satiu, papauer, mala praecocia, fungi, platanus, polygonum, potamogeton, sideritis, cucumis cibarius, holoschoenus, cicerbita, tribulus, lenticula palustris, psylli semen, plumbum.

*Que tenuium partium sint.*

Cap. CCXVIII.

Abrotonum ustum, uitex, scandix, populi nigrae flores et folia, urticae semen & folia, amomum, acorus, asari radix, bryoniae radix, chamaemelon, aparine, aristolochia, plantago sicca, asphodeli radix, praesertim usta, balsamum, herba sabina, sinapi, rubi radix, glycyrrhizae radix, oleum uetus, oleum cicinum, elaphoboscum, euphorbium, fermentum, salicis succus, calamintha, calamus aromaticus, harundinis sepiariae cortex ustus, casia, carpelion, milium, oleum cedrinum, pruni gummi, mastiche, nigella, succus cyrenaicus, opobalsamum, ruta, pistacii fructus, propolis, terebinthus, rosaceum oleum, sagapenum, sampsuchus, seselis, cucumeris semen, ficus aridae moderate, flos iunci odorati, cinis, calx, salis flos, hyssopus, sal, alcyonium milesium, nitrum, auripigmentum ustum, gypsum ustum, sulphur, cadmia, pumex ustus, lixiuium, asiae petrae flos, melanteria, misy, aes ustum, chrysocolla, sandix, fucus, adeps leonis ac pardi, itemque hyaenae ualde, castorium, sepiae testa usta, lanæ usta.

*Que crassarum partium sint.*

Cap. CCXIX.

Plantaginis radix, balauustum, uinacea, zingiber, cucumis, f cepe,



cepe, squamæ omnes, fori, alumen.

*Corroborantia.*

Cap. cccxx.

Cassia, galla omphacitis, storchas, palmæ fructus, absinthium, mastiche.

*Concoctoria.*

Cap. cccxxi.

Amomum, uua passa, cera, ladanum, glutinum librarium, crocus, thus, pix, mastiche Aegyptia, rosaceum oleum, myrrha, styrax, galbanum, alica, adeps suillus & uitulinus, butyrum, œsypus.

*Suppuratoria.*

Cap. cccxxii.

Aquæ temperatæ affusæ fomentum, aqua & oleum temperata, farina triticea, panis, alica, adeps porcinus & uitulinus, butyrum, thus, pix, resina.

*Mollientia.*

Cap. cccxxiii.

Quæcunque calfaciunt non tamen uehementer, simulque non uehementer siccant: sunt autem talia, seuum caprinum, adeps gallinaceus, & porcinus, seuum taurinum & hircinum, medulla ceruina, uitulina, ammoniacum thymiana, styrax, galbanum, bdellium, oleum sicyonium, oleum liliorum, oleum dulcissimum, chamæmelum. althææ radix, cucumeris syluestris radix, maluæ syluestris folia, mastiche chia, & Aegyptia, terebinthina, resina colophonina, opopanax, sordes statuarum in gymnasijs, sordes palestrarum, butyrum, œsypus.

*Quæ indurant.*

Cap. cccxxiiii.

Semperuiuum, portulaca, psyllium, lens palustris, solanum. Indurantur autem corpora & partes aut ob siccitatem, aut ob plenitudinem, aut ob congelationem. Si quidem igitur ob siccitatem pars dura fiat, humectare omni modo ipsam oportet. Si uero ob plenitudinem, euacuare eam ipsam oportet. Si uero ob congelationem fuerit indurata, congelationem moderate calfacientibus dissolvere oportet. Nam congelatio ex frigore est, quæ autem uehementer calfaciunt, magis congelant.

*Exterforia.*

Cap. cccxxv.

Stercus caprinum ustum & non ustum, omnes testæ, testæ intersectorum, sepiæ testæ, herinacæ terrestres ac marini cinis, serum lactis, bryoniæ radix, mel, amygdala dulcia elui apta, & ipsorum arbor, anagallis utraq, anemonæ omnes, plantaginis folia, maxime arida, aristolochia, aron, asparagus myacathinus, staphis agrestis, asphodeli radix, atriplicis semine, absinthij succus, bulbus impositus, ueratrū utrumque, helxine, siue perdicias, salicis semine, calami sepiarij radix trita moderate, fabæ caro, lapsana in cataplasmate imposita, lichen petrarum, leucon partes omnes, platani radicis cortex, marrubium, meum, propolis moderate, ulmi folia, & cortex ac radix, prissana, terebinthina amplius quam mastiche, sagapenum moderate, cucumeres, peponis partes omnes, cucumeris syluestris radix, beta, tithymallus, phu, chamæpitys, alcyonia omnia, terra chia & samia moderate, smiris abunde, cornu cerui, & capræ ustum, & quæcunque inueneris nitrosa & amara, ea omnia meatu expurgare possunt. Quæ uero tenuium partium sunt dulcia, extergent moderate ulcerum sordes, & totius cuticulæ, uelut sunt fabæ, eruum, ordeum, lupinus, & similia.

*Quæ uasorum oscula aperiant.*

Cap. cccxxvi.

Quæ oscula uasorum aperiant, calida sunt non ualde, & crassarum partium: quæ enim uehementer calfaciunt, urunt & crustam inducunt, anemonæ omnes, cepa, allium, fel taurinum, irini & amaracini olei siue unguenti sex.

*Rarefacientia cutem.*

Cap. cccxxvii.

Rarefactoria sunt quæ moderate & citra molestiam calfaciunt, nequaquam uero siccant. Chamæmelon, althæa, cucumeris syluestris radix, costus, libanotides, nitrum, abrotonum, oleum uetus.

*Densantia cutem.*

Cap. cccxxviii.

Aqua frigida, semperuiuum, portulaca, tribulus uiridis, psyllium, lenticula palustris, mandragoræ mala, & summatis omnia quæ frigefaciunt non siccantia.

*Corrodentia.*

Cap. cccxxix.

Auripigmentum, sandaracha, chrysocollo, cantharides, erucæ pinus, cedria, ueratrū nigrum.

*Reprimantia eminentias.*

Cap. cccxxx.

Elaterium, cucumeris syluestris radix, ochra, mandragoras, asiae petrae flos, ostreorum testæ, herinaceus uterque uetus una cum testis suis, hematites lapis siccus tritus et ad puluillum redactus, faba, squama æris, chrysocollo.

*Cicatricem inducentia.*

Cap. cccxxxi.

Quæcunque adstringunt & siccant, alumen, galla omphacitis, æs ustum, praesertim lotum, mali corium aridum, recrementum plumbi, spuma argenti, helcysma, id est, argenti recrementum, plumbum ustum, testæ, intersectorum omnium testæ, uitrum, pumex praesertim uustus, & uino extinctus, specularis lapis uustus, cerussa, pompholyx, spodium lotum, chrysocollo, stibiū ustum, diphryges, sarcocollo, omnia praedicta si ulceribus insperleris, ipsa cicatrice includes. Verum cum mordacitate cicatricem inducit atramentum sutorium ustum, cadmia, squama æris ac ferri, praesertim stomomatis, ærugo, calx usta & lota.

*Exulcerantia in superficie.*

Cap. cccxxxii.

Rubi canini folia, betæ radix, allium, pulegium, hyssopus, origanum, sepiæ testæ, asphodeli radix, semen lini, & falsa, & acria, & amara.

*Vistoria.*

Cap. cccxxxiii.

Cantharis, diphryges, sex aceti usta, anemona puniceum florem habens, allium, cinis, praesertim ficulnus, nitrum assatum, æs ustum, alumen, buccinorum testæ ustæ, menularum capita, auripigmentum, staphis agrestis, granum cnidium, sinapi, pyrethrum, calx non extincta urit, extincta crustam inducit.

*Attractoria.*

Cap. cccxxxiiii.

Anemonæ omnes, anagallis utraque, dictamnus, ciccer, thapsia, cyclaminos, narcissi radix, propolis fortiter, fermentum, stercus omne, sagapenum, succus cyrenaeus & medicus, silphij succus & radix, spariti quo aucupes utuntur, & semen, & uirgarum succus generose, terebinthina magis quam alia resina, sulphur, stercus bubulum, praesertim si eruo boves pascantur, calaminthe in cataplasmate imposita, costus contritus cum oleo, fortiter autem attrahit uiscum.

*Discussoria.*

Cap. cccxxxv.

Abrotonum, agaricum, adiantum, ægilops, urticae semen & folia, sambucus, ebulus, chamæmelon, anisi semen, aristolochiae radix, asphodeli radix praesertim usta, atriplex, bulbus, herba sabina, muscus qui splanchnon & hypnon Graecis appellatur, daucus, althæa, oleum dulce, oleum uetus, oleum raphaninum & cicinum, & thapsia, calami sepiarij cortex uustus abunde discutit, brassicae folia, lilij folia & radix, ladanum, mercurialis, malua syluestris, mel, mali plicis folia, & germina, rhododaphnae, grossi ficus, ficus syluestris, mastiche



maſtiche chia, opobalfamum, ſuccus cyrenaicus uehementiſſimè, paliuri folia & radix, ruta, pix, marubium, terebinthina, roſaceum oleū moderatè, ſordes à ſtatuis, ſordes palæſtrarū, quæ patos Græcis dicitur, ſampſuchum, cucumeris ſylueſtris radix, myrrha, caricæ acriores amplius quàm groſſi, beta citra calfactionem, fortior eſt autem alba, galbanum, ſal præſertim uſtus, ſalis flos, nitrum, halcyonia omnia, terra ſamia, hyoſcyamus, caſeus tener ex acido lacte moderatè, butyrum, coagulum omne, ſtercus omne ualde, œſopus moderatè, carnes uiſperarum fortiter, adeps præſertim leoninus, oſſa uſta eorundem leonum, & omnium aliorum cinis.

*Adſtringentia.*

Cap. cccxxvi.

Oleaſter, piraſter, lentilcus, apiū, ſemperuium, papaſuer, cytiſus, aloë, urtica, uinacea, pira, crocus, alihea, terebinthus glans, hyoſcyamus, hederæ, nymphæa, palmæ, oui uitellus aſſatus, paliurus, hippuris, ſanguis concretus, liguſtrū, œnanthe, braſſica bis cocta, coagulū leporinū, ſpōgia uſta, rhamnus, ſunt & multa alia adſtringentia, quæ omnibus nota exiſtunt.

*Quæ ſemen generant ac prouocant in cibis ac medicamentis, & cibis medicamentarijs.*

Cap. cccxxvii.

Ex edulijs omnia quæ amplius nutriūt & inflant, item medicamenta omnia flatuofa & calida. Itaque bulbi & cicer, & nuceſ pineæ, fabæq; ac ficus, edulia ſunt multum ſemen generantia. Scincus autem, & ſatyriſon, ac ſimilia, medicamenta ſunt. Edulia autē ſimulq; medicamenta ſunt, lini ſemen, eruca, & hominum.

*Quæ ſemen inſubeant.*

Cap. cccxxviii.

Semen inſubeant omnia quæ frigefaciunt edulia ac medicamenta, itemq; quæ craſſefaciunt & condensant, uelut lactuca, cucurbitæ, blitum, atriplex, cucurbita, mora, melopepones. Quæ uero ſiccant, ne ab initio quidem generari ſemen permittunt, etiā ſi calfactoſiam naturam habeant, uelut eſt ruta. Si uero calida non fuerint, multo magis ſiccant, & ſemen generari non ſinunt, uelut nymphææ radix.

*De alimentorum uiribus.*

Cap. cccxxix.

Sanitatis ſtudioſum ſi quid aliud, alimentorum uires noſſe oportet, itaque ea quæ attenuatoriā uim habent, anguſtos tranſitus obturatione liberant, & uiſcoſa infarta expurgant, ac craſſa ſecant. Verum qui in ipſorum eſu perſeuerant, ſeroſas & bilioſas ſuperfluitates congregant, & ſi quis adhuc amplius perſeueret, atrabiliarium ſanguinem reddet. Quare ab aſſiduo ipſorum uſu abſtinere oportet, præſertim eorum quæ temperamentum bilioſum habent. Solis enim hiſ qui pituitam & crudum humorem uiſcoſumq; ac craſſum coaceruarunt, talia conueniunt. At uero craſſefaciente ui prædita, multum alunt, & ſi in uentre ac iecore probè concoquātur, ſanguinem boni ſucci generant, lienem autē & iecur obturant. Ex hiſ uero quædam craſſi tantum ſucci ſunt, uelut lentacula. Quædam uero uiſcoſi, ut malua, quædā craſſum ſimulq; uiſcoſum ſuccum poſſident, uelut eſt caro teſta inteſtorum. Securior itaque eſt diæta & uictus attenuatorius ad ſanitatis conſeruatiōem, præ craſſefaciente, uerum quum modicè alat, firmitatem non addit corporibus neque robur, & oportet aliquando etiam multum nutriētia moderatè aſſumere, ubi firmitatem acquirere uoles. Cæterum citra

periculum craſſa diæta uti poſſunt, qui exercitijs dediti ſunt, & qui dormiunt, quantū uolunt. Omnes autem qui ante ciborum acceptionem exerceri non poſſunt, alimenta craſſi ſucci uidentur. maximum enim ad ſanitatis cōſeruatiōem malum, perpetuum oclū exiſtit, quemadmodū contrā moderatus motus maximum bonum. Omnium porro eduliorum optima ſunt, quæ inter attenuantia ac craſſefacientia medium locum obtinēt, & ſanguinem ſubſtantia ac cōpage moderatum generant. Itaque tale alimentum corporibus noſtris cōueniens eſt, nociuū uero craſſi ſucci, & propterea ſemper fugiendum. Quin & alimentorum uarietatem fugere oportet, præſertim ſi ex contrarijs uiribus ac facultatibus conſtiterint, itaque enim aſſumpta probè concoquuntur.

*Attenuatoria alimenta.*

Cap. cccxl.

Allium, cepe, naſturtium, porrū, ſinapi, piper, ſmyrnium, pyrethrum, origanum, calamintha, hyſſopus, ſiſymbrium, pulegium, thymus, ſatureia uiridis accepta, ſicca enim medicamentum eſt. Ab hiſ proxima ſunt eruca, ſion, apiū, petroſelinum, ocymum, raphanus, braſſica, beta, fœniculum, coriandrum, ruta, anethum, liguſticum, cuminum, capparitis & terebinthi fructus, carui ſemen, aniſi, dauci, & omnium odoratorum & acrium ac palam calidorum ſemina, uerum fortiter attenuat rutæ ſemen, ac cannabis, ut medicamēta de cætero exiſtant. Ex cerealibus ſeminibus attenuanti diæta ſolum ordeum conuenit, deinde panes clibano cocti triticej, à reliquis abſtinendum, præterquam ſi quis per longius interuallum piſum, aut lentem guſtare uelit; plurimum autem eduliorum uſum pro attenuantis uictus ratione ſupeditant piſces petroſi & montanæ uolucres paruæ, in uniuerſum enim omnia exercitata meliora ſunt inexercitatis, & ſicciorē uictu uentia, & purum ac tenuem aërem inſpirantia, & ex piſcibus qui mollem ſimulq; friabilem carnem habent reliquis præſtant. Nam qui duram aut uiſcoſam habent, ab hiſ penitus abſtinendum eſt. Habes autem notas carnis omnis animalis, friabilitatem ac molliciem, & quibus ſanè utraque affuerit, ad ſatietatem edere licet; quibus altera tantum, edere quidem expedierit aliquando, ſed uitanda ſatietas eſt. Neque gallinas prohibeo ſi quis exercitio utatur, neque columbas, neque turtures, maximè ſi in agro degant, ac montanis locis. Oportet autem non recens maſtatas, ſed unam minimum diem ſeruatas à maſtatione edere, non ſolum turtures & gallinas, ſed etiam perdices, & omnia quæ moderatè duram carnem habent. Sed & falſi piſces abundè attenuant, & craſſos ac uiſcoſos humores ſecant, eligendi ſunt autem & ex hiſ qui mollem carnem habent. Nam ceracei generis uitandi ſunt. Præſtat & plurima edulia aceto & aceto mulſo præparata accipere, & ſale prius condire quantum eiſ fieri poteſt. Neque læſionem incurret, qui fructus pomorum alium mollientes acceperit. Verum tarde tranſeuntes deteriores ſunt, & magis ſi duri fuerint. Quare ex hiſ ne guſtare quidem oportet, præter eos qui reſpoſitioni apti ſunt, uelut pira & mala, & uuarum nō pauca genera: molliores autem magis edere expedierit, qui uero ualde aſteri & acerbi ſunt, ad hanc diætā inepti exiſtunt. Omnium maximè autem aptæ ſunt caricæ, & nuceſ, & piſtacia, & amygdalæ ſubamaræ. Cæterum oliuas neque laudo, neque

f. 2 ultupero.

olius



ut cupero. Verum ex dulcibus non solum edulis, sed etiam potionibus, mel ferè solū exacte tenuem succum generat: Vina quoque tenuia & alba crassos humores secant, & per urinas expurgant. Vtilissimum uero ad extenuantem uictum est acetum mulsum.

*Crassi succi alimenta.*

Cap. CCXLI.

Panes furnacei, & siliginei, & nō probè præparati, placenta ex musto & similagine, itemque liba, & omnis placenta non fermentata ex tritico, & quęcunque eius generis inde parantur. Sunt etiam similago, ac alica, satis crassi succi, amyllum uero moderate. Sunt & dolichi crassi succi, & lupini, & interna lentis caro, nam cortex exterforiū quid possidet, itemque fabæ frictæ, & pisces molles appellati, loligines, sepia, polypodes, & cetacei generis, ex quo sunt & thunni, moderatiores autem ipsis sunt pelamides. Multum crassi succi sunt ostrea, & buccina, purpuræque ac chamae, patellæ, pectines, pinnæ, & omnia testa intacta, anguilla itē ac cochleæ, bubulæ carnes, caprinæ, ceruinæ, leporinæ, suillū hepar, renes, testes, moderate lacte coctum, casei omnes, uerū recentes & ex acido lacte minus, oxygala, protogala quod & pyriepton uocatur, oua ad perfectam concretionem cocta & magis adhuc assata, atque amplius etiamnum fricta in sartagine, palmæ, castaneæ, bulbi, rapa, fungi, tubera, nuces pineæ, conii ac strobili appellati, ficus non probè maturæ, citri caro, cucumeres præsertim uberius ingesti, mala nondum matura, uina dulcia quoque sanguinem crassum generant, & his amplius sapa, & uinum nouum, uinaque crassa ac nigra.

*Media inter attenuatoria & crasse scientia.*

Cap. CCXLII.

Panes optime præparati, carnes gallinarum, phasianorum, perdicum, columbarum, attagenarum, & paruarum auicularum omnium, optima edulia sunt. Insuper piscium petras ac littora & altum pelagus incolentium, gobiolorum, murenarum, buglossorum, & omnium consimilium, qui neque uiscositatem neque graueolentiā in cibo repræsentant. Item ficus, pepones, & ex syluestribus oleribus seris, id quod cōmune pluribus genus existit, singulorum autē speciales appellationes sunt apud Atticos, uelut lactuca, chondrile, gingidium, & alia infinita syluestria olera quę seridis nomine ueniūt. Eius generis est & asparagus palustris, itemque myacanthinus, & chamædaphnes, ac bryonia. Vinum itē fuluum simulque dulce ac pelucidum, quale est aruisium, & lesbium, & dulce fallernum, ac molites. Hæc enim bonum & moderate crassum sanguinem generant.

*Que uiscosum sanguinem generant.*

Cap. CCXLIII.

Triticum graue, densum, & in alto flauum, uiscosum succum generat: leue autem & rarum & intrinsecus album, minus uiscosum humorem generat. Est & similago itemque halica satis uiscosa. Item redines, præsertim in musculorum extremitatibus, aponeuroses Græcis appellati, & partes circa labra, & lingua, suilla quoque caro, & agnina, sesami item semen, & palmulæ pinguiore.

*Que crudum humorem generant.*

Cap. CCXLIII.

Palmulæ uirides uescentes crudis humoribus implent, & rapa, & testa intactorum caro, si diutius cocta salsum humorem deposuerit, & pisces molles appellati, uelut sepia, polypi, & alia huius generis: item cetaceum genus in mari, quapropter antea salsa hæc in

usum cibi ueniunt. Talia sunt & intestina, & uetres, & uulua quadrupedum, & acidum lac, lupini, uua in uentre retenta.

*Que frigidum humorem generant.*

Cap. CCXLIV.

Qui se cucumeribus ualde explēt, frigidum humorem coaceruat. Insuper & qui uentres ac intestina & uulua quadrupedum animalium ingerunt, & lac acidum, & mala nondum matura.

*Que atrabiliarium succū generant.*

Cap. CCXLVI.

Carnes bubulæ, caprinæ, & magis taurorum ac hircorum, & adhuc amplius ouium ac leporum, ac suum syluestrium, carnes item salse quadrupedum animalium. Ex marinis piscibus thunni, balænæ, & omnia cetacei generis, cochleæ, brassicæ, arborum germina, muria, & acida muria condita, uelut lentisci & terebinthi. Item cinaræ caro, & lens edulium est maxime atram bilem gignens, & post hanc furfuracei panes, & qui ex cypha ac alijs uitiolis seminibus fiunt, & casei antiqui, & uina crassa ac nigra.

*Que biliosum humorem generant.*

Cap. CCXLVII.

Siliquæ, itē cinaræ succus amaram bilē gignit, præstat itaque ipsam feruescentiā in cibo sumere. Mel quoque facile in bilē transit. Omnes quoque dulcis saporis succi, materiam flauæ bili præbent, itemque dulcia uina.

*Que superfluitatibus redundant.*

Cap. CCXLVIII.

Palumbes, anseres, pisces, exceptis petrosi, uiscera omnia, medulla, spinæ dorsæ, cerebrum, auiculæ palustres & stagnorum, cicer, fabæ uirides, faba Aegyptia, porcelli recens nati, ouilla caro, & omnium iuniorum animalium, & ociose uiuentium, pisces fluuiatiles & palustres, & qui in limosa aqua degunt, item omnia cetacei generis in mari.

*Que superfluitatibus careant.*

Cap. CCXLIX.

Colla animalium, caudæ, alæ, syluestrium animalium caro, & eorum quæ siccis locis degunt.

*Multum nutriunt.*

Cap. CCL.

Suum domesticorum carnes ex omnibus edulis optime alunt, cerebrum bubulum, testes, cor, medulla spinalis, itemque reliquæ, anserum alæ, & magis gallinarum, omnium uolucrum uentres, cochleæ præsertim ter coctæ. Ex testa intactis quæ duras carnes habent, uelut purpuræ, buccina, & similia, gammari, paguri, cancri, locustæ, squillæ, & consimilia. Item molles appellati pisces, uelut polypi, sepia, loligines, & consimiles. Ex cartilagineis, torpedo et pastinaca moderate, squatina uero magis, mulli & gobi minus. Lac crassius quidem magis, & liquidius minus. Ex panibus siligineus maxime alit, deinde similagineus: tertio loco est cui furfures non decesserunt, tritici coctum, siligo, alica, fabæ carnis habitum non adstrictum & densum faciunt, sed laxiorem. Cicer magis nutrit, phaselis & ochri magis sœnogræcum, dolichi quos lobos uocant Græci non pisces minus nutriunt, castaneæ, lens, palmulæ dulces, uua passæ dulces, ac pingues, rapa, bulbi maxime alunt & præsertim his cocti. Mel despumatum & ad distributionem & ad nutritionem aptum est, uinū omne nutrit quod crassum est. Rubra itaque & crassa ac adstringentia, magis alunt. minus uero his alba simulque crassa & austera. Omnium minime alba & tenuia, omnia item crassi succi si probè concoquantur, ualde alunt.

*Que parum nutriunt.*

Cap. CCLI.

Extremæ animalium partes, uulua, uenter, intestina, caudæ, aures, pinguedo, adeps, omne uolucrum genus



genus minus alit, terrestrium generi comparatum, caro quoque animalium annosorum minus alit quam augescensium. Piscium esus sanguinem tenuiorem generat. Ex testa inectis quæ mollem carnem habent, uelut ostrea minus alunt, panes ordeacei, polenta ordeacea, panes furfuracei & sordidi omnes ac loti, amyli, masa ex polenta ordeacea, auena, milium, eoque magis panicum, oryza, fabæ uirides, semine papaueris, mora, amygdala, pistacia, pruna, persica, armeniacæ, præcocia, oliuæ maxime drupæ, nuces auellanae, & magis adhuc regiæ, serica, corna, pruna syluestria, mora rubi, capparis & magis sale condita, terebinthi summitates, brassicæ, betæ, raphanus, sinapi, asparagi omnes, pastinaca, daucus, carus, cepa, allium, porrum crudum quidem nullum penitus alimētum præbet, bis uero aut ter coctum paucissimum, punica mala, pira, cucurbitæ, uue passæ austeræ & non pingues. Porro media quodam modo sunt inter parum nutrientia, phaselii, ochri, cicerculæ. ficus autem non similiter ut reliqui fructus parum nutriunt, uerum laxam carnem faciunt. Vuæ uero minus quam ficus laxam & humectam carnem alunt.

*Quæ boni succi sunt.*

Cap. CCLII.

Optimi succi est optimum lac ferè inter omnia quæ in cibo accipimus: optimum autem lac est animalium bonæ habitudinis, statim ubi multum fuerit calidum adhuc potum. Oua tremētia & sorbilia gallinarum ac phasianorum. Volucres & pisces ferme omnes boni succi sunt, exceptis his qui in paludibus ac stagnis & fluminibus limosis ac turbidis degunt. Verum odore & gustu cognobiles fiunt: Nam foetidi & insuaues ac mucosi sunt, propterea quod in uitiosa aqua degunt. Carnes autem quadrupedum animalium si probè concoquantur, optimum sanguinem generant, maxime si bono succo prædita sint, uelut est suillum genus. at uero omnes circa labia partes, aliæque extremitates, & alæ uolucrum, intestinaque & uulua ac caudæ, minus boni succi sunt quam carnes, glandulae autem probè cōcoctæ, similiter ut caro boni succi sunt. Cor non est mali succi, pedes suilli meliores sunt quam rostrum & aures: syluestrium quoque animalium carnes meliorem succum quam domesticorum habent, panis purus probè præparatus boni succi est, alicui item, & pitana probè præparata, fabæ, castaneæ non habent malum succum, ficus maturæ, & uua matura itemque pensilis repræhendendi non merentur. carica statim quidē in corpus digestæ ac distributæ, boni succi sunt: uerum si in uentriculo morētur, mali succi fiunt, & pediculos generant. si uero cum nucibus edantur, bonum edulium existunt. Cæterum si quis ficus & caricas assidue in cibo sumat, non parum lædetur. Lactuca ut olus sanguinem bonum gignit, & ab ea intubi. Vina odorata boni succi sunt, sed omnium optimi succi est salernum dulce & timolites.

*Quæ mali succi sunt.*

Cap. CCLIII.

Ab omnibus mali succi edulis abstinentum censeo, etiam si facile concoquantur. Latenter enim diutiori tempore uictosus humor in uenis ex ipsis congregatur, qui leuissima putrefactionis occasione arrepta, malignas febres gignit. Est autem maxime uictosus succi caro ouilla ac caprina, pessima uero hircina, deinde arietina, postea taurina. In omnibus his præstant castratorum carnes. Seniorum autem animalium pessimæ sunt: Caro leporina crassiorem quidē sanguinem

generat, uerum meliorem ad succi bonitatem quam bubula & ouilla. nihilominus tamen & ipsa mali succi est, itemque ceruina. renes & testes perfectorum animalium mali succi sunt, exceptis gallis. Item cerebrum & medulla spinalis, exceptis gallis. lien, oua in sartagine fricta, casei ueteres, boletii, amanitæ, scenogregum, lens, auena, cicer non est boni succi. olyra uero tanto deterior est tritico, quanto melior est quam titha & auena. panicum, milium, & similia non sunt boni succi. dracones, callionymi, scorpij, trachuri, muli, orphi, glauci, zygænæ, congridi, phagri, & quæcunque alia cetacei generis in mari animalia, omnia mali succi sunt. Item omnes fructus subcanculares mali succi sunt, mala nondum matura, pira prius quam concoquantur, persica, mala punica, mespila, corna, pruna syluestria, siliquæ, & terebinthi fructus, cinara præsertim ubi dura fuerit, cucumeres, pepones, cucurbita his quidem melior est, sed & ipsa in uentre corrupta satis mali succi euadit. ficus et carica minus quam alij subcanculares fructus malum succum habent, uerum his qui in ipsarum esu perseverant, non ualde bonum sanguinem gignunt, unde & pediculorum copia ex ipsis consequitur. Ex oleribus nullum boni succi est. in medio boni ac mali succi sunt lactuca, intubi, malua, blium, atriplex. Radices plantarum olerum generis mali succi sunt quæcunque acres, uelut ceparum, porrorum, alliorum, raphanorum, & dauci. Medio loco sunt raporum & cari appellati radices. Ocymum pessimi succi est. rapum crudum, brassica, bulbi non probè cocti. At uero allium & cepæ ac porrum bis cocta humoris malignitatem deponunt. Cæterum extreme mali succi sunt olera quæ syluestria appellantur. Vina crassa simulque foetida & iniucunda ac austera mali succi sunt, quale est bithynum quod in magnis dolis apponitur, nam quod in paruis affertur, neque boni succi neque mali existit.

*Quæ facilia concoctu sunt.*

Cap. CCLIIII.

Panes bene præparati, pisces petrosi omnes, gobio, torpedo, pastinaca, si uolucrum generi comparata concoctu facilius est, præsertim perdices, attagenæ, columbæ & phasianorum, alæ anserum, magisque gallinarum, & in summa præstant alæ saginatorum & iuniorum, pessimæ autem sunt gracilium & seniorum. iecur anserum sero lactis saginatorum, itemque testes gallorum similiter nutritorum facilius concoquantur. Carnes suillæ cōcoctu idoneæ sunt, in uigore ætatis consistētib; & laborantibus porcorum uigoro forum, reliquis eorum qui adhuc crescunt. Vituli meliores concoctu sunt quam boues perfecti, & hœdi quam capræ. In uniuersum autem omnium adhuc augescensium caro facilius concoctu est quam decrescensium, & animalium in siccis locis degentium facilius concoquitur quam aliorum. Nux regia magis concoquitur quam auellana, bulbi bis cocti melius concoquantur, oua tremētia & sorbilia, lactuca, intubi, malua, cucurbita cocta, si non corrumpatur, uina dulcia facilius quam austera. Facilius autem cōcoctu est quicquid unicuique iucundum est.

*Quæ agrè concoquuntur.*

Cap. CCLV.

Caro caprina, bubula, ceruina, pessimè autem concoquitur hircina, deinde arietina, postea taurina. pessima est & seniorum animalium caro, suæ quæ senes si brosam & siccam, & propterea agrè concoctilem



carnem habent. Venterculus ægrè concoquitur, itē intestina, uulua, cor, iecur, aures, caudæ, renes, cerebrum, medulla spinalis, & perfectorum animalium testes, anseres, exceptis alis, palumborum & sturnorum ac merularum & paruorū uolucrum caro durior est, atq; his magis turturis antiqui, & anatis, ægrius tamē adhuc cōcoquitur, & fibrosior his est pauiōis & otidū caro. uentriculi quoq; uolucrum omnium ægrè concoquuntur, propter substantiæ dūritiam. falsò enim quidā laudant uentrem struthionis cameli ac mergi. Cochleæ item & lac acidū, caseus uetus, recens autē & maximè ex acido lacte melior est, purpurarum caro ac buccinorū, aliorumq; testa intestorū duram carnē habentium. gammari, locustæ, cancri, paguri, squillæ, & omnia huiusmodi. polypi, sepiæ, loligines, & omnia molli cutē prædita, raia, leuiraia, squatina, dracones, cuculi, callionymi, scorpij, trachuri, oua cocta, fricta, triticū coctum, polenta, tīpha, auena, fabæ, dolichi, phaseli, cicercula, cicer, oryza, lupini, panicū, miliū, & quæcunq; huiusmodi lens, sesamum, castaneæ, mala, pira nondū matura, ficus non maturæ, uuæ acidæ & austere, palmulæ omnes, siliquæ, ocymum, rapū crudius, bulbi crudiores, pastinaca, daucus, carus, & omnes olerum radices, ipsaq; olera uniuersa, excepta lactuca & intubis. uina crassa & noua ægrè concoquuntur, uerum multo magis concoctioni resistit aqua.

*Quæ stomacho commodant, cumq; roborant.*

Cap. CCLVI.

Palmulæ austere, mala cydonia, oliuæ muria conditæ, aptiores tamen sunt aceto cōpositæ uuæ passæ austere. uuæ in uinaceis repositæ, nux regia hac parte auelanæ præstat, multoq; magis si cum caricis sumatur. gingidiū scandici simile, est ualde stomacho cōmodum, tum crudū, tum coctum comestum. longiorē autem cocturā non sustinet: cinara, sinapi, raphanus, rapum, nasturtiū, asparagus palustris, chamædaphnes, oxyacanthæ & bryoniæ, bulbus appetentiā cibi excitat, itēq; capparis sale condita, citri pars externa corroboret stomachum medicamenti loco sumpta. Vinum austereum os uentris roborat itemq; uentrem ipsum præsertim calida intemperie affectum.

*Quæ stomacho incommoda sunt.*

Cap. CCLVII.

Beta stomacho incōmoda est, adeo ut & morsum inducat si uberius comedatur, ocymum, rapū crudius, blitum, atriplex, si non cum aceto ac oleo & garo sumatur, fœnumgræcum stomachum subuertit, itemq; sesamum. Lac frigidum habentibus uentrem acelsit, calidum habentibus in nidorem transit. Merito itaq; nocuum est febricitantibus, & si quis amplius cum melle sumat, uomitū ciet. Pepon non probè concoctus, cholericos, id est bilem supernè ac infernè eicientes facere solet. Similiter & melopepon, omne cerebrum stomacho incōmodum est, & nauseosum, uelut etiam ossium medulla. Vinum nigrū & austereum facile acelsit, & uomitum concitat. Item crassum & nouum.

*Flatus expertia.*

Cap. CCLVIII.

Cuminum, ligusticum, uiticis semen, cannabis semen, fabæ frictæ, bulbi diutius atq; iterum cocti & ex oleo cum aceto comesti, mel quod in coctura omnem spumam deposuit, flatus discindunt panes ordeacei. Media porro inter flatus expertia ac flatuosa, sunt pisces, phaseli, ochri, cicercula.

*Flatuosa.*

Cap. CCLIX.

Cicer, lupini, panicum, milium, & huiusmodi, fabæ, lobi siue dolichi, minus tamen fabis, maza ex polenta, succi omnes, præcipuè cyrenaicus, silphij succus ac radix, ficuum flatus modico tempore durat, propterea quod facile aluo subeant. quæ uero exactè maturæ sunt, propemodum nihil offendunt, similiter ut caricæ. palmulæ uirides flatuosæ sunt, rapum crudius, lac facile in uentre inflatur, bulbi crudiores, mel non perfectè coctum. uina dulcia flatum tarde transeuntē generant, item dulcia simulq; austera, mustum itidē, hoc est uinum nouum.

*Quæ extergent, secant, obturatione liberant.*

Cap. CCLX.

Pisana extergit, itemq; fœnogræcū, melopepon, uuæ passæ dulces, fabæ, cicer, magisq; nigrum, capparis satis tenuium partium est, & extergit, & expurgat ac obturatione liberat, maximè ex aceto mulso aut ex oleo & aceto, præ reliquis omnibus cibis comesta: betæ succus extergit, & magis ubi cum sinapi & aceto comedatur. bulbi attenuatoriam uim habet & obturationes aperientem, cepæ, allia & porri attenuant & secant crassos ac uiscosos humores. serum quoq; lactis humorum crassitiem attenuat. ficus extergit, quapropter multa arenosa de renibus expurgant. Caricæ attenuant ac secant & renes expurgant. amygdalæ extergent & attenuant, purgantq; uiscera, & humorum per sputum reiectiones ex pectore ac pulmone expeditiores faciunt. pistacia robori ac sanitati iocineris conducunt, & ad purgationem humorum id obturantium iuxta exitus ipsius, raphanus attenuatoriam uim habet. Mel tenuissimarum partiū est, maximè quod ex calidis ac siccis plantis natum est, quapropter etiā aqua mulsa ad sputorum educationē commodat. Acetum mulsum non penitus uiscosa ac crassa facile educit, & uiscera citra molestiam expurgat. Valde autē commodat his qui crassum humorem in pectore ac pulmone coaceruarunt. Vina tenuia ac uetera cū acrimonia ad idem conferunt. At uero aquosum, hoc est albū & tenuissimū aptum est ad humorū ex pulmone educationē, roborat enim & humores humectiores reddit ac moderatè scindit. Vinum dulce in morbis acutis reficiendis uiribus accommodatum est, uelut in peripneumonia & pleuritide, concoctione morbi iam facta.

*Quæ obturant.*

Cap. CCLXI.

Lac modicum seri habens, & mulium de caseo, nō satis tuti usus est, si quis in eius esu perseveret. Nam lædit renes, qui aliās ad calculorum generationem aptius dinem habent, & iocineris obturationes facit his qui eas pati aliās solēt. Caricæ hepatis ac spleni inflammato nociuæ, uelut etiā ficus. omnia quoq; dulcia splenem ac iecur lædunt. Aqua mulsa incōmoda est his quibus uiscera indurata, aut laxo tumore occupata, aut inflammata in tumorem eleuata sunt. Palmulæ pingues obturant, & præsertim crudæ, omnia item liborum genera, & ex similagine præparata, obturant & splenem augent, & calculos in renibus generant. Similiter & triticea farina cū lacte. Alica quoq; inepta his qui iecur obturationi obnoxium habent, & renes calculo generando aptos. Vinum dulce obturat, & uiscera auget siue inflat.

*Quæ tardi transitus sunt.*

Cap. CCLXII.

Omnia liborum ac placentarum genera ex similagine facta



facta, trāsitus tardi sunt, fabæ frictæ, panes puri, lens cortice detracto, cerebrum, medulla spinalis, iecur, cor, triticum coctum, oua assata, fricta, lupini, phaseli, pisa, sesamum, mala, pira nondum matura, siliquæ, uina dulcia, & magis austerum & nigrum, citra dulcorem. item omne crassum ac nouum. Aqua autem adhuc tardius transit.

*Quæ facile corrumpuntur.* Cap. cclxiii.

Perfica, armeniaca, præcocia, & omnes subcuniculares fructus, qui humidum temperamentum habent, in uentriculo corrumpi solent, ubi non probè & citò aluum subierint. Omnia porrò mali succi, humida autem & lubrica, ac faciliè subire potentia, præ alijs edere oportet. Sic enim & ipsa citò subeunt, & alia deducunt. Si uero postremum accipiantur, etià alia simul corrumpunt.

*Quæ difficulter corrumpuntur.* Cap. cclxiiii. Chamulæ parua, purpuræ, buccina, & quæcunq; testa intecta duram carnem habent, dantur corrupentibus cibum præ humorum uitiatione, ita ut bis aut ter aqua optima coquantur, semper in aliam puram feruentē translata, ubi prior salsa reddita fuerit. Sed & gammari ac paguri cancriq; ac locustæ, & squillæ, & quæcunq; eius generis, carnem habent ægrè corruptilem, similiter ut testa intecta duræ carnis.

*Quæ uentrem subducunt.* Cap. cclxv. Lenticula, brassica, ex marinis testa intecta, & cochleæ composicam naturam habent ex contrarijs facultatibus. Ipsum enim solidū uniuscuiusq; corpus, transitus tardus est, & uentrem sistit, uerū humiditas ad excretionem iritat. Si quis igitur lenticulā aut brassicam, aut aliud quid ex prædictis coquat, deinde decoctū ipsum oleo & garo ac pipere condiat, & postea cui uelit bibendum præbeat, palam conspiciet ex ea portione uentrem subduci. Sed & herinaceorum marinorum ac conchularū omnium, itemq; gallorū ueterum iuscula uentrem subducunt. At uero si brassicam aluū subducere uelimus, cacabo in quo cocta fuerit propè posito statim extractā, in oleum ac garū mittimus. Neq; enim ualde ipsam coquere oportet. Panes fursuracei uentrem subducunt. fœnigræci succus coctus cum melle acceptus, commodus est ad subducendum omnes uitiosos humores in intestinis contentos. sed modicum esse oportet mel quod amiscetur, ne morsum stomacho infligat. Oliuæ salsæ subducunt præ reliquis cibis comestæ. Lac quo liquidius est, eo magis subducit. crassum, minus. Serum uero lactis ualde emollit uentrem. Inijciendum est ad ipsum mellis optimi tantum quantum satis est ad condiendum solummodo, ne stomachus subuertatur, iuxta eandem rationem & salem indere oportet, ne gustus offendatur. Animalium ualde iuuenū carnes facilius aluo secedunt, similiter & charilaginei pisciū generis torpedo & pastinaca moderate secedunt. beta quoq; moderate subit, & recens caseus cū melle, atriplex, cucurbita, pepones, melopepones, ficus, carica, uuæ passæ dulces, præsertim humidæ, mora ante reliquum cibum sumpta, nux adhuc uiridis, ad excretionem cōmoda est. imò etiam sicca, aqua præmacerata, et pruna sicca similiter aqua, aut aqua mulsæ præmacerata edantur. etenim plus mellis habentia uentrem multum molliunt, etiam si quis sola ipsa comedat, sed multò amplius si aquam mulsam insuper sorbeat, uentris subductioni conferent. cæterum

à sumptione talium, uinum dulce bibere oportet, & pauco tempore interiecto prandere. Porro mora, cerasa præcocia, persica et omnia humecta, & aquosissima, & in totum quæcunq; nullam fortem qualitatem gustui aut olfactui offerunt, ea mediæ quodammodo facultatis inter subducendia ac supprimentia aluum existunt. Mel solum non coctum si quis deslingat, probè aluum ducit. aqua mulsæ item parum aut omnino nihil cocta aluum subit. uinum dulce confert ad uentris excretionem. Mustum aluum emollit ac subducit.

*Quæ uentrem supprimunt.* Cap. cclxvi. Palmulæ austeræ, uuæ passæ austeræ, mora rubi, pruna syluestria, poma adstringēdi ui prædita, pira, mala punica, similiter gammari, paguri, cancri, locustæ, squillæ, & quæcunq; alia eiusmodi molli testa intectorum, minus quidem quàm testa intecta uentrem supprimunt. uerum habent etiam hæc ipsa salum in se humorem, quem ubi in aquam deposuerint, uentrem sistunt uelut ostreorum & testa intectorum caro. Lenticula item & brassica bis coctæ uentrem sistunt. & ubi humectam aluum siccare uelimus, quū iam moderate cocta esse uidetur brassica, prima aqua diffusa, aliam calidam statim assumimus, deinde rursus in illa ipsa coquimus, donec flaccida fiat. Oportet autem neq; aërem, neq; aquam frigidam attingere quod bis coquitur. nō enim amplius exacte flaccescit, etiam si diutissime postea coquatur. Cæterum lenticula decorticata fortè adstrictoriā uim perdit, & non similiter siccatur uentris humiditates. Si tamen ipsam bis coquas, prioremq; aquam diffundas, deinde parum salis aut gari addas, & aliquid ex sistentibus uentrē immittas, ita ut gustus non lædatur, iucundissimum simulq; utilissimū pharmacum simulq; edulium efficies. Polenta ex uino austero pota uentrem siccatur, oryza sistit, panicum item & milium, carnes leporinæ, uinum austerum, & nigrum citra dulcedinem, & album ac austerum, & fuluum ac austerum.

*Quæ calfaciunt.* Cap. cclxvii. Triticum coctum, & panes ex illis, tipha, auena, fœno græcum, palmulæ dulces, mala dulcia moderate, sesamum, uuæ dulces, quapropter & sium inducunt, uuæ passæ dulces magis mediocriter, apium, symyrium, eruca, raphanus, rapum, sinapi, nasturtium, pyrethrum, pastinaca, caros, allium, cæpa, porrum, caseus uetus, uinum dulce, moderate calidum est, & propterea sium inducit. Fuluum uero calidius est nigro. flauum calidissimum est extremè, deinde fuluum, deinde rufum, postea dulce, postremo album omnium minimè calfacit. Vinum uetustissimum multum calidum existit.

*Quæ frigefaciunt.* Cap. cclxviii. Ordeum iuxta omnes uendi modos, milium, panicū, tubera, cucurbita cocta, pepones, melopepones, cucumeres, pruna, mora, uuæ austeræ & acidæ, uuæ passæ austere, mala adstringētia, & acida ac teneriora, & pira eiusmodi, et mala punica adstringētia, palmulæ frigidū succum habent, lactuca, intruba mediocrius, portulaca, papaueris semen, aqua, uinū aquosum non manifestè calfacit, ideo etiā febrientibus citra periculum datur. uinū album & austerū minimè ut uinum calfacit. uinum uero album simulq; austerum, & crassum ac nouū sensibilibiter frigefacit. frige-



facit autem & acetum. nam tenuiū partium existit. quapropter nervos amplius quā alia frigefaciētia lēdit. Media porro quodammodo inter calfaciētia ac frigefaciētia sunt, panes lori, amyli, uuae uinosae.

Quae siccant.

Cap. CCLXIX.

Lenticula, brasiica, polenta, uiticis semen, eruū bis coctum & aqua saepius edulcatum, praestat autem album, sed & assatum aut frictum siccius alimentum corpori praebet, item quod simpliciter garum & uinum habet, siccius est non habente, maxima autem est differentia & seminum, & olerum, & plantarum omnium plus aut minus siccantium, iuxta eorū quae ipsis adijciuntur uires.

Quae humectant.

Cap. CCLXX.

Pissana, cucurbita cocta, pepones, melopepones, cucur

bitae, nuces uirides, pruna, mora, sycomora, lactuca, intuba, malua uero & blitū ac atriplex aquosissima olera sunt. fabae uirides humectant, et cicer, aqua calida humectat & calfacit, frigida humectat & frigefacit.

Quae caput ledunt.

Cap. CCLXXI.

Palmulae omnes, eruca, foenum graecum, mora rubi, uinum quoque fuluum capitis dolorem inducit, & mentem tentat magis quā nigrum. Austerum etiam & odoratum caput tentat. aquosum uero neque capitis dolorem inducit, neque nervos lēdit. Vinum autem modicum aquae mixturam ferens, capitis dolorem ex humoribus in uentre ortum sedat, lac non est commodū capiti, nisi quis ualde fortē ipsum habeat. cremor uuarum, quem fecem dicunt, dolorē capitis inducit. item uua ipsa in uinaceis reposita.

AETII TETRABIBLI PRIMAE, SERMONIS  
SECUNDI, FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN

TERTIO SERMONE AETII  
CONTINENTVR.

\*

|                                                           |                                        |               |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| DE frictione preparatiua. Cap. I.                         | Elaterium.                             | cap. XXXVIII. | Absinthatum flauam bilem ducens. cap.  |
| De exercitationibus. cap. II.                             | Granum cnidium.                        | cap. XXXIX.   | LXX.                                   |
| De exercitationum speciebus. cap. III.                    | Agaricum.                              | cap. XL.      | Absinthatū ad pituitosos. cap. LXXI.   |
| De frictionum speciebus. cap. IIII.                       | Cnici semen.                           | cap. XLI.     | Rosatū flauā bilem ducens. cap. LXXII. |
| De uociferatione. cap. V.                                 | Lathyrus.                              | cap. XLII.    | Rosatū pituitam, & serosum ac atrae    |
| De gestatione. cap. VI.                                   | Aristolochiae clematidis semen.        | cap.          | bilis humorē euacuans. ca. LXXIII.     |
| De equitatione. cap. VII.                                 | XLIII.                                 |               | Mellis rosacei purgatorii preparatio.  |
| De re Venerea. cap. VIII.                                 | Mercurialis.                           | cap. XLIII.   | cap. LXXIII.                           |
| De insolatione. cap. IX.                                  | Cucumis syluestris.                    | cap. XLV.     | Aceti purgatorii preparatio. cap.      |
| De uenae sectione. cap. X.                                | Styrax.                                | cap. XLVI.    | LXXV.                                  |
| De euacuationis mensura. cap. XI.                         | Thymus.                                | cap. XLVII.   | Aceti mulsi purgatorii preparatio.     |
| Quales uenae secandae. cap. XII.                          | Cyclaminus.                            | cap. XLVIII.  | cap. LXXVI.                            |
| Quomodo uena secanda est. cap. XIII.                      | Scordium.                              | cap. XLIX.    | Acetum mulsum purgans omnes uitia      |
| De magnitudine sectionis. cap. XIII.                      | Chamaepitys.                           | cap. L.       | tos humores. cap. LXXVII.              |
| De figura sectionis. cap. XV.                             | Bdellium.                              | cap. LI.      | Acetum mulsum quod colicis ac ne       |
| Quod sit oportunitas tēpus. cap. XVI.                     | Aquam ducentia.                        | cap. LII.     | phriticis per sedem infunditur. cap.   |
| De repetita detractioe. cap. XVII.                        | Squama aris.                           | cap. LIII.    | LXXVIII.                               |
| De arteriarum sectione. cap. XVIII.                       | Euphorbium.                            | cap. LIII.    | Acetum mulsum amarū. cap. LXXIX.       |
| Medicamentum sistens sanguinem ar-                        | Chamaelea.                             | cap. LV.      | Posca uentrem molliens. cap. LXXX.     |
| teriarum. cap. XIX.                                       | Sanguinem purgantia.                   | cap. LVI.     | Alia posca ualde clara. cap. LXXXI.    |
| De cucurbitarum usu. cap. XX.                             | Methodus componendi purgantia phar-    | cap. LVII.    | Gari purgatorii preparatio. cap.       |
| De scarificatione. cap. XXI.                              | maca.                                  | cap. LVII.    | LXXXII.                                |
| De sanguisugis. cap. XXII.                                | Vini purgantis bilem preparatio. cap.  |               | Mellis emollientis preparatio. cap.    |
| De purgatione. cap. XXIII.                                | LVIII.                                 |               | LXXXIII.                               |
| Bilem flauam purgantia. cap. XXIII.                       | Vinum pituitam ducens. cap. LIX.       |               | Garum aquosum. cap. LXXXIII.           |
| Scammonia. cap. XXV.                                      | Vinū melancholicis comodum. cap. LX.   |               | Garum uinosum purgatorium. cap.        |
| Peplium. cap. XXVI.                                       | Vinum polypodites. cap. LXI.           |               | LXXXV.                                 |
| Veratrum nigrum. cap. XXVII.                              | Vinū mulsum stercus exigēs. ca. LXII.  |               | Garum acetosum purgatorium. cap.       |
| Bilem atram purgantia. cap. XXVIII.                       | Vinum mulsum flauam bilem ducens.      |               | LXXXVI.                                |
| Epithymum. cap. XXIX.                                     | cap. LXIII.                            |               | Iuscula emollientia. cap. LXXXVII.     |
| Polypodium. cap. XXX.                                     | Vinum mulsum pituitam ducens. cap.     |               | Lac purgatorium. cap. LXXXVIII.        |
| Pulegium, tragoriganum, leucanthemon, alysson. cap. XXXI. | LXIII.                                 |               | Oliue purgatorie. cap. LXXXIX.         |
| Armenium. cap. XXXII.                                     | cap. LXV.                              |               | Oxyporia purgatoria. cap. XC.          |
| Centauryum minus. cap. XXXIII.                            | Conditum ad flauam bilem. cap. LXVI.   |               | Oxyporium ex palmulis. cap. XCI.       |
| Pituitam ducentia. cap. XXXIII.                           | Conditum pituitosis. cap. LXVII.       |               | Purgatorium ex cotoneis malis. cap.    |
| Colocynthis. cap. XXXV.                                   | Conditum melancholicis. ca. LXVIII.    |               | XCII.                                  |
| Tithymalus. cap. XXXVI.                                   | Absinthati preparatio flatus & sterco- |               | Purgatorium ex citrio. cap. XCIII.     |
| Isum. cap. XXXVII.                                        | cora euacuans. cap. LXIX.              |               | Purgatorium ex feniculo. ca. XCIII.    |
|                                                           |                                        |               | Aliud ualde stomacho gratū. ca. XCV.   |

Purgato



Purgatorium ex foeniculo quod parari solet ad atram bilem. cap. XCVI.  
 Purgatorium atræ bilis. cap. XCVII.  
 Aliud purgans atram ac flauam bilem cap. XCVIII.  
 Pastillus flauam bilem purgans. cap. XCLX.  
 Buccella purgatoria. cap. C.  
 Aloëdaria citra modestiam purgantia. cap. CI.  
 Pharmacum pituitam ducens. cap. CII.  
 Purgatorium atræ bilis. cap. CIII.  
 Bilis & pituita, & atræ bilis ac reliquorum humorum commune purgatorium. cap. CIIII.  
 Aloëdaria emollientia ex rosaceo mele. cap. CV.  
 Aloëdarium ex Philagrion. cap. CVI.  
 Aloëdarium Oribasij. cap. CVII.  
 Sal purgatorium. cap. CVIII.  
 Purgatorium pituitam ducens. cap. CIX.  
 Purgatorium aquam ducens. cap. CX.  
 De hieris. cap. CXI.  
 Purgatorium citra molestiam purgans. cap. CXII.  
 Hiera Galeni. cap. CXIII.  
 Hiera Archigenis. cap. CXIIII.  
 Hiera Rufi. cap. CXV.  
 Hiera Iusti. cap. CXVI.  
 Quomodo auxiliari oportet his qui pharmacum biberunt, & non purgantur. cap. CXVII.  
 Cura excessus purgationis. cap. CXVIII.  
 De uomitu. cap. CXIX.  
 Preparatio raphanorum cum ueratro albo. cap. CXX.  
 Quibus dandum sit ueratrū. cap. CXXI.  
 Quid ueratrū facere possit. cap. CXXII.  
 Quod multi accepto ueratro nihil quidem uomuerunt, nihil tamen minus quam purgati utilitatem perceperunt. cap. CXXIII.  
 Qui sint apti ad ueratrū. cap. CXXIIII.  
 Tempora uniuersalia ac particularia ad sumendum ueratrū apta. cap. CXXV.

Veratri probati nota. cap. CXXVI.  
 Victus ratio ueratro purgandorum. cap. CXXVII.  
 Differentia exhibitionis ueratri. cap. CXXVIII.  
 De cremore ueratri. cap. CXXIX.  
 De ueratri decocto. cap. CXXX.  
 Deramentis ueratri, item de contuso ac cribrato. cap. CXXXI.  
 Quæ preparare oportet exhibitionis tempore. cap. CXXXII.  
 Quomodo post potum curandi sint. cap. CXXXIII.  
 De purgationis excessu. cap. CXXXIIII.  
 Epithemata purgatoria. cap. CXXXV.  
 Compositio olei siue ungenti purgatorii. cap. CXXXVI.  
 De localibus euacuationibus. cap. CXXXVII.  
 Quæ oculos purgant & lacrymas prouocant. cap. CXXXVIII.  
 Quæ aures purgant. cap. CXXXIX.  
 Quæ per nares purgant. cap. CXL.  
 Quæ humiditatem ex ore trahunt. cap. CXLI.  
 Quæ lac generant ac mouent. cap. CXLII.  
 Pulmonem ac pectus purgantia. cap. CXLIII.  
 De suffitionibus. cap. CXLIIII.  
 Quæ tenuia intestina euacuant. cap. CXLV.  
 Quæ sima hepatis purgant. cap. CXLVI.  
 Quæ gibba hepatis purgant. cap. CXLVII.  
 Splenem euacuantia. cap. CXLVIII.  
 Rhenes purgantia. cap. CXLIX.  
 Vesicam purgantia. cap. CL.  
 Quæ glandi induntur ad urinas prolestandas. cap. CLI.  
 Lapides in renibus ac uesica euacuantia. cap. CLII.  
 Vterum euacuantia. cap. CLIII.  
 Quæ in potu sumpta menses ducunt.

cap. CLIIII.  
 Quæ stercora euacuant. cap. CLV.  
 Lumbricos educentia. cap. CLVI.  
 Sudores excludentia. cap. CLVII.  
 Quæ euacuant ac corrumpunt pediculos omnis generis circa superficiem corporis. cap. CLVIII.  
 De infusionibus sedis. cap. CLIX.  
 De glandibus. cap. CLX.  
 De tomentis siue floccis. cap. CLXI.  
 De aëre. cap. CLXII.  
 De uentis. cap. CLXIII.  
 De accessione ac significatione stellarum. cap. CLXIIII.  
 De aquis. cap. CLXV.  
 De balneis. cap. CLXVI.  
 De balneis naturalibus. cap. CLXVII.  
 De frigida lotionē. cap. CLXVIII.  
 De infessu solij ex oleo. cap. CLXIX.  
 De spongia usu. cap. CLXX.  
 De aspersione. cap. CLXXI.  
 De irrigationibus. cap. CLXXII.  
 De infusionibus. cap. CLXXIII.  
 De humectationibus. cap. CLXXIIII.  
 De fomentis, perfusione, cataplasmatibus, ac cucurbitis. cap. CLXXV.  
 De cataplasmate ex fermento. cap. CLXXVI.  
 De cataplasmate ex pane. cap. CLXXVII.  
 De cataplasmate ex fursuribus. cap. CLXXVIII.  
 De cataplasmate ex ficibus. cap. CLXXIX.  
 De dropace ac picatione. cap. CLXXX.  
 De sinapismo. cap. CLXXXI.  
 Quod caprarum fimi pilula cum aceto imposita, priuatim coxædum morbo conueniunt. cap. CLXXXII.  
 Quæ sint alia rubificantia. cap. CLXXXIII.  
 De iberide, siue cardamine, quæ etiam lepidiū uocatur. cap. CLXXXIIII.  
 De euocantibus ex alto auxilijs. cap. CLXXXV.

## AETII MEDICI GRAE-

### CI CONTRACTAE ME-

#### DICINAE TETRABIBLI PRIMAE

#### SERMO TERTIVS.

\*

De his quæ per chylum infunduntur, euacuantur, & exhibentur. Et de aëre, uentis, locis, aquis, rubificationibus, sinapismis, ac similibus.

DE FRICTIONE PRAEPARATIVA. Cap. I.



in molem eleuetur.

NT E exercitationem corpus calfacere oportet, frictionis tum per lintea, tum per oleum, usu, fricandūq; est corpus nudis manibus donec probè caleseat, & molliatur, ruborq; floridus efflorescat, & conficta particula

De exercitationibus.

Cap. II.

Exercitatio est motus uehemens. Vehementia autem terminus est respirationis alteratio ad celeritatem ac densitatem. Exercitatio ipsa partes instrumentales preparat, ut non facile affectionibus impetantur, & ad actiones obeundas robustiores reddit, & alimenti attractionem fortiolem, & nutritionem meliorem, propter excitatum calorem facit. Sed & sensibiles itemq; obscuros meatus propter fortē spiritus motum



tum expurgat. Quandoquidem igitur distributioni alimentum opitulatur, oportet sane neque humorum crudorum, neque ciborum inconcoctorum copiam, neque in uentre, neque in intestinis contineri: periculum est enim ne ad omnes animalis partes deducantur antequam probe concoquantur. Manifestum igitur est etiam ante cibos exercitari corpora oportere. Oportunitatis nota ex bonitate coloris urinarum sumitur. Aquosa enim urina, humorem ex uentre in corpus digestum ac distributum, inconcoctum esse significat. Fulua uero & biliosa iam dudum perfectam concoctionem notat. At uero moderate pallida, signum est concoctionis nuper factae. Tunc itaque ad exercitia prodeundum est, uentris ac uelice excremento prius deposito.

*De exercitationum speciebus.*

Cap. III.

Comune est omnibus exercitationibus, caloris innati corporibus augmentum. Caeterum singulatim robusta exercitatio, hoc est, uiolenta, musculos ac nervos ualidiores reddit. Tales sunt, fodere, onus maximum leuare, & aut in loco permanere, aut paululum progredi & uelut deambulare. Huius generis est & per funem manibus appraehensum repere ac ascendere, & plurima alia eiusmodi. At uero ueloces exercitationes, citra contentionem & uiolentiam, cursus sunt, & summarum manuum luctus ac exercitia, & parua pila. Caeterum robustis exercitationibus uelut uehementibus uti quis potest, si celeres motus addat. Insuper exercitiorum aliqua lumbos aut manus aut crura magis exercent, aliqua spinam, aut pectus, aut pulmonem solum. Exercendum est autem donec corpus in molem eleuetur, & floridum euadat, motusque expediti ac aequales & ualidi existant. In hoc autem corpore etiam sudorem conspicias calidum uapore permixtum. Cessandum uero tunc primum ubi quid ex praedictis fuerit alteratum, uelut si corporis moles contrahi uideatur, statim quiescendum est. Similiter etiam si coloris floriditas contrahatur. Quin & si motuum uigor remitti uideatur, statim cessandum est, & si circa sudorem mutatio aliqua apparuerit iuxta multitudinem siue qualitatem. Si enim paucior aut frigidior prodeat, euestigio desinendum est, oleumque affundendum, indeque corpus recurandum, moxque frictione recursoria, quae post exercitationem adhiberi solet, utendum quemadmodum praedictis in usu habent.

*De frictionum speciebus.*

Cap. IIII.

Frictio dura corpora constringit, mollis soluit. Quare quae supra modum exoluta sunt corpora, frictione dura, quae contra adstricta, molli fricanda sunt. Si uero aequaliter habeant, palam est quod neque molliter neque dure, sed quantum eius fieri potest, utroque excessu uitato. Frictio multa gracilitatem inducit, pauca uice uersa, media mediocritatem.

*De uociferatione.*

Cap. V.

Vociferatio exercitatio est pectoris & uocalium instrumentorum, insuperque caloris naturalis purgans, attenuans ac roborans, & corporis partes solidas & robustas reddens, ut non facile affectionibus impetantur. Utendum est uociferatione in anhelosis, & recta ceruice spirantibus, tabidisque ac doloribus diuturnis pectoris ac dorsi, & in pectoris abscessibus post rupturam, & ad raucam uocem ex plurima humiditate factam, & in febribus quartanis. Nam concretum humorem convenientissimè excutit, &

stomachi humiditatem, quam priuatim quartana febris inducere solet, expellit. Conuenit etiam stomachicis praesertim assidue uocantibus, & acidum rusticantibus. At uero capitis affectionibus incommo- dissima uociferatio existit. Caeterum qui uociferatione usus est, aluo prius exonerata, & infernis partibus sensim confectis, loraque facie placide perfusa, & ubi mox a somno se moderate loquendo & deambulando praeparauerit, ita tandem ad uociferationem progredi. In ipsa autem uociferatione concinnitas, & uocis bonitas, ac iucunditas, nihil conu- lerint ad sanitatem. Verum grauiorum uocum sonus utilis existit, quare in hoc se exercere oportet. Sic enim plurimus aer in respiratione attractus, pe- ctus distendit, & aluum ac totius corporis meatus di- latat ac disparat. unde in uociferationibus, & concin- tatis lectionibus redundantium humorum excretio- nes contingunt, & his quidem qui concitatus legunt, magis & per sudores, qui uero mitius uocem inten- dunt, per occultam transpirationem. Nam tota corpo- ris moles in lectionibus ac uociferationibus intendi- tur. Contingit item propter attenuationem ex motu factam, multa sputa resoluta, mucumque ac pituitam excerni. Porro his qui propter frigiditatem calidi- tate opus habent, quodnam commodius auxilium afferri queat quam actio per respirationem? Opor- tet itaque saepe legere, & uniuersum corpus relaxa- re, fusaque carne, ad corporis rarefactionem, asperam arteriam, & alios spiritus exitus commodè disten- dere, & grauissimas uoces concinne sonare. Utendum autem uocis actionibus neque temere, neque incon- siderate, sed neque prauis ac corruptis humoribus corpore repleto, neque in magnis ac manifestis cru- ditatibus ad uocis exercitium progrediendum, ne amplior distributio corruptorum humorum aut ua- porum in corpus fiat.

*De gestatione.*

Cap. VI.

Reliquae quidem exercitationes in motu corporis sitae sunt, gestatio uero mixta est ex motu & dispositio- ne quieti simili, quum plurimae corporis partes qui- escere uideantur, uniuersum uero gestationis tractu moueatur. Atque hinc adeo utilissima simulque lenis- sima exercitatio est gestatio, ut quae neque lassitudinem corporibus inducat, ipsaque cosimiliter uelut magna exercitia moueat. Omnis autem gestatio insitum ca- lorem uentilare & excitare potest, & materiae mul- titudinem dispergere, habitumque corroborare, & ac- tiones stupidas suscitare. Differentiae gestationis mul- tae sunt. uerum peculiare haec sunt. Prima quidem in lecto, eoque aut pensili, aut fulcra mobilia iuxta angu- lares pedes habente. Altera in lectica, quae & ipsa du- plex est, ita ut qui gestatur uel desideant uel decum- bant. Tertia in curru. Quarta in nauigio. Ponenda etiam equitatio est inter gestationis partes. Itaque ge- statione in lecto utendum in febricitantibus, aut diu- turno morbo decumbentibus, in quo corpora con- sumpta se erigere non ita ualent. Item in his qui uires recolligere a febrili afflictione iam incipiunt, & in his qui ueratrum sumpserunt. Utendum & phreniticis. Nam spiritus perturbatione placide lenit, & ad so- mnium illicet. Utendum & in lethargicis, & appeten- tia ciborum deiecta. At uero in lectica siue ferculo de- cumbentes gestamus, febris lethargica aut semitertia- na, aut quotidiana correptos. Item hydropicos, stu- pore



pore attonito percussos, resolutos, nephriticos, podagricos. Desidentes autem in lectica gestamus, eos in quibus febris exactè remisit. Cæterum gestatio in curru cōcussorium quiddam habet, & diurnos morbos cōmouet. Est autem & in hac alia uehementior, alia mitior. Mitior itaq; utendū in capitis affectionibus, & his quibus intestina fluxione laborāt. Vehementiore, in affectionibus pectoris ac stomachi, & in tumoribus laxis, hydropicisq; ac stupore attonito percussis. Verum uertiginosos & dimidia capitis parte affectos, auersos ab itinere retrorsum de sidere in curru oportet, eosq; leniter mouere. Etenim multos nouimus hoc modo curatos, qui nullo alio auxilio indiguerunt. Sed tamen sedem aliquāto supiniorē ipsis esse oportet. Porro gestatio in nauigio si iuxta terram fiat, & in mari tranquillo, hydropicis conuenit, & elephantiasis laborantibus, syderatis, tumidis. Et stomachum quidem ab initio subuertit, paulò autem postea in aduetudinem uenit. Verum gestatio per pelagus uehementissima est, & mutationes plurimas ac maximas facit. Nimirum quā anima mixtos affectus habeat, ex tristitia, & spe, timoreq; ac periculo, modò gaudentibus & lætis, modò in agone existentibus nauigantibus. Omnia autem hæc composita sufficientem uim habent omnem ueterem morbum exigendi & è corpore excludendi. Quin & mixtura ex quiete ac motu corporis, si quid aliud, probè corpus nutrit.

## De equitatione.

## Cap. vii.

Equitationis usus modicus est in ægrotis: neque enim multam utilitatem opus ipsum præbet. Nam si leniter impellatur equus, nihil aliud quā lassitudinem facit, maximè inguinum, iuxta crurum explicationem ac dependentiam. Si uero agitetur equus, uniuersum corpus dolorose concutitur. Et tamen etiam hic motus aliquid utilitatis habet in ualētibus. Suprà enim alia exercitia, & spiritū & corpus, & maximè stomachum firmat, sensusq; purgat & acutiores reddit. Verum pectori pessimum est hoc exercitium. Cæterum in omni gestatione omniq; exercitatione, curandum est maximè, ut in salubri loco fiat, & in aëre puro, nec solum de alijs exercitijs hoc accipiendum est, sed etiam de nauigatione.

## De re uenera. Ex Ruso.

## Cap. viii.

Naturale opus coitus est. nullū autem ex naturalibus operibus nocuum est. Verum iuxta immodicū & assiduū usum, itemq; iuxta tēpus non conueniens assumptus, noxius euadit. Multò autem magis nocuius fit assiduus usus, his qui neruos, aut pectus, aut renes, aut lumbos, coxendicesq; ac pedes, imbecilles habēt. Cuius rei coniecturam hinc facere licet, quòd omne hominis robur in coitus usu debilius redditur. Robur autem, est insitus in nobis calor. Vnde sanè concoctiones coeuntibus non integrè contingūt, & pallidi fiunt, & neq; exactè uident, neq; ut oportet audiūt, neq; alios sensus integros possidēt. Quin & obliuiosi tales & tremuli existūt, & articulis maximè coxendicum dolent, & alijs ex ipsis renum, alijs uelicæ morbos incurrunt. Quibusdam etiam oris graueolentia, & dentium dolores, & gurgulionum inflammationes oboriūtur. Et uisi sunt iam uiri multi qui ex multa uenere sanguinem exspuerunt, partim ob uiolentam spiritus compressionem ac intensiorem, partim ob uenarum ac arteriarum quæ ex pul-

mone ad testiculos deferuntur communionem. Cæterum foemina ex coitu sanguinem non spuit, cum propter reliquam corporis humiditatem, tum quòd in mixtione minus laboris perfert. imò etiā propter consuetas infernas purgationes. quare si contingat etiam foeminam spuerè sanguinem, magnam ex purgationibus medelam acquirit. Itaq; propter iam re-latas causas medici boni iubent uenere abstinere, siue adsit quis ex prædictis morbis, siue timeatur, ob naturalem corporis debilitatem, atq; hætenus quidem offensiones & consensus coitus, quantū uires nostræ tulerunt, paucis retulimus. Restat ut etiā utilitates recensamus, neque enim penitus inutiles & omnibus nociuæ res ueneræ existunt, si & usus, tempus, & modum, & sanā utentis constitutionem inspicere uelis. Utilitates ex coitu hæ sunt: Repletionem euacuare, & leuius reddere uniuersum corpus, idēq; ad augmentum promouere, & uiribus efficere. Duris habitudinibus ex longioribus interuallis usus eius cōmodat: mollit enim organa, & meatus dilatat, & pituitam expurgat, & impeditam rationis uim explicat, & maximas iras remittit. Quapropter et atra bile percizis, subtristibusq; & hominum consortia sugientibus, uelut magna quædam medela, cōmodissimus existit: sed et iuxta alium modum furiosos, ad saniores mentem reducit, & quosdā comitiali morbo præhenso sanat, & capitis grauitatem ac dolorē ad uigorem ac integritatem permutat. Hippocrates summam morbis à pituita rem ueneræ optimam esse pronunciauit. Multi quoq; ex morbis alimentū non sentientes, ex usu ipsarum refectioni sunt, alijs bene spirantes ex ægrè spirantibus euaserunt, alijs cibos auersantes, appetentiam edēdi assequuti sunt, quidam à frequentibus seminis per somnum effusionibus liberati sunt. Naturæ ad uenerem appositæ sunt calidiores & humidiores. nā eius usum plus quā alia ferre possunt: minimè autem sicca & frigida. Est & uigētium natura ad eam accōmoda, senum uero nequaquam. Ex temporibus uer aptum est, ineptus autumnus & æstas, sed neq; hyems cōmoda est propter frigiditatem. Et sanè diætā quoq; calidior & humidior ad coitum idonea est, contra siccans & frigefaciens inutilis. Humida enim diætā etiam impotenti ad coeundum cōmodant. Oportet igitur humidum & calidum esse uictum, cui accedere debet labor moderatus, & cibus boni succi. Vinum itaq; sit colore fuluum, substantia tenuē, panes puri furnacei recentes, carnes hœdorum, agnorum, & porcorū. Ex uolucris gallinæ, attagenæ, perdices, anseres, anates. Ex piscibus polypi, & molli carne præditi. Olerum horminum, irio, eruca, rapum bis coctū & flaccidū factum, hæc enim medicamētū loco exhibentur. Leguminum fabæ, cicer, ochri, phaseli, pisa, dolichi. nā & flatu corpus implent, & luculēter alunt. Magnopere etiam optimam uiam laudo, quod ad hanc uictus rationem attinet: humectat enim & sanguine ac spiritu corpus replet. Cæterum qui uenere uti uolet, recentes repletiones uitabit, cruditates item ac ebrietates, similiterq; famem. Malum est enim repleto corpore cotre, item à gymnasijs & à balneis. Vitandæ lassitudines, & prægressi uomitus, & alui profluvia recentia. nam inueterata aliquando per uenerē resicantur. Commodissimum coeundi tempus est à cibo non nimium ingesto. nam & ad robur conducit, &

frigida



frigiditates euenire solitæ minus fiunt. Et si quidem à prandio quis ad uenerem incitetur, quiescere oportet donec cibus desideat. Si uero à cœna, necesse est paululum antea dormire. Porro uehementes impetus ac cupiditates ad uenerem non probo, sed eis resistere suadeo, præsertim si cui morbus sit qui ex uenere facile offensionem perceptet.

De insolatione, & arenæ aggestione, ac alijs vaporatorijs fomentis. Ex Antylo. Cap. ix.

Quidam se ad solem exponunt, partim non uncti, alij etiam uncti, & alij desidentes, aut decumbentes, alij stantes & deambulantes aut currentes. Ex decumbentibus aliqui in strato, aliqui super corio, alij in arena, aut sale decumbunt. Solaris itaq; inustio citra unctionem, moderate adhibita, perspiratione occultam auget, & sudores elicit, aluum autem sistit, et carnem conseruat, pinguitudinem uero abolet, & tumores laxos cum alios, tum maxime hydropicorum deprimit. Spiritum autem desiolem ac uelociorem reddit, & propterea anhelos & recta ceruice spirantes exacerbat, uerum capiti diuturna frigiditate laboranti commodat, nam & firmum & egritudinibus minus obnoxium efficit. Oportet tamen in his aluum præuacuari. Inimica est enim insolatio capiti, euacuatione inferne non præmissa. At uero insolatio cum unctione, eadem similiter potest. Verum corpus magis siccat, uelut unguine assatum, quapropter & superficiei magis denigrat. Cæterum per occultam transpirationem hæc minus discit, nimirum ad cauterij similitudinem densans carnem. Qui uero desidentes aut stantes insolantur, uehementius quam deambulantes & magis quam currentes inuruntur. Decumbentes autem in strato, non magnopere iuuantur, sed capite magis replentur. Qui super corio se soli exponunt, magnam utilitatem consequuntur, præsertim hydropici & ischiadici, nephritici, resoluti, elephantiasi laborantes, intumesceres circa resectionem, coeliaci, & qui circa uesicæ ueterem morbum habent: itemq; syderati, scæminæ quoq; quæ ab utero strangulantur, & adhuc amplius quæ alba uteri fluxione infestantur. Oportet autem magnū esse corium, & oleo perunctum, & super tenuem arenā cribratam extectum, & ubi præcalfactū est corium, tum demum ægrum super id decumbere, capite cum crudo linteo uelato. Permanendum est autē diutius in eadē decubitus figura, & postquā corpus multum fuerit feruifectū, uertere iubendū ac deuoluendū, & postea rursus in alterum latus reuoluendū, ac quiescendum, atq; hoc ipsum sæpius facere oportet. Idem modus etiā in arena adhibetur, loco assidue permutato. oportet autē ministrum adesse, qui calentissimam arenā colligat, & corpori defossi ac obruti superingerat. Si quidē igitur mare affuerit, utendū est eius arena. Nā & leuior & magis resiccās huius arenæ fomētatio ac feruor est, quam eius quæ per corium cōtingit. Si uero fluuiialis arena fuerit, præstat corio uti. Nā & arena fluuiatilis, & aer humectior est ex euaporationibus. Quod si salis copia adsit, multò præstabilius est tenui sale subtrato hominē decumbere. Oportet autē altitudinē esse non minorem tribus palmis paruis: si enim non fuerit altus sal, caliditas ipsius facile diffatur, utpote quæ ex alto emersum ac progressū non habeat.

De uenæ sectione. Ex Galeno. Cap. x.

A similaribus corporis partibus primas actiones per-

fici, alibi demonstratum est, itemq; per instrumentales, secundas. Itaq; humores in corpore contenti cōsiderandi sunt, quam tandem utilitatē aut cladē partibus afferant, per quas corpus actiones suas facit. At uero plenitudo colligi dupliciter dicitur. Aut enim uiriū respectu plenitudinē dicimus, aut respectu capacitatis uasorum humores continentium. Quæadmodū enim is qui onus gestat, non statim ut grauatur & laborat, iam etiam concidit & uincitur ab ipso onere. Iuxta eundē modū ubi uires à plenitudine grauantur, possibile est ipsas diu resistere, & nondū hominē ægroare, ubi uero quis diutius negligatur, uires cōcidunt. His itaq; magnopere prodest uenæ sectio priusquā uires uincantur. Sed & plenitudine ac copia sanguinis in corpore non existente, uenæ sectio utilis sit, inflammatione incipiente ob prægressam plagam, aut ob particulæ debilitatē, humoribus ex corpore aceruatim in ipsam congregatis. Aliquando enim sanguis aceruatim ad particulam quandā irruens, aut stupefacit eam, ut actio ipsius corrumpatur, aut memorabilem cladē inducit, uelut in syderationibus contingere uidemus: quādoq; uero etiā ipsum uas perumpit, uelut in sanguinis sputo cōtingit. Conandū itaq; est ut redundantē sanguinem euacuemus quā citissimē, priusquā magnum aliquod malum circa aliquam corporis partē operetur. Quin & magni alius cuius morbi timore uenam secamus. Atq; ego sanè multos podagricos annis tribus aut quatuor infestatos ex interuallis, aut purgato redundante humore in principio ueris, aut sanguine detracto curauī. nā & podagricis et arthriticis, comitialibusq; ac atrabilarijs morbis, item sanguinē spuētib; uertiginosis, & his qui frequenter angina arripiuntur, peripneumonijs, pleuriticis, lippitudinibus uehementibus, & in summa his qui magnos morbos frequenter incidunt, uenæ sectionē omnibus auxilijs potiorē pronuncio. Consideranda porrò ueniunt in omni uenæ sectione, plenitudinis quantitas ac qualitas, morbi magnitudo siue præsens sit, siue timeatur, ætas uigorosa, & præ his omnibus uiriū robur aut debilitas, deinde naturalis habitus totius corporis, hora ac tempus anni, regio, præsens ambientis constitutio, prægressus uictus & diæta, copia ciborum & potus, & maxime an multū nutriendos cibos homo ingesserit, & an consueta exercitia reliquerit, & an cōsuetæ excretiones suppressæ sint. At uero aggrauante & infestante plenitudine, non omnino sanguis detrahendus est: Aliquādo enim crudus quidam humor in corporibus coaceruatus est, quapropter diligentī animaduersione opus est, quantopere uires ualidæ sint, & quantopere humor ipse perfrigeratus est, quod ipsum ex urinis & alijs signis cognosces. Nam in eiusmodi affectionibus præexolutæ uires, in uenæ sectione extremē concidere solent, ut refocillari amplius non possint, quod ubi contingit, periculum non paruum consequitur, præsertim incidente febre, in constitutione æstiuā, stomacho malè affecto, aut corpore uniuerso molli & temperamenti humidī ex natura existēte. Exoluuntur enim tales, & celerrimē in animi deliquiū collabuntur, etiam si non magna febris in ipsos irruat. Sed & si hyems fuerit, aut regio frigida, & natura hominis frigidior, minimē uenæ incisionē admitteremus: tales enim hoc modo dispositos moderatis frictionibus, et unctionibus moderate calfacien-



facientibus, & portionibus incisoria ui præditis sanamus.

*De euacuationis mensura.*

Cap. xi.

Magnitudo morbi & uirium robur principales scopi sunt incidendæ uenæ, qui ubi aucti fuerint, maiorem euacuationem fieri oportere indicant, sicut cōtrā ubi non fuerint aucti, euacuationis quantitatem imminuere oportet, in quantum uires imminutæ sunt, itemq; morbi magnitudo. Consequenter autē simul consideranda est hominis natura. Nam eos qui moderate graciles sunt & magnas uenas habēt, multūq; sanguinis, largius euacuabis. qui uero uenas angustiores habent, & corpore albi & carne teneri sunt, parce. Sanguinem enim modicum hi habēt, & facile humores ipsis transpirant. Iuxta eandem rationem, neq; pueris uenam secabis, usq; ad quatuor et decem annorū ætatem, imō neq; senibus, præsertim uiribus debilibus existentibus. Quod si uires fuerint fortes, & necessitas urgeat, etiā septuagenarijs uenā secabis.

*Quales uenæ secandæ.*

Cap. xii.

Reuulsionis gratia semper uenas in directum secabis in his à quibus sanguis erumpit. Nimirū ut sanguine è dextro nare fluente, uenam dextræ manus secas: è sinistro uero, sinistrae. Quod si splen patiatur, uenā inter anularem & paruum digitum manus secas, aut in cubito internā. Sed & in pleuriticis uenam è directo affecti lateris secas. Grauißimos item oculorū dolores mirabiliter mitigat, uenā è directo affecti oculi secas in cubito, quæ humeralis appellatur. Nā interiores uenæ sectæ, utilitatē præbent in partibus infra collum affectis. Externæ uero faciei & capiti: Mediæ utrisq;. Si autē in uenæ sectione error contingat, in media quidem uena nervus subiacens diducitur. In interna uero, arteria substrata. Et uitandum est ne hāc secemus citra magnam necessitatem. Nam minoris periculi est humeralē secare. Et sæpe facta in hac fissura magna, neq; inflammationes sequutæ sunt, neq; dolores. Quare hanc cōfidenter secare licet. Internam uero cum multo metu. Vitandum item ut ne tentemus mediam. Quemadmodū autem prædictæ partes ex uenarum cubiti sectione opem sentiunt, ita inferiores his, hoc est, coxa, & uterus ac uesica, ex uenarum poplitis ac talorum sectione. Rheneß autem utrinq; opem ferunt, & ex cubiti & ex infernarum uenarum sectione. Scio autem coxædūm affectionem in una die sanatam, per euacuationē à cruribus, quæ sanè non propter frigiditatem, sed uasis coxæ sanguine impletis facta erat. Oportet autē in omnibus inflammationibus incipientibus, reuulsorie facere uenæ sectionem, uelut pede inflammato ex manu. Verum in affectibus diuturnis, maxime quidem ex ipsis affectis partibus, sin minus, ex propinquis.

*Quomodo uenā secanda est. Ex Antylo.* Cap. xiii.

Punctim quidem uenæ incisionem facimus, ubi uasa fuerint obscura: Cæsim uero, ubi fuerint manifesta, ita ut firmemus manum in obscurioribus, & his qui ad iectum flectere solent cubitum. Oportet autem nō totum uas diducere. Nam dum labia ipsius euertuntur, fluxus non fit cum ei aculatione. Neque uero infernam uasis partem ad radiū diuidere oportet, sed supernam ad brachij exortum tendentem. Supernam enim secta, speciosa sanguinis ei aculatio contingit. Et ad hāc commoda est supernæ partis uenæ sectio, quoniam è uase quis aberrare non potest.

*De magnitudine sectionis. Ex Antylo.* Cap. xiiii.

In his qui acruata euacuatione opus habent, magna fissura facienda est. itemq; in quibus crassitiem sanguinis contineri coniectabimus. In quibus uero reuellere & auertere uolumus lationē sanguinis, uelut in reiectantibus sanguinē, aut quibus de naribus aut alia quadā parte sanguis erumpit, parua uulnuscula incutimus. Non enim indigent euacuatione (quum euacuētur ab affectione) sed retractione ac reuulsionē. Oportet igitur in his permittere ut sanguis fluat multo tempore per uenā. Paruis item fissuris utendū est in phreniticis aut mēte moris, aut alias delirantibus, quo cōglutinatio uulnusculi fiat: contingit enim ut deliri sæpe latenter uinculū manus soluant. & si quidem cōtigerit magnā esse fissuram, sequitur periculū ex sanguinis eruptione. In parua uero, etiā grumus uulneris osculo insidēs, sanguinis eruptionē prohibere poterit. Insuper, & paruis fissuris utendum est in paruis uasis, magnis uero in maioribus. Nam si in magnis uasis paruum uulnusculum fiat, necessariò grumi collecti fluxum sanguinis impediunt.

*De figura sectionis. Antyli.*

Cap. xv.

Sectionis figuræ tres sunt: transuersa, recta, non pungens sed findens uenā in directū, & inter has media, quæ appellatur obliqua. Transuersa igitur utendum est in quibus detractionem omnino non repetere uolumus: Curuato enim cubito oscula fissuræ cōponuntur. Et commoda est hāc figura, ubi magnā fissuram facere uoluerimus. Obliqua uero figura utilis est in quibus detractio repetenda est. Et eò quod à uase nō aberramus dum sic secamus. Sed & sanguinis ei aculatio ex obliqua fissura pulchrior aspectu est uidentibus, dū uelut obtorquetur & obuoluitur sanguis in saltu. Oblonga uero in directum figura commoda est in his quibus non solum eadem die sectionem reiteramus, sed etiā post unam aut duos dies. Incuruato enim cubito disparantur oscula fissuræ. Commoda est item in directum fissura his in quibus præuariatio labiorū fissuræ fieri solet. At in hac figura minus speciosa sanguinis ei aculatio contingit.

*Quod sit oportunum uenæ secandæ tempus.*

Galen.

Cap. xvi.

In omni diei ac noctis hora, necessitate urgente, uenam secabis: ita ut scopum habeas in his qui febriunt, exacerbationis declinationem: in his uero qui aut propter lippitudinem, aut aliud quid eiusmodi absq; febre, uenæ sectione indigent, magnitudinem doloris aut inflammationis. Qua enim hora uideris dolorē mitigari, uenā secabis. At uero si nihil tale urgeat, melius est mane uenā secare, non statim ubi à somno surrexeris, sed ubi uigilaueris ad horā unā. Sed et quosdam prælauare præstat & prædeambulare. In quibus uero præseruationis gratia uenam secamus, licet etiā ab actu consuetarū operationum uenā incidere.

*De repetita detractione. Galeni.*

Cap. xvii.

In quibus simpliciter euacuare uolumus, eadē die iterata detractio fiat. In quibus autem reuellere, præstat ut post duos dies fiat. Et in quibus quidem opus est multa euacuatione, uires autem nō sunt fortes, in his euacuationē referuare oportet, & prima detractione defectuosiore facta, rursus iteratō detrahare, aut si uoles tertium. Quum uero feruentis sanguinis multitudo febrem acutissimam incēderit, uelut in synochis, siue cōtinētibus, ibi acruata euacuatione opus

g est.



est. Et oportet tentare ut euacuemus usque ad animi deliquium, uirium robore ex pulsibus considerato. In aliquibus enim noui sex libras statim esse detrahas. Fluente itaque sanguine attendere oportet semper pulsum tractui, ut ne citra animaduersionem, pro deliquio animi mortem inducas.

*De arteriarum sectione. Galeni. Cap. xviii.*

Arterias secant medici in temporibus quidē, ob oculorum fluxiones, quum calidæ & flatuosæ fuerint. Eas uero quę sunt retro aures, in uertiginosis, & his maxime quę ex diuturnis morbis capitis calidis ac flatuosis laborant. Iam uero & ob alias plurimas affectiones circa caput consistentes diuturnas, quidā secant arterias retro aures. Verum aliqui arteriarum sectiones uerentur, propter sanguinis retinendi difficultatem, & quod dum fissura in cicatricem abit, dilatio uasis ipsius arteriæ fit, quę aneurysma Græcis dicitur, & inter tumorum genera recensetur.

*Medicamentum sistens sanguinem arteriarum.*

*Cap. xix.*

Quum igitur sanguinis eruptio ex incisa arteria consequatur, oportet hanc hamulis attractam totam transuersim dissecare. Deinde aloem & mannam thuris terere, & ouorum albumine subigere, & tenellis pilis leporinis medicamentum excipere, & fissurę imponere. Dicitur autem de hoc amplius, in loco de sanguinis eruptione, inter uulneraria medicamenta.

*De cucurbitularum usu. Ex Antylo. Cap. xx.*

Neque in morborum principijs, neque in corporibus repletis, cucurbitis utemur, sed quum euacuatum fuerit totum, & non amplius influxerit parti cui cucurbitę sunt adhibendę, & opus fuerit mouere ac excutere & attrahere reliqua in parte inutilē fluxionē. Cauendum est autē ne cucurbita prope mamas affigamus. Nam illabentes in cucurbitas mamas & tumescētes, non facile sinūt illas tolli. Tūc uero spōgij ex calida expressis cucurbitis circūdare oportet: sic enim remittere solent. Si uero non sic remiserint, cucurbitę perforandę sunt. Illud porro nosse expedit, quod non solum localis uenę sectio detrimento est, antequam uniuersum corpus euacuatur, per affectas partes sanguinē detrahēs, sed etiā cucurbita. Et uenę quidē sectio minus est periculosa: pro ratione enim allationis materię, etiā sanguinis excretionē facit. Cucurbita uero tū impetu affixionis uiolenter materiā attrahēs, tū multum locum occupans, & tamē neque uasis sensibile fissurā facies, attrahit quidē memorabile materiā, non euacuat autem pro ratione attractę. Et præcordijs quidē intēpestiuē affixa, præsertim in cōtinentibus febribus aut semitercianis, & maxime si etiā mēs egri fuerit turbata, & sensus sic obtusus, stragulus et mortē eadē die inducit. Capiti uero intēpestiuē admota, lethargos, & corporis ac mentis stuporē, & oculos prociuos facit. Quibus autem contigerit ut hec effugiant, hi omnino in diuturnum capitis affectum hic incidunt.

*De scarificatione. Ex Galeno. Cap. xxi.*

Venę secare sepe in anno non arbitror commodum esse: simul enim cū sanguine multus uitalis spiritus excernitur. Quum autē hic frequentius cōsumatur, & tota corporis moles perfrigeratur, & omnia naturalia opera deteriora fiunt. Probo igitur ut ab ignobilioribus partibus, uelut sunt crura, per scarificationem detractio fiat. Optimū autem est hoc auxiliū ad conseruationem sanitatis, & ad eandem recuperandam,

si fuerit præuaricata. Prodest autem scarificatio etiā oculis diuturna fluxione affectis, & alijs capitis affectionibus, itemque thoracis, & anginis. Oportet autē in unoquoque membro factas sanguinis inspersiones, post uniuersalem corporis euacuationem, soluere per localem scarificationem.

*De sanguisugis. Galeni.*

*Cap. xxii.*

Sanguisugas captas una die seruare oportet, easque paulo sanguine alere, usus autē tempore pars cui admouendę sunt nitro preparatur, & aqua dulcissima exactē abluatur. Postea ē fomēto sanguis illinatur. Atque sic accipiatur sanguisuga ac mittatur in aquā paruā, & fuligine ipsarū per spongiā deterfa sic admouebis: inhærentes enim non cessant trahere, donec salem aut nitrum aut cinerem ori ipsarū inspergamus. Postquā uero exciderint, fouēdi sunt loci per spongiā. Et si sanguis erumpat, gallam ustam, aut lintheumustum, aut spongiā liquida pice imbutā ac ustam, insperge, & superne chartam aceto madidam impone.

*De purgatione. Ex Antylo.*

*Cap. xxiii.*

Eos qui sana habēt corpora purgare difficile est. Nam & uertiginosi ac uoluulosi fiūt ac torquētur, purgatioque difficulter ipsis procedit. Et ad hec cito exoluuntur tales dum purgantur. Quū igitur purgare uolueris, præattenuare oportet ac secare crassos ac uiscosos humores & meatus aperire, per quos humores transferuntur ac trahuntur a purgatorijs medicamentis. Et serolos quidē ac tenues humores in principio morborum euacuare oportet: in crasis uero ac uiscosis cōcoctio expectanda est, qualis est pituita, & bilis atra. Sed & in omnibus diuturnis morbis semper cōcoctionem expectare conuenit. In acutis uero quū cōmotę fuerint materię, etiā in principio pharmacum exhibe, & tamē cū multa cautione. Nam quum humores sunt in motu, latiorēque ac fluxu, timor est ne quod ex uisceribus natura debile existens materiā cōmotam excipiat, & præsertim thorax. At in una aliqua parte firmatos humores, uelut in uiscerū inflammatione cōtingit, medicamentis aggredi non oportet, priusquā cōcoquantur: quicunque enim inflammata in principijs per medicamēta soluere conatur, inquit Hippocrates, a distento quidē & inflammato non auferunt quicquā: nihil enim remittit cruda affectio. uerum sana & morbo resistētia cōsumunt: dū enim debile sit corpus, morbus dominatur, quū autē morbus dominatur, pernicies adest. Proinde materię remouendę gratia utimur purgatorijs medicamentis in cephala, uertigine, hemicrania, comitiali, anhelatione, erectę ceruicis spiratione, coxēdice, arthritide, podagra, nephritide, & in affectionibus uescicę ac uteri diuturnis. Similiter autē etiā ubi fluxus assiduē infestauerit aures, aut nares, aut oculos, aut os, aut stomachū, aut totā superficiē: & neque resiccet ab alijs auxilijs, neque aliter sisti poterit: solet enim purgatio per aluū fluxiones cohibere. Et in hoc ordine locari potest etiā humoris atrę bilis purgatio, quę hemorrhoidarū suppressarū gratia assumitur post uenę sectionē. At antiquę affectionis emouendę ac expurgandę gratia, utimur purgatorijs in resolutione, si deratione, alimentū non sentiētibz, torpore, sopore, grauitate perseverante in quacūque corporis parte. Ceterū ob corporis reperimentū trāsmutandū, utimur purgatorijs in diuturnis febribus, nimirū quotidianis ac quartanis, insania, atra bile, mentis excessu, malo



malo habitu corporis, his qui alimentum non sentiunt propter vitiosum humorem. Insuperque in elephantiasi, scabie, lepra, pustulis, morbo pediculari, & in ulceribus spontaneis ac grauibus, & affectionibus fluidis. At uero quo circūlitus & infestus humor educatur, utimur purgatorijs, in aqua inter cutē, & regio morbo. Et hoc loco ponēde sūt etiā uētris fluxiōes, in quibus purgatoria assumimus: aliquādo enim acris & inutilis humor uētris tunicis insidēs aut intestinorū, similiter uelut acres glādulæ aut infusiones per anū, iritat intestina, & simul ipsa stimulat, & promptitudinē efficit ad excretionē, simulque per acredinē suam ex circūferentia corporis ac totius molis humorē atrahit. In his igitur consentaneū est purgatorijs uti, quo talis humor ex corpore expellatur, & uenter ac intestina pura fiāt. In summa utendū est purgatorijs medicamentis, in his quibus uires ualidæ sunt, & uolūtas prōpta est, & qui stomachū robustū habent, & multā inutilē materiā in corpore colligūt. At pigres & prægraciles ad purgationē inepti sunt. Insuper & qui multo sanguine abūdāt, & qui assidue animo līquuntur, & egrē reuocātur, & qui citō uomūt ex omni occasione. Pueri itē ac senes, & mulieres quibus mēses ualidē purgantur. Et qui ualde purū habent corpus. Et qui certā habēt uictus rationē. Et quibus aluus est natura adstricta. Et qui dysenteria & coeliaca affectione facillē corripiuntur. Omnes hi ad purgationē inepti sunt. Incipiendum est autē à bilem purgantibus.

*Bilem flauam purgantia. Aloë.* Cap. xxiii.

Aloë totum quidem corpus non purgat, uerum sitam in stomacho & uentre ac intestinīs bilem, citra molestiam educit, ac placidē unā cū subiectis excrementis. Datur itaque his quibus caput affligitur, propter assiduas fientes ad ipsum de stomacho euaporationes. Excindit enim inutilium uaporum allationem. Danda est & lippiētibus, propter eandem causam, & his qui ob bilis augmentū sitiunt, quibus lingua & os facillē resiccatur: & qui circa stomachū ardorē, aut nauseam, aut molestiā aliquam euerforiā percipiūt. Præbetur & his qui præter rationem pallidiores facti sunt, & in quibus superfluitates educatione indigent, & clyster adhiberi non potest ob aliquam causam. Dantur autē aloës drachmæ ii. cū aqua mulsa. Cōmoda est etiā si quis ipsam quotidie sumat, aut à coena, aut mane ante cibum potius. Tritam itaque aloē corticis citri succo excipe, aut si is desit, succo brassicæ utere. Habeant autē hinc formatæ pilulæ ciceris magnitudinem. Et dato tria aut quinque quotidie ei qui opus habet. Potes & cū terebinthina ipsam efformare, & cū melle cocto. Oportet autem in deglutiendo, aut postea absorbere aquā mulsam. Purgatoria equidē medicamenta omnem causam ex corpore extrahunt, instar cucurbitæ, principalibus partibus inhærentia, ipsaque per uentrem euacuantia.

*Scammonia.*

Cap. xxv.

Scammonia flauā bilē maximē educit. Inducit autem stomachi dolorem, & graue olet, ac iniucunda est, & ualde siticulosa. Quum enim omnia purgatoria stomachū infestent, aloë excepta, scammonia plus omnibus illi molesta est. Vitanda igitur est his qui debilem stomachum habent, & febricitantibus: quū enim leuissima sit, facillē abripitur in corpus, & omnem in ipso immundiciā cōmouet, prohibetur autem à febrili calore, ut ne superfluitates ad excretionē ducat.

Danda igitur est his qui bonum stomachum habēt, & non feбриunt, atque non facillē uomunt, & non facillē animo līquuntur. Dantur ex ea scrupuli duo plus minus, pro uirium ratione. Ammīscetur ipsi sal, & thymi coma, aut pulegiū. In his uero qui ferre possunt, præstat aloē miscere. Datur & per se cum melle, aut prīsanae succo, si clanculū exhibere uolumus.

*Peplium.*

Cap. xxvi.

Pepli semen, aliquādo uero & ramulos simul, in umbra siccata, tusa ac cribrata dato, scrupulorum quatuor pondere, in aqua mulsā, adstillato modico aceto. Nam post flauam bilem, etiā nigram & pituitam ducit. Et flatus dissipat, quemadmodū etiā Hippocrates alicubi dicit. Maxime igitur cōuenit flatuosis affectionibus, quæ sane atrā bilem lacessunt & aspicantur. Cōuenit etiā splenis inflationibus diuturnis, uteri itē ac coli, & laxis abdominis tumoribus.

*Veratrum nigrum.*

Cap. xxvii.

Veratrum nigrum atram & flauam bilem ex toto corpore trahens, inferne expurgat, non tamen cum ulla difficultate. Quapropter etiam febricitantibus per circuitū, & diu, ipsum exhibemus. Datur & furiosis, & hemicranicis, ac diuturno capitis dolore afflictis. Maxime uerò idoneum est uisceribus, & utero & uescicæ, si purgatorio medicamento opus habent. Maxima uerò ipsius uis est, priuatim educere si quid corruptoriū sanguini fuerit ammixtū. Vnde etiā in diuturno regio morbo cōmodum est, & ad asperitates cutis, uelut sunt lepræ, impetigines & similia. Est & elephantiasi utile. Datur ex eo scrupuli tres plus minus, ita ut tenuia circa radices lignula paululum in aqua madefiāt, deinde auferatur cortex, et sicceatur in umbra tūdatūque accribretur. Datur cū passo aut aceto mulso. Condimenti porro gratia addere oportet ipsi, petroselinū & dauci parum. Si uero efficacius purgare uolueris, misce & de scammonia parum.

*Bilem atram purgantia.*

Cap. xxviii.

Atram bilem ducentibus utēdum est præcipuē in melancholicis atra bile uexatis, stomachicis, his quæ facillē iritantur, iracundis, homines auersantibus, secessum quærentibus, & his qui in refectione uirium, purgatione opus habēt, & in habitibus obaridis & parū musculosis, & præsertim in autumno feruente.

*Epithymum.*

Cap. xxix.

Epithymum atram bilem infernē purgat. Dantur ex ipso contuso ac cribrato perfectis scrupuli xii. cum passo & aceto mulso ac modico sale. Confert affectionibus flatuosis & hypochondriacis præcordiorū, & quibus iecur grauatur, & difficulter spirantibus. Similiter autē uelut epithymum purgat flos in stœbe enascens, & flos qui in thymbra nascitur, atque epithymbrō appellatur. uerū uterque uiribus debilior est.

*Polypodium.*

Cap. xxx.

Polypodium bilem maximē nigram ducit & pituitā. Dantur radicis purgatæ scrup. vi. affusa aqua mulsa diluta. Potest & super balsamentū deradi, ac comedi ante prædium. Purgat etiam mediocriter ac citra molestiam, radix cocta in iure gallinaceo, & in prīsana.

*Pulegium, Tragoriganum, Leucanthemum,*

*mum, Alysson.*

Cap. xxxi.

Pulegium ducit atram bilem acetabuli mensura potū in aqua mulsa. Similiter & tragoriganum, & parthenium, quod & Leucanthemum uocatur. Dantur singulorū scrupuli sex. Sed & Alysson similiter purgatiuum



gatiuum est. Danturq; etiam ipsius scrupuli sex. Præstat autem hæc dare cum aceto, & modico sale, ex aqua, ita ut arida trita potui inspergantur.

*Armenium.*

Cap. xxxii.

Armenium quo pictores utuntur purgat atram bilem, & quicquid crassi ac uiscoli sanguini ammixtum est. Datur melancholicis, & elephantiasis laborantibus, ac consimilibus, & in renum affectionibus, & anhelosis. Dantur ex eo scrupuli plus minus quatuor.

*Centaurium minus.*

Cap. xxxiii.

Centaurium minus crassissimam bilem purgat & mucum. Quare conuenienter datur splenicis & coxendicum morbo affectis. Bibitur eius decoctum, ubi coctum fuerit in aqua. Sint autem centaury scrup. vi. aquæ mensura heminae. coquatur ad medietatem.

*Pituitam ducentia.*

Cap. xxxiiii.

Pituitam ducentium usus est in habitibus frigidioribus, ætatibus ite ac morbis frigidioribus. uelut sunt resoluti, siderati, & qui laxis tumoribus tument. Et in his qui multa & crassa emungunt, & qui ex coxendicum morbo à pituita infestantur, & in aqua intercuti.

*Colocynthis.*

Cap. xxxv.

Colocynthis purgat pituitam & bilem & mucosa. Vnde neruorum neruorumq; corporum purgatiua est. Datur igitur conuenienter in omnibus capitis affectionibus, & in erecta ceruice spirantibus ac similibus. Et in coxendicum morbo & arthriticis. Et ad diuturnas renum ac uesicæ affectiones. Est & alijs morbis comoda qui ægre excuti possunt, & induratas affectionem habent. Dantur ex medulla eius scrup. ii. in aquæ mulsæ cyathis duobus. In debilioribus scrupulus i. Eligenda est alba & tenera medulla. Nam aridior & nigra mala est. Tundatur aut & teratur diligenter, & cribretur sæpe. Et usus tempore leuigetur ualde bene in mortario cum aqua mulsæ. Solet enim tale quiddam pati. Nam tusa priusquam madefit, tenuissima apparet, ubi uero in aquam mulsam iniecta fuerit ac macerata, intumescit adeo ut uix cribratam esse credas. Itaq; tumidæ ipsius partes aliquando inhaerent uentri aut stomacho, & præsertim inuolucris intestinorum, propter molliciem: & quæ acres sint natura ac mordaces, adhærentes ulcerant intestina, & affectiones neruorum per cõsensus inferunt, torminaq; ac contractiones. Quare multa animaduersione opus est, ut leuissimam ipsam faciamus cum aqua mulsæ. Quod si minus purgare uolueris, sumito colocynthidæ iustæ magnitudinis, eamq; aperito supernè, & semen totum eximito. Deinde quicquid comesti speciem præ se fert in ipsa, rursus citra semen in ipsam indito, & repletam ipsam sapa aut uino dulci ueteri, per diem ac noctem macerari sinito. Deinde excolatū per pannū uinū calefactū bibendū dato. Purgat optime & morbum regium, & eos qui pustulas liuidas circa cutem habent.

*Tithymalus.*

Cap. xxxvi.

Tithymalus pituitam & bilem ducit. Dantur ipsius ramuli uirides accepti, & in testaceo quopiam uase parum fricti, deinde triti. Miscetur aut ex ipsis scrupuli quatuor aut tres cum polenta in aqua, & bibuntur. Nam aridiores ramuli impotentiores sunt. At uero tithymali charactæ radicem accipe, & siccato in umbra. Deinde usus tempore corticem detrahito, tundito ac cribrato, & quatuor scrupulorum pondus in uinum dulce uetus mittito, & per diem ac noctem macerari sinito, & excolatū per pannū uinū calefactū bibendū

dato. purgat maximè, ut aliqui in omnibus ipso utantur uelut quopiam arcano. Bene & citra molestiam purgat etiā succus tithymali circa aquas in humidis locis ac syluis nascētis, exceptus sale, aut pane arido trito, ita ut ex hoc nucis auellanæ magnitudo detur cum frigida aqua. At succus tithymali à quibusdā datur, aut cum caricis, aut cum polenta, guttæ quatuor aut quinque. Verū ualde exulcerat linguā, & partes circūcirca sitas, & potus multum calorem in uentre facit.

*Isum.*

Cap. xxxvii.

Isum corticem siccato, tundito, ac cribrato: & ex eo scrupulos v. aut vi. dato, macerans uelut dictum est in passo, & excolans, ac passum ipsum exhibens. Purgat autem magis pituitam. Quam diu uero uolueris ferri uentrem, ne ablues anum aqua, sed linteo deterge. Quum autem satis purgatum te putaueris, laua anum aqua frigida, & manuum ac pedum extremitates aquæ impone, & sistetur fluxus.

*Elaterium.*

Cap. xxxviii.

Elaterium purgat pituitam & bilem. Dato obolos tres cum lacte recens multo heminae unius mensura. At obolus habet siliquas tres.

*Granum cnidium.*

Cap. xxxix.

Granum cnidium purgat magis aquosa ac serosa. Purgat etiam pituitam & bilem moderatè. Est autem feruens & acutissimum. Dantur ex eo grana triginta. Si uero mitius purgare uoles, dato grana uiginti, aut quindecim. Dato autem internam granorum partem tritam cum polenta, & uino immixtam bibere iubeto, à potu uero parum olei rosacei aut melini absorbere oportet, ne fauces exurantur. Præstata autem terere & efformare catapotia cum cocto melle

*Agaricum.*

Cap. xl.

Agaricum purgat pituitam & bilem, sed non acutè. Dantur drachmæ duæ cum aqua mulsæ aut aceto mulso. Est autem stomacho incommodum, eo quod leue sit, & in ipso supernatet.

*Cnici semen.*

Cap. xli.

Cnici semen purgat pituitam, non tamen fortiter. Huius seminis drach. v. tritas mitte in ius gallinæ aut pitisanæ, & excolatum bibendum præbe. Quidam internam Cnici partem drachmæ pondere accipiunt, & terunt cum amygdalis & aniso, & cum melle cocto catapotia formant ac exhibent arquato affectis. Et conueniens quidem, sed leuius est hoc.

*Lathyrus.*

Cap. xlii.

Lathyrus pituitam magis ducit. Danda sunt eius grana xv. maiora, aut uiginti de minoribus. Et qui quidè efficacius purgari debent, his præcipiendum est ut manducent. Qui uero non ualida neq; multa euacuatione opus habent, integra deuorēt, maxime si uitiosum stomachum habet is qui accipit.

*Aristolochia clematidis semen.*

Cap. xliii.

Aristolochia clematidis semen siccum tritum duarum drachmarum pondere bibitur, & purgat pituitam ac bilem. Est autem stomacho gratum.

*Mercurialis.*

Cap. xliiii.

Si mercurialis tenera folia cocta comederis, abunde sterqus expellunt. Si uero decoctum uino mixtum biberis, moderatè sterqus educit.

*Cucumis syluestris.*

Cap. xlv.

Cucumeris syluestris radicis cortex, duorum obolorum, hoc est, siliquarum sex pondere, potuscum aqua mulsæ, ducit pituitam multam citra molestiam, ita ut neq; stomachum

uersu' hoc  
ut mulsa  
Achuaris



machum ledat.

*Styrax.*

Cap. XLVI.

Styrax pinguis flavus datur drachmarum duarum pondere, cum equo pondere terebinthinæ in pilulas coactus ducit pituitam multam citra molestiam.

*Thymus.*

Cap. XLVII.

Thymi cacumina tusa trita dato cum posca, & modico sale: ad drachmarum quatuor aut trium pondus, purgat enim citra molestiam & abunde pituita ac bile.

*Cyclaminus.*

Cap. XLVIII.

Cyclamini radice leuissime trite drachme tres aut quatuor pro uiribus cum aqua mulsa potæ, purgant pituita & bilem. Maxime uero per sudorem purgant. Quare qui bibit reclinari debet, & corpus integumentis ponere, & sudorem exclusionem iuuare.

*Scordium.*

Cap. XLIX.

Scordium tenuissime tritum, duarum drachmarum pondere ex aqua mulsa potum, ducit pituitam.

*Chamæpitys.*

Cap. L.

Chamæpityos drachmæ duæ tritæ, & cum ficibus aut cocto melle in catapotia coactæ & exhibitæ, multam pituitam ducunt.

*Bdellium.*

Cap. LI.

Bdellium arabicum pellucidum & flavum, drachmarum duarum pondere tritum potum, cum aqua mulsa, purgat pituitam.

*Aquam ducentia.*

Cap. LII.

Aquam ducentibus utendum est, & in hydropicis qui ex ascite intercute aqua laborant, & in foeminis quæ diuturno albo fluxu uexantur, & ad fluida ulcera.

*Squama æris.*

Cap. LIII.

Squama æris aquam purgat. Datur drachma una & dimidia cum aqua mulsa. Non solum autem aquam ducit, sed etiam pituitam. Ducunt porro aquam etiā aliqua ex relatis, uelut granum cnidium, & cnicus.

At cucumeris syluestris radix conuenientissima est hydropicis minimeque molestiam affert.

*Euphorbium.*

Cap. LIIII.

Euphorbium ducit quidem pituita, magis uero aqua. Est autem acutissimum inter ea quæ ego noui & feruentissimum. Vnde & colicis datur, & his qui frigidiore uetres habet. Reliquos fortiter turbat, & ualida sium inducit. Miscebis cum ipso aliqua odorata semina, dās ex eo obolos tres cum aqua mulsa. Præstat autem cum melle cocto in catapotia ipsum efformare.

*Chamelæa.*

Cap. LV.

Chamelæa cocta in aqua mulsa & pota, aquosa magis ducit. Purgat autem etiam pituitam & bilem. Immittatur ex ea drachmæ quinque in duas heminas aque, & fiat coctura ad dimidias. In fine cocturæ mellis moderata portio addatur, & modica facta coctura, coletur ac bibendum præbeatur. Aliqui cotusæ tritæ chamelææ drachmas duas cum duplo comæ absinthij committunt, & cum melle formata catapotia præbent.

*Sanguinem purgantia.*

Cap. LVI.

Sanguinem purgat porri capitati succus, mercurialis, uiola alba, malua syluestris, saluia.

*Methodus componendi purgantia phar-*

*maca.*

Cap. LVII.

Quæ quidem per se purgare possunt simplicia pharmaca, talia sunt ueluti expressimus ac præscriptus. Non fuerit autem difficile etiam mixturas ipsorum facere, his qui ex iam prædictis singulorum uires didicerunt. Si quis enim ex relatis duo miscere ue-

lit, dimidium pondus de dosi singulorum accipere oportet. Si uero tria, tertiam iusti ponderis partem. Si uero plura, iuxta eadem proportionem. Facimus aut ipsorum mixturas, ubi non fuerit unus humor qui infestat uelut pituita, aut bilis, aut aqua, sed omnia simul. Et si quidē putauerimus æqualiter redū dare humores, æqualiter ipsa miscemus in compositione. Vbi uero unus plus alijs redundarit, amplius ammiscemus de his quæ talem humorem euacuare possunt. Primum igitur uolo ea mollientia pharmaca aluum subducentia subiungere, quæ in cibo sumuntur. In cibo enim medicamentum optimū est, inquit Hippocrates: quo etiā sanis naturaliter adstrictam aluum habentibus, hæc speculatio utilis fiat. Fortassis autem & his qui se ex morbo recolligunt. Insuper & his qui ex diuturno morbo ægrotant, hæc pharmaca auxiliaria fient, si unum aut alterum simplex pharmacum iucundis edulj fuerit ammixtum, aut ad uentrē molliendum, aut si etiam redundantem humorem paulatim & latenter euacuare uolumus. Incipiamus igitur a potionibus propomata appellatis.

*Vini purgantis bilem præparatio. Ex*

*Theone.*

Cap. LVIII.

Cassia unc. i. scammonia unc. i. uini sextar. vi. Hæc tenuissima trita linteo illigantur, & hoc exacte constrictum in uinum suspendatur, ac sinatur ad dies quinque. Deinde ex hoc uino dato ante cibum potionem perfectam, cum aqua calida. Creditur bilem purgare.

*Vinum pituitam ducens.*

Cap. LIX.

Lathyrinum purgatorum unc. i. spicæ nardi drach. iii. uini sextar. v. præpara uelut prædictum est, & utere. Creditur pituitam leuare.

*Vinum melancholicis commodum.*

Cap. LX.

Polypodij unc. i. tusam, cribratam, & linteo illigatam in uini sextarios v. suspendito. & ad dies septem finito macerari. Et dato potionem uelut dictum est.

*Aliud Vinum polypodites*

Cap. LXI.

Vini dulcissimi sexta. vi. mastiches sextantem, epithymi drach. iiii. radicum polypodij non ueterum de-rasarum lib. ii. radices polypodij purgatas tunde in crassiores partes, & coque cum passo, immisso etiā epithymo ac mastiche. Quū autem ad tertias redactū fuerit, aufer ab igne, & frigesieri sine, & ad excolatū spicæ nardi contusæ ac cribrate scrupulos iiii. insperge. præstat autem hanc in mortario counire, deinde fistilibus paruis picatis excipere, & osculo uasorum oblito adseruare. Dabis autem in prandio potionem magnam inter medios cibos, aqua calida temperatam. Est hoc iucundissimum & efficax. Preparatur hoc in Babylone Phœnices, laudaturque ac quoquo uersus nauibus aduehitur.

*Vinum mulsum stercus exigēs.*

Cap. LXII.

Vini sextarios v. mellis sextar. i. mastiches quadrantē. Mastichen tritam & linteo illigatam in uino mulso suspende, & ad dies septem macerari sine. Et dato ante cibum potionem unam calida aqua temperatam. Optime hoc stercus educit, & stomacho commodū est. Euacuat etiam pituitam.

*Vinum mulsum flauam bilem ducens.*

Cap. LXIII.

Scammonie dra. i. spicæ nardi drach. i. tusa cribrata & linteo illigata, in uini sextarijs v. macerato, & mellis sextar. i. & uitior.

*Vinum mulsum pituitam ducens.*

Cap. LXIIII.

Cnici seminis purgati drach. iiii. & uini sextar. v. &

g 3 mel



mellis sexta. i. accipito. Et cnicum in crassas partes co-  
tusum ac linco illigatum macerato, utitorq; uelut di-  
ctum est.

*Vinum mulsum atrā bilē euacuans.* Cap. LXV.  
Polypodij drach. iiii. Vini sextar. v. mellis sextar. i. tun-  
de, cribra, macera, & utere.

*Conditum ad flauam bilem.* Cap. LXVI.  
Piperis drach. iiii. scammoniae unc. i. seminis apij drac.  
i. uini sextar. v. mellis sextar. i. terito species per se pri-  
mum, deinde etiam cum melle, & postea uinum ad-  
de, & sine ad dies quinq; & utere.

*Conditum pituitosis.* Cap. LXVII.  
Lathyridum unc. i. piperis unc. i. seminis anisi, apij, sin-  
gulorum unc. i. uini sextar. v. mellis sextar. i. prae-  
para uelut dictum est, & utere.

*Conditum melancholicis.* Cap. LXVIII.  
Polypodij unc. i. piperis unc. i. seminis apij drach. i. Vi-  
ni sextar. v. mellis sextar. i. prae-para uelut dictum est  
& utere.

*Absinthati prae- paratio flatus & stercora  
euacuans.* Cap. LXIX.  
Ligustici drach. i. s. cumini drach. i. spicae nardi scrup. ii.  
floris iunci odorati scrup. vi. mastiches scrup. vi. Vini  
sextar. v. mellis sextar. i. tusa ac cribrata terito cum  
melle, & uinum ammisce, excipe & utere post dies  
quinque ante prandium.

*Absinthatum flauam bilē ducens.* Cap. LXX.  
Costi drach. i. mastiches drach. iiii. rosarum siccarum  
drach. ii. spicae nardi drach. ii. floris iunci odorati dra-  
chmā i. aloes unc. i. scammoniae unc. i. mellis sextar.  
i. uini sextar. v. prae-para & utere uelut dictum est.

*Absinthatū ad pituitosos.* Cap. LXXI.  
Mastiches drach. iiii. costi drach. iiii. folij indici drach.  
i. spicae nardi drachm. i. floris iunci odorati drach. i.  
casiae drach. i. polypodij unc. i. mellis sextar. i. lathy-  
ridum purgatorum unc. i. uini sextar. v. prae-para &  
utere uelut dictum est.

*Rosatū flauā bilē ducens.* Cap. LXXII.  
Rosarum exungulum recentij lib. i. uini ueteris sex-  
tar. vi. mellis sextar. i. Rosae ad diem unam praesicca-  
tae mittuntur in uinum, & macerantur per dies no-  
uem. Deinde uinū excolatur & adijcitur melli prius  
trito cum scammoniae unc. i. oportet autem tundere  
ac cribrare scammoniam, atq; sic leuigare cum mel-  
le. Postea uero recondatur in uasa, quae exacte coo-  
perta suspendes in puteum aque frigidae, & fines per  
dies septem aut nouem. Deinde extrahe & alios tri-  
ginta dies sine, & sic propomate utere.

*Rosatū pituitam, & serosum ac atrā  
bilis humorē euacuans.* Cap. LXXIII.  
Si praecedens descriptio acceperit grani cnicij unc. i. abs-  
que scammonia, euacuat serosum humorem & pi-  
tuitam. Si lathyrida solum, pituitam euacuat. Si epi-  
thymum solum, atrae bilis humorem expurgat.

*Mellis rosacei purgatorij prae-para-  
tio.* Cap. LXXIII.  
Mellis lib. i. succi rosarū lib. i. mastiches drach. iiii. pi-  
peris drach. ii. zingiberis drach. ii. scammoniae scrup.  
viii. coquito mel cum rosarum succo ad compagē  
mellis liquidioris. Deinde insperge scammoniam &  
mastichen leuissime trita, & parum coque, & ablata  
ab igne cum reliquis in mortario unito & sepōito,  
& dato cochlearium. Euacuat flauam bilem. Quidā  
uero simpliciore prae-parationem facere uolentes,

praemacerant modica aqua scammonia, deinde feruē-  
ciūt: & detracto superstate ipsius co-cremēto excolār,  
& leuigatā ad mel rosaceū adijciūt, & simul coquūt  
uelut dictū est. Si uero lathyridū unc. i. acceperit prae-  
dicta prae- paratio mellis rosacei, absque scammonia,  
purgat pituitam. Si uero polypodij acceperit unc. i.  
atrae bilis humorem euacuat. Verum efficacior fit, si  
pro polypodio epithymum acceperit.

*Aceti purgatorij prae- paratio.* Cap. LXXV.  
Scammoniae unc. i. aceti sextarios v. terito simul, & fi-  
nito ad dies quinque, & dato ad intinctus cum cibo  
cochlearium i. aut ii. purgat flauam bilem. Si ue-  
ro pro scammonia, inieceris lathyridū un. i. purgat  
pituitam. Si uero epithymi unc. i. inieceris, euacuat  
atrae bilis humorem.

*Aceti mulsi purgatorij prae- paratio.* Cap. LXXVI.  
Mellis despumati sexta. i. aceti acerrimi sextar. i. coqui-  
to simul usque ad mellis compagem, deinde adijce  
epipetri triti ac cribrati unc. i. utere ad intinctus: aut  
cū aqua dato bibere cochlearia. i. circa horam tertiā  
ieiunis. Euacuat bilem, si uero non affuerit epipetru,  
scammoniae inijce unc. i. Aliud acetum mulsum. Mel-  
lis despumati sextar. i. aceti sextar. i. coquito simul  
ad compagem. Deinde inijce cnici internam partem  
purgatam & tritam pondere unc. i. & sine ad dies  
quinq; et utere ut uoles. purgat pituitā. Aliud. Mellis  
& aceti singulorū sextar. i. coquito, & thymi leuissi-  
mē triti un. i. addito, & finito per diem, ac uitor, eua-  
cuat atrae bilis humorem. Omnia uero quae prae-  
dictis aceti mulsi prae-parationibus inijciuntur, lin-  
teolo illigata macerentur.

*Acetum mulsum purgans omnes uitia-  
tos humores.* Cap. LXXVII.  
Comae hyssopi sesquiunciam, origani un. i. pulegij ses-  
quiunciam, marrubij un. i. epithymi, seminis cnici, cacu-  
minū thymi, agarici singulorū un. i. polypodij sexta-  
rē, scammoniae un. i. scrup. vi. aceti sequisextariū, aque  
sexta. i. mellis lib. ii. sapē sexcūcē. Herbas praemacera-  
tas aceto & aqua ad tertias decoquito & excolato,  
& mel addito, ac rursus coquito ad bonā cōpagē. Et  
scammonia, epithymum, agaricū, trita ac tenuissimo  
cribro excreta, in mortario ammisce. Et ubi mode-  
ratē purgare uolueris, scrupulos x. exhibeto. medio-  
uere modo scrup. xx. At uero fortibus perfectā do-  
sim exhibere potes, unciam i. Quidā etiā alypiadis un-  
ciā i. addūt. Aliud flatus euacuās. Aceti sextar. i. mel-  
lis sexta. i. bacarū iuniperi dra. iiii. piperis un. i. zin-  
giberis un. i. petroselinī drach. iiii. seminis apij, am-  
mij, ligustici, anisi, epithymi, singulorū drach. iiii.  
cumini drach. ii. seminis anethi drach. ii. polypodij  
unc. i. prae-para & utere uelut praedictum est. Con-  
uenit colicis.

*Acetum mulsum quod colicis ac nephriti-  
cis per sedem infunditur.* Cap. LXXVIII.  
Centaurij unc. i. alypiadis recentis sextatē, rutae uiri-  
dis sextantē, marrubij, agarici, casiae, iridis, hyssopi,  
pulegij, singulorum drach. iiii. scillae unc. i. aceti sex-  
ta. iiii. mellis sextar. i. omnia aceto macerata ad ter-  
tias coquito & colato, & adiecto melle ad mellis li-  
quidioris cōpagē coquito. Deinde scammonie tenuis-  
simē tritae un. i. spicae nardi unc. i. purgatorij medica-  
menti ex foeniculo unc. i. inspergito, & unitis uitor  
hoc modo, ubi puacuaris colicū per clysterē stercora  
educētē, accipe aceti mulsi cochleariū, & dissolue  
cum



cum succo pitisanæ, & infunde. Vtere similiter & in nephriticis pituitosioribus. Euacuat pituitam citra molestiam & sanat.

*Acetum mulsum amarum.*

Cap. LXXXIX.

Foeniculi uiridis unā cum radicibus fasciculū .i. apij cū radicibus, rutæ uiridis singulorum fasciculum unū, acetū sextar. .ii. & dimidium, hoc est libras .v. mellis sesquilibram. Coquito herbas cum aceto ad tertias & excolato, & mel ad acetum indito, & coquito donec mellis liquidioris cōpagem habuerit. Deinde aloës primariæ unc. .i. in mortario terito ac cribrato, & ad ipsam paulatim acetū mulsum addito, unito, excipito ac utitor: exhibetur ex eo cochlearium unum, ita ut ab ipso absorbeatur aqua calida. Caput egregie purgat. Est autem & stomacho gratū. Acetum mulsum uentrem emolliens, Prosomilitæ, pulegij, origani, thymbræ syluestris, polypodij, singulorum unc. .i. radicū apij drach. .iiii. radicū anethi scrup. .vi. agarici, epithymi, scammoniae, singul. unc. .i. mellis sextar. .i. acetū sextar. .i. macerato species & coquito uelut acetum mulsum. Vbi uero deuenierit ad bonam compagem, tollito ab igne, & adijce scammoniam, epithymum, & agaricū. Et dato quadrantem cum aqua calida.

*Posca aluum emolliens.*

Cap. LXXX.

Cymini quadrantem, hyssopi sesquiunciam, ammiij sexquiunciam, pulegij sesquiunciam, petroselini drach. .iiii. cacuminum thymi drach. .iiii. zingiberis unc. .i. seminis cnici unc. .i. piperis drach. .iiii. epithymi drach. .iiii. salis capadocici dodrantem. Tundito & cribrato, & aridum seruato. Vfus tempore dato cochlearium .i. ex posca.

*Alia posca ualde clara.*

Cap. LXXXI.

Cumini quadrantem, pulegij sesquiunciam, foeniculi sextantē, seminis apij sextantem, anisi sextantē scrup. .viii. scammoniae trientem, epithymi quadrantem, salis communis bessē aut libram .i. Tundito, cribrato, & dato cochlea. .i. ex posca, purgat imperuerse.

*Gari purgatorij preparatio.*

Cap. LXXXII.

Scammoniae drach. .iiii. piperis grana .l. gari nigri quadrantem, misce, utere ad intinctus, aut quomodo uolueris, purgat bilem. Aliud. Cnici grana .xx. piperis grana .l. gari quadrantem. Internam cnici partem tritam unito ac utitor. purgat pituitam. Si uero pro cnico adieceris lathyridas, efficacius facies. Si uero polypodij drach. .iiii. inieceris, atræ bilis humorem euacuat. Efficacius autem euadit, si pro polypodio, epithymi drach. .iiii. aut tres inieceris.

*Mellis emollientis preparatio.*

Cap. LXXXIII.

Foeniculi uiridis manipulū .i. aquæ sextar. .iii. coquito ad tertias, colato, & adijcito mellis lib. .i. & coquito ad cōpagem mellis, et dato ex eo cochlearia. .iii. purgat bilem flauā. Si uero pro foeniculo, seminis cnici interiorem partē adieceris uncia .i. pondere, purgat pituitam. Si uero polypodium aut epithymū eodē pondere simul coques, purgat atræ bilis humorem.

*Garum aquosum.*

Cap. LXXXIII.

Gari unc. .i. piperis grana .l. seminis apij obolum .i. hoc est siliquas .iii. mellis cochlea. .i. aquæ quadrantem, scammoniae scrupu. .i. s. aut .ii. Reliquis coctis & ab igne ablati ammisceto scammoniam, & dato ante cibum. Si uero pro scammonia, seminis cnici granorum uiginti internam partem adieceris, purgat pituitam. Si uero polypodij drach. .iiii. adieceris, purgat

atræ bilis humorem.

*Garum uinosum purgatorium.*

Cap. LXXXV.

Gari conchulas .ii. uini conchulam .i. piperis grana .xx. ligustici scrup. .i. scammonie scrup. .i. mellis parū, utere. Purgat bilem. Si uero cnici granorum .xx. internam partem inieceris pro scammonia, purgat pituitam. Si polypodij drach. .iiii. atram bilem.

*Garum acetosum purgatorium.*

Cap. LXXXVI.

Seminis apij drac. .i. piperis grana .l. cumini obol. .i. succi cyrenaici siue laseris tantundē, scammoniae scrup. .i. gari unc. .i. acetū quadrantem, utere, purgat bilem. Si uero pro scammonia, cnici granorum uiginti internam partem adieceris, purgat pituitā. Si uero polypodij drach. .iiii. atræ bilis humorem euacuat.

*Iuscula emollientia.*

Cap. LXXXVII.

Aquæ sextar. .i. olei conchulæ .i. gari parū, salis pauillum, anethi modicū, omnia donec succulēta fiant coquito. Deinde granorū cnici .xx. internā partem indito, & dato. Euacuat pituitam. Si uero polypodij drach. .iiii. confusas ac cribratas insperferis iusculo perdicis aut phasiani, purgat atræ bilis humorem. At uero scammonia non probo in iuscula cōiectam, eò quod experimento compererim inidoneam esse.

*Lac purgatorium.*

Cap. LXXXVIII.

Lactis asinini aut caprini heminam .i. scammoniae scrup. .ii. misceto ac exhibeto. purgat bilem. Si uero cnici granorum .xx. internam partē inieceris, euacuat pituitam. At uero polypodium aut epithymum non probo ut lacti misceantur, eò quod tingant lac, & nō potest hoc latere accipientem. Pleriq; enim ob timiditatem purgari non uolunt.

*Oliuæ purgatoria.*

Cap. LXXXIX.

Piperis drach. .i. epithymi drach. .ii. silphij drac. .i. mente uiridis drach. .i. comæ pulegij drach. .i. cymini drach. .i. rutæ drach. .i. scammoniae unc. .i. palmularum pinguium sextantem, mellis sextar. .i. acetū sextarij dimidium, oliuas muria conditas .c. xx. numero, omnia prædicta per se tenuissimè terito, & deinde cū aceto mulso. Postea oliuas singulas ter lacinatas inijcito, & finito ad paucos dies, ac utitor. dato in cibo oliuas tres, & iusculi cochlearium .i. aut .ii. pro uiribus.

*Oxyporia purgatoria.*

Cap. xc.

Si ad concoctorium medicamentum quod ex malis cotoneis parari solet, cochlearij unius mensura acceptum, ammiscueris scammonie scrup. .ii. flauā bilem citra molestiam euacuabis. Si uero lathyridum grana .xx. addideris, purgat pituitam. Si polypodij aut epithymi drach. .iiii. addideris, purgat atram bilem. Similiter autē si quoq; diospolitico cōcoctorio pharmaco uteris, idem efficies, & maximè in quibus pituita in thorace residet. Si uero ad cōcoctorium ex calamintha pharmacum ammiscueris medicamenta purgantia, euacuabis omnem citra cutē corporis uisiosum humorem, lepras, impetigines, & similia.

*Oxyporium ex palmulis.*

Cap. xci.

Zingiberis, piperis, cumini, petroselini, singulorū unc. .i. scammoniae in fermento assatæ ac tenuissimè tritæ unc. .ii. s. palmularū pinguiū carnis trictem, foliorū rutæ unc. .i. mellis libr. .i. acetū sextar. .i. Coquito mel & acetum & palmulas, donec reliqua fiat tertia acetū pars. Deinde rutam cū palmulis terito, & arida leuissimè trita inspergito ac unito, & paulatim acetū mulsum coctū addito, unito ac utitor, uelut admirando & multa experientia cognito pharmaco. Perfecta do-



sis sunt cochlea. ii. ad adstrictam aluum, dum adhuc in uigore est medicamentum. Si uero nō ualde fuerit aluus adstricta, pro mensura illius adstrictionis exhibendū est pharmacū, aliquando cochleariū i. s. aliquādo i. solum. Subducit egregiē flauam bilem. Quapropter & in morbo regio utiliter exhibetur, & tertianarijs, ubi cōcoctio bona in urinis apparuerit, purgat etiā pituitā moderate. Vtere cōfidēter in omni tēpore uelut imperuerso ac minime curioso. Ego uero etiam his qui absq; rigore febricitant dedi, postquā apparuit cōcoctio in urinis, & cōfestim sanati sunt. In quibus autē atram bilē purgare uolueris, adde ad prædictam dosim, epithymi scrup. i. aut pro uiribus. Si uero pituita multa insidet, adijce agarici aut isij scrup. i. purgat enim moderate pituitā.

*Purgatorium ex cotoneis malis.* Cap. xcii.

Malorum cotoneorum maturorum, magnorū, odoratorum, fermento oblicorum & assatorū, carnis purgatae trientem, mellis despumati quincuncem, piperis drach. ii. scammonie drach. vi. singula per se terito & unito, ac exhibeto cochlear i.

*Purgatorium ex citrio. Oribasij.* Cap. xciii.

Purgat hoc caput, facit ad stomachicos, coeliacos, et qui non possunt forte purgatorium ferre propter imbecillitatem. Vnde etiam pueris citra noxā datur. Est enim stomacho commodum. Citrii corticis ac carnis lib. i. aquæ sextar. i. s. mellis sextarii dimidium, piperis unc. i. scammonie unc. i. Citrium in tenues partes secato, & cum aqua ad tertias coquito, deinde colato, & mel ad decoctū adijcito, ac coquito ad bonam compagem, & reliquias coctorum citriorum terito, ipsiq; arida tenuissimē trita inspergito, et ubi simul triueris, coctam aquam illam mulsam adijcito, & unitis utitor, cochlear i. exhibens.

*Purgatorium ex fœniculo ualde bonum.* Cap. xciiii.

Epithymi, zingiberis, piperis, scammonie, singulorum unc. i. fœniculi uiridis, rutæ uiridis, apij radicem uiridum, singulorum quadrantem, aquæ sextar. iiii. mellis libr. iiii. decocto ad tertias redacto adijce mel, & coque ad bonam cōpagem. Deinde insperge arida, & exhibe cochlear i. magnum.

*Aliud ualde stomacho gratum.* Cap. xc v.

Fœniculi, cumini, pulegij, apij, singulorum manipulū, aquæ sextar. iiii. coquito ad tertias, & colato, & tantundem mellis addito, & coquito ad mellis compagem, & inspergito in mortario scammonie leuissimē tritæ unc. i. piperis unc. i. mastiches tritæ drach. iiii. unito datoq; cochleare i. Conuenit flatuosis.

*Purgatorium ex fœniculo quod parari solet ad atram bilem.* Cap. xcvi.

Scammonie sextantem, zingiberis, piperis, singulorum unc. i. petroselinī scrup. xii. corticis ueratri nigri scrup. vi. epithymi unc. i. mellis libras iiii. succi fœniculi libr. iiii. Coquito succum cū melle ad mellis compagē, et affundito paulatim ad arida tusa ac cribrata in mortario, & unitis utitor. Datur ex eo cochlear i.

*Purgatorium atræ bilis. Oribasij.* Cap. xc vii.

Aquæ sextar. iiii. mellis dodrantē, epithymi unc. i. epithymū tusum ac cribratum inspergito, ubi illa simul ad tertias decoxeris. Dato bibendum pro uiribus. Mihi uero uidetur quarta pars exhibenda esse. his autem qui bono habitu præditi sunt, dimidium.

*Aliud purgās atram ac flauam bilem.* Cap. xc viii.

Scammonie, epithymi, singulorū sesquiunciā, petro-

selini, zingiberis, mentæ, singulorum drach. ii. excipe melle, & exhibe nucis ponticæ magnitudine.

*Pastillus flauam bilem purgans.* Cap. xcix.

Piperis, mastiches, nucum pinearum, passularum enucleatarum, singulorū grana x. cumini grana xv. scammonie scrup. ii. plus minus, mellis parum, trita simul dato, uelut pastillum. Huius dosis una est, purgat citra molestiam.

*Buccella purgatoria.* Cap. c.

Fermenti ex similagine libras ii. scammonie unc. i. seminis fœniculi, cumini, folij malabathri, singulorū filiquas iiii. piperis grana xxxiii. salis communis parum, olei & gari cochlear. ii. arida contundito ac cribrato, et cū fermento mollito, & facias panes paruos duplam latitudinem miliarefij habentes. Torreto in clibano, & exhibeto perfectam dosim sextantem ex hoc pane edendam, quocunq; quis uoluerit modo, saltem ut ieiunus utatur. Est enim maximē alienum ab omni molestia, purgat bilem.

*Aloëdaria citra molestiam purgantia.* Cap. ci.

Aloës quadratē, agarici unc. ii. s. scammonie unc. i. bdellij drach. iiii. gummi uermiculati sextantē, excipe succo brassicæ. In his uero qui humore flacidū stomachum habent, succo carnis citrii, & forma pilulas ciceris magni magnitudine, & dato perfectis septē ieiunis. Si uero uoles, etiā ante cœnā, & post cœnam. Si autem mollire uolueris, tria dabis ex his catapotia. Aliud sine molestia purgans. Scammonie sextantem, bdellij unc. i. aloës drac. iiii. gummi drac. iiii. & cum succo brassicæ fac catapotia ciceris magnitudine, & exhibe post cœnam. Si mollire uolueris, tria: Si uero purgare, septem ut plurimum, aut quinq;.

*Pharmacum pituitam ducens. Oribasij.* Cap. cii.

Baccarum lauri recentium sextantem, euphorbij unc. i. mellis quod satis est, ut eclegmatis formā habeat. Datur cochlearij dimidiū. Redundantibus humoribus plus datū plus profuit. Vtere uelut optimo. Aliud pituitam euacuās. Seminis anisi, piperis, casiae, medullæ colocynthis, singulorum drach. iiii. grani cnidij, seminis cnici, singulo drach. iiii. mellis quod satis est, ut eclegma fiat. dato perfectis cochlear i. s. Aliud. Anisi, apij, ammi, piperis, grani cnidij, seminis cnici, lathyridum, singulorum drach. iiii. casiae drachm. ii. mellis despumati quod satis est. Perfecta dosis sunt cochlear. ii.

*Purgatorium atræ bilis. Philagrij.* Cap. ciii.

Zingiberis drach. i. seminis apij drach. ii. succi cyrenaisci, piperis, ligustici, singulorū drach. i. epithymi drac. iiii. excipe melle ut eclegma fiat, & exhibe cochlear. ii. Aliud. Epithymi, agarici, aloës, singulorū drac. iiii. corticis ueratri nigri drach. i. hyssopi, iridis, absinthij succi, singulorum drach. iiii. bdellij, gummi, utriusq; drach. i. Si uero nō affuerit absinthij succus, adijce comētantundem, & excipe melle. & dato pro uiribus. Euacuat atræ bilis humorē, itemq; pituitā.

*Bilis & pituitæ, & atræ bilis ac reliquorum humorum commune purgatorium.* Cap. ciuii.

Lathyridum, medullæ colocynthis, foliorum chamaelæ sicciorū, scammonie, epithymi, polypodij, anisi, singulorum drach. x. cacuminum thymi, piperis, mastiches, carpobalsami, casiae, seminis apij, chamaepityos siccae, singulorum drac. v. absinthij succi aut comæ drach. v. mellis quod satis est ad eclegma. Dato cochlear i. aut plus pro uiribus. Vtere autem hoc non



non in omnibus, sed in quibus coniectaueris omnes humores æqualiter in corpore redundare.

*Aloëdaria emollientia ex rosaceo melle. Philagrij.*

Cap. cv.

Aloës sexcūcem, costi, spicæ nardi, carpobalsami, floris iunci odorati, singulorum unc. i. casia unc. i. agarici drach. iiii. croci drach. iiii. s. comæ centaurij scrup. iiii. mellis sextantem, succi rosarū trientē, epithymi unc. i. rhei scrup. viii. asari scrup. iiii. ligni balsami scrup. vi. mastiches scrup. viii. excipe melle rosaceo, & da pro uiribus. Aliud ex rosaceo melle, molliens uē trem sine omni molestia. Vtere uero ipso ad articulos, & maximè coxendicū dolores, itemq; lumborum. Aperit etiā iecoris obstructions. Isij scrup. viii. agarici drach. iiii. aloës sextantē, spicæ nardi scrup. viii. floris iunci odorati scrup. viii. croci scrup. iiii. casia scrup. xvi. costi scrup. viii. carpobalsami scrup. viii. mellis rosacei quadrantē & scrup. viii. terito & formato catapotia cū melle rosaceo, & quinq; exhibe ro, post cœnam quotidie si uoles, aut alternis diebus, aut prout uisum fuerit. Exterget enim stomachum & articulos, præcipue uero purgat pituitam. Est autem consuetudo more prandendū ac cœnandū. Aliud bilem & pituitam ducens. Absinthij comæ tusæ ac cribratæ, aloës tenuissimè tritæ, utriusq; unc. i. excipe succo tithymali, maximè myrsinitæ, & efformato catapotia phaselij magnitudine. & dato iiii. tātum.

*Aloëdarium ex Philagrio.*

Cap. cvi.

Purgat hoc bilem & pituitā. Colocynthidis medullæ, aloës, scammoniæ, singulorū drach. v. succi aut comæ absinthij drach. v. excipe succo brassicæ, & fac catapotia ciceris magnitudine, & exhibe perfectis xxi. Aliud, & ipsum multo experimento cognitum. Euacuat autē tres humores. Aloës, epithymi, scammoniæ, singul. drach. ii. colocynthidis, agarici utriusq; drach. i. excipe succo brassicæ. Et dato catapotia xv. Aliud quod in Tyro præparatur. Scamoniæ sextantem, aloës drach. i. mastiches, bdellij, piperis, absinthij, singulorum drachm. i. excipe succo medij citrij ac corticis, & fac catapotia. Et dato septem aut nouē. Si uero uoles probe purgare, habeant catapotia exhibenda pondere scrup. iiii. s. & amplius.

*Aloëdarium Oribasij.*

Cap. cvii.

Conuenit hoc maximè lippientibus. Euacuat autē magis bilē flauā & atram. Scamoniæ unc. i. corticis uerratri nigri unc. i. salis ammoniaci drach. i. radicis panacis drach. iiii. piperis, pulegij, utriusq; drach. i. efformato cū aqua pilulas fabis græcis similes. Et dato ex eis septē mediā dosim, ita ut habeāt septē, drachmam unā & obolos duos. Aliud, Oribasij. Aloës sextantem, spicæ nardi, asari, mastiches, croci, xylobalsami, sing. drach. vi. casia drach. xii. epithymi drach. xii. formato catapotia erui magnitudine, cū decocto pulegij. Et dato xxi. Hoc quartanarios sanat. Possunt etiā cum melle cocto efformari.

*Sal purgatorius.*

Cap. cviii.

Salis ammoniaci sexcūcē, silphij drach. ii. seminis apij drach. ii. zingiberis drach. i. piperis drach. iiii. folij indici, spicæ nardi, pulegij, singul. drach. i. scammoniæ unc. i. Datur cochleariū unū. Euacuat bilem. Aliud. Salis ammoniaci sexcūcē, seminis apij drach. i. zingiberis drach. ii. piperis drach. iiii. spicæ nardi drach. i. pulegij scrup. iiii. s. folij scrup. i. lathyridū unc. i. dato cochlearium. Euacuat pituitā. Aliud. Salis ammo-

niaci sexcūcē, zingiberis drach. iiii. piperis drach. ii. anisi, seminis apij, utriusq; drach. ii. folij scrup. i. epithymi unc. i. dato cochleariū. Euacuat atræ bilis humorem. Sal subducens & euacuans circūsitam in uentre ac intestinis pituitam, & reliquos humores. Purgat moderatē etiā bilem. Cōueniētiss. est arthriticis, uertiginosis. hoc usus est quidā stomachicus, & frequēter ex comitiali morbo cadere solitus, & ingentes gratias egit. A morbis uero præseruat familiariter ipso utentes. Petroselinij drach. iiii. mastiches scrup. iiii. zingiberis drach. iiii. piperis, euphorbij, utriusq; scrup. vi. salis ammoniaci drach. x. scamoniæ drach. vi. Datur cochlearij dimidiū in prædio, cū carnis uolucris aut gallinæ, aut piscis, ad intinctus. Sit autē pondus scrup. iiii. s. Si uero efficacius purgare uoles, dato ieiuno mane cū succo ptisanæ, aut cum aqua mulsa, scrup. vi. fortioribus etiā vii. dare potes. Debilioribus uero scrup. iiii. aut iiii. s. Aliud purgatoriū purgās citra periculū non euerrens stomachū. Datur in omni tempore, & omni ætati, & pueris. Educit stercus & omnē materiam corruptā, a capite usq; ad ungues. Remouet furfures & reliquas circa caput nascētes pustulas. Facit ad uertiginē, lippitēs. Medetur omnibus circa cutē pustulis. Sanāt tertianam, quartanam, quotidianā, in interuallis exacerbationum datum, ubi concoctio bona in urinis apparuerit. Bilem autē præcipuē euacuat. Habet hoc modo. Zingiberis, petroselinij, epithymi, silphij, ammi, seminis apij, cumini, ligustici, piperis, singul. drach. iiii. scamoniæ quadrantem & uncia dimidium. salis ammoniaci tosti septuncē. Torrero salem ac tundo cū reliquis. Scammoniā uero tritam cribratam unito in mortario, & dato scrup. ix. cū succo ptisanæ aut aqua mulsa meraciore. Aliud cōsimile, acutius experimento constans, imperuersum. euacuat magis bilem. Ammi scrup. vi. seminis apij scrup. iiii. piperis, petroselinij, epithymi, cumini, singulorum scrup. iiii. s. scammoniæ unc. i. salis cōmunis quincuncem, salis ammoniaci trientem, datur cochlearium cū ptisana. Aliud experimento constans ualde bonum. Epithymi scrup. x. v. cacuminū thymi scrup. vii. salis ammoniaci scrup. viii. piperis scrup. ii. cumini Aethiopici, anisi, utriusq; scrup. ii. mastiches scrup. xii. contusa trita adseruato. Vsus autē tēpore scammoniæ scrup. ii. sumito, ac terito cū modico melle, et adijcito aridi triti adseruati medicamenti scrup. ii. tantū, & unito ac dato cum ptisanæ succo aut aqua mulsa.

*Purgatoriū pituitam ducens. Diogenis.*

Cap. cix.

Euphorbij, piperis, salis ammoniaci, singulorū unc. i. terito & redigito in puluillum, & dato in ouo sorbili cochlearij dimidium. hoc purgat pituitam solum. Dosis perfecta sunt scrup. iiii. s. Aliud flauam bilem purgans. Scammoniæ unc. i. costi, spicæ nardi, utriusque scrup. iiii. s. radicis rubiæ leuissimè tritæ scrup. ii. perfecta dosis sunt scrup. iiii. media ii. minima i. Aliud atram bilem euacuans. Scammoniæ in malo assatæ drach. v. costi, spicæ nardi, utriusque scrup. iiii. s. cariophylli scrup. i. s. radicis rubiæ scrup. ii. epithymi scrup. ii. perfecta dosis scrup. vi. media iiii. s. minima iiii.

*Purgatorium aquam ducens. Oribasij.*

Cap. cx.

Ducit hoc item pituitam, piperis, seminis rutæ, scobis siue ramentorum eboris, euphorbij, æquales partes. Dantur scrup. iiii. cū aqua mulsa aut cōdito, facit & ad colicos



colicos & hydropicos. Aliud aquam ducēs. Petro-  
selini, anisi, cacuminū thymi, singulorū drach. iiii. fo-  
liorum chamelææ siccorum drach. x. mellis quod sa-  
tis est ut eclegma fiat. Dato perfectā dosim cochlear.  
iiii. s. Si uero efficacius facere uoles, ammisce prædi-  
ctis squamę æris drach. vi. Et dato perfectā dosim  
cochlear. iiii.

De Hieris.

Cap. cxi.

Hiera Logadij. Medullę colocynthidis sextantē & un-  
cię dimidium, scillæ assatæ, agarici, ammoniaci thy-  
miamatis, thymi, scamoniæ, singulorū drach. x. corticis  
ueratri nigri, hyperici, utriusque drach. x. epithymi,  
bdelli, polypodij sicci, aloës, chamædryos, marrubij,  
casia, singulorū unc. i. myrrhæ troglodyticę, piperis  
albi, longi, nigri, cinamomi, croci, opopanacis, sagape-  
ni, castorij petroselini, aristolochiæ longæ, sing. drach.  
iiii. excipe melle. Dosim perfecta sunt drach. iiii. me-  
dia iiii. minima ii. adijce ad dosim dum exhibitu-  
rus es salis tenuissimę triti cochlearij dimidium.

Purgatorium citra molestiam purgās. Cap. cxii.

Facit ad ischiadicos, & qui per circuitū diuturnē uexā-  
tur. Medullę colocynthidis unc. i. nitri sextantē. re-  
frito probē, & dato robustis drach. i. cū aquę mulsę  
potione magna ieiunis. Debilibus uero siliquas nō  
uē. Vtere cōfidenter. Aliud eximium. Ad principia in-  
sanix, melancholicis, paralyticis, ischiadicis, uertigino-  
sis, comitiali morbo laborantibus, alopecijs, capitis  
doloribus. Veratri nigri, scamoniæ, utriusque drach.  
viii. salis ammoniaci drach. iiii. gummi drach. i. effor-  
mato catapotia ciceris magnitudine cū succo brasia-  
cæ, & dato pfectis scrup. v. Media dosim sunt scrup. iiii.  
Minima iiii. his qui ualde debiles sunt. Est hæc descri-  
ptio Oribasij, cap. lxxvii. desunt autem huic species  
tres. Purgatoriū medicamentū, Profomilitæ, epithy-  
mi quadrantē, isij unc. i. agarici drach. iiii. euphorbij  
drach. vi. spicæ nardi, folij, costij, piperis, singulorum  
drach. xxx. caryophylli scrup. vi. Datur ex hoc scrup.  
vi. cum aqua mulsā. Si uero bilem flauam repperis  
cum alijs duobus humoribus redundantem, adde ad  
hanc dosim usus tempore etiam scammoniam, quan-  
tum satis esse iudicaueris pro uiribus. Habet autem  
hæc dosim, isij siliquas quinq, epithymi scrup. i. s. a-  
garici siliquas ii. s. euphorbij siliquas iiii.

Hiera Galeni.

Cap. cxiii.

Medullę colocynthidis sextantē & uncię dimidium,  
chamædryos, agarici, scillæ assatæ, ammoniaci thy-  
miamatis, scamoniæ, corticis ueratri nigri, stœcha-  
dis, hyperici, singulorū sextantē, epithymi, euphor-  
bij, utriusque drach. viii. polypodij sicci, bdelli, aloës,  
marrubij, casia, singulorū sextantē. myrrhæ tro-  
godyticę, sagapeni, croci, aristolochiæ longæ, pipe-  
ris albi, longi, cōmunis, cinamomi, opopanacis, ca-  
storij, petroselini, singulorū drach. iiii. Mellis quod  
satis est. Dato perfectā dosim drach. iiii. Mediam  
iii. Minimam ii. cū aqua mulsā & salis tenuissimę  
triti cochleario dimidio. Maxima porrō est huius uti-  
litas: purgat enim ex profundo uarios humores ex-  
cellēter, ita ut neq, exolutionē, neq, tribulationē, ne-  
que debilitatē, neq, inappetentiā, neq, aliā angustiam  
ægro accipienti exhibeat. Sed potius facile sperantes  
& hilares & robustos efficit, ut mirabilis sit ipsius  
excellentiā. Sanat itaq, hemicranicas affectiones, uer-  
tiginēs, comitialē morbū, insanīā, melancholiā, lethar-  
gum & similia, hebetudinē uisus, grauitatē auditus,

uocem interceptam, anhelosos, stomachicos, affectio-  
nes antiquas, splenicos, nephriticos, colicos, ischiadi-  
cos, arthriticos, podagricos. Ducit menses. Conuenit  
tremulis, & resolutis, impetiginem feram, & omnes  
circa cutem corporis nascentes pustulas, & elephan-  
tiasim, & febres diuturnas per circuitum repetentes  
sanat, & omnia maligna ulcera.

Hiera Archigenis, ex epistola ad Marsum de atra  
bile.

Cap. cxiiii.

Medullę colocynthidis sextantē & uncię dimidium,  
chamædryos, agarici, marrubij, stœchadis, sing. drach.  
x. opopanacis unc. i. sagapeni unc. i. petroselini, ari-  
stolochiæ rotundę, piperis albi, sing. drach. v. cinamo-  
mi, spicæ nardi, myrrhæ troglodyticę, polij, croci,  
singulorū drach. iiii. excipe melle despumato, ut habeat  
strigmētitiā crassitudinē, & repone in uitreo uase. p-  
fecta dosim sunt drach. iiii. (In alio exēplari addūtur  
scrup. iiii.) cū aqua mulsā adiecto salis cochleario par-  
uo. Quū enim sordibus inquinatus & male affectus  
fuerit æger, strenuā cōstitutionē inducit, non solū ob  
multitudinē eorū quę per aluū subducuntur, sed etiā  
quod priuatim bilē atram imminuit. Pleurididi itaq,  
primū præparata est, & flatuosis affectionibus cōue-  
niētissima est, & facilē spirationē facit, & impedimē-  
tis nutritiōis aduersatur, & colorem cutis depurgat,  
sanguinē quidē defecās, malē uero ardētē spiritū lu-  
cidius accēdēs. Sed nō est propositū nobis encomiū  
dicere eius, quæ nō frustra hiera, id est, sacra appella-  
ta: longū enim sermonē res ea requirat. Ad melancholi-  
cas autē affectiōes nō est aliud pharmacū quod huic  
cōparari mereatur. Et noui multos p assiduū eius u-  
sum nullo alio opus habuisse, etiā si nullā omnino bi-  
lē excreuissent: nō em̄ q nigrā excernūt bilē soli melā-  
cholici uocātur, sed q etiā iā habēt in solidis mēbris ta-  
lis cōstitutiōis structurā. Sed & pāniculorū siue mē-  
branarum cerebri malos habitus ualdē bene exterit:  
unde morbū comitialē & insanias inde oriētes mira-  
biliter remouere uidetur. Ego reperi hāc descriptio-  
nem in medicamentario libro de Roma mihi allato  
ualde laudatā ad insanos, melancholicos, ischiadicos,  
paralyticos, uertiginosos, comitialē morbū, alope-  
cias. Non habebat autē opopanaca, neq, piper, neq,  
pulegiū. Hiera Antiochi. Chamædryos, agarici,  
medullę colocynthidis, stœchadis, singulorū drach.  
x. opopanacis, sagapeni, petroselini, aristolochię, pi-  
peris albi, singulorū drach. v. cinamomi, spicę nardi,  
myrrhæ troglodytidis, croci, folij, singul. drach. iiii.  
Mellis quod satis est. Facit ad melancholias, insanias,  
morbū comitialē, & oēs seculētū sanguinē habentes.

Hiera Rufi, ad melancholias.

Cap. cxv.

Medullę colocynthidis sextantē & uncię dimidium,  
chamæpityos drach. x. chamædryos drach. x. casia  
drach. v. agarici, marrubij, utriusque drach. x. opopana-  
cis un. i. sagapeni, petroselini, aristolochiæ rotundę, pi-  
peris albi, sing. drach. v. cinamomi, spicę nardi, croci,  
myrrhę troglodytidis, polij, sin. dra. iiii. Excipe mel-  
le, et exhibe drach. iiii. perfectā dosim cū aqua mulsā,  
& sale. Habet aliquid ad intelligentiā utile, eō quod  
a capite plurima ducit. Vnde uertiginosis, & capitis  
grauitati, & glaucomatis fieri minātibus, comitiali  
morbo, paralyticis affectionibus, hoc pharmacū pri-  
uatim adhibere soleo, et si opus fuerit memoriā reuo-  
care. At melancholico nō parua nec uulgaris utilitas  
ex ipso cōtingit. Quare sepe per ipsum purgādus est.

Etenim



Etenim alia medicamenta aliter alibi præparantur, & ad alios quosdā morbos magis apta sunt. Si uero q̄s ad attram bilem uti uoluerit, hoc utile existit. Vtatur autem singulis diebus ex hac antidoto fabæ magnitudine, non purgationis gratia: magnopere enim cōfert ad concoctiones, & flatus discutit. Videtur porro mihi conducibile esse, ut ob strenuas purgationes maluæ seminis drach. ii. bibantur.

*Hiera iusti, faciēs ad eadē uelut relata. Cap. cxi.*  
Epithymi trientem & uncię dimidium, marrubij, stœchadis, chamædryos, corticis ueratri nigri, scammoniæ, agarici, piperis albi, cōmunis, longi, scillæ assatæ, singulorum sextantē, medullæ colocinthidis, euphorbij, aloës, croci, gentianæ, seminis petroselini, ammoniaci thymiamatis, sagapeni, singulorū uncia i. opopanax, polij, cinamomi, casia, myrrhæ troglodyticæ, spicæ nardi, floris iunci odorati, pulegij, singulorum drach. iiii. aristolochiæ longæ, & rotundę, utriusq; drach. ii. mellis despumati quod satis est. Perfecta dosi drach. iiii. s. cum aqua mulla & salis tenuissimē triti cochleario uno.

*Quomodo auxiliari oportet his qui pharmacum biberunt, & non purgantur. Cap. cxvii.*  
Si uero quis poto pharmaco non purgetur, aquā mulsam meraciore assidue absorbendā dato, & nitri parū in aqua liquefacti. Optimū autē cognoui multo experimēto maltichen, ut datur eius seru. xii. leuissimē trita cū aqua tepidiore. Optimū est & glādē ano indere, ex sale, nitro, ac melle. Et malū aliquādo māducatum effecit quod debuit: corroboratū enim os uentris, superfluitates infernē protrudit: Ob quorū causas nō exercuit uenter purgatorio dato: ob quinque causas. Aut propter naturæ ægri proprietatem, aut ob dati pharmaci paucitatē, aut propter stercus durū impactum in quibusdā intestinis, aut quod natura impetū per urinas fecit, aut propter errorē, pars quidē purgantis, ad hoc ut nihil lædat corpus, alimētum sit animalis, pars uero in pharmacū uenenosum eueritur. At uero Hippocrates de purgationis excessu sic dicit: Quum purgationis excessus hominem arripuerit, statim in balneū ipsum inducito, uinumq; bibendum & ante balneū & post dato, fuluū colore, & albū substantia. Et mea experientia comperit hoc præstantissimum omnium, quare ne contempseris.

*Cura excessus purgationis. Oribasij. Cap. cxviii.*  
In his qui nimium purgantur, potū contrahere oportet, & somnum procurare, dandū est autē uinum austerum paulatim, cū aqua fontana. Bonū est & crassiores polentā torrere ac potui inspergere. Aut parū de calice papaueris, & gallæ parū. Facit etiā probē lentis decorticatæ farina cū aceto & beta nigra cocta, rhoē adiecto aut parū de calice papaueris. Cōducunt & pira sicca expressa, & mala cotonea. Si uero adhuc perseverat lationis impetus, utendū est efficacioribus ad coeliacos descriptis. In his uero qui facile uomunt, aquam tepidā multam bibendā dato, & uomere iubeto, digito aut penna immissa. Atq; hoc facies bis & ter consequenter. Deinde oleum melinum & uinum calefacito, & in hoc lintē tinctum uentri admoueto. & post modicū interstitiū antidoti theriacis fabæ magnitudinem cum uino bibendum dato.

*De uomitu. Rufi. Cap. cxix.*  
Quandoquidem in uiolentis uomitibus sæpe absurda quædā sequi solent, operæpretiū fuerit prius modos

referre, quomodo quis facile uomat. Nā pituitā mouet uomitus, & caput leuat: & eū qui auidius cibum ingessit, aut plus uini hausit, lædi prohibet. Auxiliatur autē purgatio per uomitus nimio corporis molli. Opitulatur item excellēter gracilibus. Omnes autem fluidas affectiones uomitus sanare solet, uelut ulcerationē renum, uesicæ, & ani, & aliarū partiū, elephantiasim, caneros, malos corporis habitus, articulorum affectiones. Cōuenit & hydropicis, maximē aqua inter cutē laborantibus, regio iē morbo, & comitiali in his quibus à stomacho initium affectionis accepit. Nam his qui in capite affecti sunt comitiali morbo, incongruus est uomitus. Cōducit iē tremulis, resolutis, siderationibus, spirationibus erecta ceruice, melancholij, imperiginosis. Cōtrarij uero sunt uomitus sanguinis reiectioni, stragulatibus uteri, naturis nauseabundis, animi deliquis, his qui à suffocatione assidue uexantur, & qui ex qualibet occasione caput dolēt, & qui suffusionē suspectam habēt, & in summa omnibus oculorū affectiōibus. Sint autē uomitoria nō acerba & arida, sed parū dulciora, parū acriora. Videtur autē inter hæc raphanus probari, & eruca, & salsamentū uetus, origanū uiride, cepe & porrū. Coadiuuat uomitus etiam pūsana adiecto modico melle, & pingues carnes. Attamē nō oportet prædicta aut huiusmodi decoquere, & succos ipso rum solos accipere, uerū totā molē deuorare. Neq; uero circa māducationē diu immorari oportet, si q̄s uomere uelit. Sint tamē omnia ex coctura emollita. Manifestū est autē ex uinis quoq; dulciora esse eligenda: hæc enim magis in uētre supernatāt. Et calidæ potu utendū est. Oportet & amygdalas melle tinctas edere, & placetas gustare, & cucumeris semē maceratū cū melle offerre. Sed & cucumeris satui ac peponis radix trita cū melle uomitū mouet, & Celicę radix trita septem drachmarū pōdere in aqua mulla ac pota fortiter sursum purgat, ut aliquādo etiā excessus purgationis consequatur. Qui uero fortioribus, uti uolūt, narcissi bulbū in aqua coquūt, & cū decocto quidē tēperāt uinū: Ipsum autē bulbū edūt coctū, cū oleo & modico sale. Mouet etiā uomitū ungentū irinū, & plus adhuc cyprinū, si quis illitis ex his digitis iriter. Citra molestiā mouet uomitū etiā hyssopi decoctū, & thymi, & cnicī semē tritū cum sesamo, ac cū aqua mulla plurima potū. Et nasturtij semen. Similiter oleū sesaminum, raphaninū, narcissinū. Daphnoidis folia uiridia tria comesta. Optimū est & hoc raphani decoctū, & caricarū cremorē simul misceto, tepefacito, & bibendū dato. Pleraq; igitur & curiosiora uomitoria reprobanda sunt. Dandi uero sunt raphani ieiunis qui inediā tulerunt, & à cœna prius uomuerūt. Sint autem raphani ualde acres, & secantur in tenues laminas, macerentur autē hæc frustula à uespera in aceto & melle. Edat autem uomiturus ex his magnā copiam, & assidue superingerat acetum mullum. Deinde ad horas duas lentē obambulet, & plurima aqua tepida hausta uomat, per digitū aut pennæ iritamentum.

*Preparatio raphanorum cū ueratro albo. Cap. cxx.*  
Præparantur etiā alio modo raphani ad diuturnas affectiones, & fortiore exagitatione indigentes. Veratri enim albi & optimi festucarū drach. vi. in raphanos figuntur, ita ut raphani prius harundine compungantur, & deinde festuæ ueratri in foramina immittantur,



tantur. Hæ festucae ubi totam noctē in raphanis māserint, sequenti die eximuntur, ut ipsarum in raphanis relicta. Postea uero raphanos conscindere oportet & in aceto mulso macerare, & similiter edendos exhibere. Diligēter autem considerandū est, ne quid ex cortice ueratri in raphanis permaneat.

*Quibus dandum sit ueratrum, & quibus non.* Ex Antylo ac Posidonio. Cap. cxxi.

Ipsū ueratrum dandum est his qui diuturno ac forti morbo laborant, & qui in alijs auxilijs spem nō habent. Dandum est hydropicis, elephantiosis, malo habitu præditis, resolutis multo tempore, comitialibus & melancholicis, arthriticis & ac podagricis. At enumerare in quibus affectionibus probetur ueratrum, non facile est propter multitudinem. Præstat itaq; dicere qui morbi à ueratro lædantur. Incommodū est itaq; ueratrum, sanguinis reiectioni, spirationi erecta ceruice strangulationem minanti, & in suffusione imminēte, capitisq; affectibus qui ex intervallis uolentos dolores inducunt, cum rubore faciei & uasorum distentione; & in uteri strangulationibus, & his qui assiduè animo linquantur.

*Quid ueratrum facere possit.* Cap. cxxii.

Veratrum potest corpora transmutare ac permutare, temperaturam ipsorum recētiorem ac robustiorem efficiens.

*Quod multi accepto ueratro nihil quidem uomuerunt, nihil tamen minus quam purgati utilitatem perceperunt.* Cap. cxxiii.

Multi accepto ueratro ipsoq; concocto, omnino quidem non sunt purgati, utilitatem uero non minorem perceperunt quam hi qui purgati fuerant.

*Qui sint magis apti ad ueratrum.* Cap. cxxiiii.

Viri aptiores sunt ad ueratrum mulieribus, & ex ipsis uiris hi qui fortiores habitum possident. At mulierosi, & habitu ualde pingues, aut graciles, aut thoracem non carnosum habentes, & longam ac angustam ceruicem habentes inepti sunt. Pueri quoque ac senes inepti sunt; & qui ualde frigidam temperaturam habent, & qui sana corpora habent, & multo sanguine abundant, inepti sunt. Item difficulter uomentes & pusillanimes.

*Tempora uniuersalia ac particularia adsumendum ueratrum apta.* Cap. cxxv.

Tempus uernū aptissimū est ad sumendum ueratrū. Deinde autumnus. Aestas incōgrua est, & nimirum hyems quoq; nisi ualde magna urgeat necessitas. Et tunc hyeme quidē qui ualde calidum temperamentū habent aptiores sunt. Aestate uero senes. Constitutio idonea est serena & calida & insolara. At in morbis in quibus interualla sunt, dandum est in intervallis. In alijs, quandocunq; cōtigerit. In quartanis uero & intestinis fluxione uexatis, in ipsis accessionibus.

*Veratri probati nota.* Cap. cxxvi.

Optimum est ueratrū quod ab una radice plures festucas siue surculos habet, eosq; paruos & extentos, & non rugosos, & non in acutū desinētes, neq; caudam muris referentes. Intus uero ualde albos, foris autem pallidiores, profundam medullam habentes, friabiles, qui non flectuntur ob mollitiem, sed franguntur trāuersim instar caulis, & qui in fractura fumosum quid cōtinent ac remittunt, atq; hoc purum. Nam si puluerulentū id fuerit, uetustatē ueratri indicat. Bonum porrò ueratrū mansum primum dulcedinis in-

dicationem de se præbet, deinde modicæ acrimoniæ, postea feruorem fortem inducit in ore, & saluam multam ducit, & stomachum euerit. Oportet autem uere colligere ueratrum radice adhuc prægnante.

*Victus ratio ueratro purgandorum.* Cap. cxxvii. Victus ratio accuratissima constituenda est his qui ueratro purgandi sunt. Attenuatis enim corporibus nō citra periculum exhibetur. Diebus tribus antea abstineat à carnibus aut reliquis crassi succi eduljjs ac potibus. Adsuefaciat autē seipsum ad uomitū, & ter aut quater prius uomant à coena, & aluus subducatur. Oportet autem declarata antea domesticis anxietate certaminis futura, sic ad hoc auxilium procedere.

*Differentiæ exhibitionis ueratri.* Cap. cxxviii. Datur diuersimodē ueratrum. Alij enim decoctū ueratri dant, alij cremorem, alij ipsam eius substantiam. Et alij forpice in ramenta confectum exhibent. Alij tusum & cribratum. In ramenta igitur confectum citò incipit purgare, post horas in totū duas, bilem & pituitā educens citra multam lancinationē. Et ipsum simul uomitū reiectū, in quatuor aut quinque horis purgationem sedat. At in puluillum redactum ualde tarde operatur, ut post quatuor aut quinque horas sæpe incipiat. Verū omnes species bilis & pituitæ educit, & ad periculum contractionis & nimiae purgationis deducit. Ad longum etiam tempus producit purgationem, sed utilitatem multiplicem exhibet.

*De cremore ueratri.* Cap. cxxix.

Cremor in quo maceratū est ueratrū, datur senibus & pueris, & his quibus habitus defluxit, & qui morbum facile solubile habent. Datur & his qui elephantiasim futurā timent. Oportet autē drach. v. ramentorū, in aquæ pluuialis hemina dimidia macerare ad triduū, deinde colare et calfacere, atq; exhibere totū cremorē.

*De ueratri decocto.* Cap. cxxx.

Decoctum ueratri dandū est tum prædictis, & qui illis adhuc sunt robustiores, infanientibusq; ac atrabile percitis. Præparatur hoc modo. Veratri librā i. cōcisam in aquæ pluuialis sextar. ii. macerato ad triduū. Deinde ad prunas mitiores coqto ad tertias. Postea colato & adijcto ad decoctū, mellis despumati primarij lib. ii. & coquito usq; ad mellis compagem. & cochlearium magnū delingēdum dato. Licet etiā aqua calida miscere, & dare cum sorbitione quadā. hoc neq; conuulsiones, neq; contractiones, neq; nimiam purgationem facit. Exercitium autem est uolenti ad ipsum ueratrum transire, ut etiam confidenter ramenta eius confecta accipiat.

*De ramentis ueratri, item de contuso ac cribrato.* Cap. cxxxi.

Cæterum his qui maiori molimine ac exagitatione opus habent, fortioribusq; ac confidentioribus, & facile uomētibus ramēta cōcisa danda sunt. At uero his qui adhuc audentiores sunt, aut etiā consuetudinē habent, cōtusum & tenuissimo cribro excretum dabis. Ramenta uero sic exhibe. Accipe festucas, conscinde forpice ad polentæ aut fursurū magnitudinē. deinde puluillū linteo exterge, & detractis omnibus tenuibus particulis, ut ne strangulet, dato; timidioribus quidē cum ptisanæ aut alicæ succo, ubi parū decoxeris; fortioribus uero cū aqua calida, aut aqua mulsa, ita ut cogas ipsos insuper sorbere aquā mulsam purā aut aquā, ut ne relinquatur quid in faucibus aut stomacho. Dosis perfectissima fortibus, de ramētis cō-

cilis,



cilis, sunt drach. ii. s. de puluere crassiore, drach. una & oboli ii. de puluillo drach. i. & oboli ii. Cōtundimus autē crassiorē eius farinam in mortario, & per angustissimum cribrum excernimus, & tenuissimū auferentes, id quod crassius est, exhibemus cum succo alicæ, aut mazæ ex polenta factæ. Tenuem uero puluillum tundimus, & exactē cribramus. Et postea cum cocto melle solidissimo in cataporia coactuum ac efformatum exhibemus.

*Quæ preparare oportet exhibitionis tempore.*

Cap. cxxxii.

Præparantur porrò ipsis ad opem ferendam lancinationibus, animi deliquis, & conuulsionibus hæc: Aqua calida & frigida, & decoctum hyssopi, mel, ruta, pulgium, acetum, mala, panis calidus, uinum, pullus gallinaceus coctus, oleum commune & sicyonium, sal, galbanum, castorium, cremor ueratri, oleum cyprinum, aut irinum, aut narcissinum, pennæ, sternutatorium, cucurbitulæ diuersæ, lectica siue ferculum, lectus stratum molle habens, dyster.

*Quomodo post potum curandi sint.* Cap. cxxxiii.

Si quidē facile purgētur postquā biberunt medicamentū, dabimus ipsis aquā frigidā absorbēdā aut colluēdam. Deinde odorem quoddā corroborans. Et iubebimus ipsos sedere aut reclinari, & in quiete manere ad horas duas, ut ne citius quā oportet pharmacū reuomatur. Postea iubebimus ipsos moueri. Prima perceptio caloris circa stomachū & fauces cōtingit: Deinde salua multa in os colligitur: Postea paritē alimentū & pharmaci cū pituita uomūt: deinde pituita & bilē cum pharmaco: Mox purā bilē. Sæpe uero etiā uēter infernē subducitur, quādo sanē etiā tolerabilior purgatio cōtingit. Singultū leuiter, & facies rubicūda est. Si uero faciliē procedit purgatio, & facies bonū colorē habebit, & singultus cessabit. His uero qui circa mediā purgationē singultūt, aquam mulsam dabimus, aut decoctū rutæ, & aquā tepidam in potu. Deinde purgatos lauabimus, & alimētum stomacho gratū exhibebimus. Perseuerāte uero purgationē, oportet dare aquā mulsam calidā absorbēdā in qua decocta est ruta, aut aquam cū oleo. Penna quoq; cyprino aut irino oleo, aut aliquo simili tinta iritentur, & lecto pēssili reclinatī cōmoueātur. Si uero ualde uexētur à stragulatione, cremoris ueratri cyathos tres offeremus. Nā ex qualitate adiuuat purgationē. Quod si neq; sic stragulationis periculū leniatur, acerrima infusione per dysterē euacuabimus. Dabimus ipsis etiā galbani obol. iiii. deuorādos, nō ut uomitū cōctemus, sed ut stragulationē sedemus. Aut sternutatoriū forte admouebimus, assidue per lectū pensilē agitatēs, & pēnarū immīssione iritatēs. Vbi uero incipiūt purgari, mitigādu est singultus, uelut antea dictū est. Si uero uolētus fuerit singultus, sternutatorio utemur, & cucurbitis per totā spinā, & maximē circa magna scapularū uerticula, detrahētes ipsas ad spinā. perseuerantes enim cucurbita sæpe corrigūt stomachū cōtractū & uelut cōtortū à singultu. Ligabimus etiā extremas partes, & fouebimus immīssas in aquā calidā. At uero succedētes in quibusdā contractiones, crurū maximē & manū: (solēt em̄ pleriq; hæc accidere) leniemus fortiter illinendo, fouēdoq; ac calfaciēdo & fricādo extrema & musculos in suris. Sit autē oleū sicyoniū, aut quoddā ex molliēdibus & lassitudinē ac dolorē eximēdibus,

*singulni remedia*

acopis appellatis. Sed & castoriū unguēto ammiscēbimus, et in potu exhibebimus. Maximē uero pdest cōtractis balneū si affuerit. Sin minus, in scaphā aut in solū immittēmus, ita ut oleo multo dulci totū corpus, maximē uero cōtractas partes illinamus. Sit autē aqua probē tēperata, ut in ipsa diutius manere possit. Porro ubi cessauit cōuulsio ac purgatio, statim nutrire oportet, panē exhibēdo uino diluto madefactū, aut in omphacomelini, his qui ualde sunt euacuati. Si uero caloris sensus circa stomachū post cibū contigerit, ipsum omphacomeli aqua calida tēperatū bibendum dabimus. Aliquando uero etiam cum frigida mixtū secunda die dabis. Cibi uero postea boni succi omnes sint, & uinum tenue ac ualde uetus.

*De purgationis excessu.*

Cap. cxxxiiii.

Nimias purgationes sistemus aquæ calidæ potū, & extremarū partiū ligatura, & frictione uehemēti, & cucurbitis ad præcordia & dorsum affixis. At absinthij potus egregiē supprimit uomitū. Si uero adhuc perseuerarit, utemur somniferis dolorē sedantibus. Nam talia resiccandi ui prædita purgationes sistunt. Et somnus excretionē sistendi uim habet. Succedit tamē somnus sua sponte probe purgatis per ueratrū, multus & profundus, si nō periculū imminet. Quibus sane in tantū cōcedere oportet, quantū somno tenētur.

Si uero sudores immodici consequantur, sedabimus ipsos corporis uentilatione, & spongiæ ex frigida aqua aut posca expressæ deersione. Utemur etiā puluillorum adstringentium & meatus obducentium insperione, & reliqua cura in cardiacis referenda.

*Epithemata purgatoria.*

Cap. cxxxv.

Medullæ colocynthidis, seminis erucæ, rutæ syluestris, elaterij, grani cniidij, lathyridū purgatarū, galbani, ceræ, nitri rubri, singulorū drach. iiii. opopanacis drach. ii. terebinthinæ drach. vi. Tunditur hoc pharmacum adiecto paulatim felle taurino, quantū satis est. Et si quidē super umbilicū positū fuerit usq; ad pubē, inferiorē aluū mouet. Si uero super uentrē, superiorem purgat per uomitū. Aliud: Nitri rubri, seminis securidacæ, medullæ colocynthidis, fellis taurini, staphidis syluestris, stercoreis columbini, radicis cucumeris syluestris, scillæ, mercurialis, singulorū æquales portiones, tūdico, cribrato, & felle excipito ac melle sufficiēti, & ubi ad malagmatis formā redēgeris, utitor. Aliud quod pollicetur sanguinis per nares educationē, si frōtū imponatur. Vbi uero sistere uolueris, inquit, sanguinē, ablato ipso locū diligēter deterges per spongiā ex posca aut frigida aqua expressam. Si uero imo uentri impositū fuerit quadrāgulari nouē digitorū figura, ciet mēses, & foetus corrūpit. Imponitur & renibus in exacerbationibus. Cōpositio hæc est: Ceræ, galbani, euphorbij, radicis lanariæ herbæ, sing. unc. i. alorum ceruinorū ustorū drach. iiii. succi absinthij drach. iiii. terebinthinæ liquidæ drach. iiii. Sicca trita cribrata, rursus terito cū felle uitulino, ad strigmeticiā crassitiē, & liqda ac eliquata affundito, & unito ac utitor, inquit, uelut admirando. Aliud emplastrū purgatoriū, quo utor, Chezananze appellatū. Hoc impositū umbilico, mouet inferiorē uentrē: thoraci uero & stomacho impositū uomitū ciet, donec spleniū cui illitū est tollatur. Menses autē scēminarū ducit, & foetus corrūpit imo uētri & lūbis impositū. Cōpositio hæc est: Grani cniidij drach. iiii. lapidis asij drach. x. ueratri albi drach. iiii. adipis capri

h

prini



prini drach. v. elaterij drac. iiii. succi tithymali drac. iiii. amurcae drac. xii. fellis taurini drach. ii. spumae nitri drac. v. farinae lupinorum amarorum sextantē, comae absinthij drach. ii. Reliqua tundito ac cribrato, deinde fel tritū adijcito, mox amurcā, & postea adipe liquefactū affundito, & unctis utitor. Aliud umbilicariū. Et hoc uomitū ciet uentri impositū. Et menses ducit nō ob uasorum conclusionē suppressos, foetusq; corrūpit, imo uentri ac lumbis impositū. Absinthij, succi radicis cyclamini, artemisiae, elaterij, singulorum drac. vi. medullae colocynthidis drac. x. radicis cucumeris syluestris, farinae lupinorum, chelidonij, seminis uiolae albae, singu. drac. vi. opopanax drac. ii. ceræ drac. c. terebinthinæ drac. l. cyprini drach. l. aut quantū satis est. Impositū autē ubi aluū commouit, mox ipsum tollere oportet. Aliud, facit & ad colicos. Nitri scrup. i. x. terebinthinæ scrupu. vi. elaterij scrup. iiii. staphidis syluestris scrup. i. s. castorij, seminis rosmarini, sampsuchi, baccarū lauri, grani cnidij, lupinorum siccorū, medullae colocynthidis, singulorum sesquiunciā, scammonij unc. i. fellis taurini unc. i. ceræ sextantē, adipis anserini quadrantē. Aliud. Cucumeris syluestris succū, & cyclamini succum, paribus portiōibus, cū melle misceto, & hæc exacte unito in sole aut calido cinere, & utitor illinens ab umbilico usq; ad pubē. Aliud. Elaterij drac. iiii. colocynthidis drac. i. scammonij, squame aeris, radicis cucumeris syluestris, sing. drac. i. lathyridū drac. i. aut pro ipsis succi tithymali rātundē. Tūdito, cribrato ac terito cū oleo plurimū salis habēte, & hapsū lanae magnū facito, ipsumq; pharmaco imbutū imposito ubi uolueris, umbilico inquā, aut uentri, aut imo uentri & lumbis. Aliud. Mespilorū exēptis nucleis scrup. xviii. scammoniae scrup. xii. atramentū sutorij scrup. xvi. sagapeni scrup. xxxii. lathyridū scrup. xii. colocynthidis seminis scrup. xii. Trita excipe oleo & utere.

*Cōpositio olei siue ungēti purgatorij.* Cap. cxxxvi. Fellis taurini sextantē, elaterij unc. i. grani cnidij uiridis trientē, lupinorum uiridiū succi sextantē, euphorbij unc. i. medullae colocynthidis unc. i. adipis uulpini recentis sextantē, adipis uiperæ sesquiunciā, stercoris muris drac. iiii. succi pæoniæ drac. iiii. castorij drac. iiii. olei cyprini sexcuncē, olei ueteris lib. i. arida tūdito ac cribrato per tenuissimū cribellū. Adipes autē præmolito in mortario, præsertim uulpinū: fibris enim refertū est, deinde ad lentas prunas liquefacito cū oleo, & ipsis reliqua omnia inspergito, & parum ad prunas coquito ac seponito in stāneo uase, diligēter operto, ut ne trāspiret, & deponito in domo superiore nō humecta ad dies xxx. Et postea utere in omnibus & ad omnē affectionē: Citra molestiā enim purgat. Sanata autem cū reliquis etiā mentis perculsionem. Mensura quæ in usum assumitur ut plurimū est cochleari ortū duorū, in qbusdā etiā unū solū. Inuncto em̄ umbilico pfectā feci euacuationē. Si uero immodicē feratur uenter, & uoles suppressere, spongiā uino tepido imbutā ac expressam adhibe, & siste tur. Aliud epithema. Hoc umbilico imponitur, & splenem purgat. Veratri nigri quadrantē, ueratri albi trientem, ammoniaci thymiamatis, nitri, utriusq; trientē, scammoniae sextantē, piperis grana xxx. cōtusa cribrata excipe terebinthina ut malagmatis formā induat. Et ubi præfricueris locū ac fomēto præparaueris, formato quadrangulārī quinq; digitorū

figura splenium, & imposito. At pectini impositū, fortius corrūpit. Epithema sanguinē ducens, ut hæmorrhoidas iritet, & menses muliebres. Elaterij, myrrhæ, galbani, farinae ordeaceæ, sing. drach. iiii. foliorum rutæ uiridis drac. ii. fellis taurini quod satis est. Singula seorsim tenuissimē terito, deinde unito, & fellis quod satis est affundito. Vfus uero tēpore locū sub umbilico, & partes circūcirca sitas illinito. Aliquando etiā lūbos. Ducit menses & hæmorrhoidas.

*De localibus euacuationibus.* Cap. cxxxvii.

Et de his quidē quæ superfluitates quæ in toto corpore sunt, purgare possunt, sufficiū relata. Tempus est autē transeūdi ad locales euacuationes. Verū illud meminisse te uolo per totā tractationē, ut primum totū corpus purges, & a superfluitatibus liberes per prædicta purgatoria medicamenta. Et postea per localia euacues. Si enim antē totius corporis euacuationem aut purgationem, per localia auxilia uolueris partiū affectiones curare, in magna mala immiseris egrotū. Ampliorem enim materiā ad debiles locos attrahes.

*Quæ oculos purgant & lacrymas prouocant.*

*Cap. cxxxviii.*

Lacrymas prouocantibus utemur ad oculos diu resicatos, & palpebras scabras ac pruriginosas. Extergentibus uero & repurgantibus ad hebetē uisum & suffusionis principiū. Prouocat autem lacrymas & extergent omnia hæc: mel, oleū uetus, ricininum, amygdalinū, ex nucibus regijs, e foeno græco, lentiscinū, laurinum, anethinum, fusinum, nardinum, opobalsamum. Ex succis autem oculos purgant, succus uuæ acerbæ, lactuæ syluestris, lyciū, radicis acori succus. Itē chamædryos, centaurij, chelidonij, ocymij, ceparū, rutæ hortēsis ac syluestris, quæ etiā besasa appellatur, itē mali punici succus, foeniculi, utriusq; anagallidis, marrubij, trifolij, ueratri albi, et anemones. Ex liquo-ribus uero spissis, myrrha, sagapenū, opopanax, cyrenæicus, & Medicus, ammoniacū thymiamata, galbanū, thus: ex animantibus, testudinis terrestres sanguis: hepatis caprini cruor, itēque siluri. Sed & siluri fel, & hyænæ, capræ, gallinæ, perdicis, uulturis, ursi, scari, callyonymi, & coracini. Ex adipibus, uiperæ adeps, gallinarū, pisciū fluuiatiliū, castoris testes. Ex cineribus, hirundinū pulli exusti, lacertæ ustæ, cornū cerui ustum. Ex metallicis, lapis hæmatites, & scissilis, æs ustum, atramentum sutorium, chalcitis, misy, alumen omne, squama aeris, rubrica, lapis phrygius, iaspis, magnes, moroxus qui & leucographis appellatur, lapis galactites. Ex plātis, cortex thuris, ericæ fructus, & quæ eiusdem generis sunt.

*Quæ aures purgant.* Cap. cxxxix.

Mel, uinū mulsum, uinū dulce, oleū nucū regiarū, amygdalinū per se, & cū anserino adipe, irinū cum aceto, myrrha cū alumine, acetoq; ac aqua: spuma nitri cū melle & aceto, alumē cū aceto, senecta serpentis cum aceto, fel bubulū, suillū, & omne fel pisciū, betæ succus, foliorū capparis succus, corticis raphani succus, mercurialis succus, bdelliū, galbanū, castoriū, casia, ueratrū albū & nigrū, herba lanaria, capparis folia cū oleo cocta, acerū mulsum, nitrū cum aqua calida infusum. Cæterū ex prædictis quædam ad pruritus, quædā ad ulcera, quædā ad ea quæ in meatum inciderunt, aliqua ad sordis duriū, itē ad sonitus, & grauē auditū ac surditates cōmoda sunt. Capitis itē doloribus antiqs, & morbo comitiali hæc profunt.

*Quæ*



*Quæ per nares purgant.*

Cap. CXL.

Per nares purgat caput, radicis betæ succus, elaterium, anagallidis ceruleū florē habentis succus, oleū irinū, amygdalinū, cyclaminī radicis succus, & ipsa arida trita insufflata, piper, nitrū, atramētum sutoriū, mel, thlaspi, ueratrū albū, euphorbiū, herba lanaria, castoriū, calamintha, melanthiū, iris, marrubium, anemone. Hæc uero manibus admouentur, propter diuturnas capitis affectiones, & ad morbum comitiale, & oculos arquato morbo infestatos. Item ad obtusum auditum ac uisum, & ad narium obstructions antiquas, & in læso olfactu, & ad eos qui caninam conuulsionem passi sunt.

*Quæ humiditatem ex ore trahunt.*

Cap. CXLII.

Lētiscus & ipsius folia, & quod ab ipsa resinaceum defluit, mastiche appellatū, cū staphide syluestri, piper, granum cnidiū, sinapi cum aceto mulso, ac nitro gargarisatum multā pituitā euacuat: rumicis radix cum aceto cocta, pyrethrū, capparis cortex, tæda, mel, oryganū, thymus, pulegium, hyssopū, rhus cū melle, alumen, chalcidis, misy, myricæ fructus, terebinthina cū melle, omphacī succus cū silphio, cyrenæicus succus, calia, & omnia quæ ori illini solent. Ceterū quæ ualde efficacia sunt, in diuturnis affectionibus assumenda sunt, ore prius ex oleo colluto, ut ne acrimonia impediatur usum. Adhibenda uero sunt hæc omnibus diuturnis capitis affectionibus, & hebetudini uisus, & graui auditui citra dolorē. Ad linguę itē ac gustus resolutiones, ad parotidas, anginas, pustulas capitis aut faciei, ad caninā conuulsionē. At uero recuratiōis gratia, adhibenda est postea aqua calida, sapa, aqua mulsa, lac mīcarum, panis cremor, aut pitanae succus.

*Quæ lac generant ac mouent.*

Cap. CXLIII.

Generant ac mouēt lac in potu accepta, pitana cū foeniculo cocta præsertim uiridi: sin minus, cū semine. Sed & ipsum foeniculū per se comestū, & anethū, sesamū, anisum, semen lini, cuminū, milij farina cocta, tritici decoctum, eruca uiridis, cucumeris semen: foris autē illita uberibus prouocant & mouēt lac, intestina terræ, nigella, fel tauri, ordeī macerati succus, portulacæ succus, adeps anserinus, cera, sulphur, recrementum ferri. Hæc adhibentur in his quibus lac deficit.

*Pulmonem ac pectus purgantia.*

Cap. CXLIII.

Semen urticæ, dauci, apij, thymus, semen raphani, in potu ac cibo accepta, item sinapi, sesamū, nasturtiū, erysimum, cardamomū, cucumeris semen, nigella, piper, ruta, polij, marrubium, baccae lauri, calia, aron, dracūculus, bulbus, cepe, alliū, costus, amomum, spica nardi, sulphur, styrax, galbanū, terebinthina, myrrha, opopanax, scilla, origanū, pulegium, hyssopū, abrotonū, bryoniæ radix, amygdalæ amaræ, caricæ, uuæ passæ, nuces pineæ, maximè recentes, mel, sapa, uinū dulcē, castoriū, farina erui, picearū nuclei, ammoniacū, bdelliū, thus, silphij, & succus æris, aristolochia, baccae iuniperi, stœchas, porrū capitātū, cū pitana coctū in cibo acceptū, ouū recēs absorptum, butyrum per se, & cum melle, glycyrrhizæ succus & ipsa radix. His utendū est ad anhelosos & erecta ceruice spirantes, & ad ueterem tussim. Pleraq; uero ex ipsis etiam phusicis & suppuratū pectus habentibus conueniunt, propter educationē eorum quæ in thorace collecta sunt, & ad ulcerum repurgationem.

*De suffitionibus.*

Cap. CXLIII.

Suffitus nō commodi sunt omnibus affectionibus circa

thoracē consistentibus: neq; enim in sanguinis spuro idonei sunt, quū per acrimoniā eorū quæ suffiuntur uasa rursus aperiātur: neq; his qui siccū morbum circa thoracē habent: uerū solis anhelosis & erecta ceruice spirantibus, & quibus thorax ob copiā frigidorū humorū infestatur. Utendū autē est suffitiōibus toto corpore euacuato. Collocandus est homo, & ubi uestibus cōtectus fuerit, iubendus est crura disparare, & deorsum nuere, ut facies prope genua existat, atq; ita os aperire, quo suffimēto inter crura posito, fumum ore suscipiat. Præstat tamen per infundibulū fumum suscipere. Sunt autē suffimēta hæc, Castorium suffitū humidā & frigidā affectionē pulmonis ac cerebri sanat. Similiter aristolochia, bitumē, sandaracha, ladanum, loliū, paleæ antiquæ, funiculus uetus marina aqua maceratus, terebinthina, chamæleuce, calaminthe, styrax, mastiche, thus, erysimū, leporis stercus ac pili, dorcadis stercus, cucumeris syluestris radix, centaury, foeniculi semē. At nos habemus suffumigium per experiētiā cognitū, quatuor specierū, nimirū styracis, terebinthine, sandarachæ, mastiches, æqualibus portiōibus cōmixtis. Hoc fidē reperit quod anhelosas, & suppuratas, et pleuriticās affectiōes sanat, itēq; tussim, quemadmodum & quæ prædicta sunt.

*Quæ tenuia intestina euacuant.*

Cap. CXLV.

Tenuia intestina purgat fructus rithymali, & semen ipsius quātū guttē qnq; caricis aut palmulis excepte, atriplicis semē, bralsicæ succus, cicerū decoctū, thymbræ & polypodij decoctū, pulegij decoctū, uiticis folia, thymi decoctū, chamæpitrys, butyrū recēs assidue delinētū, chanæ ualde coctæ ac comestæ, iusculo insuper absorpto, oleū omphacinū potatū, rosaceū, itē ac ricinū. Agaricū cū aqua mulsa, sed hoc cū molestia purgat: est enim stomacho incōmodū, eod quod leue sit, & stomacho innatet, aloē cū aqua frigida, aut aqua mulsa, aut lactosa siue lactei teporis pota, itēq; cocto melle excepta ac deuorata, citra molestiā purgat, styrax terebinthina exceptus ac deuoratus, absinthium & abrotonū similiter. At uero tenuiū intestinorū purgatio recētes obturationes, & crudorū humorū generatiōes, & lūbricos rotundos curat. His uero purgatis, etiā uesicæ bilem suscipiētis meatus, qui ieiuno intestino inseritur, propriā actionē minime impediēte perficit. Quin & inflationes & tormina uertiginosa ac uoluulosa horū purgatio per sanat.

*Quæ sima hepatis purgant.*

Cap. CXLVI.

Polypodiū, mercurialis cocta comesta, lathyrides cum aceto mulso, chamelæa cū absinthio & aqua mulsa pota, bralsicæ succus, cyclaminī radix, lactis serū, heliotropij, scorpiuri appellati succus, galli ueteris iusculū. Hæc auxiliātur diuturnis inflammationibus circa sima hepatis. Nā incipientibus profunt mitiora.

*Quæ gibba hepatis purgant.*

Cap. CXLVII.

Amomi decoctū, flos iunci odorati, acori radix, gentiana cū aqua, agaricū cum uino mulso. Est autē stomacho incōmodū, radicis lauri cortex cū uino, rheō Ponticum, glycyrrhizæ succus, amygdalæ amaræ præsertim, absinthij coma, anisum, foeniculi semen, spica nardi, radicis quinquefolij succus, uiticis semē, dauci semen, petroselinum, cetaurij decoctū, pæoniæ fructus, sesamū torrefactum, lauri, palmularum ossa usta, symphyton, polygonū, erigeron, smyrniū, hipposelinum, anagallis ceruleū habens florem, sumaria siue chelidonia quæ in sepibus nascitur, securidacæ

h 2

semen,

ad anhelosas  
suppuratas  
pleuriticās  
affectiones tussis



semen, cornu cerui usitum, mentae succus & decoctum, calamintha, costus, foenum graecum modice frictum, bacanum, opobalsamum, radices myrti sylvestris cortex, ordeii cremor, lupini, phu, asarum, meon, pix. Haec sanant diuturnos circa gibba hepatis morbos, siue cum tumore aliquo sint, siue sola intemperatura adsit cum dolore, siue obturatio.

*Splenem euacuantia.*

*Cap. cxlviii.*

Veratrum nigrum, epithymum, polypodium, scolopendrium, paeoniae radix, chamædryos decoctum, item chamæpitios, centaurii praesertim minoris, pulegii decoctum, capparis cortex, colocynthidis cremor potus, mercurialis comesta, & decoctum ipsius potum, laryrides cum aceto mulso potae, chamaelea, aqua marina calida pota, ericae fructus cum petroselino, uitis semen, Haec omnia splenem purgantia, etiam hepar ab obturatione liberant, & malos habitus, & hepaticas ac splenicis, morbi quoque regni & aquae inter ceterum affectiones generari prohibent.

*Renes purgantia.*

*Cap. cxlix.*

Omnia incisoria uel praedita, plantaginis radix & folia & semen, arida trita pota, asparagus myacanthinus, paeoniae radix, cicerum nigrorum decoctum, amygdalae praesertim amarae, eryngii radices decoctum, damasonium, adiantum, apri semen, foeniculi, dauci, petroselini, ammi, anisi, ligustici, asari decoctum, meon, phu, flos iunci odorati, seseli, acori radix, gramme, uitis lacryma & cortex, sanguis hirci aridus. Auxiliantur autem haec pota post remissum inflammationum vigorem: dissolunt enim duros tumores qui fieri parant, & lapides generari prohibent.

*Vesicam purgantia.*

*Cap. cl.*

Vrinas a uesica ducit, acori decoctum potum, itemque asari, oleum amaracinum, amygdalae amarae cum passo potae, radices althaeae decoctum, adianti decoctum, haemates lapis tritus cum uino potus, gallinarum sterces siccum, anchusae decoctum, abrotoni, anisi semen, sanguis hirci aridus, atriplicis semen, artemisiae decoctum, aristolochiae decoctum, sabinae leuissimè tritae drachma una cum aqua mulsa, in non febrientibus cum uino, balsami semen, gladii decoctum, bdellium, apri semen, bryoniae radix, glycyrrhizae succus, pulegium, paeoniae fructus, dictanum, dracunculus, abietis decoctum, rubiae decoctum, serpyllum, eryngii radix, heliotropium, senecio, menta, salvia, foliorum oleum decoctum. Haec non sinunt lapidum generationem in uesica fieri. Et crassities ac feculentas subsidetias. Insuperque scabiosas & ulcerosas affectiones sanare solent.

*Quae gladii indantur ad prolestantes urinas.* *Cap. cli.*

Postquam uero repleta fuerit uesica urina, & contrahi non poterit, neque urinam exprimere, in gladem haec indere solemus, nitrum aqua dilutum, muriam, fel, cyclaminum.

*Lapides in renibus ac uesica euacuantia.* *Cap. clii.*

Haec lapides frangunt, cardamomum cum cortice radices lauri potum, cyperus, oleum amygdalinum, paliuri semen, bellium, foeniculi radix, libanotis, myrti sylvestris folia, cerasorum fructus, prunorum succus, amygdalae amarae, rumicis radices decoctum, seminis althaeae decoctum, triboli uiridis decoctum, adianti decoctum, uitis lacryma, apri uesica sicca, lithospermum, tecolithos, betonica, saxifraga, lapides in spongis, electrum.

*Vterum euacuantia.*

*Cap. cliii.*

Sanguinem ab utero ducunt infecta & apposita haec. Ca-

sia cum myrrha, calami aromatici decoctum, oleum amaracinum, uiola alba, thymi ac thymbræ decoctum, centaurii radix, & ipsum centarium, opopanax, uitis semen, amygdalae amarae, nucum regiarum nucleis usitum cum uino appositum, decoctum absinthii, itemque succus, sampsuchus, seseli, galbanum, lilii radix, chamæpitrys, artemisiae decoctum, dictamnium, conyza foemina, rubiae radix, urticae semen cum myrrha, elaterium, ueratrum nigrum, lupinorum decoctum, raphani cortex, herba lanaria, adeps cerui recens, adeps anseris, resina terebinthina, fel taurinum cum mastiche, muscus qui & splanchnum & hypnon dicitur, cyperus, unguentum irinum, succus cyclamini, anchusa, quinquefolium, cuminum, fesymbrium, helenium, salvia, heliotropium, mercurialis, granum cnidium, uua exemptis granis, foenum graecum, sesamum, nucleus baccarum lauri, amygdali amarae radix, cochleae paruae, lanæ succidæ, oesypum, lactucae sylvestris succus, porrum, ceparum succus, calaminthae folia. Tot quidem sunt quae in pessos, hoc est, talorum formas excipiuntur, iniiciunturque ac apponuntur. Vitandus tamen est assiduus usus eorum quae inter ipsa sunt acriora. Solent enim ulcerationes inducere.

*Quae in potu sumpta menses ducunt.* *Cap. cliiii.*

At uero in potu accepta sanguinem ab utero ducunt pleraque quidem ex praedictis, & omnia quoque urinam cientia. Sed & erysimum & asarum cum aqua mulsa, calamus aromaticus, alumene, castorium, cicerum decoctum cum pipere & ruta, radices asphodeli decoctum in uino elixatae, item pulegii in uino cocti, radices eryngii decoctum, abrotoni semen, origani, thymi, thymbræ, rutae decoctum, foeniculi decoctum, crethmone, cuminum, sinapi, marrubii semen, & succus & decoctum, myrrinum, lion, oreoselinon, dauci semen, thlaspi, nigella, uiolae albae semen, carpobalsamum, paeoniae semen, baccae lauri, myrrha, cardamomum, cyclaminus, sagapenum, galbanum, semen foeniculi, spica nardi, mercurialis, costus, styrax, centaurii magni radix, sabina, iris, aristolochia, bryoniarum flos & succus, radices rumicis decoctum, artemisia, dictanum. Singula ex his cocta cum uino, aut trita et pota, sanguinem ducere creduntur. Conueniunt autem haec his in quibus purgationes impediuntur, uel guttatim purgantur, aut occlusio uteri adest. Auxiliantur autem & declinationibus, & recursibus sursum uersus, & strangulationibus uteri.

*Quae stercora euacuant.*

*Cap. clv.*

Stercora euacuant styrax deuoratus, mastiche cum aqua frigida trita pota, scrupul. xii. pondere, aloes drach. i. terebinthinae cochlearium, sinapi, allium cum oleo & garo feruefactum, ficus cum nitro, cnici seminis medulla. Omnia uero praedicta ad tenuia intestina commoda, etiam magna intestina purgant.

*Lumbricos educuntia.*

*Cap. clvi.*

Lumbricos rotundos & largos & ascaridas expurgant ea quae de tenuibus relata sunt, in potu accepta. Proprie uero expellit ipsos, auriculae muris succus cum melle potus, aut cum zytho, uiriusque cyathi mensura. Senecio in cibo acceptus, santonicum cum fico comestum, abrotoni decoctum, intestina terrae trita cocta cum passo pota.

*Sudores excludentia.*

*Cap. clvii.*

In potu accepta sudores excludunt, cuminum, baccae lauri, anisum, uirga, serpyllum, calamintha, polium, raphani cortex comestus, costus, fesymbrium, dictanum, artemisiae,



artemisiæ, cardamomū, libanotis, mel, lac bubulum, calia, iunci odorati decoctū, succus cyrenaicus ciceris magnitudine deuoratus in frigidioribus morbis, chamædrys, castoriū cū aqua mulsa, centaurij magni radix, radices capparis cortex, ligusticum, petroselinū, nigella. Hæc aliquādo cū uino, aliquādo cum uino mulso bibuntur, & sudores mouere creduntur. Sed & pistacia comesta sudores citra molestiā dicit. At uero forinsecus illita sudores mouent, nitrū cū oleo, ungentū irinū, anethinū, chamæmelinū, laurinū, raphaninū, lycioniū, myrobalaninū, althæa, costus, balsamū, aristolochia, calia, calamus aromaticus, libanotis, singula cū oleo cocta. Suffita uero sudores mouet, castoriū cū pulegio, semē balsami, bdelliū, uiticis semē. ut edum est his ad morbum regium, & ad eos qui ob frigiditatem, aut cutis adstrictionem, nō sudant.

*Quæ euacuant & corrumpunt pediculos omnis*

*generis circa corporis superficiem. Cap. CLVIII.*

Sandaracha, aristolochia, staphis sylvestris, sulphur uiuum, cinamomum, calamus aromaticus, calia, pyrethrum, cinis quercinus, cucumeris sylvestris radix.

*De infusionibus sedis.*

*Cap. CLIX.*

Plurima mala quæ in perniciem animalis generantur, propinat uētris suppressio. Sequitur enim ad ipsam uentris adstrictionem, capitis grauitas & uertigo, euerſio stomachi, lancinatio uomitoria, nausæ & ac prostratus appetitus, oris siccitas & amaritudo, ructus iniucundi, ac uirosi, spiritus graueolens, somni suspensi, ac iniucundi, inflationes, tormina, uoluuli. Generat itē plenitudinis, et articulares, podagricosq; accoxendicū morbos, omniaq; auget, & maligniora ac diuturniora mala efficit. Aliquando uero etiā pernicioſa ac letalia. Contingit autē infusionum per sedē usus etiā in alijs affectionibus, quarum ex parte mentionē faciam. Ex infusionibus igitur quæ iniiciuntur, aliæ simplices sunt & teneræ, aliæ acres, alię uero aliū usum ac uim habent. Ex simplicibus igitur, aqua calida ipsa per seipsam facit, eliciendorum stercorum gratia, in cōtinuis febribus, malignisq; ac æstuosis, & in his qui ex lōga imbecillitate uires recolligunt, in quibus difficiles secessus fiunt. Calidiorē autē immittimus, inflat enim tepida. Verū aqua & oleo utimur in detentione duriorū stercorū, & in his qui ulcerosum ac mordacē sensum circa intestina habent. Vitare tamen aquam & oleū oportet, ubi capitis grauitas fuerit, aut stomachus subuertitur, aut prostratus appetitus obtinuerit. Rosaceū autem pro oleo cū aqua iniectum, aptū est in æstuosis febribus, & feruoribus excellentibus circa mediā, & maximē circa colū. Caput autē complet, & minus lubricum est quā aqua & oleū. Immittēdum est autē rosaceū quarta aquæ parte. At uero cū ouo & ptisanæ succo iniicimus rosaceū in æstuosissimis febribus, aut ubi mordacitas circa intestina adest. Chamæmelinū uero oleū, & ouī luteū ac candidū, cū ptisanæ succo infundimus ad noctē, in ardentibus febribus, iubentes ipsum cōtinere per totā noctē. Nam & somnū iucundum inducit, & causas febris sequēti die secum educit. Butyrū uero cū aqua iniectū morsus & tormina mitigat. Modicū autē esse oportet in his butyrū. Facit et ad eos in quibus propter inflammationē intestini recti detinētur stercora, & in sordidis ulcerationibus circa intestinū. At fœnigræci decoctū ex aqua citra pinguedinē infundatur in febribus ex pituita accen-

sis, & in mollibus ac mulierosis corporibus, et in intestinorū morsu. Caput autē abūde cōplet. Quapropter nō utendū est eo, nisi caput à læsione fuerit alienū. Maluæ autē decoctū conuenit in torminibus ac morſibus, & præsertim si durū subest stercus. Semini lini uero decoctū in corporibus ac morbis siccis cōuenit. Vtile est & morſibus, & nausæbundis, & ualde sitiētibus. Caput autē cōplet quidē, nō similiter autē uelut fœnumgræcū. Ptisanæ uero succus stercora dura dissoluere potest, & intestina extergere, & morsus mitigare. Alicæ succus morsus quidē mitigat, maximē uero cōuenit cardiacis, & qui ex animi deliquio exoluuntur. Nam ad hoc quod nutrit, etiā uires reficit infusus. Insuperq; lubricitatem subiectis stercoribus exhibet. Furfurū succus febribus siccis, & doloribus colicis, & intestinorū ulcerationibus cōmodus est. Exterget enim absq; morsu. Portulacæ succus febribus accommodatissimus est, in morſibus ac feruoribus, tū alijs, tū in quibus propter durorū ac acriū stercorū excretionē, anus aut intestinū rectū læsum, ignis sacri affectionē incurrit. Verū in his miscere ad succum oportet & ouum, & rosaceū. Sed & per se succus portulacæ cōmodus est, ubi sacri ignis ardor in profundo circa intestina cōsistit. Lac iniicitur, ulceratione & inflammatione circa intestina consistente, itemq; in renibus & uesica atq; utero. Serum lactis infusum, egregiē stercus educit, & omnes supfluitates in intestinis repertas expellit. Exterget etiā sordidiora intestinorū ulcera. Verū citra coagulū paratur. Oleum per se immisſum calidum, cōmodum est inflammationis intestinis. Idoneum est etiā in extremē senibus, in quibus stercus induratur. Aqua mulsa cōuenit infusa in mitioribus febribus, & in mulierosis corporibus, & in decrepitis, quibus intestinū rectum aut colū perfrigefactū est. Rutæ decoctum, itē anethi, et cumini cū oleo, dissoluit flatum. quapropter colicis immittitur. Oportet autē in his esse duas partes decocti, & unā olei. Fœnigræci succus butyro & terebinthina ammixtis, ita ut sit de utrisque quarta pars succi, maximē mitigat tormina, siue concussionē circa intestina. Nā & diu intus manet citra mordacitatē, & superfluitates educit citra turbationem. Vtilissimus est etiā ad uteri morsus. At ptisanæ succo miscetur butyrū & mellis ualde parū, & sit cōmodus in detētis stercoribus propter intestinorū ulcerationem, & in sordidis intestinorū ulceribus. Rutaceum oleū cum butyro & terebinthina, utiliter infunditur in colicis doloribus. Aliquādo uero picis liquidæ drach. III. aut bituminis drach. IIII. cū rutaceo oleo terentes infundimus, & sedat dolores, & pituitā euacuat citra molestiā. Aliquando uero lanas sordidas in uino dulci coquimus & excolamus, atq; hoc ipsum oleo rutaceo ammixtū infundimus, & colli dolores sedat, ita ut sint uini mēsuræ tres, olei uero duæ. Si uero neruorū ex quibus testes pendent, aut uesicæ dolor affuerit, etiā petroselinū leuissimē tritū rutaceo oleo inspergatur. In doloribus uero abscessuum, aut doloribus ulcerosis in intestinis, butyrum cū māna thuris immittimus, aut medullā cerui aut uultuli cū oleo. Vbi uero frigidi fuerint morbi, & dolores lenti, galbanū cū butyro iniicimus, ut sit galbani drach. una, butyri sexcūx. Aut styracis oboli tres cū butyro. Cæterū acris infusus utimur in ischiadicis, lethargicis, erecta ceruice spirantibus, & frigidis morbis,



morbis, & ad eos qui letale pharmacum acceperunt, & in his quæ propter frigiditatem, aut concretionem in grumos, occidunt. Proinde in frigefactis toto corpore, syderatis, ischiadicisq; ac nephriticis, castorij obol. iiii. tritos cum oleo immittimus addito modico sale. Verum pro sale nitrum addimus, quum bis aut ter promptitudinem ad excernendum facere volumus. Sal etenim acruatim quidem mordet, non perseverat autem diu ipse morsus. At nitrum caput male afficit ac replet, & stomachum evertit, quale nihil salis adest. Efficacia autem sunt ad paulum ante relatos, garum a siluro, marina aqua, muria, decoctum centaureæ, colocynthidis, aristolochiæ, cucumeris sylvestris radicis, agarici, thymi, chamæpityos, seminis rosmarini. Hæc enim & sanguinem ducunt, & hoc ipso affectiones leuant.

De glandibus.

Cap. CLX.

Glandibus subditis utimur, aliquando ob egrorum imbecillitatem, qui infusis uti non possunt. Aliquando propterea quod stercora sint apud intestinum rectum, & infuso non habeant opus: præsertim in febribus vehementibus ac ardentibus, & materiam sursum repente habentibus, in quibus nocivus est infusionum usus. Nam in his absque omni molestia educuntur superfluitates infusæ, per glandes subditas. Commodæ sunt etiam omnibus frigidis capitis affectionibus, altiore somno pressis ac deliris. Contingit etiam ipsorum usus sæpe in his quibus non excernitur id quod per clysterem immisum est. Preparatur autem diversimode glandula ipsæ. Nam & ex melle cocto, & sale tosto, & nitro præparantur. Et ex cumino & ruta nitroq; ac melle cocto, in quibus inflatio magis infestat. Sed & thymus tritus cocto melle excipitur. Et cyclaminus trita cum melle. Et absinthium, aut abrotonum, aut lupinorum farina cum melle. Hæc autem glandula ad lumbricos comoda est. Aut hyssopum & tragoriganum & epithymum cum melle. Hæc in stomachi subuersione utilis est. Aut granum cnidii cum resina sicca siue melle cocto. Aut pyrethrum cum resina sicca. Aut sinapi cum sicca resina. Aut centaurium cum pice & cera. Hæc comode sunt in partium resolutione. Aut bitumen, radicis panacis parum, hyssopum, galbanum, & resina sicca. Utilis est hæc glans ad resolutos toto corpore, & propterea facultatem excernendi debile habentes. Facit & in resolutione intestini recti. Facit ad ascaridas. Potest autem pro melle resina sicca in usum assumi, aut pix, aut ficus pinguis trita, aut uua passa exepitis granis, aut sapo. Optima uero glandula fit ex folijs mercurialis uiridibus tritis ac efformatis & siccatis. In infantibus autem etiam grumus salis inditur, cepaq; ac porrum capitatum.

De tomentis siue floccis.

Cap. CLXI.

Sæpe etiam opus est aliquid subdere, in his qui scissuras aut condylomata in ano habent. dilaniantur autem hæc a glandium duritie. Vnde cogimur tomentis pro illis uti. Materia uero horum sunt omnia ante relata, quæ trita cum melle, & tomento siue flocco excepta ano induntur.

De aere. Galeni.

Cap. CLXII.

Bonus est aer in omni tempore qui exacte purus est. Talis autem fuerit is qui non ex stagnorum aut palustrium locorum euaporatione turbatur, neque ex barathro quopiam uenenosam auram concipit. Velut uerbi gratia. Si ex quibusdam cloacis magna ciuitatem expurgantibus conturbatur, malus est. At uero & qui nebulosus est, non est bonus. Quemadmodum etiam qui in regione

caua undique aliis montibus includitur, malus est & æstuosus ac strangulatorius. Qui uero in montibus altisq; regionibus est, & nullam auram suscipit, salubrior est, commodus erecta ceruice spirantibus & tabidis, & omnibus thoracis ac capitis affectionibus. At qui in humilibus regionibus purus est, commodus est animo deliquentibus ac senibus. Marinus uero hydropicis et fluidis affectionibus, & præsertim frigidioribus utilis est, & nervis per consensum affectis, & prostratae appetitiae. Qui uero in petrosis locis est, hyeme quidem grauis est, frigidus enim est: æstate uero æstuosus est. Malus est etiam qui ex metallis exhalat. Qui uero ex argillosis, stomachum exoluit. At ex locis terræ fuluæ, magis priore siccatur. Optimus autem est ex terra nigra. Sed & circa anni tempora, mutationes aeris fiunt. Et uerno quidem tempore humidus & calidus est aer. Aestate uero siccus & calidus. Autumno frigidus & siccus, hyeme frigidus & humidus. Rursus autem in singulis temporibus tres differentiae fiunt, prima, media, & ultima. Media itaque sincerissimum temporis temperamentum habet. Prima uero & ultima a uicino tempore imminuuntur. Sed & luna secundum mensem quatuor differentias in aere operatur. Primus igitur septenarius a nouilunio usque ad septimam diem, similis est ueri, humidus & calidus existens. Secundus uero septenarius usque ad plenilunium, æstati similis est. Tertius sextenarius decrescere luna, autumno. Quartus et ultimus, hyemi. Sed & singulis diebus differentiae aeris fiunt. Matutinum enim tempus humidum est & calidum, uelut uer: Quapropter etiam corpora tum sanorum, tum ægrotorum remittuntur, ut etiam febrientibus hoc tempus facillime tolleretur. At medium diem, æstati assimilatur. Crepusculum autumno, uespera hyemi. Quin & noctis prima pars ueri assimilatur, media æstati, & reliqua consequenter.

De uentis, Adamantij Sophistæ.

Cap. CLXIII.

Quandoquidem uero ex terræ exhalationibus ueteri generantur, etiam de his paucis tractandum est. Ventos quidem parturit terra. parit autem fuliginosas exhalationes. Nam caliditas humiditati inuoluta, sicciores exhalationes, & uelut fuliginosas faciens, uentos generat. Siccam autem exhalationem nunc accipe ad comparationem aliorum, uelut si uinum siccius dicamus. Vniuersales ueteri duodecim sunt numero. Orientales tres, eurus, subsolanus, cæcias. Occidentales tres, aphricus, fauonius, thrascias. Vnus autem meridionalis appellatus auster, & unus septentrionalis boreas: ut sint relati octo. alij uero quatuor inter relatos medij sunt, et ab angulis mundi excitantur. Inter orientem & meridiem, Euroauster. Inter meridiem & occidentem, Aphricoauster. Inter orientem & septentrionem, Aquilo. Inter septentrionem & occidentem, Argestes, siue Circius: ut sint omnes uniuersales xii. Alij uero qui uernaculi sunt singulis regionibus, spurij existunt. At uero aliae exhalationes ex terra fientes, humidiores his sunt quæ uentos generant. Si quidem igitur modica & tenuis fuerit exhalatio, uapor nubilosus generatur. Si uero amplior & crassior, caliginosus. Si uero adhuc crassior, tenebricosus. Plurima uero ac crassissima humiditate exhalante, uapor diffunditur in ambientem roscidus. Ex his quatuor exhalationibus coactis rores & imbres fiunt ac deferuntur: congelatis uero pruinae, & niues, & grandines, pro frigoris qualitate ac quantitate. Nulla uero harum uentum generare solet, quum segnes sint & impetu careant. Et humida quidem exhalatio quæ uapor



uapor appellatur, rores & imbres facit. Siccior autē facit uentos, & est sicca humide contraria. Quomodo uero sepe simul imber & uetus fit, dicimus, quia ex alto atq; alio loco afferuntur. Quā enim ex diuersis latitudine locis contrariæ exhalationes fiunt, tunc & pluit & flatus fit. Cur autē aliquando post pluuiā uenti fiunt, aliquādo post uentos pluuiā sequitur, dicimus, Quoniam caliditas in terra nō habet in illo tempore humorē quē accēdat, & propterea manet ociosa, ubi uero arripit pluuiā humiditātē, efflorescit: et per materię incensionē fuliginē excitans uentos efficit, qui iam sanē cōsumpta pluuiā nube, manēt in serenitate spirātes, aut impellunt id quod ipsos genuit. Pluuiā itaq; hoc modo uentos generat. Ventus autē pluuias hoc modo generat. Ostendimus quod cōmunis est caliditas utriusq; exhalationibus. Verū humiditas quātitate diuersa est. Quum igitur multa fuerit caliditas, larga uero humiditas, tūc appropinquante humiditātē in superficie exurit, & fuliginē simul ac uapores facit. Transpirans autē caliditas ex multa humiditate paulatim imminuitur, & non amplius humiditātē exurit, sed diffundit, & uapores pro fuligine facit. Atq; sic succedit imber post. Et sepe ad multos dies obtinet pluuiā calido exoluto, & non amplius materiā exurere potente. Cur autem multi & assidui borales ac anniuersarii uenti in æstate fiunt? Quoniam sol sub boreali polo plurimā reperiens humiditātē, partim in niue, partim in aquis cōgelatis, & hāc paulatim eliquās, diuidit quidē in fluuiorū ac stagnorū generationē, effundit autē & fontes in terrā. Et propterea multas exhalationes efficit, quas in flammā exurēs, unā cū caliditatibus multo tempore in terra occultatis, fuliginosas ipsas reddit, & quod exurit ad ueti diuturni fluxū paulatim redigit. In cōmuni igitur omnis uentus longiorē aëris fructio-nem exhibet corporibus, uiolēto motu aërem inducēs. Porro locales uenti similes sunt locis ex quibus spirāt, à salubribus locis, salubres, à morbosis, morbosī. Quare ex relatis de aëre, etiā de his coniectare oportet. Quo uero in summa dicamus, omnes locales ueti uniuersalibus morbosiores sunt. Nā corpora inæqualiter afficiūt, neq; totum aërem cōmouentes, neq; per totū diem spirantes. Maximē enim locales uenti circa matutinū solū tempus spirāt, quos nautæ Apogeos, uelut è terra eleuatos appellāt. At ex uniuersalibus uentis hi qui à meridie spirant Austrī appellati, calidū temperamentū habētes semper, ferme etiā humidi sunt. Trāsmutantur autē ad tempora anni, & fiūt calidi ac sicci. Et propterea uarios morbos generant. Boreales uero frigido sunt temperamēto, & ideo omnium uentorum saluberrimi, & præsertim in calidioribus ac carnosīs corporibus. At uenti orientales uehementissimi sunt, & morbos à siccitate contingentes efficiunt. Occidentales autem humidi sunt ac lenes, et corporibus nostris magis familiares.

De accessione ac significatione stellarū. Cap. CLXIII. Quandoquidem etiā stelle in cœlo orientes iuxta tempora à deo ipsis ordinata, & similiter occidētes, aëra mutant, ut contingat ex hoc etiam uentos alias aliter spirare: necessarium duxi hic tempora indicare, in quibus earum quæ palam aërem alterant, ortus & occasus fiunt. Nam sanorū corpora, & multo magis ægrotorum iuxta aëris statū alterātur. Mense Martio qui Dystrōs Græcis est, equus mane oritur decima nona die. Mense martio die xxxiii. æquinoctiū

uernū est, & maxima aëris turbatio. Mense aprili hoc est Xanthico, prima die intempesta nocte pleiades apparēt. Mensis april. xxi. pleiades uesperī occultantur. Mensis april. xxi. pleiades cum solis ortu oriuntur, & est maxima circa aëre turbatio. Mensis aprilis xxvii. orion uesperī occultatur. Mense Artemisio, hoc est Maio, prima die hyades simul cum solis ortu oriūtur. Mensis maij quarta, lyra uesperī oritur, & aër multū alteratur. Mensis maij sexta, capra mane oritur, & ualde alteratur aër. Mensis maij septima, pleiades mane apparēt, et aër sedari incipit. Mensis maij xix. hyades mane apparēt, & aër ualde alteratur, pridie aut nudiustertius eius diei. Mensis maij xxiiii. capra uesperī occultatur, & nudiustertius eius diei aër mouetur. Mensis iunij secunda, aquila uesperī oritur. Eiusdem sexta arcturus occidit. Nona delphin uesperī oritur. Vigesima quinta oriō mane oriri incipit. Sunt autē solstitia æstiuā, & aër tribus diebus antea ualde alteratur. Mensis iulij tertia oriō totus oritur. Decima quarta procyō, siue canicula mane oritur. Decima nona canis oritur, & contingit maxima aëris turbatio, aliquando etiā nudiustertius eius diei. Vigesima quinta aquila mane occidit. Mensis augusti decima quinta lyra mane occidit, decima nona delphin mane occidit. Et est mutatio æstatis ad frigiditātē. Vigesima octaua uindemiator mane oritur, & malus nauis occidit. Et est finis dierū post exortū canis. Mensis septembris septima capra uesperī oritur. Decima septima arcturus oritur, & alterat sequenti die aërem. Decima nona spica mane oritur. Alteratur aër duobus diebus antea. Vigesima quinta æquinoctiū fit autumnale, & est maxima aëris turbatio tribus antea diebus. Quare cauendum est ne uenam secemus, neq; purgemus, neq; alias corpus uehemēti motu moueamus, à decima quinta septēbris usq; ad uigesimā quartā eiusdem mensis. Mensis octobris sexta corona mane oritur, & est uehemēs aëris mutatio. Septima hœdi uesperī oriuntur. Decima septima hyades uespere oriūtur, & magna fit aëris turbatio. Vigesima tertia unā cū solis ortu pleiades occidunt. Et cōtingit pridie maxima aëris turbatio. Mensis nouēbris sexta pleiades mane occidunt, & incipit aër sedari. Vndecima lyra mane oritur. Vigesima prima hyades mane occidunt, & sequenti die turbatio fit circa aërem. Vigesima septima orion oritur, & corona occidit. Mensis decembris prima, canis mane occidit. Obseruatū est autem à multis, quod si tempestuosa fuerit hæc dies, perseverat plerūq; turbatio aëris ad dies xxxvii. Si uero serena fuerit, per tot dies serenitatem fore significat. Decima hœdi mane occidunt. Vndecima capra mane occidit, & perturbatio aëris fit postridie. Vigesima tertia solstitium est hybernum. Mensis Ianuarij quarta delphin oritur. Quinta aquila uespere occidit, & fit turbatio uehemens post duos dies. Vigesima quinta illustris stella in leone occidit. Mensis februarij sexta fauonius spirat. Vigesima secunda malus nauis uesperī occidit, & est turbatio aëris magna. Vigesima quinta arcturus uesperī oritur. Vigesima sexta hirundines uolant & apparent.

De aquis, ex Ruso.

Cap. CLXV.

Aquarū potabiliū quinque sunt uniuersales differentie, pluuiā, fontana, puteana, fluuiālis, stagnina. Ex his apparet aqua pluuiā leuissima et facillimē mutabilis, & in alijs affectionibus potu optima, si statim exci-



piatur ac coletur. Verum febribus & his qui bilem supernè ac infernè reddunt, & regio morbo incòmoda est. Mutatur enim facillè & in bilem trāsīt. Idonea uero est ocularijs medicamentis, ad fluxus aut ulcera destinatis. At his quæ uisum acutiorem reddunt, inepta est. Itemq; ad metallicorum pharmacorum loturam. Adstringit enim amplius quàm fōtana. Quare neq; extergit, neq; concoquit, neq; madefacit, & excretionem impedit. Diuturnior autem acerbior fit, & difficilius transit, & ægrius secernitur, tardius item concoquitur ac digeritur. Generat autē destillationes, præsertim si frigida bibatur. Fōtanæ uero aquæ, quarum fontes ad septentrionem erumpunt ex petris stillantes solè auersum habent, incoctiles ac tardī trāsītus sunt, & tarde calefiunt, ac frigescunt. Quarū uero fontes ad orientes erūpunt, & per meatū quendā aut terram purā excolantur, calefiuntq; ac frigescunt citissimè, hæ optimæ sunt, nisi ex cloacis quibusdā uitium ipsis accedat. At puteana frigida est, terrea, difficulter excernitur, ægre digeritur, & propterea æstus stomacho aut uentri cōmodior est quàm fontana. Fluuiales autē aquæ & stagninæ omnes malæ sunt. Nili aqua excepta, hæc enim omnibus uirtutibus exornata est. Nam & in potu iucunda est, & moderato tēpore in aluo moratur, sitimq; extinguit, & si quis frigidā bibat, minimè molestat, & ad cōcoctionem ac digestionē utilis est. Vnde concinnū, & robustū, & bene coloratū corpus facit. At aliorū fluuiorum aqua egrè cōcoquitur, siccatur, & siticulosa est, & præsertim si uitiosas aliquas regiones pertransit. Meliores autē sunt fluuij, qui per fontes perpetuos fluunt, & alijs fluuijs non miscentur. Stagnina uero aqua, propter cœnosam circūferentiā, limosa & grauis est; & propter stationem ac immobilitatem, uelut mortua & putrefacta. Quare nunquā alia præsentē aqua, exhibēda est hæc debilibus. Porro iuxta terrā quoq; ac regiones, plurimæ aquarū differentiæ sunt. Verū ut in summa dicā, quæ gustui congrua est, & cui inhabitatorū experientia testimonium præbet, optima censenda est. Nam quæ cito calefcit ac frigescit, & facile carnes ac alia omnia coquit, ea etiā cibos in uentre concoquit. Quæcūq; uero aquæ adstrictionem, aut falsedinem, aut nitrositatem, aut crassitiem, aut aliud quid in gustu detegunt, malæ sunt. Itē quæ graue olent, & quæ concretionem superstantem habent, & subsidentia fœtidam ac solidam, & quæ instar lapillorum æreis uasis adhærent, & quæ hirudines nutriunt, aut talia quædā praua animalia; & stantes, & palustres, & quæ sunt in metallis auri & argenti, aut aluminis, aut sulphuris, aut similibus. Et quibus radices insitæ sunt, incommode sunt. Et quibus uicinæ sunt calidæ aquæ siue spontaneæ erumpentes, omnes tales malæ sunt. Optimum igitur fuerit talem aquā præcoquere in fictilibus uasis, & frigefacere, & rursus calfactā bibere. Cæterum in peregrinationibus aut exercitijs, fossæ consequenter faciendæ sunt, ab altissimis locis ad decliues, & per has ducenda est aqua, ita ut in totas fossas terra dulcis ac pinguis mittatur, ex qua fictilia fiunt. Semper enim in fossis relinquitur aquæ malicia. In summa, omnis aqua tarde transit, ægre concoquitur, & flatuosa est, & præsertim frigida destillationē facit. Si uero ab acceptis in cibo oleribus quis aquam bibat, maius est periculum, ne homo tenuia capitis ulcuscula, & scabiē, &

lepras, pustulas, impetigines, furfures, putrida ulcera, herpetas, satyriases, aut ex his aliqua incurrat, & ad hoc urinas mordaces talesq; etiam egestiones habeat, & præsertim si nitrosa fuerit aqua. Incòmoda est etiā thoraci, arteriæ ulceratæ, nitrosa aqua, renibus item ac uesicæ & omnibus ulceribus. Emendant autem nitrosam aquā, cibi hebetantes ac uinum. Crassam uero, secantes & attenuantes, uelut sunt allia & similia. Aluminosam, uinum tenuissimum, omnia urinam cientia, & omnia excretionem impellentia. Videtur porrò aqua cōuenire capitis doloribus, hebeti uisui, comitiali morbo, articulari morbo, tremulis, resolutis, per se, & cum melle pota. Commodior est autem his quæ ab utero strangulantur, & qui bilem generant nigram siue flauā, à quibus os uentris roditur & robusto uentri, ac intestino ieiuno, & iuuenibus exudantibus carnosiss, & omnibus pinguibus, & nimium purgatis, & ex uulnere sanguinem fundentibus, aut ex naribus, aut alio loco. Commodat & æstuosæ febris tempestiuè data. Cōuenit etiam his qui assidue in somnis semen effundunt, & qui alias seminis profluuio laborāt, in potu accepta: quāquam profit etiā in ipsa natate, ex eaq; perfundi conuenit mulieribus è fluxu, aut pica laborantibus. Cōuenit singultientibus, & oris graueolentiam habentibus frigida pota. Tepida uero cōuenit morbo comitiali, capitis doloribus, lippientibus, gingiuis dentium corrolis, dentibus perforatis, gingiuarum abscessui, & gingiuis cruentis, faucibus ulceratis, tonsillarum morbis, fluxioni capitis, atræ bilis feruori, bilis superne ac infernè erumpenti in principio, & uomentibus in febris biliosa. Conuenit etiā tepida aqua quā frigida impedimentū fuerit, & his qui ulcera habent circa septum transversum, & sanguinem spuētibus, & rupturis in succingēte costas membrana. At uero calida aqua conuenit, ubi oportet excretionem præparare, & ubi quid attenuare, & ubi diffundere, aut liquefacere, aut mollire, aut eluere, aut concoquere, aut discutere uolumus. In uniuersum igitur calida pota hæc potest. Particulatim uero, mucum ducit, & scretum adiuuat, & dolorem omnē mitigat, & præsertim in præcordijs ac intestinis, ructum mouet, & flatum prouocat, urinam ac secessum ducit. Bona est etiā ad cōcoctionem, ac digestionem, & nutritionem, atq; augmentū. Menses ducit, neruis & cōuulsionibus idonea est. Pleuritidi itē ac peripneumoniæ & anginæ. An uero nutriat, aut non nutriat, & an sit alimenti uehiculum, non est propositum hic quærere. Quod uero dicere necessarium est, hoc est, quod sine aqua alimentum concoqui non potest: Sicut neque citra aquam quicquam commodè coqui potest. Cæterum aqua lixiuij pota splenicis prodest. Et si quis panem cum tali aqua præparatum ipsis præbeat, multum prodest.

De Balneis. Ex Galeno. Cap. CLXVI.  
Balnea quædam sunt dulcia, quædam qualitatis exortia, quædam qualitatem aliquam habent. Et quæ aliam quandam qualitatem habent, partim ex nostro studio uim habent, partim naturalem uim per se possident. Primum igitur de dulcibus dicendū est, quādoquidem horum usus frequētiore existit. Dulcium itaq; aquarum uis humida et calda est, si quidem fuerint tēperatæ. Si uero tepidæ fuerint, humida & frigida. Si uero calidiores æquo factæ fuerint, calida quidem



quidem ipsarum uis est, nō autem similiter humida. Inhorrescere enim cogunt corpora, & meatus ipsorum densari, ut neq; extrinseca humiditate fruuntur, neq; ex internis superfluitatibus quid euacuetur. At enim à temperatis incipiendum est. Temperatę itaq; semper humectant per se ipsas ac calefaciunt. Contingit autem ipsas aliquando aut discutere humiditates ex corporis quibusdam partibus, aut mollire, aut concoquere, aut corroborare uirtutem, aut dissolvere. Ad hæc tamen etiam quantitas ipsarum non parū confert. Commoda uero sunt talia balnea, dulcia inquam & tēperata, in febribus siccis & humoris exoribus, & præsertim in immodicē sitientibus, & in fori insolatione, & in pustulis scabiosis. Oportet autem & aërem balnei humidum efficere pauimēto & parietibus atq; conspersis. At uero calida ex nostra industria parantur balnea, quum frigiditatem infestā sedare uolumus, aut lassitudinis affectum, aut conuulsionem, aut dolorem mitigare. Fiunt autem calida, calfactorijs quibusdam aque immixtis, uelut pulegio, origano, hyssopo, thymo, thymbra, saluia, folijs lauri, pyrethro, chamępity, panacis radice, ros-marini semine, & similibus. Balneis autem discussorijis utimur, aut habitum corporis graciliore reddere uolentes, uelut in pinguibus, & ex affectione tumefactis, aut toto corpore, aut aliqua parte, uelut ab domine, testibus, pedibus, uelut in hydropicis cōtingit. Utimur etiam in fluidis ulceribus, propter subiectam in toto corpore multitudinem, aut uaricibus ulcere subiectis. Fiunt autem discussoria balnea, iniectis aque talibus quibusdam, qualia sunt, sal, nitrum, aqua marina calefacta, & mel aquę ammixtum, aut staphis syluestris cocta cum aqua ex cinere ficulneo aut uitis percolata. Item bacca iuniperi cum eadem aqua cocta, & sulphur eadem aqua elutum, adarce & alumen cum eadem coctum. At uero mollibus, & lenibus balneis utimur, in inflammatione ac duritie quadam partium. Talia autē sūt malua in aqua cocta, tum hortensi, tum syluestri, & semine lini, & foenigræci, & meliloti. In fluidis autem inflammationibus, plantago aut polygonum aquę incoquitur, aut malicorium, aut rubi folia. In conuulsionibus autem inflammationem minantibus, utimur his quę iam relata sunt in inflammationibus absq; fluxionibus. Maxime uero prodest his aqua & oleum, in quibus malua, foenumgræcum ac semen lini sunt incocta. Si uero duritia est citra inflammationem, prædictis discussorijis utemur.

*De balneis naturalibus. Archigenis. Cap. CLXVII.*  
Ex balneis naturalibus quædam sunt nitrosa, quædam salia, quædam aluminosa, aliqua bituminosa, aliqua sulphurulenta, aliqua ferri, aliqua aeris qualitatem habent. Quædam uero ex his composita sunt. Horum autem omnium uis est siccare. Aliqua uero unā cum hoc quod siccant, etiam strenuē calfaciūt. Quædam unā cum siccando etiam adstringunt, uelut aluminosa, ex parte uero etiam salia, & quę aeris qualitatem habent. Omnia autem sunt commoda humidis & frigidis præter naturam corporibus, & talibus morbis diuturnis. Quapropter cōueniūt morbo articulari, podagræ, resolutionibus, nephritidi, anhelosis, fracturis calli inductione egentibus, ulceribus fluidis, inflammationibus diuturnis & iam induratis. Et nitrosa quidem ac salia capiti cōueniūt,

& thoraci fluxionibus uexato, & stomacho humido, & hydropicis, & tumoribus omnibus. Aluminosa uero, sanguinis reiectioni, stomacho uomentis, & his qui immodice ab hæmorrhoidibus euacuantur, & sceminis quę inordinate purgantur, aut nimium purgantur, & quę citra manifestam causam frequenter abortiunt. Prosunt & his qui immodicē exudant, & tardē concoquunt, & tumoribus surarum. Commodant etiam uaricibus. At sulphurulenta & neruos molliunt, & tenasmi dolores mitigant. Verum stomachū exoluunt ac subuertunt. Purgant autem cutem, & propterea conferunt uiriliginē albę ac nigrę, leprę, scabiei, impetiginē, & ulceribus antiquis, articularum fluxionibus, spleni indurato, hepaticę ac utero, resolutis, coxædicum morbo, & pruritui. Bituminosa uero caput replent, & sensu instrumenta lædunt. Perseueranter autem calfaciūt, & cum tempore molliūt, & præsertim partes circa uerum & uesicā ac colum. Quę uero aeris qualitatem habent, ori & tonsillis, & uuæ, atq; oculis excellēter cōmodant. Ferri uero qualitate prædita stomacho & spleni cōuenientissima sunt. Porro quę mixtam qualitatem habent, iuxta dominium mixtorum operantur. Oportet autem ingressus ad naturalia calida balnea citra turbationē facere, quo uis ipsorum remisso corpori allabens immergatur. Nā qui perturbati ingrediuntur, eorum corpus horrescens densatur, & nō suscipit ab aqua qualitatem. Cæterum bituminosis & sulphurulentis aquis salientibus, caput supponere non oportet, facile enim inde læditur.

*De frigida lotionē. Ex Galeno. Cap. CLXVIII.*  
Frigida balnea cōueniunt inculpatē sanis. Corroborant enim totum corpus, & cutem duram ac densam efficiunt. Optimum est autem hoc præsidium contra læsionem ab externis. Non autem dico conferre frigida lotionem his qui uulgari uictu temere utuntur, sed solum his qui exacte uiuunt, & laboribus ac cibis cōuenientibus utuntur. Sint autem neque ex uenere, neque aliās lassati, neque crudi, neque prius uomuisse debent, neq; uentre malē affecti esse, neque uigilasse. Alloqui periculosus fuerit eius usus. Oportet autem insuetos ad frigida lotionē paulatim adsuafacere. Et primum quidem in æstate ipsius usum auspicari, & primum non in sinceram frigidam ingredi, sed quę superficiem habet exolutam. Deinde ubi paulatim per totam hyemem adsuauit quis, ita ad frigidam accedere. Sit autem dies in qua auspiciatur, à uentis tranquilla, & quā maxime pro illo tempore calida, & in meridie initium faciat. Qui uero frigida usus est, sit græte circa quintum & uicesimum annum, sit animi alacris & ualde uirilis. Et primum fricet corpus linteis diutius frictione duriore. Deinde per oleum fricetur consuetum, postea exerceatur, atque ita in frigidam descendat, non lenitē, sed confertim insiliēs, quo in uno tempore omnibus corporis partibus aqua circumfundatur. Nam quę paulatim appropinquat, horrorem inducit. Sit autem aqua uelut dictum est, neque tepida, neq; purē frigida. Postquā autem egressus fuerit ex aqua, à pluribus per oleum fricetur, donec cutis incallescat. Et postea cibos plures quā solet ingerat. Nam plures appetunt à frigida lotionē, & melius concoquunt, & minus siciunt. Quare etiam paucior porus ipsis dandus est.

*De infessu*



*De infessu in folium ex oleo. Galeni. Cap. CLXIX.*  
 Infessus in folium ex oleo, conueniunt diuturnis cum frigore febribus, & lassatis, & dolentibus nervos ossibus incumbentes, & conuulsis, & urinæ suppressæ. Oportet autem quintam olei partem ad ignem calfacere: Reliquum uero in folium immittere. Satis autem calidum fit, quod in parua folia balneorum immittitur. Quinta uero pars ad reliquum calfacta adijciatur, atque sic æger inducatur.

*De spongiæ usu. Archigenis. Cap. CLXX.*  
 Spongiæ usum assumimus in alijs quidem partibus, aut ad sordes incumbentes detergendas, aut ad sanie, aut sanguinem, aut pus, aut ipsa medicamenta, aut ut corpora à mordacitate aut pruritu uexata mitigemus. Verum in facie, ut spiritum renouemus ac resuscitemus, uelut in his qui animo linguuntur aquam adhibemus æstate quidem frigidam, hyeme uero lactosam siue lactei teporis. In ægrotis autem caute hoc faciendum est, non in principio, neque in augmento exacerbationis, sed in uigore ac declinatione. In principijs enim impetuum refocillamus per odoramenta. Vult autem Archigenes in febris ardentis excessu iuxta ipsum uigorem, ut non solum faciei spongiam adhibeamus, sed etiam pectori.

*De asperisionibus. Cap. CLXXI.*  
 Sed & asperisiones faciei assumimus in ægrotis, ob prædictas causas. Et æstate quidem in ardentissimis febribus frigidam adhibemus, hyeme uero calidiorem. Verum in simplicioribus febribus, & in stomachi subuersione, etiam poscam aspergimus. Cauendum autem ne diutius immoremur, & præsertim in his qui caput quod facile leditur habent. Nam delationis in soporem grauiorem ac periculosæ frigiditatis initium præbet. Utimur etiam asperisionibus in oculis fluxione infestatis, ocymi decoctum uelut efficacissimum adhibentes, & ramulorum pinastrorum conusorum decoctum. Subijciatur autem mento spongia sicca, ut ne defluat aqua ad pectus.

*De irrigationibus. Cap. CLXXII.*  
 Irrigationibus utimur ubi ob aliquam circūstantiam balneum adhibere prohibemur. Et in uigilijs, in febribus, & ad delirantes ipsis utimur, uelut est decoctum chamæmeli, aliquando etiam calicum papaueris. Quin & decoctis in oleo calicibus papaueris, caput irrigamus, & statim iucundus somnus sequitur. Archigenes autem præceptorem suum Agathinum ex uigilijs delirantem, cōfestim à delyrio ac uigilijs liberauit, capite eius multo calido oleo irrigato. At in conuulsionibus caninis oleo sicyonio calido, aut aliquo consimili caput perfundendū est. Item in his quibus nerui fortiter sunt afflicti. Si uero frigiditas & tremor ad afflictionem neruorum consequatur, etiam castorium ad sicyonium ammiscendum est. Podagricos uero marrubio in aqua aut uino cocto irrigamus.

*De infesionibus. Cap. CLXXIII.*  
 Infusiones assumimus in partibus inflammatis, aut ob balnei penuriā, aut propter uirium debilitatem, aut ob aliud quoddam impedimentum. In inflammatis igitur renibus, utimur decocto scœnigræci, maluæ hortensis ac syluestris, seminis lini. In calculosis uero, isdem propter inflammationem, & artemisiæ decocto, ac rosmarini, & petroselinis, ac spicæ nardi. Iisdem etiam utendum est in uelica, adiecta etiam ruta.

Ad uterum uero, artemisiæ decocto, saluæq; ac lauri, & similibus. Ad colum autem, sinonis & panacis decocto, & lauri ac similibus. Ad sedem, meliloti, calicum papaueris & rosarū decocto. Ad fluxiones autem uteri & hemorrhoidas ani, plantaginis decoctum conuenit, & polygoni, malicorini, rosarum, ruborum, ac similibus. Ad uulnera uero cōuulsionem denuntiantia, aqua & oleum. Omnes igitur illinēdi sunt, & inducendi usq; ad imum umbilicum. Oportet autem & partes quæ non madefiunt, prius inungere, & præsertim caput, & regere ut ne repleatur.

*De humectationibus. Cap. CLXXIIII.*  
 Humectatio differt ab irrigatione, eò quod perseverantem ex adhibito auxilio habet utilitatē. Nam aut lanam aut linteam humectantes imponimus partibus affectis post perfusionem siue humectationem. Habent igitur minorem uim quàm cataplasmata. Utimur autem ipsis ad caput, quod non probe ad cataplasmata dispositum est, & ad eos qui ob debilitatē ferre non possunt cataplasmatum grauitatem, & ad præcordia inflammata, circa morborum principia, quum intempestiuus sit tunc cataplasmatum usus. Utimur etiam ad fracturas ac contusiones necessitate experiente, quando emplastica pharmaca assumere non possumus.

*De fomentis, perfusione, cataplasmatibus, ac cucurbitis. Ex Galeno. Cap. CLXXV.*  
 Fomenta cutem rarefacere solent, & facile transpirabilem efficere, & sanguinem in inflammationibus attenuare ac discutere, toto nimirum corpore tunc superfluitatibus carente. Nam superfluitas quæ redundat in quibusdam per omnem cutem, plus ad calefientem partem trahetur quàm discutietur. Quapropter ante fomenta totum corpus euacuare oportet. Humida itaq; fomenta inflammationibus conueniunt à biliosioribus humoribus factis. Sicca uero his quæ à tenui & aquoso sanguine productæ sunt. Et leuia quidem fomēta mordacibus humoribus conueniunt: Mordacia uero & attenuantia, crassis ac uiscosis. At uero calfacere præcordia cataplasmatibus aut irrigationibus, non semper tutum est. Sed in illis solum ægrotis, in quibus nulla superfluitas in toto corpore oberrat. Alijs omnibus extremum malum est. Cōtingit autem in plenitudinis morbis, ut diuites magis quàm pauperes male curētur. Pleriq; enim ipsorum prædelictis non sustinent uenæ sectionem, & quidē quum magis quàm pauperes plenitudinis affectionibus corripiantur, ut qui etiam magis impleantur & ociosius uiuant. At qui curant ipsos medici, eò quod relictum est maximum auxiliū, arbitrantur se aliorum usu expleturos esse quantum deest. Et sanē ipsi etiam ægri putantes quietum uictum, negligentiam esse, & quodcunq; tādē facere, curationem esse, cōgunt medicos quotidie aliquid præcordijs adhibere, consentientibus sanē etiam medicis in hoc ipsum, ut semper aliquid facere uideantur. Hinc enim sperant se plus lucri facturos esse. Atq; sic ipsi efficiunt inflammationes per ea quæ faciūt, semper aliquid præcordijs adhibentes. Proinde contingit in illo tempore inflammationes incipere in diuitibus, in quo iam in pauperibus morbus est prope solutionem. Vena enim secta in principio præsertim continentis febris, & pauperes, & serui diuitum plerique in quinta die iudicati sunt, aliqui uero in septima. At uero diuites, plenitu



plenitudinem & superfluitates plures quam ferui & pauperes habentes; & uenæ sectionis auxiliū transgressi, & postea quotidie per calidū oleū forti, & laxatorijs cataplasmatibus intesti, inflammationem quandam conflata habent, aut circa hepar, aut uentrē, aut alia uiscera, aliqui in quarta die, aliqui in quinta, aut omnino in sexta. Vidisti autem etiam tu qui eodem tempore dum fomentum adhiberetur difficulter spirauit, omni superfluitate ad præcordia attracta à caliditate. Hic itaq; mortuus est, & alij innumerij quotidie moriuntur, quā cataplasmata instar cucurbitæ attrahant ad uiscera superfluitates ex toto corpore. Quidam uero etiā ipsa cucurbita usi sunt in præcordijs, hoc unum etiam illi cogitantes, ut uiderentur aliquid semper facere circa ægrotum. In principijs igitur dum adhuc feruntur fluxiones ad affectum locum, melius est repellere ac reprimere, non attrahere ad ipsum. Comoda autem sunt in principijs adstringentia cum oleo adhibita: quæ simul & firmitatem addunt partibus affectis, ut ne facile affluentes superfluitates suscipiant, & simul iam in ipsis contentarū temeritate intus reprimunt. Postquam uero latio quiescit per repulsoria auxilia, & densitas ex adstrictione inducta partibus affectis, continet superfluitates, tunc iam tempus est laxare, quo contentæ superfluitates euacuentur: præsertim uero ubi ad hepar aut uentrē impetū fecerint superfluitates, moderatè adstringentibus uti conuenit in principio. Valde enim principales sunt hæ partes. Imò ubi etiam tempus iam fuerit discutiendi firmatas, tunc quoque partes hæ adstrictione opus habet. Quare decocto in oleo absinthio irrigabimus. In quibus autem fortiore adstrictione opus est, omphacinum sit oleum, in quo decoquitur absinthium. In penuria uero absinthij, melinum aut mastichinum aut lentiscinum ad hoc sufficet. Si uero minor fuerit febris, etiam nardinū unguentum addatur. Si uero declinatio febris nō ualde mitis fuerit, à nardo cauere oportet, uti uero melino. Quo non præsentē, rosaceum ad nardinum miscendum est. Similiter etiam cataplasmata compositam uim habeant, ex laxatoria ac tenui, & ex amara ac adstringente. Quod si colum fuerit affectum, aut alia intestina tenuia, aut musculi præcordiorum, aut pellicula aluum & intestina amplectens, nequaquam miscenda sunt adstringentia. quemadmodum nec si uelica aut uterus, quum uelut dictum est, nec influxerit quid amplius, neque superfluitas fuerit in toto corpore. At uero renes & thorax in medio retractorum sunt: Neque enim multa adstrictione in his opus est, nec tamen exoluere conducit. Splene uero inflammato, in principijs adstringentia miscenda sunt. Euacuato uero corpore, etiam discutienda. Quin & si cucurbitis opus fuerit, præuacuato toto corpore utemur ipsis, non in principio affectionum.

*De cataplasmate ex fermento.* Ex Ly-

co.

Cap. CLXXVI.

Hoc cataplasma diffundere ac eliquare compacta ualde potest, & aculeos infixos extrahere, & tumores induratos mollire. Oportet autem fermentum dissolvere in oleo sufficienti, atq; sic imponere. Quod si uehementius efficere uolueris, nitrum modicum admisce. Si uero etiam aceto dissolueris fermentum, & rursus coctum per cocturam spissaueris, conuenientissimum erit ad induratos tumores in splene ac he-

pate. Si uero thymum & pulegium, aut absinthium, aut abrotonum fermento miscueris, optimum efficies pharmacum.

*De cataplasmate ex pane.*

Cap. CLXXVII.

Cataplasma ex pane efficacissimum est ad omnes inflammationes. Multis autem modis paratur. Nam & frigida aqua madefactis, & tritis, & adiecto modico rosaceo, & coriandri succo, commodum fit cataplasma inflammationibus ignis sacri. Aut pro aqua, ex aceto paratur, atq; sic magis conducit igni sacro. Verum si pro oleo, butyrum addatur, commodum fit cataplasma ad inflammationes ægre concoctiles. Paratur etiam sic. Panis multa aqua dissoluitur, ut succi spissitudinem habeat, & huic miscetur oleum aut butyrum. Deinde coquitur ad compagē. Hoc præstantissimum omnium est ad uulnenum inflammationes, & ut citius suppurētur. Hoc utimur ubi neruus aut neruosum quid intus contusum fuerit. Ego uero etiam picis liquidæ parum ammisceo, & utile cataplasma expertus sum. Hoc et podagricis inflammationibus idoneum est. Alia præparatio panis cum melle. Pridiani panis medullam manibus conterimus, & ubi uelut similago dispersa fuerit, in olla calefacimus, & sic tritum panem inspergimus, ac coquimus ad moderatā compagem, deinde oleum moderatum adijcimus, & unctā imponimus. Hoc cataplasma commodum est inflammationibus præcordiorum. Præstat autem parum aquæ melli ammiscere. Sic enim in coctura diffunditur. Farinæ quoq; triticæ cataplasma eadem ferme facere potest, & eodem modo præparatur.

*De cataplasmate ex furfuribus.*

Cap. CLXXVIII.

Furfures in mortario tūdinus ac cribramus ut tenuissimi fiant, & utimur ipsis ad tumorem induratum in omni corporis loco consistentem, & præsertim in hepate aut splene. Oportet autem ipsos præparare cum aceto mulso. Aut ammoniacū thymiana cum aceto mulso terimus, & furfures ammiscemus, & cataplasma imponimus, atque adhibemus lenti ulata uasa uaporatoria aqua calida plena, ut ne frigeat cataplasma. Aliquando uero ad testes inflammatos utilissimum est hoc cataplasma. Verum ad hos sine aceto paratur, cum aqua mulsa uidelicet. Commodum est hoc cataplasma etiam furunculis, & alijs duris tumoribus ac tuberculis. Verum ad uenenū iaculantes bestias, furfures aceto imbuti commodius cataplasma efficiunt.

*De cataplasmate ex ficibus.*

Cap. CLXXIX.

Ficus pingues exactissime contuduntur, ut nihil inalteratum in ipsis appareat. Deinde ungenti irini parum additur, & cataplasma imponitur. Facit autem ad duritias neruorum, & ad articulos contractos, aut plus iusto laxatos: & ad dueros tumores, præsertim hepatis ac splenis. Vbi uero ad relatum cataplasma nitri parum additum fuerit, rumpit abscessus & aculeos extrahit: Si uero ad ficus ita paratas ammiscueris pulegium, aut origanum, aut thymū, aut absinthij comam tenuissimè cribratam, hydropicis confert. Sed & si coquantur ficus probe, & deinde cum decocto terantur, & ordeacea aut triticea farina ammiscatur, & rursus coctura fiat ad compagem, eodem modū fit cataplasma abscessibus qui non facile maturi fiunt. Si uero uoles pinguiudinem adijcere, aut butyrum ammiscere, aut rutæ folia trita, dolores intestino



intestinatorum à flatu factos sedabis. Misceatur autem similiter & cuminum & oleum.

De dropace ac picatione, Archigenis, Cap. CLXXX.  
Dropax à quibusdam etiam picatione appellatur, diuturnis autem maxime morbis conuenit. Omnino autem & ante sinapismum assumitur, ut corpus ad sinapi præparetur, & post sinapismum, ut reliquæ affectionis excindatur. Simplicissimus itaque dropax est qui picatione uocatur. Pix arida cum ualde modico oleo liquatur. deinde calida adhuc cuti illinitur, & præralis locis agglutinatur, & priusquam perfecte frigescat auellitur. Et rursus calefacto emplasmate ad ignem agglutinatur, & similiter priusquam frigescat auellitur: atque hoc sæpe repetitur. Vtilissimus est assidue uomentibus & crudis ac non concoquentibus, & coeliacis affectionibus, & reliquis partibus alimentum non sentientibus. At uero ad hunc communem dropacem, calfaciendi gratia adijcitur piper, pyrethrum, semen rosmarini, bitumē. Si uero siccare opus fuerit, sulphur uiuum, sal, cinis sarmentorum, Sin lacinare, limnestis, quæ & adarce uocatur, adijcitur, aut euphorbium. Singula autem hæc trita liquefactis insperguntur. Est autem dropax qui à multis in usum assumitur & Gallas appellatur, hic: Colophoniam thus redolentis, & resinæ sordidæ lignosæ quæ in dolis affertur, resinæ à nauibus derasæ, quam Græci aliqui apochyma uocant, picis siccæ, singulorum lib. i. s. picis liquidæ brutiæ lib. ii. ceræ lib. iiii. nitri lib. i. bituminis, galbani, adarces, piperis, ueri albi, piperis, singulorum trientem, sulphuris uiui quadrantem, castorei, ammoniaci thymiamatis, staphidis syluestris singulorum sextantem, olei sicyonii lib. i. opobalsami sexcuncem. Alius dropax optimus & probatus. Picis, ceræ, colophoniam, singulorum lib. i. nitri sexcuncem, bituminis quadrantem, sulphuris uiui sesquiunciam, piperis, euphorbii, adarces, singulorum unciam i. Cantharidum drach. iiii. olei cyprini trientem, Vtere. Oportet autem, uelut prædictum est, dropacem calidum illinere, crassitudinem habentem pro ratione uirtutis ægri, præralis pilis in locis quibus adhibetur. Eos uere qui robusti dropace utuntur, etiam lauare conuenit incumbente dropace, & si fieri potest, etiam exerceri. At dropax conferatim auulsus, remissum spiritum firmare potest, & ad superficiem reuocare, & propriorum operum commonefacere.

De sinapismo, Archigenis, Cap. CLXXXI.  
Cataplasma ex sinapi sinapismum uocare omnes solent. Est autem efficacissimum auxilium. Verum in acutis morbis non ualde probatur, paucis exceptis. Nam in solis segnioribus ac pigrioribus, & in acutis affectionibus immersis, sinapi utimur. At in diuturnis ferme omnibus, postquam reliqua auxilia nihil profuerunt, sinapismus efficacissimus reperitur. Quandoquidem igitur in omnibus fere diuturnis conuenit, præstat ut dicamus in quibus non utendum est ipso. Itaque in ulceratione pulmonis sinapismus non assumitur, neque in alia in profundo exulceratione. Effertur enim ulcera & exacerbantur, ob acrimoniam. Sed neque in exulcerata cutis superficie, neque in cartilaginosis partibus, uelut sunt aures aut nasus summus. Exuruntur enim ab ipso, et nigrescunt partes quæ ualde sunt excarnes. At reliquæ partes corporis itaque affectiones, hoc auxilio gaudent, præ-

cipue uero caput, in diuturnis capitis totius itemque alterius partis doloribus, & in uertiginibus, comitialique morbo ac infania. Sed & thoraci commodus est in erectæ ceruicis spiratione, anhelationibus, tussi diuturna. In destillatione uero caput unum cum thorace sinapismo integendum est. Stomachus autem & intestina in omnibus diuturnis affectionibus, & maxime prostrato appetitu, & in renum affectionibus ac lumborum, & in spinæ colicis ac uellicæ resolutionibus. Quin & omnes resolutæ ac frigefactæ partes hoc auxilio gaudent. Commodum est & arthriticis & ischiadicis ac podagricis. Inditur & in intestinum rectum glans ex sinapi, ubi illud fuerit resolutum, & post morsum ablata glande, infunditur aqua mulsa. Modus autem præparandi hic est.

#### Sinapismi præparatio.

Caricas pingues in aqua tepida pridie macerare oportet, frequenti autem die fortiter expressas probè conterere, deinde acre sinapi acceptum per se terere, & inter terendum paulatim de caricarum cremore affundere, quo facilius teri possit, non tamen aquosum fiat. Deinde utrumque per se in massas redige, & inter se misce prout usus postulat. Si quidem fortiter sinapissare uoles, duas sinapi partes ad unam caricarum. Si uero mediocriter utriusque parem portionem. Sinapius, tertiam partem sinapis, & duas caricarum. Cæterum in corporibus molli sensu præditis, & in quibus circa superficiem est affectio, panem pro caricis ad sinapi ammiscere oportet. Sed & hoc noscendum est: Si in aceto maceretur sinapi inefficacius redditur. Acetum enim sinapis uim discutit. At ubi tenue factum est cataplasma, in omnibus prædictis infarciatur in lintheum, & locis adhibeatur. Temporis porro longitudinem in omnibus decernere impossibile est. Quare frequenter leuandum est cataplasma, & caro considerata an exacte rubefacta est. Et hoc maxime facere oportet in partibus hebetiore sensu præditis. In quibus uero celeriter operari ipsum uolumus, locus spongiis ex calida expressis fouendus est incumbente adhuc cataplasmate, hoc est, super lintheum spongiæ adhibendæ sunt. Post sufficientem usum, in balneum ducendus est æger, & in calidum solium ponendus, & pars iterum perfundenda citra inunctionem. Post balneum uero rosaceo illinimus locum. At in uehementi dolore aut etiam ulceratione, hapso lanæ aqua & rosaceo imbuto integendus est, & imponenda est malua cocta trita cum pane. Post sedatum dolorem utendum est cerato rosaceo cum cerusa. In quibus uero balneum adhiberi non potest, in his per reliquum corpus spogiæ ex calida aqua expressarum somentum utendum est. Verum in capitis & præsertim frigidis affectionibus, olei calidi perfusione locus mitigandus est.

Quod caprarum fimi pilulæ cum aceto impositæ priuatim coxendicum morbo conueniunt.

Cap. CLXXXII.

Caprarum fimi pilulæ in aceto tritæ, sinapismi usum exhibent. Priuatim uero ischiadicis, hoc est coxendicum affectione laborantibus conuenit hoc cataplasma, ut quod longe efficacius sinapismo in ipsis compertum est.

Quæ sint alia rubificantia.

Cap. CLXXXIII.

Rubificat nasturtii semen, & calefacit uelut sinapi. Similiter helenii radix, & syluestrium columbarum fimus,



simus, quo ualde frequenter utor. Sed & cum nastur-  
tij semine contuso ac cribrato, pro sinapi illo utor, in  
ischia de, hemicrania, uertigine, capitis dolore anti-  
quo, in doloribus diuturnis laterum, humerorū, ten-  
dinum, lumborum. Et ad hæc in nephriticis ac colici-  
cis affectionibus, & arthriticis ac podagricis, quum  
nondū pori ac duricies callosæ fuerint coactæ. Quin  
& scilla contusa in mortario, consimilem sinapi uim  
habet in cataplasmate imposita. Verū ad modicum  
tempus imponatur, nam diutius immorans locum  
exulcerat. Utendū est ipsa priuatim ad erecta ceruice  
spirantes thoraci imposita. Item in resolutione, quā-  
do nō solum motus, sed & sensus tactus defecit. Post  
hæc autem mitigandæ sunt partes, uelut in sinapismo  
prædictum est. Priuatim uero scillæ morsus  
mitigat perfusio olei, præsertim rosacei.

De Iberide siue Cardamine, quæ & Lepidium

uocatur.

Cap. CLXXXIII.

Ex his uero quæ ualde utiliter rubificant, est & iberis,  
quæ etiā cardamine uocatur. de qua Galenus in tra-  
ctatione de ischiade plurima scripsit. Sed & Archige-  
nes ipsa usus est in splenicis ac coxendicibus. Verum  
in epistola ad Aristonem Archigenes sic scribit de  
ipsa: Vellem autem te uti etiā radice eius herbæ quæ  
nunc hic Iberis appellatur. Habet autem folia uelut  
nasturtium, uere floridiora, caulem longitudine cu-

birali ampliore aut minorem. Et nascitur quidem  
in incultis locis: Aestate uero lacteū florē producit,  
tuncq; efficacissima est. Radices nasturtiū odore refea-  
runt. Radices igitur accipe prædicto tēpore, ipsasq;  
diligenter tunde, ægre enim conteri possunt: & adi-  
pis suilli inueterati tantum adijce quo emplastri for-  
mæ cataplasma fiat, quod non minus horis quatuor  
impositum habe: Deinde in calidum balneum citra  
inunctionem ingressus, post modicā corporis exu-  
dationem, in solio mordaciore morare. Egressus au-  
tem uino & oleo multo perfusus ac deterfus, coxen-  
dicem lanis puris intege. Atque hic quidem est sina-  
pismi modus. Verum utilitates spe maiores habet,  
eò quod medicatiorem uim possidet, & cum mino-  
re mordacitate curet.

De euocantibus ex alto auxilijs. Galeni. Cap. CLXXXV.

In omnibus diuturnis affectionibus, quum nihil pro-  
fecerint ulla auxilia, euocantem ex alto curationem,  
metasyncriticam à Methodicis appellatam, hoc est,  
quæ meatuum miscellæ corporis statum præter na-  
turam habentem transmutat, facere plerique solent.  
Ego uero ubi intemperies quædam humida & fri-  
gida in affectis partibus est, aut obrusus aut stupidus  
sensus, adhibeo ipsis pharmaca ex sinapi, aut tha-  
psia, & similibus confecta. At siccis & calidis affe-  
ctionibus ea non adhibeo.

AETII TETRABIBLI PRIMAE, SERMONIS  
TERTII, FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN

QVARTO SERMONE AETII  
CONTINENTVR.

\*

|                                                           |             |                                                                                                             |              |                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|
| DE sanitate tuenda.                                       | Cap. I.     | pititis ulcuscula.                                                                                          | cap. XXII.   | pertingente.                                       | cap. XXXVIII. |
| Quomodo infans recens natus sa-<br>nus cognoscitur.       | cap. II.    | Ad ulcus Melicerida à mellei humoris<br>similitudine dictum, quod & dulce<br>appellatur, & Syriacè Sanalia. |              | De lassitudine ob siccitatem ac gracili-<br>tatem. | cap. XXXIX.   |
| De infantis educatione.                                   | cap. III.   | cap.                                                                                                        | XXIII.       | De lassatis ex uenere.                             | cap. XL.      |
| De nutricis electione.                                    | cap. IIII.  | Ad sedem infantium procidentem.                                                                             |              | De lassitudinibus spontaneis.                      | cap. XLI.     |
| Probatio lactis.                                          | cap. V.     | cap.                                                                                                        | XXIII.       | De lassitudine ulcerosa spontanea.                 | cap.          |
| Victus nutricis.                                          | cap. VI.    | Ad femorū intertrigines.                                                                                    | cap. XXV.    |                                                    | XLII.         |
| Ad stertentes infantes.                                   | cap. VII.   | Ad procidentes puerorum umbilicos.                                                                          |              | De lassitudine tensiua spontanea.                  | cap.          |
| Ad uocem infantium interceptam.                           | cap. VIII.  | cap.                                                                                                        | XXVI.        |                                                    | XLIII.        |
| De dentitione.                                            | cap. IX.    | Ad hispidos pueros.                                                                                         | cap. XXVII.  | De lassitudine inflammatoria spontanea.            | cap.          |
| Ad inflammationes oculorū.                                | cap. X.     | Quando ablactandi sunt infantes.                                                                            |              |                                                    | XLIII.        |
| Ad albugines puerorum.                                    | cap. XI.    | cap.                                                                                                        | XXVIII.      | Quali curatione ad frigiditates utēdum<br>est.     | XLV.          |
| Ad inflammationes ac humiditates au-<br>rium.             | cap. XII.   | Victus ratio post ablactationem pue-<br>rorum, & aliarū etatū.                                              | cap. XIX.    | Cutis densatae curatio.                            | cap. XLVI.    |
| De inflammatione Siriasi Græcis ap-<br>pellata.           | cap. XIII.  | Victus senum ratio.                                                                                         | cap. XXX.    | Quomodo curandus sit æstuosus ardor.               | cap.          |
| Ut exudet puer in febre.                                  | cap. XIII.  | cap.                                                                                                        | XXXI.        |                                                    | XLVII.        |
| De aphtha ulcere oris ardēte.                             | cap. XV.    | De carniū subuersione.                                                                                      | cap. XXXII.  | De matutina frictione.                             | cap. XLVIII.  |
| Ad deuoratas spinas aut festucas exi-<br>mendas.          | cap. XVI.   | Quomodo graciles renutrire oportet.                                                                         | cap.         | De uespertina frictione.                           | cap. XLIX.    |
| Ad assiduas sternutationes infantium,<br>& ad grauedines. | cap. XVII.  | Quomodo quis partes attenuatas sana-<br>rit.                                                                | cap. XXXIII. | De cruditate.                                      | cap. L.       |
| Ad tusses puerorum.                                       | cap. XVIII. | De lassitudinibus à gymnasijs, aut ex<br>itinere obortis.                                                   | cap. XXXV.   | De crapula.                                        | cap. LI.      |
| Ad alui infantii profluiū.                                | cap. XIX.   | De lassitudine ulcerosa.                                                                                    | cap. XXXVI.  | De equalibus intemperaturis.                       | cap. LII.     |
| Ad aluum suppressam.                                      | cap. XX.    | De lassitudine tensiua.                                                                                     | cap. XXXVII. | Optimi tēperamenti dinotio.                        | cap. LIII.    |
| De pustulis puerorum.                                     | cap. XXI.   | De lassitudine inflammatoria, & ad ossa                                                                     |              | Temperamenti calidi notæ.                          | cap. LIII.    |
| Ad capitis ulcera, & achores tenuia ca-                   |             |                                                                                                             |              | Temperamenti frigidi notæ.                         | cap. LV.      |
|                                                           |             |                                                                                                             |              | Siccioris tēperamenti notæ.                        | cap. LVI.     |
|                                                           |             |                                                                                                             |              | Humidioris temperamenti signa.                     | cap.          |
|                                                           |             |                                                                                                             |              |                                                    | LVII.         |
|                                                           |             |                                                                                                             |              | Calidi & humidi temperamenti notæ.                 | i cap.        |



|                                        |              |                                |              |                                        |             |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------|
| cap.                                   | LVIII.       | Frigidioris uentris notæ.      | cap. LXXV.   | Frigidi & humidi hepatis notæ.         | cap.        |
| Calidi & sicci temperamenti notæ.      |              | Pulmonis notæ.                 | cap. LXXVI.  | XCI.                                   |             |
| cap.                                   | LIX.         | Cordis calidioris notæ.        | cap. LXXVII. | Frigidi ac sicci hepatis notæ.         | cap.        |
| Frigidi & humidi temperamenti notæ.    |              | Frigidioris cordis notæ.       | ca. LXXVIII. | XCII.                                  |             |
| cap.                                   | LX.          | Siccioris cordis notæ.         | cap. LXXIX.  | Testiū tēperamenti signa.              | cap. XCIII. |
| Frigidi ac sicci temperamenti notæ.    |              | Humidioris cordis signa.       | cap. LXXX.   | Calidorum temperamenti correctio.      |             |
| cap.                                   | LXI.         | Calidi ac sicci cordis signa.  | cap.         | cap.                                   | XCIII.      |
| De capitis dinotione.                  | cap. LXII.   | LXXXI.                         |              | Frigidi intemperamenti medela.         | cap.        |
| Cerebri temperati notæ.                | cap. LXIII.  | Calidi & humidi cordis notæ.   | cap.         | XCIV.                                  |             |
| Cerebri calidioris notæ.               | cap. LXIII.  | LXXXII.                        |              | Humidi intemperamenti correctio.       |             |
| Frigidioris cerebri notæ.              | cap. LXV.    | Frigidi & humidi cordis notæ.  | cap.         | XCVI.                                  |             |
| Siccioris cerebri signa.               | cap. LXVI.   | LXXXIII.                       |              | Sicci intemperamenti medela.           | cap.        |
| Humidioris cerebri notæ.               | cap. LXVII.  | Frigidi ac sicci cordis notæ.  | cap.         | XCVII.                                 |             |
| Calidioris & humidioris cerebri signa. |              | LXXXIII.                       |              | Calidi ac sicci intemperamēti curatio. |             |
| cap.                                   | LXVIII.      | Hepatis calidioris notæ.       | cap. LXXXV.  | XCVIII.                                |             |
| Calidi ac sicci cerebri notæ.          | ca. LXIX.    | Frigidioris hepatis notæ.      | ca. LXXXVI.  | Humidi ac calidi intemperamenti me-    |             |
| Frigidi ac sicci cerebri signa.        | ca. LXX.     | Siccioris hepatis signa.       | ca. LXXXVII. | dela.                                  | cap. XCIX.  |
| Frigidi ac humidi cerebri notæ.        | cap.         | Humidioris hepatis signa.      | cap.         | Humidi ac frigidi intemperamenti sa-   |             |
| LXXI.                                  |              | LXXXVIII.                      |              | natio.                                 | cap. C.     |
| Ventris siccioris signa.               | cap. LXXII.  | Calidi ac sicci hepatis signa. | cap.         | Frigidi ac humidi intemperamenti cu-   |             |
| Ventris calidioris notæ.               | cap. LXXIII. | LXXXIX.                        |              | ratio, frigiditate prædominante.       |             |
| Humidioris uētris notæ.                | ca. LXXIII.  | Calidi ac humidi hepatis notæ. | ca. XC.      | cap.                                   | CI.         |

# AETII MEDICI GRAE-

## CI CONTRACTAE ME-

### DICINAE TETRABIBLI PRIMAE

#### SERMO QVARTVS.

\*

#### DE SANITATE TVENDA. GA-

#### LENI PRAEFATIO.

Cap. I.



V V M una sit ars quæ circa humanum corpus uersatur, duæ sunt ipsius primæ ac maximæ partes: prior quæ sanitatem tuetur, altera quæ morbos curat. Quandoquidem uero et dignitate & tempore prior est sanitas morbo, oportet sanè etiā nos prius considerare quomodo quis hanc custodiat. Deinceps uero etiā quomodo quis quàm optimè morbos curet. Dicitur autem sanitas dupliciter: Altera exacta, & optima, & perfecta, & summa: Altera deficient quidē ab hac, nō tamē in tantum ut animal ægrotet. Et huius graduū non parua est in corporibus differentia circa magis ac minus. Prius autem recensere conuenit, quomodo quis optimæ ac inculpabilis naturæ sanitatē conseruet, & adhuc ante hoc mētionem facere, quænam sit optima corporis structura. Est autem si quis iuxta ipsam essentiam rei exponet, temperatissima, & quæ formationē partium, ac actionibus ipsarum exacte conuenientem habet. Et ad hæc numerū omnem, & magnitudines, & compositionem omnium ipsarum inter se, actionibus commodā exhibet. Si uero quis iuxta notas designare uolet, corpus exacte bene carnosum tale est, quod mediū est inter gracile & multa carne obesum: & neq; hirsutum est, neq; pilis nudum, neq; moderato mollius, neq; durius, neq; albū aut nigrū, aut uenis occultis aut amplis, aut animosum aut deiecti animi, aut somnolentū aut uigilans, aut hebeti mente præditum aut uasum, aut ueneri deditum aut uice uersa. Si uero etiā omnibus partibus fuerit exacte inter omnes excessus mediū, erit

perfecto etiam pulcherrimum aspectu tale corpus, ut quod sit moderatum, & ad omnes labores idoneum. Habebit autem & alia omnia signa temperamenti boni per singulas partes. De quibus pro uiribus pauca indicabimus circa finem huius sermonis. Multa enim corpora temperata quidē sunt, si ita contingat, capitibus, uerum intemperata pectoribus, aut uentre, aut genitalibus. In quorundam uero artubus est intēperies, & plerisq; in uno uiscere, aut alia quadam parte. Sed & de his in prauis corporū structuris postea dicetur in hoc sermone. Cæterum de optima structura iam dicamus, cuius singulæ partes uniuersam habent inculpabilem essentiam. Dicitur autē primum quomodo quis ab initio susceptū eiusmodi hominem, per omnem uitam sanum cōseruari, nisi si quid extrinsecus uiolentum ipsi accadat.

Quomodo infans recens natus sanus cognoscitur.

Cap. II.

Indicabitur autem sanus infans statim ex natiuitate, primum quidem ex eo quod genitrix per totum gestationis in utero tēpus sana uixit. Deinde ex eo quod ubi natus est & in terrā positus infans, ipse eiulatum edit cum cōueniente firmitate. Et ex eo quod omnibus partibus ac sensibus integer est, & naturales meatus omnes expeditos habet, uelut sunt aures, nares, fauces, urinæ meatus, podex. Et quod unicuiusque membri naturales motus non segnes, neque exolutos habet, & iuncturarum flexuras ac extensiones, magnitudinesq; ac figuras, & sensum exactum.

De infantis educatione.

Cap. III.

Proinde recens natus infans, hic nimirum per omnem structurā inculpabilis, primum ita tractetur, ut ipsi umbilicus quatuor à uentre digitis acuto scalpro resecetur: Reprobamus enim aliam materiam harundinum



dinum ac vitrorum, ut ne quid atteratur. Deinde contentus in ipso sanguis grumofus exprimatur, & spōgia detergeatur, ac lana carpta obturetur. Postea moderato sale per se tenuissimo conspergimus. Aliquando uero etiam in delicatioribus totum corpus succo prisanæ aut fœni Græci depurgare oportet: & aqua tepida uiscositatem corpori oblitam abluere, & sordes naribus insitas digitis exprimere, & os atque aurium meatus purgare, palpebras diducere, & oculos detergere, ac oleū ipsis instillare. Digitis item disparare ipsum anum. Confestim itaq; excernit per sedem id quod Græcis meconium uocari solet. Porro supra umbilicum haplus lanæ madefactus imponatur, ad umbilici figuram formatus. At cuminum ipsi inspergere reprobamus, propter acrimoniam, etiamsi quidam id usurpare soleant. Deinde duplicatus umbilicus, & lanæ inuolutus, leniter in medio componatur. Et postea infans pro more fasciis inuoluatur. Exhibendum est autem ipsi mel præ omni alimēto, quod optime est despumatum ut delingat, reprobato butyro uelut stomacho incōmodo. Deinde instillanda est aqua mulsā tepida. Postea uero mater, ubi prius crassum ex uberibus emulxit, & ipsa aqua calida fouit, lac præbeat infanti. Præstat enim non accipere matris lac usq; ad quartam diem. Lauare uero oportet puerū bis in die, horarum aliquot interstitio post cibum. Postquam uero exciderit umbilicus post tertiam aut quartā diem, cochleæ testam ustam tritā loco insperge, aut talum suillum ustum, aut plūbum ustū cum uino illine, & obliga.

## De nutricis electione.

Cap. IIII.

Præ omnibus his eligenda est nutrix, neque iunior uiginti annis, neq; senior quadraginta, quæ bis aut ter peperit, non morbida, boni habitus, iustæ magnitudinis, ampli pectoris, ubera habens moderata, non rugosa, papillas neq; magnas, neq; paruas, neq; angustiores, neq; ualde latas, aut cauernosas. Magna enim ubera plus quam opus est lactis præparant, & hoc manens in ipsis corrumpitur, & infantem ledit, simulq; etiam matrem grauat. Parua uero parum lactis exhibent. Et magnæ quidem papillæ offendunt gingiuas, & impediunt linguam ne iuuat deglutitionem. Paruæ uero ægrè apprehendi possunt, & propterea affligunt maxillas. Sed & eiaculatum lac per angustos meatus, sublinentem os pelliculam ferit, & aphtham Græce appellatū ulcus igneæ caliditatis generat. At latiores & cauernosæ papillæ aceruatim remittentes lac, suffocationis causa fiunt. Præterea conuenit esse nutricem castam, sobriam, mansuetā, mundam, hilarem, et non tristē. Ego inquit Galenus, quū puer aliquando ploraret per totam diem & indignaretur, ubi uidissem stratum ipsius & uestimenta sordida, & ipsum puerum sordidum: iussi & ipsum, & stratum ipsius lauare, & uestimenta mutare, quo facto ab eiulatu & indignatione cessauit & obdormiuit.

## Probatio lactis.

Cap. v.

Probandum est lac gustu, uisu, & olfactu. Nam & gustantibus & olfacientibus iucundum, & uidentibus album ac æquale, & inter liquiditatem ac spissitudinem medium habēs, ipsum esse oportet. At uiciosum lac, aut crassum est & caseosum, aut liquidum & serosum, aut liuidū, aut strias floridas habens, aut spumofum, aut graueolens, aut foetidū, aut cito acefcēs, aut gustanti amaritudinis, aut muriæ, aut alterius cu-

iusdam peregrinæ qualitatis significationem exhibens. Hæ igitur sint notæ uiciosi itemq; boni lactis, ex quibus coniecturam facies mulierem morbosam esse, & ad aliam transibis. Cæterum opulenti plures nutrices esse oportet.

## Victus nutricis.

Cap. VI.

Exercere oportet nutricem moderatis exercitijs, & maxime supernis partibus. Cibos autem exhibere boni succi & qui facile digeruntur, & tempore conuenienti, & mensura congrua. Atq; ita etiam potus. Abstineat à porro, cepis, allio, fassamentis, & omnibus foetidis & graueolentibus. Et à plerisq; bellarijs, præsertim nucleis pineis. Sunt enim oleosi, & propterea bilem faciunt, & uentriculo innatāt. itemq; uenerem stimulant. Itaq; penitus ab his nutricem abstinere oportet. Irritatur enim in coitu lunares purgationes, & propterea lac corrumpitur, & uiciosum ac paucissimum fit. Quædam uero etiam concipiunt, quo nihil nocentius fieri infanti qui ex ipsa alitur possit. Vbi autem imminuitur lac, aut corrumpitur, aut etiam omnino extinguitur, aut spissatur, aut attenuatur, præstat quidem alterius nutricis lac præbere. Sin id non permittat res aliqua instans, uictu nutrix curanda est, ut ne in morbum incidat infans. Extincto itaq; lacte, considerandum est an totū corpus, aut una pars ægrotet, & lædētē affectionem corrigere oportet. Si uero ob penuriam extinctum est lac, alimentum augere, & melioris succi cibos dare, & plures auferre, aluumq; si plus iusto fertur adstringere, & exercitijs supernarum partium uti, & uberum frictione, & fomentis per spongas, ceratis item liquidioribus ad ubera ex oleo irino aut gleucino. Lini uero semē delingere cum melle aut passo. Aut sesamū crudum cum palmula passa, quam pateron Græci uocant, æquis portionibus edendam præbe, & bibat zythum, & eadem die ubera lacte replebuntur. Putabit autem mulier simul ut acceperit potū, omnia sua membra resoluta esse, donec lac in uberibus factū fuerit. Aut lumbricos piscatorum, qui in limo fluminis reperiuntur, & intestina terræ appellantur, quinq; aut septem terito, & palmulas passas addito, & simul terito, ac dato in zytho bibendos prælotæ mulieri idem ad dies decem: & de multitudine ac bonitate lactis miraberis. Præstat autem etiam præcedens pharmacum similiter cum zytho conterere, & bibendum præbere. Vinum uero exhibendū est dulcius. Et fœniculū aut anethum uiride cum prisanā coctum, sorbēdum dato. Si uero tenue fuerit lac, balnea reprobāda sunt, uelut quæ humores aquosos reddant. In cibo utendum est alica, ouis sorbilibus, pane similagineo, pedibus ac extremitatibus porcinis, uolucris tenioribus, carnibus hœdinis, & uino dulci. Sin crassius fuerit lac mulieris, attenuante alimento utēdum est, ac minus nutriente, & balneis frequētibus. Crassius enim lac abscessus & furunculos circa infantis corpus generat, & uenter ipsius cohibetur. Sed neq; urinæ pro ratione prodeūt, & uomitus pituitosi infestant, & ægrè mobilis ac difficulter spirans puer euadit, & appetitū perdit, ac decolor fit, & sordes oculorum habebit crassas, & mucos similiter, & flatus multi ab eo prodeunt. Si uero acrius fiat lac, excretionem per uentrem plures fiunt cum mordacitate, & appetitus deficit, & pustulæ acerrimæ in corpore fiunt, & præsertim circa supernas partes, imò etiam



infernas, & infans paulatim gracilescit. Quare omni modo temperandum est corpus nutricis, balneis dulcibus, & boni succi alimento. Si uero lac quod multum fertur imminuere uoles, cibos minus alentes & paucissimos dato. ubera uero lenticula cocta integrit, aut cuminum cum aceto illinito. Aut lapidem album simplicem, quo ad ædificia utimur, similiter cum aceto. Aut hyoscyamum cum aceto. Aut lintheum aceto imbutum imposito, & assidue humectato. perfundito autem aqua marina, aut muria calida, aut myrti decocto.

*Ad stertentes infantes.*

*Cap. VII.*

Quandoquidem plerique nutrices ineptis, uelut dictum est, utentes cibis, uitiosum lac suū efficiunt, & ex hoc diuersis morbis infantes, qui etiam optimā structuram adepti sunt, obijciunt. Aliquando uero etiam ex forinsecus corpori accidentibus morbi accedunt; necessarium est etiam de diuersis affectionibus pueros infestantibus, pro uiribus breui tractare. Si quidem igitur infans crassiore alimēto nutritus, pituitam in uentre colliget, & propterea stertat. Lini semen cum melle delingendum dandum est, aut cumini parum cum melle. Et aqua multa instillanda est ori assidue calida. Si uero hec pressura perseveret, oleo medium digitorum tingito, & consillas illinito, & depressa lingue radice ad uomitum irritato. ubi enim uomuerit, ab omnibus uexationibus confestim liberatur.

*Ad uocem infantium interceptam.*

*Cap. VIII.*

Ad interceptam in infantibus uocem, ob quancunque causam præcedentem (contingit autem hoc maxime suppressa aluo) brassicæ succum cum modico sale bibendum dato aut instillato. Statim enim soluit aluū, & uocem restituit. Sed & glans ano indenda est.

*De dentitione.*

*Cap. IX.*

Circa septimum mensem incipiunt infantes proferre dentes, & dum punguntur ac stimulantur uelut ab aculeo, dente gingiuas disparante, inflammationes succedunt ipsarum gingiuarum ac maxillarū & tendinum, ad quas etiam febres omnino consequuntur. Accedit & pruritus auditoriorum meatuum. Et aures humectantur. Aliqui uero etiam lippitudinibus capiuntur, & sanguis ex oculorum angulis fluit. Plurisque uero etiam exturbatur uenter, propter stomachi inflammationem, & uentris exolutionē. Itaque lenire ac pinguefacere oportet tendinem & maxillas, mollium lanarum ac mundarum circumiectu, circa collum & ipsius neruum, per oleum dulce ac calidum. Instillare quoque auditorijs meatibus oleū calidum. Perseuerate uero inflammatione, etiam ceratum rosaceum liquidum locis imponere. In cibo offerendū est puero cerebellum, maxime quidem leporis coctum aut assatum: Sin minus, ouiculæ: Naturaliter enim opitulatur. Sed & melle moderate cocto illitiendæ sunt gingiue. Efficit enim minime molestum dentium exortum. Nihil uero duri dandum est ipsis ad mandendum, ut ne gingiue callosiores reddita impedimento sint dentium exortui. Balneo autē utendum est febribus remittentibus. Neque studio habendum est ut uenter adstringatur, ut ne materia sursum repens, supernas partes, præsertim oculos lædat, & febres uehementiores efficiat. Sed & nutrix cogenda est ut aquam bibat, & cibos leuissimos ac sorbiles accipiat. Aiunt autem naturaliter auxiliari dentientibus pueris, colocynthidis syluestris radicem, in

aureo aut argenteo canali gestatam. Itemque rubi radicem. Sed & uiperæ, præsertim masculæ, dentem, in argento pro amuleto appende. At circa stomachum gestent semper uiridem iaspidem de collo suspensum, ita ut stomachum contingat.

*Ad inflammationes oculorum.*

*Cap. X.*

Lycium Indicum præsertim, sin minus, Patariū cum lacte diluito, & supernas palpebras cum supercilijis illinito. Aliquando etiam ipsis oculis instillato, multo lacte dilutum, Mirabiliter etiam facit Nili ex roscollyrium illitum. Ipsos uero oculos ocymi decocto abluito.

*Ad albugines puerorum.*

*Cap. XI.*

Ad albugines puerorum ab eiulatu factas, solani nigri succum illine.

*Ad inflammationes & humiditates aurium.*

*Cap. XII.*

Ad inflammationes & dolores aurium, oui cadidum cum lacte muliebri instilla. Aut intestina terre cū rosaceo cocta. Ad humiditates uero aurium, alumen uino dilue, & lanam puram ac mollem in ipso imbue, & in sole assicca. Et rursus imbue ac sicca. & ubi ter hoc feceris, lanam sicca asserua. Vsu uero expetente, de ipsa accipe & in aurem inde. Ad ulcera uero in auribus, pastillo Musæ utere, diluto cum sapa ac modico aceto. Si uero caro superexcreuerit, primum reprime per pastillum Bithynum dilutum cum uino. Deinde utere Musæ pastillo, uelut dictum est.

*De inflammatione Siriasi Græcis appellata.*

*Cap. XIII.*

Ex affectionibus quæ cum febre accidunt, est & siriasis in infantibus appellata, quæ est inflammatio partium cerebri & membranarum, adeo ut sincipitis & oculorum cauitas consequatur, cū febre ardente, & pallore, & corporis siccitate, ac prostrato appetitu. Siriasis autem appellata est à sincipitis cauitate. Siros enim apud Græcos dicitur fossa ac corpus cauum, in quo semina seruantur. Quare omnia uelut ad inflammationes facere oportet, ita ut leniamus & mediocriter frige faciamus caput, coriandri succo cum rosaceo humectantes. Sed & totum corpus ex hoc illinatur. Aut cucurbitæ ramenta sincipiti impone. Aut uitis folia, aut portulacam cum rosaceo tusam, sincipiti illine. Aut heliotropij scorpiuri succo sinciput illine. Aut oui luteum cum rosaceo coctito, & sincipiti illinito, & assidue permutato.

*Vt exudet puer in febre.*

*Cap. XIV.*

Arundinis uiridis medullā terito, & ex ea sinciput ac pedes illinito, ipsumque puerū uestimentis contegito.

*De aphthæ ulcere oris ardente.*

*Cap. XV.*

De aphthæ ulceribus, & inflammationibus consillarū, dicitur absolutissime in sermone de affectionibus quæ perfectis accidunt circa has partes, in octauo nimirum.

*Ad deuoratas spinas aut festucas eximendas.*

*Cap. XVI.*

Alumen quo ad coria utuntur cum oleo terito, & gula illinito, radicem lingue digito ualde cōprimens, & facile ipsas sursum effert.

*Ad assiduas sternutationes infantium & grauedines.*

*Cap. XVII.*

Ocymum siccum tusum ac cribratum naribus admove, ut per respirationē attrahatur, aut insuffla. Idem etiam ad grauedinem facit.

Ad



*Ad tusses puerorum.*

Cap. xviii.

Nucleorum nucum pinearum modice tostorum drach. iiii. seminis cucumeris parum tosti drach. i. tragacanthi drach. iiii. mellis despumati dodrantem. Præpara & præbe delingendum. Tragacanthum autem in uino ueteri dulcissimo macerato. Aliud Hippocraticum. Vitellum oui assatum, & sesami duplum, & salis granum unum moderatum terito sufficere, & cum melle delingendum dato. Aliud. Nucleos pineos tostos xxx. amygdalas decorticas xxx. seminis lini tosti, succi glycyrrhizæ, utriusque sextantem. Mellis quod satis est, dato delingendū. Probè etiam facit cuminum cum melle. Item ammium.

*Ad alui infantium profluuium.*

Cap. xix.

Si aluus infantis fluxione laboret, balneum & gestationem reprobamus. Vtimum autem humectatione stomachi ex uino & oleo melino. Si uero fluxio extendatur, œnanthen leuissimè tritam, & acaciā, ac mastichen, æquis portionibus singulis tritis, oui luteo quantum satis est excipe, & ex emollito stomachum illine, & dorsum, & hapsū lanæ purpureæ impone ac deliga. Facit enim citra molestiam. Præ omnibus uero nutritiæ alimentis boni succi uti oportet, & potibus adstringentibus. Si uero aluus infantis farinæ similia excernat, mentam tritam cum uino nigro, aluo impone ac obliga.

*Ad aluum suppressam.*

Cap. xx.

Si uero supprimatur aluus, glande irritanda est, aut ex sola aqua mulla infusum immittendum est. Et mel alimentis ammiscendum. Cæterum florem artemisiæ cum oleo tere, & circa umbilicū affrica, & fluet aluus. At de lumbricis dicetur in uniuersalibus auxilijs in nono sermone.

*De pustulis puerorum.*

Cap. xxi.

Iamantea dictum est quod infantes uitioso alimento utentes, uarios incidunt morbos, ut cum alijs & pustulæ & papulæ instar bullarū efferuentes, & humida ulcera in cute fiant, quæ bubastica uocant, & alia consimilia. Itaque muriam & urinam, & alia quæ aliqui adhibent, reprobamus, ob acrimoniam. Lauamus autem ipsos rosarū decocto aut lentis. Et si ampliori adstrictione opus habemus, myrti aut malicorij. Magis uero ulceratis, cataplasma ex plantagine imponimus: Aut ex seride siue intubo cum pane: Aut ex flore polætæ cum portulaca, aut semperuiuo, aut ueneris umbilico, aut hyoscyamo. Aut rosas uirides aut siccas coctas cum meliloto & palmulis adhibeamus. Aut spumam argenti, melilotum, alumē, cum aceto terito, & myrteum oleum siue rosaceum adhibito, atque illinito. Aliud ad bubastica ulcera. Recrementum plumbi & amyli, æquis portionibus cum solani succo terito, & adiecto rosaceo illinito. Aliud pulcherrimum. Cadmiā tritam cum aqua illinito, aut cimoliam cum uino. Aliud. Spumæ argenti, cerusæ, utriusque trientem, malicorij sicci leuissimè triti sextantem, succi stratiotæ fluuiialis quod satis est, utere. Quod si non adsit stratiotes, lentis palustris succum accipe, & utere, aut herbæ uiridis quæ in aquis inuenitur, & stratiotæ similis est, succum amisce, probè etiam facit serapiadis tritesticularis succus. Aliud. Retrementum ferri terito cum uino, ac illinito. Valde enim bonum est hoc. Probè facit & emplastrum ex ladano, & emplastrū ex hordeo, oui candido, & rosaceo aut myrteo oleo diluta. Aliud,

ad infantium pustulas ac papulas feruidas post rupturam. Cadmiæ drach. lxxx. æris usti drach. lxxx. acaciæ, croci, utriusque unciam i. tragacanthi sextantem. Tragacanthum aqua macerato ac terito, & cum ipso reliqua excipito, ac pastillos formato. Et usus tempore cum succo senecionis, aut intubi, aut solani, diluito, & addito rosaceo, illinito. Ego, inquit, succo senecionis aut intubi excipio tragacanthum ac reliqua, & pastillos effingo.

*Ad capitis ulcera, & achores tenuia capitis ulcuscula.*

Cap. xxii.

Pharmacum ex cuius usu ego nomen assequutus sum, Spumæ argenti, cerusæ, utriusque bessem, seminis ericæ, thuris, utriusque drach. iiii. uino & oleo raphanis terito ac uitior. Aliud. Acaciæ fuluæ unciam i. ladani trientem, myrrhæ sextantem, opij unciam i. Aqua palustri excipe & forma pastillos, & utere assidue. Aliud. Cochleas albas unā cum testa exustas insperge. Aliud. Aloē leuissimè tritā, cum plantagine arida trita insperge. Aliud. Balauitium aridum tritum insperge. Aut cum aqua tritum impone & illine. Aliud. Herbam quam in Alexandria Liparonem uocant, aliqui uero cnestrum appellant, urito, & cinerem cum uino tritum illinito. Vtere etiam reliquis cum discriminationibus referendis in sexto sermone, de uniuersalibus auxilijs ad achoras.

*Ad ulcus Melicerida à mellei humoris similitudine dictum, quod & Dulce appellatur, & Syriacè Sanalia.*

Cap. xxiii.

Spumæ argenti, baccarum lauri, æquales portiones terito cum aceto & oleo, & illinito. Sæpenumero eius experimentum fecimus.

*Ad sedem infantium procidentem.*

Cap. xxiiii.

Spongitiæ herba podicem assidue deterge. Acaciā cum sapa & uino nigro tritam podici illine. Cochleam ustam tritam quum egreditur prælotæ sedi insperge, & sanabis, ostreorum testas crudas tustas ac tenuissimo cribro excretas insperge. Myrrhi baccas uirides cum uino tritas impone. Vtere autem perfusionem aqua fabrorum, in qua ferrum tingunt. Ego uero semper utor muria tepida, & ualde probè facit. Similiter autem & aqua marina. Vtere etiam dicendis in uniuersalibus auxilijs, quæ suo loco referentur.

*Ad femorum intertrigines.*

Cap. xxv.

Myrtum siccam tritam insperge, aut cyperū cum rosis.

*Ad procidentes puerorum umbilicos.*

Cap. xxvi.

Procidunt pueris umbilici, dum aut in eiulatu diu & multum distenduntur, aut ex plaga, aut ex casu. Talibus igitur ammium cū muria tritum umbilico illine, & rasuram linthei impone, ac ad triduum obliga. Et rursus eo soluto, idem facito. Aut lupinos amaros et ungulam asini ustam, & laterem ustum, simul terito ac imposito, & obligato. Si uero efficacioribus opus fuerit, his quæ ad herniā inguinum referuntur utere. Critonis ad pueros exumbilicares, ob quancunq; causam, Resinæ pinus unc. xvi. aluminis scissi dextantem, mellis dextantes duos: Alumen tritum cum melle ad prunas coquito, & ubi bonam compagem habuerit, resinam addito, assidueq; mouero, & ubi dissoluta fuerit, laminā de hoc pharmaco accipito, & umbilico imposito, ac quotidie alterato. Verum supra laminam plāraginis folia aut hederæ imposito. Aliud. Aluminis scissi uncias xv. secis uini austeri dextantem, gallarum drach. ii.



uino dilue ut spissitudinem habeant, & umbilicum illine, & forinfecus spongiam impone, posca imbutam ac expressam.

*Ad hispidos pueros.*

*Cap. xxvii.*

**C**rasstoribus & pluribus fuliginosis superfluitatibus sub cutē collectis, ex quibus pili generantur, hispidiores infantes fiunt. Itaq; caricas urito ac terito, & cum hoc cinere pilis oblitos locos confricato. Ex alio exemplari. Resinā coquito in aqua, & puerum lauato, ac leuiter detergito, ac cum caricarum ustarū cinere & fabarum cremore confricato. Aliud smegma corroborans ipsos. Farinā fabrum, cimoliā, spumæ nitri, candidi ouorum, & testarū, æquales portiones pro smegmate adhibe.

*Quando ablactandi sunt infantes.* *Cap. xxviii.*

**D**onec firmetur infans lacte nutriatur. Postquam uero solidus factus fuerit, micis panis ex uino mulso, aut uino dulci, aut lacte. Deinde etiam oua sorbilia summat. Nam quæ mandere oportet, salua in ipsis replentur. Potus dandus est uinum dilutum. Vbi uero iam intrepide frumentaceū alimentum infans sumit, quod plerunq; circa uigesimalum mensem cōtingit: tunc latenter & paulatim ab ubere desuescat. Si uero ablactatus morbū inciderit, rursus ad lac transferatur. Et ubi cessauit morbus, refocilletur corpusculum, atque sic ablactetur.

*Victus ratio post ablactationem puerorum, & aliarum ætatum.*

*Cap. xxix.*

**A**blactati infantes in remissione ac hilaritate exercitiorum uersentur, denturq; ipsis cibi leues ac boni succi. Verum à multo uino abstinere oportet eum qui bonum corporis temperamentum habet. Nam in humidis ac calidis corporibus, uinū replet caput uaporibus. Neq; uero à frigida aqua potu penitus arcere iubeo tales pueros. Sed inter cibos plerunq; & in calidioribus oris, optima aqua uti permitto. A septimo anno ad literas ueniant, & mitibus ac humanis magistris tradantur. At à decimoquarto anno usq; ad uigesimalum primum conuenit exercitatio in disciplinis philosophicæ doctrinæ. Prohibendi sunt à ueneris usu. Contrahendum est & uberius uinū, & plura exercitia iam sunt assumenda. His uero qui iam in uigore ætatis degunt, uictus ratio remissa cōuenit, tum animi, tum corporis. Et corporis exercitia qualiacunque fuerint, pro ratione his detrahenda sunt, & alimenta sensim contrahenda, quum habitus ipsorum frigiditatis principium sumat. Maximam autem optimè constructi corporis notam esse statuo ipsius naturæ promptitudinem, quicquid tandem fuerit agendum, ipsa sui ipsius mensuram excoGITANTE in optimis constitutionibus. Nam & dum exercentur ac fricantur, aut quiduis aliud agūt, tunc primum pigrescunt, quum sufficienter fuerint exercitati. Et sanè etiam à cibis ac potibus tunc abstinēt, quum sufficienter fuerint impleti, neque plus iusto appetentes, neq; minus ingerentes. Quare nullus timor est de optimæ constitutionis homine, ne uel nimium labore fatigetur, aut cibis nimium expleatur. Ipsum enim sanum corpus omnia sibi ipsi excogitat, naturæ motibus impulsus, præsertim si animus ipsius à puero probè fuerit institutus. Pleriq; enim in improbis moribus educati, dum licetiore aut negligentiore uictu utuntur, bonas naturas corrumpunt. Quemadmodum aliqui uice uersa uitioso cor-

pore à natura producti, moderato uictu & tēpestiuis exercitijs, multa naturæ uicta ac delicta correxerunt. At de exercitorum mensura, & utendi modo, dictum est in præcedenti sermone.

*Victus senum ratio.*

*Cap. xxx.*

**N**aturalis senectū est sicca & frigida corporū temperatura, ex longæuitate proueniens: quum enim corporū essentia unā cū insita caliditate paulatim defluat, & instrumenta iā ulterius quàm conueniens erat sicca fiant, tum actiones deteriores redduntur, tum animal ipsum ex carne & seipso gracilius euadit. Postquam uero adhuc amplius fuerint resiccata, non solū ex carne, sed etiā rugosum efficitur, & mēbrorū impotēs, & in motibus ambiguū. Qui itaq; affectionē ex scientia nouit, quod uidelicet siccitas est cū frigiditate, is bonus fuerit senū Medicus. Cognoscet enim quod horū correctio per humectantia ac calfacientia cōtingit. talia autē sunt, aquarū dulcium balnea calida, & uini boni potus, & cibi qui humectant simulq; calfaciunt. Et frictiones per oleū mane moderate fiētēs. Deinde deambulationes & gestationes citra delationē, uirium senis coniectatione facta: nō enim parua est etiā in ipsis senibus differentia. Dandus autem est cibus modicus quidem, uerum sæpe. Nam si paululum iustā mensuram senes excesserint, non parum leduntur. Securius itaq; est debilibus senibus parum cibi offerre, uerum ter in die. Circa tertiam quidem horam panem probè paratum recentē, cum optimo melle despumato. Circa septimā uero præfrictis, & cōuenientibus senibus exercitijs exercitatis, ac lotis, prandium exhibendum est, & primū quidem danda quæ uentrem molliūt, uelut sunt olea ex beta ac malua. Deinde pisces petrosos ac pelagios præbere conuenit, postea uero paululū in lecto quiescere, deinde moderato motu uti. Ad uesperam autem cœnantes, à piscium esu abstineant. Accipiant autem cibos boni succi & ægrè corruptiles, uelut est gallina aut uolucris aliqua ex simplici iure. Vinum uero senibus utilissimum est. Sit autem ex calidioribus natura. Quale est quod substantia quidem tenue est, colore autē fuluum aut flauum. Atq; unum quidem hoc maximū bonum senibus ex uino accedit, quod calfiunt omnes ipsorū partes. Deinde quod serum sanguinis per urinas purgatur. Quæcūq; uero uina pallida sunt aut flaua, & simul crassa, ea sanguinē generant, & corpus nutriūt. Quapropter etiā ipsa aliquando cōmoda fuerint senibus, quo uidelicet tēpore neq; serosum humorē in uenis habēt, & ampliore nutrimento indigent. Vt plurimum enim uino urinam ciente opus habent, eò quod aquosa superfluitas in ipsis redundat. At uero à nigris & acerbis ac crassis & similibus uinis abstinere ipsos oportet. Diutius enim in uentre manēt, & propterea incommoda sunt. Dulci uero si senex uti uelit, post balneū sumat dulce simulq; pallidū colore. Non prohibeo etiā uinorū ex melle paratorū usum, et præsertim his senibus qui suspecti sunt de calculi in renibus generatione, aut quos podagra aut articularis morbus infestat. Et tunc in uinū inijciendū est petroselinū solum. Sufficit enim hoc arthriticis. Ad calculosos uero betonica ammiscetur, quæ & cestrū appellatur et saxifraga. Abstinere autē oportet senes ab eduljjs & potibus, uiscosum & crassum humorē gignētibz. Quælia sunt alica, caseus, oua cocta, cochleæ, bulbi, fungi, lenticula



lenticula, & ostreorum caro, & reliqua suprâ relata in alimentorû crassi succi mentione, sermone secundo. Si uero ex necessitate aliquando contigerit aliquo ex talibus uti, statim exhibendum est pharmacum ex calamintha, aut ex tribus piperis generibus. Si uero non sit ad manû quid ex his, piper tundendum est & exactè cribrandû, & tum cum obsonijs edendû, tum potui inspergendum. Et allium tunc gustare conducit. Postquam autem soluta est obturatio, & aluus subducta, etiâ theriacam antidotû, & mithridaticam, aut aliam quandam ex his quæ ex aromatibus constant exhibere conuenit. A talium uero usu trâsire statim ad humectantē ac calfacientem uictus rationē suprâ relatâ. Dandæ sunt ipsi etiam maturæ & dulcissimæ uirides ficus, ante aliû cibû. Sed & in hyeme caricæ, nisi accidens aliquod circa dextram præsertim præcordiorum partē adsit. Quando quidē uero serosæ ac pituitosæ superfluitates in senum corporibus, uelut dictû est, colliguntur: urinâ quotidie propellere oportet, non per medicatas res, sed apij decocto cum melle, & uinis urinâ clientibus uti. Venter quoq; per oleum bonû subducendus est, præsertim absorptum ante cibos. Manifestû est autem quod & oleracea omnia præ alijs cibis edere oportet, ex oleo & garo. Emolliunt autem uentrem & pruna sicca, præsertim quæ ab Hispania afferuntur. Damascena uero in aqua multa meraciore præmaceretur, aut in ipsa decoquatur. Sed & oliuæ muria conditæ, si fieri potest albæ, præsumendæ sunt. Ventre uero amplius suppresso, etiam mercurialis cocta detur, & cnicus cû ptisana. sed & resina terebinthina. De hac uero accipiendum est aliquando ad nucis regiæ magnitudinē, aliquando ad duarû aut trium. Non enim solû citra molestiam mollire solet, sed etiam uiscera extergere, & pulmonē & renes. At perfecta dosis eius est uncia una. Idoneum est ipsis & hoc. Caricas pingues accipe, & corium forinsecus ipsis obsitû detrahe, deinde in mortario tûde, & cnici medullâ ipsis adijce, decima plus minus caricarum parte. Deinde ambo tusa misce, ex hoc duarû aut trium caricarû magnitudinē præbe. At uero ex relatis pharmacis nullum unquâ largius accipiendû est. Quidam enim gaudēt quod cōfestim uehemēter sunt purgati. Verû quanto magis fuerint euacuati, tanto amplius uenter sistitur per sequentes dies. Suppressa autē aluo ipsorû, infundere oportet oleum solû calidû. Nam & dura stercorea hinc educuntur, & lubricitas quædâ fit in transitu, & ipsum senû corpus mollescit, instar aridarû pellî induratur.

*Victus ratio eorum qui in ocio degunt. Cap. xxxi.*

Qui uitâ in ocio degit considerare debet, an in priore uita exerceri cōsueuit, aut citra exercitationē lauari. Nam quidâ hunc morem moderatē ferunt, ut aliqui ex ipsis nō assiduè ægrotent, ubi corpore facile trâspirante præditi fuerint. Atq; talem sanè corporis naturâ, ad aliam consuetudinē transferre minimè oportet, quemadmodû neq; illâ aliam, eorû qui per multum tēporis interuallum ægrotant. Si uero assiduè quis ægrotet, cōsideranda est in ipso causâ, an ob plenitudinē, aut propter humorû uitiatiōnē ægrotet. Et si quidē è morbis ex plenitudine ægrotare uideatur, scopus tibi erit propositus, ut omnino salubrē ipsius diætâ conserues, quo semper moderatos habeat humores. Si uero propter uitiatos humores ægrotare solet, optimos facere humores. Quidâ igitur plenu-

dinem coaceruât, quâ ea quæ per corpus transpirant pauciora fuerint his quæ accipiuntur. In his itaq; seruâda est symmetria ac proportio eduliorû ac poruum ad ea quæ euacuatur. Symmetria autem est, ut in utrisq; cōsideremus nos quantitâtē, tum eorû quæ ingeruntur, tum eorû quæ euacuatur. Nâ qui in priore uita statim priusquâ exerceretur, in balneû ingres si sunt, in his nûc frictione moderata utendum est, & breui motu. Qui uero exercitabatur ante balneum, his cōsulo ut nunc paululû augeant consuetudinem. Detrahare uero oportet etiâ aliquid de cibis, & quantitâ ac qualitate moderatos exhibere. Qualitatē autem dico, uelut in carnibus porcinis: celerrimè enim plenitudinem & copiam boni humoris congregant. Itaq; ad olera ducēdi sunt, & ad pisces similiter ac uolucres, qui non multû nutriunt. At uero in his qui uitiatos humores colligunt, nō unus est scopus, quoniâ neq; una est uitiati humoris species. Quidâ enim frigidiore ac pituitosiore uitiolum humorē congregât. Aliqui uero calidiore & biliosiore. Sicut alij atrabiliarium. Fugiendî itaq; sunt singuli cibi ac potus, qui promptè generare solēt humorē qui in ipsis cōgregatur. Dictum est autem de ipsis abunde, in boni succi & mali succi eduliorû mentione, in secundo sermone huius operis. In quo sanè de attenuantibus edulij dictû est, quæ commoda sunt, his qui crudû appellatum humorē coaceruant, qui semper quidem crassus est, nō tamen semper uiscosus. Porro in omnibus his cōmune auxilium est, moderata uentris subductio, & maximè quibus ueter est natura durior. Cōmune auxilium est etiam ueneris usus moderatus.

*De carnum subuersione.*

*Cap. xxxii.*

Quum ad immodicâ carnum multitudinem deuenierit corpus, liquare ipsum ac subuertere oportet. Ostēsum est autem quod calidius & siccus temperamentum, gracile corpus efficit. Huiusmodi igitur faciendum est carnosorum hominum temperamentum, si moderatû fieri debet. Didicisti autē iam quod uelocia exercitia atq; acuta, & diætâ attenuas, itemq; eiusmodi medicamenta, sed & animæ curæ, totû tēperamentû calidius ac siccus reddūt, & ipsum corpus tenuius. Attenuas itaq; diætâ manifesta est, pharmaca uero uehemētia sunt, rutæ semen, & præsertim syluestris cum cacuminibus, aristolochia rotunda, centaurea tenuis, gentiana, & polium, & quæcunq; fortiter urinam ciēt, uelut petroselinum. Singula enim hæc & per se, & inter se uniuersa mixta, attenuare & euacuare humores possunt. Sed & sal ex uiperis uistis multum attenuat. Quin & ipsa theriaca antidotus attenuat & discutit. Illinatur autem oleo, in quo cocta est cucumeris syluestris radix, & althæa, & gentiana, & panacis radix, & aristolochia rotunda, poliumq; ac centaurea. Cibi uero non statim à balneis dandi sunt, sed permittendum est ut prius quiescant aut quid consuetarû actionum obeant, & rursus ad secundû balneû ducantur. Præstat autē & balnei aquâ discussoriâ esse, si naturalem habere possent. Sin minus, flos salis marini aquæ ammisceatur. Deinde uero edulia magna quidē mole, pauci uero nutrimenti danda sunt, ut impleatur quidē, modicû uero alimentû ex ipsis in corpus distribuatur. Talia uero sunt olera, & panes sordidiores, & similia quæ iam in secundo sermone relata sunt. Vino autē utendum est albo colore, & tenui substantia. Neq; uero



ante cibos potus permittendus est, neq; copiosus potus indulgendus. Sed & semel in die cibū capere melius est, & pro exercitiorum ratione pauciores cibos exhibere. Quin & frictio sicca ex mappis crassioribus, sufficiens est ad attenuandum. Sed & nītro ac aspersore sale frictionem facere conuenit. Multū itaque nītrum in balneis attenuat. Modicum uero, iritamentum est ad carnositatem uberiores, & ad meliorem nutritionem. Prodest etiam insolatio carnosiss. Probe attenuat etiam potum hoc pharmacum. Petroselinī trientē, pīperis sextantem, anisī, asari, uetriusq; unciā unam. Hoc & lotium ciet, & aluum promouet.

*Quomodo graciles renutrire oportet. Cap. xxxiii.*  
Gracilitas corporibus accedit, quibusdā ex totius corporis intēperatura frigidior ac siccior, quibusdam uero digerēdi facultate, aut nutriendi, aut utrisq; imbecillioribus natura existētib. Omnes autē sic habentes iuuant edulīa boni succi, & exercitiā tarda ac moderata, & frictio consimilis. Et in summa, omnia cōtraria relatis ad carnosos. Cōmodum est etiā ipsis picari per dies tres aut quatuor. Nā & digestionī cōfert, & nutritionī. Et multos uidere est crassefactos ex hoc picationis auxilio, & praesertim eos quibus facultas digerendi debilis est. Nutriendi uero facultas nō debilis quidem est, sed ob idoneae materiae penuriā nutrire non potest. Si uero ieiuni lauentur, ante balneū corpus linteis cōfricare oportet, donec rubefiat. Deinde frictione nō ualde dura uti, ut ne constringentes, cutē densam ac duram efficiamus. Oportet autem decoloribus & alimentum non sentientibus iracundiā inducere, & commotiones animales.

*Quomodo quis partes attenuatas sanare possit.*

*Cap. xxxiiii.*

Ex his qui in quibusdam partibus graciles fiunt, plerique aut ob diuturnam ipsarum quietem, aut ob deligationis fracturā modum, ad hanc affectionē deueniunt. Oportet igitur uires quidem in membro corroborare, largum uero sanguinem attrahere, tū per moderatarum frictionum usum post cibum, tū per cōmodos parti motus, & per moderatas aquae calidae affusiones. Hec autem post cibum facere oportet, donec pars rubicunda facta eleuetur, & tunc statim a perfusione cessandū est. Oportet etiam picatorū medicamento uti, de quo dictum est in praecedenti sermone, ubi uero frigiditatis sensus circa attenuatam partem fuerit, linteis ipsa perfricanda est, & quodam pharmaco calefaciente. Sed & thapsia illinenda est, aliquando cum melle, aliquando cum cerato.

*De lassitudinibus a gymnasijs, aut ex itinere obortis.*

*Cap. xxxv.*

Lassitudinum primae ac simplices tres sunt differentiē. Quae ulcerosa appellatur, & quae tensua, & quae inflammatoria. Et ad has insuper ea quae ob multā musculorum siccitatem generatur, quam lassitudinem uocant abusiue, quum non sit lassitudo, sed siccitas.

*De lassitudine ulcerosa.*

*Cap. xxxvi.*

Ulcerosa itaque lassitudo in superfluitatibus tenuibus simulq; acribus ac mordacibus generatur. Nō enim in his plenitudinis copia est quae affligit, sed humorum acrimonia, qui exercitiorum tempore, aut aliorum uehementium motuum, ex duplici causa generatur. Aut crassioribus superfluitatibus diffusis quidem ac attenuatis, non autem omnibus excretis. Aut

colliquata aliqua pinguedine, uel carne tenera, in uehementibus motibus; necesse est enim a talibus tenuibus humoribus & acribus pungi ac uelut sauciari cutem & carnes, ut & horror aliquādo fiat, & rigor, quum fortiter fuerint acres & multi. Tumor autem non est oculis expositus in partibus dolentibus. Accidit hec lassitudo praecipue corporibus uitiosis humoribus ac superfluitatibus refertis. Consequitur & ad recentes cruditates, quū aut immodestius se exercuerint aliqui, aut in sole diutius uersati fuerint. Sed & citra cruditatē in boni succi corpore cōflatur, propter immodici exercitiū excessum. Densa autē & horrida apparet his cutis, & dolent uelut qui ulcus habent, alij cute tantū, alij etiam carnibus sub ipsa. Sanatio porro cōtingit ex eo quod contrariū est affectioni. Oportet enim superfluitates discutere, & sedabitur affectio. Discutiētur autē frictione multa & molli cum oleo dulcissimo nulla adstrictione praedito. Quale est dulcissimum sabinum. Maximē enim aduersatur his omphacinum. In prima igitur die largo oleo cū multa frictione utendū est, quo omnino nullus percipiatur futurae lassitudinis sensus. In secunda uero, quo ea quae facta iam est soluatur. Soluit autē ipsam, exercitiū moderatum, & frictio multa, pluribus ministris simul contrectantibus, quo pars ipsa nō frigeat, & superfluitates celerrimē discutiantur. Haec autem lassitudo plerunq; extendi solet usq; ad quartā diem. Itaq; quarta die lauentur & cōsueti cibo nutriantur. prioribus tamē diebus pauciores sint ac humidiores cibi, & nihil uiscosi habentes. Sit autē & balneum non moderato calidius. Laxare enim & discutere uolumus ipsum corpus.

*De lassitudine tensua.*

*Cap. xxxvii.*

Lassitudo tensua nullam memorabilem superfluitatem in corporibus sitam habet. Verum in muscularis ac neruis affectio est ob uehementes distentiones facta, quas per exercitiā fecerunt. Contingit enim in his rectas in musculis fibras laborare ac tendi, ut proximae sint diuulsiōni. Fit autem haec lassitudo uiris maximē boni succi, qui nō acuta & uelocia exercitiā faciunt, sed magis robusta. Et efficit sanē lassatos ualde pigros & ad motum aegros. Non tamen horridi fiunt, uelut qui ulcerosam lassitudinem inciderunt. At uero corpus in his nihil minus quā in ulcerosa lassitudine, & in musculorum squallore, contractum uidetur. Et calidiores quā pro natura cōtingentibus esse uidentur. Sanatio autem in his est tensarum partium laxatio. Frictio igitur his conueniens est modica simulq; mollis, per oleum dulcissimum tepidum fiens; & ocium ac quies, & balnea maximē temperata moderato non calidiora, & mora in calida aqua diutius facta. Quare etiam si bis talē laueris, magnopere profueris. Hi etiam post balneū unctione opus habent antequam induantur. Et si quidē postea sudauerint, deterfos rursus inungere conuenit. Quin & sequenti die ubi surrexerunt de strato, post defricatas superfluitates, & subductam aluū, unctione opus habet, ita ut neq; extremē frigidus oleo, neque dura frictione confricentur. Cibus dandus est his modicus quantitate, uerum boni succi, & nihil uiscosum habens.

*De lassitudine inflammatoria, ad ossa pertinente.*

*Cap. xxxviii.*

Tertia lassitudo est, in qua uelut cōtusas ac inflammatas



tas sentiunt partes. hæc tunc accidere solet quum ob uehementissimos motus calfacti musculi, attraxerint quid de circumfusis ipsis superfluitatibus. Et sola hæc eleuat musculos præter naturā, ut inflammationi similis sit affectio. Et propterea ex contactu dolent, & calidiores apparent. Dolent autē magis quum moueri uolunt. Si uero circa tēdines aut neruos in profundo eandem affectionem fieri contingit, ossium lassitudinem affectionē eam appellant, ob sensus profunditatem. Hæc lassitudo accidit ut plurimum hominibus ad exercitia non aduersis. Sanatio scopos tres habet, quemadmodū omnia inflammata: superflui euacuationem, distentæ partis remissionem, & inflammatæ refrigerationem. Oleum itaq; multum dulce tepidum, & fricationes molliores, & in temperatissimis aquis mora diutissima, tales lassitudines sanant. Si uero etiam paulò tepidior fuerit aqua, magis his prodest. Ita uero & quies multa & assidue inuictio- nes. Cibi dādi sunt his boni succi, uerum pauciores, & nihil omnino uiscosi habentes.

*De lassitudine ob siccitatem ac gracilitatem.*

*Cap. xxxix.*

Alia præterea est quarta affectio, similis quidē lassitudini, sed nō est lassitudo, eò quod neq; ulcerosam, neque tensiuā, neq; inflammatuam affectionem habet, imò neq; horrore aliquem, neq; dolore, neq; ad motus pigritiam similē lassitudinibus infert: uerū solam gracilitatē cum siccitate. Cōtingit igitur in boni succi & exercitatione utētib; corporibus, quū immo- destius exercitata nō probe recurata fuerint. Discutuntur enim sic superfluitates, & laxatur distēta corpora. Et nihil reliquū sit in corpore præter siccitatē, quā ex immodica euacuatione habet. Quare etiā correctio huius affectionis in appositione ac repletione euacuati cōsistit. Non potest autē hæc fieri, dum cutis rarefacta est. Proinde cutē contrahere oportet, ac densare, & adstringere. Contrahit autem & adstringit, tum frigida aqua, tum feruens. At à frigida periculū est ne homo lædatur, qui iam rarus simul ac uacuus ob exercitiorum copiam factus est. A feruenti uero nulla læsio, sed secunda densitas cuti accedit, ita ut etiā relictus in ipsa calor reuocetur ex feruentis aquæ solio. Vnde feruentius calidæ solium parandū est. Exiliant autem ex ipso statim in frigidum, quo in ipsis maneat firmitas in cute unā cum caliditate. Nam & in sequenti tempore minus discutiuntur, & alimentum facile in carnes & in cutem suscipiunt: quo bono nullum maius ipsis excogitare possis. Vitāda est autem longior in frigidæ solio mora. Exoluit enim frigidæ lotio, calidæ lotionis utilitatem. Prima itaq; die lotus uelut dictum est, cibum accipiat boni succi & humidioris. Secunda uero recuretur, modicæ simul ac mollis & lentę frictionis usu, & solio calido. Atque hoc faciat consequenter per multos dies.

*De lassatis ex uenere.*

*Cap. xli.*

Debilitas uirium sequitur ad immodicū ueneris usum, præsertim in corporibus natura debilibus. Rarefit autem ipsis & cutis, ex uehementi motu. Et plurima fit per trāspirationem discussio ac exhalatio, & propterea siccitas. Aliquando uero etiā frigiditas consequitur, tum propter raritatem, tum propter caloris trāspirationem ac sudores. Correctio igitur horū est per constringentia spissantiaq; ac corroborantia cutem. De quorum numero est & moderatum exer-

citium, & feruentius calidæ aquæ solium. quales item ac somnus multus. Edulia uero sint multitudine quidem pauciora, qualitate uero humidiora, & moderate calidiora: quo & concoctio bona fiat, & siccitas ex lassitudine corrigatur.

*De lassitudinibus spontaneis.*

*Cap. xlii.*

Quum de lassitudinibus ex gymnasijs, aut ex itinere obortis dixerimus, nunc de his quæ sine uehementi motu sponte fiunt docebimus: tales enim morbosæ sunt, uelut etiam Hippocrati uidetur: Lassitudines enim, inquit, spontaneæ denuntiant morbos. Sunt autem, & harum tres differentiæ, ulcerosa, tensiua, inflammatoria.

*De lassitudine ulcerosa spontanea.*

*Cap. xliii.*

Spontanea igitur ulcerosa lassitudo, ob uitiosos humores clandestine coalitos fit, qui acres & tenues ac calidi sunt, ut corrodant & stimulent ac pungant corpuscula sensu prædita. Et quam diu quidem ipsi in uenis ammixti sunt sanguini, later ipsorum uis à sanguinis bonitate superata. Vbi uero in carnes et cutē trāsumpti fuerint, & per mansionem confirmati, tunc ulcerosam affectionē ac sensum inducunt. Et tunc maxime in talibus augentur, quū moueri uolunt. Considerandum est autem in his, utrum in cute & carne sola uitiosi humores contineantur, aut etiam cū sanguine intra uenarum uasa. Horum autē signa habes ex urinis, & morfu circa cutem, & sudoribus. Quando enim unā cum hoc quod etiam in urinis apparent uitiosi humores, sensus quoq; ipsorum mordax circa cutē contingit, & sudores alieni, tū colore, tum sapore apparent, manifestum est quod & in uenis cum sanguine uitiosi humores continentur, & quod in cute sunt ac carne. Si quidem igitur modicus sensus uitiosorum humorum cōtingat, ieiunū hominem per totum diē seruabimus, quiescere ac dormire iussim. Deinde uesperī multū & pinguius illito, atq; temperatissima calida lotio, paucissimum boni succi ac sordibilem cibum dabimus. Neq; uero uinum prohibebimus: concoquit enim uinum semicrudos humores, si quicquam aliud hoc facit, & sudores ac urinas prolificat, & ad somnum cōducit. Si quidem igitur à prædictis quieuerit hoc symptoma, paulatim ad cōsuetam reducere hominē oportet. Si uero sequenti nocte ac postera die adhuc permanserit, aut auctum fuerit, uindendum est de auxilio fortiore. Nam tales ubi uires robustæ sunt, alterū ex duobus facere oportet, ut aut uenam fecent, aut purgatione utantur, ita tamen ut decernas utro auxilio magis opus habent, uelut consequenter dicam. Sin uero debiles fuerint uires, minime secunda est uena. Purgādum uero moderate aut omnino non. Si quidem enim cum multitudine sanguinis robustæ fuerint uires, uena secunda est, aut cōsuetæ excretionis suppressæ mouēdæ: uelut sunt hæmorrhoides in sede, & in mulieribus lunares purgationes. At ubi soli uitiosi congregati sunt humores, citra sanguinis multitudinem, ad convenientem redundantī humori purgationem ueniendum est. Affligit autem quandoq; bilis amaræ humor, aut atræ, quandoq; pituita salia aut acida, aut serosi humores. Siquidē igitur ociosiorē uitā habuerit homo, et cibus crassus succi usus fuerit, & præsertim in hyme, pituitosus humor colligitur. Verum in pluribus laboribus & cibus acrioribus, & in æstate, amara bilis coaceruatur. In autumno uero, & edulij eiusmodi, ac laboribus



horibus diuturnis, atra bilis. Horum uero notas sumere oportet, & ex colore, & ex hominis motibus, & ex urinis ac sudoribus, & ex siti ac ciborum appetentia. Proinde sanguine prædominante reliquis humoribus, unâ cum uiribus robustis, uenam secabis. Si uero uitiosi humores prædominantur, & uires robustæ sunt, purgatione cōueniēti utemur. At post uenæ sectionem aut purgationem, nutrire oportet hominem edulijs boni succi quæ exterforium quid habet, uelut est ptisana: & quæ nulla uiscositate prædita sunt, neque crassi succi sunt, neque multum nutriunt. Utendum est & balneis temperatissimis, & unctione ac frictione moderata. Sed & reliqua diætata ac cura sic facienda est, uelut relatum est in lassitudine ex gymnasijs generata. Si uero bonus sanguis paucus fuerit, crudi uero humores omnino multi, uires autem debiles: Neque uena secanda est, neque purgatione, neque exercitio utendum: Imò neque omnino motu utendum est, neque lauandum: Nam uenæ sectio bonum sanguinem euacuat, uitiosum autem, qui sanè in magnis uenis circa hepar & mesenterium congregatur, ad totum corpus trahit. At purgatio in his tormina ac morsus efficit, & animi deliquia intèra, ad hoc quod nihil memorabile euacuat. Crudi enim humores omnes pigri sunt ac ægre mobiles, ob crassitudinem ac frigiditatem. Itaque obturant omnes arctas uias, per quas oportet id quod in purgationibus euacuatur ad uentrem accedere ac inferri. Et ob hanc causam neque ipsi euacuantur, & alios impediunt. Ob eandem uero causam neque exerceri, neque omnino moueri, neque lauari hos conuenit. Omnes enim tales motus humores in totum corpus ducunt, & angustos transitus obturant. Seruandi igitur sunt in omni quiete, & danda edulia potusque ac pharmaca attenuantia ac secantia, & crassitudinem humorum conficienda, citra manifestam calfactionem. Nam humores quomodocunque fortiter calfacti, undique per corpus meant. Utantur igitur in uictu aceto mulso præsertim, aliquando & ptisana: Aliquando uero danda est & aqua mulsa. Possunt enim ferre tenuem diætam, si qui alij idem possunt, propter subiectam crudorum humorum multitudinem. Quandoquidem uero præcordia omnibus talibus eleuata sunt ac inflata, & facile sanè inflantur, quicquid tandem ingesserint: præstiterit ipsis dare cum cibo modicum piperis, præsertim longi. Melius fuerit & dispolitico uti medicamento. Commodissimum est autem ipsis acetum mulsum, ex solo optimo melle & aceto præparatum: ut sint mellis quidem despumati partes duæ, aceti uero pars una, plus minus. Præstat enim ex accipientium sensu modum iudicare, non nostris commoditatibus. Nam quod naturæ iucundum est, hoc commodum est. Quod uero iniucundissimum est, id maxime aduersarium est. Prodest talibus etiam apomeli, & præsertim aridum factum. At ubi iam attenuati aliquantulum fuerint humores, etiam uinum dandum est moderatum, album ac tenue. Sed & in apomelite ac aceto mulso coquendum est aliquando hyssopum & pulegium. Edulijs uero utendum attenuantibus, citra uehementem calfactionem: qualis est capparitis ex aceto mulso, aut ex aceto & oleo. Postquam uero omnia perfecte bona tibi apparuerint, tunc ad familiarem uictum paulatim reducere conare, ita ut mo-

deratis exercitijs utantur, & balneis, & unctionibus. Idoneum est autem ipsis unguentum lassitudinem eximens ex abiete paratum, itemque quod ex populo nigra fit, quorum præparandi modum inter Acopa uocata referemus. Congruum est ipsis & oleum chamæmelinum, & anethinum. Item sampsuchinum tempore hyberno. Sampsuchinum uero oleum sic præparatur. Coquitur sampsuchus in duplici uase cum oleo. Similiter coquitur & rosmarinus herba. Si uero hæc non habeas, radicem cucumeris syluestris, aut althæa, aut bryoniæ, aut betæ albæ accipe, & cum oleo coque, multum enim discutiunt.

*De lassitudine tensiua spontanea.*

Cap. XLIII.

Tensiua spontanea lassitudo, si sine exercitijs, aut alio quodam motu excitata fuerit, multitudinem nimirum humorum indicat, qui nimia copia solidas animantis partes distendunt, & præsertim musculorum fibras. Vlcerosus sensus non est in hac lassitudine. Sed neque tumor alicuius partis sub tactum aut uisum cadens. Verum solum grauitatem & distentionem percipiunt. Manifestum est autem quod sanguine redundante, optimum auxilium est uenæ sectio in cubito. Possunt & uenæ in talis secari. At uero post totius corporis euacuationem, ad distectarum partium laxationem procedendum est, per unctiones ac frictiones molles, ociumque ac quietem. Et utendum est balneis temperatis, & cibis citra mordacitatem exterforium quiddam habentibus, qualis est ptisana, & apomeli, & consimilia. Et ut in summa dicam, post uenæ sectionem eadem cura uti oportet, quæ relata est ante ad tensiuam lassitudinem ex gymnasijs exercitijs obortam.

*De lassitudine inflammatoria spontanea.*

Cap. XLIII.

Inflammatoria lassitudo quum sponte citra aliquem motum oborta fuerit, tum propter doloris magnitudinem, tum propterea quod cum manifesta inflammationum partium caliditate consistit, coeleuans musculos in tumorem, neque paucarum horarum, nedum dierum duorum aut trium moram ac dilationem tolerat. Sed statim febrem uehementissimam inducit, nisi quis sanguinem detrahendo præueniat. Calidissimus est enim talis sanguis, & plurima opus habent ipsius euacuatione, omnes ferme ab hoc malo apprehensi, & plerique ipsorum etiam post uenæ sectionem febriunt. Quare neque cunctari, neque parum detrudere conuenit. Sed & cito euacuare, & usque ad animi deliquium ducere, si nihil aliud amplius impedierit. Præstat autem & detractionem repetere in eadem die, ita ut in priore euacuatione homo non animo linquatur. In posteriore neque ferendum est animi deliquium. At quibus hoc modo affectis uena secta non fuerit, aut sponte aliunde sanguis eruperit, hi bona fortuna opus habent ut seruentur, & neque seruantur. Si quidem igitur in capite & collo dolores magis hæserint, humeralem appellatam uenam secare oportet. Si uero thoracem & dorsum & lumbos doleant, internam uenam secabis. Sin æqualiter totum corpus, mediam. Si quidem igitur à uenæ sectione febris permanserit, curationem facere oportet, quam in febrium tractatione referemus. Si uero sine febre maneant, in prima quidem die à uenæ sectione, ptisanæ succus aut alicæ solum dandus est. Similiter autem & secunda. Si autem & in tertia die sine febre manet, etiam lauato & largo oleo inungito.



inungito. Etiam si autem laueris, moderatum tamen uictum exhibebis ex lactuca, aut si ea non adsit, cucurbita: & alitum uelut prisanam coctam. Sed & beta, & malua, & atriplice utendum est, si non adsit lactuca. Ex piscibus dandi sunt petrosi, & asellus ex albo iure probe coctus. Utatur aque potu. Aquæ potum dico, non frigida aquæ potionem, sed calidæ. Post tertiam si tolerabilis manet æger, inspergere oportet in potum, uini parum albi ac tenuis, & de cætero pro ratione reficere, per boni succi & neutiquā calfacientis diætæ usum.

*Quali curatione ad frigiditates utendum est.*

*Ex Herodoto.*

*Cap. XLV.*

Duplex est frigiditatis curandæ modus. Nam & futuram frigiditatem præcauere oportet, & corrigere iam factam. Quo igitur non capiatur frigiditate is qui in frigido aëre uersaturus est: neque famem tulisse, neque præuomuisse oportet, neque crudelitatem pertulisse, aut fatigatum esse, aut crapula impletum esse. Frigiditas enim consequens ad ciborum crudelitatem, morborum causa est. His uero qui famem pertulerunt, frigiditas ad ipsos nervos penetrat, qui nudi quodam modo sunt, & propria materia priuati. Quapropter qui in frigido aëre uersabitur, totum corpus nardino aut gleucino oleo præinungere debet. Plantas autem pedum, cerato ex laurino parato illinere. Aut ipsas lauri baccas cerato excipere, ac utere. Verum ex ueteribus quidam succum cyrenaicum milij magnitudine, in talibus necessitatibus deuorandum dederunt, cera oblitum. At uero à couersatione in frigido aëre, desidere non oportet, sed ambulare prius in tepidiore loco. Et postea ad balneum ingredi, & in calida aqua diutius morari. Non præsentem uero balneo, ad ignem corpus illinendum est, ac confricandum diligentius tum per seipsum, tum per alios. Deinde accipiendus est cibus calidus potentia & actu. Vinum uero neque ualde acerbum, neque nimis uetus dandum est. Tale enim nervosas partes offendit, iam à frigore uexatas, & præsertim uescicam ac renes. Si uero sequenti die frigiditas perseueret, curatio per balneum aut inunctionem conuenit. Et diætæ consimilis, & acopa ex oleo gleucino & amaracino ac similibus præparata.

*Cutis densata curatio. Galeni.*

*Cap. XLVI.*

Densatur aliquando cutis, tum per uehemens frigus, tum per balnea aluminosarum aquarum, aut aliquid humilemodi. Fieri potest autem ut & post balneum, & post sudores, aut alio quodam modo rarefacta ac frigefacta cutis densetur. Cognoscitur affectio calore albidior quam pro natura, & cutis ariditate ac densitate, & quod sic affecti in exercitijs ægre calefiant. Neque enim sudant, neque bonum colorem habent. Si uero etiam à plurimis exercitijs coacti sudauerint modicum ac frigidum sudorem excludunt. Sanatio horum est calfactio & cutis rerefactio. Utendum igitur est exercitijs, & balneis calidioribus. Præstat autem in prima balnei domo super leui lapide sedentem perfundere. Vngantur etiam oleo quopiam laxatorio, uelut est quod dulcissimum est, uerum duorum aut trium annorum. Utantur & lauacro natationi apto, calido, temperato diutius. In frigido uero ne immorentur. Neque uero aqua sit ualde frigida. Vbi uero induere se uolunt, inungantur aliquo moderatè calfaciente, quale est anethinum aut cicinum. Ex

ungentis uero gleucinum, aut susinum, aut irinum, aut amaracinum. Cibis porro utantur moderatis, nihil uiscosi habentibus.

*Quomodo curandus sit æstuosus ardor. Herodoti.*

*Cap. XLVII.*

Quemadmodum frigiditas famelicos magis lædit, sic ardor repletos. Quare qui in æstiuo sole uersari uolet, repletionem & acrum esum uitet, uinositatem item ac crudelitatem. præhumectet autem corpus balneis potabilium aquarum, & cibis humectantibus. prospiciendum est & in mora ipsa sub sole, ut caput tegatur leuiore aliquo uestimēto, aut folijs uitis, aut myrti, aut polygoni. Si uero sitis uehemens oritur, non acruatim ingerendus est frigida potus. Plurimis enim hinc præterfusio aquæ inter cutem contingit. Alijs uero ad ardentem pulmonem aquæ frigiditas illapsa, tusses & grauedines excitat, aliquibus etiam tabem. Præstat igitur prius faciem frigida proluere manusque ac pedes, deinde colluto ore paulatim ex interuallis absorbere. Postquam autem discessit à sole, temperata calida se lauet, & in frigida natet. Si uero non adsit balneum, aqua & oleo, aut aqua & rosaceo totum corpus humectetur, & mollibus manibus præfricetur, & tunc in frigidam insiliat, præsertim si asuetus fuerit. Si uero nihil tale adest, aqua perfundatur. Postea potus quidem sit aqua. Edulia uero, lactuca, intyba, cucumis, cucurbita. Vinum quoque dilutius solito sit. Obsonium pisces delicati, domesticæ gallina ex iure albo. A coitu uero absteineat. At ubi caput uehementer calfactum est, aut stomachus adhuc exardet, ut alba & glutinosa sit saliuua, ut uix sputo reijci possit, & reliquum corpus pigrum apparuerit, ac uelut exolutum: caput rosaceo irrigandum est, aut rosarum succo cum oleo omphacino, aut polygoni succo, aut pampinorum uitis, aut intubi, aut allicuius similis succo. Totum uero corpus humectandum est aqua & oleo, aut aqua & rosaceo. Super stomachum autem molle linteolum imponendum uino & oleo imbutum. Aut ceratum rosaceum, aut melinum quod absinthium habet aut portulacam. Optimum est autem & absinthij cremorem bibere, ad detergendas biliosas & acres in uentre congregatas superfluitates. Conducit & rosaceum absorbendum dare ad cyathi unius mensuram.

*De matutina frictione. Galeni.*

*Cap. XLVIII.*

Matutinam frictionem assumimus post superfluitatum excretionem, excellenter quidem mollē in plus iusto resiccatis, & in his qui in uehementi frigore uersari uolent, & quibus propositum est frigida lauari, & qui lassitudinis sensum habent, & in quibus cutis densitatem corrigere uolumus cum largo oleo. At uero densitatem ex frigore obortam sanamus, primum quidem siccarum & asperarum frictionum usu, deinde frictionibus ex oleo calido. Ad raritatem uero cutis obortam ex balneis, aut frictionibus, aut ob ueneris usum, paucis quidem siccis frictionibus utimur, paucis uero etiam post ipsas, ex oleo frictionibus, & eo quopiam ex adstringentibus. Cæterum humiditates ex multo potu obortas solæ siccae frictiones curant, per linteæ factæ, citra pinguitudinem, aut cum aliqua ex discussoria ui præditis.

*De uespertina frictione.*

*Cap. XLIX.*

Vespertina frictio lassatis, aut resiccatis, aut alimētum non



non sentiētibz cōmoda est. Prandium in his parcius fiat, & amplius tēpus intercedat usq; ad coenā, & plerūq; in quiete. Deinde etiā paululū deābulent. Melius enim est si subductis cibis etiā uentrē exonerauerint. His ita factis, citra periculū frictio assumitur. Frictio fiat cū oleo dulci, uentre penitus nō cōtacto. Periculum est enim & ipsos cibos prius cōcoqui, & semicoctum aliquem humorē digerī, & caput perturbari, & stomachum subuerti. Quare nardino unguento uenter perfundendus est absq; defrictione.

*De cruditate.*

*Cap. L.*

Quot modis cruditas fiat, & quomodo uariē resistere oportet oborientibus ex hac corpori detrimētis, in loco de alui affectionibus postea declarabitur. Nunc uero necessarium est dicere quomodo ad urgētia accidētia instare oportet. Ructu itaq; accedente ac iritante, & grauitate circa præcordia existēte, & ex hac molestia quadā in totum corpus se diffundente, non cunctandū est ad uomitum deuenire, sed aqua plurima tepida hausta cogendus est, ut cibi penitus excernantur. Vbi enim permāserint, & torminum, & dolorū, & grauitatis capitis, & destillationis, aliquādo uero etiā febris, causa fiunt. Si uero quis natura difficulter uomat, aut ob aliā quandam causam uomere impediatur, elaborādū est omni modo ut cibus subducatur, & ex præcordiis secedat. Ad hæc erectior decubitus paretur. Adiuvat enim, si quicquā aliud, concoctionē. Et si uigilans quis fuerit, propter nimiam expletionem somnū assequi non potens, is immotus permaneat, & eandē decubitus figurā conseruet. Nā assiduæ conuersiones flatus pariunt. Flatus autē materiam sursum uergere faciunt. Si uero perseverarit hoc accidēs, etiam pharmaci cōcoctorij ex malis cydonijs præparati, cochlearij mensura danda est. Si uero quis adsuētus sit ad frigide potū, & multam sitim percipit, non incongruū fuerit sinceræ frigide heminam exhaurire. Celerrimē enim corroboratum os uentris, quæ in aluo sunt expellit. At uentrē nardino unguento illinere oportet, & partes circa præcordia fouere, & extremarū partiū frictione uti. Exonerata aluo ad deambulationē procedendum est, tarde progrediendo, ne uapores ex cruditate ad caput allati concutiantur. Postea uero ad consueta uitæ munia pergendum est. Deinde succedat balneū, & inunctio ex oleo dulci. Vtilis est & absinthij potus. Cibo uero utendum est facile concoctili ac moderato, & cui addita sunt quæ aluo commodant, uelut sunt erinacei & cancri. Deinde olera, beta, malua. Modicē utendum est uino, uerum calidiore. A reliquis uero abstineat, uelut sunt acriū esus, & bellaria, ac placētæ ex melle, & fructus dulces. Talia enim omnia ægre cōcoqui ac digerī possunt. Hinc autem somnus imperturbatus succedat.

*De crapula. Philumeni.*

*Cap. LI.*

Sed & cruditates ex uino obortas, quas crapulas uocāt, ferē eodē modo tractare oportet, ita ut cogamus ipsos uomere à tepida aqua, aut sola immiſsione digitorū aut pennarū, & in lecto quiescere iubeamus, & turbationē somno sedemus. Et si quis sanē ad frigide potum adsuētus sit, & stomachi ac uentris uexationem siue morsum perceptet, dādi sunt ipsi cyathi duo aut tres synceræ puræ frigidae aquæ ex interuallis. Sedata uero turbatione, cibos exhibebimus boni succi, & magis frigefacientes. Potus autē sit modicus, ui-

num album & tenue, dilutius temperatū. Optimus uero in his est uini absinthiae potus à balneo.

*De æqualibus intemperaturis. Galeni. Cap. LII.*

Quū tractauerimus quomodo quis à prima etate usq; ad senectutem conseruet hominem optime constructum: transibimus nunc ad eos qui statim ab initio morbosam corporum constructionem adepti sunt. Duplices autem sunt secundum genus uitiosæ corporum structuræ. Quædam enim æqualiter habent temperatas uniuerſas corporis primas partes, quæ similes appellantur. Quædam uero inæqualiter. Dico autem æqualiter, quum ad aliquā intemperaturā immutatæ fuerint omnes simul corporis partes, frigidiore quā conuenit, aut calidiore, aut sicciore, aut humidiores factæ. Et per coniugationem, quædā calidiore & sicciore, quædam humidiores & frigidiore, quædā calidiore & humidiores, quædā frigidiore & sicciore. Et sanē iuxta instrumentaliū partium compositionē, aliquæ æqualiter, aliquæ inæqualiter composite sunt. Vidi enim iam quosdā habere uentrem quidem frigidū, caput autem calidū: alios uero caput frigidū, uentrem uero calidū. Vidi autem & uentrē per accidens assiduē bile uexatum, qui non esset natura calidus. Quemadmodum etiam alium frigefientē, qui nō esset frigidus. Sic & caput, & hepar & splen, & omnes alię partes, fruuntur aliquando alterius intemperatura, quū ipsæ ex natura nihil læsæ sint in propriū temperamentum, neq; cōtrario modo dispositæ. Proinde de primis optimū temperamentū adeptis à me dicitur, quo hoc exemplum habeas quod temperatū est. Deinde de his qui æqualē intemperaturā habēt. Demonstratū est à me sæpe, impossibile esse unam aliquam intemperaturā diutius perseverare. Ipsa enim sibi ipsi necessariò aliā quandam asciscit. Illud porro nosse expedit, quod quæcunq; corpora morbosam structuram in prima natiuitate habuerunt, ea omnino non perueniunt ad senectutem. Si uero etiam peruenerint, unum quendam morbum diuturnū habent. Proposuius autē in hac tractatione de uitiosam structuram habētibus agere, considerantes quomodo quis ipsa conseruet ut plurimum sana. Prius uero referendæ sunt temperamentorum notæ, postea consequenter etiam intemperaturarum correctiones.

*Optimi temperamenti dinotio.*

*Cap. LIII.*

Optimē tēperatus est homo quū corpore apparet exacte medius inter omnia extremē disposita corpora, in gracilitate ac crassitudine, mollicie ac duricie, caliditate ac humiditate, siccitate ac frigiditate. Et, ut in summa dicā, si animales ac naturales actiones inculpabiles habuerit. Medio item modo se habuerit inter hirsuta corpora ac glabra, & inter nigra colore ac alba. Habuerit autem capillos, dum quidem puer est fuluiores, in uigore uero ætatis flauiores.

*Temperamenti calidi nota.*

*Cap. LIIII.*

Calidius quā conuenit temperamentū totius corporis, nūc dico illud quod proportionē secundū humiditatem ac siccitatē inculpabilē habet. Qui igitur ab initio talē corporis naturā adepti sunt, saniores alijs apparent, & articulata uoce loquuntur, & canūt, & citius gradiuntur. Augebitur autē ipsis caliditas pro annorū proportiōe. Iuxta uigorē autē ætatis palam calidiores apparent. Quare morbis & accidētibus à flaua bile facile capiuntur: Nā multa caliditas paulatim



latim consumens humiditatem, siccius temperamentum efficit. Hi colore rubicundi sunt, & nigros capillos habent, progressu uero temporis etiam moderate densos. Habentque uenas amplas, sunt enim & graciles. Nam pingues & uenas amplas habentes, non natura pingues sunt, sed acquisitum temperamentum habent.

*Temperamenti frigidi nota.*

Cap. LV.

Frigidum ad contactum est his corpus, depile, & pingue. Color autem una cum capillis, fuluor his est. Si uero multa est frigiditas, liuidi sunt & plumbei coloris, et angustas uenas habent. Si uero quis angustas habet uenas, & gracilis est, is necessario acquisitum temperamentum habet, & non ex natura gracilis est.

*Siccioris temperamenti nota.*

Cap. LVI.

Aegre mobile, & siccum, & squallidum in his fit corpus facillime ab omnibus siccantibus. Nam & natura excarnes sunt ac graciles. At cum hoc quod hi graciles sunt & excarnes, amplius etiam durum & asperum apparet tangentibus horum corpus. Gracilitas autem non solum ad naturales consequitur temperaturas, sed etiam ad acquisitas ex longa consuetudine succedit.

*Humidioris temperamenti signa.*

Cap. LVII.

Humidius temperamentum in reliquis consimile est temperato. Verum mollius & carnosius. Nam mollicies ab humida temperatura separari non potest. Quemadmodum sane & crassities non solum ad naturalem sequitur temperaturam, sed etiam ad eam quae ex longa consuetudine facta est, succedit. Proprium autem est humiditatis etiam grauari corpus ab omnibus humectantibus.

*Calidi ac humidi temperamenti nota.*

Cap. LVIII.

Mollius & carnosius est hoc, optimo temperamento. Vbi uero plurimum fuerit augmentum, putredinis facile capitur morbis. Si uero paulo humidius, multo uero calidius fuerit, tales molliores sunt moderatis, & carnosiores, & non paulo calidiores. Nigri autem sunt ipsis capilli, & caro non pinguis. Si uero paulo calidius, multo autem humidius fuerit, mollis his & multa est caro, & color mixtus ex rubro ac albo: & ad contactum paulo sunt calidiores. Quod uero in summa dicam, in coniugatis temperaturis semper praedominantis qualitatibus nota prauealent.

*Calidi & sicci temperamenti nota.*

Cap. LIX.

Calidum & siccum temperamentum hispidius ac calidius est, & gracile. Capitis autem pilos boni habitus & nigros ac multos habet in iuuentute. Temporibus uero progressu etiam caluities sequitur. At uenae ipsius amplae sunt, & arteriae magnae ac uehementissime pulsantes. Et sanum & firmum, & articulatam, & musculolum, & minime pingue totum corpus. Et cutem ipsam duriores ac nigriorem.

*Frigidi & humidi temperamenti nota.*

Cap. LX.

Thorax his angustus est, & pilis nudus, quemadmodum etiam totum corpus. Cutis autem tenera & alba. Capilli subfului, praesertim in iuuentute, & senescentes non caluescunt. Sunt item timidi, & minime audaces, ac pigri, & obscuras habent uenas. Et crassi sunt ac pingues, & femoribus ac musculis infirmi & inarticulati, & fiunt blasi. Quod si frigiditas ac humiditas amplius augetur, color una cum capillis fuluus euadit. Si uero plurimum augetur, liuidus. At si inaequale fuerit qualitatibus augmentum, eius quae

magis aucta fuerit propriae notae praedominabitur.

*Frigidi ac sicci temperamenti nota.*

Cap. LXI.

Si uero frigiditas ac siccitas ex aequo fuerint auctae, natura durum & gracile habent tales corpus, albumque ac non musculolum, & inarticulatum, ac depile, & ad tactum frigidum, pinguitudo tamen ipsis etiam si graciles sint, per carnem disseminata est. Pili & color corporis pro mensurae frigiditatis portione se habent. Porro quum calida & sicca temperatura, in tempore inclinatae aetatis, saepe transeat in siccam ac frigidam: habitus talium gracilis ac durus similiter fit, uerum melancholicus est. Et propterea colore nigriores ac hispidiores fiunt. Praedominabuntur autem semper praedominantis temperamenti notae, obscurae uero alterius notae erunt.

*De capitis dinotione.*

Cap. LXII.

Caput paruum quidem uitiosae cerebri structurae proprium signum est. Magnum uero non necessario bonae. Si quidem enim propter robur insitae uirtutis materiam multam ac bonam creantis factum est, bonum est. Si uero propter solius materiae multitudinem, non bonum. Distinguendum uero de ipso tum ex figura, tum ex his quae ab ipso ortum habent. Ex figura quidem, si fuerit concinna. Semper enim hoc signum bonum est. Ex his uero quae ab ipso ortum habent, si ualidam ceruicem habet, & alijs ossibus optime dispositum est. Et si uniuersum ipsorum nervosum genus bene nutritur, ac robustum est. Et si oculi acri uisu fuerint praediti. At uero acuminata capita defectuosam circa occiput aut frontem eminentiam habent, aut ultra iustum modum auctam. Proinde ut plurimum sicut magna, ita etiam haec capita uitiosa comperimus. Raro autem & ex his aliqua sunt, bona, efformatrice ipsorum uirtute forti existente, & multitudinem materiae bonam adeptam. Nam qui acuminata capita habent, & ceruice ualida praediti sunt, hi tum alijs partibus omnibus, tum ossibus robusti sunt, ait Hippocrates.

*Cerebri temperati nota.*

Cap. LXIII.

Temperatum cerebrum naturales actiones moderatas habet, itemque superfluitates quae per palatum, aut aures, aut nares purgantur; minimeque ledetur ab omnibus extrinsecis quae calfaciunt, & frigefaciunt, & siccant, & humectant. Talibus pili capitis dum infantes sunt, subfului sunt, pueris uero subflui: perfectis autem flui fiunt, medium quodammodo tenentes inter exacte crispas ac simplices. Nec uero facile caluescunt.

*Cerebri calidioris nota.*

Cap. LXIII.

Si uero moderato calidius fuerit, uniuersa circa caput rubicundiora ac calidiora erunt, & oculorum uenae conspicuae. Pili his genitis cito in capite oriuntur, ubi multo sunt calidiores temperatis, nigri & multi, & crispi ac robusti. Vbi uero non multo, subflui primum, deinde nigrescunt, & progressu aetatis caluescunt. Superfluitates in palato, & naribus oculisque ac auribus, pauca his sunt ac matura, quum inculpate sani fuerint. Replentur autem capite maxime, quum incauta dieta utuntur, & grauantur a calfacientibus edulis, potibus, & odoribus, atque omnibus forinsecus accidentibus. Et hoc magis adhuc, si non solum calida ex natura fuerint talia, sed etiam humida.

*Frigidioris cerebri nota.*

Cap. LXV.

Superfluitates plures circa proprios meatus hi habent.

k

Capilli



Capilli uero ipsis recti sunt & fului ac stabiles, & multo tempore à natiuitate orientes, tenues ac macri primum. Et citò à frigidis causis læduntur, & iuxta ipsum læsionis tempus destillationibus ac grauedine corripuntur. Neque uero capitis partes ad tactum calidæ sunt, neque rubicundæ apparent. Et oculorum uenæ inconspicuæ sunt. Et ipsi quodammodo somnolentiores.

*Siccioris cerebri signa.*

Cap. LXVI.

Meatum à superfluitatibus puritas, & sensuum sinceritas, signum sunt talis temperamentum. Vigilantissimi uero sunt, & pilos robustos celerrimè ubi nati sunt producant, crispas magis quàm rectas. Citò uero canescunt.

*Humidioris cerebri nota.*

Cap. LXVII.

Pili simplices, & omnino non caluescunt, & sensus caliginosi sunt & superfluitatum copia adest, & somni multi, ac profundi.

*Calidioris & humidioris cerebri signa.*

Ca. LXVIII.

Si uero caliditati affuerit humiditas, utrisque parum excedentibus modum, bonus color adest, & calor, & uenæ oculorum magnæ sunt, & superfluitates plures moderatè maturæ. Et capilli recti ac subflauii. Et non facile caluescunt. Replentur autem & grauantur capite à calefacientibus ac humectantibus. Quum autem ad plurimam humiditatem ac caliditatem ueniunt, morbosum fit his caput, & superfluitatibus redūdās, & quod facile ab humectantibus ac calefacientibus læditur. Auster his ualde aduersatur, optime autem in aquilonarijs locis degunt. Neque uero uigilare possunt diutius, & ubi ad somnum seipsos conuertunt, simul sopore premuntur altiore, & uigilijs, & insomnijs uarias imaginationes obuersantes habent. Visum item habent caliginosum, & sensus non exactos. Si uero una temperatura fuerit intenta, notæ ipsius magis prædominabuntur.

*Calidi ac sicci cerebri nota.*

Cap. LXIX.

À superfluitatibus puri sunt hi, & sensibus sinceri, ac uigilantissimi. Et citò caluescunt: prima capillorum generatio ipsis celerrima est, & probe nutritur. Sunt autem nigro ac crispo capillo præditi, & calidi ad capitis contactum, rubicundi que usque ad uigoris tempus.

*Frigidi ac sicci cerebri signa.*

Cap. LXX.

Frigidum ac decolor caput efficit hoc temperamentum, quantum in se est. Alterantur enim aliquando partes ipsius, ex humorum in toto corpore temperamento. Tales temperaturæ uenas oculorum latentes habent, & à frigidis causis promptè læduntur. Quare etiam inæqualiter sani sunt isti, aliquando quidem capite leuissimi, & meatibus à superfluitatibus puri. Aliquando uero destillationibus ac grauedine ob paruas causas corripuntur. Sensus ipsis sunt in iuuentute quidem sinceri, & per omnia inculpabiles. Verum progressu temporis citò contabescunt. Et ut in summa dicam, Omnibus capitis partibus citò senescunt, quare etiam citò caluescunt. Capilli ipsis geniti prodeunt quidem uix, uerum macri ac fului. Progressu temporis frigiditate prædominante siccitati, non caluescunt. Si uero siccitas obtinuerit dominium, parum hi caluescunt.

*Frigidi ac humidi cerebri nota.*

Cap. LXXI.

Humidæ ac frigidæ cerebri temperaturæ soporosos faciunt & somnolentos, & sensibus uiciosos, ac superfluitatibus redundantes, & quibus caput facile frige-

fiat ac repleatur, & qui destillationibus ac grauedine facile corripantur. Tales tamen non caluescunt.

*Ventris siccioris signa.*

Cap. LXXII.

Si citò siticulosi sunt, & modicus ipsis suffecerit potus, & uberiore grauentur, & fluctuationes habuerint superfluitate ipsis innatante, & edulij siccioribus gaudeant.

*Ventris calidioris nota.*

Cap. LXXIII.

Calidior uenter cōcoquit melius quàm appetit, & multo magis quæ dura sunt & difficulter alterantur. Quæ enim facile alterantur, in ipso corrumpuntur. Gaudet autem edulij ac potibus calidis, & neque à frigidis læditur, si moderatus contigerit ipsorum usus. At uero calidorum forinsecus allabentium diuturnam conuersationem ferre non potest.

*Humidioris uentris nota.*

Cap. LXXIII.

Hi neque siticulosi fiunt, & ampliorem humorem citra molestiam ferunt, edulijque humidioribus gaudet.

*Frigidioris uentris nota.*

Cap. LXXV.

Frigidior natura uenter, bene quidem appetit, non autem bene concoquit, & præsertim edulia quæ ægre alterantur & frigida sunt. Facile itaque in ipso acescunt, & propterea ructum acidum habet. Et gaudet quidem frigidis, læditur autem facile immodico eorum usu. Atque ita etiam extrinsecus allabentium ipsi frigidorum diuturnam conuersationem ferre nequit. Cæterum ex morbo conflata in uentre intemperaturæ in hoc differunt à naturalibus, quod contraria concupiscunt, non similia, uelut naturales. Si quidem igitur concoquit probe, temperatus est uenter. Si uero non cōcoquit, non omnino intemperatus est. Sed si quidē nidorosos ac fumosos efficit ructus, immodicus est ipsi ac feruens calor. Si uero acidus, uiceuersa. Sic etiam uentres qui ægre concoctilia probe concoquunt, immodicum calorem habent. Si uero ipsa non concoxerint, debilis est ipsorum calor. Considerandum est autem an ob aliquem humorem alium de in uentrem confluentem, hoc ipsis contingat. Nam ad pituitosos humores, acidi ructus consequuntur: Ad biliosos uero, nidorosi aut uirosi, aut alia quædam peregrinae qualitates. Communia autem accidentia omnium redundantium in uentre humorum sunt nausæ. Verum si quidem in uentris amplitudine humores innatarint, supernatabunt in his quæ per uomitum reijciuntur. Si uero in ipsis uentris tunicis impacti fuerint, frustra lancinabunt per inanes nausæ, ita ut nihil uomitu reijciatur.

*Pulmonis nota.*

Cap. LXXVI.

Non solū uenter siticulosos & non siticulosos facit, & frigidi ac calidi potus appetentes. Sed etiam thorax, cor, & pulmo. Verum qui propter horum caliditatem sitiunt, plus inspirant, & amplius ac diutius efflant. Percipiunt autem æstum in thorace, non circa præcordia siue hypochondria Græcis appellata, quæ admodum qui propter uentrem siti uexantur. Et sane ubi bibunt, non statim quiescunt: & frigidus potus magis ipsorum sitim sedat, quàm multus calidus. Refrigerat autē ipsos & frigidus aer inspiratus, qui ne alleuiat quidem propter uentrem siticulosos. Sic uero etiam frigefactum thoracem habentes, à frigida inspiratione sensibiliter læduntur. Et maxima est hæc frigidi pulmonis nota. Quemadmodum autem frigidum aërem inspirantes, palam sentiunt molestiam ac frigiditatem: sic calidus ipsis est gratus. Sed & pituitosas



tuitosas superfluitates hi cum tussi reijciunt. At pulmonis siccitates superfluitatibus carent, & uocem puram habent. Quemadmodum humiditates obscuræ & raucam uocem efficiunt, & ubi amplius aut acutius loqui uolunt, superfluitates ipsis incurrunt.

*Cordis calidioris notæ.*

*Cap. LXXVII.*

Magnitudo respirationis, & pulsus uelocitas ac densitas, calidioris cordis notæ sunt, audaciæq; ac uelocitas ad actiones obeundas impigra. Si uero amplior fuerit caliditas, excandescencia & furiosa temeritas. Est & thorax ipsis hirsutus, & maximè pectus, & præcordiorum partes thoraci uiciniores. Vt plurimum uero & totum corpus calidius fit ex calido corde, nisi hepar magnopere reluctetur. Sed & thoracis amplitudo, caliditatis signum est, nisi etiam hic magnopere cerebrum resistat.

*Frigidioris cordis notæ.*

*Cap. LXXVIII.*

Pulsus sunt moderatis minores, non tamen tardiores necessario, aut rariores. Timidi uero ex natura sunt tales, & socordes, ac minime audaces, & pectus pilis nudum habent.

*Siccioris cordis notæ.*

*Cap. LXXIX.*

Pulsus sunt duri, & animi concitationem non facilem, sed feram & ægre sedabilem tales habent. Et ferme totum corpus his siccus est, nisi hepar reluctetur.

*Humidioris cordis signa.*

*Cap. LXXX.*

Pulsus molles, & mores ad iram procliuēs, ac facile sedabiles. Et totum corpus humidius, nisi hepar resistat.

*Calidi ac siccis cordis signa.*

*Cap. LXXXI.*

Pulsus duri & magni, & ueloces ac densi, & respirationes magnæ ac ueloces & densæ. Et sane multo magis uelocitas ac densitas ipsarum augetur, si thorax ad proportionem cordis responderit. Hi omnium maximè pectore hirsuti sunt, & circa præcordia. Ad actiones uero expediti, & animosi, & tyrannidis moribus præditi, & celeres ad iram, ac pertinaces in ipsa.

*Calidi & humidi cordis notæ.*

*Cap. LXXXII.*

Si uero humiditas unâ cum caliditate dominetur, minus quidē prædictis hi hirsuti sunt, nihil uero minus ad actiones expediti. Verum non adeo ferus est ipsis animus, sed ad iram solam sunt procliuēs. Pulsus uero molles sunt & magni, & ueloces ac densi.

*Frigidi & humidi cordis notæ.*

*Cap. LXXXIII.*

Pulsus molles sunt. Mores minime audaces, ac timidi, & pigri. Sunt autem hi pectore pilis nudo, & minime furiosi fiunt. Nam neq; ad iram procliuēs sunt. De thorace ac toto corpore similiter uelut in superioribus distinguendum est.

*Frigidi ac siccis cordis notæ.*

*Cap. LXXXIII.*

Pulsus duri & puri: Hi omnium maximè ab ira alieni sunt. Coacti tamen ad irascendum, in ira perseverant. Sunt autem pectore omnino depiles.

*Hepatis calidioris notæ.*

*Cap. LXXXV.*

Venæ amplæ, flaua bilis copiosior. Tempore uigoris etiam nigra. Calidior est ipsis sanguis. Et propterea etiam totum corpus, nisi cor resistat. Præcordia & uenter hirsuta sunt.

*Frigidioris hepatis notæ.*

*Cap. LXXXVI.*

Angustia uenarum, pituita copiosior, & sanguis frigidior, & totius corporis habitus frigidior, nisi à corde calefiat. Præcordia & uenter his pilis nuda sunt.

*Siccioris hepatis signa.*

*Cap. LXXXVII.*

Sanguis crassus & paucus, uenæ duræ, & uniuersus

corporis habitus siccior.

*Humidioris hepatis signa.*

*Cap. LXXXVIII.*

Sanguis copiosior & humidior. Venæ molliores. Sic & totum corpus, nisi cor reluctetur.

*Calidi ac siccis hepatis signa.*

*Cap. LXXXIX.*

Præcordia hirsutissima. Sanguis crassior ac paucior. Amara bilis plurima. Iuxta uigorem etiā atra. Venarum amplitudo ac durities. Sic & totum corpus calidum ac siccum. Nam caliditas ex corde proficiens, frigiditatem ex hepate proficiscentem superare potest. Quemadmodum etiam frigiditas cordis, caliditatem hepatis superare potest. At siccitatem hepatis, cor humidius ad contrarium transmutare non potest. Quare manifestum est quod ubi amborum temperatura in idem concurrerint, totum corpus exacte iuxta illas afficitur.

*Calidi ac humidi hepatis notæ.*

*Cap. XC.*

Minus quidem quàm calidum ac siccum præcordia hirsuta facit. Verum plurimum sanguinem & uenas magnas habent tales. Et habitum humidum ac calidum, nisi cor resistat. Si uero amplius utriusque qualitatibus naturalem modum exceßerit, facile capitur morbis, putredinis ac mali succi, atq; hoc adhuc magis, si amplius aucta fuerit humiditas, paululum uero caliditas. Si uero ulceuerit, modicè aucta fuerit humiditas, plurimum uero caliditas, utriusque humores minime gignuntur.

*Frigidi & humidi hepatis notæ.*

*Cap. XCI.*

Depile habet præcordium, sanguinem uero operatur pituitosiorē, unâ cum uenarum angustia. Et corpus totum frigidius ac humidius, si non à corde ad contrarium transferatur.

*Frigidi ac siccis hepatis notæ.*

*Cap. XCII.*

Frigidum ac simul siccum hepar, corpus modici sanguinis, & angustarum uenarum facit, atq; frigidius. Præcordia uero pilis nuda talibus sunt, nisi & hic cor superarit.

*Testium temperamenti signa.*

*Cap. XCIII.*

Calidum testium temperamentum uenereum est, fecundumq; ac masculorum generatiuum. Et citò hirsutus facit genitales partes, & circumscissas moderatè. Frigidum uero uice uersa. Humidum autem multo & liquido semine abundat. Siccum uero pauco & moderatè crasso. At calidum & siccum, crassissimi seminis est ac fecundissimum. Et celerrime ad coitum stimulat animal statim ab initio. Tales etiam celerrimè hirsuti fiunt circa genitales partes, & omnes circumcirca sitas, sursum usq; ad umbilicum, deorsum usque ad media femora. Concitatum quidem igitur est tale temperamentum ad uenerem, uerum citissimè satiatur, & si cogatur læditur. Si uero humiditas ad caliditatem accedat, minus quidem hirsuti sunt hi, sed plus seminis habent. Non tamè magis alijs appetunt, sed multè ueneri minore detrimento sufficiunt. Si uero & humiditas & caliditas multum fuerint simul auctæ, ex ueneris abstinencia magis læduntur. At si testes humidi ac frigidi temperamento fuerint, partes circumcirca pilis nudæ sunt. Et tarde rem ueneriam agere incipiunt, & neque ad actionem procliuēs sunt. Aquosum autem & tenue est ipsis semen & infecundum ac foeminarum generatiuum. Siccum autem & frigidum temperamentum, prædicto quidem in reliquis simile est. Crassius est autè ipsis semen, & omnino modicum. Porro quicunq; totum



scrotum cum testiculis laxatum habet, & uelut exolutum, hi uiribus ut plurimum sunt debiliores. Qui uero contractum habent scrotum unà cum testibus, & uelut adstrictum, robustioribus uiribus ferme praediti sunt. Et huius rei signa sumi possunt ex omnibus quadrupedibus animantibus.

*Calidorum temperamentorum correctio. Cap. xciiii.*  
Quandoquidem in calidis intemperaturis biliosa spiritus fluitas redundat: considerare in his oportet, utrum subit ipsis bilis cum secessibus ac excrementis alui, aut ad supernum uentrem procedit. Si enim subit, nihil moliri oportet. Si uero ad supernum uentrem fertur, per uomitus euacuare à tepidæ aquæ potu. At si ægrè uomant, uinum dulce tepidæ aquæ permixtum bibendum dato, atque sic uomant. Exercendi autem sunt exercitio non ueloci ac concitato, sed tardiore ac molliore. Quidam uero ex uehementer calidis omnino non opus habent exercitijs. Sed sufficit ipsis debulatio, & balneum, inunctis oleo cum mollibus manibus. Hi etiam post cibum balneis gaudent, & alii qui ipsorum crassefacti sunt ob talem diætā. Vinum his conuenit aquosum, tenue & album. Nam fulua calida sunt, item ualde uetusta. Quare his ualde aduersantur. Attendendum est autem in omnibus qui post cibum lauātur, ne hepar affectum sit: Extremè enim læduntur tales, si post cibum lauentur. Qui uero cum siccitate calidi sunt, circa ætatis uigorem maxime opus habent humida diætā ex eduljs ac balneis, & concitatorum ac multorum exercitiorum abstinentia. Quare æstatis tempore citius lauentur, & post cibum rursus, nisi aliquod ex uisceribus affectum fuerit. Proderit his & frigida potus, si nihil impedierit. At siccioribus temperamenti ualde aduersatur uenus. Abstineant item ab ardore, lassitudinibus, uigilijs, curis, & omnibus motibus acutis. Biliosi uero ira perciti exardescunt, & in acutas febres incidunt. Verum excessus quantitatem considerare oportet, & pro portione aucti caloris, augere etiam frigefacientem ac humectantem uictus rationem.

*Frigidi intemperamenti medela. Cap. xc v.*  
Quicumque frigidioris natura sunt, circa siccum uero temperamentum ac humidum moderatè se habent, minus uiciosi sunt ad corporis robur ac sanitatē. Excitare igitur oportet ac corroborare ipsorum caliditatem. In humiditate uero ac siccitate totius diætæ medium eligere.

*Humidi intemperamenti correctio. Cap. xcvi.*  
Humidæ naturæ in puerili ætate fluidis & plenitudinis morbis corripuntur, & insuper putredinosis. Opus igitur habent pluribus exercitijs, & exacta in uentre concoctione. Nam cibi qui in hoc corrumpuntur, putredinosorum morborum materia fiunt toti corpori. Quapropter ante cibum hi loti, & naturalibus calidis aquis utentes, magnam opem sentiunt. Scopus enim in ipsis est ipsas corporis partes humidas seruare. Atque hoc commune est omni temperamento. Nam contrarium, ipsa inquam siccitas, omnium animalium corpora citius ad senectā perducit. Quare

si quidem possibile esset semper cōseruare humidum temperamentum corporis, uerus profectò esset philosophiæ Philippi sermo, qui obedientem ipsi immortalē fore promissit. proinde diutissime uixerit, qui minime resiccatur. Quum autem humida diætā superfluitates & humorum multitudinē generet, difficile est congruam tenere proportionē, ut neque morbis corripiantur, neque citò senescant. Quantum igitur ad temperamenū attinet, qui humidissimi sunt, diutissime uiuunt. Et sanè etiam plus alijs sani sunt, ubi corpus fuerit corroboratum: quemadmodum etiā robustissimi sunt omnium eandē ætatem habentium, usque ad extremam senectutem. Et propterea laudatur hoc temperamentum ab omnibus serè medicis ac philosophis, qui corporis elementa exactè cognouerunt. Et quidam solum hoc naturale esse putauerunt. Melius enim alijs progressu temporis euadit, quum ab initio sit deterius. Quare qui tali corpori corrigendo præfectus est, ea quæ desunt ipsi providere debet, per exercitia ante cibum fientia, & balnea ac cibos idoneos: & per plures excretiones tum per urinas, tum per uentrem contingentes. Nihil autē uetat & apophlegmatismis pituitam à capite trahentibus uti, & purgationibus tempestiuis: & præ omnibus, eduljs boni succi, & uini urinam proritantis potu.

*Sicci intemperamenti medela. Cap. xc vii.*  
Balneum siccis corporis temperaturis omnibus commodissimum est. Temperata autem sit & dulcissima aqua. Et si bis aut ter in die lauentur, magis conferet. Sed & uniuersa diætā humectans sit. A lassitudine uero & curis ac uigilijs abstinentum est.

*Calidi ac sicci intemperamenti curatio. Cap. xc viii.*  
Calidum ac siccum temperamentum uarijs curationibus subiaceret. Non tamen iniucundus est similiter frigefaciendum usus. Nam iuxta siccas dispositiones necessarium est, non solum uicinas uentri partes, sed etiam totum corpus gracilius fieri.

*Humidi ac calidi intemperamenti medela. Cap. xc ix.*  
Quod si humida intemperatura est cum caliditate, adstringentium eduliorum usus utilis est. Sunt autem hæc austera citra caliditatem. Et sanè etiam frigidus potus ipsis commodus est.

*Humidi ac frigidi intemperamenti sanatio. Cap. c.*  
Humidi uero cum frigiditate temperamentum, optimæ medelæ sunt omnia acria ac calida. Misceantur autem ipsis etiam acerbæ, citra manifestam frigiditatē. Optima item medela est his modicus potus. Sit autem uinum calidum fortiter & adstringens, ac ualde uetustum. His uero etiam ea quæ forinsecus adhibentur proportionē respondeant.

*Frigidi ac humidi intemperamenti curatio, frigiditate predominante. Cap. ci.*  
At si frigiditas humiditatem superauerit, uiciosæ fiunt tales temperaturæ, & hæ maxime fluidis morbis corripuntur. Prodest autem ipsis illuuijs, & exercitia pura, & ratio uictus attenuans, & ungenta moderatè calefacientia.



## INDEX EORVM QVAE IN

## QVINTO SERMONE AETII

## CONTINENTVR.

\*

- Q**uod oportet medicū naturæ operum gnarum esse. Cap. I.  
 Quod citra prænotionem morbi, fieri nequit ut probe cures. cap. II.  
 Quæ sint bona signa. cap. III.  
 Quæ sint mala signa. cap. IIII.  
 Quæ prima dies totius morbi dicenda sit. cap. V.  
 Principium morborum trifariam dici cap. VI.  
 Quid est febris. cap. VII.  
 Quid est exacerbatio. cap. VIII.  
 Quid est remissio. cap. IX.  
 Remissionem dupliciter dici. cap. X.  
 Quod est principium febrilis accessio- nis. cap. XI.  
 Augmenti particularis exacerbationis signa. cap. XII.  
 Vigoris particularis exacerbationis si- gna. cap. XIII.  
 Declinationis particularis exacerba- tionis signa. cap. XIII.  
 Quod est principium totius morbi. cap. XV.  
 Quod sit augmentum totius morbi. cap. XVI.  
 Vigoris totius morbi cognitio. cap. XVII.  
 Declinationis totius morbi cognitio. cap. XVIII.  
 Quod declinatio totius morbi in iudica- tionibus confertim fientibus, sensum nostrum aufugit. cap. XIX.  
 Quod seruandus aeger quatuor tempo- ra totius morbi pertransit. cap. XX.  
 Vtrum tardius aut citius morbus iudi- cetur. cap. XXI.  
 Quomodo prænoscere oportet, an iudi- cabitur morbus, aut non, & quan- do. cap. XXII.  
 Futuræ iā iudicationis signa. ca. XXIII.  
 Quomodo prænoscere oportet, bo- na'ne an mala iudicatio futura sit. cap. XXIII.  
 Qui sint boni iudicatorij dies & qui ma- li. cap. XXV.  
 In quibus ambigua est dies principij morbi, & nulla præiudicatiua facta, derepente contigit iudicatio, quo- modo ambigua inuenire oportet. cap. XXVI.  
 De notis ex pulsibus. cap. XXVII.  
 De urinarum notis, & primum quæ sit naturalis. cap. XXVIII.  
 Qualis urina optima in ægrotis. cap. XXIX.  
 Quod non omnis alba subsidentia bo- num significat. cap. XXX.  
 Quid indicet tenuis & pallida urina. cap. XXXI.  
 Quid indicet tenuis & fulua. cap. XXXII.  
 Quid indicet rufa urina. cap. XXXIII.  
 Vrina tenuis micta, & postea turbata. cap. XXXIIII.  
 Vrina crassa micta, & crassa manens. cap. XXXV.  
 Vrina crassa micta, & postea desidens. cap. XXXVI.  
 Vrina tenuis micta, & talis manens. cap. XXXVII.  
 Differentiæ urinarum oleosarum, & quid significant. cap. XXXVIII.  
 Quid significant eruiæ subsidentia. cap. XXXIX.  
 Quid indicent furfuracea subsidentia. cap. XL.  
 Quid indicent laminea subsidentia. cap. XLI.  
 Quid indicet polentaceum in urinis. cap. XLII.  
 Quid indicet graueolens urina. cap. XLIII.  
 Vrina nigra quid significet. cap. XLIII.  
 De egestionum notis. cap. XLV.  
 De egestionibus iudicatorijs. ca. XLVI.  
 De uomitus prænotione ac significatio- ne. cap. XLVII.  
 De eruptionis sanguinis ex narib. præ- notatione ac significatiõe. ca. XLVIII.  
 Quod & per hæmorrhoidas, & mulie- bres purgationes sepe soluitur mor- bus. cap. XLIX.  
 De significatione ex sudoribus. cap. L.  
 Abscessuum signa iudicatoria. cap. LI.  
 De sputorum significatione. cap. LII.  
 Signa perfecte ac fideliter soluti morbi. cap. LIII.  
 Signa morbi non perfecte soluti. cap. LIII.  
 Prænotio diei qua moriturus est aeger. cap. LV.  
 Quod etiā horā mortis ægri prænosce- re possit doctus Medicus. cap. LVI.  
 In acutis morbis mortem non esse præ- dicendam. cap. LVII.  
 Februm diuisio, & de diarijs febribus cap. LVIII.  
 De diarijs ex lassitudine febribus. cap. LIX.  
 De febrientibus ex uigilijs, & cura, aut tristitia, aut ira. cap. LX.  
 De febrientibus ex ardore. cap. LXI.  
 De febrientibus ex frigore. cap. LXII.  
 De febrientibus ex grauedine & destil- latione. cap. LXIII.  
 De febribus ex cutis densitate. cap. LXIII.  
 De febribus ex fame. cap. LXV.  
 Dieta communis omnium diariarum fe- brium. cap. LXVI.  
 De febrientibus ex inguinis inflamma- tione. cap. LXVII.  
 De diarijs febribus ex cruditate obortis. cap. LXVIII.  
 Curatio diariarum febrium multarum dierum, quarum aliquæ ex mutatio- ne diariarū generantur, ob cutis ob- turationem. cap. LXIX.  
 De febribus continentibus, siue syno- chis. cap. LXX.  
 De uenæ sectione. cap. LXXI.  
 De frigida aquæ exhibitioe. ca. LXXII.  
 Dieta in febribus continentibus. cap. LXXIII.  
 Vniuersalis doctrina de febribus putre- dinosis. cap. LXXIIII.  
 De febribus putridis. cap. LXXV.  
 Communis dieta omnium febrium putri- darum. cap. LXXVI.  
 De febribus continuis. cap. LXXVII.  
 Cura febris ardētis. Philū. ca. LXXVIII.  
 Tertianæ exquisitæ dinotio. cap. LXXIX.  
 Tertianæ exquisitæ curatio. ca. LXXX.  
 Tertianæ spurie curatio. cap. LXXXI.  
 De hemitritæo, hoc est, semitertiana. cap. LXXXII.  
 Quartanæ exquisitæ dinotio. cap. LXXXIII.  
 Quartanæ curatio. cap. LXXXIIII.  
 Quotidiana febris dinotio. ca. LXXXV.  
 Quotidiana febris curatio. ca. LXXXVI.  
 De Epialis febribus. cap. LXXXVII.  
 Communia auxilia febrium per circui- tum repetentium. cap. LXXXVIII.  
 De ignis sacri circa uiscera affectioni- bus. cap. LXXXIX.  
 De colliquatione. cap. XC.  
 De febribus quæ in calidis ac siccis tēpe- raturis fiunt, citra inflammationem ac putrefactionem. cap. XCI.  
 De febribus hecticis ac tabidis. ca. XCII.  
 Hecticarum febriū curatio. cap. XCIII.  
 De popularibus passim uagantibus, & pestilentibus morbis. cap. XCIIII.  
 De peste Ruffi. cap. XCV.  
 De his qui ob crudorū humorū multitu- dinē, animo linguuntur. cap. XCVI.  
 De his qui animo concidunt, ob flauā bi- lem os uentris ledentē. cap. XCVII.  
 De his qui ob tenues humores animo concidunt. cap. XCVIII.  
 De alijs animi deliquij causis. cap. XCIX.  
 De dolore animi deliquium inducente. cap. k 3



|                                                                                                                          |    |                                                                  |          |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| cap.                                                                                                                     | c. | aut malignam febrem.                                             | cap. CX. | Lumborum doloris curatio. ca. CXXVI.                                  |
| De animi deliquio propriè dicto. ca. CI                                                                                  |    | De animi deliquio ob siccitatē. ca. CXI                          |          | Vlcerationis circa os sacrum in febribus curatio. cap. CXXVII.        |
| De his qui ob uentris profluuium, aut sanguinis eruptionem, aut immodici sudoris euacuationem animo linquntur. cap. CII. |    | De animi deliquio ob principalis membri obturationem. cap. CXII. |          | Vlcerationis circa scrotum & anum, in febribus curatio. cap. CXXVIII. |
| De his qui ob humorum copiam, animo linquntur. cap. CIII.                                                                |    | De animi deliquio ob repentinam euacuationem. cap. CXIII.        |          | Pustularum in febribus curatio. cap. CXXIX.                           |
| De his qui ob quandā uteri affectionē animo linquntur. cap. CIIII.                                                       |    | De animi deliquio propter affectus. cap. CXIIII.                 |          | De tremoribus in febribus. cap. CXXX.                                 |
| Ad eos qui ob stomachi debilitatē, animo linquntur. cap. CV.                                                             |    | De capitis dolore in febribus. ca. CXV.                          |          | De cōuulsōibus in febribus. cap. CXXXI.                               |
| De his qui ob uitiosos humores, os uentris rodentes, animo linquntur. cap. CVI.                                          |    | De uigilijs in febribus. cap. CXVI.                              |          | De iucundis ac commodis potionibus in febribus. cap. CXXXII.          |
| De his qui ob pituitā in stomacho collectam animo linquntur. cap. CVII.                                                  |    | De graui sapore. cap. CXVII.                                     |          | De potione pharmaci ex capitibus pauperis. cap. CXXXIII.              |
| De animi deliquio ob fortem frigiditatem. cap. CVIII.                                                                    |    | Quomodo linguae asperitas in febribus curanda sit. cap. CXVIII.  |          | Omphacomelitis preparatio. cap. CXXXIIII.                             |
| De animi deliquio, ob multam caliditatem. cap. CIX.                                                                      |    | Quomodo sitis curanda sit. cap. CXIX.                            |          | Mellis rosacei preparatio. ca. CXXXV.                                 |
| De animi deliquio, ob inflammationem,                                                                                    |    | De aurium dolore in febribus. ca. CXX.                           |          | Hydrosatis preparatio. ca. CXXXVI.                                    |
|                                                                                                                          |    | Auris suppurata curatio. cap. CXXI.                              |          | Apomelitis preparatio. ca. CXXXVII.                                   |
|                                                                                                                          |    | De lippitudine in febribus. ca. CXXII.                           |          | Hydromeli & Crustuminati preparatio. cap. CXXXVIII.                   |
|                                                                                                                          |    | De oculorum obscuratōe. ca. CXXIII.                              |          | Cydonati preparatio. cap. CXXXIX.                                     |
|                                                                                                                          |    | Fluxus sanguinis narium in febribus curatio. cap. CXXIIII.       |          | Aceti mulsi preparatio. cap. CXL.                                     |
|                                                                                                                          |    | Vesicae & urinae difficultatis in febribus curatio. cap. CXXV.   |          |                                                                       |

# AETII MEDICI

## GRAECI CONTRACTAE

### MEDICINAE TETRABIBLI SECVNDAE SERMO PRIMVS, ET EX ORDINE QVINTVS.

#### DE FEBRIVM COGNITIONE AC CVRATIONE.



**S**ALVBRIS diætæ præcepta ad conseruandam sanitatem cōmoda ac necessaria, iā antea præscripta sunt. didicisti itaque ex ipsis, qualis & cuiusmodi diætæ usu, tum ipse quantum eius fieri posset, maximè sanus esses, tum tuæ curæ commissis singulis cōuenientem sanitatem conseruares. Quandoquidem uero clām nobis ipsis sæpe contingit, ut negligentiore diætā utamur, aut ut propter aliquas actionum circumstantias, aut ob ambientis nos aeris uiolentiam, læsi aliquando morboris structuris acutarum aut diuturnarum affectionum corripiamur. Præstat etiam de ipsis morbis tractare, & ab uniuersalibus febrilium morborum notis auspicari, tum quod hi magis abundāt omnibus ætatibus communes, tum quod nō periculo uacant, turbantq; ac tumultum repentinum inducunt, ob symptomatum accidentium copiam.

Quod oportet Medicum naturæ operum gnarum esse. Cap. I.

Quare circa prognosticum Hippocratis & alios eiusdem libros, Medicum exercitatū esse oportet, & naturæ opera nosse. Naturæ enim sunt morborum medici. Adiuuare igitur naturam oportet ad salutē decertāti aduersus morbum. Sic enim natura, ubi Medicum ea quæ oportet facientem auxiliariū accipit, & ipsum ægrotum obedientem, & nihil in diætā delinquentem, morbum facile superarit. Oportet autem cooperari etiam ministros, & extrinseca, quo nihil his quæ rectè fiunt resistat.

Quod citra prænotionem morbi fieri nequit ut probe cures. Cap. II.

Propositum est autem nobis partem eam quæ de signis ac notis morborum tractat, prius exponere. Nam citra hoc ut prænoscas in quid desinet morbus, fieri nō potest ut modus diætæ tibi probe suppetat: & præsertim in acutis, & citum periculum inducentibus morbis.

Quæ sint bona signa. Cap. III.

Facies bonis signis prædita, poteris enim uel ex sola facie cōstantē ac firmam prænotionē sumere, priusquā ægrum contingas: dico autē ex sensibus in ipsa, uisu, auditu, olfactu. Et ad hæc ex respiratione, sine qua uiuere non datur, & quæ indicat nobis dispositionem cordis. Adest autē & loquendi instrumentū in facie, ipsa lingua, quæ ostēdit nobis rationalis animæ partibus robur ac debilitatē. Bonū signū est & decubitus decorus, prout maximè consuevit etiā in sanitate se facile conuertere. Bonum signū est & totū corpus ad portandū facile esse, & æqualiter ac leniter calidum, & sitis quantū eius fieri potest exors. Item sanā esse mentē, & bene se habere ad ea quæ offeruntur. Bonū signū est facilis spiratio, & ordinatus pulsuum motus. Ex his enim & quæ adhuc referentur, cognoscemus tū robur, tum debilitatē, trium animæ actionū. Nam sanam esse mentē, & nō defluere corpus in decubitu ad pedes, cerebrū per omnia sanū esse indicat. Faciei uero floriditas, & facilis spiratio, & pulsus ordinatus, cor sanum esse arguunt. Quandoque enim florida sit facies cum difficili spiratione, uelut in peripneumoniacis fieri solēt. Ac sitis exortē esse, & bene se



se habere ad ea quæ offeruntur, naturalem facultatem in hepate & toto corpore sanam esse indicat. Bonum signum sunt & somni boni, & sudores per totum corpus temperati & æquales ac moderati, & oportuno tempore apparentes. Bonum item signum est præcordia doloris expertia ac mollia esse. Et ad hæc secessus alui & urinarum ac sputorū expeditos esse, & bona concoctionis signa.

*Quæ sint mala signa.*

Cap. IIII.

Totius faciei ac temporū collapsio, oculi fixi ac caui, lacrymæ inuoluntariæ, & alba oculorum in somnis apparentia, si non aduersus fuit sic dormire, & defluere corpus ad pedes, & præter morem pronū iacere, dentibus frendere, totū corpus inæqualiter calferi ac frigidari, & ad portandū difficile esse. Item sitis intolerabilis, & ardor internarū partium externis frigidis existentibus, excessus mentis & uelut delirium quoddam aut stupiditas, sopor profundior, auersio totius appetitus. Frigiditas oborians ex inflammatione thoracis ac costarū, difficulter spirare, & frigidum respirare, & foras multū expirare, intrā uero parum inspirare: hoc enim iam futurā cordis mortificationē indicat, quemadmodum etiam pulsus interceptum esse, aut malè ferire. Facilem enim spirationē inquit Hippocrates, putare oportet ualde magnā uim habere ad salutē, in omnibus acutis morbis, qui cū febre fiunt, & in quatuordecim diebus iudicantur. Malum signum sunt & uigiliæ cōcomitantes, aut etiam somni fientes quidē, uerum turbati. Sudores frigidi & inæquales, & non per totum corpus, & aliquando milij figuram præ se ferentes ac uiscosi. Frigiditatem enim fortem hæc indicant. Et non in debito tempore apparere sudores malū est, & sudores statim febrem sequi. Item suppressio retrimentorū alui, & maxime uelicæ, & aliarum excretionum. Imò etiam si hæc procedant, & alicuius perniciosi notas ferāt: & præsertim urinæ graueolentes ac crassæ & nigræ: Tales enim in acutis ac malignis morbis omnino periculū significant. Præcordiorum distētio, & principalium partium inflammationes maximæ, cerebri inquam ac cordis & pulmonis, & membranæ costas succingentis, hepatisq; ac uentris: ubi enim aliquis ex talibus morbis adest, ualde mala signa apparentia periculosa sunt. Oportet autem uniuscuiusque signi uim perdiscere. Vnum enim aliquando signum forte ac fidum, plura signa infida ac debilia uincit.

*Quæ prima dies totius morbi dicenda est.*

Cap. v.

Principium totius morbi dicere oportet, illud tempus quando homo febre inceptit adeò manifestè, ut continuitatem corporis sibi solutā esse putet, & non amplius in publicū prodire ualet, & consueta uitæ munia obire, & propterea decubitu opus habuit. Non enim idē est displicentiā habere & febrē. Qui enim caput dolet, aut displicentiā habet, & corpore grauat, potest ferè in principijs consueta facere, donec præualens ipsi morbus uires eius deiciat.

*Principium morborum trifariam dici.*

Cap. vi.

Principium propriè dicitur impartibilis illa ac indiuisibilis primi morbi impetus inuasio, in qua uictus homo decubuit. Principium etiam dicitur quod per dilatationē nominant, quod usq; ad tertium diē extenditur. Principium quoq; dicitur proprium ac necessarium, quod uelut partem totius morbi, principium nominamus: quod sanè non dierum numero

cognoscitur, sed exacerbationum qualitate, & concomitantium accidentium lenitate. Nam in augmento & morborum & symptomatum accidentium incrementum fit. Exacerbationes enim anticipant, & longius extenduntur in augmento, & symptomata grauiora fiunt. Principium igitur totius morbi dicitur, donec apparuerint manifesta & bona concoctionis signa. Si quidem igitur principium brevis temporis fuerit, morbum uelociter soluendum ostendit, uelut etiā Hippocrati uidetur. In pleuriticis inquit, si sputum statim appareat, in principio quidem brevis fit: Si uero posterius appareat, prolongatur: morbus ipse uidelicet. Qua igitur die apparuerint in superfluitatibus quæ excernuntur manifestæ concoctionis signa, in ea dicimus principium totius morbi cessasse, & incipere ipsum augmentum. Concoctionis enim signa nunquam malè apparent.

*Quid est febris.*

Cap. vii.

Febris est calor præter naturā, cordis & articularū, uitalem firmitatem ledens, ex profundo emergens, & acris ac mordax ad tactum allabens, præsertim circa thoracem, & ubi arteriæ magnæ sitæ sunt. Verū ad talem calorem inæqualitas quædam & inordinatus motus pulsibus accedit iuxta ipsam febris speciem.

*Quid est exacerbatio.*

Cap. viii.

Exacerbatio, quam paroxysmū Græci uocant, est motus morbi particularis, à remissione ad deterius. Particularis autem motus dictus est, ad discretionē uniuersalis morborum augmenti.

*Quid est remissio.*

Cap. ix.

Remissio est particularis exacerbationis temporaria quies symptomatum corpori coincidentium.

*Remissionem dupliciter dici, comprehenditur enim & interuallum.*

Cap. x.

Ex remissionibus ea quæ sincera est, cognoscitur ex quiete concomitantium ad exacerbationē symptomatum circumscripta. Et propterea dicitur Interuallū, quemadmodum in his qui per circuitum quendam exacerbant, uelut tertiana, quartana, quotidiana, capitis dolor, morbus comitialis, podagra, & cōsimiles. Quæ uero insincera est & non pura, depræhenditur ex symptomatum diminutione, quemadmodum in continuis maximè febribus contingit. Nam in his ante absolutam morbi solutionē, non contingit pura remissio: Declinationem enim prioris posterior exacerbatio excipit.

*Quod est principium febrilis accessionis.*

Cap. xi.

Principium febrilis exacerbationis, sermè est cōtractio extremarum partium omnium, & maximè nasi. Et quandoq; etiā frigiditas totius corporis. Et aliquando tussicula parū irritans, unā cū frigiditate irruens. Item oscitatio & partium corporis extētio, aut nausea, aut uomitus, aut animi deliquium. Et capitis dolor, aut alterius cuiusdam partis, & in profundum somnum delatio. Pulsus insuper paruus & contractus, tardè feriens ac relidens: Et symptomatum ad præsentem morbum concomitantium irritatio.

*Augmēti particularis exacerbationis signa.*

Cap. xii.

Iuxta augmentum exacerbationis, aliorum quidē accidentium incrementum & unio accedit, contractio uero & frigiditas cessant. Et pulsus inæqualis emicat. Et corpus calefit quidem, uerum non exactè.

*Vigoris particularis exacerbationis signa.*

Cap. xiii.

Iuxta uigorem exacerbationis, calor æqualiter diffunditur,



ditur, & particulatim distribuitur, per totū corpus. Et pulsus totam augmenti magnitudinem accipientes, ad subiectæ materiæ proportionem extenduntur, itemq; reliqua exacerbationis accidentia. Tunc uero iam tempus est ægroto potum dare.

*Declinationis particularis exacerbationis signa.*

Cap. xiiii.

Declinatio est ubi incipiunt aliqua, aut omnia prædicta accidentia minui. Et pulsus ad ordinatum quodāmodo motum deueniunt. Aliquando uero & humores exudant. Et calor nimirum contabescit. Quandoq; etiam somni boni concurrunt, si longum tempus inter accessiones futurum est, uelut in puris remissionibus fieri solet. Contingit enim in quibusdā morbis, ut exacerbatio posterior prioris declinationem excipiat, uelut in febribus continuis apparet.

*Quod est principium totius morbi.*

Cap. xv.

Iam antea dictum est, quod principium totius morbi illud tempus didimus, quando per morbi uolentiam uires hominis uictæ, principium decubitus factæ sunt.

*Quod sit augmentum totius morbi.*

Cap. xvi.

Augmentum totius morbi est, quum exacerbationes consuetam horam anteuenterint, & longiores ac maligniores, & cum pluribus ac grauioribus accidentibus factæ fuerint.

*Vigor totius morbi cognitio.*

Cap. xvii.

Quum exacerbationes statim acceperint, & similiter per omnia consequenter contigerint, & concomitantia symptomata neq; detraxerint, neque addiderint, tunc iam in uigore esse morbus dicatur. Vigor enim uehementior morbi totius pars est, quādo etiam bonæ iudicationes uel maxime fieri solent.

*Declinationis totius morbi dinotio.*

Cap. xviii.

In declinatione totius morbi, contraria augmento fiunt. Remoratur enim exacerbatio consuetæ horæ impetum, & modico tempore occupat. Et symptomata leniora ac simpliciora fiunt, & bona tolerantia ac remissio adest per omnia.

*Quod declinatio totius morbi in iudicationibus confertim fientibus, sensum nostrum effugit.*

Cap. xix.

Quicumque morbi in uigore confertim iudicantur, & perfectam solutionem recipiunt, eorum declinatio difficulter compræhendi potest, ut neq; sensui manifesta fiat. Imò neq; commodum est de ipsa inquirere. Satis enim est cognoscere quod morbus fideliter, secure, ac perfecte solutus est.

*Quod seruandus æger quatuor totius morbi tempora pertransit.*

Cap. xx.

Si quidem igitur sine periculo fuerit morbus, acutèq; moueatur, & ad hæc bona & commoda signa affuerint ægroto, quatuor morbi tempora citò pertransit, & manifestum est quod etiā seruabitur. Si uero his contraria affuerint, ante uigorem plerumq; morietur.

*Vtrum tardius aut citius morbus iudicatur.*

Cap. xxi.

Tardiusne an citius iudicabitur morbus, ex morbi magnitudine, & motus uehementia, manifestum fit. Nam magni morbi citò mouentur. Quod uero citò mouetur, etiā citò iudicatur.

*Quomodo prænoscere oportet, an iudicabitur morbus, aut non, et quando.*

Cap. xxii.

Magni morbi qui & citò & uehementer mouentur, omnino iudicantur. Parui uero & obscuriores, & qui debiliter mouentur, si diuturni sunt, soluuntur tan-

tum paulatim citra iudicationem. Raro uero & ad abscessum tales procedunt. Tertia enim etiāsi intermittat, tamen quia citò & uehementer mouetur, iudicatur. Quartana uero, quia diuturna est, paulatim ferè soluitur. Item omnes qui pigrius mouentur. Naturam itaq; morbi inspicere oportet, an biliosus sit, aut pituitosus, aut atrabiliarius. Deinde anni tempus, & ægroti etatem, & temperamentum, ac studium, & prægressam uictus rationem. Imò & regionem, & statum ambientis nos aëris. Postea uero considerare exacerbationum circuitus, uelut antea dictum est; & an intermittant, siue non, uelut in continuis ac continetibus febribus uidere datur. Si enim festinauerint, & semper anticipauerint conuenientem horam, & uehementiores facti fuerint, & per tertiam occurrerint, breui iudicatione futuram indicant. Si uero pigre moueantur, & eadem hora irruerint, & quotidie contigerint, tardam fore iudicationem significant. Considerandæ insuper sunt & superfluitatum concoctiones, an bonæ sint, & an in diebus indicatiuis fiant, uiribus robustis. Si enim morbus statim ab initio ostenderit omnia signa extra periculum, in primo quaternario iudicationem promittit. Si uero in quarta præsignificarit, septimam non transgreditur. Leuissimæ enim febres & in signis securissimis fientes, quarta die quiescunt, aut citius, inquit Hippocrates. Maligniores uero & in signis grauissimis fientes, quarta die occidunt, aut etiam citius.

*Futura iam iudicationis signa.*

Cap. xxiii.

Ubi iam affutura est iudicatio, non parua turbatio in ægri corpore præcedit, & præsertim in nocte iudicatoriam exacerbatione præcedente. Quibus enim iudicatio futura est, his nox grauis est ante exacerbationem, inquit Hippocrates. Grauitates enim & uigiliæ, & deliria, & graues sopores, & spirandi difficultates, & uertigines, & sensus obtusi, & dolores capitis, colli, stomachi, ac multarum aliarum partium adsunt. In quibusdam uero aurium sonitus. Et splendores oculis obuersantur. Et lacrymæ inuitæ fluunt. Et urina supprimitur, & labium concutitur, & alia quæcunq; pars tremula efficitur. Et contingit obliuio ac ignorantia præsentium. Et uehemens rigor aliquando incidit, aut ardor antea non factus, & in summa exacerbatio ante solitam horam irrumpit. Et multus sopor ac sitis intolerabilis sequitur, & uociferantur ac exiliunt uelut consternati. Et decubitus figuram seruare non possunt. Et timor impendit uidentibus. Ac imperitus medicus uidens symptomatum accidentium tempestatem perturbatur, & cum familiaribus ægri calamitatem deplorat, & per condolentiam occultat imperitiam. Verum generosi medici est non turbari, neque ignorare quod euenturum est: sed ex præsentibus prænoscere, non solum quod iudicatio futura est, sed etiam qualis futura est.

*Quomodo prænoscere oportet bonane an mala iudicatio futura sit.*

Cap. xxiiii.

Optimam iudicationem, quam etiam solam simpliciter iudicationem nominamus, non per coniecturam, uelut alias, sed constanter quis prænoscere poterit. Omnia enim signa in talibus morbis statim a principio citra periculum apparent. Quemadmodum rursus in morituris, ut plurimum ab initio omnia mala apparent. Primum omnium igitur considerare oportet ægri



ægri vires. Deinde concoctiones ex urinis ac fecibus & sputis. Nullū enim unquā perire uidimus, ex his qui ob præostensam bonā concoctionem iudicati sunt. Tertio quod in uigore & totius morbi, & particularis exacerbationis, & in die testabili iudicatio contingit. Consequenter autem & speciem morbi, & mores. Speciem dico, tertianam, aut quartanam, aut quotidianam, aut aliquam aliam. Mores autē, an sint moderati & leues, aut mali ac maligni. Et mores præcipuè indicabunt tibi, an seruetur, an morietur. Et in affectionibus quidem thoracis ac pulmonis attendere oportet sputis, neque uero urinarum inspectio negligenda est. Considerandæ uero sunt etiam egestiones. At in febrientibus absque inflammatione alicuius uisceris, urinis maximè mentem attendere oportet. Ceterum in pernicioso morbo primum ac maximum signum est futuræ mortis citra iudicationem extrema uirium debilitas: Non enim excitantur ad pugnam. Secundum si nullum omnino fuerit ac ne minimum quidem concoctionis signum. Imò etiam si præmanifesta fuerit iudicatoria dies, futuram iudicationem simul præmanifestat, & malam fore indicat. Ad hæc uidendum est an magnus sit ac malignus morbus, nō tamen citò moueatur. Magnum autem dico peripneumoniam pulmonis abscessum, semitertianam, febrem ardentem, & consimiles. Velut uerbi causa, contingat ut uideatur in quarta die primum in urinis nubecula nigra, aut simile quiddam in medio ipsarum pendens, aut subsistentia nigra. Sint autem & omnia accidentia perniciofa, morietur quidem talis homo. Verum si quidem celeriter moueatur morbus, in sexta; si uero tardè, in septima.

*Qui sint boni iudicatorij dies, & qui mali.*

Cap. xxv.

Septima ab initio morbi dies omnium maximè semper perfecte soluit ac fideliter, & bene ac citra periculum, & manifestè ac signanter. Septimæ uero fidem decimaquarta maximè imitatur. Propinqua autem ipsis est nona & undecima. Et huic propinqua est decima septima, & quinta. Post has quarta. Et post hanc tertia, & uicesima. Sexta uero sæpe quidem iudicat, uerum plures iudicationes malas, aut etiam letales inducit, aut certè non perfectas neque fideles. Reuertuntur enim morbi qui in sexta die iudicantur, etiam si soluti esse putentur. Si uero etiam perfecta iudicatio, id quod rarum est in sexta, contingat, tamen cum periculosis ac grauibz accidentibus contingit. Proinde sextæ naturam nulla alia dies imitata est. Si uero aliquando in octauam diem aut decimam solutio morbi aceruata exciderit, assimilatur quodammodo ei quæ sit in sexta: Raro enim in his morbus soluitur, & neque fideliter, neque bene neque perfecte: sed & obscure ac minimè signanter. At medio quodā modo inter primas bonas rellatas, & inter postea malas, tertiadecima locata est, neque similiter reprobanda uelut mala, neque tamen similis bonis existens. Quod si bona iudicatio futura est, oportet omnia prius iudicata esse, in urinis præsertim, imò etiam in alijs signis. Tertia igitur & quarta ac quinta dies statim ab initio præiudicantur. Quarta uero septimam præiudicat, & septima undecimam. Undecima uero decimaquartā. Decimaquarta decimam septimam, decima septima uige-

simam. Terminus porro acutorum morborum est decimaquarta. Quare si hanc transgressus fuerit morbus, ab acutis excidit.

*In quibus ambigua est dies principij morbi, & nulla præiudicatoria facta de repente contigit iudicatio, quomodo ambigua inuenire oportet.*

Cap. xxvi.

In quibus nulla præiudicatoria die facta, de repente contigit iudicatio, & in quibus nō exactè cognoscimus principium morbi, in his respicienda sunt signa, & ambiguum reperietur, si ad exacerbationum proportionem, & ad dierum naturam, mentem aduerterimus. Si enim imparibus diebus facta fuerit exacerbatio in intermittentibus, aut seipsa uehementior facta fuerit in continuis febribus, æstima præsentem iudicationem imparis diei propriam esse. Si uero in paribus exacerbetur, illarum proprie iudicatio erit. Nam ad uehementiores exacerbationes omnino sequuntur iudicationes. Cæterum ad ipsam dierum naturam sic animum aduertere oportet: si ambiguum sit utrū nonæ aut decimæ diei iudicatio sit. Si enim accidentia omnia mitiora fuerint, & citra periculum ac bona facta fuerit iudicatio, & consequuta fuerit ad iudicationem bona tolerantia, nonam potius esse iudicatoriam diem dicere oportet. Si uero periculosa & mala facta fuerit iudicatio, & cum grauibz accidentibus, & grauis tolerantia post iudicationem sequatur, decimam diem magis iudicatoriam fuisse dicendum est.

*De notis ex pulsibus.*

Cap. xxvii.

Quum iam expectatur iudicatio, ante omnia pulsus tangere oportet. Nam altus pulsus, quemadmodum etiam uehemens, omnis bonæ iudicationis nota est, & constat signum iam adesse morbi iudicationem. Si uero uehementer ac fortiter ferit digitos, & cum hoc etiam magnus fuerit, & ad distentionem magis quàm ad contractionem festinarit, motus externi potius signum est. Externum autem motum dico, sanguinis eruptionem ac sudores. Internum uero, uentris exturbationem ac uomitus. Si quidē igitur magnus fuerit pulsus, & undosus, & simul mollescat, unā cum hoc quod etiam ipsum arteriæ corpus humectum est, & ad distentionem magis festinat: per sudorem futuram iudicationem sperare oportet. Si uero magnus simpliciter fuerit ac uehemens, & magis ad distentionem quàm ad contractionem festinarit, sanguinis eruptionem per nares fore significat, ubi uidelicet simul testimonium præbuerint signa in sanguinis eruptione referenda. Si uero uehemens quidē fuerit, non autem magnus, & durior seipso factus fuerit ac inæqualis, & ad contractionem magis festinarit, inclinatione iam ad intestina facta, per uentrem iudicationem facturam expectare oportet.

*De urinarum notis, & primum quæ sit naturalis.*

Cap. xxviii.

In febrilibus maximè morbis, notæ ex urinis commo dissimæ sunt. Quandoquidem uero quicquid est præter naturam ex naturalibus inuenitur, à naturalibus initium faciamus. Vrina igitur optima est in sanis ac optimo habitu præditis hominibus, subflua aut subflaua, & moderatè crassa, & talis manens colore, qualis mixta fuit, & leuè ac albam & æqualem subsidentiam habens omni tempore, copiā uero pro potus ratione. At in foeminis naturalem urinam



nam colore albiorem uirili esse conuenit, & subsidē-  
tiam habere ampliolem. In puerili uero ætate, mul-  
tum crassam subsidentiā habere oportet, propter  
puerorum uoracitatem, & inordinatos ac intempe-  
stiuos motus. Leuem autem subsidentiā Hippocra-  
tes uocat, coherentem ac indiuisam indicare uolēs.  
Aequalem uero dicit, ut per totū semper similis min-  
gatur, & non hodie quidem concocta, cras uero cru-  
da; & ut neq; subsidentiā, aut totam diffusionē in-  
æqualem habeat. Proinde in naturali urina quæri-  
mus colorem, & diffusionis compagem, & quæ in  
ipsa diffusionē obiter ferūtur, uelut est nubecula, aut  
simile quiddam in medio pendens, & subsidentiā si-  
ue residentiā quæ fundum occupat. Manifestum igitur  
est quod urina in aliquo ex istis mutata, crudita-  
tem in uenis indicat.

*Qualis urina optima est in ægrotis.* Cap. xxxix.  
Optima igitur est urina in ægrotis quæ similima est sa-  
nis, subpallida aut subflaua, albam ac leuē & æqua-  
lem subsidentiā habens. Defectuosior est, quæ id  
quod in medio pendet album ac leue & æquale ha-  
bet. Crudior autem adhuc hac est, quæ nubeculam  
talem habet. In qua enim flatus est in profundo cras-  
sus ac crudus, si quidem paucus fuerit, permittit ma-  
teriam ad fundum uasis deferri, diuidens autem ip-  
sam, uniri non permittit. Si uero redundauerit cru-  
dus in profundo flatus, eleuat subsidentiā ad me-  
dium diffusionis urinæ, & facit id quod in medio  
pendet. Si uero adhuc amplior fuerit crudus in pro-  
fundo flatus, eleuat subsidentiā, & ad supernā su-  
perficiem diffusi urinæ liquoris attollit. In quantum  
igitur flatus diuidere ac eleuare ualet ipsam sub-  
sidentiam, in tantum crudiorē urinam putes. Si ue-  
ro neque subsidentiā, neque quid in medio pen-  
dens, neque nubeculam habuerit urina, nosse oportet  
quod natura nondum humorem concoxit. Si ue-  
ro aliquando habet subsidentiā, aut illud in medio  
pendens, aut nubem, aliquando uero non, pugnam  
indicat naturæ aduersus morbum, atque hinc modò  
cruda est, modò non. At uero in tertianis exquisitis  
& in diarijs febribus, nubecula sola, aut illud in me-  
dio pendens, ad morbi solutionem suffecit. Aliquan-  
do uero etiam urinā solum boni coloris factā esse.

*Quod non omnis alba subsidentiā bonum signi-  
ficat.*

Cap. xxx.  
Sæpe uero albus color eius quod in urinæ fusura siue  
diffusione fertur, idiotas decipit, ut subsidentiā bo-  
nam putent quæ bona non est. Contingit enim cru-  
dum ac album humorem unā cum urina excretum  
subsidere, & bonæ subsidentiæ imaginationem ex-  
hibere. Quandoque uero hepate aut renibus affe-  
ctis, pus excernitur cum urina, & subsidens decipit  
artificem. Verum primum distinguendum est, an  
homo antea affectos habuerit renes, aut hepar, aut  
aliā quandam partem per urinam expurgari soli-  
tam. Deinde etiam graueolens reperitur urina pus  
habens. Crudus uero humor à bona subsidentiā di-  
stinguitur, per inæqualem subsidentiæ substantiam  
siue compagem. Non enim coherens sibi ipsi ma-  
net, sed in paruas uelut arenulas diuiditur. Et omni-  
no non leuis est, quemadmodum uera subsidentiā.  
In bonis igitur urinis, primum supernè apparet nub-  
bes. Deinde subdescendens facit id quod in medio  
pendet. In fine uero subsidens in fundo uasis, nimis

rum ubi perfectè fuerit concocta. In crudis uero hu-  
moribus, statim ab initio ad fundum uasis multa co-  
pia secedit, unā cum hoc quod mali coloris est tota  
fusura. Postea uero etiam paulatim concoctus ac at-  
tenuatus, circa medium fusuræ urinæ conspicitur, &  
facit id quod in medio pendet. Quum autem am-  
plius attenuatus fuerit ac concoctus, in superficie dif-  
fusionis urinæ consistit, & nubeculā facit, decipitq;  
idiotas ut putent morbum ad deterius procedere.

*Quid indicet tenuis & pallida urina.* Cap. xxxi.  
Tenuis & pallida urina, cruda quidem est substantiæ  
compage, concocta autem mediocriter colore. De-  
bilitatem autem indicat etiam hæc naturæ, quod co-  
lore quidem concoxit, uelut quæ res facilis sit; non  
autem etiam compage, propter difficultatem. Si ue-  
ro per multum tempus hæc fertur, periculum est ne  
sufficere possit homo, donec concoquatur morbus.  
Nam quæ ualde tenuis est, mala est. Indicat enim  
cruditatem, in quātum calorem id quod tenuius est  
depascere oportet.

*Quid indicet tenuis & fulua.* Cap. xxxii.  
At tenuis in substantiæ compage urina, & fulua colo-  
re, melior est quā pallida. Et tamen repræhensio-  
ne non caret propter substantiam.

*Quid indicet rufa urina.* Cap. xxxiii.  
Rufa urina cruditatem indicat, non mortem. Verum  
tempore opus habet ad concoctionem. Est enim ex  
sanguine seroso, nondum ualde concoctionem ade-  
pto, neque proprium colorem. Et propterea diutur-  
niorem morbum significat. At in febribus continen-  
tibus, ob sanguinis multitudinem consistentibus,  
excernitur urina rufa & crassa, & subsidentiā rufa,  
& colore, & fusuræ compage, & subsidentiā cruda.

*Vrina tenuis mixta & postea turba-  
ta.*

Cap. xxxiiii.  
Vrina quæ tenuis mingitur, & postea foris turbatur,  
cruda est propter flatus crassi redundantiam. Indicat  
autem naturam incipere concoquere.

*Vrina crassa mixta, & crassa manens.* Cap. xxxv.  
Vrina quæ crassa mingitur, & crassa manet, & non  
desidet, qualis est iumētorum, significat uigere cras-  
sorum flatuum ac humorum uelut fermentationem.  
In his capitis dolores aut adsunt, aut aderunt, pro-  
pter humorum turbationem ac euaporationes.

*Vrina crassa mixta, & postea desides.* Cap. xxxvi.  
Quæ crassa mingitur urina, & postea desidet, indicat  
humorum fermentationem quiescere, & quodam-  
modo attenuari. Et separationem ac secretionem in-  
cipere.

*Vrina tenuis mixta, & talis manens.* Cap. xxxvii.  
Extremam cruditatem tenuis & alba urina significat.  
Non enim aggressa est in his natura concoctionem.  
Cōtingit autem hoc aut ob uirium debilitatem, aut  
propter obturationem, aut ob morbi lōgitudinem.  
Nam in quartanis diuturnissimis, in principio ob  
crassitudinem & intractabilitatem materiæ, urina  
excolata tenuis uocatur. Mingitur autem tenuis, etiā  
ob hepatis obturationem aut renum. Verū cognos-  
citur ex locali dolore. Mingitur etiam aliquando te-  
nue & album in febribus ardentibus. Febris enim  
ardens bilis multitudinem indicat, atque hæc urina  
phrenitidem imminere significat. Non tingitur autē  
urina, quia non manet in uasis ipsa bilis, sed leuitate  
sua ad cerebrū decurrit. Si quidem igitur nō adest in  
his



his phrenitis, scito ipsam iam affore. Si uero adest, & urina tenuis ac alba mingitur in ardentissima febre, ut plurimum mortem preñunciat. Non enim tolerare possunt uires cerebri iam prostrate ab ardente febre, acrimoniam ac mordacitatem bilis iam putrefactæ.

*Differentiæ urinarum oleosarum, & quid significent.* Cap. xxxviii.

Solet febris primum pinguedinē eliquare, postea carnem, postremum etiam ipsa solida corpora inuadit. Pinguedine igitur liquefacta oleosæ urinæ excernuntur. Paulatim autē liquatur pinguedo, unde & principium habet, & augmentum, & uigorem. In principio igitur colliquationis, ita oleosi coloris facit urinas, ut ambiguum sit, aquosæ ne sint an oleosæ. In augmento uero oleosæ fiunt, ita ut notabiliorem oleosi mixturam habeant. In uigore autem colliquationis totæ urinæ per totum, tum in colore, tum in substantiæ compage, uelut oleum sunt. At hæc pinguedo eliquata, aut renum solum est, aut totius corporis. Si igitur renum solum fuerit, cōfertim excernitur talis copia, imò & caloris sensus amplior circa renes contingit. Si uero totius corporis fuerit, paulatim additamentum facit.

*Quid significant eruiæ subsidentiæ.* Cap. xxxix. Quando consumpta est pinguedo, deinceps caro liquefit, & eruiæ subsidentiæ in urinis fiunt. Sed & hæc aut renum solū sunt, aut totius corporis. Si quidem igitur in febribus apparuerit talis urina: totius corporis affectionem esse indicat. Si uero non, in renibus solum. Et rursus, si crudæ sunt urinæ, totius corporis est malum. Si uero concocta est urina, eruiæ autē sunt subsidentiæ, renum affectionē indicant.

*Quid indicent fursuracæ subsidentiæ.* Cap. xl. Quum febris pinguedinem consumpserit, & maiorem carnis partem, & in profunditatem uasorum irrue-rit, fursuracæ subsidentiæ fiunt, angustiores quidem lamineis, uerum crassiores ipsis. Et hæc similiter aut ex toto corpore, aut ex uesica excernuntur. At si quidem febris affuerit, ex toto corpore. Si non, ex uesica. Et si quidem cruda fuerit urina, corporis est affectio. Si uero concocta, solius uesicæ. Sed & localis adest dolor.

*Quid indicent lamineæ subsidentiæ.* Cap. xli. Quum ipsæ solidæ partes affectæ fuerint, primum in superficie deraduntur, & quæ in urinis subsident lamineæ fiunt. Sed & ex uesica sola talia excernuntur. Si quidem igitur fuerit febris, totū corpus afflictum est. Si non, uesicæ affectio est.

*Quid indicet polentaceum in urinis.* Cap. xlii. Quum febris post occupatam profunditatem, & maiorem & longiorem profunditatem inuaserit, fiunt talia fursuribus crassiora, & uocantur polentacea. At duo significant hæc polentacea. Aut enim sanguinis assationem indicant, aut fortem solidorum colliquationem. Si quidem igitur alba fuerint polentacea illa, solidorum corporum affectio est: Si rufa, sanguinis.

*Quid indicet graueolens urina.* Cap. xliii. Graueolens urina putrefactionem indicat, & futuram naturæ mortificationem.

*Urina nigra quid significet.* Cap. xliiii. Omnes nigrae urinæ statim etiam crassæ, omnino perniciosæ sunt. Raro enim aut nunquam inuenitur tenuis & nigra. Nam niger color accedit urinis, dum

expurgatur atræ bilis humor, aut ipsa atra bilis, tum quæ ob frigiditatem, tum quæ propter nimiam assationem facta est. Et uiris quidem ac foeminis nigrae urinæ pessimæ sunt. Pueris uero aquosæ. Minus autem perniciosæ fiunt nigrae urinæ, his qui debilem habent splenem, quibus non ex adustione, neque ex perfrigeratione, nigrescit ac liuescit sanguis, quædam modum in alijs quibusdam contingit: sed ex melancholici humoris diffusionem. At hæc tres differentiæ crassitudinem substantiæ habent. Necessariò igitur etiam crassæ reperiuntur nigrae urinæ. Proinde in acutis morbis perniciosissima est omnis urina denigrata, & præsertim quum & graueolens fuerit & crassa, & nigram subsidentiā habuerit. Fieri enim non potest ut seruetur æger ex acuto morbo, qui talem urinam minxit: Et si quidem subsidentiā fuerit nigra, perniciosissimum est. Si uero id quod in medio pendet nigrum fuerit, minus malum, aut non similiter malum. Si autem nubecula fuerit nigra, adhuc mitius & non similiter malū. Nigra porro urina, aliquando indicat frigiditatem, aliquando caliditatem, siue superassationem. Si quidē igitur prius mixta fuerit liuida urina, deinde sic nigra fiat, frigiditatem causam habet. Si uero flaua præcesserit, & postea nigra inuenta fuerit, ab ampliore nimirum caliditate superassata nigra facta est. Scire tamen operæ precium est quod & in febris quartanæ declinatione, & in melancholici delirii solutione, urinæ apparent nigrae ac crassæ. Splenicis autem ut plurimum talis urina mingitur, quando debilis fuerit splen. Nullam enim concoctionem ac distributionem melancholicæ superfluitatis facit.

*De egestionum notis.* Cap. xlv. Quod de urinis antea dictum est, hoc etiam in egestionibus cognoscere oportet. Dico autem, qualis sit naturalis egestio. Nam ab hac euariatio in aliqua parte, cruditatem indicat. Optima igitur est egestio mollis & compacta, & leuis, & iuxta consuetam horam quam maximè prodians, & ad proportionem comestorum, colorata quidem moderate bilioso humore, hoc est, subfulua, & non ualde graueolens. Quæ enim talis est, naturalis est. Et manifestum est quod significat sana esse omnia circa uentrem ac intestina. Si uero aliqua parte à relatis euariauerit, præter naturam iam dicitur. uelut est, ualde graueolens, aut crassa, aut sicca, aut dura, aut distorta, & non humori ammixta, & quæ cum stridore & uelut strepitu quodam præter rationem excernitur. Tales enim omnes concoctoriæ actionis debilitatem indicant. His adhuc deterior est exacte fulua. Est enim bilis intemperatae ac puræ signum. Nigra uero egestio, atræ bilis signum est, aut sanguinis adusti. Liuida uero intestinorum frigiditatis ac mortificationis. Pinguis autem & oleosa, pinguedinis colliquationem significat. Viscosa uero ipsorum solidorum corporum colliquationem indicat. Quæ autem uaria est colore, & ualde graueolens, uariorum humorum excellentem putrefactionem significat. Cæterum in omnibus his considerare conuenit, an edulia talia fuerint, aut intestinum ex more fluxione laboret, quum debile sit.

*De egestionibus indicatorijs.* Cap. xlvi. Si porro iudicatio alicuius morbi per uentrem futura est, nihil quidem præiudicans, uelut in alijs, neque quæ



quicquam proprium ac firmum præsignificans habet. Verum ex eo quod adsunt quidem iudicationis signa, non autem adsunt signa uomitus, aut eruptionis sanguinis narium, aut sudoris, colligere datur. Considerare tamen oportet ex aluo egesta, an plura prodierint quam prius ante iudicationem. Indicant enim inclinationem hac magis fore, & præsertim ubi imminutæ fuerint urinæ. Insuper autem & grauitas notabilis, & dolor, & tensio circa præcordia & lumbos, ventris excretiones præcedunt. Quandoquidem uero & per hæmorrhoidas, & per locos muliebres, iudicationem fieri possibile est, communia etiam amborum sunt signa quæ nunc sunt relata. Verum considerandum est an horum quid ex more expectetur. Si quidem igitur in principio morbi aut augmento, uenter perseueranter liquidiora egerit, aut uelut biliosa quædam pura, & febris perseuerat, & bilis magis augebitur: tunc & ardentior & periculosior ut plurimum est morbus. Si uero in uigore multum exturbetur aluus sua sponte, ferè morbi solutionem efficit. At circa uigorem aliquando in morbis diuturnioribus uenter exturbatus, omnem materiam morbum facientem dederit. Verum in acutis morbis, & nigra pura & graueolentia inducentia, præsertim in principio pessima sunt. Quibuscunque enim morbis inchoantibus bilis atra sursum aut deorsum prodierit, mortale est. Et rursus quibuscunque ex morbis acutis, aut diuturnis, aut ex uulneribus attenuatis, bilis atra subierit, postmodum eius diei moriuntur. Non autem simpliciter si quid nigrum excernitur, iam etiam hoc atra bilis est. Potest enim & sanguis è proprijs locis excidens, & tempore aliquo manens frigidus factus in grumos congelari. Atram itaque bilem cognoscemus ex eo quod ad terram fusa, ipsam radat ac fermentet, uelut acerrimum acetum.

*De Vomitus prænotione ac significatione.*

Cap. XLVII.

Instante iam iudicatione, uomitum fore expectare oportet, si pulsus fuerit uehemens, & ad contractionem magis festinaret, & durissimus existens ac inæqualis. Cordis item punctura & uehemens oris uentris morsus adest una cum capitis dolore, & uertigines oculorum, tenebris simul obuersantibus. Et labium concutitur, & saliuam multa ac tenuis defluit, & nauisæ infestant, & infernæ præcordiorum partes frigidæ tangentibus apparent. Omnia enim hæc coincidunt, bilioso ac mordaci humore in uentre ac stomacho coaceruato, mordenteque ac simul contrahente totum stomachum infernè. Vnde & labium concutitur, & saliuam defluit. Si uero cum his etiam rigor accesserit, citissime uomunt. Quod si etiam cibos recens ingererint, & maxime potum, citò uomunt. Vtilissimus est uomitus pituitæ ac bilis quam maxime mixtorum. Vomatur autem non crassus. Nam sinceriores, hoc est, non mixti, reprobandi sunt. Tales enim & cum uiolentia & laniationibus ac molestia uomuntur, una cum hoc quod signum sunt, solam bilem prædominari. Quin & uarij reprehendi merentur, uelut sunt liuidi & nigri ac porracei. Mali enim sunt hi inquit Hippocrates. Si uero omnes hos colores idem homo uomuerit, perniciosum est. Deteriores tamē sunt liuidi ac nigri, in acutis & ardentibus morbis fientes, & præsertim si fuerint graueolentes. Attendere uero oportet & in his, num sanguis conflu-

xerit in uentrem, & tempore quodam in ipso moram traxerit, & grumosus excernatur. In plurimis enim tale quiddam contingit, ex circuitibus quibusdam. Et non solum nihil molesti infert, sed etiam tolerantiores seipsis fiunt, ubi hic per uomitum fuerit reiectus.

*De eruptionis sanguinis ex naribus prænotione ac significatione.*

Cap. XLVIII.

Si sanguinis ex naribus eruptio futura est, propria signa præcedunt hæc. Splendores oculis obuersantur, eò quod flauus est humor. Obtusus autem est uisus, propter multitudinis sursum uersus lationem. Quapropter etiam lacrymantur oculi. Facies rubicunda est, & præsertim male. Præcordia distenduntur citra dolorem, difficultas spirandi adest, propter transitum sanguinis per thoracem. Capitis item dolor, & temporum pulsus irruens simul cum iudicatoria exacerbatione, & non in principio morbi existens. Collum dolet, & deliria sæpe ac exultationes fiunt. Pulsus autem alti sunt & magni, & ad distentionem magis festinant. Si uero cum his omnibus etiam nares scalpat, iam adest tempus ut sanguis erumpat, & præsertim quum dolor fortiter circa frontem ac tempora incutit. Quod si etiam sano sanguis erumpere consueuit, augebit sane etiam hoc ualde spem tuam. Atque hæc sunt signa iam futuræ sanguinis eruptionis. In principio uero apparentia crudo existente morbo, periculum significant, & tales plerunque moriuntur. Si uero facta iam concoctione, præsertim in urinis, hæc signa appareant, circa uigorem morbi commode conspiciuntur. Soluunt autem tales sanguinis eruptiones etiam uiscerum inflammationes in febribus, quando maxime ex directo fiunt, uelut inflammato hepate, ex dextro nare: inflammato splene, ex sinistro. Vnde de facillimum iam fuerit etiam medicum prædicere, utra naris sanguinem emissura sit, occasione ex dolente parte accepta. Soluunt etiam sæpe sanguinis ex naribus eruptiones phrenitidem, non tamen lethargum aut peripneumoniam.

*Quod & per hæmorrhoidas, & muliebres purgationes, sæpe soluitur morbus.*

Cap. XLIX.

Vidimus in multis etiam per hæmorrhoidas prius existentes in sede apertas, morbum solutum. Similiter & in foeminis menstrua purgatione facta. Oportet autem & in his prægressa concoctione, in morbi uigore excretionem fieri, quo bona & iusta iudicatio fiat. Præcedit & in his notabilis grauitas, & dolor lumborum, imò etiam imi uentris dolor ac distentio.

*De significatione ex sudoribus.*

Cap. L.

Febrem per sudores soluendam cognoscemus ex eo quod ardentissima est, qualis est quam inde Causum Græci uocant. Biliosus est enim hic morbus, & ubi fortiter motus fuerit, rigorem efficit. Si quidem igitur pro ratione suppressa fuerit aluus, aut urina, iudicatione propinqua existente, rigorem expectare oportet. Si uero amborum suppressio facta est, & non adsunt signa uomitus aut eruptionis sanguinis, sudor necessario erit multus, & hoc magis fiet ubi augescente exacerbatione ægri mente moti fuerint, & forinsecus calidiores facti, & uapor quidam calidus ex corpore ascenderit, qualis antea non contigit, uelut uidere est in recens lotis. Pulsus item his sunt magni & alti & ueloces, & ad distentionem magis festinantes ac uelut undosi. Et arteriæ tunica mollis ac humecta apparet. Superficies autem totius corporis pruriginosa



riginosa & mollis, & quibusdam horis rubicunda. Hęc in exacerbatione iudicatoria fientia, concoctio-  
ne prægressa, & iudicatoria die bona existente, sa-  
lutares & solutorios sudores significat. Manifestum  
est autem quod moderatè calidum esse oportet solu-  
torium sudorem, & per totum corpus fieri, & pro  
ratione leuare, ac tolerantiorē facere ægrotum. At  
frigidi sudores cum acuta quidē febre mortales sunt,  
cum mitiore uero, longitudinem morbi significant.

*Abscessuum signa iudicatoria.*

Cap. LI.

Si ad abscessum conuertatur morbus, salutariter se ha-  
bente ægro, ad hoc maximè animū aduertere oportet.  
Durante quidem febre & continua existente, &  
urinīs tenuibus ac crudis semper existētibz, & sub-  
sidentia non habentibus, si postea apparuerit in ali-  
qua inferiori parte, uelut cruribus aut circa iuncturā  
aliquā, aut grauitas, aut tensio, aut ardor, aut dolor,  
absq; manifesta causa, in ea parte abscessum fore ex-  
pecta. Si uero æger derepente difficulter spirās, citò  
quidem à difficili spiratione liberatus fuerit, successerit  
autem dolor & grauitas capitis, & altus sopor ac  
surditas, huic in glandulis circa aures abscessum fieri  
necesse est. Fiunt autem abscessus magis in hyeme, &  
senioribus qui trigessimū annum exceſſerunt.

*De sputorum significatione.*

Cap. LII.

In peripneumonidis ac pleuriticis affectionibus, sputa  
proprie appellata, subsidentis in urinīs similes sunt.  
At nihil omnino expuere, sed solum siccè tussire, est  
uelut in urinīs quum extremè crudæ sunt. Si uero  
incipiat æger humida & perfectè cruda educere, ob-  
scura est & incerta talis transmutatio, & desinit pri-  
mum morbi tempus, hoc est principium. Vbi uero  
inceperit spuere pauca & matura, & semper plura ac  
facilius educit, tunc augmentum esse dicimus. Quum  
autem exactè fuerint concocta ac mollia, & non æ-  
grè eduncuntur, tunc instat uigoris tempus. Vbi ue-  
ro concocta fuerint, ac citra molestiam educuntur, &  
imminuta est copia, & dolor non amplius fuerit, &  
homo facile spirat, ac bene tolerat, uigorem cessasse  
putandum est, & morbum iam declinare. Cæterum  
ante alia animū aduertere oportet, utrū citius aut  
tardius sputa extussire incipiat, quemadmodū etiam  
Hippocrati uidetur. In pleuriticis inquit, si sputum  
statim appareat, in principio quidem breuis sit: si  
uero posterius appareat, prolongatur morbus ipse  
uidelicet. Quæcunque igitur sputa subflaua sunt &  
subfulua & subspumosa ac tenuia, solius cruditatis  
notæ sunt, & nihil notabilis mali indicant. Quæ ue-  
ro purè flaua & fulua & uiridia ac spumosa sunt ac  
uiscosa, insuperq; nigra, mala sunt. Nam excepto  
sanguine quicunque alius humor purus fuerit, ma-  
lam affectionem indicat ex calore generatam. San-  
guinea igitur & pituitosa sputa, moderata sunt. Fla-  
ua uero ac nigra, mala. Considerare uero oportet  
& educationis ipsorum modum. Si enim facile ex-  
puuntur, iudicium est quod talia bona sunt. Si uero  
ægrè educuntur, mala: & præsertim si nigra, aut li-  
uida, aut æruginosa fuerint, aut ualde graueolentia,  
ut prunis iniecta graueoleant.

*Signa perfectè ac fideliter soluti morbi.* Cap. LIII.

Perfectè ac fideliter solutum esse morbū putare oportet,  
quum in idem simul conuenerint omnia soluto-  
ria signa. Siue igitur in uigore statim & confertim  
ac cōstanter iudicatus est morbus: siue paulatim de-

clinando fideliter solutus est, ex his sanè cognoscere  
poteris. Primum enim & maximum signum bonæ  
ac fidelis iudicationis, sunt concoctiones superfluita-  
tum apparentes in diebus indicatiuis, cum uirū for-  
titudine. Deinde si in impari die iudicatio facta est,  
& ad hæc insuper, si febris soluat egrō iudicato, &  
ipse æger ab omnibus accidentibus liberetur, & co-  
loratio fiat tum in facie, tū reliquo corpore, pro eua-  
cuationis ratione: & subtiliore pulsu præditus, ac for-  
tior dum assurgit, & bene toleras per omnia, & ma-  
ximè circa concoctiones ciborum ac digestionē: &  
si omnes naturales actiones inculpate facit, et corpus  
pro refectionis ratione roboratur: & color ex non  
naturali in naturalem transmutatur. Hęc est optima  
iudicatio, & oportet ipsos confidenter renutrire con-  
uenienti uictu ac balneis uidelicet. Si uero defectuo-  
sa facta fuerit iudicatio, morbus recidiuare solet.

*Signa morbi non perfectè soluti.*

Cap. LIIII.

Suspectos de recidiua cognoscemus, ex eo quod puta-  
tur quidem solutus esse morbus, perseverant autem  
consimiles prioribus urinæ ac pulsus. Et quod ad-  
huc pallidus est eger, & difficulter tolerat, & reliqua  
contraria omnibus prædictis bonis fiunt. Et in sum-  
ma, quoties præter rationem solutus est morbus, bis  
ipsum reuerti timor est.

*Prænotio diei qua moriturus est æger.*

Cap. LV.

In perniciosis morbis considerare oportet exacerba-  
tiones per singulos insultus, an quotidie, aut alternis,  
aut alio modo fiant. Si uero febris est non intermit-  
tentium generis, uide an in imparibus diebus, aut  
paribus, æger magis intoleras seipso sit. Nosse enim  
clare oportet quod in illa die aut nocte, in qua ma-  
gis intolerans seipso sit eger, morietur: Et si morbus  
multo plus uires excedit, citò morietur: Si uero ui-  
res parum resistunt, differri poterit ad unā atq; alte-  
ram diem. Fieri autem non potest ut moriturus ad  
declinationis morbi tempus deueniat. Raro uero in  
declinatione morbi aliquem mori cōtingit, nisi alius  
morbus priori succedat. Neq; uero necessariò ad ui-  
goris tempus peruenit moriturus: sed ut plurimum  
in principio aut augmento ægroti moriuntur.

*Quod etiam horam mortis ægri prænosceat possit  
doctus medicus.*

Cap. LVI.

Quum quatuor sint particularis exacerbationis tēpo-  
ra, obseruare oportet qua hora diei aut noctis gra-  
uior exacerbatio irruere solet. Insuperq; in qua par-  
te exacerbationis æger seipso grauior factus est, ni-  
mirum an circa accelsionem, aut augmentū, aut uigo-  
rem ipsius exacerbationis. In illa enim hora, in qua  
languidior, aut præter solitū magis pulsu destitutus  
factus fuerit, morietur. Et in accelsione quidem exa-  
cerbationum moriuntur, ob inflammationes magnas  
in partibus principalibus, aut propter multitudinē  
crassorum ac uiscosorum humorū acruatim intrò la-  
psorum, ut transitus spiritus perfectè obturent: ita ut  
suffocetur ac uelut extinguatur natura, quemadmo-  
dum si quis uiridium lignorū copiam accumulet in  
flammam. In uigore uero exacerbationū moriuntur,  
emota natura per uiolentiam ac uehementiā morbi.  
Eodem modo contingit ipsos etiā in exacerbationis  
augmento mori. In declinationibus autem exacerba-  
tionum moriuntur, exoluta ipsis per uiolentiā uitali  
firmitate. Obscurior enim & collabēs semper fit pul-  
sus in perniciosis exacerbationis declinationibus.

Diffluit



Diffluit enim tunc una cum alijs in corpore, etiam febrilis calor. Atque hinc idiotæ melius res habere imaginantur. Aegri uero aut ad exonerandum aluum surgentes, aut alio motu facto, animo linquuntur. aliqui uero paucos ac viscosos sudores exclusos moriuntur.

*In acutis morbis mortem non esse prædicendam.*

Cap. LVII.

In acutis morbis coniectatione uti non oportet, in quibus maxime repentina mors, aut periculum ingruit. In his enim facile transfluit & ardentior est humor, & uehementissima febris uiolentia. Et de his morbis Hippocrates pronuntiavit: Acutorum morborum non omnino tutæ sunt prædictiones, neque sanitatis, neque mortis.

*Februm diuifio, & de diarijs febribus.* Cap. LVIII.

Ex morbis ob intemperiem orientibus unus est & febris ipsa, calore præternaturali ad tantam immodestiam euecta, ut angat hominem, & actionem lædat. Differentiæ huius caloris maioris ac minoris ratione distinguuntur, & iuxta subiectum siue materiam, aut ipsum cordis corpus calore occupate, aut humores, aut æream essentiam. Incipit igitur hæc præternaturalis caliditas, alias ex alio de prædictis, & nisi soluta fuerit, progressu temporis similiter reliqua duo genera afficit. Et si quidem in spiritibus permanserit hic calor, diariam febrem efficit. Si uero humores occuparit, febrem putridam incendit. Si uero ipsum cordis corpus iniuria affecerit, hecticam ac habitualement febrem facit. Nam aliqui febricitantes facile solubilem affectionem habent, uelut calefactum in sole lignum. Aliqui uero ægrè solubilem, uelut accensum ab igne lignum, ut etiam fumum edat. Quidam uero plane exuruntur, uelut lignum ad carbonis naturam adactum. Tria igitur sunt genera, diariæ, putridæ, & hecticæ. Primum itaque de diarijs tractabimus. Fiunt hæc febres, uelut dictum est, citra humorum putrefactionem, solo spiritu feruefacto, & propterea diariæ appellantur: Nam ubi loti sunt ægri in prima huius febris declinatione, & cibum boni succi ac humectum acceperint, non amplius secundo febricitant. Proprium autem & inseparabile signum diariarum febrium est urinarum cōcoctio in prima die, & caloris iucunditas. Verum post exacerbationem sedatam, certiores habebis cognitionem. Nam articularum motus, per omnia assimilatur motui sanorum, quod nulli alij febris adest. Et ipsa bona ægri tolerantia maximum liberationis signum est. Et urinae multo meliores post exacerbationem quam in febris principio tibi apparebunt. Et si ipsis dum lauantur, neque horror aliquis insuetus acciderit, neque alia aliqua iniucunditas, & post balneum consequenter bona tolerantia manserit, confidenter nutrire potes ipsum, & uinum exhibere intrepidè bibendum, quantum in præsens moderatum est. Facile uero à talibus febribus capiuntur hi in quibus defluxiones corporis non uaporosum, sed acre quid ac fumosum habent. Quare si quando suppressus fuerit coaceruatus in ipsis calor, febrilis efficitur. Auspicientes uero ac externe læssentes harum febrium causæ sunt, lassitudines, frigiditates, uigiliæ, curæ, tristitiæ, iracundiæ, rigor, ardor ac exustio cutis, ut difficulter transpirationem admittat.

*De diarijs ex lassitudine febribus.*

Cap. LIX.

Qui ex lassitudine febricitant, cutem sicciorē quam qui ex alia quadam diaria febre laborant, habent. Et

hoc maxime contingit his qui simul frigefacti sunt ex multa lassitudine, ut etiam post febris uigorem permaneat ipsis siccitas. Et pulsus his parui fiunt. Qui uero non nimium fatigati sunt, his humiditates quædam, aut uapor calidus ex profundo effertur. Magni autem sunt & his pulsus. Oportet autem ipsos statim post exacerbationis declinationem, in balneum ducere. Et accurate simul ac molliter modico oleo dulci tepido perfrictos, aquarum dulcium lauacris lauare. Sed neque si in ære balnei ipsos morari iusseris, quicquid læseris propter frigiditatem. Postea quietis studium prodest.

*De febricitantibus ex uigilijs, & cura, & tristitia, aut ira.*

Cap. LX.

Eos qui ex uigilijs febricitant, distinguit etiam coloris species. Est enim subhumida. Sed & oculorum motus manifesti sunt: uix enim attollunt supercilia. Et caui fiunt ipsis oculi, imò etiam sicci. Pulsus autem densiores fiunt omnibus ob uigilijs, curam, ac tristitiā febricitantibus. Qui uero ex ira febricitant, his neque cauitas oculorum adest, neque color ille. Et calor his est amplior, & uelut ex profundo emergens. Et magni sunt his pulsus. Omnes igitur relati neque frictionibus, neque balneis multis opus habent. Sed multi olei perfusionem omnino non adstringentis. Atque ubi parum defricti sunt, pro more lauentur.

*De febricitantibus ex ardore.*

Cap. LXI.

Febricitantes ex ardore statim ab initio perfrigerantibus sanare oportet, & balneis pluribus dulcissimarum ac temperatissimarum aquarum. Oleum autem modicum adhibendum est, & omnino non affricandum. Sint autem quæ adhibentur capiti frigefaciētia, omphacinum & rosaceum ex ipso præparatum sine sale. Facere autem hæc possumus frigida, uas in quo continentur suspendentes in puteum ut aquam contingat. Sed adhuc magis saliens aquæ frigida, oleum frigefacit, & magis adhuc nix forinsecus uasi circumposita. Perfundendum est autem sinciput ex oleo sic frigefacto, lana moderate excepto, ita ut manum in sublimine leuemus, & hoc indefinenter faciamus, usque ad febris declinationem: atque ita in balneum dulcium ac temperatarum aquarum ducamus, accessu solo æris balnei per transitum concessio.

*De febricitantibus ex frigore.*

Cap. LXII.

Si quis frigefactus febricitarit, suppressis uidelicet fumosis transpirationibus, quæ per cutem fiunt, & hic in balneum ducendus est in febris declinatione. Caput autem calfaciendum est & ante balneum, & post balneum, in declinatione, ex unguento amaracino aut nardino.

*De febricitantibus ex grauedine ac destillatione.*

Cap. LXIII.

Qui ob grauedinem febricitant lauare non oportet, priusquam ea concoquatur, si ex frigidityte aut cruditate destillatio facta est. Caput autem humectandum est irino unguento aut amaracino aut nardino. Si uero ex ardore facta est destillatio capite calfacto, & instar cucurbitæ attrahente materiam ex locis subiectis, hunc statim in balneum dulcium ac temperatarum aquarum ducere oportet, & in frigida immergere, & sub saliente locare. In balneis autem frigefacientibus caput humectare. Sunt autem ea moderata, propter balneum.

*De febribus ex cutis densitate.*

Cap. LXIII.

Densatur cutis aut ex frigore, aut acerba qualitate ipsi præter aduetudinem allapsa. Quale quid accidit etiam his qui in aluminosa aqua lauantur. Arctissima est

his cu



his cutis, ut etiam tacto cognoscatur. Imò & calorís motus, levis quidem iuxta primâ manus admotionem apparens, acris efficitur, si diutius tactus perseveret: Urinæ autem non uelut alijs fuluæ sunt. Quare non accusamus in his quòd alimentum non sentiant, unde corporis moles contrahitur. Neque uero oculi caui ac sicci fiunt. Verû sunt quibus humidiores & prominentiores esse uidentur naturalibus, eò quòd non contigit transpiratio in ipsis, sed materiæ magis intus concluduntur. Vnde neq; pulsus parui sunt uelut in tristitia, aut cura, aut uigilijs, & ualde immoderatis exercitijs. Curare porrò eos oportet aquarum dulcissimarû ac temperatissimarû balneis, post exacerbationis declinationē, & præcipere ipsis ut aliquandiu in balnei aëre morētur, affundendûq; est ipsis oleum dulce tepidum, & frictio mollis ac moderata adhibenda. Tenuis autem uictus præscribendus est, & uinum dandum tenue & album.

*De febribus ex fame.*

Cap. LXV.

Si ob famē fiat febris, exacerbationē declinante in balneum ducantur, & plurimo oleo tepido dulcissimo perfusi leuissimè fricentur, & plurimo tēpore in calido solio morētur. Egressi deinde ac uiribus refecti rursus in balneum ducantur, & in calidum solium locentur. Postea egressis post balnei turbationē sedatā, dāda est aqua calida potanda, deinde ptisanæ succus: aliquando etiam pisces petrosi in iure albo parati.

*Diæta cōmunis omnium diariarû febrium.* Cap. LXVI.

Diæta in febribus diarijs omnibus cōmunem scopum habet, ut sit ex eduljjs boni succi & quæ omnino cōcoquantur, & nusquam circa meatus detinentur: his quidem qui ex ardore aut ira februnt, quæ simul frigefaciunt ac humectant: frigefactis uero, minus alentia & moderatè calfacientia. His autē qui uigilarunt, aut tristes fuerunt, aut curis uexati, humidus & somnificus cibus congruus est. Fatigatis autem, plurimus & maximè nutriens. At in quibus intēperatura corporis calidior ac siccior facta est, eos oportet aliquando circa primum exacerbationis impetum nutrire. Vinum autem dandū est omnibus qui ex diaria febre laborant, aquosum, tenue ac album, quòd & concoctionem adiuuat, & urinas ac sudores propellit. His uero qui uigilarunt, aut tristes fuerunt, aut curis uexati, magis intrepidè uinum datur. Sed & fatigatis nimium, dandum est quātum superare possunt. Iratis autem priusquam ab affectu omnino liberati fuerint, minimè tutum est uinum dare.

*De febrilibus ex inguinū inflāmatione.* Cap. LXVII.

Si quidem citra laceissentem externā causam, inguinis glandularum inflāmatio fiat, multitudinē sanguinis plerunq; in uniuerso corpore indicat. Nam & calor in his amplior est quàm in prædictis, & facies rubicūda ac tumida apparet. Oportet igitur celerrimè uenā secare priusquam materia in inflāmato putrescat, ac febrem putridā accendat, post uenæ sectionem utendum est tenui diætā, usq; ad perfectā liberationē. At inflāmato inguinī, ante uenæ sectionē adstringentia ac repellentia imponenda sunt, post uenam sectam, laxantia ac moderatè discutiētia. Cæterū quibus propter offensionem digitorum pedis, aut aliud quid tale, inguinis inflāmatio facta est, & ea de causa febris diaria consequuta, tales ne interrogāt quidem Medicum quid facere oporteat, sed ulceri ex quo inguinis inflāmatio facta est prospicientes, lauantur

circa exacerbationis declinationem. Prohibendum autem est uinum omnibus ex inguinis inflāmatione febrilibus, donec inflāmatio fuerit soluta. Et uictus ratio tenuior ipsis constituenda est.

*De diarijs febribus ex cruditate obortis.* Cap. LXVIII.

In corporibus ex malis humoribus uitiatis cruditates orientes citissimè febrē accendunt. Minus autem fit malum, si ob cruditatē aluus infra erūpat. Non paruum autem malum est, si fuerit suppressa. Februnt autem aliqui etiam in quibus profluuium uētris ob cruditatem fit. Si quidē igitur sola corrupta euacuata esse apparuerint: lauandi sunt ac nutriēdi in febris declinatiōe. Si uero plus iusto euacuatio fiat, melius est nutrire citra balneū, prospiciendo uentri ipsi. Cura uero uentris dupliciter fiat. Si enim non amplius feratur ipsa aluus, absinthium modicum aqua macerans coquito cum oleo in duplici uasculo, & ex hoc locos circa uentrem humectato. Deinde hapsum lanæ purpureæ oleo imbutū uentri imposito. Si uero debilius est os uentris, mastichē cū ungento nardino ad strigmentitiā crassitudinem redige, & purpuram ex eo imbutā impone. Sint autem ea quæ imponuntur ad tactū calida: tepida enim robur uentris exoluūt. At si adhuc feratur aluus, melius est optimo melino uti pro nardino, cū modico uino. Cōmodum est ad hæc & mastichinum. Si uero etiā uenter exuratur post euacuationē, melino similiter utaris, aut cerato ex ipso parato. Nutriēdi porrò sunt adhuc fluēte aluo, ex polenta & panibus paucissimum acetum habentibus. quos hinc oxylipes Græci uocāt. Inspergenda est autem polenta succo malorū punicorum, aut pīrorū aut malorum, præsertim cotoneorū. Vel in ipsorum decoctū, aut myrtorum. Si uero fluxus cessarit, alica detur, & gallorū testes, & pisces petrosi in iure albo parati, & fructus adstringentes. Si uero inappetentes fuerint, ut auersentur cibos, ex cōcoctorio medicamēto ex malorum cotoneorum succo ac melle composito, cochlearium unum aut duo dāda sunt. Si autem non affuerit id quod ex succo cōpositum est, detur id quod ex carnibus cotoneorū paratur, cui nihil omnino piperis additum est, aut ualde exiguum quiddā. Si uero supprimatur aluus in his qui ob cruditatē ex diaria febre febricitāt, si quidem cibi adhuc in uētre continētur, plurima tepida pota, digitis aut pennis immisis, per uomitū iubebimus id quod molestū est reñcere, deinde præcordia fouere, & quietē agere. Si uero cibi iā descenderūt ad intestina, reclinatis ipsis ita ut partes circa caput & stomachū sursum uergentes habeāt, foueatur uenter, & somnus concilietur. Post somnū autē glandula subdetur, ad superfluitates quæ descenderunt educēdas, aut per mitiorē clysterem, quale est fursurum decoctum, euacuatio fiat. Diæta sit tenuissima, quæ plurimam extensoriā uim in se habet. Quòd si inflatio accesserit, incoquere oportet in oleo cuminum, aut rutā, & infundere per sedē. Euacuata uero aluo, statim nutriantur. Si uero etiam citra molestiam dormierint, postridie lauentur, adhibentes uentri ungentum nardinum cum modico uino. Et post balneū similiter tenui uictu utantur. Si uero etiam tertia dies febrem aliquam induxerit, neq; sic timendum est, sed similiter lauandum, ac moderatè nutriendum. Dare autem oportet talibus ante cibum aliquod concoctorium, oxyporium à cita penetratione appellatum



medicamentum, & præsertim quod ex cotoneis malis fit cochlearij mensura.

*Curatio diariarum febrium multarum dierum, quarum aliqua ex mutatione diariarum generantur, ob cutis obturationem.* Cap. L XIX.

Quædam febres propter obturationem uasorum circa cutem fiunt, ex diariarum mutatione, quæ non probe curatæ fuerint statim ab initio. Cõtingit hoc maxime in corporibus uitiolis humoribus præditis, quum multum fuerint uoraces. Nam in talibus circa primam ac secundam diem aliquantisper, non est in pulsu putredinis signum, sicut neque in urinis, cruditatis: dum enim prolõgatur quidem declinatio, & non amplius iuxta proportionem remittit, suspecta est affectio: si enim non transpirauerint perfecte, necesse est putrefactos esse uitiolos humores. Si quidem igitur puer aut senex fuerit ægrotus, uenam secare non expedit. In medijs autem ætatibus, robore præsentem ægroto, uena secetur, si sanè etiã plenitudinis signa affuerint in corpore. Detrahendum est autem pro uiribus, & obturationis magnitudine: maior enim febris ob uehementiores obturationes incidit. Minor autem ob minores. Euacuata uero multitudine, & rarefactis meatibus, fumosæ ac fuliginosæ superfluitates transpirantes pauciores fieri poterint. Periculosum enim est aperire potentibus obstructions, uiri ante euacuationem. Quæ enim uim extersoriam habent, exhibita dum exhalant simul attrahunt quid ex crassis ac uiscosis humoribus in uasis, & duplicat in angustis meatibus obturationes. Si uero etiã extrinsecus cuti admoueat extrorsoria, periculum est ne attrahant etiam aliud quid ad meatus obstructos. Quod igitur securè & intrinsecis exhalatio, & extrinsecis attractio contingat, utilissimum est euacuare pro uiribus corpus: post euacuationem uero non longa facta dilatione, aliqua extersoria edulia aut pharmaca dare. Eduliorum quidem loco ptisanam & aquam mulsam, pro pharmacis autem, acetum mulsum ex solo aceto ac melle paratum. Quæ enim in aceto mulso coquuntur alijs, uelut calamintha, & similia calida, febres accendunt, uelut etiã uinum. At post tertiam diem, neque putredinis humorum signo in pulsibus præsentem, neque in urinis cruditate, & ubi hora suspecta in qua febris accessit in prima die transijt, confidenter iam hominem lauare oportet. Si uero etiã circa decimam horam suspectus tibi fuerit paroxysmus siue exacerbatio, lauare oportet ante horam sextam. In balneo uero corpore præcalefacto illinire oportet oleo dulci tepido, & moderatius cõfricare, postea depurgare & abluere forinsecus corpus. Eligenda ad hoc quædam moderatè extergentia, qualis est ordeacea farina & fabacea. Deinde immittere in solium calidam temperatam, deinde etiam in frigidam. Si uero circa decimam horam, ut ita demus, turbatio quædam suspecta sit, nihil exhibendum est præter aquam cui incocta est hyssopus & parum apij. Deinde si nihil mali intulerit hora, nutriantur: Si uero etiam quid attulerit, omnino moderatum apparebit. Quare & lauare poteris post stridie ac nutrire. At ubi magna facta est obturatio, necessario putrefactio contingit. Vnde curatio in putredinosa febre referenda, etiam his congrua est.

*De febribus continentibus, siue synochis.* Cap. L XX.  
Continens febris nominatur, cuius ab initio usque ad finem una est exacerbatio, nullam alterius exacerbationis principij significationem faciens. Corporibus bo-

no habitu præditis, & multo sanguine repletis, & ætati calidæ peculiaris est continens febris. Conflatur enim ob calidi sanguinis copiam nondum putrefacti, & eò quod non transpirat, feruore solùm caliditate excitantis: quemadmodum nouum uinum solet in dolis: tempus autem talium febrium maxime uernum est. Sunt autem differentie febris continentis tres, nam aut equalis permanet magnitudo ab initio usque ad solutionem, aut additamentum facit, aut detractionem: hoc autem contingit prout maiores aut minores fiunt transpirationes, ex eo quod densior aut rarior est habitus corporis affecti. Est autem multa copia quæ in talibus affligit, & feruorem sanguinis ebullientem consequenter febris accendit. Aliquando uero etiã crassitudo. Scopus igitur curationis in ipsis est euacuare copiam, & extinguere calorem præternaturalem, & crassitudinem secare, si quidem affuerit. Deinde ueterem bonam temperaturam debilitatis partibus reparare.

*De uenæ sectione.*

Cap. L XXI.

Si ualidæ sunt uires, & ætas permittit, & nihil aliud fortiter resistit, sanguinis tantum auferre oportet, quantum uires tolerant. Præstat autem si uires adsunt, usque ad animi deliquium ducere. Quibus uero non sic uena secta est, hi ad extremum periculum deueniunt, ut aut suffocentur, aut animo linquantur, nisi uirium robur, aut larga sanguinis eruptio, aut multus sudor, ex manifesta pernicio ipsos eripiat. Nam multitudo in his non amplius a uenis contineri potest, obturat ac distendit corporis mole, & propterea ipsum aliquando dirumpit, & uasa maxime in naribus aperit. Ea gratia festinare oportet ad sanguinis detractionem, quantum uires ferunt: quod uasorum natura ex transpiratione ac uentilatione, naturale temperamentum conseruas, iuxta morem ab initio humoribus dominetur. Verum animaduertendum est & ad ipsius uenæ sectionis scopos. Præcedente enim ciborum cruditate, eousque uenæ sectionem differre conuenit, donec tibi satis esse uidebitur concoctio ipsorum in uentre peracta, itemque secessus superfluitatum in intestinis. Si uero suspectam habes post uenæ sectionem, aliam fore sanguinis euacuationem, uelut muliebrem purgationem, aut hæmorrhoidum in sede fluxum, relinquere oportet in uenæ sectione tantum sanguinis, quantum per alios locos euacuandum putas. Quare siue menses fuerint moti, siue hæmorrhoids aperta, totum negocium nature permittito. Si uero non tantum quantum oportebat euacuatum fuerit, tunc uenam secato, quod ex utrisque compositis perficiatur quod conuenit. Aptus est ad uenæ sectionem habitus corporis durus, multi sanguinis, densus, & ægrè transpirans. Status aeris humidior. Resistit uenæ sectioni puerilis ac senilis ætas, temperamentum calidum, ac siccum ualde, & tempus ac regio cõsimilis, & qui natura humidiores sunt, & præsertim cum caliditate, & qui raro habitu præditi sunt. Insuper quibus os uetris aut amara bili ualde uexatur, aut debile est, aut ultra iustum subtili sensu præditum: hi enim omnes facile transpirant, & in uenæ sectione animi deliquis corripiuntur, ex quibus ægrè reuocari possunt. Similiter autem etiam triginta annorum fuerit is cui uena secanda est, uerum humidus & mollis, & pinguis ac albus corpore, & paruas uenas habuerit: huic aut omnino non uenam secabis, aut parum detrahes: omnino quidem non, ætatis tempore & in reliquis eiusdem ordinis: parum uero, alijs temporibus



temporibus ac reliquis cōstitutionibus. Proinde alii qui in animi deliquiū collapsi in ipsis medicorū manibus, nō sunt reuocati, quare si quis euacuasset citra uiriū dissolutionem, non perisset. Aliqui uero per omnē deinceps uitā, totum corporis tēperamentum frigidius habuerūt, propter immodicā euacuationē, ut quidā in malo corpore ac habitu uitam degerint: quidā uero ex hoc ipso perniciosi morbis correpti sint, ab aqua inter cutem, & erectæ ceruicis spiratione, hepatisq; ac uētris debilitate, & semī sīderatione: optimū igitur est, quēadmodum nos semper facere uidisti, nō dierum numero animum aduertere, neq; soli multitudinī, sed uiriū robori, in omnibus quidem, uerum maxime in continentibus febribus: si enim uires conseruentur, non solum sexta ac septima, sed etiam sequentibus diebus uenam secabis.

*De frigida aqua exhibitione.*

*Cap. LXXII.*

Si aliquando coactus fueris curare aegrotū, qui non solum antea uenæ secandæ auxilium omisit, sed etiam nunc aut propter timiditatem aegroti, aut cognatorum sanguinē detrahēre prohibearis: ad frigida exhibitionem deueniendū est exacta præscriptiōe facta, quantū ex ipsa fieri possit detrimentū. Nā si hoc paruum uel omnino nullum futurū est, danda est in potu frigida sincera quantū eger eius uoluerit. Tunc autem danda est frigida, quum in urinis uideris coctionis signa. Neq; autem in principio, neq; in augmento danda est frigida, sed in ipso uigore totius morbi, ac particularis exacerbationis. Oportuno enim tēpore data frigida, corroborat solidariū partiū naturam. Corroborata uero natura præattenuatos humores aggreditur, ut bonos quidē detineat, inutiles uero eiciat, aut per uētre, aut per uomitus, aut sudores. Si uero frigida potior fuerit eger tēpore sanitatis ualde confidenter frigida dato, ipsa experientia doctus, omnia uiscera frigida familiaritatē sustinere. Si enim omnino aliqua pars adeo frigida esset, ut ab ipsa læderetur, sanitatis itaq; tempore euidentis detrimentum ostēdisset. Quum autem nulla pars in sanitate læsa sit, ne in febre quidem lædi poterit, quū maximum propugnaculum habeat in profundo ardentis caloris multitudinē. Quapropter his qui modicum sanguinem, & minimū carnis habent, frigida potus periculosior est. Cito enim ad solidas animalis partes pēnat carnis nudatas. Quapropter etiam habituales febres, neq; sincera, neq; multa frigida opus habent: Tenuia enim sunt in ipsis ac modici sanguinis corpora. Vnde quū magni detrimenti timor imminet in ineptis, à frigida exhibitione abstinere oportet, & uti alijs auxilijs, quæ obturationes reserant, & multitudinem euacuant, & feruorem febris mitigāt. At uero detrimēta ex intempestiuo frigida potu orientia hæc sunt: Viscosos ac crassos humores attenuari ac transpirare frigida impedit. Quare siue inflammatio fuerit in aliquo uiscere, siue ignis sacer, siue indurata, siue mollis ac laxa affectio, frigida potus ad huius sanationē nihil cōfert: sed euestigiō quidem non modicam affert lenitatem, eod quod febre iam factā extinguit. Manente autem intus causa, quū ex frigida densatum fuerit corpus, aliam febre accendit priore grauiorem. Atq; hæc quidē detrimēti species contemni poterat. Verum pleriq; debilia habentes uiscera, citius ac facilius à frigida exhibitione læduntur. Quibusdā enim stomachus siue gula adeo

fortiter affectus est, ut perdiderit actionē, & uix potuerit deglutire: Alijs uēter lēsus est, ut uix cōcoquere potuerit: Alijs hepar, ut ex hoc in aquā inter cutē inciderint. Alijs colū, aut pulmo, aut renes & uesica, aut aliud quid à frigida læsum, debile ad propriam actionem factū est. Quidā ipsorum statim erectæ ceruicis spiratione, aut alto sopore, aut lethargo, aut aurī abscessu, aut conuulsionibus, aut tremoribus, aut sīderationibus corripuntur. Et ut in summa dicam, Omne neruorū genus & caput ipsis affligitur. Noui quod formidinem tibi induxerim per ea quæ retuli, ad frigida exhibitionē. Verum uidisti me sæpe ipsa oportunē usum esse, & in quibus dare oportet. Et semper utilitatem assequutum esse, citra ægri læsionem.

*Dieta in febribus continentibus.*

*Cap. LXXIII.*

Quibus uena secta est, his ego post duas uenæ sectæ horas, semper do modicum ptisanæ succum, & iubeo quiescere. Et postquam ex somnis surrexerint, rursus similiter ptisanæ succum exhibeo, & in hoc perseuero usq; ad tertiam diem. Quarta serē semper in balneum duco. Tales enim oportunē uena secta uiribus robustis, & ad animi deliquiū euacuati, necessariō sequitur non longē postea uentris secessus, attenuatis uidelicet humoribus, & leuatis ac corroboratis uiribus. Aliquando uero etiā bilis uomitus. Ad quæ statim etiā humiditates per totum corpus aut sudores succedunt. Quare confidenter hos lauato quarta die. At uero tempus exhibendi cibi in febribus continentibus, tum his, quæ iam relatae sunt, tū his quæ postea referentur, quæ sanē unā solum ab initio usq; ad finē exacerbationē habent, est bona ægri tolerantia & cōsuetudo. Tunc enim ipsis cibi dandi sunt, quando tolerantissimi sibi ipsis esse uidetur. Et illo præsertim tēpore diei, in quo etiā prius morē accipiendi cibi habuerunt: maxime enim toleranter pertulerint cibos isto tēpore acceptos. Robustis igitur uiribus, & dū uigor morbi breui expectatur, tenuissimo uictu uti licet. Vbi uero uires ægræ sunt, non licet tenui uictu uti, citra magnū detrimentū. Quare alimentis tantum apponendū est, quantū roboris uiribus detractū est.

*Vniuersalis doctrina de febribus putredinosis.*

*Cap. LXXIII.*

Transpirationis angustia ac impedimentum meatuum obscurorum totius corporis obturationem facit, per quos fumosæ & fuliginosæ superfluitates quotidie transpirant. At obturationis affectio quū parua fuerit, & probe tractata, diariā febre efficit. Quum autem siue propter magnitudinē, siue imperitiā Medicorum consuetū diariarū tempus excesserit, aut continentem, aut aliā quandam ob humorū putrefactionem accendit febre. At uero transpiratio multiformiter impeditur, & dum densantur meatus propter siccitatē, aut adstrictionē cutis: & dum obturantur propter multitudinē & crassitudinē ac uiscositatē humorum. Dū itaq; quotidie fumosarū ac fuliginosarū superfluitatū trāspiratio impeditur, naturalis in nobis calor affligitur. Alius uero præter naturam corporibus accedens, primū humores propter humiditatem putrefacit ac corrūpit: Progressu uero tēporis etiā pinguedinem ac carnem, & ipsa solida corpora inuadit. Est autē putrefactio essentia putrescentis corporis ad corruptionē transmutatio, à calore præter naturam fiens. Putrescentes igitur humores, aut intra uasa arctati, continuas & nunquā intermittentes



res usq; ad perfectam morbi solutionē febres efficiūt. aut per totū corpus delati, & extra uasa elapsi, quā dā febrem per circuitū accedentem, & interualla habentē accendūt, uelut tertianā, quartanam, quoridianā, aut aliā consimilē. Causa uero cur nō excidant extra uasa humores in febribus cōtinuis, est aut multitudo, aut crassitudo, aut uiscositas ipsorum. Quē admodū igitur dum inanimata corpora putrescunt, primū abijcimus ex ipsis quæ iam putruerūt, dein de reliquū in aēre frigido suspendimus, & perspirationes perfrigerantes molimur: Eodē modo sanabimus in humanis corporibus putrefactionem, quod quidē iam corruptū est omni modo euacuantes. Reliquum uero gestationibus moderatis & transpirationibus perfrigerantibus, ad exactam ac naturalem proportionē reducentes. Proinde ubi prius de non intermittētib; febribus tractauerimus, mentionem faciemus deinceps & reliquarum.

*De febribus putridis.*

*Cap. LXXV.*

Quum in omnibus uasis, & præsertim maximis, circa alas ac inguina, ac cōsimilibus, sanguis calidior & equaliter redundans putruerit, febrem putridā continentē efficit. Plerumq; uero in corporibus multi sanguinis ac carnosus, & denso habitu præditis, & superfluitatibus calidis refertis hæc generatur. Proinde his iam febriētibus pulsus maximus & æqualis ac uehementis est, & qui cōpagem arteriæ neq; duriorē, neq; molliorem habet. Ad tantā uero uelocitatē ac densitatem uenit, ad quantā magnitudinē ipsa febris uenit. Atq; hæc quidem ambabus cōmunia sunt, huic uidelicet, & prædictæ cōtinenti citra putrefactionē febrī. Verum huic præcipua putrefactionis signa in urinis, & pulsibus, & caloris specie adsunt. Curatio uero harū febriū, in utroq; genere cōmunicat, tum in eo quod cum putrefactione, tū eo quod sine hac est. At essentia quidem & uniuersa ipsarū natura, ex genere putridarum est. Verū quatenus una est tota ipsarū exacerbatio, ab initio usq; ad totius morbi solutionē, eatenus cōmunicat cum cōtinenti absq; putrefactione. Oportet itaq; etiam curationē ipsis in hoc solum cum illis cōtinentibus cōmunem esse. Per alia uero omnia bifariam secari, ita ut quosdā medēdi scopos ex genere putridarū accipiamus, quosdam uero ex propria ipsarum essentia. Sanguis enim est qui in hac febre putrefactionem suscepit. Sic uero etiā alias differentias putrefactorum humorum sanare cōuenit, iudicationem partim à putrefactione sumendo, partim à propria uniuscuiusq; differentia, uelut pituita, aut utraq; bile. Quandoquidem igitur putridarum febrium septem subiecta sunt præter naturam, à quibus iudicationes sumuntur, nempe copia humorum, & crassitudo, & uiscositas, & obturatio, & transpirationū suppressio, & putrefactio, et febris non habēs interuallum, unāquāq; sanē ex relatis affectionem sanare oportet per cōtraria. Copiam per euacuationem. Crassitudinē per secantia. Viscositatem per exurgentia. Obturationē, aperientibus. Transpirationū suppressionem, si quidē propter cōstrictionem cutis facta est, per diffundentia: si uero propter densitatē, per rarefacientia. Deinde putrefactionem, extergētib; & alteratib; ac transmutantibus. Febrem autē, per frigefaciētia. Quū igitur uires fuerint fortes, uena & his secanda est, nisi cruditas uentris, aut alterius cuiusdā partis prohibeat, uelut antea dictū est. Nam

ex his quæ de illis diximus, considerāre oportet conuenientia etiam de his. Quandoquidē uero neq; obturatio neq; putrefactio curari potest per solā uenæ sectionem, quum alijs auxilijs opus habeant, reseruare aliquid sanguinis oportet ad curationis tēpus, ut ne necessitas aliqua ingruat, ob inopiam, intēpestiuē nutriendi. Quantū enim ad talem febrē attinet, omni nō non nutrire oportet: Quātum uero ad sanguinis euacuationem, nutrire opus erit. Quare ex duobus alterum necessarium erit, ut aut nutriendes febrē augeamus: aut non nutriendes, uires dissoluamus. Melius igitur, uelut dictū est, relinquere sanguinis proprium alimentum animalis partibus. Et ipsum contentum esse modicis sorbitionū exhibitionibus, uelut sunt ptisana & aqua mulsa, quibus ut medicamentis magis quā alimentis opus habemus. Si uero ob aliquā causam relictū fuerit uenæ sectionis auxiliū: hominī per tenuem uictum connutrito, quum iam concocti fuerint humores, & crassitudo ipsarum fuerit præattenuata, febre in uigore existente, dabimus frigidam aquam, uelut in superioribus cōtinentibus febribus, nisi quid ex illic relatis prohibeat exhibitionem. Quod si uero etiam frigidæ potionis auxiliū fuerit relictum, alijs auxilijs utendum est, quæ obturationes aperiant, & multitudinem euacuant, & feruorem mitigant, uelut antea dictum est, & deinceps consequenter referetur.

*Communis dieta omnium febrium putridarum.*

*Cap. LXXVI.*

In omnibus putridis febribus in cōmuni putrefactos humores expurgare oportet, per urinā, & uentrem ac sudores. Hoc enim cōmune est omni putredini. Si uero aliquando sua sponte ad os uentris impetū fecerint, per uomitus euacuentur. Alioqui non oportet ægrē uomentes præter naturam irritare, ut ne uires oris uentris exoluantur, quibus maximē in morbis opus habemus. Eligenda uero sunt quæ citra calefactionem ac resiccationē prædictas euacuationes perficere possunt: Velut est ptisanæ succus, & aqua mulsa, acetum mulsum simplicissimum, & fauorū melis elotorum cremor, apomeli Græci uocāt, & radicis apij decoctum. Aqua itaq; mulsa ad secādos crassos humores, & detergendos uiscosos, & promouendas excretiones, optima fuerit, in febribus ex coarctatione ac putrefactione obortis, & præsertim cōtinentibus putridis. attamē febrilem calorem auget. Quare si immodica fuerit caliditas ab aqua mulsa abstinendum est, & utendum ptisanæ succo. Si uero obturationes ægrē solubiles esse iudicauerimus, acetum mulsum dandum est: quanquam & hoc si quis immodicē utatur, intestina radit, & tussim mouet, & neruofas partes lædit, ut difficilē sit reperire tale auxiliū, quod nihil lædens multū proffit, atq; hoc cōtingit propter cōplexum affectionū præter naturā in corpore. Quapropter his qui facilē à quacūq; re exhibita læduntur, melius est ut ptisanæ succo utantur, donec ualidius alimentū accipere possint. At si alius nō egerat, aqua mulsa cum solo oleo infusa eluatur. Totū uero corpus forinsecus ante euacuationem discussorij diffilare nō oportet, post euacuationē uero discussorij uti licet. Pharmacis autem utēdum est tepidam caliditatem habentibus, uelut est oleū chamæmelinum, & in hoc tempore, inter discutiendum iniquā, etiā uinum aquosum, potū omnes excretiones mouet.



mouet. Cōcoctione uero manifesta in urinis apparēte, etiam lauare licet, dulcis & potabilis aque balneo.

*De febribus continuis.*

Cap. LXXVII.

Febres continuæ eiusdem generis sunt cum intermittētibz siue interpolatis. Eiusdem autem generis dico cum tertiana exquisita, febrem ardentem (causum Græcis dictam) exquisitam, & cū quotidiana, eā quæ quotidie exacerbatur, & tamen nō intermittit. Nam & febris ardens omnes alias exquisitæ tertianæ notas seruat, & in hoc solum ab illa differt, quod cum rigore non irruit, neq; intermittit. Et quæ quotidie exacerbatur, similiter omnes notas habet cū quotidiana. In eo uero quod non intermittit, eiusdē cum illa generis est. Eodem modo etiam quæ per quartā exacerbatur, non autem intermittit, eiusdem generis est cū quartanis. Et manifestum est quod neq; rigor exacerbationes præcedit, neq; sudor consequitur in hac febre, quemadmodū neq; in febre ardēte. In febre ardente rigor superueniēs soluit ægritudinem. Differt autē febris ardens à continente putrida, eò quod hæc ex sanguine putrefacto conflatur, & à principio usq; in finem unam habet exacerbationem. Febris autem ardens ex flaua bile putrescente incenditur, & alternis diebus exacerbatur, & quādam habet febris imminutionem ac uelut remissionem. Continens uero putrida similis manet usq; ad solutionem.

*Cura febris ardentis. Philum.*

Cap. LXXVIII.

Est igitur febris ex flaua bile putrefacta incensa, continua ardentissima, & neq; medicis, neq; ægris bonū ordinem exhibet. Lingua enim in his arida est, & nigra ac aspera. Morsus item uentris, ac sitis intolerabilis, & uigiliae. Aliquando etiam delirium. Primum itaq; leniter ac blandē hanc febrem aggredi oportet. Vbi uero concoctionis signa apparuerint in urinis, & morbus iam uiguerit, acrius instare, & ad frigide potum accedere. Nisi & hic aliquid prohibeat ex his quæ de cōtinentibus febribz relata sunt. Prima uero auxilia in febre ardenti sunt: Decubitus in locis frigidis, qui ad purū aërem patent ac perflantur. Stratum molle & sepius renouatū. amicula assiduē permutata, & satis gracilia & non sordida. Lectus sit abunde amplus, quo possint mēbra calefacta subinde ad alias atq; alias eius partes transferri. Et per flabellum aër ignauior cōcitetur. Epithemata cōueniunt pectori ac stomacho imposita, palmulæ cū uino & rosaceo, aut melino tritæ. Sunt & frigefaciētia commoda, uelut sunt pampini uitis triti, seris, polygonū, plātago, ramenta cucurbitæ, lactuca, rumex acutus. Singulis autem ammisceantur micæ panis præmadefactæ, aut polentæ. Oportet tamen assiduos horum usus deuigare. At uero panniculi linei complicati moderate graciles aqua & oleo calido imbuti, & pectori ac stomacho impositi, ardētem febrem mirifice mitigant. Sed & aqua & oleum calidum, aut aqua & oleū rosaceum, ex alto in pectus delata per lane manipulū, uehementiā ardoris facile obtundunt. Oportet autē abunde calida esse aquam & oleū, aut aquā & rosaceum. Tepida enim partium firmitatem exoluant. Si uero parum niri his ammixtū fuerit, sudores excludere poterint. In ardentissimis autem febribz etiā aceti parū ammiscēdum est. nā & hoc quod debet facit. Cibi porro offerendi sunt humidissimi, & nihil acre habentes, uelut sunt lactucæ, caules cum posca aquosa feruefacti, & cucurbitæ similiter cum

posca. Sed & ptisanæ succus tenuior dandus est absq; sale, aut alio additamento. Et aliquando post cibum aquam frigidam cochlearij unius aut duorum mensura absorbeant. Aut sit potius ipsorum potus in totum lactei teporis. Sed & aqua frigida fracta colluēda ac gargarissanda præbeatur. Et rosarum succi cochlearium absorptum stomachum refrigerat. Quin & alia animi oblectamenta procurentur. Folia uitis uiridia, item myrti ac rosarum per pauimentū spargantur, & aqua frigida frequenter irroretur. Et aque salientes in uicinia sonum edant. Tempus autem frigefaciētiū epithematum ac similiū, est uigor exacerbationis. Nam in principiis ac augmentis exacerbationum, dum adhuc inæqualiter affectum est, & caliditas circa uiscera residet, si hæc adhibeantur, diffundunt quidem sensum, uerum repellentia caliditatem in profundum, malus detrimentum inducunt, incluso intus feruido calore, & rursus febrem ardentem efficiente. At in uigore exacerbationum, ex passa caliditate per totum corpus, facile extingui poterit ea quæ adhuc reliqua est circa uiscera. Nam & melius spirantes, & minus siticulosi fiunt, his in tempore adhibitis. Et ipsorum roscido uapore excluso, ad somnum conuertuntur. Cæterum instante iam uigore totius morbi, & nullō prohibente ex his quæ in cōtinenti febre relata sunt, tempus iam est frigida exhibendæ. In quibus igitur confidimus, nullum ex uisceribus, neque caput, uelut dictum est, læsionem incursum, sinceram sanè frigidam exhibemus. In quibus uero metus est, atque is uel minimus impedimento est, pro prima uice fractum exhibebimus potum siue frigidam. Frangitur autem si quis temperatæ aquæ calidæ cyathum unum, ad quinque frigida puræ sinceræ ammiscuerit. Atque talis potio suspectis corporibus exhibetur. Quidam uero olei rosacei cyathum frigida exhibendæ affundunt, & sic exhibent. Ipsum enim rosaceum non ualde frige facit, & oleositas eius corporibus intus oblita, non permittit ipsa à frigida aqua lædi. Et simul firmitatem quandam exhibet uentri rosaceum, & lubricitatem, propter oleositatem. Quidam pro rosaceo, melinum exhibent. Porro balneum illis solum cōuenit in ardenti febre, qui citra tumorem aliquem inflammatum, aut erysipelatum ægrotant, ubi concoctionis signa apparuerint in urinis. Quod si quis iuuenis sit carnosus, tempore æstatis, & constitutione calida ac sicca, febre in uigore existente, & concoctione in urinis apparente, citra uisceris alicuius inflammationem, & in lauacrum frigida notatorium seipsum iniiciat, atq; natet, sudores utiq; commoueat. Si uero etiam ad frigida balneū aduersus fuerit, ualde confidenter hoc auxilio utatur. Quibusdam enim statim uenter biliosa egessit. At si moderata est febris, & uires robustæ, unā cum cōcoctionis signis, prosunt ipsis balnea dulcium ac temperatarum aquarum, & ex ungentis chamæmelinū, præsertim si aër ambiens, frigidus fuerit. Nam si aliquando contigerit, ut frigido existente ambiente æger fortiter à febre exuratur, modicam salutis spem de ipso habere oportet. Si uero neq; concoctionis signa affuerint, in tali aëris statu, neq; uires fortes habere apparuerint, tale seruari impossibile est. Quare neq; lauabis ipsum, neque inunges rarefacientibus medicamentis, neque uinum dabis, neq; frigida. In quibus enim desperata



est salus, uanum est auxilia multos seruantia imperitorum calumniæ exponere. Proinde ego sanè Medicos quosdam noui methodi ignaros, qui imitati sunt ea quæ à nobis fieri solent, & usi sunt his auxilijs, in his qui penitus mortui fuerunt, & neq; quicquam profecisse, & oportunum ipsorum usum suspectum ac horrendum fecisse. At nos & temporum occasiones, & auxilia describimus, in his qui seruari possunt. Nam qui incurabiles sunt ægri, his neq; occasio neq; auxilia commodant.

*Tertianæ exquisitæ dinotio.*

Cap. LXXIX.

Febris tertiana exquisita in corporibus natura biliosioribus omnino consistit, & in ætate uigoris, & maxime tempore æstiuo, & in locis calidis ac siccis temperamento, & in tali ambientis nos aëris statu. Sed & uita in laboribus, & curis, ac uigilijs, ardoribusq; & paucò alimento, eorū calido & sicco. Et immodicus calefacientium ac siccantium potionū ac medicamentorum usus, apta sunt ad febrem tertianam. Quum igitur gignatur tertiana, ex flaua bile putrefacta, ac mota, & extra uala lata, statim à principio rigorem insignē inducit, qui à quartanæ febris rigore in hoc differt, quod in tertianis pungi ac uulnerari corpus uideatur. Nam in quartanis inuasio uehementem perfrigerationem habet, & magis in profundo. Quotidianam uero neq; rigor omnino præcedit, sed magis circumfrigesunt. Est etiam in tertianis febribus ordo pulsuum exquisitus, & æqualitas. Excitatur autē in progressibus exacerbationum pulsus ipse ad uehementiam ac magnitudinem & densitatem. Sitim etiam inducit tertiana, maxime in uigore, & hominē exurit, ut se denudet & abijciat uestitum, & magnū ac densum spiritum ducat, & uelut flammam quandam efflet, & frigidam bibere expetat. Et paulo post calor æqualiter per totum corpus extenditur. Quod si etiam manum inieceris corpori, iuxta primū contractum calor multus & acris occurrit, qui uelut eū uapore quodā affertur. Vincitur autem paulo post à manu, & sanè iam etiam bibere tempus est ægro, atq; ubi bibit, statim multitudinē calidi uaporis per cutem remittit, prænuntiam sudoris, & uomitus bilis apparet, & aliquando etiam uenter egerit. Urinæ uero his sunt biliosæ & subfuluæ ac subflauæ, & moderate crassæ, & paulo post aut nubeculā albam, aut quiddā in medio dependens bonū efficiunt. At si fuluiores fuerint urinæ, & neq; quid in medio pendens, neq; nubecula, in primo circuitu apparuerit, ad septē circuitus extendetur morbus. Verū exquisita tertiana quæ in primā die ostendit in urinis subsidentiam albam ac leuem, & æqualem, tertium circuitum non transgreditur. Hæc febris in integrā febris quietem desinit post exacerbationem, uniuersum exacerbationis tempus duodecim horarum ad summum facies, & non plurium. Atq; hanc exquisitā tertianam nominamus. Quæ uero diuturniorem habuerit exacerbationem, eam appellamus extēta. Si uero quotidie exacerbauerit, cum rigore irruens uehementi, habuerit autem omnes prædictas notas in pulsibus, & urinis, & reliquo corpore, hanc duplam tertianam nominamus. Et hoc contingit propter multitudinē & crassitudinem & bilis inæqualitatem.

*Tertianæ exquisitæ curatio.*

Cap. LXXX.

Tertianam igitur exquisitam uelut à flaua bile comota fientem, humectare ac frigefacere quantum eius fieri

potest, conuenit. Et quæ quidem in supernū uentrem confluunt, euacuare per uomitus. Quæ uero infernū subeunt, similiter per infernā excretionem. Sed & urinis ac sudoribus uia aperienda est, & uenter quidē mollibus infusis euacuandus est. Urinæ autem propellendæ sunt, apio & anetho in potionibus maceratis. Et si concoctionis signa apparuerint, confidenter iam etiam absinthij comam aqua mulsa macerata ac excolatam dabis. Balnea uero ipsis cōueniunt, ex aqua calida potabili temperata, & neq; nitrū, neque aliud quiddā tale in balneis adhibere, sed aquam & oleū præcalescto corpori circūfundere, & in calidæ solium locare, ac hortari ut in ipso moretur quātum eius fieri potest. Eos uero qui balneum amant, etiam si bis laueris, non peccaueris. A uino uero abstinentum est penitus priusquā cōcoquatur morbus. Vbi uero cōcoqui incipit, tenue & aquosum ac modicū, primum dandum est, prope solutionem uero, uberior. Cibi qui humectant ac frigefaciunt, omnes cōmodant tertianis exquisitis. Quantitas uero in ipsis tanta sit, quantū probè concoquere possunt. Et ex oleribus quidem cōueniunt atriplex, blitū, malua, lactuca, & cucurbita. Ex reliquis autē prisanæ succus, & sorbitiones ex alica, & pisces petrosi, & ex uolucris quæ mollem carnē habent. Ex alijs alas, & gallorū testes, & suillos pedes, ac cerebella, & paruorū porcellorū extremas partes dare conuenit. Sorbēdi sunt etiā ouorū uitelli, & fructus gustandi non ægrè concoctiles. Abstinentum uero ab omnibus dulcibus & acris, & salis, nidorosisq; ac uirosis edulij ac potibus. Et à ueteribus ac natura calidis uinis.

*Tertianæ spurie curatio.*

Cap. LXXXI.

In non exquisitis tertianis, neq; lauare statim ab initio bonū est, sed quando iam apparuerint signa concoctionis: neque quotidie nutrire, sed satis est alternis. Quies autem & calfactio præcordiorū ipsis conducit, & sorbitiones cōcoctu faciliores. Infusa item inferni uentris non ualde mollia. Et si sanguinis detractione opus habuerint, neq; hæc relinquatur, sed statim ab initio distinctione facta, uelut in Sermone de uenæ sectione dictum est, moderatus sanguis auferatur, quantum in præsens satis est. Totus uero diætæ status non frigefaciens & humectans sit in totum, uelut in tertianis exquisitis, sed etiā quid de incisorio ac calfactorio modo assumat. nimirū uelut crassiore bile subiecta, & nō ualde calidiore. Maxime uero contulerit ipsis prisanæ succus, iniecto pipere & hyssopo aut origano. Sed & nardi spicam cū aqua mulsa cōcta bibendā dato. Et alia quoq; quæ urinā cient, præterquā extremē calfaciētia ac siccātia. Maxime quoq; absinthij cremor assidue dādus est post septimā diē. Sed & acētū mulsū multis profuit potum. Et aliquod lene purgatoriū, bona cōcoctione in urinis apparente. At uero uomitus ab accepto cibo, usq; adeo cōmodus est his qui in hac febre perseverant, ut multos nouerim statim perfectē liberatos ex huius usu.

*De hemitritæo, hoc est, semitertiana.* Cap. LXXXII.

Febris semitertiana appellata, fit pituita putrefacta ad putrefactū amaræ bilis humorē ammixta, & est ex duabus febribus cōposita: quotidiana enim cū circūfrigefactione irruente, tertiana uero cū rigore, febris ex ambabus mixta, horrorem inducit, & de rigore quidē minus, plus autē de frigefactione, id quod extremitatibus permixtis contingit. Itaq; neq; absonū

nomen



nomen huic febrī imposuerunt qui hæmitritæū dixerunt. Duplex est autem modus generationis eius. Aut duabus exacerbationibus uno tēpore coincidentibus: Aut statim ab initio utriusque inter se permixtis. Quum igitur tertiana prædominatur, horridior febris fit, & iuxta accessione etiam aliquid rigoris assumit. Statim uero talis etiam calidior est & æstuosior, & quendā bilis uomitum, aut egestionē, aut sudorē inducit. Vbi uero altera pituitosior febris præualet, prædominatur quidē frigiditas extremitatū, uerum modici sunt horrores: & non sunt siticulosi, neque æstuoſi. At ubi æquales magnitudine fuerint, & tertiana interpellata, & quotidiana cōtinua, inuasio quidē exacerbationis cum horrore contingit. Et quum pituitosa febris dominatur, cōtractiones fiūt ac horrores. Quum autē biliosa febris præualuerit, acruatim incalescunt. Atque hæc quidem est semitertiana exquisita, ex tertiana intermittēte & quotidiana continua cōposita, ambarum febrīū temperatura æquali existente. Cæterū semitertiana nō exquisita, aut biliosum humorē habet, aut pituitosum. Quū igitur ex utrisque relatis humoribus semitertiana febris cōfletur, etiā curationē mixtā esse cōuenit. Quare ex his quæ de tertiana relata sunt, & ex his quæ de quotidiana dicuntur, curationem cōponere oportet.

*Quartanæ exquisitæ dinotio.* Cap. LXXXIII.

Quartana exquisita omnem ætatem inuadit, præcipuè tamen inclinatam. Hippocrates autem in libro de septenario, uigoris ætatem dixit. Idem asserere uidetur, eundem hominem non bis quartanam febrem incidere. Verba eius sunt, Primum quidem quartana febre idem homo bis neque capitur, neque unquam captus est, neque de cætero corripitur, si semel sanus fiat, & hoc propterea: iuxta propriā uniuscuiusque hominis naturam, & ætatem uigoris contingit. Necessè enim est uigentem hominis naturā in hoc tempore quartana febre corripi. Præterito autē uigore, exolutam esse & à quartana, & ab inuasionē. At uero naturæ corporum magis atrabiliariæ hanc febrem perferunt, & ex temporibus Autumnus, & præsertim ubi ipse seipso fuerit frigidior ac siccior, & inæqualis. Edulia item ac potiones, & totus uitæ uictus siccus & frigidus tempore existens, quartanarū febrium signū est. Et lienes aucti. Hæc autem febris nō statim à prima die omnino irruit cum rigore: Sed aliquando ex alijs in hanc fit transmutatio, ex his quæ erroneæ ac inordinatæ uocantur. Verum in progressu rigor accedit, & cum augescēte etiam rigor augeatur. Sensus autem ægrotis contingit, non uelut pungetur & stimuletur cutis, uelut in tertianis cōtingit, sed & perfrigerantur uehementer, & uelut franguntur usque ad ossa. Proinde audire est ægros dicentes, quod ossium lassitudine tenentur, & carnem cōfringi imaginantur. Pulsus porro sunt parui, obscuri, ac rardi & rari in principijs accessionum, uelut in nulla alia affectione. Etenim iuxta inuasionē quartanarū arteria tibi ligata esse uidebitur, & introrsum retrahi, ac prohiberi à regressu. Quare etiam si iuuenis fuerit æger, tamen senilis extremæ ætatis motū arteria imitatur. Si enim ægrotantis naturalem pulsum noueris, aut in principio exacerbatiōis alterius morbi affueris, nihil aliud expectaueris quo minus pronūcies, irruentē à principio febrem quartanam esse, adeo immēsa quendā mutatio pulsus ad raritatem ac

tarditatē fit. Urinæ uero his in principio quidē albæ ac tenues & aquosæ, nimirū propter materiæ crassitudinē percolatæ. Progrediente uero morbo, pro ratione colorationis fiūt, & subsidentia habet crassam. Sequitur autē sudorū copia circa exacerbationis declinationē. Ex Rufo. Quartanæ igitur à splene initium sumentes, diuturniores sunt. Fiunt autē manifeste ex colore, & cruditatibus, & quod uenter non facile egerit, & ex splenis tumore, & quod ad sinistram magis se reclinent. Est autem periculū ne progressu temporis etiam in aquam inter cutem incidant. At uero propter hepar inflammatum quartanarij, coloris sunt albicantis, & toto corpore tumidi, & urinæ his sunt ualde rubræ, sandaracham referentes. Et ad contactū tumor dextri præcordij occurrit. Et hi etiā magis difficulter spirant quàm splenici, & subuulsiūt, & postremum in hydropem inuitabilem delabuntur.

*Quartanæ curatio.* Cap. LXXXIII.

In principio igitur moderatè ac leniter tractandi qui ex quartana febrī laborāt, ita ut neque medicamentū aliquod forte adhibeamus, neque euacuationē, nisi sanè sanguis ualde abundare uideatur. Tunc enim moderate sanguinē auferre oportet. Et si diducta uena sanguis fluens niger ac crassus fuerit, cōfidenter euacuat. Talis autē in splenicis maximè reperitur. Vbi uero flauus ac tenuis apparuerit, statim cohibe. Secūda est autē uena, aut interna, aut media, in sinistro cubito, si splenicus fuerit homo: Aut in dextro, si circa hepar fuerit affectio. Diæta uero sit flatus expers, & bona. Venter autem molliatur quantū eius fieri potest, per consuetos cibos. Si uero hi nihil profecerint, infusis per clysterem utendum est, primum quidem mollioribus, postea acribus. Prohibendæ sunt carnes porcinæ, & omnes uiscosæ ac tardi transitus. Item frigida ac humida edulia omnia. Vīno utendū est pauco, albo & tenui, ac moderatè calido, uolucris autē motanis. Et piscibus mollis carnis, ac facilis cōcoctionis, & nihil uiscosum habentibus. Utendū est etiam salisamentis ac sinapi. Et per dies aliquot accipiendū est pharmacū ex tribus piperis generibus, & diospolitico cum appellatū. Et si piper solū tritum quotidie acciperint, recte utique fecerint. A frictionibus autem & deambulationibus & alijs consuetis, non penitus arceantur. A balneis uero abstineant, frictionibus cōtenti, quæ ualde profunt. Et si breuis fuerit ac nō ualde uiolenta quartana, non malū fuerit in intermedijs diebus cōsuetā exercitia contingere. Atque hæc quidē in principio ac augmento faciendā sunt. In uigore uero morbi tenuiore uictu utendum est, & iubendi sunt ægri diu quiescere, & uisceribus prospiciendum est, adhibitis fomentis ac cataplasmatibus mollire ac laxare potētibz, & flatus dissoluere. Talia uero sunt, farina ordeacea, & semen lini, iris, cuminū, chamæpitys, & ruta, in aqua mulsa cocta. Oleum quoque à fomento cataplasmati miscendū est. Oportet autem primum olei foru per paucos dies irrigare, atque ita cataplasmatibus uti, in die uidelicet adhibitis, si æger ferat. Epithematis autē utendū est polyarchio, & eo quod ex styrace paratur, & similibus. Cōsequenter autem etiā urinam ciētibus utendū est. Et aqua mulsa in potu exhibenda, in qua cocta est ruta & anethū. Quod si concoctionis morbi signa euidenter apparuerint, confidendum est statim pharmacis humores nigros euacuantibus, & nō semel, sed sæpius, si opus fuerit.

Conuenit



Conuenit autem Epithymū quartanis potum, & Veratrum nigrū maximè prodest, eò quòd citra molestiam euacuat ea quæ molestant. Et uinū dulce in uacuum colocynthidis calicē infusum. Omnibus tamē miscendū est apium, aut anisum, aut dauci semen, iucunditatis gratia. Assiduè etiam betæ ac ostreorum decoctum bibant. Conueniunt his quoq; aloëdaria Oribasij, quæ sic habent. Aloës drach. c. spice nardi, asari, mastiches, croci, xylobalsami, singulorū drach. vi. cassiæ drach. xii. epithymi drach. xvi. ueratri nigri exempta medulla drach. viii. forma pilulas magnitudine erui cū pulegij decocto, & exhibe pro uiribus. Possunt & cū melle cocto pilulæ formari. Ego uero etiam ueratrum internum adieci. Utendum est & uomitibus à cibo, & à raphanis, si nihil impederit. Pleriq; enim ipsis assiduè usi, partim perfectè à morbo liberati sunt, partim facile pertulerūt. Nam unā cū hoc quòd euacuant ea quæ stomachum infestant, etiā facilius concoquant tales, ubi uero nihil iam prohibet, etiā album ueratrum dandum est, primum quidem raphanis infixum uelut in Sermone de purgatorijs dictū est, postea uero etiā ipsum per se. Qui uero uomere non possunt, his uehementius infernè purgatis dandum est medicamentum ex uiperis, theriaca appellatum, & reliqua quæ ad tales febres laudantur. Inter quæ est & familiare illud nobis omnium probatissimum, quod recipit succi cyrenæici, & piperis, & myrrhæ troglodyticæ, & foliorū rutæ uiridiū, singulorum æquales partes. Singula seorsim leuissimè teruntur, & ruta cum melle trita excipiuntur, fiuntq; pilulæ, de quibus aliquibus obolus unus, alijs duo exhibentur. Aliud Asclepiadæ, hoc etiā somnū facit, quo etiam ipse utor piperis longi, myrrhæ troglodyticæ, succi papaueris, castorij, singulorum pares portiones, efforma & utere, obolum unum aut dimidium exhibens cum aceto mulso, duabus horis ante accessione. Aliud ad quartanam, facit & ad arthriticos: hoc in quartanis dato prælotis duabus horis ante accessione, drachmæ unius pondere cum aceto mulso. Arthriticis uero cum aqua mulsa. Bituminis unc. i. myrrhæ troglodyticæ drach. ii. folijs mentæ uiridibus leuissimè tritis excipe, ac utere uelut prædictum est. Cæterū qui in principijs talium pharmacorū aliquod exhibuerunt, aut omnino ante uigorem, hi sæpe simplicè quartanam duplicem fecerunt, aut omnino maiore ac difficiliorem effecerunt. Aut duplicè antea triplicem reddiderunt, aut omnino duas difficiles ac maiores effecerūt. Noui ego quendam medicum qui ausus fuit è tribus quartanis correpto dare theriacā ante morbi uigorem. Deinde auctis omnibus accidentibus, quum febris continua successisset, hominē peremit. Archigenis. Quartana febre laborantibus, inquit Archigenes, trifolij bitumen olētis seminis drac. i. in tribus aquæ mulsæ cyathis exhibere soleo. Mirificè etiā ipsis prodest bitumen ipsum iudaicum tritū potum cum uino diluto drachmæ pondere. Verum pharmacū minimè molestum, & sæpe successum sortitū expertus sum ego hoc, maximè in quibus splenes tument, & hydrops initium capit. Hederæ corymbiferæ folia quinq; cū myrrhæ troglodyticæ magnitudine fabæ trita, in aquæ mulsæ dulcioris hemina exhibentur. Sed & castorium porū rigores mitigat, & morbosam carnē coësumit, & concoctionibus in uenis opitulatur, & se-

gniciem ad motū eximit. Ruffi. Absinthij cremor humores uentrē infestantes deterget, & concoctioni auxiliatur. Vnde neq; saliuā colligunt qui absinthium bibunt. Mitigat etiā inflammationes hepatis ac splenis, & urinas impellit, & menses muliebres. At si æger aduersus fuerit, & habitus uentris euacuatione gaudeat, & mordaces humores secedant, lac recens multum asininū aut equinū, quibusdam dedi, quos magis purgare uolui. Alijs uero caprinum, propter familiaritatem & parabilitatem. Exhibui autem ab initio heminas tres, & progressus sum usque ad sex. Deinde intermisso uno circuitu, similiter à tribus heminis incepti, & addita quotidie hemina, ad sex progressus sum, et postea detracta quotidie hemina una, rursus per duos circuitus quieui. Et simul morbus dissoluebatur, & corpus nutriebatur. Oportet autē animal boni succi esse, cuius lac exhibemus. Si uero alicui nō acescit, neq; nidorosum sit, neq; per uētre erumpit, etiā in suspecta die, sorbitionis loco moderate dandū est, multo tempore ante accessione, & bucellæ panis modicæ superingeredæ. At uero morbo in uigore cōstituto, apparente manifestissima concoctione, nullo uiscere læso, aduersus tēpore sanitatis, etiā aquam frigidā exhibui duarum heminarū mensura, instante iā propè inuasionē, & reuera à multis rigore prohibui, non parū sæpe etiam febribus exēptis. Melius est autē etiam forinsecus calefacere corpus cyprino aut sicyonio, ante exacerbationes quidem, ut ne rigeant: sedatis autē exacerbationibus, ut ne ab extrā allabentibus perfrigerentur. Dioscorides porrò dicit prodesse his qui quartana tenentur febre, hæc in potu accepta etiā ante accessione. Plantaginis radices iiii. siccæ tritæ in uino bibuntur. Verbenacæ recte quartus à terra geniculus tritus cū uino potatur. In tertiana uero tertius. Radicis ite libanotis drach. i. in uino exhibetur. Quòd si oleo illeue ris totum corpus, extremitates autem ex uingento aliquo ad rigores destinato inunxeris, & ægrum cōtectum quiescere siueris, non experietur rigorem.

Quotidianæ febris dinotio.

Cap. lxxxv.

Quotidiana febris in pituitosis moribus naturis consistit, & tēpore hyemis, & in humidioribus ac frigidioribus cōstitutionibus. Et senes quoq; magis infestat & pueros, propter edacitatē, & præsertim eos qui in humidis ac frigidis regionibus degūt, & uitā ociosam agunt cum repletionē, atq; hoc magis ubi post cibos assiduè balneis utātur, et adhuc multo magis ubi ipsi cibi natura sunt pituitosiores, & inordinatus est ipso rū usus. Hæc igitur febris neq; cum rigore irruit statim in prima die, sed tēporis progressu nō rigor, sed circumfrigefactio ægræ cōcalescens ipsis accedit. In pulsibus autē manifesta ordinis cōfusio, & inæqualitas adest, tēpore irruptionis exacerbationis præsertim, & uelocitas ac uehementia motus ipsis nō adest. Nō autē exurit febris hæc ægrotos, neq; dēsam respirationē facit, neq; crebras efflatiōes, neq; frigidæ expectentiam excitat. Sed hæc febres minimè siticulosæ sunt. Vomūt autē pituitosa. Et quæ per uentrē infernè ipsis euacuātur, frigidiora, pallidiora, crudiora, & aquosiora omnino sunt. Exudant autē nequaquā in primis diebus, neq; ad perfectā febris quietem deueniunt. Albus est ipsorū color. Urinæ albæ & tenues in primis diebus minguntur, postea uero crassæ ac cōturbatæ. Hic humor quotidie exacerbatur, desinit autem



autem in quiete febris non integram, uniuersum tempus faciens horarum plerūq; octo & decem. Quapropter etiam amphemerina febris Græcis uocatur, de ambabus enim participat, die ac nocte.

*Quotidianæ febris curatio.* Cap. LXXXVI.

In quotidianæ febris curatione aceto mulso utimur in primis diebus, & his quæ urinas probè impellere possunt. Et tota diætæ forma fecidi uim habeat. Circa uigorem uero uentri prospicere oportet, & præsertim ori ipsius. Et postea uomere à cibis & raphanis & purgatorijs pituitam euacuantibus uti. Reliquam diætam ad communes scopos respectu facto comperies, ut scilicet attenuante diætâ, & pharmacis incisorijs ac attenuantibus utaris.

*De Epialis febribus.* Cap. LXXXVII.

Prædicti generis, pituitosi inquam, est & febris quæ priuatim à leni afflictione Epiala appellatur, quum simul & febricitant & rigent, & utrunq; percipiunt eodem tempore in omni corporis parte. Pituita enim acida, & uitrea appellata, citra febrem quidem, rigorem inducit. Si uero putredo aliqua moderata ipsis accedat, febrē epialam efficit. Si uero amplius putrescat, præcedit quidem rigor, sequitur autem febris, exuperata frigiditate à multitudine caloris, ut omnino non appareat iuxta augmenta & uigores exacerbationum. Fortassis autem & pituita uitrea addam qualitatem habet. Curatio porro consimilis est his qui quotidiana febre laborat, incisorio curationis modo amplius aucto.

*Communia auxilia febrium per circuitum repetentium.* Dioscoridis. Cap. LXXXVIII.

In communi ad omnem circuitum ac rigores utiliter exhibentur ea quæ sudores mouere possunt, & sunt hæc. Seminis smyrnæ drach. i. datur potanda ex uino duabus horis ante accessione. Item aristolochiæ drac. i. & iridis drac. ii. & calaminthes decoctū cum castorij drac. i. in quartanis & quotidianis. Chamædryos item decoctū assidue potatū, quartanā et quotidianā soluere solet. Caroi quoq; semen, ferulæ semen, uerbasci radix, aut succus cū uino. Aliud, quod ad omnē circuitū, & maximè ad quartanas datur, duabus horis ante accessione. Facit & ad calculosos, ac dysentericos, & stomachicos. Est etiā anxiosus ac desperatis, & lippientibus cōmodum. Seminis hyoscyami albi, seminis apij, seminis anisi, styracis, singulorum drac. iii. croci drach. x. opij drac. iii. castorij drac. ii. myrrhæ drach. ii. cū aqua ad fabæ ægyptiæ magnitudinē formato, & cū duobus aquæ cyathis exhibitō. Aliud ad omnē circuitum. Aphrodæ. Seminis hyoscyami, myrrhæ troglodyticæ, opij, styracis, singulorum drach. i. croci, zingiberis, aloës, singulorū drac. x. & obolos iii. excipe melle, & exhibe nudis ponticæ magnitudinē, cū aquæ cyathis iii. præ illitis extremitatibus ac cruribus, & sine ut dormiant. Ego uero etiā castorij drach. i. adieci, & mirificè uim suā declarauit. Vtere etiā confidenter antidoto poronia, & ea quæ ex sulphure cōstat. Miram enim efficaciam habent aduersus omnē circuitum, præsertim quartanas ac quotidianas febres. Cæterū quæ trita cum oleo illinuntur, prosunt omnibus qui per circuitum exacerbantur cū rigore, fouent enim corpus, & sudores mouēt. Sunt autem hæc. Chamæmeli flos trius, & in pastillos efformatus, ac in umbra siccatus, & usu expetente cū oleo tritus ac illitus. Semen

uiticis cum oleo, semē libanotidis, flos salis, nitrum, spuma nitri, baccæ lauri, pyrethrum, smyrnæ semen, hypericum, calamintha, cāchryon, castorium, conyza, costus, granum cnidium, cū nitro, oleo & aceto, oleum amygdalinum, cyprinū, irinum, gleucinum, chamædrys, staphis agrestis. Asclepiadæ unguentum ad accessiones cum rigore. Hoc sæpe tertianas depulsi inquit: Spumæ nitri drach. ii. myrrhæ drach. ii. piperis grana xx. ceræ drac. iii. olei cyprini, aut irini, aut gleucini, aut amygdalini sexcuncem, liquefacta aridis ammisceantur. Vsus est hora ante accessione. Magis autem confricandi sunt pedes, unde horrores initium sumere uidentur. Aliud ad tertianas. Grani cnidij, spumæ nitri, piperis, æquales portiones excipe irino, & ad strigmentitiā crassitudinem redige, & utere extremitates leniter confricans. Hoc medicamentum sudores ciet, & per duos aut tres circuitus sanitatē reducit. Aliud, ad quartanas, tertianas, ac reliquos circuitus. Myrrhæ drachm. vii. cassiæ drach. x. piperis drach. xii. staphidis agrestis drach. iii. nitri drach. iii. ceræ sexcuncem. Cyprini aut alterius talis libr. i. Myrrham uino dilue, & staphidem & reliqua contunde accribra, & cum myrrha tere, ac cerato affuso excipe. Vsus autem tempore pharmacum cum pari cyprini portione illine.

*De ignis sacri circa uiscera affectionibus.*

Cap. LXXXIX.

Fiunt aliquando ignis sacri affectiones circa aliqua uiscera, febrem ardentē ac habitualement inducentes. Et si quidē circa uentrem fuerit ignis sacer, erysipelas Græcis appellatus, febrem ex his accensam lipyriā nominant. Si uero circa hepar, urentem siue fumosam. Si circa pulmonē, algidam. Talis autē febris frigefacientibus ac humectantibus opus habet edulij ac potibus, & his quæ extrinsecus imponuntur. Quum igitur febris habitualis aliū morbum ammixtū non habet balneo indiget, quēadmodum etiā alię omnes caliditates ac siccitates. Si uero affectio fuerit circa uiscera ignis sacri, à balneo quidē abstinere oportet in totum. frigida uero in uigore morbi utendū est contentiosa, sic autē appellare solemus, quum semel frigidissimam & multā damus. Ante uigorem autē frigida nō est danda, nisi ab ægroto cogamur, cui mos sit frigidam bibere, & qui sitim non ferat. At forinsecus imponēda sunt frigefacientia, & si nihil profecerint, tunc etiam frigidæ potus exhibeatur, aut edulia potius frigefacientia. conueniunt autē maximè lactucæ humidæ ac dulces, pura frigida elotæ. Atq; sic quidē acceptæ optimę sunt. Si uero opus fuerit aliquando ad preces ægrorū, in suauitatē ipsarum mitigare, acetum multæ aquę frigidæ ammixtū, ad intinctū cōcedemus. Sit autē acetū exactē separatū ab omni uinosa qualitate. Forinsecus autē etiam ipse lactucæ succus aptus est. Imò etiā semperuiui, & intybi, portulacæ, atriplicis, solaniq; ac plātaginis, cū pane sicco trito, & modico bono rosaceo, & his quæ similiter resiccant. Optimū uero est id quo nos utimur, iuxta uuarum acerbarū tempus. Expressum enim ipsarū liquorem in mortarium conijcimus cū portulacis uiridibus, tūdimus, & utrūq; liquorē in uas mittimus, osculumq; eius diligēter obturamus, atq; sic uas in aquam immittimus. Melius autē est etiā niue uas obuere. Vsus autē tempore polentam tenuissimā ammisce, & postea subigo, ut liquidius euadat medicamentum



camentum, idēq; duplici linteolo infarctū præcordiis impono, non immorari sino, sed ubi tepidum factū fuerit tollo, ac alterū impono. Atq; hoc semper consequenter facio, donec eger sentiat profunditatē quodam modo perfrigeratam, & à siti liberetur. Ammiſcemus autē aliquando etiā oleum omphacinum, aut rosaceū, ubi circa præcordia fuerit ignis sacer, inflammationis naturam habēs. Vidi mulierem supinam decubentem in terra & uoce destitutā, habētēq; pulsum formicātem, unā cū manuum ac pedū perfrigeratione. Putabā autem calidā esse affectionem. Nam simul cū relatis pessimis signis, densiorē uidebam respirationē factam. Hoc autem signū est magni doloris, ac calidi morbi in præcordiis ac thoracis partibus existentis. Dixit autē quidam ex astantibus se auduisse mulierem dicere, quod arderet eius stomachus, & frigidaē potionis magnā cupiditatē haberet. Quapropter etiā in paulmento iacet, inquit, uenans frigiditatem. Itaq; confusus dedi ipsi per cochleariū aquā frigidam, iterum atq; iterū immittens ipsam ori eius uiolenter. Videbā autem labia ipsius placide aquam intus attrahere. Et ratiocinatus ipsam expetere frigidaē potū, propter insitā uentri feruidā affectionē, rursus amplius exhibui. Post hoc autē oculis quoq; annuere incepit, indicans sic me facere debere. Accepta itaq; cōfectione ex papaueris capitibus cōstāte, diacodion appellata, parū de ea cū uino cnidio & aqua frigida, per cochleariū ori infudi. Et ex hoc nimirum paulò post sensim loqui cepit. Quare rursus amplius de hac portione dedi, uino emmeleo pro cnidio accepto, cū modica aqua. Ori itē uentris semperuiū & lactucam, cū pane trito & rosaceo imposui. Frigida autē hæc adhibui propter affectionis caliditatem, & tempus æstatis, donec frigiditatem abunde sentiret.

*De colliquatione, Philagrij.*

*Cap. x c.*

Colliquatio nominatur quū excernitur quid per uentrem, non ex comestis aut concoctis, sed ex humoribus ex toto corpore in ipsum cōfluentibus, quod simile quidē est bili quæ assidue per uomitū reijcitur, ac per uentrē secedit. Differt autē ab ipsa foetoris graueolentia, & quod egestio fuluioſior apparet, & caſſitudinē habet strigmenticiā, aliquando etiā oleosam, aut adiposam. Colliquatio autē appellatur hic morbus, quoniā recens cōpacta essentia pinguedinis ac carnis ab ardentissima febre dissoluitur ac colliquescit. Et ubi iam diuturnū est malū, etiam ipsarū solidarū partium essentia ex parte eliquatur, Quapropter grauissima omniū est hæc febris. satis autem clarū est quod extinctoriis medelis utimur, ita ut ualde frigidam aquam potandā exhibeamus, & cataplasmata & epithemata frigefaciētia thoraci ac præcordiis imponamus. Et cibos humectātes ac frigefaciētes demus. Dictū est autē de his in tractatione de febribus ardentibus. Dicitur itē consequenter in sequenti capite.

*De febribus quæ in calidis ac siccis temperaturis fiunt, citra inflammationem ac putrefactionem. Cap. x c i.*

Quicunq; tēperatura biliosi, & habitu graciles & natura aridi, & stomachū subtili sensu prædictū habentes, & qui facile in bilē efferuescit: hi ubi famē aut uigilias pertulerunt, aut nimīū delassati sunt, & præsertim in profectione ac æstiuo sole, aut tristitia affecti sunt, aut grauib; curis pressi, promptē ab horroribus ac febribus corripiūtur. Nā habitus in biliosis naturis, ob famē ac omnia relata, facile in bilē efferuescit. Et

primū quidē inæqualitatē percipiunt, postea etiam horrore. Et si quidē in motibus perseuerarint, aut cibum nō acceperint, statim febricitāt. Mordaces enim humores ac uapores per sensitiua corpora delati, horrores ac rigores generāt. Et propterea horrente ac desata cute, uelut quæ ex natura in his aridior est, cohibetur fuliginosæ ac fumosæ superfluitates, antea transpirare solitæ, & sic febrē accendūt, nisi talis cibū accipiendo uelut dixi præuerterit. Ostendi autē tibi aliquos qui sic febricitarunt, & maximē qui ex longo morbo se recolligebāt. Ex quibus uni in foro obuiā factus horrore incipiente, introducto ipsi in officinā quandā, panem ex uino diluto exhibui, & euestigiō horrorem sedauī, & febreſ prohibui. Alios uero in suas domos abire festinantes, in principio horroris, aut paulò post nutriui. Et in summa, quibus adhuc sunt principij exacerbationū accidentia in talibus tēperaturis, his omnibus panē ex uino diluto citò exhibui, & horrore statim sedauī, & febreſ prohibui. Quanto enim citius ipsos nutries, tanto magis febrē impediēs. Si uero aliquando paulò tardius ipsos nutriui, febris quidē facta nō est. Calor autē modicus ipsis accedet, ut si diutius moreris nutrire, tali caliditate excalescet, ambiguum ut sit an febreſ appellare ipsam oporteat. Si uero duæ horæ post horroris initium factæ fuerint, manente adhuc horrore etiā tunc nutrire oportet. Verū prædicere quod febricitabunt hi febre nō molesta, ad quā exudationes consequentur, Et hoc factō, & lauare oportet, & rursus nutrire. At postquā sedatus est horror, incipitq; febris cū contractione, nō amplius nutriendi sunt illo tēpore. Declināte uero exacerbatione statim alātur, & ne expectetur donec febris integrē quiescat. Detur etiam potus aqua calida in uigore amplior. In omnibus enim squalētib; affectionibus nō cessant exacerbationes priusquam aut balneis, aut alimētis humectantibus rigētur. Quosdā uero etiā declinatione incipiente: Alios autē uigore exacerbationis instante nutrio. Fames enim in his tēperaturis, maximē febricitantibus, nō simpliciter nociua est, sed si quid aliud pernicioſa. Aut enim ex fame in ardentē febreſ incidunt, ex quibus si nō morte præuēti fuerint, in habituales delabūtur, & ex his rursus in tabē. Aut statim ab initio habitualis febris ipsis coincidit. Proinde à principio sic nutrire oportet eos qui talē temperaturā habent. Quum uero aut ex lassitudinibus, aut ira, aut curis pluribus, aut uigiliis, aut tristitia, aut ex omnibus simul cōmissis, corpore uehemēter resiccato, febris inuasērit, squalidā quidē habens cutē, ardentem autē caliditatem, timor proſectō est talē hominem habituali febre corripiendū esse, & præsertim in æstate, & sicca ac calida cōstitutione. Opus igitur habent tales humectantibus ac frigefaciētib; edulib; ac potibus. Qui enim temperatura calidi ac sicci sunt, hi etiam necessariō uires debiles habent. Non enim fieri potest, ut corpus calidum ac siccū, ubi febricitet uires ualidas habeat. Cōuenit igitur quā celerrimē per pisanæ succum, aut sorbitiones ex alica nutrire, & paululum panis insuper exhibere, atq; sic per frigidaē potum ægrum curare. Extinguitur enim statim ac sedatur febris perfectē, si non inflammatio aliqua ipsi adest, neq; humorum putrefactio. Si tamen magnum detrimentum futurū conſectaris, exhibitionem eius inhiſce, & per ea quæ extrinsecus corpori adueniūt ac adhibentur, curat



curationem molire. Forinsecus autem adueniunt, aer nos ambiens, & quaecumque humectare ac frigefacere solent medicamenta. Et ad haec aquarum dulcium balnea. Si itaque ambiens nos aer temperatus fuerit, utendum est eo uelut habet, nihil amplius moliendo. Si uero aut multum calidus est aut frigidus, calido quidem uice uersa excogitanda sunt subterraneae domus, frigidaeque, ac quae uentis perflantur ad septentrionem conuersae. Auras quoque ipsis quasdam proprias excogitabimus. Aliquando ex Euripis in quos plures aquae salientes se praecipitant. Aliquando aqua frigida ex uasis in uasa transfluente. Haec uero statim etiam somnum conciliant. Respergenda est etiam domus assidue frigida aqua pura. Et rosae multae, aut uicium pampini, aut myrtus per terram sternantur: aut aliae quaedam plantae frigefacientes. Arcenda est ab ingressu hominum copia. Nam & hoc domum calfacit. Si uero frigidissimus est aer, uelut in hyeme maxime, per tegumenta corpus foueatur. Frigus enim densat ac constringit cutem, & humorum qui intus aduruntur defluxiones transpirare prohibet. Maiorem enim ex frigida inspiratione utilitatem fore noscendum est, quam ea est quae ex cutis perfrigeratione contingit. Similiter autem & in his quae forinsecus imponuntur, eligenda sunt frigefacientia citra fortem adstrictionem, densationemque ipsius cutis. Et non solum quae frigefaciunt, sed etiam quae copage corporis fuerint partium tenuium, quantum eius reperire est in frigefacientibus aut citra ammixturem alterius uehementis qualitate. Est autem simplicissimum medicamentum ex humectantibus ac perfrigerantibus, quod & ad ignem sacrum utor, & ad pudendorum inflammationes in principio. Ceram albidissimam in duplici uase liquato, & in aquam frigidam diffundito, ac manibus emollito diu eam eluens. Deinde similiter ipsam liquatam, in aliam aquam diffundito, & rursus tertio idem facito. Ad hanc autem ceram sic lotam, rosaceum ex optimo oleo omphacino preparatum adijcito, ut sit quidem ceree unc. i. rosacei uero triens. Haec similiter in duplici uase liquato, et ab igne ablata moueto, donec aliquantulum frigescent. Postea in mortarium diffunde, & pistillo fortiter tere, aqua potabili ac frigidissima paulatim instillata quantum satis est. & tandem fictili puram aquam habente excipe, & aquam quotidie permuta. Hoc pharmacum tenui linteo inductum impone, non super totum petus, uelut quidam faciunt, neque super tota praecordia, sed illo maxime loco in quo multae caliditatis sensus percipitur. Permutetur autem pharmacum semper priusquam manifeste calefiat. Aliud epithema optimum. Rumicis acuti succus polenta tenui ammixta, duplicato linteo detricto excipiat, & frigidus imponatur. Facit & portulacae succus, & semperuiui, cum uuae acerbae succo & polenta. Item tribuli uiridis succus, & polygoni, ac seridis, & lactucae cum polenta. Sed & ipsa horum folia trita imposito. Bonum pharmacum etiam hoc est: Palmularum pinguium carnem exemptis membranis, cum posca meratiore ad flacciditatem usque coctam, & cum tenuissima polenta tritam impone. Si uero aridius hoc uidebitur, ex praedicto cerato parum, aut rosacei optimi minimum quiddam ammisce. Bonum etiam pharmacum est rosarum succus cum tenui polenta, Et ipsae rosae tritae impositae. Et haec quidem assumimus mul-

tum frigefacere uolentes. Si uero moderate hoc facere uoluerimus, non modica est copia emplastrorum leniter perfrigerare potentium. Ego enim noui, imposito aliquando frigido medicamento praecordibus, hominem euestigio difficulter spirasse: alium autem statim tussiuisse. Et paulo post amborum accidens quieuisse, frigido pharmaco sublato. Balnea porro dulcium ac calidarum aquarum, aut potius temperatarum, utilissima sunt omnibus siccam ac calidam temperaturam habentibus. Lauandi autem sunt quae admodum hecticae, in secunda balnei domo, corpore ex aqua & oleo calido perfuso, & ipsis statim in temperata aqua solium locatis. Deinde etiam in frigida solium. In frigida tamen moram diutius trahere non oportet. Si uero inflammatio alicuius uisceris accedat, balneum recusare oportet. Illud tamen nosse expedit, quod si quando inflammatio principalis partibus in talibus febribus ac corporibus coinciderit, omnino morientur. Et praesertim si pulmonis, aut membranae costas succingentis, aut uentris, aut hepatis inflammatio fuerit. Nam quantum ad inflammationes harum partium attinet, minime nutrire oportet. Quantum uero ad uirium debilitatem, saepe nutrire oportet. Quare necessarium est ut aut dum non nutrimus, uires exoluamus: aut dum nutrimus, inflammationes augeamus.

De febribus Hecticis ac tabidis.

Cap. XCII.

Hectica, hoc est, habitualis nominatur febris, quum ad tantam immodestiam uenerit caliditas praeter naturam, ut in habitu sit ipsius solidae essentiae similis corporis cordis. Et propterea aegre solubilem habet structuram. Primum igitur calor praeternaturalis eliquar, & resiccat, ac consumit essentiam in partibus uelut ex humore concretam, qualis est pinguedo & caro: Deinde uero propriam humiditatem consumit, ex qua corpora nutriuntur. Quae sane circumsusa est ac instar roris dispersa, circa omnes animalis partes. Hinc autem transit ad carnosum genus, quod fibris & membranis partibus solidorum corporum insitum est, quod sane discindentes coqui tollunt, fibras uero abiciunt. Exactum autem eius complementum in hoc est, si ipsa solida similium partium essentia siccior facta est, quando & tabida febris uocatur. Duplex est autem genus hecticarum febrium. Quaedam enim ex ipsis post febres ardentes plerumque fiunt, aut usque adeo in longum extensas, ut temporis progressu humorem corporis cordis consumpserint. Aut manente adhuc humiditate fiunt, & cordis corpus occupantes, hinc inceduntur: quemadmodum lucernarum flamma ex funiculo, superstitite adhuc in lucernis oleo. Et haec quidem una est ipsarum generatio: Altera uero quam ab initio statim iruerint, primam generationem diutius similem facientes, ob tristitiam, & iram, & lassitudinem ampliorem simul cum ardore factam. Has igitur non difficile est curare. Eas uero quae in tabem procedunt, sanare impossibile est. Natura enim ipsarum calida est & sicca, simile quiddam patiente corde, quale quid patitur funiculus in lucernis, ubi plurimum fuerit exustus. Qui enim exustus est comminuitur, ut neque si largum oleum affuderis, luculentam flammam excitare possis. Proinde parua haec & infirma flamma circum circa tremat, semper amplius minor euadens, donec fuerit extincta. Facilis autem cognitu est haec febris. Priusquam enim contigeris pulsus accaliditatem, oculos immo-

m dice

grus uoida  
carnis x. m  
cap. of

dog 11



dicē cauos uidebis, uelut in foueis quibusdam sicos, & gramas in ipsis reperies siccās, & squallidā quādam affectionem, qualis his fieri solet qui per totum diem in sole aestiuo multum puluerem percurrunt. Perijt autem & ipsorum coloris uitalis flos. Et cutis circa frontem sicca est ac circūtenfa. Et plerunq; palpebris nictant, uelut somno grauati. Est autem hęc affectio non somnus, sed impotentia uigilandi. Et tēpora sunt collapsa, ut loci caui appareant. Et quid aliud quā ossa & cutis sunt in totum? ut etiam si denudatum consideraueris uentrem, neque aliquod intestinum, neque uiscus aliquod saluum esse putes, & præcordia uehementer retracta esse ad thoracem, & cutem totam siccam ac obaridam, & si distenderis digitis appræhensam, uelut corium quoddam producit. Febris itaque exactē tabida incurabilis est uelut dixi. Tabescit enim in ipsis totum corpus, instar arboris extremē arefactæ, aut ob flammæ uiciniam, aut ob uehementem ac immodicam siccitatem. Atq; hęc est quam senectam ex morbo uocant. Tale enim corpus fit in his qui secundum naturam ad extremā senectam perueniūt citra febrem, paulatim extincto in ipsis insito calore. Verum eorum qui secundum naturam consenuerunt, mors sine molestia cōtingit, ob frigiditatem ac siccitatem imminens. Tabida uero febris non solum sicca, sed calida affectio est. Hęc igitur uelut dixi incurabilis est. Illud porro omnibus febribus hecticis commune est, ut debiles sint & æquales semper, à prima die usq; ad extremam respirationem. Maximum autem & minimē ambigū naturæ ipsius signum habebis, si cibum homini præbueris. Alimento enim accepto accenditur calor, & pulsus augetur ad magnitudinem ac uelocitatem. Et quod in ipsis contingit simile est ei quod accidit in calce ac lapidibus calefactis. Si enim frigidissimam aquam ipsis affuderis, multo calidiores apparent, uaporosa in ipsis caliditate, ab humida essentia irrigata. Donec igitur aliquid humidæ essentiæ seruetur hectica solum febris est. Quum uero in periculū uenerit, ut non amplius super sit aliquid humiditatis, exausta iam tabes, Marasmus Græcis dictus, consistit. Nos autem earum solum curationem aggredimur, quæ sanari possunt.

*Hecticarum febrium curatio.*

Cap. xciii.

Hecticas febres omni modo statim refrigeramus; priusquam progressæ in tabem desinant. Caput autem curationis ipsarum in humectantibus ac frigefacientibus consistit, cum his quæ foris adhibentur, tū quæ intra corpus accipiuntur. In quibus est & aer qui inspiratur. Omnes igitur hecticos, etiam si iam principium tabescendi acceperit, absque hoc ut alia febris ipsis sit implicata, aut propter humorū putrefactionem, aut cum principalis partis inflammatione, confidenter lauato, citra omnem tamē laborem, ut ne uires exoluantur. Deferatur itaq; æger in lecto ad balneum. Præparata autem ipsi sindone calida, in ipsa ad primam balnei domum gestetur. Sint autem quatuor qui sindonem teneant, in singulis angulis unus; deinde in prima domo nudatus, ad secundam portetur. In qua toto corpore ex oleo tepido dulcissimo perfusus, ad tertiam domum feratur, & in solum locetur. Sit autem aer balnei temperatus, & humidus præparetur, parietibus aqua calida respersis. In ipsa uero solij aqua temperata abūde quiescat, moderatē

in sindone uectus, nulla corporis perfusione fiēte, neque item capitis perfusione. Hinc autem extractus à quatuor adolescentibus sindonem gestantibus, in frigidam aquam confertim mergatur, ne minimum quidem moræ in ipsa trahens. Statim autem alius paratam habens sindonem aliam, ipsi inijciat, & alius aliam simili modo. demissus autem in lectum, mollibus linteis lenissimē derergatur. Postea uero unctus & uestibus contactus ad domum in lecto referatur. Sit autem & domus balneo uicina. Eos quidem igitur qui iam tabescunt, lauare oportet uelut dictū est. Qui uero in hecticis febribus sunt, nondum tabescentes, hi etiam citra sindonē lauari possunt. Deferendi tamen & hi sunt ad domū siue in lecto, siue in uehiculo quopiam, aut lectica: Deinde oleum ipsis infundendum, uelut dictum est. Et postea ad calidā aquam ducantur, ut in illa immorentur. Deinde ad frigidam prodeant, ut nullam omnino moram in ipsa trahant. Atque ita deterfi ac inuncti ad domum reducantur. De balneis igitur satis dictum est. Consequens est ut de alimentorum uiribus addamus. Quod quidē igitur frigidos & humidos conuenit esse cibos hecticis febribus profuturos, omnibus manifestū est. Tales autem sunt, ptisanæ succus frigidus acceptus, & alica uelut ptisana præparata, conuenit etiā panis aqua frigida madefactus. Verum nullius horum frigiditas sincera sit, ueluti potus. Nam quæ bibuntur, & citò calefcunt, & meatus penetrant. Quæ uero eduntur aut sorbentur, diutius in uentre perseverantia, perfrigerant ipsum, si immodicē fuerint frigida. Ar ubi iam diuturna est febris, lac asinum dandum est, diligentī animaduersione habita, ne in uentre in caseum coaguletur. Hoc uero aliquando etiā ipse æger nos docebit, ut qui suæ naturæ habet experimentum. Quandoq; autē nos ipsos depræhendere oportebit paulatim ad eius usum progrediendo. Fugienda est autem quātum eius fieri potest, mellis mixtura in omnibus hecticis febribus. Dandum uero est primū lac asinæ in cubiculū adductæ, quo calidū adhuc lac potetur. Si quidē igitur probe fuerit concoctū, & non corruptum, copia eius augeri potest, ut in exhibitione cyathus dimidijs addatur. Reliqua uero diæta facienda est, uelut in siccis uentris intemperaturis, uelut in proprio loco dicitur. Quātō autem hecticarum febriū caliditas maior illis est, tantō frigidioribus auxilijs opus habet, & diligentia ampliore, ut ne damnum aliquod cōsequatur, ex fortiorum auxiliorum usu.

*De popularibus passim uagantibus, ac pestilentibus morbis.*

Cap. xciiii.

Populares & cōmunes morbos uocant eos qui simul multis hominibus coincidunt: quorū uelut generatio, ita & causa cōmunis est. Communia itaq; edulia praua, morbos cōmunes pariunt. Item uitiosæ aquæ potus, & ærūnæ immodicæ, & labores consueti relictī. Fames, & repletio, præsertim ubi post magnam indigentiam, abūdantia succedit. Sed & regionis natura sepe communes morbos inuexit, aëre quem inspiramus à putredinosa euaporatione inquinato. Causa uero talis putredinosæ euaporatiōis, aut mortuorum multitudo est, uelut in bellis contingere solet. Aut paludes quædā, aut stagna, aut barathrū aliquod profundum in propinquo, uenenosam ac prauam exhalationē remittunt. Hęc igitur assidue contingere solent. Sed & ambiens nos aer, temperamēta assidue



alsidue peruerit, dū aut immodicē calidior, aut siccior, aut frigidior, aut humidior euadit. Nam reliquis causis non omnes simul obnoxij sumus, neque per totū diem occurramus. Aër autem nos ambiens forinsecus omnibus circūfusus est, & per inspirationē trahitur. Necesse igitur est ut ad mutationes eius, iuxta temperamentū ipsius coafficiantur etiam animalium corpora. Aliquando uero ambiens nos aër humidior ac calidior factus, pestilentē constitutionē inducit. Et quia sunt in corpore humores ex uictu uictu ad putrefactionē idonei, principij fit pestilētis febris. Quare si quis moderatis laboribus, & uictu modesto ac castigato utatur, in totū illēsus manet per omnes eiusmodi affectiones. Et nos sanē hoc prænoscences, statim incipiente tali constitutione, quaecunq; corpora humida uidemus, omni modo siccare conamur. In his autē quæ natura sicciora sunt, pristinam naturam conseruamus. Quæ uero superfluitatibus redūdant, purgationibus sanamus. Obturationes autem meatuū aperimus ac extergemus. Et in summa sanitatem corporibus custodiuius, contraria adhibentes. Et quādoq; refrigerationibus usi sumus, si ita opus esset: quādoq; uero calfactorijs. Sed & rogo ingenti extructo & intenso, aërem ad caliditatem ac siccitatem transmutare quis potest, humidum & frigidum factum, quemadmodum Hippocratē Athenis fecisse dicunt. Itemq; Acronem Agrigentinum.

De peste. Ruffi.

Cap. xcv.

Omnia horredissima in peste fieri possunt, & nihil occultatur, uelut in singulis morbis. Plurima enim & uaria fiunt, delyria uaria, bilis uomitus, præcordiorum distentiones, dolores, sudores multi, extremitatum frigiditas, profluvia biliosa, tenuia, flatuosa, urinae, alijs aquosæ ac tenues, alijs biliosæ, alijs nigrae, malas subsidenuas habētes, & pessima ea quæ in medio uasis dependent. Sanguinis nariū destillationes, æstus in thorace, linguæ torrefactæ, uigiliæ, conuulsiones uiolētæ. Sed & ulcera praua & carbunculosa & perniciofa, in peste fieri possunt, & in reliquo corpore, & in facie, ac tonsillis. Si uero solerti ingenio quis præditus sit, futuram pestem prænosceret, attendens anni temporibus, quæ & mala sunt, & in bruta animantia impetum faciunt. Si enim ambiens nos aër, pestis causa fuerit, uolucrum generis prior interitus erit. Si uero ex prauis de terra exhalationibus hoc contigerit, quadrupedum animantium prior corruptio fiet. Quum autem hæc tecum expendēris, amplius etiam illud cogita. Quale est præsens anni tempus, qualis totus annus, hinc enim comperies quomodo uictus rationem optimē constituas. Verbi causa: Debat esse, si recte res fieret, tempus siccū, nunc uero humidum factum est. At si quidem humidum factum est, necesse est etiam uictum resiccantem constituere, quo excedens humiditas cōsumatur. Respicienda sunt etiam studia hominum, an non ad sanitatem conducant, & ea prohibere. Ventris quoq; cura habenda est. Si uero superior uenter pituitam habuerit, uomitu euacuetur. Quibus autem sanguis abundat, his uena secetur. Bona est & per urinas purgatio, & quaecunque alia. Si uero æstuosus fuerit æger, & flamma usque ad pectus ascenderit, non fuerit alienum frigefaciendū pectori adhibere, & frigida potum dare, non paulatim exhibendo, uincitur enim ab ampliori in uentre caliditate, & plus nocet,

ac amplius exurit. Sed & multa & acruatim frigida danda est, ut copia eius flama extinguatur. Si uero ardor occuparit interiores partes, extremitates autem & superficies frigida fuerint, & præcordia distendantur, & uenter colliquamenta partim sursum, partim deorsum mittit, uigiliæq; affuerint ac delyrium, & linguæ asperitates, his calfactoria lomenta adhibere oportet, ut calor ad superficiē corporis trahatur, & quibuscunq; id fieri potest modis conandū est, ut calor ex profundo ad externa educatur.

De his qui ob crudorum humorum multitudinem,

animo linquntur.

Cap. xcvi.

Quidam febricitare incipiunt, ex magna crudorum humorum copia collecta, unā cum hoc quod os uētris male affectum est, aut ex cruditatibus, aut alijs. His inflata sunt præcordia, & totū corpus maiorem naturali molē habet. Et color alijs quidē albidior & aquosior fit naturali. Alijs autem nigrior ac liuidior euadit, quos plūbicolores aliqui appellāt. Pulsus uero omnium minores sunt, quā pro caliditatis ratione, obscurioresq; ac omnino inæquales. Si quidem igitur hi humores copia sua uires grauauerint, & crassitudine ac multitudine meatus animalis obturarint, multis de causis perniciofa est affectio, & animi deliquium inducens, tum quod animal nō nutritur, tum quod suffocatur: & quod tēperamenti symmetria alteratur ac corrūpitur. Etenim crudi humores nutrire nō possunt prius quā cōcoquantur. Multi uero grauant aut obturāt transpirationes, & calorē extinguunt. Si uero neq; obturarint, neq; grauauerint, hi animi deliquia quas syncopas uocant, nō inducūt, sed omnino animo exoluūtur tales, si nō frequentius alantur. Danda est autē eis copia, nō pro una uice, neque cibi crassi aut uiribus frigidi, sed ex genere attenuandum & calefacientium. Sic etiam medicamenta ipsis danda sunt, quæ homo febricitans accipere potest, attenuantia ac calefacientia. His cōmodum est uinū aquosum album ac tenue, nisi ualde febricitarint, quod tamen non adeo contingit in relata affectione. Debiles enim sunt his febres, & adhuc magis si fuerint senes. Vinum autem dandum est ipsis ad singulos cibos, & potius ad uesperam & noctem, non mane & usque ad meridiem. Iuuenibus uero nō statim ab initio uinum detur. Nulli porro talium sanguinis ablatio citra maximum detrimentum fieri solet, etiamsi euacuatione indigent. Imò neque uenæ sectionem, neq; purgationem ferunt, qui sanē etiam citra hæc derepente animo concidunt. Quomodo igitur hos sanare oportet? qui egent quidem euacuatione, euacuantiā uero non ferunt, nullum equidem inueni in his euacuationis modum præter confrictionem. Incipere uero statim ab initio morbi conuenit, primum à cruribus supernè deorsum per lintea moderate aspera. Deinde etiam totæ manus confricentur, supernè deorsum. Postquam autem artus satis calidi apparēt, & timor fuerit lassitudinis sensum ipsis accessurum ob multitudinem frictionis, oleo laxante utendum est, quale est quod dulcissimum est. Abstinentium autē ab omphacino, & omnibus adstringentibus. hyemis autem tempore etiam discussorio utendū est, quale est oleum sicyonij, & chamæmelinum, aut aliud simile, uelut anethinum. Postea uero oleum detergeatur, & progressus ad totam spinā fiat, & hæc similiter fricetur, primū per lintea, deinde

m 2

oleo.

vide Cornelium  
Celsū lib. 3.  
7.



oleo. Postea rursus ad crura progressus fiat, & rursus ad manus, deinde rursus ad spinam, ita ut per totam diē hoc agamus in domo lucem habere puram, & minimè humecta. Sit autem & caliditate moderata domus. Commodissima est his aqua mulsa, in qua coctum est hyssopum. Verum neq; cibi, neq; sorbitio, neq; aqua ipsis danda est, neq; permittendū ut large bibant, sed aqua mulsa sola utantur per primos tres dies, ita ut per successionē fricemus, & illud solum tempus remittamus, in quo somnus ipsos occupat. Ad hunc autem conducit maximè amplior frictio. Sed neq; amplior somnus talibus cōmodus est, neq; enim humores discuti permittit, & uiscera grauatur. Vtriusq; igitur moderatis natura opus habet, somno & uigilijs. Si quidem igitur pulsus ipsis ualde paruus & fortiter inæqualis est, extremum periculū imminet, & facere oportet quæ dicta sunt, nihil aliud curiosius conando. Si uero firmitatē & magnitudinem moderatam habuerit, & non fractus neq; mollis fuerit ac æqualis, uentrem considera, & clysterem adhibe confidenter, si non probe egestionem faciat. Contingit enim ex aquæ mulsæ potu, ut probe euacuetur omnis superfluitas, quæ in primis uenis congregari solet, iuxta simas hepatis partes & mesenterium. Si uero superfluitatū impetus amplius quàm oportet in uentrem fiat, primum amplius ipsam decoquito. Talis enim minus aluum subit. Si uero etiā postea superfluitas humorum amplius feratur, neq; sic sistere oportet, sed pro aqua mulsa prisanæ succū dare. Si uero ferri adhuc perseveret, sorbitionem ex alica dato, pulsus nimirum in hoc sequens. Aliquando enim derepente mutantur ad debilitatem, aut inæqualitatem, aut paruitatem, quo tempore conuenit exhibere panē ex uino diluto, neq; uentre uidelicet, neq; hepate inflammato. Nam si inflammate fuerint hæ partes, corpore crudis humoribus repleto, desperatus est æger pulsibus ita mutatis. In talibus igitur ægrotis si mortem prædixeris, & nullum strenuum auxilium adhibueris, te ipsum inculpātū seruabis. In quibus autē spes est salutis (est autem in omnibus citra inflammationē ita ægrotantibus) quum à principio susceperimus ipsos, turpissimum mihi uidetur ut animo concidat æger. Si uero perceperis aliquādo crassos esse humores, semper acetum mulsum dabis pro aqua mulsa. Et si quidem æstas fuerit, & æger frigida potor, huic frigidū acetum mulsum dabis. hyeme uero omnibus calidū. Aduersissima sunt his balnea, & aer nos ambiens multū calidus aut frigidus factus. Quare neq; lauare cōuenit, & reclinare tempore æstatis in domo frigida, hyeme uero calida. Leguntur enim ualde ex utroq; excessu. Nam in balneis, & æstate, & omni caliditatis incremento, crudi humores diffunduntur, & per totū corpus diffuunt, ut periculum sit etiā ad pulmonem & cor peruenturos esse, & quandoq; etiā ad cerebrū recursuros esse. Melius igitur est circa hepar & uenas ipsos permanere. At uero in domibus immodicè frigidis, & hyeme, & omnino in frigido ambiente, humores crudi incocti permanēt, & obturationes hepatis augent & exacerbant, si paruæ fuerint. Si uero nō fuerint, generantur propter crassiciē detenti ac impacti. A cataplasmatibus autem & perfusionibus abstinere oportet, donec multitudo parum euacuetur, partim concoquatur. Qui enim hæc in talibus affectionibus adhibent, ipsi

inflammationes per ea quæ faciunt efficiunt, non animaduertentes præcordia lædi. Hæc igitur faciendæ sunt à prima diē, ubi ipse inceperis curationem. Si uero ubi iam animo concidunt uocatus fueris, præcordijs non inflammatis, dabis ipsis panem non multū uino fuluo madefactum. Et si quidem fuerit æstas, aut regio natura calida, aut cōstitutio calida, cū aqua frigida. Sin contrā, cum calida uinum dabis. Postquā autem sedatum fuerit eiusmodi animi concisi accidens, experiendum est ut calida potum exhibeas. Nam ad totam curationem melior est calida, crudorum humorum concoctionem adiuuans. Statim uero & in his ad frictionem deuenies, eo quo dictum est modo.

*De his qui animo concidunt, ob flauā bilem os uentris lædentem.* Cap. xcvi.

In quibus ob flauam bilem os uentris lædentem animi deliquium contingit, his exhibendus est frigidus potus, si tamen hic uinum calidum natura, fuluum, tenue, & uetus.

*De his qui ob tenues humores animo concidunt.* Cap. xcvi.

Qui ob tenues ualde humores animo concidunt, ut citissime tum per sudores, tum per obscuram transpirationem exoluantur, contrario modo curentur his qui ob crudos humores animo linquuntur. Nos enim paulatim euacuamus, eò quod uires acruatam euacuationem nō ferant. Qui uero ob tenues humores animo concidunt, paulatim assidue nutrimus. Si uero à principio hos exceperimus, uiribus adhuc robustis, non paulatim alimus: Possunt enim hi amplius alimentum semel exhibitum superare. Quemadmodum autem diximus priores perniciose affectos esse, ubi uiscus quoddam inflammatum fuerit. Eodem modo etiam hos incurabiliter habere putandum est, si aliquod uiscus fuerit inflammatum, uiribus iam languentibus. Neq; enim possibile est ipsos assidue nutrire, sed in declinationibus solum. Neq; si non nutriuerimus possibile est ipsos seruare. In talibus affectionibus letalis constitutio celerrimè fit in facie: Nasus acutus, oculi caui, tempora collapsa, & quæ deinceps recensentur. Et siue amplius excreuerint, siue uigilauerint, aut tristitia affecti fuerint, si non citius alantur, statim talem faciem habēt. Si igitur propter uigilias, aut tristitiam, aut amplior rem excretionem, tale factum fuerit, parum mali esse puta. Si uero citra hæc, perniciosum. Atq; hoc magis, si statim à morbi initio sic habuerint. Non enim dubitant ad ipsius concoctionem. Nutrire igitur ipsos tunc necessarium est, & cutem ipsorum densare, & aërem domus frigidum præparare, uelut dictum est de his qui ex sicca intemperie febricitant. Ungendi quoque sunt adstringentibus ungentis, & cibi exhibendi non ualde promptè defluentes. Et neque aqua mulsa, neque prisanæ succus eis exhibendus est, sed panes, & sorbitiones ex alica, & fructus austeri, ac ægrè corruptiles, tum per se ipsi, tum cum pane & alica ex aqua cocta. Dentur etiam ipsi ouorum sorbilibium uitelli soli, & gallorum testes, & cerebella suilla probe affata, aut bene cocta. Nam crudiora extreme lædunt. Et in summa, omnia faciendā quò crassior materia fiat, & cutis densetur, & transpirationes impendantur. Prodest his uinum aquosum ab initio post cibos acceptum.

De



*De alijs animi deliquij causis.*

*Cap. xcix.*

Sunt & aliæ quatuor causæ, ob quas homines animo concidunt. Dolor uehemens, uigiliæ, euacuatio immodica, & in delirantibus ipse motus. His quintam si libet adde, principiorum intemperiem. Celerrima igitur perniciēs instat corde affecto, consequenter autem cerebro.

*De dolore animi deliquium inducente.* *Cap. c.*

Dolor est repentina temperamentī mutatio, & futura continuitatis solutio. Non enim quæ paulatim fit alteratio, animal dolore afficere potest. Apparet enim corpora non solum dum acuatim ad non naturalem habitum ducuntur, molestam habere mutationem, sed etiam dum ad naturalem habitum reducuntur, nisi paulatim id contingat, dolore affici. Proinde eos qui in uehementissimo frigore iter fecerunt, acuatim calefactos dolore affici scimus circa unguium radices adeo ut ferre non possint. Querimus igitur quomodo ægrotantes dolent, nullo forinsecus accedente ipsis dolorem inducente. Necessarium est in corpore talem quandam causam querere, quæ calfaciens uehementer, aut perfrigerans, aut essentiam aliquam sensitiui corporis diuidens, angorem nobis inducat. Et primum sanè considerabimus cuius nature esse oportet id quod corporum diuisionē facere poterit. Necessarium igitur est aut rupturam, aut contusionem, aut erosionem esse affectionem, in qua continuitas diuiditur. At ruptura fit ex tensione, contusio ex grauitate, erosio ex mordaci qualitate. Quum igitur foris nihil fuerit quod dolorem inducat, aut tendens, aut grauens, aut mordens, sed ex seipso aliquid horum patitur corpus, omnibus nimirum manifestum est, quod ab aliquo intrinsecus fit. Attensio quidē ab essentia distendēte corpus ipsum continens fieri potest, aut ab immodica siccitate. Contusio uero ab aliquo tumore duro adiacente. Morsus autem ab acri humore. Considerandum igitur est in doloribus, an sit humor multus, aut flatus transitum non habēs, uelut in colicis. Aut grauis moles, uelut in inflammationibus & tumoribus induratis. Aut humor mordax, aut affectio sicca, uelut in conuulsis. Aut frigiditas uehemens. Aut caliditas. Et horum singulorum correctio ritè faciēda est. Stupidus itaq; dolor ex frigida fit affectione. Pulsatiuus autem dolor proprius est magnę inflammationi. Si uero uelut ab aculeo infixio, aut uelut à cerebro perforari quis sibi uideatur, crassi intestini, quod colum nominamus, hæc doloris species existit. At uero in renibus cum grauitate quadam dolor est in uno loco firmatus, circum lumbum dextrū aut sinistrum, retrorsum magis. In colo uero dolor ex loco ad locū transit. Pungitiuus autem dolor circa membranas consistit. Qui uero prosiliens dolor appellatur, contingit in uehementibus hemicranijs, dimidia capitis parte affecta. Cognoscitur ex hoc, quod uelut à radice quadam, à primario affecta parte dolor initium sumens, celerrimè ad adiacētes utrinq; partes fertur. Quapropter ad ambas extremitates contingentibus distentionibus, etiam nerui ad utranque partem distenduntur. Minimè ad latitudinem distentos dolores nerui ipsi habent. At uero membrana subter omnem cutem distenta, tensiuos & stupidos dolores inducit. Quæ uero inter carnem sunt membranæ, dolores uelut diuellentes faciunt. Sunt enim multæ, &

inæqualiter insitæ, & forinsecus ipsam carnem am-bientes. Cæterū circūcitarum ossibus membranarū dolores profundi sunt. Et ipsorum ossium dolētium imaginationē inducunt. Quum igitur nulla externa causa doloris apparet, prægressam causam & diætā cōsidera. Si enim fuerit præter cōsuetudinē ociosior, aut cibus pluribus homo usus est, aut multū nutriendis: Aut cōsuetæ excretio suppressa est. Si quicquā horū, aut omnia apparuerint, multitudo est doloris causa. Et propterea quàm celerrimè homo euacuetur. Sic enim cū omni securitate tibi licebit his quæ fluxiones repellunt uti in partibus dolore affectis. Si quidē igitur multitudo fuerit quæ distendit, uiribus fortibus existētibz, uena secetur, & ex magna uena inflammatae aut dolenti parti propinqua sanguis auferatur. Si uero debiles fuerint uires, reuulsio fiat & deriuatio sursum, aut deorsum, aut utrinque, aut per frictiones. Vitiosis autē humoribus solis infestantibus, purgatio fiat. Ambobus autem cōcurrentibus, utrisq; euacuationibus utendū est, primum uenæ sectione, postea purgatiōe. Si uero his factis dolor remanet, manifestum sanè est circa partē affectam impactum esse id quod molestat. Manifesta est etiā curatio, per discussoria siens medicamenta. Eodem uero modo etiā propter spiritum flatuosum, aut pituitam uiscosam fiēte dolore, uelut in colicis per fomenta & irrigationes medemur. Si uero tumor grauas aut contundens, dolorem effecerit, tumor ipse curandus est per attenuantia ac rarefacientia. At si ob mordacem humorem dolor fiat, aduersissima his sunt attenuantia ac calefacientia. anethum autem uiride in oleo coctum, dolorem eximit, & somnum inducit, si affecta pars oleo calido irrigetur.

*De animi deliquio propriè dicto.*

*Cap. ci.*

Hactenus de animi deliquio dictum est, quod syncopē Græci uocant, hoc est, animi concisionem. Tale uero quiddā est & quod propriè animi deliquiū, hoc est, lipothymia uocatur, itemq; exolutio. Et nomē quidem animi deliquiū unū est: Causæ uero ipsius plures, & curationes iuxta singulas species. In tantū autem de ipsis nūc dicemus, in quantū quis his satis cognitis, resistere possit exacerbationibus derepēte incidentibus. Differt autē animi deliquium à syncopa, quod animi deliquiū derepēte incidit, sensu & motu hominē priuans, & omnino non sudant. Syncope uero, & uigilantes, & dormientes inuadit, & omnino cum sudoribus qui syncoptici appellari solent.

*De his qui ob uentris profluuium, aut sanguinis eruptionem, aut immodici sudoris euacuationem animo linquuntur.*

*Cap. cii.*

Qui ex bilis supernæ ac infernæ excretionē, & alui fluxionibus, & alijs immodicis euacuationibus animo linquuntur, his aqua aspergenda est, & nasus apprehendendus, & os uentris confricandū, & digitis aut pennis immisis lancinandum, & ad uomitum cogendum. Manus & crura pluribus & uehementioribus uinculis deligētur; manus in euacuationibus infernæ fiētibus; crura uero in supernæ fiētibus. Auxiliatur etiam in talibus euacuationibus uinū aquosum uetus frigida dilutum. Balnea uero fluxionibus in uētre commoda sunt, uerum his qui ob sanguinis eruptionem, aut sudorum immodicorū euacuationem animo linquuntur, aduersissima sunt. Adstrictione enim hi indigent & frigiditate, non laxa-



gione. Vinum uero frigida dilutum uelut dictū est, etiam his commodum est. Neq; uero extremitates ligare conducit, neq; uomere, neque omnino moueri. Sed densari his conuenit ac frige fieri. Quapropter aërem domus frigidum paramus, frigidos uentorum flatus inducentes, & pauimenta adstringente qualitate sternentes, uelut myrto, rosas, pampinis uitis.

*De his qui ob humorum copiam, animo linquntur.* Cap. CIII.

Qui ob humorum copiam animo linquntur, plurimum fricentur & calefiant, & manuum iuncturae ac malleoli ipsis deligantur. A cibo uero & uino, ac balneis omnino arceantur, si febricitarint. In potu autem detur acetum mulsum.

*De his qui ob quandam uteri affectionem animo linquntur.* Cap. CIII.

Similiter etiam hae quae ab utero affecto exoluuntur ex aceto mulso curandae sunt. Et crura fricanda ac liganda, maxime his quae ab utero strangulantur, & in quibus retractus aut loco motus est uterus. Cucurbitas quoque inguinibus à femoribus affigemus, Et naribus quidē odora menta graueolentia adhibebimus. Vtero uero beneolentia, & laxare ac calefacere potentia medicamenta admouebimus. At uero his quae ob immodicam mēsum euacuationem animo linquntur, manus magis deligabimus, & fricabimus, & cucurbitam pectori affigemus.

*Ad eos qui ob stomachi debilitatē, animo linquntur.* Cap. CV.

Ad eos qui ob stomachi debilitatem animo linquntur, cataplasmatibus utemur ad stomachum roborantibus, ex palmulis, uino, polēta, croco, aloē, mastiche. Et irrigationibus ex absinthio, & oleo melino & mastichino ac nardino, & uino. Et si stomachus exuratur, ammiscenda sunt etiam frigefacientia, uelut est ramentorum cucurbitae succus, aut lactuca, aut portulaca, aut solani, aut intybi, aut rumicis acuti, aut uuae acerbae. Hic autem non solum frigefacit, sed etiā adstringit. Prodest etiam generose ipsis extremarum partium frictio. Si uero ex horum usu melius habuerint, eos quidem qui stomacho exuruntur statim ad balneum ducere oportet. His autem qui quendam frigiditatis sensum habent, parum dandum est de medicamento ex tribus piperis generibus constante. Aut ipsum piper album.

*De his qui ob uitiosos humores, os uentris rodentes, animo linquntur.* Cap. CVI.

Quicunque uitiosis humoribus os uentris mordentibus exoluuntur, his aqua calida data uomere iubeto. Si uero aegrē uomant, stomachus & pedes ac manus prius foueantur. Deinde digitis aut pennis immisis uomant. Si uero uomitus non contingat, uentris excretionem adiuuare oportet glandulis subditis. Si uero ex his melius habuerint, comam absinthij in aqua mulsa coctam, bibendam dato, & omnibus modis stomachum corroborato, tum per ea quae foris imponuntur, tum per ea quae intra corpus sumuntur. Non tamen à principio hoc facere conuenit, neq; absinthium praebere. Sed posterius post uitiosorum humorum euacuationē, ubi iam pura facta fuerit aluus,

*De his qui ob pituitā in stomacho collectam animo linquntur.* Cap. CVII.

Si pituita multa & frigida in stomacho collecta, exo-

lutiones fieri contingit, stomachū oleo calido in quo absinthium coctū est, plurimum rigabimus. Deinde aquam mulsam dabimus, in qua hyssopus aut simile quid commaduit. Item acetum mulsum & piper, & pharmacum ex tribus piperis generibus constans, & id quod diosporiticū appellatur. Et tota rationis uictus summa ad incisoriū ductū sit destinata.

*De animi deliquio ob fortem frigiditatem.* Cap. CVIII.

Exolutiones ob fortes frigiditates, similiter ut bulimo, hoc est magna fame ex frigore oborta, correpti curantur, ita ut omni modo ipsos calefaciamus. Vinū igitur dandum est ipsis calida dilutum, & cibi calefacientes. Fricandi sunt etiam ac fouendi iuxta ignem.

*De animi deliquio, ob multam caliditatem.* Cap. CIX.

Qui ob multam caliditatem animo linquntur, aut in aëre suffocante uersati sunt, aut in balneo diutius moram traxerunt, eos roborare oportet confestim quidam frigida aqua aspersa, & uentilatione facta, & aegro ad uentum conuerso. Fricandum est etiam ac lancinandum os uentris. Et consequenter uinum & cibi dandi.

*De animi deliquio, ob inflammationem, aut malignam febrem.* Cap. CX.

Qui ob inflammationum magnitudinem, aut uehementis febris malignitatem, animo linquntur in ipsis accessionibus, & artus perfrigeratos habent, eos fortiter fricare oportet ac fouere, & crura ac manus ipsorum deligare, & iubere ut uigilent, & ab omni cibo ac potu abstineant. Optimum est autem in his praenoscere quod futurum est, & ipsum ante exacerbationem lenire ac mitigare.

*De animi deliquio ob siccitatem.* Cap. CXI.

Sed & eos qui ob siccitatem animo linquntur in exacerbationum principijs, optimum est praenoscere. Si enim duabus aut tribus horis ante accessionem nutritiueris, & manus ac pedes ligari iusseris, non interibunt. Oportet autem cibos esse concoctu faciles & stomacho commodos. Si uero etiam uehemens periculum fore suspicaberis, panem ex uino dabis, aut alicam coctam uino infuso exhibebis. Si uero modicam syncopam fore speras, uinum ne dederis, sed mala punica, aut alia poma, & adstringentes fructus cibis ammiscabis. At post exacerbationem non est necessarium fructibus uti. His uero qui derepente in periculum incidunt, uinum calidum dandum est, & panis, & alica omnino modica. Si enim aut amplius dabis, aut cibos concoctioni resistentes, hi qui sic affecti sunt suffocabuntur.

*De animi deliquio ob principalis membri obturationem.* Cap. CXII.

Qui ob principalis partis obturationem animo linquntur, his acetum mulsum dandum est, & portiones ex hyssopo, origano, pulegio & melle, & cibi incisoria ui praediti. Crassi enim & uiscosi magno his detrimento sunt. Quare ab ipsis abstinendum est. Fricandi sunt artus & ligandi, & portiones urinam cientibus utendum, ex apio, petroselinio, dauco, & similibus. Vbi uero manifesta consequitur utilitas, etiam uino aquoso ueteri utendum est.

*De animi deliquio ob repentinam euacuationem.* Cap. CXIII.

Si ob repentinam & acruatim factam abscessus rupturam



pturam, aut sectionem, aut euacuationem, uelut in hydropicis, animi deliquium contigerit, statim quidem odoramentis reuocentur, postea uero sorbitio- nibus probè concoctilibus nutriantur.

*De animi deliquio propter affectus. Cap. cxiii.*

Si propter tristitiam, aut gaudium, aut timorem, aut iram, aut terrorem, exolutio fiat, per odoramenta, & narium ac oris apprehensiones reuocatos, ad uomitū cogito. De cardiacis & bulimo dicitur suo loco in stomachi affectionum tractatu.

*De capitis dolore in febribus. Cap. cxv.*

In his quibus in febribus caput dolet, uitanda est multa lux: Lædit enim uisum, & membranas ad motum ducit. Utendum est autē frictione pedum, & extremitatum deligatione, ac constrictione. Vitanda est etiam caliditas à carbonibus, aut lucernis, aut sole & fumo. Item iniucundi & humiditate referti odores. Et clamores, & iræ, & frequens potus, ac collutio oris. Nā aut statim ab ore, aut humectō stomacho, uaporum multitudo ad caput defertur, quod aliā iam ignitum est. Maxime uero irrigationibus largioribus utendum est, ex oleo omphacino, aut optimo rosaceo, lanæ manipulo excepto, & digitis ex alto expresso, & instar salientis cum ictu quodam delabente. Quod si non resistat aer ambiens, frigida sit irrigatio, aut per se, aut ex nostro studio. Aucto autem dolore, etiam in aurem rosaceum fundatur. Si uero tempus permittat, & dolor cū ardore quodam innitatur, ocymi succus aut polygoni, aut mentæ, ex tertia aut quarta parte rosaceo ammisceatur. Et tunc etiam parum aceti ipsis diligēter ammisceatur, maxime in quo acetum fuerit coctum. Perseuerante uero dolore, ad uenæ sectionem deueniendum est, si nihil aliud fuerit quod prohibeat. Odoramenta quoque non incommode assumuntur, myrtus, rosa, pulegium. Cataplasmata uero conueniunt in sin- cipite ac fronte, polygonum tritum cum flore polen- tæ, & folijs seridis ac plantaginis. Si uero dolor ue- hementer incumbat, hyoscyami folia uiridia aut pa- paueris cum micis panis. Præstant autem amygda- læ amaræ madefactæ ac decorticatæ, & cum micis impositæ temporibus ac fronti. Optima uero est aloë fronti illita cum aceto. Aut crocomagma. Et intesti- na terræ trita illinuntur, & celerrimè mirificè opitu- lantur. Vter porro in ipsis facile solubilis præpare- tur. Considerandum tamen ne stomachus uehemen- ter infestatus, caput ad consensum perducatur. Et conan- dum ut quæ molesta sunt per uomitus euacuentur.

*De uigilijs in febribus. Galeni. Cap. cxvi.*

Si uigiliæ nimium infestauerint, manus & crura deli- gari iubebimus, eò tempore quo ad somnum con- uerti solent, & hortamur ut assiduè aperiant ac clau- dant palpebras, donec satis fatigati fuerint. Deinde repente soluimus ligamenta, & tollimus lucernam, & multam quietem esse iubemus. Ex Herodoto & Philumeno. Puluinaribus uigilantium subdantur capita papaueris, aut radices papaueris nigri, aut mala mandragoræ, aut hyoscyamus. Odoramentis autem utendum est, papauere uiridi, & lactucis, quæ meconitides appellantur, & menta, & coriandro ac rosas. Nos autem minus horrenda faciei prolatio- ne uitimur, incoctis in aqua calicibus papaueris ni- gri, & meliloto. Aut calamintha, aut pulegio, & melius facit. Odoramentum uero optimum hoc est.

Papaueris albi calicum costorū, corticis radices man- dragoræ, æquales portiones terito, & uino ac pauco rosaceo subactas olfaciendas exhibeto. Suffumigio autem somnifico utendum est tali. Styracis, amomi, ammoniaci thymiamatis, bdellij scythici, corticis ra- dicis mandragoræ, opij, singulorum æquas partes preparato & suffito in lignis cupressinis. Mirificè facit etiam berenices suffumigium, similiter suffitū: Ducit enim ad somnum. Descriptum autem habe- tur in tractatu de theriacis, Sermone inquam deci- mo tertio. Vngento uero somnifero utere hoc. Stry- racis sextantem, rosarum siccarum unc. i. seminis hyoscyami nigri unc. i. baccarum myrti nigrarum unc. i. olei rosacei lib. i. Vini ueteris odorati quan- tum satis est. Contusa & cribrata terito cum uino, & adijcto oleum, & unitis utitor, illitis ex eo naribus intrinsecus ac extrinsecus, & fronte. Imponendum est etiam fronti serpillum cum meliloto in passo co- ctum. Item semen ocymi, & atractylidis semen, hy- oscyami semen & folia, similiter & solani halicaca- bi, itidem faciunt. Illine etiam frontem ex cyphi cum uino, & crocomagmate. Si uero perseuerarit uigi- liarum symptoma, frontem & tempora aliquo pa- stillo dolorem eximente illine. Et si nihil profece- rit, prædicta rei difficultate, ad dolorem eximentia, in potu exhibenda procede. Est autem minus mo- lestum, & sapore iucundius omnibus pharmacis so- mnificis, id quod ex calicum papaueris decocto ac melle componitur. Cuius compositionem paulò post in hoc Sermone referemus. Utere & cataplas- mate optimè ex palmulis maceratis aut coctis in ui- no, & cum polenta tritis, adiecto modico rosaceo, aut melino. Pectori enim impositum quodammodo præparat ad somnum.

*De graui sopore. Herodoti. Cap. cxvii.*

Perfectam curationem eorum qui in grauem soporem delapsi sunt, in sequenti Sermone de capitis affectio- nibus trademus, in quo etiam de phrenitide docebi- mus. Nunc autem dicere necessarium est quomodo quis urgentibus symptomatis resistere possit. Pro- inde spongia posca imbuta, non ualde frigida, fa- ciem detergere oportet, & extremitates fortiter de- ligare. Odoramenta uero adhibeantur incisoria uim habentia & excitatoria, & maxime castorium. Et in exacerbationum remissionibus cucurbitæ dorso ac spinæ efficaciter affigantur. Perseuerante uero morbo, etiam sternutatoria in exacerbationum re- missione adhibeantur. Cauendum autem est à lucer- narum usu. Caput enim inde repletur. Sit autem & ciborum materia incisoria uim prædita. Habent autem uim excitandi etiam in ipsis, ea quæ sequenti Sermo- ne ad lethargicos describentur, tum per se, tum cum aceto naribus admota.

*Quomodo linguae asperitas in febribus curan- da sit. Cap. cxviii.*

Lingua in febribus aliquando siccatur, & opus habet humectatione. Aliquando uero exasperatur magis aut minus, & diffringitur, aut nigrescit, aut carbo- nis speciem induit: quod à uiscerum inflammatione contingere solet. Si uero ipsa quidem lingua, ue- lut dictum est, affecta fuerit, præcordia uero mollia reperiuntur, periculosum signum est. Humectare au- tem ipsam oportet, seminis lini decocto in ore deten- to. Efficacius id erit, si myxæ cum semine lini fuerint



coctæ. Sed & digito in hoc succo madefacto linguam confricabimus, simul detrahentes etiam sordes dentibus adhaerentes. Deinde colluant os aqua pura, aut spongia pura detergeant. Deinde rosaceo diligenter illinantur. Sed & ipsum rosaceum melli ammixtum egregie efficax est. Et portulacæ succus in ore detentus, locos humectat. Et rhus culinaris aquæ, aut aquæ mulsæ ammixtus. Et prunorum damascenorum aut myxarum ossa in ore detenta mitigant. Sepe etiam lactucæ caulem ad oliuæ magnitudinem defectum, aut de symphyti radice, in ore tenendum dedimus, & quod oportuit fecit. Sint autem cibi mordacitatis exortes, & omnino non adstringentes, leuesque ac sorbiles. Si uero etiam præcordia inflammata fuerint, horum curationem facere oportet. Principium enim & finis interaneorum lingua est. Si uero diutius durarit linguæ asperitas, adipem anserinum si affuerit, sin minus, gallinaceum, aut qui adhuc præstantior est phasianicum duplici uasculo liquato, & digito in ipso intincto, linguam abunde fricato. Si uero adhuc perseverarit asperitas, butyro recenti similiter utere, facit optime, sed in principio eo uti non conuenit.

*Quomodo sitis curanda sit. Philumeni. Cap. cxxix.*  
Sitis duplex est, altera ob humiditatis inopiam: altera ob caliditatis redundantiam. In febrientibus itaque ambæ affligunt. Nam caliditas in his multa est, & siccitas succedit, multa humiditate per uolentiam febris consumpta. Si quidem igitur sine detrimento bibere possent quando uellent, hanc sanè sitis medellam statim amplecteremur. Quandoquidem uero & mensuram & tempora potus decernere oportet, lenimenta quædam sitis excogitanda sunt. Nam in tempestiue sumptus potus, non solum sitim non exstinguit, sed etiam uice uersa auget. In principijs enim acerbationum omnes materiæ febres accendentes, ad profundum declinant, & propterea sitim intendunt. Datus autem in illo tempore potus à materiæ multitudine superatur, & simul uitiatu accessio fit mali. Quare in principijs & augmentis potus exhibitionem prohibere oportet. In uigoribus autem, primum per gargarismos, & per collutiones oris, squallorem corporis mitigare oportet. Deinde declinatione incipiente potum dare. In remissione uero etiam nolentes aliquando cogantur potum assumere, ut ne humore indigi ad exacerbationis accessum delati resiccentur ac exurantur. Mitigare autem aliquo modo sitim oportet olei frigidissimi irrigatione, aut rosacei instar salientis delabentis. Sed & auxilia ad febres ardentes relata, & ea quæ ad linguæ asperitatem dicta sunt in ore retinenda, sitim mitigant. Omnibus autem præstat lactucæ semine commansum, & radix dulcis appellata, & cucumeris semen. Oportet autem post horum commanducationem collutionibus ac gargarismis uti. Sint autem & cibi omnes humectantes. Catapotio sitim eximens. Ex Dioscoride. Seminis cucumeris drach. viii. tragacanthæ drach. iiii. tragacantham tusam ac cribratam ouorum crudorum recentium candido dilue, & ex contritis simul catapotia efforma, eaque in umbra sicca, & unum sub lingua tenendum præbe, ita ut dissolutus liquor absorbeatur. Dato etiam cremore malorum cydoniorum absorbendum, aut pirorum, aut omphacii succum, aut hydrosotum, aut mel rosa-

ceum cum aqua calida. At uero in sanis, sitis ob siccitatem factæ medela est somnus. Concoquit enim humores. Sitis autem ob caliditatem, medela sunt uigiliæ. Caliditas enim in uigijs circa superficiem expanditur. Sitis uero ob caliditatem eduliorum factæ, aut ob multum uini potum, medela est frigida potus.

*De aurium dolore in febribus. Philumeni. Cap. cxxx.*

Aurium dolor in febribus fit, & aut ipse febrem auspicatur, aut succedit, & periculosiores febres efficit. Succedunt dolori atque inflammationi etiam uigiliæ. Si uero perseverarit, etiam mentis emotiones. Hippocrates autem letales fieri dicit in his dolores. Si igitur moderatus est dolor, & in principio, rosaceum tepidum auribus instilletur. Aut candidum & aquosum oui, cum lacte muliebri. forinsecus autem hapsio lanæ oleo imbuto, in quo anethum coctum est, aures obturentur & integantur. Caput item rosaceo irrigetur, aut oleo omphacino. Si uero dolor amplius intendatur, & uenæ sectio assumatur, & aluus iritetur. Postea quoque forinsecus per ambitum aurium cataplasma ex pane, aut semine lini imponatur, hyoscyami aut papaueris uiridibus folijs simul contritis. Butyrum autem pro oleo in cataplasma misceatur. At in dolorum exacerbationibus, fouendi sunt loci spongijs aqua & oleo calido imbutis, donec dolor sistatur. Vehementer enim hæc mitigant, & rursus prædictum emplastrum imponatur. Instillandum est etiam auribus oleum amygdalinum, aut rosaceum, in calice papaueris ad calidum cinerem calefactum. Aut intestina terræ in rosaceo cocta instilla. Aut asellos sub hydris stabulantes, aut araneos.

*Auris suppuratæ curatio. Cap. cxxxi.*

Suppurata inflammatione & eruptione per meatum facta, ubi lana specillo obuoluta pus eduxerimus, primum aqua mulsæ eluimus: deinde uino mulso: Postea aceto mulso: deinde modica nitri spuma aceto mulso ammixta. In meatum uero indemus nostrum medicamentum lana exceptum, quod egregie facit. Est autem alumen liquidum, mel, & rosaceum, æquis portionibus singula modice cocta. Optime facit & Mulsæ pastillus optima sapa & modico aceto dilutus. Cæterum de sonitu & audiendi difficultate, inter communia auxilia dicetur. Nosse tamen oportet pessimum signum esse in acutis febribus auditus difficultatem. Nam aut lethargum, aut mentis apprehensionem, aut parotidas perniciosas, aut aliud quoddam periculum minatur. Raro autem permanet audiendi difficultas in aliquo qui morbum superauit, sed simul cum morbo intercidit. Et enim aliquando per circuitum repetit in exacerbationibus augescens. In remissionibus uero simul discedens. Quod contingente auditorum meatum uexare non oportet: sed solum caput irrigare cum his quæ in febribus ad capitis dolorem conueniunt.

*De lippitudine in febribus. Cap. cxxxi.*

Si lippitudo in febribus fiat, abstinere oportet ab omni medicatione. Infundendum est autem oui tenue & candidum cum lacte. Et foris illinendum glaucium, aut Nilii collyrium ex rosis, aut aliud quoddam ex croco, ex his quæ fluxiones repellunt cum refrigeratione. Si uero dolor uehementer uexet, somnū fiat per spongas, & hapsus lanæ ouo imbutus pro more



more imponatur. Si uero augeatur dolor, etiam panis imponatur, in calicem papaueris ac melilodi decocto madefactus, cum oui assati uittello, aut etiam cocti, addito modico rosaceo. Aut psyllium feruenti aqua madefactum imposito. Suppurata inflammatione collyrijs dolorem eximentibus utendum est.

*De oculorum obscuracione. Philumeni. Cap. cxxiii.*

Fieri solet circa morborum solutiones, aut etiam ubi uires recolligunt aegri, circa utrumque oculum aut circa alterum obscuratio, ut uix uidere possint, uelut per caliginem quandam, & ut aliquando quaedam ante oculos uideantur pilis similia. At dum oculi considerantur, puri apparent. Rarissime uero in talibus circumstantijs, circulus pupillae aut minor aut amplior reperitur. Ipsum porro obscuracionis oculorum accidens, ut plurimum seminis in somno effusione praegressa, iuxta morbi solutionem, aut refectioem euestigio incidit. Et est signum debilitatis spiritus uisui ac nervosae partis. Itaque in perfecta corporis conualescentia, etiam uisus actio integre restituitur. Quapropter a localibus auxilijs abstinere oportet, & neque fomenta, neque illitiones adhibere. Verum refectorij totius corporis ductus usu, hoc ipsum accidens corrigere.

*Fluxus sanguinis narium in febris curatio.*

*Cap. cxxiiii.*

Fluxum sanguinis e naribus in quarta die in febris fientem, pessimum signum Hippocrates dicit. Multitudinem enim significat in toto corpore, aut in capite. Destillat enim sanguis aut ob compressionem, aut ob densationem meatuum. At uero uberior excretio eius, multitudinem & laxare, & minuere potest. Paulatim igitur euacuationem facere oportet inde, unde natura impetum habet. Hac ratione facta, ausus fui in destillationibus in quarta die fluxibus, per graminis cauliculum, uelut mos est, uasa narium fauciare. Non autem oportet modico fluxu contentum esse, sed pro uiribus detrahare. Sufficiente autem facta euacuatione, consueto more eundem suppressere.

*Vesicae ex urinae difficultatis curatio in febris.*

*Philumeni.*

*Cap. cxxv.*

In principio pessimarum febrium etiam hoc accidit, ut uesica doleat, & paulatim ac cum dolore urinam emittat. Et hoc non solum molestum est, sed etiam signum quod tota pars nervosa doleat. Est enim totum corpus crudioribus humoribus refertum. Confluit autem ex ipso aceruata multitudo in uesicam, quae amplius distenta ad actiones suas inefficax fit, & periculum suppressae urinae inducit. Proinde imo uentri, pectini, ac inguinibus, lana pura oleo dulci calido aut scyonio imbuta imponatur. Praestat autem ruta, & anethum, & apij semen in oleo cocta esse. Aut cuminum tritum lanæ inspergere. Si uero dolor augeatur, etiam cataplasmata post irrigationes adhibeantur. Et in intestinum rectum oleum & butyrum cum foenigræci decocto infundantur. In mulieribus uero & in uterum, & in intestinum rectum. Si uero inflammatio urgeat, & rubor cum multa caliditate in summo uentre appareat, etiam uenae sectio adsumatur. Dieta autem sit tenuis & exquisita. Utanturque pisana, aut alica lora ex aqua mulsa, aut ouis sorbilibus. Post hæc etiam micæ panis probe lotæ exhibeantur. Deinde malua friabilis assumatur, & por-

rum capitatum pluribus aquis coctum. Et pisces tenerissimi. Infessio quoque appareat usque ad umbilicum & totos lumbos, ex artemisia, foeni Græci, pulegij decocto, & oleo ammixto. Progressu uero temporis, castorium lanæ inspergatur. Cæterum potius ita affectis commodissimus est, post augmentum quietum, cucumeris satui semen, quod præmaceratum decorticatur, & tritum datur cochlear. II. mensura cum aceto cyathis tribus. Et mouet quidem urinam citra molestiam. Dolores autem euestigio soluit. A reliquis autem urinæ cibus, quam diu febres perseverarint, in totum abstinendum est, ut ne urinæ copia ad uesicam delata, ipsam distendat, & malum augeat.

*Lumborum doloris curatio.*

*Cap. cxxvi.*

Lumborum dolores sunt plerumque in febris prauis statim ab initio, & permanentes maximas uexationes inducunt, & repente dissipari, periculosiorem fore morbum indicant. Circa primos igitur dies irrigatione ex uino & oleo utendum est. Deinde spuma nitri, & uinum dulce mari mixtum, & oleum, simul unita & lana sordida excepta, locis adhibeantur. Tales autem irrigationes uehementiam quidem doloris mitigant, dolorem autem non omnino tollunt. Progressu uero temporis uenae sectione utendum est. Deinde cucurbitæ loco adhibendæ. Postea cataplasma parabimus ex semine lini & foeno Græco, & hoc in sacculum coactum lumbis supponemus, ut super ipso decubitus fiat. Deinde irrigatio ex oleo rutaceo fiat. Et cerata ex cyprino facta adhibeantur. Venter autem a principio facile solubilis per cibos paretur. Vehementer autem prodest ipsis clyster, ex decocto cucumeris syluestris & melle solo iniectus. Euacuat enim pituita & citissime alleuat, nisi uehemens fuerit febris.

*Ulcerationis circa os sacrum in febris curatio.*

*Philumeni.*

*Cap. cxxvii.*

In diuturnis & alijs habitum eliquantibus febris, consumpta carne, super nudis ossibus decubitus fit, & eminentes maxime ipsorum partes, dolorosas & ægre curabiles ulcerationes habent, eo quod per stratum trahantur. Non solum autem ob curationis difficultatem graues sunt ulcerationes: dilatantur enim & profundæ fiunt, & crassa labia habent, proserpuntque & usque ad nuditatem procedunt: sed etiam notandæ sunt a ueteribus, uelut hæc affectio perniciem portendat. Quapropter antequam immedicabilis fiat, curationem eius aggredi oportet. Primum itaque ubi locus rubicundus & dolorosus fieri incepit, circulum laneum iuste magnitudinis loco subdemus, quo affecta pars per uacuum firmata, a compressione liberetur, & decubitus minime ærumnosus fiat. Postea uero ceratum ex rosaceo aut myrteo oleo paratum, quod recipit spumam argenti, cerussam, ordeumustum imponemus, subiecto uidelicet ex lana circulo. Idem faciunt etiam omnia sedis cerata. Et adhuc magis id quod residet in cretis uasis in quibus aqua coquitur, quod uelut testa adhæret fundis ipsorum, si cerato rosaceo ammisceatur. Reperitur autem eius copia in æneis balneorum uasis. Item ceratum ex melle, quod quatuor hæc æqualiter recipit, spumam argenti, oleum, ceram, mel. Diluitur autem rosaceo, & mirifice facit. Adhibeatur etiam fomentum per spongas. Si uero inflammatio fiat, panis cataplasma locis imponatur, cum solano, aut polygono, aut plantagine, aut brassicæ folijs. Si uero



uero pascendo proserpat, ulceratio, lenticula cocta cū malicorio imponatur. Utendum est & medicamentis ad nomas paratis, cum rosaceo dilutis. Item emplastro uiridi Epigonij. Et pastillo qui Corax appellatur, & Andronis aut Musæ pastillo cum sapa. Cōtracta autem & repressa noma mitioribus communibus auxilijs utendum est.

*Ulcerationis circa scrotum & anum, in febribus curatione. Philumeni. Cap. CXXVIII.*

Sæpe in ægrotantibus exulcerantur partes hæ, quandoq; ob solam negligētiā. Aliquando uero etiam à prauis & acris humoribus, & malignis febribus. Itaq; reperire est ita affectos etiam mente læsos, & non percipientes dolorem, neq; animaduertentes feruorem, nisi is qui curam ipsorum gerit ex odore cognoscat. Primum itaque per spongiā fouendus est locus ex aqua leniter calida. Deinde illinendus myrteo aut rosaceo oleo. Et postea scrotum myrtosicca leuissimè trita conspergatur. Deinde ex candido oui, cum cerussa & modico rosaceo aut myrteo illinatur, ut ne exarescat. Si uero illitionum inquinamenta non ferant, ceratum molle præparetur ex rosaceo, quod cerusam & argenti spumam habeat, & uitellos ouorum coctos. Cōuenit etiam ceratum butyrinum, & quod ex anseris aut gallinaceo adipe paratur. Et emplastrum siue ceratum ex ordeo. Et omnia ad sedem parari solita. Si uero nome succedat, utendum est curatione in ossis sacri ulceratione relata. Cibi uero exhibeantur ipsis dulciores, pro facta de febribus coniectatione. Ventris quoque cura habeatur maximè locis circa sedem alleuatis.

*Pustularū in febribus curatio. Herodoti. Cap. CXXIX.*  
In febrientibus assidue fiunt pustulæ circa labia & nasum, iuxta febrium solutionē. Verum in principijs febrium non simpliciorum, sed à prauis humoribus ortarum circa totum corpus exoriuntur uibices similes culicum moribus. In malignis autem & pestilentibus febribus exulcerantur, & quædam ad carbunculorum speciem accedunt. Omnes autem multitudinis corrupti & habitum erodentis humoris signa sunt. Quæ uero in facie oriuntur, omnium malignissimæ sunt. Deteriores autem sunt plures quàm pauciores, & maiores quàm minores, & quæ citò delentur quàm quæ multo tempore durāt. Deteriores item feruentes quàm quæ pruritus inducunt. Et quæ quidem succedunt aluo suppressa, aut moderatas egestionem faciente, bonæ sunt. Quæ uero fluente aluo & uomitibus uexantibus fiunt, malæ. Si uero succedentes aluū resiccent, bonæ. Sequuntur ad pustulas, febrium malignitas, & plerunq; etiam animi deliquia. Eas igitur quæ circa febrium simpliciorū solutiones fiunt circa labia & nasum, rosaceo illinere oportet per se, aut cum cerussa & spuma argenti. Cōfert etiā pastillus ex croco, myrrha, & alumine, quæ iridem uocant. Et niger pastillus, qui recipit crocogrammatis, balaustrij, atramenti sutorij, myrrhæ, & aloës, singulorū partes æquales. Teruntur hæc cum uino uelut collyrium, & in pastillos efformantur, & usus tempore cum aqua aut lacte illinuntur, aut cum uino, ubi adstrictionem augere uoluerimus. Agglutinantur autem hæc post illitionem, aut sine hac, pellicula palmulæ ossi adhærente, aut membrana oui. At uero pustulæ uibices referentes curentur uenesectione in principio, si nihil impederit. Solent enim

reuerse intra corpus periculum afferre, si nō per uomitus, aut per aluū acrimonia secedat. Quapropter etiam aluus per pisanæ succū, & oua, & oleum chamemelinum molliatur. Detineant autem uesperis infusum per totam noctem. Sed & ciborū contractione utendum est, quò undiq; multitudo tollatur. At in accessionibus propter succedentes circa stomachū uehementissimos morsus, aqua repida data uomere iubemus, digitis aut pennis immisis. Cibi uero exhibeantur contemperandi uim habentes. uelut est pisanæ succus, aut alica cum aqua mulsa. Si uero febris ardens infestet, illinatur corpus aqua & oleo, nitro modico ammixto. Pustulas enim circa superficiem retinet, & materiam in profundo attrahit, & profunditatem refrigerat, & sæpe sudores excludit, qui acrimie humorum multitudinem in uaporē diffilare possunt. Cæterum in pestilentibus & carbunculosis, uenæ quidem sectionem adhibemus statim in principio, non autem cibi contractionem. Fames enim peiorem materiam facit, & uires in his conscindit, quas integras seruare uolumus in omnibus febribus, maximè pestilentibus. Si quidē igitur admiserint loci, illinendæ sunt pustulæ pharmaco crasso, ex rosaceo & cerussa, & thure ac uino dulcissimo. Aut ex spuma argenti & manna thuris cū rosaceo. Reliquæ uero partes cerato integantur ex eadem materia parato. Conueniunt etiā ipsis omnia cerata & emplastra quæ ambustis adhibentur. Et pustulas quidem circa faciem, calidæ prolutione mitigabimus. Quæ uero in reliquo corpore sunt, per spōgias diutius foueantur, maximè prurientes. Si uero serpentina fuerint ulcera, etiam calcis uiuæ parum ammisceatur: mirificè enim resiccat, & serpiginem ipsarum sistit. Quæ uero iam depascunt, lenticula cocta cum malicorio ac melle, aut plantagine, aut polygono, aut rosis cum pane integantur. Bonum est etiam his caprinum lac, ad humorum prauitatem contemperandā. Oportet autem quartam partem lactis aquam ammiscere, & simul coquere assidue uersando, donec dimidium de toto super sit. quo neq; in casei naturam trāsiliens exacerbat, neq; seruēfactum nidorosum fiat, propter febrē detinentē. Declinatione uero facta, per medicamentū purgatorium idoneum materiæ euacuentur. Postea autem Antidotus theriaca detur, aut mithridatica, aut alia quædam ad letalia uenena, & uirus eiaculantia facta. Nam humorū fortis mutatio per corruptionem facta, uenenoso pharmaco similis est. Fiunt porro aliquādo pustulæ magnæ colore albæ, modicum pruritus inducentes, redundantes in foemoribus, naribus, lateribus, & summa uentris plerunq; parte. Origanum autem ex multa lēta & alba materia habent. Hæc uero cum toto corpore curantur. Neq; enim grauem morbū minantur, si saltem modico uictu quis utatur. Quòd si febres in his urentes fiant, commodum fuerit frigidam dare in exacerbationum uigoribus, morbo in uigore existente, nisi uiscera habeant quæ facillè læduntur. Fiunt etiam aliquando pustulæ rotundæ, inæquales, subalbide, aut subrubræ, cum elevatione carnis. Aut uariis similes, qui in facie oriri solent, & duræ sunt, ac multū pruritus inducūt, ut uigiliarum causa fiant, dum inde sinens adest cupiditas ad scalpendum. Consequuntur autem hæc plerunq; ad febres intermittentes, & minime grauem indicant morbum. Quapropter cōueniendū



nienti tempore æger in solium calidum intentè insideat. Utendum est & his quæ foris illinuntur, uelut est oleum myrteum aut lentiscinum cum myrto, aut manna thuris, aut cimolia, torrefacta, aut alumine liquido, aut farina fabarum. Aut sesamū tritum cum modico aceto illinito. Si uero pruritus urgeant, linteis crudis aut per spongas ex aqua feruente foueto. Si autem exulceratæ fuerint, utendum est ceratis ad ambusta destinatis, præsertim eo quod ex ordeo paratur. Porro quæ ualde rubræ sunt, pessimè existunt. His autem deteriores sunt liuidæ, nigræ, & tumidæ, similes existentes carnibus compunctis, redundant autè in facie & pectore, & uentre, lateribusq; ac dorso. Tales à principio aggredi non oportet, sed differre. Si enim non successerit, in eum qui curationē aggressus aut pollicitus est, culpa recidit. Si uero permanserint hæ usq; ad uigorem, & non progrediantur in peius, non omnino negligere oportet, etiam si raro, attamen aliquando opem ferre, & oportuno tempore medicamēta adhibere, atq; magna animaduersione curare. Quæ enim post mortificationem superficie ex alto emergunt, quid aliud significarint, quàm uitam aliquo modo ab internis efferri:

*De tremoribus in febribus. Herodoti. Cap. cxxx.*

In malignis febribus fiunt tremores. Conflantur enim ex uitiato uictu, & frigida potu, & poscæ, ac multi uini, & ex immodico rei ueneræ usu, ac similibus. Abstinendum itaq; est ab his quæ nocuerunt, & exhibenda quæ prodesse possunt. Necesse est autem omnino affectam esse in omnibus spinalem medullā. Quapropter tota spina contegenda est, & affectę partes, lanis sicyonio aut potius gleucino imbutis: aut cerato liquidiore ex aliquo taliū parato, aut ex oleo rutaceo. Rigandum est etiam caput in primis diebus oleo dulci. Si uero protrahatur morbus, anethino in accessionum interuallis. Deinde adhibeantur cucurbitę à primo uerticulo usq; ad lumbos, impositis cataplasmatibus iisdem partibus unā cum præcordijs, ex cruda ordeacea farina oleo & aqua diluta ac cocta. Integantur autem hæc lanis oleo ueteri aut sicyonio imbutis. Cibi exhibeantur sorbiles calidi. Prouidendum etiam ut facile solubilem faciamus aluum, permanendumq; in hoc ductu, donec febres minuantur aut soluantur. Progressu uero temporis si perseverarint tremores, cōmunis auxiliorum modus uelut in alijs tremoribus adhibeatur. Ita ut alterius in olei calidi solii locemus, & ante solū insessum & postea, sicyonio aut antiquo oleo illinamus. Aliquando etiam castorium ungento ammiscendum est. Si uero perseverarint dolores, etiā in potu exhibeatur castorium. Et ceratū imponatur ex ipso paratum. Et communia ungenta ad resolutiones in usum assumantur.

*De conuulsionibus in febribus. Galeni. Cap. cxxxix.*

Conuulsionem plerumq; fiūt propter repletionem neruorum partium, qua ratione etiā fortiter inflammatis accidere solent. Insuperq; ob mordacē tenuem humorem, neruosas partes erodentē. Et propter fortem frigiditatem congelatio simile quiddam efficiens. Fit etiam conuulsio ob excellentem siccitatem. Sequitur autē maximè ad perniciosas phrenitidas, & tum propter febris uehementiam, tum ob intentos & agrestiores motus. Et ex his qui sic conuulsi sunt, neminem seruatum esse ipse uidi, neque qui uidisset audiui. Proinde prædictæ tres conuulsionis species

sæpe curantur. Incurabilis est autem ea quæ ob neruorum partium fit siccitatem. Aliquando uero in ore uentris humor tenuis, & acris, ac maximè æruginosus, conuulsionem fortes & syncopam inducens efficit, ut frigida exudationes fiant. In his aqua tepida in potu oblata, digitorum aut pennarum immisione, uomitum mouemus. Si uero circa intestina morsus sensus contingat, ptisanæ succum per clysterem iniicimus. Damus autem cibos ægrè corruptiles, uelut est alica cum mali punici granis, & similia. Si uero nihil tale fiat, conuulsionem per totum corpus fientes similiter ut tetanicos, qui antrosum ac retrorsum conuelluntur, curabimus. In partialibus uero primum partes contractas blandè contrectabimus, & dolores ipsarum mitigabimus, molliterque fricabimus oleo sicyonio antiquo calefacto. Si uero adhuc perseverent, etiam castorium ammiscetur, & reliqua relaxantia ungenta adhibeantur. Qui uero ob siccitatem conuelluntur, propter febris uiolentiam, & præsertim delirio præsentē, his lauandum est caput multa calida dulci ac temperata aqua. Manus quoque ac pedes multa calida perfundantur. Deinde oleo dulci calefacto caput irrigetur, & manus ac pedes illinantur, & amiculis foueantur, & quies inducatur. Quod si sanguinis multitudo adsit, & conuulsionem inducat, uena secanda est. Deinde cucurbitæ affigendæ cum scarificatione. Et si quidem crura fuerint contracta, postremo uerticulo cucurbita affigantur. Manibus uero conuulsis, septimo uerticulo, & ei quod humeri articulo subiectū est cucurbita affigamus. Si uero toto corpore ab affectione immuni, labium contrahatur aut palpebra, graue hoc accedens ducendū est. Detractiones autē sanguinis per cucurbitas in his fiant à ceruice & primis duobus uerticulis. Caput uero oleo anethino calido irrigetur. Vbi autem tempus balnei opportunū apparuerit, lauetur, & in aquæ potu adhuc seruatur. Si uero uinum exhibere opus fuerit, modicū & aquosum præbeatur.

*De iucundis ac commodis potionibus in febribus.*

*Philumeni.*

*Cap. cxxxii.*

Duplex robur & admirandum simul auxilium exhibet, id quod etiam naturæ ob iucunditatem gratum existit. Venter enim ubi quod blandum est suscipit, & in se complexus est, tenet et probè concoquit pro uiribus, maximè si fuerit quantitate moderatū. Excitatur enim natura, & actiones sæpe ab affectionum feritate misere afflictas suscitatur, ac morbo repugnat iuxta duplicem modum. Ipsum quidem malum paulatim contrarietatis natura castigans: uires autem animal gubernantes consolans, & excitans, ac fortificans, ad superandum morbum. Omnes igitur homines ut plurimum dulcibus gaudet potibus, & præsertim si adstrictionē, & caliditatem, & quasdam eiusdem generis qualitates habuerint ammixtas. Quale est uinum dulce, & uinum mulsum. Verū hos potus non tutum est in febribus exhibere. At eos quos nunc referemus, etiā si magna animaduersione opus habeat, tutius tamen quàm prædictos exhibere possumus.

*De potione pharmaci ex capitibus papaueris.*

*Galen.*

*Cap. cxxxiii.*

Sumatur autem in manus medicamētum ex papaueris capitibus, quod optimum potu est iucunditatis gratia, & optimum ad calidas ac magnas affectiones circa uiscera consistentes, & totum corpus apprahendentes,



dentis. Item febricitantibus, & cholericis in quibus bilis infernè ac supernè erūpit, affectionibus. Et his qui delirij in febribus ac uigilijs affliguntur. Prodest & tussis frequēti ex tenui fluxione factæ, quæ ex capite calidiorè in pectus destillat. Preparatur autem hoc modo. Capita papaueris moderatæ magnitudinis decem numero unà cū ipso semine, recentia, neque ualde mollia, neque dura, in aquæ pluuiæ optimæ sextario uno per diem ac noctem macerare oportet. Deinde ad ignem non fumantē coquere, donec flaccida appareant, & expresso liquore, & per panniculum rariorem excolato, mellis optimi despumati dimidiam aquæ mensurā ammisce, & agitando coque ad compagē mellis Attici. Præstat autem per passum Creticum, aut per sapam, mellis loco præparare, ubi fluxus fuerit ualde tenuis. Ammisceo etiam aliquando ad hoc pharmacum glycyrrhizæ radicem, ut unà cum papaueris capitibus coquatur. Si uero hæc non affuerit, succum ipsius siccum inijcio. Si uero continetur in pulmone humor delapsus educatione indigens, melius est per mel ipsum parare. Datur moderata mensura duorum cochleariorum. Augebis autem & minues copiam, pro corporis magnitudine cui id exhibes, & pro ætate, animi tempore ac regione. In omnibus enim his ad frigiditatem declinantibus, minimum dabis. Ad caliditatē uero, plus. Sed & destillationis quantitatis ac qualitatis respectu, plus aut minus dabis. Certè ex eo quod ex capitibus papaueris Thebaici præparatur, datur ad summum uncia una. Talis est descriptio Galeni huius pharmaci. Ego uero semper in usu eius quod ex passo præparatur perseuero, aliquando mel ammisceus ad eius exhibitionē, aliquando acetū mulsum, aut mel rosaceū, aut omphacomeli, aut aliud quoddā pharmacum hepaticum, aut splenicū, aut stomachicū, & uires eius ad præsentē semper affectionē transmutans. Exhibeo autem ipsum non solū somno indigentibus, ad uesperā, & ad tussim: Sed etiā infania laborantibus post uenesectionem & febrientibus uehementer, & quibus os uentris intolerabiliter perustum est, et in igne sacro, atque aliàs calida affectione thoracis & pulmonis, hepatis item ac intestinorum & mesenterij. Et non solum semel, sed iterum, & non solum in febriū uigore, sed etiam ante uigorē, & ante manifestā concoctionē, in quibus uigiliæ, aut caliditas acris & magna hominē affligunt. Præstat autem ea quæ sexcenties feci in huius pharmaci exhibitione recensere. Etenim in febribus putridis ante morbi uigorē, & in his qui ex hepatis, aut splenis, aut pulmonis affectionibus ægrotant, acetū mulsum simplex exhibitioni eius ammisceo. In uigore uero febriū, omphacomeli, aut mel rosaceū adijcio. In rarioribus quidem corporibus, & qui os uentris debilius & non appetens habent, omphacomeli. his uero qui dulci potu gaudent, & qui medicatum aliquē humorem, aut biliosum in uentre habet, mel rosaceum. Atque hæc quidem in febrilibus affectionibus. Urinæ autem stillicidium ex urinarū acrimonia abortum, magnificè sedat maximè in balneo, & ante balnei ingressum largè datū. In quibus etiam uictus rationem pleniorē & melioris succi esse iubemus. Sed & in nephriticis ac lūbis calidioribus medēdi uim habet. At uero his qui urinæ profluuiū laborant, & quibus bilis supernè & infernè erumpit, exhibeo frigida ammixta, præsertim in ca-

lidioribus temperamentis. Oportet autem in bilis supernè ac infernè effusione, habitum corroborare forinsecus per adstringentes irrigationes, & similia, atque sic pharmacum exhibere, cum omphacomelite calido temperatum. Si uero thoracem humoribus repletum per tussim euacuare uolueris, acetum mulsum uariè ad eius exhibitionem ammisceto, & calidum exhibeto.

*Omphacomelitis preparatio.* Cap. cxxxiiii.

Botri uuæ acerbæ accipiantur qui iam maturescere incipiunt. Deinde in domo temperie moderata ad biduum uel triduum expandantur, & resiccati exprimantur, & liquor uase uitreo excipiat, & optimi mellis despumati pars una, ad tres succi partes ammisceatur, & ad dies aliquot ad solē exponatur hoc pharmacū, donec feruere desierit ac quieuerit. Deinde in domo superiore seruetur ne putrescat. Hæc autē proportio tibi pro regula sit in optimo melle & optimo uuarum acerbæ succo. Augebis autē & minues quantitatem mellis, pro tenuitate aut crassitie succi. Utendum est ipso in tenuibus ac diuturnis uentris fluxionibus, ob calidas affectiones factis. Et in his quibus os uentris appetentiam nullam habet, propter caliditatem. Et in his qui humectum stomachum habent, post uentris per uomitus euacuationē. Et in prægnantibus mulieribus, & quæ terram aut carbones, aut alia quædam aliena edunt, ubi per picram ex aloë purgationem feci, omphacomeli exhibeo. Bonum est & his qui ob excedentem uentris euacuationem, animo linquuntur.

*Mellis rosacei preparatio.* Cap. cxxxv.

Mel rosaceum tres partes succi rosarum exunguiū excolato accipit, & mellis partem unam. Coquitur autem ad solem calidum expositum ad plures dies, eodem modo quo omphacomeli. et postea adseruatur. Si uero turbulentus fuerit aer, aut frigidior, quando mel rosaceum paras, ammixto optimo melle ad rosarum succū, & per rarum panniculum siue linteum excolato, simulque ad lentum ignem coquito, donec quartam aut tertiam succi partem cōsumpseris, atque sic exceptum medicamentū uelut dictū est adseruato. Et ubi calidiorē uideris aerē, uelut omphacomeli insolato. Adstringit equidē leniter, & propterea frigefacere potest. Habet uim extensoriā ex melle. Habet & subamarū quiddam & leniter acre, unde oricomodum est calidam quandam inflammationē habēti, propter calidi fluoris influxū, itemque in acris ac biliosis fluxionibus in uentre, ubi uidelicet affecti prius uomuerint. Exhibemus etiam ipsum his qui uentre exuruntur, citra humorum superfluitatē, atque hoc absque uomitu. Item febricitantibus, uigore iam totius morbi instante, & particularis exacerbationis. Sæpe enim in febrilibus morbis etiam unica portio larga sufficit in conuenienti tempore data, ad affectionis solutionem, tum per sudorum eruptionem, tum per uentris subductionem. Inter reliquos enim potus mel rosaceum conuenientissimum est his quibus acres humores per uentrem subire uelis.

*Hydrososati preparatio.* Cap. cxxxvi.

Rosarum recentium exunguiū, & per diem ac noctem præficcatarum lib. i. mellis sextar. i. aquæ pluuiæ ad tertias decoctæ sextar. iiii. commisceto hoc modo. Aquæ pluuiæ sextar. ix. coquito donec tres reliqui fiant, & ad ablatam ab igne aquam feruentem præficcata



siccitas rosas iniice, & uas pluribus operimentis probe contextum adserua. Sequenti uero die aquam excola, & rosas non expressas abijce, ut ne aspera aqua fiat, & coiecto melle in mortarium, & probe trito, aquam cum ipso unito, & fictilibus uasis praesertim recubibus ac crudioribus excepta, ad paucos dies insolato, & in domo in qua uinum repositum est adseruato. Hoc multo magis quam mel rosaceum frigescit.

*Apomelitis preparatio. Cap. cxxxvii.*

Apomeli sic praeparare oportet. Fauos accipe melle plenos, colore quidem albos, uerum mel pellucidum continentes, & mel ipsum manibus exprime, & ad aquam fontanam optimam ammisce. Et si quidem crassius fuerit mel, quatuor aquae partes, ad unam mellis ammiscemus: Si uero liquidissimum fuerit mel, tres aquae partes ad unam mellis adijcimus. Si uero sicciiores tibi uidebuntur faui, ipsos in tenues partes comminutos in mensurata aqua mitte, & manibus sufficienter tere, exprime, excola, & metre, & cognosces quantum mellis addere oporteat. Deinde in ollam nouam mittimus, in qua prius aqua fuerit feruefacta, propter terream qualitatem, & ad ignem non fumantem coquimus, detrahentes semper inter ebulliendum insidentem spumam, aut cerosam partem. Postquam autem neque spuma, neque quicquam fecis superstititerit, & octaua aut septima pars de tota mensura decesserit, ollam ab igne tollimus ac frigesieri sinimus. Et post perfectam perfrigerationem, sequenti die id quod superne fluitat detrahimus, & in uasa fictilia recentia ac crudiora transfundimus, & in uinaria cella adseruamus. Est autem apomeli exterisoria ac incisoria ui praedictum, & biliosa per aluum ducit, & ad urinam ciendam conducit, & febres putridas ad solutionem praeparat. Calidis tamen & siccis naturis aduersatur. Et in morbis calidis, & praecordij inflammationis nocuum est. Et neque sium ledat, imo etiam auget. Dandum est autem ante sorbitiones. Nam post cibum datum nocuum est.

*Hydromeli & crustuminati preparatio.*

*Cap. cxxxviii.*

Hydromelum sic praeparatur. Succum malorum lib. vi. mellis lib. xii. aquae ad tertias decoctae libr. xviii. Alia praeparatio. Malorum dulcissimorum & odoratissimorum, ac friabilem carnem habentium, corticem & interna grana detrahito, deinde contusa exuccato, & succum per panniculum purum ac densiorem excolato. Sumito autem succi sextar. i. mellis sextar. ii. aquae pluuialis in coctura ad tertias redactae sextar. iiii. Postquam igitur praeoxeris aqua ad tertias, adijce ad ipsam mel, & ubi efferbuerint simul, ab igne ablata quodammodo frigesieri sinito, et sic omni spuma detracta, malorum succum adijcito, & uasis fictilibus excipito, oblinito, & in cella uinaria reposito. Videtur autem eo post dies quadraginta. Quum autem rosas exungues ad hydromelum ammiscere uolueris, unciam rosarum per diem ac noctem in ipso macerato, deinde de excolato adseruato. Bonum enim colorem inde accipis.

quirat, & non accessit. Eodem uero modo etiam ex crustuminis, & alijis pirorum generibus praeparare potes.

*Cydonati preparatio.*

*Cap. cxxxix.*

Preparatur etiam ex malis cydonijs magnis, cortice & internis granis exemptis, deinde contulis & exuccatis, & succo per panniculum excolato. Sumantur autem succi sextar. iiii. Mellis sextar. viii. aquae pluuialis ad tertias decoctae sextar. xii. Primum itaque aquae sextar. xxxvi. coquimus, & ubi reliqui fuerint sextarii xii. mel adijcimus, & quum ebullierint, ablata ab igne ollam aliquatenus frigesieri sinimus. Postea detracta superstante spuma, succum cydoniorum adijcimus, & unita excipimus, ac uelut hydromelum adseruamus. Aliquando uero ut ne praeparata potio corrumpatur in hyeme propter frigus, mel prius despumamus, & succum excolato ad ipsum iniicimus, & in fictili oblinito per totam hyemem seruamus. Postea in uere aquam ad tertias decoctam, uelut dictum est, accipimus, & mel cum succo ipsi ammiscemus, atque sic utimur. Idem facimus etiam in malis, & crustuminis ac alijis piris. Quomocumque uero praeparauerimus cydonatum & hydromelum, & ante hyemem, & post hyemem insolamus ipsum per dies quadraginta, cauentes ab imbribus ac uentis, & sic in uinaria cella reponimus. Melius igitur est praeparare id quod cum melle seruatur sub caniculae aestu. Potest etiam rosarum exunguium, & per diem unam siccatarum uncia una, ad sextarium mellis despumati adijci, & aqua uelut dictum est sub canis aestu coqui, & uniri, & sic excolari, ac per dies quadraginta insolari. Conuenit hoc quod ex succo malorum cydoniorum praeparatur, morbis qui adstrictione & exstersione opus habent, qui internis partibus exulceratis fiunt, ore, stomacho, uentre & intestinis. Auxiliatur etiam scabiei in uenis. Et renibus ac uellicae, in quibus furfuraceae ac squamosae & capilliformes urinarum sunt subidentiae.

*Aceti mulsi preparatio.*

*Cap. cxi.*

Acetum mulsum componitur ex optimo melle, & pelucidissimo aceto, ita ut sint mellis partes duae, acetum pars una. Haec proportio pluribus corporibus conuenit. Variari tamen potest semper pro gustus & temperamenti aegri ratione, ut habeat, quod blandum ac gratum est naturae. Coquitur ad mellis compagem, & exhibetur calida temperatum. Potatum extergit uiscosos humores, & crassos attenuat. Quapropter uiscera omnia ab obturatione liberat, hepatis, splenem, uentrem, mesenterium, & renes. Commune est enim his, siue in febribus, siue citra febres detur. Aquae uero multae ammixtione, uehementia uirium ipsius exoluitur. Tussim autem mouere quae non est, & intestina radere acetum mulsum, Hippocrates & Galenus dixit: non in corporibus crassis & glutinosis humoribus refertis, sed puris & non redundantibus superfluitatibus. Aut his quae ex tenui & acris fluxione laborant, & quae nervosas partes ualde subtili sensu praeditas habent.

FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN

SIXTO SERMONE AETII

HABENTUR

De hydrocephala affectione. Cap. i. De lethargo. cap. ii. De phrenitide. cap. iii. De catocha & catalepsi.

cap. iiii. De caro.

cap. v. De comate.

cap. vi.

cap. vii.

De re.



|                                         |              |                                        |               |                                          |                |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|
| De uertiginosis.                        | cap. VII.    | De conuulsionibus aut distentionibus.  | cap. XXXVIII. | Resiccantia ac cicatricem inducentia     | cap. LXXI.     |
| De insania.                             | cap. VIII.   | cap.                                   |               | achoribus.                               | cap. LXXI.     |
| De melancholia.                         | cap. IX.     | De Tetano siue distentione & conuul-   | cap. XXXIX.   | Smegmata ad achoras, furfures, asperi-   | cap. LXXII.    |
| Curatio melancholiae.                   | cap. X.      | sione.                                 |               | tatem, & scabriciem.                     | cap. LXXII.    |
| De insania lupina aut canina appella-   | cap. XI.     | De capitis dolore distinctiones.       | ca. XL.       | De aurium affectionibus.                 | cap. LXXIII.   |
| ta.                                     | cap. XI.     | De dolore capitis ex ardore aut cali-  | cap. XLI.     | Ad dolores ex frigidityte.               | ca. LXXIII.    |
| De incubo.                              | cap. XII.    | ditate oborto.                         | cap. XLI.     | Ad dolores ex aqua medicata.             | cap. LXXV.     |
| De morbo comitiali.                     | cap. XIII.   | De dolore capitis in febribus.         | ca. XLII.     | Ad dolores ob humorum crassitudinē.      | cap. LXXVI.    |
| Quae arguunt morbum comitiale.          | c. XIII.     | Ad capitis dolorem ex ebrietate, & me- | cap. XLIII.   | Ad aurium sordes.                        | cap. LXXVII.   |
| Quae collabentes comitiales excitant.   | cap. XV.     | ri potu.                               | cap. XLIII.   | De sonitu aurium.                        | cap. LXXVIII.  |
| Auxilia ad comitiales.                  | cap. XVI.    | Perfrigerati capitis medela.           | c. XLIII.     | Ad auditus difficultatem ac surditatem.  | cap. LXXIX.    |
| De his qui ex stomacho primario affe-   | cap. XVII.   | De capitis dolore à stomacho.          | ca. XLV.      | Ad aurium inflammationes.                | cap. LXXX.     |
| cto, comitialis morbi modo conuelli-    | cap. XVII.   | Quae ex natura capitis dolorem indu-   | cap. XLVI.    | Ad aures absq; ulceratione humectas,     | cap. LXXXI.    |
| tur.                                    | cap. XVII.   | cunt.                                  | cap. XLVI.    | quae uelut exudant, & seorsum hu-        | cap. LXXXI.    |
| De his qui ex parte aliqua habent mor-  | cap. XVIII.  | Ad dolorem capitis ob plagā.           | c. XLVII.     | morem excludunt.                         | cap. LXXXI.    |
| bi comitialis causam.                   | cap. XVIII.  | De cephalaea.                          | cap. XLVIII.  | Ad ulcera in meatu auris.                | ca. LXXXII.    |
| Curatio senum ac puerorum comitali      | cap. XIX.    | De hemigrania.                         | cap. XLIX.    | Ad corruptiones ac fetores aurium.       | cap. LXXXIII.  |
| morbo correptorum.                      | cap. XIX.    | Communis curatio cephalaea & hemi-     | cap. L.       | Ad superexcrecentes in aurium ulce-      | cap. LXXXIII.  |
| Curatio ualde senū comitialiū.          | cap. XX.     | craniae.                               | cap. L.       | ribus carnes.                            | cap. LXXXIII.  |
| Curatio puerorum recens natorum co-     | cap. XXI.    | Epithemata ad capitis dolorem.         | cap. LI.      | Ad uermes in auribus.                    | cap. LXXXV.    |
| mitialium.                              | cap. XXI.    | Quae narib. indita caput purgāt.       | c. LI.        | Ad sanguinis ex auribus eruptiones.      | cap. LXXXVI.   |
| De fatuitate.                           | cap. XXII.   | Apoplegmatismi pituitam per os à ca-   | cap. LIII.    | De calculis aut alijs corpusculis in au- | cap. LXXXVII.  |
| De memoria amissa.                      | cap. XXIII.  | pitate detrahentes.                    | cap. LIII.    | rem illapsis.                            | cap. LXXXVII.  |
| De commorsis à cane rabioso, aut his    | cap. XXIII.  | Smegmata & puluilli inspersiles, caput | cap. LIII.    | Ad affectiones aurium extra meatum.      | cap. LXXXVIII. |
| qui aquam timent.                       | cap. XXIII.  | densantes.                             | cap. LIII.    | cap.                                     | cap. LXXXVIII. |
| De cerebri inflammatione.               | cap. XXV.    | De alopecia.                           | cap. LV.      | De parotidibus.                          | cap. LXXXIX.   |
| De erysipellate cerebri.                | cap. XXVI.   | De defluo capillorum.                  | cap. LVI.     | De narium affectionibus.                 | cap. XC.       |
| De syderatione.                         | cap. XXVII.  | Ad supercilia pilis denudata.          | cap. LVII.    | Ozenarum curatio.                        | cap. XCI.      |
| De resolutione.                         | cap. XXVIII. | Tingentia ac nigrescentia pilos.       | cap. LVIII.   | Polyporum curatio.                       | cap. XCII.     |
| De superciliū aut palpebrae resolutio-  | cap. XXIX.   | cap.                                   | cap. LVIII.   | Ad ulcera in naribus.                    | cap. XCIII.    |
| ne.                                     | cap. XXIX.   | Vt fului pili fiant.                   | cap. LIX.     | Ad sanguinis ex naribus eruptionem.      | cap. XCIII.    |
| De conuulsione canina.                  | cap. XXX.    | Vt albi pili fiant.                    | cap. LX.      | Quomodo sanguis ex naribus eliciatur.    | cap. XCV.      |
| Linguae resolutae curatio.              | cap. XXXI.   | Vt crispī pili fiant.                  | cap. LXI.     | De narium obturatione, & odoratus        | cap. XCVI.     |
| De instrumenti uocalis resolutione.     | cap. XXXII.  | De his quae pilos corrumpunt.          | cap. LXII.    | oblesione.                               | cap. XCVI.     |
| cap.                                    | cap. XXXII.  | Quae pilos extirpant.                  | cap. LXIII.   | De sternutatorijs.                       | cap. XCVII.    |
| Deglutitionis resolutae curatio.        | cap. XXXIII. | Psilothra pilorum.                     | cap. LXIII.   | Ad sedandas redundantes sternutatio-     | cap. XCVIII.   |
| nes.                                    | cap. XXXIII. | Quae pilos attenuant.                  | cap. LXV.     | nes.                                     | cap. XCVIII.   |
| Vesicae resolutae curatio.              | ca. XXXIII.  | De furfuribus siue porrigine.          | ca. LXVI.     |                                          |                |
| Colis resoluti curatio.                 | cap. XXXV.   | De morbo pediculari.                   | cap. LXVII.   |                                          |                |
| Intestini recti resoluti curatio.       | cap. XXXVI.  | De achoribus & reliquis pustulis ca-   | cap. LXVIII.  |                                          |                |
| Cruris aut alterius cuiusdam membri re- | cap. XXXVII. | pitis.                                 | cap. LXVIII.  |                                          |                |
| soluti curatio.                         | cap. XXXVII. | Ad capitis scabriciem.                 | cap. LXIX.    |                                          |                |
|                                         |              | Ad parua & densa ac rubicunda capi-    | cap. LXX.     |                                          |                |
|                                         |              | tis ulcuscula.                         | cap. LXX.     |                                          |                |

# AETII MEDICI GRAE.

## CICONTRACTAE MEDICINAE TETRABIBLI SECVNDAE

### SERMO SECVNDVS, ET EX

#### ORDINE SECVTVS.

De cerebri, capitis, & nervorum affectionibus, aurium item ac narium.

DE HYDROCEPHALA AQVOSA



HYDROCEPHALA affectio appellata est ab aquoso humore in capite collecto. Plerumq; igitur aquosus humor colligitur. Aliquando autem feculentus aut cruentus. Sæpe uero lentus consistit, aut ex obscura, aut ex ma-

nifesta causa. Ex obscura quidem, localibus uasis sua sponte rarefactis, & aquosa in ipsis essentia, quae cum sanguine permixta est, depulsa & in unum locum congregata. Atque ex huiusmodi causa aquosus humor colligitur. At uero ex manifesta causa fit, uasis localibus ex plaga aut contusione ruptis, & sanguine in ipsis prætereffuso, & deinde rarefacto, ac in essentia feculentam, aut cruentam dissoluto. Frequentissime uero huiusmodi affectio ex tali causa in infansibus, quibus obstetrix



obstetrix functionis suę in experta, & durior manu rem tractans, corpora aliqua in capite infantis attriuerit. Colligitur autē hic humor in hydrocephalis, aut inter cutem et membranam caluam ambientem, siue musculus temporum. Aut sub membrana caluam ambiente, inter ipsam & os capitis. Aut sub calua, inter os & cerebri membranam. Maiores autem nostri dicūt etiam inter cerebri membranā & ipsum cerebrū colligi, id quod perniciosum existit. Si quidem igitur lētus humor fuerit collectus sub cute extra membranam caluam ambientem, aut inter hanc membranā et os capitis, tumor adest iuxta capitis partem ubi collectio facta est, concolor, citra dolorem, mollis ad tactum, cedens ac transiens ad digitorum contactum. Et si quidē sua sponte fiat ab initio, doloris exors & concolor est locus. Si uero ex plaga, aut contusione, primum quidem rubicūdus & dolorosus fit tumor, postea uero lentescēte humore & in tenuem essentiam transeūte, tumor concolor citra dolorem euadit. At ubi collectio sub calua facta est, inter os & membranā cerebri, ab initio dum modicus est humor, caput grauatur, et uertigines assidue fiūt, & sensus hebetantur, uisus inquam, auditus & reliqui. Quum autem redundauerit humor, futurę capitis ob multitudinem disparantur, & propterea caput magnum fit, & locus collectionis apparet. Humor enim ad digitum cedit. In communi igitur in collectione sub cute, & in ea quę inter membranam caluam ambientem & ipsum caluę os fit, nōdē aggressiōibus utimur, ad humoris excretionem. Et si quidem paruus est tumor, apex ipsius unica sectione diuiditur: Si uero maior, duę aut tres sectiones fiunt, aut plures iuxta magnitudinis proportionem, in locis ad effluxionem commodis. Non oportet autem uelut in abscessibus, post chirurgiam limniscos trāsmittere, sed ipsas solas sectiones linamētis disparare. Nam post humoris excretionem, corpora in his facile agglutinantur. Quapropter linamentorum usu in ipsis contenti sumus. Post indita linamenta, si infans fuerit cui chirurgia adhibetur, deligationē propter grauitatem recusamus, uerum lana ouo imbuta imponatur, & caput pileo contegatur. In robustioribus autem linamenta forinsecus custodiantur, & deligatio fiat. Poterit autem à tertia die conglutinatorio adiuuari, per emplastrum quoddam glutinatorium. Quod si sub temporū musculo collectio fiat, expectare oportet donec humor redūdet, ut ne musculus incidatur. Et postea à lateribus musculi sectionem facere. Et si quidē humor in profundo sub musculo contineatur, duę sectiones fiant utrinq; à lateribus musculi ipsius. Deinde corpuscula securē per scalpelli manubrium exorientur. Post totius autem humoris excretionem, curatio fiat uelut dictum est. At si sub calua collectio facta fuerit, itidem expectare oportet, & quum redundauerit humor, & futurę fuerint disparatę, fastigiatum locū disseccare, & consequenter facere uelut in capitis futuris disparatis.

De phrenitide. Ex Posidonio.

Cap. II.

Phrenitis inflammatio est membranarum cerebri cum febre acuta, delyrium & mentis percussione inducens. Raro autem ab initio phrenitis cum febre irruit, plurimis uero à quarta aut quinta aut sexta incipit, & adhuc serius, cum ipso ferme periculo incidens, ut iam aliqui septima, aliqui nona delyrare in-

ceperint. Differentiæ autem phrenitidis plures sunt, sed tres principalissimæ. Aut enim imaginatiua facultas solum læsa est, seruatur autem ipsis ratiocinatiua & memoria. Aut ratiocinatiua solum læsa est, seruatur autem imaginatiua & memoria. Aut etiam imaginatiua læsa est, seruatur autem memoria. At uero ubi memoria deperdita est in febrilibus morbis, simul perit omnino et ratio, & imaginatio. Proinde anteriore cerebri parte læsa, imaginatio solum læditur: Medio uero cerebri uentriculo læso, ratio perueritur. Posteriore autem circa occipitium parte læsa, perit memoria, & cum ipsa omnino etiam reliquę duę facultates. Quibus igitur imaginatio læsa est, hi iudicant quidem recte, imaginantur autem peruerse. Quibus uero ratio solum læsa est, imaginantur quidem recte, iudicant autem nō recte. Quibus autem memoria læsa est, nullius antea factorum meminerunt, imò neque omnino recte imaginantur, neque iudicant. Conuenit itaque parti magis læsę auxilia adhibere, & tamen neq; alias negligere. De memoria itaque perdita priuatim paulo post dicemus. Nunc uero quomodo phreniticos curare oportet dicendum est. Aeger igitur decumbat hyeme quidem in domo tepida, æstate uero, frigida. Quies autem imperanda est & ipsi ægroto, & omnibus in domo, & uicinis. Et qui quidem ad lucem efferuntur, in tenebricosa domo decumbant. Qui uero ad lucis splendorem resipiscunt, in lucida domo degāt. Si quidem igitur phrenitis cū febre ab initio in prima die, aut secunda, usq; ad quartam irruat, & non ex transmutatione alterius morbi succedat, & urinę fuerint subcruentę, & facies rubicunda, & ætas uigoris, & bona corporis habitudo adest, & omnia signa simul indicant sanguinis multitudinem, uena cubiti secetur, ea quę media est, & pro uiribus detrahatur, & nō usq; ad animi deliquium. Minus autem quàm oportet auferatur, ob plurimam quę in ipsis ex uehementi motu contingit discussionem ac exhalationem, & propter lassitudinem. Sed & sectio moderata fiat, ut ne aeger clanculum brachij uinculum exoluat. Cōsequitur enim periculum sanguinis eruptionis. Quod si ob aliquam causam, uenę sectionis auxilium relinquatur per clysteres uentrem euacuare oportet, cum fursurum aut ptisanę succo, modicęq; nitri spuma ac pauco melle. Caput autem rosaceo magis tepido irrigetur. Nam cerebri membrana inflammata, frigiditas rosacei non est tuta. Imò neq; caliditas. Frigidum enim dēfat meatus, & superfluitates in capite discuti non permittit. Quod uero ualde calidum est, feruorem duplicat. Quare æstate exacte tepidum rosaceum adhibēdum est, cum modico aceto: hyeme uero moderatē calidum. Commodum est & chamæmelinum ex æquo ipsi ammixtum, si ambiens frigidior fuerit. Si uero uehementius fuerit delyrium, post factam euacuationem, uelut dictum est, per uenę sectionem aut clysteres, capitibus papaueris in oleo coctis caput rigato, & faciem assidue prolut præcipito ex aqua, in qua papaueris capita sunt cocta. Frontē uero somnifero aliquo pastillo il-line. Olfaciant etiam assidue somnifica, in præcedēti sermone conscripta ad uigilias. Et sub cervical capita papaueris subdantur, aut mandragorę mala. At uero auctis malis, dandum est etiam somniferū ex capitibus papaueris pharmacum, cochlearij mensura



plus aut minus, pro uiribus. Dandum est autem id quod ex melle præparatur, non quod ex passo, propter uinositatem. Detur autem hoc pharmacum in exacerbationis declinatione: Si enim datum fuerit in uigore, trahit quidem ad somnum, febris autem excitatur, & eger ad ambo partitus, grauius fert quod contingit. Dato uero pharmaco quiescere iube. Præstat autem mel rosaceum ad pharmacum ex capitibus papaueris adhibere, contemperat enim acrimoniam, & aluum subducit. Quapropter etiam aquæ quæ bibitur, mel rosaceum irrorare bonum est, in exacerbationis uigore. Cæterum assiduus usus stupefacientium pharmacorum, potionum, irrigationum ac illitionum uitare oportet. Facile enim in his qui immodice perfrigerantur, transitus fit à phrenitide in lethargum, quando etiam perniciosus fit morbus. Quare ubi delirium moram traxerit, serpyllum aut spondylium in oleo coquantur: Crassos enim uapores transpirare faciunt. Quum autem manserit facies etiam post uenæ sectionem incontracta & rubicunda, cucurbitas occipitio affige, & moderatis uulnusculis impactis cutem scarifica, & ad libræ mensuram sanguinem detrahe. In cibo porro datus est pisanæ aut alicæ succus, aut micæ panis sæpe lotæ cum rosaceo melle. Mitigata uero febris, dentur oua sorbilia, & lactucæ feruefactæ, quæcunque moderate humectant ac frigefaciunt, unaque nutriunt, propter uirium debilitatem.

De lethargo. Archigenis & Posidonij. Cap. 111.

Lethargi principio duo sunt. Quibusdam enim septum transversum & uiscera primario affecta, cerebrum ad consensum ducunt. In quibusdam uero cerebrum affectionem auspicatur. Et quibusdam statim ab initio affectio incidit. Quibusdam autem ex mutatione alicuius acuti morbi. Nam à phrenitide maxime in his qui per stupefacientia pharmaca perfrigerati sunt, transitio ad lethargum fit. Quin & à continente febre mutatio in lethargum fit sæpissime, itemque ex alijs plurimis morbis, præsertim in quibus plures euacuationes subsequutæ sunt. Aliquando etiam in diuturnis febribus, per circuitum contingit ægrotos somno immergi, uelut in quotidianis fit & semiteridianis, quandoque etiam quartanis. Et alij quidem cum conuulsione & contractione neruorum in soporem deferuntur. Alij pedetentim facta accessione. Et alij quidem unam immersionem sustinent, in quo extreme periclitantur: Alij in circuitibus in somnum deferuntur, & rursus reuocantur. Proinde considerare oportet speciem delationis in sopore. Qui enim per circuitum somno immerguntur, manifestiore pulsum habent. Qui uero semper affecti sunt, minutissimum & egrè mobilem. Hi uero etiam dum excitantur, aliena loquuntur, & obliuiosi sunt. Qui uero per circuitum afficiuntur, nihil tale patiuntur. Et alij quidem cum grauitate & elata respiratione in somnum deferuntur, ut & sterant, & singultus ac suspiria edant dolorem indicantia, quæ reuocati neque eloqui possunt, propter rationis læsionem. Alij uero quietissime dormire uidentur. Et alij quidem perfrigerantur artus, & rugosi ac pallidi sunt, et corporis miscella ferè cōgelatur. Alijs uero diffunditur, & uelut rorem effundit circa exacerbationum declinationes. Qui igitur hac affectione occupati sunt, his hæc adsunt. Præcordia reuelluntur, uenter contrahitur, & uiolenter ab assidentibus excitati, rursus in somnum deferuntur, & obliuio ipsis.

Nam dum sæpe ad mictionem urgetur, porrecta ipsis matula, se in manibus ipsam tenere obliuiscuntur. Aucto uero malo, totum corpus segne redditur ac uelut mortificatur. Supini autem decumbentes, ad pedes defluunt, distensis manibus ac cruribus. Nasus quibusdam destillat. Os ipsis hiat, & fortior eius hiatus succedit. Inferna mandibula uelut resoluta ac laxata uidetur. Atque hæc quidem adsunt lethargicæ affectioni. At uero curationem ipsorum aggredientes in domo lucida ad splendorem ipsos locamus. Sit autem domus tepida. Pedes & manus confricentur. Odoramenta excitatoria exhibeantur, uelut est castorium, funiculus lucernarius extinctus, pix liquida, bitumen, galbanum. Suffusa quoque lethargicos excitant, lapis gagates, bitumen, castorium, peucedanum, sulphur, galbanum, sagapenum, cornu ceruinum, hirci sordes, abrotanum, silphium. Sternutatoria quoque naribus admoveantur. Si uero multitudo humorum in corpore est, si quidem sanguis fuerit redundans, uena secetur secunda die, & pro uiribus euacuetur. Si uero pituitosa & lentior materia fuerit, uelut in lethargicis reducere solet, attenuantia exhibere oportet, & quæ crassiciem secare possunt, ita ut his quibus neruosa pars læsa non est, acetum mulsum exhibeamus: quibus uero læsa est, decoctum apij, foeniculi, adianthi, & similia. Sed & alius efficaciore infuso eluatur, & glandes subdantur ex ruta, nitro, cumino, & melle cocto. Caput autem rigetur in principio quidem serpillio in aceto & oleo cocto. Verum in interitis affectionibus peucedani radicem pro serpillio in aceto coquito, & cum oleo capiti adhibeto. Bonum est ipsis & oleum irinum. Tremoribus autem & contractionibus succedentibus, castorium cum modico aceto terimus, & oleo addito caput irrigamus. Si uero præcordia sint inflamata, in principio cataplasmata adhibeantur, ex polline aut pane, & malo cotoneo cocto, aut pampinis uitis. In progressu uero, semel lini ad pollinem aut panem amisceatur, & absinthium, & althææ folia cocta. Postea uero ex ordeï farina, & foeno Græco, & althææ radice cataplasmata fiant. Omnibus autem absinthium ammisceatur. Sit autem latum linteum, ut utrinque latera, & pectus sub mammis amplecti possit. Post cataplasma uero partes nudas sinere non oportet, sed cerato nardino aut cyprino contegere. Retro autem dorso ceratum ex sicyonio factum imponere, quod terebinthinum & baccas lauri tritas infartas habet. Et si quidem inflatio adsit, ammisceantur cataplasmatibus ea quæ flatum discutiunt, uelut sunt cuminum, bacce lauri, ruta, & similia. Si uero quid induratum fuerit, & libanotis addatur, & farina fabarum. At uero in diuturnis iam lethargicis uiribus presentibus danda est hiera ex colocynthide. Et sternutatoria adhibenda, ex uerratro albo, struthio, pipere, castorio. Et naribus infundendum elaterium cum lacte, aut cyclamini succus, aut ipsa radix sicca trita insufflanda, & ori ac palato sinapi cum melle illinendum. Deinde occipitio cucurbitæ affigendæ cum multa flamma, item circa primum & secundum uerticulum, sanguisque detrahendus ex posteriore capitis parte. Postea derasis capillis capitis sinapis mus adhibendus ex caricis cum sinapi aceto macerato. In tremantibus uero etiam castorium sæpe potandum detur. Affectione autem declinante æger ad balneum ducatur, & smegmate moradaciores utatur. Velut est fex usta, sinapi, pyrethrum, piper,



piper, baccæ lauri, calx uiua, nitrū uero duplum adijciatur. Cibi porro sint tenues & incisori ac resicantes. Et cum condimentis parati, apij, anisi, cumini, pipere & baccis lauri. Et ex uolucris conueniunt, gallina domestica, columba, auiculæ montanæ, & perdix. Ex piscibus, petrosi. Ex oleribus, porri, asparagus, petroselinum, chamædaphne. Vinum aquosum, tenue, album subadstringens. Sed & reliqua curatio iuxta eundem modum fiat.

*De catocha & catalepsi.*

*Cap. iiii.*

Mediam inter phrenitidem & lethargum affectionem reperies, quæ species est delirij siue amentia. Medici autem catochā & catalepsi, hoc est mentis occupationem & apprehensionem uocare solent, ex humore atræ bilis magis contingens. Periculosior est autē hæc affectio quam lethargus. Verum in febribus lethargo similibus consistit, & aliquādo dormire, aliquando uero palpebras apertas habent, aut nictant, aut intecē uident, & uelut fixos oculos ac palpebras habet, & penitus immobiles, adeo ut neq; si quis manum oculis ipsorum obtendat, eos claudant. Voce insuper ac sensu priuantur, neq; audientes neq; respondentes. Admouent autē manus suas aliquando ad caput & oculos ac nares, uelut qui uellicentur, atq; hoc non sentiunt. Pulsus sunt parui, languidi, ferme deficientes. Spiritus aliquando densus, aliquando rarus. Et per interualla quædam magnum spiritum ducunt. Alius & urinæ supprimuntur, nō præ siccitate: Habent enim multum humorem, sed propter sensum stupidiorem, gramæ his subaridæ in angulis oculorum fixæ sunt. Et aliquando uicinos parietes attingunt. Et in summa, neq; phreniticis omnino similes sunt, neq; lethargicis. Quandoq; etiā ob sanguinis multitudinem confertim caput occupantis & ipsum superimplētis fit hæc affectio: quemadmodum uidimus in adolescentē quodā multo sanguine referto. Qui quū tri-duum exegisset, neq; claudens palpebras, neq; ad uehemētes uociferationes transmouēs oculos; neq; respondens, quarta die sanguinis eruptione larga per nares facta, ab omnibus molestijs cōfestim liberatus est. Quare si eger multo sanguine refertus appareat, citra diladonē uenam supernā in cubito secā, & pro utribus detrahe. In alijs autem primū uentrē per clysterē eluere oportet, simpliciore infuso immisso, uelut est fursurū succus cū spuma nitrī & melle. Postea uero etiā polypodij radix cū fursuribus coquatur. Caput autē primū irrigetur oleo dulci tepido. Deinde si caput calidius apparuerit, caput papaueris in oleo coquatur. Si uero frigidius, serpillū. Et si quidē facile solubilis fiat alius ex prædictis infusis, in ipsis perseverandū est. Si uero sistatur, ueratrī nigri radix cū fursuribus coquatur. Potus ipsis cōuenit apomeli, aut aqua mulsa pro tempore diutius cocta. Quod si urinæ crassæ fuerint, etiā anethi & apij decoctum detur. Cibi sint, ptisanæ succus & similia. Aqua his aduersatur, auget enim inflammationem, & fluctuationes facit, & splenes excitat, & sitim nō sedat. Totum autem corpus oleo anethino inungatur, maxime hyeme. In quibus uero etiā tremor succedit, castorij drach. i. cum aqua mulsa ori infundatur.

*De caro. Posidonij.*

*Cap. v.*

Quum frigidi & humidi humores cerebrum occupant caros appellata Græcis affectio succedit, hoc est, capitis percussio, cum debili febre. Consequitur sensum

stupor, & totius corporis immobilitas, cum principalium actionum læsione. oculi uero ipsorum semper sunt clausi. Differunt autem caros a lethargo, quod lethargici interrogati respondeant, & non omnino sine uoce decumbant. Verum qui in caron collapsi sunt, somno profundissimo detinentur, ut dum pun-guntur sentiant quidem, non tamen loquantur, neq; oculos aperiant. Curandi uero sunt & hi similiter uelut lethargici, ita ut magis incisorium & attenuatorium curationis ductū faciamus. Stomachi quoq; cataplasmata, unā cum hoc quod calefaciant, etiam corroborandi uim habere oportet.

*De comate. Posidonij.*

*Cap. vi.*

Soli uapores calidi & humidi, & subiectis partibus ad caput in febribus delati, & ipsum implētes, affectionē faciunt, quam Medici coma nominant. Cognoscitur si somnus amplior naturali fiat, & in somnis peregrina loquuntur, & corpore inæqualiter habent, & infernā mandibulā inter dormiendū laxatam. Et sæpe excitati cōfertim rursus in somnū deferuntur, & caput humidius habet. Curantur ex irrigatione rosæ faciei, aut chamæmelini cum aceto. Sit autem acetum acerrimum. Si uero frigidius appareat caput, anethi cum oleo dulci ex æquo permixtum ac calefactum adhibe. Et in summa, in quantū intentā est frigiditas, in tantum calefactoria augeantur, ut etiā pulgij aliquando & rutā in oleo coquamus. Glandes quoq; sedi subdantur, quæ multum irritare possunt. Nutriantur autem ptisanæ succo, & apomelice.

*De uertiginosis. Archigenis & Posidonij. Cap. vii.*

Vaporibus calidis & acerbis ad caput delatis, & animalē in cerebro spiritum euerrentibus, primū hemeturidines quædam in oculis fiunt. Postea etiam aurium sonitus assidui, & auditus grauitates, atq; hæc maxime contingunt circa ciborum coctionem, & ubi ex somno exurgunt, augescēte affectione, uertigines & obtenebrationes oboriuntur, ut putent se uideri omnia circūuerti. Contingit hoc etiam ubi confertim ex sellis surrexerint, cruditate quadā pregressa. Perseuerāte uero diutius malo, ex facili occasione uertigine afficiuntur, ut etiam concidant aliquando, maxime ubi in circulum circūuertiuntur. Nā quod alijs ob multas circūuersiones contingit, hoc illis ex una. Sed & si alium quendam circūuerti uiderint, uertigine afficiuntur, aut si trochum, aut tale quid circūuerti conspiciant, idem perpetiuntur. Spiritus enim uisuius ad trochum qui circūuolutatur allabens mouetur, & simul cum illo circumfertur. Atq; sic inæqualem & turbulentum ac inordinatū humorem, ac spiritus motum efficit. Facile uero corripitur hac affectione quibus consuetæ excretionēs sunt suppressæ. Sed & cruditates & ardores assidui, & ebrietates, affectionem hanc efficiunt. Cōsequitur & alui suppressio, & propterea multa inflatio, & urinarum tenuium ac paucarū excretio, materia ad caput accurrente. Graciles autem in totum ferme fiunt, & pigri ad omnem aggressionem. Si quidem igitur ea quæ oculis obuersione sanguinolēiora se uidere putant, ad insaniam magis apti sunt. Qui uero purpurea uident, ad morbum comitalem. Si igitur uires robustæ fuerint, & nihil aliud aduersetur, uenā secanda est, siue principiū affectionis fuerit, siue tempus iam progressum fecerit. In uenæ autem sectione uitandum est ne acuatim euacuemus, eò quod ex



qualibet occasione concidat. Quare pluribus detractionibus ex quibusdam interuallis uteres congruam mensuram explebimus. Irrigetur autem caput tempore sectionis uenae aceto & rosaceo, polygoni aut hederæ succo ammixto. Et lana conuoluta rosaceo aut oenanthino madefacta eodem tempore uetri imponatur. Si uero quid sanguinis detractione impediat, uelut gracilitas, aut aliud quid ex sæpe relatis, subducatur alius, primum per clysterem ex fursurū succo, spuma nitri et melle. Postea uero picra ex aloë compositio assidue detur. Si uero accidentia perseuerarint, etiam uehementioribus purgatorijs utendum erit, ita ut ad redundantem humorem pharmacū aptes. Ex efficacioribus autem purgatorijs commendant his quæ foeniculum in aceto mulso coctum habent. Et quod ex palmulis, ruta, & scammonia præparatur, quorum compositiones relatæ sunt in purgatoriorum Sermone. Sed & pituita à capite per os detrahentibus, & gargarismis utendum est, ex origano, pulegio, & aceto mulso. Postea uero etiā anagallidis succus naribus infundatur, aut cyclamini, aut radicis betæ, aut elaterij cum lacte. Sed et nitrum cum nigella tritum, & oleo ueteri ammixtū, generosam per nares purgationem facit. Post hæc autem ad balneum ducantur. Tale uero frictoriū caput corroborans ipsis cōuenit. Lapidis asij unc. i. spumæ nitri albæ unc. i. iridis unc. i. floris iunci odorati sextans. Ex hoc quod satis est accipe, & sincipiti insperge, modicam aquam calidam irrorans. Deinde ubi lauisti, & caput calida non madefecisti, sed solū abluisti, egressus de solio frigida ter aut sæpius madefactio. His uero qui ualde calidum caput habent, etiam rosaceum cum aceto sæpe adhibeas, & ipsum ex salientibus aquæ in balneo frigefacias. Et si quidem ex his cessarit affectio, cessandum est à medicationis molestia. Si uero perseuerarit, arteriæ in capite iuxta tempora supra aures inciduntur, uentre prius euacuato, aut per hieram, aut per clysterem. Postea uero constrictorijs fortioribus utendum est, quæ ad insanos referuntur. Cibi sint boni succi, facile concoctiles, flatus exortes, omnino stomacho commodi, uentri commodi, urinam cientes. Vinum modicum sit, album & tenuissimum, & non ualde uetus. Cōueniunt his balnea naturalia aluminosa. Maxima uero & prima ac ultima in his præseruatio ac curatio est, ut suppressæ excretiones commoueantur, & officij sui commoueanur, maxime in mulieribus.

De insania. Archigenis & Posidonij. Cap. VIII. Insania fit citra febrem, multo sanguine nō putrefacto ad cerebrum confluente, qui aliquando purus est, & multitudine solum affligit, uelut in ebrijs. Aliquando uero flaua bile ammixta. Præcedit insaniā capitis debilitas, uelut in podagra debilitas pedū semper adest. Tunc autem dolent, quum materia locis influxerit. Si itaq; ob solum sanguinem insania fiat, hæc cōsequuntur. Risus immodicus ipsis commouetur uidentibus sæpe ob oculos imagunculas quasdam risu dignas, & hilaris est ipsis facies, & assidue canunt. Aliquando enim ex contingentibus euaporationibus sonitus circa aures adsunt, ut putent se tibicines quosdā audire. Seruatur in ipsis memoria, uelut ex captilenis quas familiares habent coniectare licet. Lesa est autem imaginatio & ratio. Si uero flaua bilis ad sanguinem fuerit ammixta, & mordacē ipsum

effecerit, uelut ex ipsa stimuletur ac pūgatur cerebrū & membranæ eius, iracundi & temerarij & percussores ac iniurijsi fiunt. In quantū enim bilis sanguini mixta est, in tantū mutatur uicinis, & auget tristitiam ac irā. Si uero amplius fuerit bilis superassata & crassifecta, & ipsi corpori cerebri ac membranarum instar uisci agglutinata, pungatq; ac diuellat, ferina deliria efficit. Quidā enim iam propriam carnem gustarunt, & domesticos uelut insidiatores tractarunt, occiderunt, percusserunt, uulnerarunt. Cōtingit autem eundē hominem aliquando risu immodico teneri, aliquando ira & indignatione. Nā in fame ac inedia tolerata, & ex acrioribus ac salstioribus alimentis, & in pluribus motibus acurbationibus, sanguis seipso acrior efficitur. In cōtrario uero statu, melior. Sæpe autē etiā nullo auxilio adhibito, per modicum cibum & cōmoda alimentia, progressu temporis id quod lædit consumitur, & cerebrum à superfluitatibus intractum manet, & purū mentis emotionis interuallum ac defectus & intermissio consequitur. Quibusdā per circuitum quēdam irrui affectio. Alijs semel in anno. Alijs bis, aut sæpius, coaceruato uidelicet paplatim eo quod molestū est. Corripiuntur hac affectione pauci ante uigore ætatis. Plurimi in ipso uigore, & post ipsum. Viri magis quā mulieres. Et ex illis magis qui animalibus affectiōibus diu exantur, uelut sunt irrisores, risu multo & intempestiuo utentes, intractabiles, iracundi, curiosi, auari, potiores, item & assidua cruditate laborantes. Et quibus consuetæ excretionēs suppressæ sunt. Et propterea etiam mulieres, aliquando insanunt, quibus menses suppressi sunt. Infinitæ uero sunt insanix species, quas exponere superfluum est. In delapsuris, igitur in hac affectionem, prædictorum proœmia quēdam præcedunt, uelut risus præter rationem non assuetis id facere, & facili occasione irascuntur, & aurium sonitus adest, & splendores oculis obuersantur; Et uigiliæ adsunt intentæ, & curæ per uices repetentes ac peregrinæ, grauitas item & uibratio capitis. In progressu uero temporis omnia hæc intenduntur, & appetentiæ ipsis putidiores fiunt, & ad uenerem prompti sunt. Et ideo assiduæ seminis in somno effusiones ipsis fiunt, & oculi cauantur, simulq; intenti ac fixi consistunt. Atq; hæc cōsequuntur usq; ad perfectam mentis emotionem. Oportet igitur doctum medicū ægri curam gerentem, his apparentibus, aut quibusdā ex ipsis, facere quæ oportet. Si itaq; tales notas affectio præmiserit, aut etiam iam institerit, uictum tenuem exhibere conuenit, sorbilem, liquidum, non percellentem, uentri commodum, & qui neuisquam sanguinem generare potest. A uino abstinendum est penitus. Vbi uero per triduum hominem eo uictu curasti, aliquam cubi uenam secato, præcipue quidē supernam. Si uero non appareat, mediam. Aut si hæc non appareat, uenas circa talos perquirito, maxime in mulieribus, eo enim momento citam menses impellantur. Quod si neque hæc appareant, ad eas que in summis manibus ac pedibus sunt, transeundū est. Studendū enim est ut prius per uenæ sectionē generosa euacuatio fiat, atq; sic affectarū partiū curatio sequatur. In uenæ autē sectione pro uiribus euacuationem facere oportet. Exincto enim feruore, euestigio quidē considerantes sūt. Simul autem & locus alijs auxilijs datur. Quandoquidem uero aliqui in prima



prima detractiōe generose ferunt euacuationem. In repetitis autē detractiōibus animi deliquia incidunt, cōuenit hos in prima detractiōe euacuare quantum opus est. Sic enim multū de flatuosa & uaporosa superfluitate cōeuacuatur. Itaq; pulsus assidue tangere oportet, dū sanguis fluit. Et si cōciderint, referuare ad repetendā detractiōem. Sæpe enim recuperatis uiribus postera die detractiōem repetimus. Aliquando etiā tertiā sectionem seruantes apposito sale. Caput uero irrigare oportet rosaceo cū aceto, aut polygoni succo, aut oleo cōnathino, aut melino. Lana autē fordidā oleo imbuta sincipiti imponatur, & frequētius renouetur. Post euacuationē omni modo procurandus est somnus. Sanguine enim euacuato, si successe- rint uigilię, acriores & feriores ipsos faciūt. Quapropter cōfidentes pharmacū ex papaueris capitibus dabimus, quod somnū inducit, cū ptisanā aut alicuius succo, aut cū aqua. Iucundum enim fuerit, & postea somnus succedet. Pleriq; enim ipsorū omnia somnifica cōtēnunt. Quapropter etiā si prima die eo accepto dormierint, intermissa die una, rursus dādum est de eo cochleariū unū. Solet enim uel solū post uenę sectionē, perfectē liberare ab affectiōe, unā cū cōueniente diætā. Cauendū tamē est ne cōsequēter ipsum exhibeamus. Stupefacit enim sensus. Studendū etiā est ut uentrem facile solubile faciamus, tū per cibos, tum per clysteres. His autē factis, a localibus auxilijs incipere oportet hoc modo. Sanguinē a uena in fronte eleuata media detrudere cōuenit, ita ut per phlebotomum instrumentū ipsam diuidamus nō facta impulsione, uelut quidā facere solent, propter maximas inflammationes mēbranae caluā ambientis, quæ sæpe sauciata ipsa succedere solent. Detrahenda est autē sanguinis libra ferme una. Post hanc euacuationē, in his qui sanguinē biliosorem, intermissis quinque diebus, detur picra ex aloē, cochlearij magni mensura cum aqua mulla. Deinde etiā per nares caput purgetur, radicū betæ succo infuso, aut elaterio, aut atramēto sutorio cū lacte. Sternutatorium quoq; adhibeatur ex ueratro albo et herba lanaria. Sed & per os pituita detrahatur, per mastichem & staphidē agriam. Et per gargarisationē aceti mulsi, in quo coctum est pulegiū & hyssopū. Subducatur etiā aluius purgatorijs ex centaurea, & ex gentiana. Sed & ipsa per se ipsam radix gēiana cōmoda est pota drachmæ unius pondere cū aqua mulla. Datur & aristolochia eodē modo. Prodest autē maxime ipso cōtūculi magni syluestris radix, & semē, ex aqua quotidie pota. Et radicis bryoniæ drachma una. Postea uero sanna gūlgue toti capiti circūcirca affigantur, & præsertim sincipiti. At in mulieribus studendum est ut menses moueamus. Deinde uiribus reparatis per dies septem Galeni hieram dato, quæ maxime ob stœchadis copiam euacuat. Dato autē quādrachmā tri, ex aqua mulla. Deinde rursus naribus adhibeatur. Declinante uero affectiōe ad balneū ducantur. Frictionū autem cōmodum ipsis in balneo, hoc est, inidis illis lyricis, lapidis asij, manę, thuris, spumę uiri albæ, punleis, buccinorū, iustorum, floris iunci odorati, apij, rasilis, rosarum siccarum, singulorū unę. Atunditū & cribratū, ac uiror in prima balneidomo, inspergens sincipiti, quantum facis est, & aquam tepidam in roans, ita ut satis longam morā in domo habeat quo uires pharmaci usque in profundum distri-

buantur. Deinde capite leniter deterso & abluto, ubi locus est ita ut caput nō madefecerit calida, ex folio exeat, & frigida iterum atepiterum irriget. Si uero ualde calidū caput habuerit, etiā sæpius frigida perfundatur. Post hæc per rubificatoriū ex sinapi & caricis caput corroboretur. Et per interualla quædam pituita per os detrahatur, & naribus foria adhibeatur. Diætā uero statuatur tenuior, concoctu facilis, uentri cōmoda, flatus exors, uim cōtemperandi habens. Vinij usus his rarus sit. Si uero reliquæ affectiōis super fuerint, ad ueratrum albū deueniendū est. Modus autem utendi relatus est in Sermone de purgantibus medicamentis. De cætero uero ad moriendi sunt, ut ab omnibus eduljjs & potibus bilem gignentibus abstineant. In uere autem quotannis negnam secent gratia præseruationis. Deinde etiam purgentur, & præsertim si bilis magis redundarit. Mulieribus uero menses consueto tempore proritentur ut fluant, citra impedimentum. Sed & in alijs cōsuetæ excretionēs procurentur.

De melancholia. Ex Galeno & Rustico. Cap. xl.  
Quemadmodum in apparentibus corporis paribus, aliquando omnibus eadem temperatura apparet, uelut in malo corporis habitu, elephantiasi & hydro-pisi; aliquando uero una quædam pars, aut amaræ bilis, aut pituitæ, aut atræ bilis humore suscepto, ipsa solum temperaturam mutat. Sic etiā circa cerebrum fieri potest, ut aliquando toto in uenis sanguine amar-biliario facto, ex cōmunis detrimēti ratione etiam cerebrum lædatur. Et rursus ut alio tempore, sanguine in toto homine illæso permanente, is qui iuxta solum cerebrum est alteretur. Et contingit hoc dupliciter, aut aliunde confluentē in ipsum; aut generatū in loco, atræ bilis humore. Generatur autē a caliditate multa indigena, aut flauam bilem, aut crassiorem & atriozem sanguinem adassante. Plerunq; uero partē circa præcordia primariō affectæ, caput ad cōsensum perducunt, & delirium efficiunt, aut ipsa bile cerebrum occupante, aut aliqua uaporis melancholici exhalatione, quemadmodum in morbo flatuoso & præcordiali appellato. Nil enim rationi nostræ obstat, aliunde & ex alia parte principium & generationem affectiōis esse. Nam os uentris quomodo cunctos affectum facile ad cōsensum ducit, cerebrū ob cognationem, per maximos duos neruos qui ex supernis ad ipsum deferuntur. Perducit etiā ad cōsensum cor ipsum ob uiciniam. Similiter quoq; sepius transuersum, quod etiam ipsi inferitur. Communitas est etiam stomacho ad spinalem medullam, quæ parte & incumbit, & colligatur uerticulis colli. Principium itaq; eiusmodi melancholici plerunq; exteruditibus. Flatus enim ipsis succedunt multi, qui facile eleuantur, & circa præcordia diutius morantur, & rursus ipsa acidi consequuntur, nullo eiusmodi cibo accepto. Ventres plerunq; ipsis siccifunt, somni parui diuulsi, insomnia turbulenta & peregrina, uibratiōes corporis alie alias, uertigines capitis, & flatuum sonitus circa aures. Et alijs quidem caput plenum & graue esse uidetur, alijs uero leue & uacuum, alijs sicū. Quidam neq; omnino caput se habere putant, ad quem excogitasse dicunt. Philonimus supra reliquam curationem plumbeum pileum, a quo grauius caput se habere intelligeret. Huius etiam merite caput, & timidū & misericordes, & lacrymantur ac



deserta persequuntur. Quidam etiā dæmones ab inimicorū præstigijs sibi immisos esse putant. Alij uenenosum pharmacū accepisse suspicantur, & suspicio nem ipsorū confirmat uirosi ac peregrini ructus qui ipsis adsunt. Et est morbus hic omnifarius & nō facile enumerabilis. Velut uerbi causa circa timores. Alius amicissimos timet, alius oēs homines. Et alius ad lucē prodire timet, & tenebras persequitur. Alius fugit caliginosos locos. Pleriq; tamē in tenebricosis locis degere cupiunt, & in monumentis ac solitudinibus. Quidam uero etiā aquā timent, & uinum & oleum, & omnē liquorem, uelut qui morfi sunt à rabioso cane. Et in summa, Melancholica delyria multiformia quidē sunt, ob particulares corruptas imaginationes. Vnum uero omnibus ipsis, cōmune est: **Timor & tristitia.** Tristantur enim omnes præter rationem, & neq; si interrogas habent quod dicant cur tridentur. Non pauci uero ipsorū mortem timēt, & alia quædā nullo timore digna. Sunt etiam qui mortem uehementer exoptant. Quod igitur ob atram bilem ratiocinalis animæ principia occupātem, timor fit, & tristitia, & mortis formido, nihil miri est. Videmus enim etiā extra corpus nihil nobis ita horrendum, uelut sunt tenebræ. Quum igitur uelut caligo quædā rationali animæ parti circūfusa fuerit, necesse est timere hominē, ut qui causam timoris secū in corpore circūferat. Sicut enim in profundis tenebris pueri timent, itemq; adulti imperiti: Ita etiā atræ bilis color, uelut tenebræ rationis locū obumbrans timores efficit. Quapropter omnium symptomatum singulas accidentiū causas enarrare impossibile est. Pleraque enim multam difficultatē habent, uelut uerbi gratia, Cur fugiunt uelut horrenda, quæ non sunt horrenda. Alia uero persequuntur uelut bona, quæ nō sunt bona. Et cur alius domesticos timet, alius uero omnes homines, & huiuscemodi. Plurimorū uero symptomatum causas medicū dicere, non est difficile, uelut, qui sibi uidetur uas fictile esse, propter siccitatem hoc patitur: frigidus enim & siccus est melancholicus humor: similiter etiā qui cutē suam siccis pellibus similē esse putat. Qui uero putabat se caput nō habere, forsatis ob leuitatē hoc passus est, quam flatus uētosus sursum latus ipsi exhibuit. Cur uero appetunt melancholici plures cibos: nū quia frigescit ipsis os uentris: Cur autem aliqui ipsorū uini potiores sunt: num quod frigiditas calfactione opus habet: Cur autē occidunt se ipsos: num quia à maioribus malis liberari se putant: Nisi forsatis talē opinionē induunt, quod bonum est mori, quod barbaris quibusdam uidetur. Cur autem cruditates assiduæ ipsis fiunt: num quia turbatū & superfluitatibus plenum est ipsorum corpus, & propterea etiā uenter intēperatus, ut qui semper ex atræ bilis humore perfrigeratur: Cur autem alui plerunq; ipsis siccantur: num quia flatus supernè circa præcordia consistunt, & non ualde infra secidunt: Necesse itaq; est ob hoc ipsum etiā uentres siccōs esse. Ex multa uero retentione, aliquando coacervata ac colliquata egerunt. Oculis autem plerumque nictant, & oculi ipsis prociđū, & crassa labia habēt, propter crassum flatum. Atri uero coloris, propter humoris diffusionem. Hirsuti uero pleriq; ipsorum sunt, propter multitudinē crassarum superfluitatum. Veloci uero plerunq; lingua sunt, & balbi, & gracili uoce præditi, ob linguæ incōtinentiā. Motus enim

concitatiores à flatu fiunt. Quicquid autē conditū mouetur, citò defluit. Et procliue sane fuerit etiā aliorum symptomatū causas reddere, si quis ex his progressum facere uolet. Porro nigrescit aliquādo hic humor supercalefactus, aliquādo superfrigefactus. Nā quale quiddā patiuntur carbones, dum uruntur lucidissimi ob flammā existentes, extincta autem flamma nigrescentes: tale quiddam circa clarū sanguinis colorem frigiditas facit. Videmus enim etiam in externis, quædā corpora liuida fieri ac denigrari à frigiditate. Et rursus excessus caloris resiccans ac cōsumēs humiditates à quibus calor nutritur, humores nigrefacit, quemadmodū etiā sol fructus, & hominū corpora. Hæc igitur sunt quæ ante curationē Medicum cognoscere oportet. Quæ uero discenda sunt ut quis ita ægorantibus opē ferre possit, iā tempus est subiungere. Nō parum autē refert ad curationem, nosse unde morbus initiū habuit. Cognoscere itaq; oportet quod duplex est melācholiæ species. Quidā enim ex natura & temperatura ab initio atrā bilem habēt. Quidā uero ex mala diætā postea id temperamentū acquisierunt. Et est hæc species segnis semper & tristis. Qui uero ex flauæ bilis superassatione in delyrium incidūt, audaciores & iracundiores alijs sunt, & percussores, & omnia horrenda faciētes, & maximè tēpore quo bilis superassatur. Quo uero tēpore ipsa extincta fuerint, tristes, mœsti ac timidi fiunt. Quum igitur totū corpus melancholicū sanguinē habuerit, à uenæ sectione principium curationis facere conuenit. Quum autē solum cerebrum, æger uenæ sectione non habet opus, nisi multo sanguine redundarit, & præseruationis gratia detractionē faciamus. Cognitio uero an totum corpus melancholicū sanguinem habeat, aut iuxta solū cerebrum talis sit, ex his à te fiat. Nigriores & hirsuti, & qui uenas amplas habēt, aptissimi sunt ad atræ bilis generationē. Aliquādo etiam homines colore rubicundi, cōfertim in melancholicam temperaturā transeunt. Consequenter autem ab ipsis, flauī, & præsertim ubi uigilijs, & laboribus pluribus, & curis, & tenui uictu, aut melancholicis edulijs fuerint usi. Ad hæc si suppressa est hæ morrhœis in sede, aut alia excretio cōsuetā, aut mulieribus menses, nec parū confert anni tempus, & aëris status, & regio, & ægritās ac studiū. His omnibus præcōsideratis, ubi speraueris in totius corporis uenis melancholicū sanguinē contineri, certissimū experimentū adhibeto, ex uenæ cubiti mediæ præsertim sectione. Si enim effluēs sanguis nō uidebitur atrabiliarius esse, statim cohibeto. Si uero talis apparuerit, quantū pro ægri corporis habitu satis fore putaris, euacuato. At uero tertia melācholiæ differētia, cuius principiū à uētre hærere diximus, & quæ affectio præcordialis appellatur, sæpe ex relatis cognoscitur. Primū enim incipiūt uentris symptomata, uelut sunt inflationes, rugitus, ructus acidi ac uirosi, & quod uēter resiccatur, & quod in secessibus ac uomitibus & ructibus alleuātur, & quod ipsi ægri percipiunt omnes uexationes circa præcordia consistere. Quæadmodū igitur dū quibusdā sæpe ex uētre fuliginosa quædā aut fumosa, aut omnino crassiorū uaporum exhalatio sursum fertur, uelut in suffusos oculos habentibus, aliqua ob oculos uersantur. Eodē modo etiā nunc dū melācholica exhalatio ad cerebrū, uelut fuligo aut fumus fertur, melancholica quoq; symptomata



promata circa mentem cōtingent. Quum igitur melancholici delirij propria symptomata apparuerint magna, circa uērem uero aut nihil molesti, aut minimum fuerit, in his cerebrū primariò affectum esse putandum est, uelut prædictum est.

*Curatio melancholice. Galeni.*

*Cap. x.*

Melancholiā ex cerebro primariò affecto obortā, per balnea assidua, & diætā boni succi humidam ac flatu exortē curare oportet, citra aliud efficax auxiliū, nisi ob tēporis longitudinem humor affligens ægrē euacuetur: quando sanē magis uarias ac fortiores curationes adhibere oportet. Incipientē autem affectio nem curare cōuenit. Nam inueterata ac aucta, ægrē tractabilis euadit. Ruffi. Siue autē cerebrum primariò affectū fuerit, siue præcordia, cōmunia sunt subducētia uentrē auxilia. Primū igitur bonæ concoctionis curā habere oportet. Postea uero purgare primum epithymo & aloē. Horū enim etiam si parum quotidie acceperit, prodest tamē moderatē & paulatim subducēdo. Posidonij. In quibus sanguis redūdare apparuerit, statim ab initio uena secetur in cubito, & præsertim in quibus cōsuetæ sanguinis excretionēs sunt suppressæ. Verum in mulieribus quibus menses defecerunt, uenā in talo secare oportet. Et in singulis pro uiribus sanguinem euacuare. In quibus autē uitiati humores magis redundant, præparatum per uictū egrū purgabis per hierā Ruffi, aut Archigenis, aut Iusti. Si uero utriq; redūdant, facta prius uenæ sectione purgato. Postea interpositis aliquot diebus, aluū per clysteres euacuato, primū cū fursurum succo, spumaq; nitrī ac melle. Deinde etiā polypodij radices cōtusas, aut epithymū cū fursuribus coquito. Post triduum à clysteris usu, detur ipsis picra ex aloē cōpositio, quæ supra reliqua oīa, etiā epithymū accepit. Præparāda est autē, uelut Themison iubet, ita ut aloēs accipiat drach. c. mastiches, croci, spicæ nardi, cinamomi, aut cassiæ duplū, asari, carpobalsami, singul. unc. i. His uero etiam epithymi sextans addatur. Detur autē cochlearij magni copia cum aqua mulsa. Deturq; ipsis ex modicis interuallis iterū atq; iterū. Deinde rursus per uictum reparatis uiribus, rursus dato hieram Ruffi, aut Archigenis, aut Iusti. Sit autē pondus drach. ii. cū aqua mulsa, & salis cochleario paruo. Melius est autē per euacuantia quotidie leniter uentrē subducere. Atram uero bilem ducit amaracus, & cunila appellata, drachm. ii. pondere aquæ mulsæ inspersa & pota. Conducit & lactis sero aluū subducere. Sed non de caseis dandū est serum. Præstat enim quod à lacte per cocturā separatur. Sit autē lac equinum, aut si non possit haberi, bubulum. Lac ipsum in ollam nouam mittatur, & sic ramulo agitetur. Postquā autē ter aut quater ebullierit, acetum mulsum irroretur. Deinde per colatū in potu detur. Et primū quidem ammiscendū est mel, quum autem uenter subire inceperit, nō amplius addatur mel. Accipiat autē æger hoc serū per heminas, nō infra quinque heminarū mensurā. Ab omni uero euacuatione utendū est maluæ semine leuissimē trito, duarū drachmarum pondere, cū aquæ cyathis tribus. Egregiē enim facit. Quare sæpe ipso utēdum est. Optimū est & pulegij decoctū sæpe bibere, & ante purgatoria, & post ipsa. Et similiter cēraurij parui. Ablinthij autem decoctū & assiduē & conquēter præbe. Stomacho enim & uentri in his commodū est. Et neq; flatū

multū in uentre fieri permittit, neq; secessum penitus resicari, & urinam ciet, & concoctionē probe adiuuat, adeo ut ego ex huius solius usu nouerim quosdam à morbo liberatos. Danda sunt etiam urinā mouentia, anisum, daucus, petroselinū, asarum, nardus: & his adhuc amplius foeniculi magni syluestris semen, & radix. Chamæpitys autem & chamædrys prōptius accipiēda sunt, ita ut singula hæc cū aqua coquantur, aut arida trita potioni inspergatur. Cōmodæ sunt etiam euacuationes per sudorē, & labores, & balnea fientes, & per illitiones in sole, qualis est quæ cū oleo chamæmelino fit, & cum oleo ac nitro. Quod si habitus permiserit, rursus per hierā purgato. Conuenit autē neq; præcordia negligere, & maxime ubi accesserit Medicus, curationis ipsorū coniecturā faciet. Fomēta igitur cōueniūt ex oleo, in quo cocta sunt ruta, anethum, serpyllū, absinthiū, artemisia, pulegiū, uiticis semē, baccæ lauri, aut folia tenera. Hæc enim dolores mitigāt, & flatu minuūt. at uero in inflationibus stomachi cū morfu, cumini & pulegiū in aceto coquere oportet, & per spōgias stomachū fouere. Aliquādo etiā alumē aceto inspergimus. Cataplasmata autē habeāt aut anisum, aut apium aut cumini in oleo præcoctū. Et cyperus leuissimē trita, & iris, & libanotis cataplasmati addatur. Permittantur autē diutius, & ante & post cibū. Ablato autē cataplasmate præcordia cōtegantur, aut lana amplissima, aut leuissima & pura pelle agnina, præillitis locis ex nardino. Utendū est etiā cucurbitarū adhibitione, ad flatu quidē inaniū, ad inflammationes uero ac duricias, cū scarificatione. Postea uero ceratis ex cyprino utendū est, & polyarchio, & quod ex styrace paratur, & quod ex seminibus fit, & similibus. In progressu autē curationis, etiā rubificatione ex caricis ac sinapi uti, ualde proderit, & cōcoctiones reuocat. Nā & uētri robur addit, & si quis dolor in præcordio restat, eū eximit. Utendū est etiā acribus sme-gmaris ad præcordia, & picatorū medicamēto, hoc est, pice sicca per seipsam liquefacta, aut cum modico oleo. Calida autē imponitur cuti, & uētri ac dorso adhibetur, ac finitur donec sua sponte decidat. Quare licet cū ipsa lauari, & quod paulatim disparatur forficibus auferre. Valde uero prodest eis stercus bubulū aridū aceto mulso infartū ac impositū. Profunt etiā bulbi cum nitro aut alumine triti ac impositi. Sed & his ad bubulū stercus ammixtis utile fit cataplasma, & præsertim ubi morsus ab ipsis circa stomachū percipitur. Cæterū in quibus cōuulsiones assiduæ corpori adsunt, confert etiā castorij potus, & illitio corporis ex castorio cum oleo sicyonio. Conuenit & moueri & exerceri ipsos pro uiribus ante cibos. Balnea uero probe cōcoquenti non sunt ualde necessaria, nisi lassitudinē alicui mederi uelis. Qui uero non bonū uentrem habet ad concoquendū, huic cōducit frequētius lauari, aut ieiuno, aut post perfectam cōcoctionem. Post balnea cibos damus concoctu faciles, flatu exortes, ex aluo secedentes, exacta consideratione facta quomodo ex singulis homo afficitur: non enim omnes ad omnes cibos similiter dispositi sunt. Plerūque tamē cōueniunt panes clibano cocti probe præparati. Volucres nō pingues, non uirosæ, montanæ. Oua gallinarum mollia. Pisces petrosi & molles carne. Herinacei uero marini plurimum præstant ad iucunditatem & utilitatem. Vitanda sunt omnia in stagnis

*Hæc experiri in  
compensum est  
D. Christophoro  
Montanensi*



stagnis degentia, & in paludibus. Ex carnibus conueniunt hœdinae, & lactentiū animalium, & ex his magis extremæ partes probe coctæ. Non inutiles sunt etiā uulua, & uentriculi, & pedes suilli. Ex oleribus ad cōmunem uictū cōferūt dulcia. Acriora uero aliquando danda sunt pharmaci loco, uelut est asparagus palustris, petroselinū, & similia. Moderata uero copia omnia accipiātur. Vinū sit tenue & albū & nō ualde uetus. Non autē acruatim detur potus inter cibum, neq; magna copia potus exhibeatur, ut ne cibi in uentre fluitent. Acetum quoq; acerrimū cochlearij mensura post omnē cibum absorbeatur ubi iam uult dormire. Sed & pleraq; obsonia in aceto tincta edere conuenit. Præstat autem aceto ammiscere parū de scilla, & ruta, & aristolochia tenui. Posidonij. Cōmodum est autē ad inflationes tale oxyporium præparare. Ligustici, seminis apij, zingiberis, thymi, singulorū unc. i. mellis despumati quantum satis est. Dato cochlearij dimidiū mane, & uespere similiter. Quod si mellis dulcedinē auersentur, salem concoctoriū eiusmodi ipsis præparato. Scillæ assatæ unc. i. salis ammoniaci quincuncē, seminis apij, fœniculi, thymi, petroselini, anisi, sinonis, zingiberis, singulorum drac. iiii. panis puri sicci quincuncē, piperis sesquiunciam. Ex hoc cochlearij mensurā edendam dato cum cibo, prout uoluerit. Detur etiā ipsis antidotus theriaca ex quibusdam interuallis, & præsertim hyeme, & inchoante uere. Rufi. Vomant ex lōgioribus interuallis etiā a cibis. Verum a raphanis, aut origano, aut thymo ieiuni. Non tamen fortioribus uomitorijs utendū est. Sunt enim talia nociua in his, ærumnā uentri ac stomacho addentia, iam antea ex morbo afflicto. Videntur enim aliqui ex efficacioribus uomitorijs melancholia correpti. Proinde operæpretiū esse nōsse, quod multi sic ægrotantes, in tēpore curationis nihil cōmodi perceperunt. Dimissa uero curatione restituti sunt, natura ante curationem præualente cōtra morbos debiles ex medela factos. Quapropter naturæ remissionē dare oportet. Videtur enim unā cū curationibus affligi. In quiete uero inualefcere, & superare morbos iā antea attenuatos.

De insania lupina aut canina appellata. Ex Marcello.

Cap. xi.

Qui morbo lupino siue canino appellato corripiūtur, in februario mense noctu exeunt, per omnia imitantes lupos aut canes, & usq; ad diem monumenta maxime aperiunt. Cognosces autem ita affectos ex his signis, pallidi sunt, & uisu imbecilli, & oculos siccos habent, & nō lacrymantur. Videbis etiā ipsos cauos oculos habere, & linguā siccam, & saluā omnino nō profundunt. Sunt quoq; siticulosi, & tibias habent exulceratas immedicabiliter, propter assiduos casus & canum morsus. Ac talia quidem sunt signa. Nōsse uero oportet melancholiæ speciem esse hunc morbum. Quem curabis tempore accessionis uenā secando, & sanguinem usq; ad animi deliquium euacuando, & ægrum boni succi cibis nutriendo. Utatur autem balneis dulcibus. Deinde sero lactis per triuum usus, hiera ex colocynthide Rufi, aut Archigenis, aut Iusti purgetur, iterū atq; iterum ipsam sumēs ex interuallis. Post purgationes etiam theriaca ex uiperis utendū est, & alia adhibenda in melancholia iā antea relata. Ad uesperam uero inuadente iam morbo, irrigationibus capitīs somnum inducere solitis

utendum est, & talibus quoque odoramentis. Nares item opio illinantur. Quandoq; uero etiam somnifica in potu exhibeantur.

De incubo. Posidonij.

Cap. xii.

Qui incubus appellatur non est dæmō, sed magis præludium & proœmium morbi comitialis, aut insaniæ, aut syderationis. Nam cruditates ex uoracitate affectionē præcedunt. Dum enim uentriculi cerebri uaporibus crassis ac frigidis implentur, prohibent hī facultates per nervos transire, & morbū ægrē excitabilem efficiunt, & qui uix ad rectā actionem perducitur. Vnde etiā immobiles penitus tales permanent. Præcedit enim incubū suffocatio, uocis priuatio, grauitas, & immobilitas. Per multā uero anxietatē attenuato ac discussu spiritu, & apertis meatibus derepente excitatur. Cauendū igitur est a malo dum in principio est. Inueteratū enim & assidue incidens, quosdam ex relatis morbis inducit, dum paulatim in uentriculis cerebri crassus humor coaceruatur. Quæcūq; enim patiuntur comitiali morbo correpti in exacerbationibus, eadem perpetiuntur incubo pressi dum dormiunt. Si quidē igitur sanguis redundat, uenā in cubito secare oportet. Si uero uitiosi humores magis prædominantur, purgatio facienda est per hierā Archigenis. Maxime autē opitulatur ipsis hoc. Corticis ueratri nigri drach. i. scammonia obol. iiii. anisi, aut dauci, aut petroselini parum. Diæta uero sit tenuis & penitus flatus exors. Auxiliatur etiam ipsis niger pæoniæ fructus, si quindecim grana trita cum aqua in potu exhibeantur. Rigare uero oportet etiā caput oleo anethino calido, & pileo cōtegere ubi cubitum uadit æger.

De morbo comitali. Galeni.

Cap. xiii.

Tres sunt morbi comitialis differentia. Omnibus autē cōmune est, cerebrum affectū esse. Aut primario cōstitūte in ipso affectione, aut per cōsensum oris uētris. Rarō autē fit etiam tertia species ex parte quadam, in qua incepit affectio, & deinde sensibiliter ægroto ad caput ascendit. Atq; hanc speciem in puero quodā uidi, qui principiū affectiōis in crure habebat, & postea per tempus quoddam per femur & lumbos ac spinā ad collū & usq; ad caput ascendebar. Vbi uero caput pertigisset, nō amplius sui cōpos erat. Tale quiddam contingit etiā in his, qui a scorpione, aut aliqua alia uenenū eiacularante bestia icti sunt. Quidam enim ictus a scorpione, grandine se impeti putare dixit. Et erat totus subfrigidus, & frigidū sudorem excludebat, & medicamentis adhibitis uix seruatus est. Non igitur impossibile est circa aliquos non principales partes eiusmodi essentiā generari, citra externā causam. Et hāc ipsam ubi in neruosa parte cōstitit, uim suā per continuitatē ad neruorū principiū transmittere. Posidonij. Cōuulsio sequitur ad morbū comitalem, eò quod principiū neruorū affligitur ab instantibus ac molestiā exhibentibus. Quemadmodū enim stomachus, dū aut alimēti copia grauatur, aut ab acri humore mordetur, non solū singultū, sed etiā conuulsionē inducit. Sic etiā principium neruorū ad talem motū perducitur, dum reñcere conatur quicquid tandē fuerit id quod ex primario affecta parte ad ipsum affertur. Cæterum ordinati aut inordinati circuitus ipsis fiunt iuxta diætæ modum. Aut enim per omnia æqualiter diætā habent ægri, aut inæqualiter & inordinatē. Irruente igitur comitialis morbi exacer



exacerbatione, conuulsas & obrortas partes deligare oportet, inungereq; ac dirigere. Deinde disparato ore pennā oleo illitā immittere, cyprino præsertim, aut irino, aut narcissino, & uomitū irritare, quo incumbentes stomacho humores extrahantur. Oportet etiam odoramentis sensum irritare, uelut peucedano aut succo cyrenaico. Perseuerante uero exacerbatione, Medicus confidenter cogens, ac mandibulas diducens castorium ori infundat, & succum cyrenaicum cum aceto mulso. Reuocatis autem ipsis, per sedem infundatur centaury ac calaminthæ decoctū, aut aristolochiæ. Deinde recuperatis uiribus, per hieram Galeni ex colocynthide purgētur. Eiusmodi sanē est recentis & acuti comitialis morbi curatio. Deinceps autem quæ ad inueteratū demolitionē pertinent trademus. Oportet itaq; ægros in longo aque potu continere, & in curationis aggressione, si nihil impedierit, uenam secare, & intermissis diebus quatuor aut quinque corpus reficere, ac sic infra euacuare, maximè per ueratrū nigrum, aut colocynthidē. Veratri autē corticem siccum tundere ac cribrare oportet, & eius drach. i. cū aqua mulsa præbere. Aut modico pipere addito melle excipere, & cataportia deuoranda dare. In colocynthide uero electo semine, & relictā medulla, uinū dulce infundito, ac per noctē finito. Mane uero uinū excolatum ac tepefactū bibendum dato. Post sufficiētem purgationem lauare ipsos oportet. Tertia deinde die cucurbitas affigere præcordiis ac dorso cum scarificatione. Deinde intermissis aliquot diebus ac refecto corpore, purgare per hieram Galeni ex colocynthide. Postea uero, etiam capiti cucurbitas affigere. Et sequenti die cataplasma capiti adhibere, ex pane cocto cum aqua mulsa, amygdalis amaris simul cōtritis, aut serpillio, aut calamintha, aut mēta, aut ruta. Et hoc faciendum est per triduum. postea radendū est caput, & illinendū peucedani succo in aceto diluto. Aut spondylium, aut serpillū, aut iris in aceto coquatur, & facta intermissione, rursus ex hiera drach. i. i. solum dato. Deinde sternutatorijs utendum est, & pituitam per os ducentibus, & naribus rursus, ita ut cyclamini succū naribus infundamus, aut ipsam radicē siccam tritam insufflemus, aut elateriū cum lacte. Et rursus facto interstitio, clysteri ex centaury & colocynthide utere. Deinde sinapismū capiti adhibe, & eduliorū acriū esu per interualla utere.

*Que arguunt morbum comitalem.* Cap. xiiii. Arguunt comitalem morbum & eo affectos collabi faciunt suffita, bitumen, lapis gagates, cornu ceruinum, odor hepatis caprini assati, & ipsum hepar dū editur.

*Que collabentes comitales excitant.* Didymus. Cap. xv. Simagnum pedis ægri digitum diuiseris ex quacunque parte, & destillante sanguine labia ipsius collapsa illeueris, statim excitabitur. Asclepiadæ odoramentum excitans comitales. Sagapeni, piperis, castorij, amygdalarum, amararum, radicis peucedani, spondylii, galbani, singulorum drach. ii. silphij drach. i. opobalsami drach. i. aceto dilue ad passillos efforma. Vt uero expetente aceto dilue acinaribus subline. Utendum est hoc in exacerbationibus. Facit & ad uteri strangulationes. Pharmacum hoc repositum seruatur in area pyxide, quam naribus ægri ad mouebis. Aliud Galbani, spondylii aut serpilli, æruginis rase,

castorij, acori, singulorum drach. iiii. succi peucedani drach. ii. aut radicis drach. iiii. succi cyrenaici drach. i. opobalsami drach. i. piperis grana x xiiii. amygdalas amaras decorticatas x x x. picis liquidæ quātum satis est, aceti tantundem. Excipe & utere.

*Auxilia ad comitiales.* Dioscoridis. Cap. xvi. Ad comitiales facit rutæ syluestris semen cum aqua potum. Et spondylium eodem modo. Item radicis bryoniæ drach. i. seminis siue fructus balsami drach. iiii. Cardamomi drach. i. Ramentorum loti arboris cremor. Foliorum quinquefolij drach. i. quotidiē pota. Testudo terrestris cocta ac delincta. Laser cum cibo acceptum. Summe uero prodest castorij post aliquam purgationē acceptum, ad dies quinque aut plures, drach. i. pondere cum aqua mulsa. Et eboris ramenta magnopere profuisse cognouimus, ad dies quinque aut plures, duorum cochleariorum mensura quotidie pota cum aqua mulsa. Ex Asclepiade. Oxallidem, siue rumicē acutum, uiridem præsertim, quotidie dato à prima lunæ usque ad trigessimā. Eadem oxallis herba uiridis data cum uino delyrantibus, in naturalem statum eos restituit. Aliud, ut ne assidue cadant inquit Archigenes, Eryngij montani appellati, cuius folia angusta & parua, & flores auricolores & oculorum speciem præferentes. Hulus radicem contūdito ac diligenter cribratam reponito. Et ex hac mystra duo ad dies quinque dato, sufficiens melle adiecto, ut eclegmatis crassitudinem habeat. Et hoc facito ex interuallis ut trecentos sexaginta quinque dies expleas. Qui enim hoc pharmacum per anni spaciū, hoc est trecentos sexaginta quinque dies sumit, ab hac affectione non corripitur. Aliud. Scillæ assatæ internæ partis triæ, anethi, singulorum acetabulum, apij acetabula tria. Excipe melle, & nuncis ponticæ magnitudine exhibe cum aceto mulso. Et qui bibit si potest, currat. Sin minus, condatē deambulet. Aliud Asclepiadæ. Folij oleæ x x v. & castorio cum aceto mulso usus est Themison. Facit ad comitalem morbum & elephantiasim. Est & hæc theriaca bona. Sefelis drach. v. scordij, castorij, cinamomi, seminis trifolij, singul. drach. vi. staphidis syluestris drach. iiii. gentianæ drach. viiii. aristolochiæ drach. vi. pyrethri drach. viii. euphorbij drach. v. piperis albi drach. x. opobalsami drach. iiii. succi cyrenaici drach. iiii. Excipe aceto mulso simplici, & dato comitialibus cum aqua mulsa drachmas tres, elephantiasim uero affectis sesquidrachmā præbe. Aliud. Quo Serenus utebatur ad comitiales, cui nullum cōparari potest. Idem concoquit & euacuat. Castorij, ueratri nigri, scammoniæ, singulorum drach. ii. opopanacis, cumini thebaici, centaury, nitri, sulphuris uiui, abrotoni, ammoniaci thymiamatis, seminis rutæ syluestris, absinthij, singulorum drach. i. cōtusa & cribrata excipe aqua, & efforma pilulas fabæ Aegyptiæ magnitudine, & unam quotidie præbe cum aceti mulsi cyathis iiii. Diuina huius cōpositionis uis est. Recipit autem simplicia xii. & habet drach. xv. Aliud. Coagulum leporis quotidie ieiunus bibat erui magnitudine aqua dissolutum. Si non adest leporinum, hœdino utatur. Aliud Archigenis. Ad comitiales, & qui per circuitū cōuelluntur, & à uoluulo uexantur, & ex diuturno capitis dolore laborant. Castorij, abrotoni, radicis panacis, pyrethri, croci, singul. drach. xii. seminis rutæ syluestris, myrrhæ, piperis



piperis, singulorum drach. iiii. Terito in aceto mulso scillicetico, & pastillos drachmales formato, & unū exhibeto non febrientibus cum aceto mulso. Febrientibus in remissione. ac interuallo cū aqua mulsa per triduū. Deinde interposito triduo, rursus per aliud triduum dato. Facit etiam ad arthriticos. Ducit mulieribus menses, si nouies per interualla uelut diximus bibatur. Aliud consimilis usus. Castorij, piperis, radicis panacis, singulorum drach. viii. pyrethri, staphidis syluestris, abrotoni, seminis rutæ, zingiberis, acori, dauci, singulorum drach. iiii. croci, iridis, cardamomi, singulorum drach. ii. Dato ex hoc arido cochlearium cum aqua mulsa. Facit ad comitiales, resolutos, & tremulos.

*De his qui ex stomacho primario affecto, comitialis morbi modo exacerbantur. Galeni. Cap. xvii.*

Quando stomacho primario affecto fit morbus comitialis, oportet ægro præcipere ut bonæ concoctionis studiosus sit, & circa horam tertiam panem accipiat probe præparatum, ex uino ueteri albo & tenui diluto ac leniter adstringente. Dato autem ipsis etiā amarum ex aloë pharmacum sæpe in anno. Dicitur autē amplius de his qui ex stomacho comitialis morbi modo affliguntur, in Sermonē de stomachicis. Multum uero prodest ipsis fesceli, & spodylij radix ac semen, & aristolochia, cum aqua trita pota. Auxiliatur his magnifice & uenæ sectio à talis & poplite, si assidue fiat. Noui etiam puerum qui omnino non corripiebatur comitiali, ex quo pœoniæ radicē gestabat magnam & recentem de collo suspensam, ut indefinenter stomachum contingeret.

*De his qui ex parte aliqua habent morbi comitialis causam. Posidonij. Cap. xviii.*

Quibuscumque uero ex alia manifesta parte morbus comitialis principium habet, uelut in prædicto puero ex crure; Post totius corporis euacuationem, unguentis locum prius excalfacere oportet. Deinde epithema ex seminibus imponere. Et ex emplastris quæ rarefaciunt & intemperiem transmutant. Quale est quod Ebrietas appellatur, & quod ex althæa paratur, & mnasæ inscriptum. Postea uero phoenicinū appellatum. Post temporis autem interstitium dropaces ac sinapismi loco adhibeantur. Et sic quidem adolescentes ac iuuenes, & inclinatæ ætatis homines, fortiter curare oportet.

*Curatio senum, ac puerorum comitali correptorum. Cap. xix.*

Senes autem & pueri affecti hoc modo curentur. Corporis equidē euacuationes in his uitare oportet per purgantia medicamenta. Imbecille est enim & senibus & pueris corpus, ad resistendum fortitudini purgatiuorum. Per clysterem uero euacuandi sunt præsertim senes, ex centaurea, aristolochia, polypodio ac anetho. Sed & manducationum usus senibus conuenit, & gargarismatum, ac eorum quæ naribus induuntur. At uero pueris simplicissima infusa immittantur. Frictoriorum quoque ac sinapismorum simpliciorum usus pueris adhibeatur. Senibus autem efficaciorum. Sed & antidoti præscriptæ senibus sunt exhibendæ.

*Curatio ualde senū comitalium. Posidonij. Cap. xx.*

Valde senibus cōsulendum est, ut uictu solum calido re utantur, & ut bonæ concoctionis rationē habeāt. Impossibile est enim eos qui cum hac affectione cō-

senuerunt, humana ope curari, ac à morbo liberari. Quibus autem temperaria est affectio, ab aliquibus occasionibus allapsa, etiam si ualde senes fuerint, ab ipsorum curatione desperandum non est.

*Curatio puerorum recens natorum comitalium. Posidonij. Cap. xxi.*

Afficiuntur etiam recens nati pueruli à morbo comitali, & difficilem curationem habent, non tamen desperatam. Possunt enim ipsorum matres aut nutrices calidis cibis ac potibus nutrirī, quo lac semper calidius ac tenuius fiat. Possunt etiam capita infantium puluisculis calidioribus conspergi, uelut est cyperus, adiantum, iris. Oleo item anethino assidue illini, & irino, ac amaracino calidis. Lauari quoque possunt, ita ut caput non rigetur, neque calida, neque frigida. Nisi ubi opus fuerit sordes detergere per spumam niri ac mel, & sic caput solum calida abluere, non autem immergere. Dandum est etiam ipsis mel despumatum ad delingendum. Et collo alliganda est pœoniæ radix recens, ut semper stomachum contingat.

*De fatuitate. Cap. xxii.*

Fatuitatis quoque ac delyrii curationem aggredi oportet à principio generationis ipsorum, si partes corporis uniuersæ, & præsertim capitis, moderatē se habuerint, & si rationem antea moderatam ac integram habuerunt, postea uero dementes apparuerunt. Oriuntur ambæ affectiōes frigidiorē cerebro facto, aliquādo ex sola qualitate, uelut fieri solet in profectiōibus dum pluuia caput frigefacit, aut etiam uehementis uentus. Aliquando uero etiam modica pituita ad cerebrum illapsa. Differt autē fatuitas à delyrio, quod fatuitas quidem consequentia & dicitur & facit; Delyrium autem transgressionem inconsequentem habet, & sermonem alium alij cōnectit, ita ut posterior nihil commune habeat cum priore. Delyrium item senibus plerumque accidit. Fatuitas autem & in pueris, & adolescentibus, ac reliquis ætatibus, ex prægressis quibusdam morbis consequitur. Cæterum curatio amborum morborum cōsimilis est ei quæ ad comitiales relata est, per calefactoria auxilia similiter fiēs, non tamen similiter siccantia.

*De memoria amissa. ex Ruso ac Galeno. Cap. xxiii.*

Memoriæ detrimentum sæpe in quibusdam morbis factum esse compertum est, læsa simul etiam ratio. Ita ut affectio quidem utraque eadem sit, intendatur autem quādo unā cum memoria etiam ratio perit, quod sane fatuitas appellatur. Pereunt autem ambo hæc in lethargo, & omnibus affectionibus soporiferis. Vnde etiam curatio ad prædictas affectiones descripta adhibetur instantibus iam morbis. Contingit autem hoc etiam ex peste, quemadmodum accidit in peste Athenis facta. Si uero irruerit aliquando ex aliquo prædictorum morborum, soluto iam in totū, & in obliuionē transeunte, considerare oportet qualitatem magis prædominantem, hoc modo. Sola quidem humiditas redundans, profundos ac longos somnos facit. Sola uero siccitas, uigilias. Si uero frigiditas fuerit cum humiditate, soporiferæ ac stupidae affectiones fiunt. Si uero humiditas fuerit cum modica frigiditate, memoriæ detrimentum & fatuitates succedunt. Quum autem multa sit differentia temperaturarū, pro maioris ac minoris ratione, multiformis sit uarietas causarum animales actiones lædentium. Obseruare igitur oportet somnos eorum qui



qui memoriam perdiderunt, aut intelligentiam: Intelligentiæ enim amissio fatuitas est: utrum somno-  
lenti sint ualde, an moderatus ipsis sit somnus. Ita e-  
nim repereris intemperaturam prædominātem. In-  
super autem considerandum est utrum multa excer-  
nantur per os & nares de humoribus ex capite dela-  
tentibus, aut siccae appareant partes hæ. Si quidem  
igitur frigiditas sola est, calefacere solū cōuenit, non  
item siccare. Si uero cū siccitate fuerit frigiditas, cale-  
facere ac humectare. Atq; ego sanè noui quendam qui  
ferme memoriam amiserat, & ratione læsus erat, ob  
studium & uigilias circa disciplinas. Alium item ui-  
nitorem ob uineæ labores similiter affectū. Et uterq;  
ipsorū palam à calefacientibus ac siccantibus lædeba-  
tur: Ab humectantibus uero simulq; calefacientibus  
opem sentiebat. His autem prædistinguis curationem  
annectamus. Si igitur ob purgationes quasdam, aut  
alias immodicas euacuationes, aut animi deliquia,  
fractis uiribus, memoriæ detrimentum succedat, refe-  
ctoria diæta uti cōuenit, nihil aliud curiosius molien-  
do. Roboratis enim corporibus & collectis uiri-  
bus, restituitur etiā memoria. Eodem uero modo si  
propter extremā senectutem accesserit memoriæ de-  
trimentum, non oportet curiose quid moliri, sed so-  
lum cōueniente diæta contentum esse. Quibus au-  
tem derepente deficit memoria, alia uero sana esse ui-  
dentur, in his comitalem successurum timere opor-  
tet, aut resolutionem, aut etiā syderationem. Et in  
summa magnum quoddam malum in ipsis compe-  
ries. His igitur sufficiunt aliquando præseruationes  
à morbis imminetibus. Dum enim morbi aduen-  
tum prohibemus, ex hoc etiā memoria conseruatur.  
Prohibent autem prædictos morbos, primum atte-  
nuans & incisoria diæta. Deinde etiam purgationes  
conueniunt, & similia. Si uero ex morbis uelut di-  
ctum est irruerit, uelut lethargo aut peste: horum cu-  
rationem contentiosius aggredi oportet. Summa ue-  
ro medelæ est in calfaciendo uniuersum ipsorum cor-  
pus, intrinsecus ac extrinsecus, iuxta mensuram euac-  
uationis habitus naturalis. Calefactoria quæ ferme  
talibus conueniunt æstate quidem oleum per se cali-  
dum: hyeme uero irinū cum aceto acriori, aliquan-  
do serpillio, aut spondylīo, aut calamintha in ipso co-  
cto. Aliquando etiā nitro iniecto & pipere, aut bac-  
cis lauri. Commodum est etiam castorium cū oleo  
occipiti adhibitum. Auxiliatur autem his maiorem  
in modum hieræ Ruffi purgatio. Quandoque enim  
inquit huius solius purgatione usus, multum profe-  
ci in purgando, quum nihil boni secum detrahat. In-  
cipit enim superne à capite detrahère, & postea etiam  
alias partes pertransit, nullam uiolentiam, nullum  
dolorem inferens, non ardorem, nō stomachi dolo-  
rem, non sitim. Verum semper pro euacuationis ra-  
tione alleuat. Vnde etiā stomachum corroborat per  
purgationem, ut ciborum quoq; appetentiā augeat.  
Creditur etiam post purgationem per hieram, ebo-  
ris ramentum memoriæ opitulari, drachmæ ponde-  
re potum cum aqua mulsa, & similiter cerui cornu.  
Quin & castorium similiter drachmæ pondere po-  
tum, post purgationem cum aqua mulsa magnope-  
re prodest. Maximum auxilium est & ueratri albi  
porro, non uelut quidam putant postremum, sed ab  
ipsa recte etiam quis incipere possit. Quid enim o-  
pus est diu & multum laboribus fatigari, quū ex ma-

ximo auxilio maximam medelam consequi liceat.  
Quare citra omnem formidinem ueratrum dādum  
est, priusquam eger per morbum excoletur, & uires  
auxilij exiles fiant. Commoda sunt quoque sternu-  
ratoria ex ueratro albo & castorio, naribus admota  
post euacuationes: & quæ naribus induntur ac infun-  
duntur: & quæ piuitam per os detrahunt. Alimen-  
tum uero cōuenit friabile & aliquo modo calefa-  
ctorium ac attenuatorium. Ab oleribus autem o-  
mnibus frigescentibus abstinendum est, & à fructi-  
bus ac bellarijs, caseoq; ac lacte, & à cibis crassefacien-  
tibus ac inflantibus. Alia enim ex ipsis spiritum cō-  
turbant, alia dēfant. Acriora uero ex interuallis ex-  
hibeantur, uelut sunt allia, thymbra, origanum, pule-  
gium, & raphani. Sed & horum copia uitanda est.  
Semper autem cruditas cauenda. Nam cruditates o-  
mni re magis mentem uitiant. Vinum his cōuenit  
tenue, album, & non ualde uetus. Per moderatam e-  
nim caliditatem tum alia non pauca potest, tum ani-  
mam māsuefacit & ad tripudia aptam facit, motum  
ei præbens concinnum ac sedatum. Multus autem a-  
quæ potus, & adhuc magis uini, pessimus est. Ca-  
put enim ualde humectat. Multa autem humiditas  
obliuiofissima est. Somnus sic moderatus, & à re-  
pletiōe ne fiat. Veneris uero usus sit rarissimus. Ne-  
que enim ad totam sanitatem conducit, neque ad ani-  
mæ ratiocinationes. Imò & tristitiā inducit, & lan-  
cinatio illa in coitu contingens, conuulsioni quodā-  
modo cognata est. Et perfrigeratio quæ succedit cō-  
gelat quodam modo ac stupefacit intelligētiā. Cæ-  
terum post purgationes uniuersales ac locales, etiam  
sinapismus occipitis commodus est, & post sinapis-  
mum, balneum. Cruditas autem & lassitudo peni-  
tus uitentur, tum aliarum corporis partium, tum mā-  
ximè capitis ac ipsius mentis: Vitandi quoque ue-  
hementes ardores ac frigora. Ambo enim caput res-  
plent. Vitanda & edulia crassefaciētia, & inflantia,  
ac humectantia. At uero si quis ex his progressum  
faciat, etiam in sanis qui humidius caput habent, ui-  
ctus rationem commodam præscribere poterit, ut  
quis optimā memoria præstet.

*De commorsis à canerabioso, aut his qui aquam  
timent. Ex Ruffo & Posidonio. Cap. xxiiii.*

Quum canes natura calidi ac sicci sint, per æstatem ex  
ambiente nos aëre aliam caliditatem ac siccitatem ac-  
quirunt, & ob immoderatam intemperaturam insa-  
niunt, & hæc insania rabies uocatur. Patiuntur au-  
tem hoc magis in illis regionibus, in quibus maxi-  
mæ & inæquales ambientis mutationes inordinate  
fiunt. In quibus & hyemes uehementes fiunt, & æstus  
excellentes. Insanientes autem canes, & siti uehemē-  
ti correpti porum nō admittunt, eò quod insaniunt.  
Vnde etiam magis intenditur ipsis ueneni maligni-  
tas. Signa canum rabiosorum hæc sunt. Muti sunt  
& adeo delyri ut ne familiarissimos quidem cogno-  
scant, sed hos primum attingant. Cibum auersantur,  
& siticulosi quidem sunt, non tamen bibunt, & ple-  
runque anhelant. Ore autem hiant, & linguam exe-  
runt, ac saliuam largam & spumofam profundunt.  
Aures item inclinant, & caudam laxatam habent, se-  
gniusq; incedunt & uelut somnolentiores existunt.  
Si uero etiā cucurrerint, uelocius solito currunt intē-  
pestiue ac inordinate. Huiusmodi canes fugere opor-  
tet. Omnes enim qui à rabioso cane morfi sunt, si ne-  
glecti



glecti fuerint, aut male curati, in affectionem timoris aquae incidunt. Et hoc maxime patiuntur qui vitiosis humoribus repleti sunt. Vnde quidam statim ubi commorfi sunt, aquam & alios liquores timet. Alii post quadraginta dies. Alii post longius tempus. Contingit autem ipsis grauior perturbatio, quum aquam, aut aliud quoddam pellucidum speculum uiderint. Aspiciunt enim faciem suam rubicundam, & toruere tuentem, atque ira plenam. Fieri autem potest, ut quemadmodum aliqui dicunt, etiam canis a quo morfi sunt imaginem in aquis apparere imaginentur. Recordari autem formae canis, confertim ab immodico timore corripiuntur. Hoc uero patiuntur ob immodicam siccitatem. Nam philosophus quidam morsus a rabioso cane, & generoso animo affectioni resistens, & inconsequens ratus canem in balneo apparere: apparebat enim ipsi quemadmodum etiam alijs hoc modo affectis. Ratiocinatus igitur & sic secum loquutus. Quid cani & balneo commune est? superauit affectione, & sanatus est ab affectione, ubi citra timorem bibisset. Quum igitur aliquis a rabioso cane commorsus est, ei quam celerrime per receptam curatione auxiliari oportet, etiam si paruus & in superficie consistens fuerit morsus, de hac re certi, quod nullus ex his qui non probe curati sunt effugit. Primum itaque uulnus maius facere oportet, osculo ipsius per scapellum diuiso ac dilatato. Deinde etiam fissuris incussis omnem circum circa locum uellicare, eo studio ut effluxum sanguinis multum per locum efficiamus. Vlcus uero cauterijs ignitis amplioribus inurere. Deinde porrum imponere, aut panem cum sale trito, aut cepas, aut allium. Et ubi crustae exciderint, ulcera ad dies quadraginta aut sexaginta a cicatrice arcere. Et si ad cicatricem peruenierint, rursus per cinerem uitris aut ficulneum, & similia ulcera resolueret. Hac de causa bonum est etiam folia marrubij, & anagallidem imponere. Haec uero etiam a ceraste serpente morsis magnopere auxiliatur. Vlcus autem perfundendum est chamæmeli, & radicis rumicis acuti, quem oxallidem uocant, decocto. Noui ego quendam senem, qui ubi quis morsus esset a rabioso cane, sola oxallide curabat. Nam & ulcus decocto perfundebat, & herba integebat, & de ipsa bibendum dabat. Et hoc pharmacum uelut robustum ualde laudabat. Mingunt aut homines qui ipsam acceperunt multa & intemperata. Et propterea morbum regium haec expurgat. Nos uero etiam impetiginem ex ipsa cum aceto confectam depellimus, & pruritu auxiliamur per eandem radicem. Vt murus etiam ipsa ad morsus canis rabiosi cum alijs auxilijs. Similiter facit etiam syluestris rumex aculeatus, radicem habens oblongam, uelut raphanus paruus. Commodum est etiam ipsis pharmacum Galeni ex pice brutia. Est autem hoc. Picis brutiae lib. i. opopanacis quadrantem, aceti heminas ii. Opopanacem cum parte aceti terito. Residuum uero aceti ad picem adijce, & coque donec acetum consumatur, atque ita ad tritum in mortario opopanacem diffunde, & unita excipe ac impone, & hoc pharmaco per dies quadraginta aut sexaginta utere, & non permittet ulcus cicatrice includi. Bonum est & theriacam antidotum ex uiperis oleo rosaceo diluta uulneri imponere. Sed & aridum hoc, ipsis conuenientissimum est. Salis fossilis drach. vii. chalcididis drach. xvi.

scillae drach. xvi. rutae uiridis drach. iiii. æruginis rase drach. iiii. seminis marrubij drach. i. Reponitur siccatum in sole, in aërea pyxide. Vtere primum sicco, donec crusta inducatur. Deinde cum rosaceo, donec crustae excidant. Sed & potamogeton cum sale impositus non permittit incidere in affectionem timoris aquae. Vtere autem hac herba & humida & sicca. Danda est antidotus theriaca in potu per primos tres dies, nucis auellanae magnitudine. Neque enim aliquem noui, qui eam accepit aequè timore correptum. Nec uero ab alijs auxilijs abstinendum est, sed danda maxime est antidotus celebris ex cancribus fluuiatilibus. Est autem compositio eius hæc. Cancrorum fluuiatilibus, magnorum uiuorum, in uase aeris rubri ustorum cineris dextrantem, gentianae quicunq, thuris unc. i. preparandum est hoc pharmacum mense Augusto luna decima octaua. Si uero non affuerit quod sic preparatum est, nihil de hoc curiosus sis, sed quocunq, tempore paratum exhibe uelut dictum est. Praestat tamen lignis uitris exustione ipsorum facere. Dato cochlearij mensuram cum aqua calida ad dies quadraginta, si ab initio hac potione usus fuerit. Si uero non ab initio, sed post aliquot dies, dato quotidie cochlearia duo, donec impleueris quadraginta dies. Facit quoque per seipsum cinis cancorum potus, & cum melle uulneri impositus. Preparatur quoque antidotus ex nucibus, etiam febricitantibus iam conueniens. Nam supra hoc quod affectioni resistit, etiam somnum conciliat. Compositio eius hæc est. Sagapeni drach. ii. opij thebaici drach. ii. croci sesquiscrupulum, lycij indicij scrupulos x. & dimidium. carnis nucum iuglandium non ualde ueterum drach. x. excipe & exhibe drach. i. cum aqua pluuiali calida ad noctem, post uigorem febris. Ita ut mane quidem antidotum ex cancribus, uespero uero ex nucibus præbeas. Quod si hæc antidoti non adsint, dato confectionem cyphi appellatam, siue eam quæ ex rebus xxxvi. constat, siue eam quæ ex xxxviii. paratur, habueris: commodus est etiam succus cyrenaicus aut parthicus, fabae magnitudine deuoratus. Quidam hepar ipsius canis qui momordit coctum præbent commorso. Mergi quoque secur assatum datum cum oleo ac modico sale commodum est. Aiunt enim ita efficax ipsum esse, ut eger euestigio aquam petat. Sed & hippocampus marinus assatus comestus prodest. Sanguinem enim ipsius amore aquae inducere dicunt, & formidini aquae resistere. Vnde iterum atque iterum hippocampum edere iubent. Et ipsos hippocampos cum acri aceto tritos ulceri imponunt, & hoc pharmaco saepe rabiem superarunt. Quin & catuli coagulati cum aqua datum, utilissimè ab ipsis bibitur. Et ubi semel ipsum acceperint, assidue comouet ipsis potus cupiditatem, & bibunt etiam alios liquores intrepide. Oportet autem catulum non multorum dierum esse, sed recens natum & adhuc lactentem. Prodest ipsis etiam leucanthemum herba pota. Tantam autem eius uim esse aiunt, ut si ex ea fundum poculi sublinatur ac exhibeatur, ipsi libenter potum accipiant. Idem etiam de chamæmelo traditur. Utilissimum autem est ipsis bitumen Iudaicum potum cum aquae cyathis tribus. Datur ex ipso perfectis scrupulus unus, aut, uelut aliud exemplar habet, drachma una. Utiliter etiam datur syluestris fici uirgultorum cortex siccatus ac tritus & cum aqua potus. Et lycium indicum. Et abinthium,



thium, & scordiū, & centaurea parua. Aristolochia, artemisia, chamedrys, bryoniae radix, polium, laser, cancerorum fluuiialium decoctū multo anetho cū ipso cocto. Substernitur autem commodē & insternitur ipsis ursae pellis, & phocae. Sed & hyaenae pellis efficacissima est, ut ipsis intacta uelociter mentē in integrū restituat. Quin & pellis hyaenae exusta, ita ut cinis in potu detur, affectionem formidinis aquae sedat. Cognitionē autem an homo à periculo liberatus sit, ex his sumito. Vlcus nudiū regis leuissimē tritis intege. Sequenti uero die solue, & cataplasma gallo aut gallinae edendū obijce. Si enim ex eius esu nō mortui fuerint, tunc ulcus ad cicatricē perducto, nimirum uelut liberato aegro à periculo. Vtere autē eodem etiam ab initio ad dinotionem. Si enim gallina ex esu cataplasmatīs prima die impositi ulceri nō moritur, scito non à rabioso cane hominem mortuum esse. Si uero mortua fuerit, ulce uersa. Primum enim ne attinget quidem. Si uero à fame coacta ederit, morietur, si rabiosus canis fuerit. Hoc igitur quotidie alterare oportet, donec ex eius esu gallina non moriatur. Ceterum ulcus ipsum optimē ac tutissimē ad cicatricē perducit antidotus theriaca, cum rosaceo diluta. Vlceribus autem ad cicatricem perductis, ueratrum album praebeatur ad totius affectionis destructionem. Nam & rabiosi canes hoc cū posenta accepto uomunt, & statim resipiscunt à rabie liberati. Fieri etiam poterit quod opus est, si per Ruffi hieram infra purgaris, ubi quid prohibuerit ueratri acceptionem. Danda est etiam quotidie hiera, non ad purgationem, sed tanquam auxiliare medicamentū, nucis auellanae magnitudine, cum cyatho decocti saluiae, aut herbae sideritidis, quam heracleam appellant. Quidam etiam sola ipsa utuntur, & multum prodesse dicunt, & propterea etiam Alyssum, ab eo quod rabiem eximat, ipsam nominant. In uictu indigentia & repletio uitanda sunt, & magis indigentia. Nam indigentiae humorum malignitates augent, quod nequaquam commodum est ulceri maligno. Quapropter alimentum moderari oportet, quo & probe concoquat corpus, & succulentissimum ex bono succo fiat. Quin & egestionum quotidianarū & mictionum cura habenda est. Ad hoc autem faciunt & praedictae radices, & scandix comesta, & foeniculum. Cretinum autē tum uentrem, tum urinam mouet. Cichorium uero syluestre etiā stomacho commodum est crudum comestum. Appellant ipsum aliqui ferim, aut picridem. Commodus est & brassicae asparagus, & asparagus palustris, & rumex hortensis, & agrestis, & acutus. Et ex piscibus qui tenerā carnem habent gammari & cancri, & herinacei recentes cum uino mulso. Ex carnibus extremā partes, & uolucres omnes montanae, concoctu faciles ac boni succi. Vinum tenue & albū, non ualde uetus. At uero praeseruacionis gratia singulis annis appropinquante tempore, per hieram praepurgari oportet. Et instante iam die theriacam antidotum accipere per triduum.

## De cerebri inflammatione.

Cap. xxv.

Cerebrum inflammātū saepe ita intumescit, ut etiam suturae capitis disparentur, & dolorem maximum ac exurentem compressis membranīs inducit. Consequitur nausea stomachi multa, & bilis uomitus, & rubor multus in facie consistit, & oculi prominent, & facies intumescit, itemq; totū caput. His ergo uena

secanda est à cubito. Oportet quoq; à naribus & uenis sub lingua sanguinem euacuare. Vtere etiam irrigationibus capitis, quarum usus aliās ad inflammationes adhibetur, & cataplasmatīs humectantibus & concoquere ac maturare potentibus.

## De erysipelate cerebri.

Cap. xxvi.

Fit & erysipelas, hoc est, ignis sacer, in cerebro, & patitur aeger haec. Dolet totum caput, & uidetur sibi flammā in ipso habere. Et facies ipsius frigida est, itemq; praecordia. Et os siccatur. His igitur uena secetur, & praesertim uenae sub lingua incidantur. Forinsecus autem adhibe capiti frigefacientia ungenta, & pastillos quibus ad erysipelata urimur.

## De syderatione. Ex Galeno.

Cap. xxvii.

Syderatio propter repetitum exortum, indicat humorem crassum, aut frigidū, aut uiscosum implere principales cerebri uentriculos, & non propter intemperiem totius essentiae eius fieri. Magnitudinē itaq; periculi, ex magnitudine lesionis respirationis cōsecta. Quum enim respirationem multū impediri, & uix fieri uideris, non paruam morbosam affectionē cōijce in cerebro factam esse. Est autem syderatio Graecis apoplexia appellata, priuatio sensus & motus totius corporis, unā cum lesione principalium actionum, de repente incidens. Ex Archigene. Syderationis affectio ex natura magna est, & uehementer acuta. Contingitq; ut qui periculū effugerunt in diuturnū morbum incidant, resolutionis aliquarum partium, aut etiā totius corporis, aut etiam uiolatae rationis. Senibus autē magis accidit affectio, & magis in hyeme, & cōstitutione frigida, & ex uehementibus cruditatibus, & ardoribus uehementibus, & immodico uini potu ac ebrietate. Talia enim habitū perfrigerāt. Et in summa qui in hanc affectionē collapsi sunt, uiuentes sunt cū mortificatione, aut cū tota sensus priuatione. Primū igitur corpus oleo calido inungendū est. Caput autē rigādum rosaceo cum aceto. Coquendū est autē in aceto serpillum aut spondiliū. Odoramenta quoq; adhibenda sunt, castorium, opopanax, & galbanum. Et aperto ore instillandū est acētū mulsum. Et pinnae oleo cyprino, aut irino, aut narcissino imbutae immittendae sunt, & uomitus prouocandus, & sedes assidue illinenda cū ruta & cumino, addito nitro ac melle, ad flatum prouocandos. Si uero haec nihil profecerint, clysteribus utendū est ex decocto fursurum, & cucumeris syluestris radice, & centaurio, nitroq; ac melle. Aut ex muria cum melle ac oleo rutaeco. Enitendū autem est ut quod infusum est emittatur, per lūborum ac uentris frictionē. Et si opus fuerit etiā digiti in sedē immittantur & obiuuamēta educantur. His peractis uenā secare oportet periculo praedicto. Detractio autem fiat e dextra manu, & copia eius qui detrahatur diuidatur. Commouere enim oportet tantū, non exoluere uires, & calorē extinguere. Inspiciantur etiā pulsus in euacuatione, & faciei color, ac respiratio. Et si nihil mali cōsequitur, etiam repetenda est detractio. Post uenae sectionem, adhibeantur odoramenta excitatoria, & uociferationes. Et corpus totum inungatur. Et si qua pars resoluta fuerit insigniter, hapsō lanae integatur sicyonio aut pingui ueteri oleo imbuto. Qui uero ad uenae sectionem inepti sunt, primum ad uomitum, uelut dictum est, cōmoueantur, & sedes ipsorum illinatur his quae flatum educunt. Deinde post illiutiones, cucurbitis cō-

o 2 cutere

resolutis ex  
ardore xte f



cutere conamur magnis & fortibus, retrorsum iuxta lumbos affixis, & ubi per tempus aliquod attraximus, transferimus ipsas utrunque ad pectinem ac imum ventrem. Sæpe enim expresserunt ea quæ in ventre sunt, & simul cum expressione reuocarunt morbo occupatos. His uero nihil efficientibus, aliquando ipsi ausi fuimus ori hieram infundere. Et quum suscipere non possent, quantum oportet, per clysterem infundimus. Et priusquam quicquam egeretur, accidens concurrentia reuocarunt me ad ampliorem aggressionem. Et sane permittit hæc affectio, ac cogit uel temere omnia tentare. Hæc igitur in necessitate fiunt. Vbi uero tolerare possunt, etiam reliqua auxilia annecte. Febris tamen occupat hominem, alios prima, alios secunda die, & exhibet spem salutis ipsa calamitas febris. Sed neque negligenda est. Verum si qua resident in intestinis, ea educere oportet. Si deorsum repant, per clysterem. Si sublimia sunt, per purgatorium inferne pharmacum, & maxime per hieram Archigenis. Post purgationem cucurbitæ præcordijs ac capiti affigantur cum scarificatione. Si uero aliqua compunctio etiam inferius fiat, illic quoque scarificatio adhibeatur, præsertim in mulieribus, iuxta uteri regionem. Quod si ad aliam quandam affectionem transitus fiat, curatio ad illam adaptetur. In summa uero providendum est in syderatis, ut facilis fiat per aluum ac urinas excretio. Curandum est autem ut accipiant cibos quotidie quidem, uerum paucos & leues ac calidos, & exterioria uel præditos, pleneque cum melle edulcatos.

*De resolutione. ex Archigene. Cap. xxviii.*

Quum omnes nerui sensum simul ac motum amiserunt, Syderatio appellatur affectio. Si uero iuxta alteram partem, siue dextram, siue sinistram hoc contigerit, Resolutio uocatur, illius partis uidelicet iuxta quam facta est. Conflatur hæc affectio, humoribus multis uiscosis ac crassis neruos obturantibus, per quos motus uoluntarii perficiuntur. Manifestum igitur est quod redundantem humorem euacuare oportet. Nec uero apertius principium in his reperire datur quam a uenæ sectione, si quidem permiserit ætas, habitus, tempus, studium, prægressus uictus, & reliqua quæ prohibere solent uenæ sectionem. Oportet autem moderatam detractionem facere, ut ne perfrigerentur. Frigiditas senim cum siccitate, uelut dictum est, affectionem inducit. Quapropter solum imminuenda est materia paululum per uenæ sectionem, & præsertim in prouectiori ætate. Detractio uero fiat a sanioribus partibus. In hoc autem tempore contexta esse oportet membra, hapsio lanæ oleo sicyonio aut gleucino imbuto. In prouectioribus ætate etiam castorium inspergendum est irrigationi. At in his qui derepente resoluti sunt, uelut ex ardore, præstat irrigatio ex lanis succidis, & oleo ac aceto, aliquando etiam nitro. Sæpe uero irrigationem renouare oportet. Cibus conuenit his modicus. Sint autem sorbitiones alicæ lotæ, & succi prisanæ. Interpositis diebus quibusdā a uenæ sectione, alius subducatur, primū clysteribus. Deinde etiam per aloës & polypodij ac colocynthidis cremorem purgetur. Conuenit etiam hiera Archigenis pro uiribus accepta. Post purgationem cucurbitæ affectis partibus adhibeatur. Si uero hæc ineptæ fuerint, uicinis affigantur. Post cucurbitas utendum est cataplasmatibus ex semine lini, & foeno græco, ac ordeï farina, cum oleo ueteri coctis,

& pulueribus inspersilibus ammixtis. Aut etiam emplastris quæ acceperunt picem, resinam, mannam, thuris, aliquando etiam bitumen. Egregie facit & artemisia coincta, & calamintha, ac ruta, & conyza. Postea uero etiam nitrum ammiscemus, & in muria cataplasmata coquimus. Modicam autem aquam esse oportet, quæ & ipsa in coctura consumatur. Postea autem pro lini semine, farinam loliaceam & fabaceam adhibere conuenit. Optimum est & erysimum. Deinde cerata & ungenta adhibeantur. Alius autem semper facile solubilis sit. Catapotia ad resolutiones, tremores, & opisthotonicos. Succus cyrenæici, piperis, galbani, singulorum drach. i. passo dissoluito ac facito catapotia, & dato ex eis obol. ii. & his acceptis absorbeant aquæ mulsæ cochlearia duo aut tria. Aliud ad tremulos, resolutos, & opisthotonicos. Myrrhæ, castorij, styracis, piperis, æqualibus partibus utere. Aliud. Opopanacis, sagapeni, castorij, myrrhæ, succi cyrenæici, piperis, uirgultorum rutæ, singulorum drach. i. præpara catapotia & exhibe, & insuper absorbeant aquam mulsam. Ungenta uero idonea sunt huiusmodi. In aliquo ex prædictis oleo scillam macerare oportet in sole ad dies quadraginta. Si uero tale oleum non affuerit, in præsens scillæ sextantem in olei sextario coquere oportet. Similiter etiam canchry, hoc est libanotidis semine utendum est. Ammiscendum est & ceræ parum, & galbani, & propolis, aliquando etiam castorij unc. i. & adarces ac euphorbij, sing. drach. iiii. & nitri drach. iiii. Commoda est quoque ranunculus herba similiter præparata. Manifestum est autem quod a lenioribus incipere conuenit. Sed & cerata ex his parari possunt, adiecto pyrethro, baccis lauri, nitro, sinapi. Malagmata uero conueniunt ex baccis lauri, & quod uiride appellatur. Sæpe uero sufficit ceratum cyprinū, largo sinapi ammixto, quod malagmatis usum exhibet. Conueniunt etiam smegmata ex fece uini, & acetato, & combusta adarce, euphorbioque ac calce uiuæ parata. Sed & dropaces ipsis commodissimi sunt. Sint autem leuia omnia quæ imponuntur, propter corporum debilitatem. Reuocat autem sensus etiam thapsia cum aqua illita aut cum aceto, post dropaces. Item illitio ex cantharidibus. Verum ulcerationes ex talibus fientes cicatrice citius includere oportet. Quin & sinapismi ipsis commodi sunt, & postea balneum. Utendum est post purgationem etiam potionibus ipsis conuenientibus. Castorium itaque assidue ipsis detur drach. ii. pondere cum aqua mulsæ. Et opopanax magnitudine fabæ, cum castorio, & sagapeno erui magnitudine ab ipsis deuoretur. Item succus cyrenæicus eadem magnitudine. Sed & sarmentorum uitis uiridum decoctum, a ieiunis assidue potum, ualde prodest partibus corporis resolutis. Utilissima est etiam post purgationes & alias euacuationes, theriaca ex uiperis antidotus, & mithridatica. Est & simplicius pharmacum ualde celebre ad huiusmodi affectiones, hoc. Castorij, seminis rutæ syluestris, opopanacis, sing. obol. ii. pyrethri obol. i. acori tantundem, piperis grana x. Cū aquæ mulsæ cyathis ii. dimidiū huius totius primū dato, robusto uero totū. Vniuersa uero curatio a capite initium sumat. Hoc enim radix est & principium totius affectionis. Quapropter illitiones ipsius sint, castorium, peucedanum, baccæ lauri, & menta. Hæc modico acri aceto excipiuntur, addito irino

*ut q. in ueni  
q. ne uti fuit  
ut fallaris  
ut. a frigida  
et humida*

*et fol.*



irino unguento, ut liquidioris cerati crassitudo fiat, & illinatur ex hoc totum caput usque ad frontem. Sed & odoramenta eiusdem generis adhibeantur. Postquam autem alius efficacior clystere praeuacuata est, & totum corpus iam minus superfluitatum habet, cucurbitae capiti adhibeantur cum scarificatione, primum quidem tali quae multum sanguinem extrahere potest. Deinde uero moderatiore. Hoc autem auxilium saepe adhibendum est, leuibus & inanibus cucurbitis primum capiti circumpositis, & deinde locis agglutinationis. Sic enim affixae nihil minus quam repetita sanguinis detractio possunt. Tonsura uero non solum cucurbitarum gratia, sed etiam per seipsam assidue fiat. Si uero ambiens nos aer non fuerit frigidus, etiam rasura commoda est. Statim autem praedictis iustitiis caput modice confricandum est. Postquam autem detracta fuerit materia, etiam sternutatorijs & pituitam per os ducentibus utendum est. Ego uero etiam crustas inurere non dubitarim per ignem, aut per medicamentum. Vnam quidem circa occipitis cauitatem, quo loco spinalis medulla initium habet, duas autem ab utraque ipsius parte. Tres aut quatuor in uertice. Vnam ex his in medio capitis, tres circum ipsam. Vlcibus enim diutius fluidis permanentibus, non despero perfectam restitutionem. Reliqua diuina sit attenuatoria, uentri comoda, nihil uiscosi aut uiscoli habens. Et quae urinam ciente alimentis ammiscetur. Utendum est etiam portionibus relatis ad morbum comitalem, & unguentis ad arthriticos referendis. Quum enim communia sint haec, superfluum est eorum etiam hic meminisse. Si uero fuerit aestas, etiam in totum detegantur loci, & denudati aeri exponantur. Quibusdam enim hoc tempore principium recuperationis actionum contigit.

*De supercilij aut palpebra resolutione. Cap. xxxix.*

Si supercilium aut palpebra fuerit resoluta, curabuntur unguentis calidioribus & acrioribus fronti illitis. Palpebra uero collyrio ex sandice & germinum oleae succo illinatur. Optimum autem in ipsis, & maxime in supercilio relaxato, hoc. Mastiche cum succo brassicae non lotae terito, & distenta frontis cute, fronti crassius illine. Perseuerante uero affectione, palpebra quidem sutura curat. Supercilium uero fasciolae de frore ablatis.

*De conuulsione canina. Cap. xxx.*

Caninam conuulsionem uocant mandibularium musculorum resolutionem. Distorquetur igitur in obliquum os, nasus, & oculus, & in summa, dimidia faciei pars. Auxilia itaque resolutae parti adhibeantur, non oppositae. Decipiuntur enim aliqui, qui mandibulam ab opposita parte distrahi putant. In communi igitur ipsis commodant omnia in resolutione relata. Nam & sanguinis detractio, si nihil prohibuerit, & purgatio, & clyster, & cataplasmata, & unguenta, & malagmata, & sinapismi, & taphiae usus, conducunt. Priuatim uero deligatura quae ad opposita reducit. Et sanguinis detractio a uenis sub lingua. Et cucurbitae duobus uerticulis impositae. Et quae pituitam per os detrahunt, itemque quae per nares. Iam uero etiam acerbis illitionibus utendum est ad oculi affectum, praesertim collyrio ex sandyce & germinum oleae succo.

*Linguae resolutae curatio. Cap. xxxxi.*

Si lingua fuerit resoluta, uenae sub ipsa secantur, corpore uniuerso prius euacuato. Et cucurbita sub mentum ponatur. Et quae pituitam per os detrahunt, & collu-

tiones ex sinapi, & linguae exercitia adhibeantur. Reliqua item occipitio ac collo uniuerso admoventur, uelut sunt illitiones acres, & epithemata, & sinapismi.

*De instrumenti uocalis resolutione. Cap. xxxxi.*  
Resoluitur & uocale instrumentum, faucium inquam musculi, & extremitatis asperae arteriae, imò etiam thoracis superiores. Spiritus itaque in ipsis supprimuntur. Quidam etiam gracilem uocem acquirunt. Alii uix loqui possunt. Et alij aliter uox impeditur. Proinde post uniuersalia auxilia, etiam thoraci adhibeantur ea quae antea enumerauimus. Et gargarismi acres in ipsis exhibeantur. Priuatim uero ad ipsos uocem est spiritus detentione, & coaceruata expiratione, & concinna uociferatione. Post haec autem per uictum ac exercitia uniuersum corpus corroboretur.

*Deglutitionis resolutae curatio. Cap. xxxxi.*

Si deglutitio resoluta fuerit, hoc est, delatix ciborum promptitudo: nam si stomachus, hoc est, gula resoluta fuerit, perniciem inducit: calida omnia adhibenda sunt. Priuatim uero conandum est ut cibi indatur quam penitissime, ut ne ad asperam arteriam dilabatur. Cucurbitae quoque mento affigantur. Et unguenta usurpentur ad partes iuxta tonsillas acra, ex castorio, sagapeno, succo cyrenaico praeparata. Gargarismi ite ex sinapi. Et quae comasa pituita ducunt. Forinsecus quoque adhibendae sunt illitiones communes praedictae ipsi mento.

*Vesicae resolutae curatio. Cap. xxxxi.*

Vesicae resolutio siue detinuerit urinas, siue inuoluntarie excreuerit, isdem communibus auxilijs curabitur, circa pectinem & maxime circa intercapedinem inter anum ac scrotum adhibitis, qua parte situm est uesicae collum, quem locum quidam sican, id est cate nulam appellant. Utendum est autem supra praedicta, irrigationibus pectinis ex unguento nardino, & malabathirino susinoque ac sicyonio, in quo cocta est eryngii radix, cyperus, cardamomum, ruta. Sed & sedes his illinenda est. Post communia uero auxilia, etiam per infusa in annum conandum est reuocare uesicae actiones. Sunt autem haec, a principio quidem castorium cum oleo sicyonio, aut ruta, aut cumino, aut anetho in oleo cocto. Deinde centaury & colocynthidis decoctum, ita ut modò cum aqua, modò cum pisanæ succo simul coquantur. Optime facit & anagallidis succus. Et origani ac thymi decoctum. Omnibus autem ammiscendum est oleum sicyonium & castorium. Aliquando etiam opopanax & galbanum in ipsis eliquamus, si frigoris sensus ipsis affuerit. Infundimus etiam per colem oleum sicyonium cum castorio aut opopanax. Quandoque etiam silphium in oleo coquimus. Priuatim uero in his qui urinas detinent cathetere instrumento immisso ad urinas prolestandas utimur. Et post urinae euacuationem, cathetere adhuc in sico, aliquod ex praedictis infundimus, angustissima fistula ad utrumque parata, quae catheteri adaptari possit. Et mirum est quanta inde utilitas emergit, ex infuso uidelicet post urinas excretas. Utendum est autem in utrisque etiam urinam cientibus, per interualla: Velut est sion, & iunci odorati flos, ac similia. Utendum & aceto ac uino scillino. Dicitur autem de his amplius in Sermone de affectionibus uesicae.

*Colis resoluti curatio. Cap. xxxv.*

In colis resolutione urinae excretionem non impediuntur. Seminis autem excretio & coitus impeditur. Oportet igitur auxilijs ad uesicam relatis uti. Priuatim



uero nunc etiā coxendicibus calefactoria adhibere. Et iam quoque tentiginem sciētia, de quibus suo loco dicitur, exhibere. Facit autē cum reliquis pudendum cerui femori uelut zona alligatum. Et carnes ipsius comestae, & polypi marini, & herinacei. Et ex uolucris sturni. Castorium autem in omni resolutione commodum est. Cauenda uero sunt in ipsis omnia frigida edulia ac potiones.

• *Intestini recti resoluti curatio.* Cap. xxxvi.

Intestino recto resolutio omnino inuolūtariē stercora excernuntur. Aliquando uero etiam sistuntur. Itaque etiā auxilia eadē sint quae in uesica sunt relata, coxendicibus adhibita. Priuatim uero in his, nūc adstringētia & corroborantia, nūc pingua & leuia, per clysterem infundimus, & rursus mordacia ac lancinantia. Proinde cupressi ac rubi decoctum adstringit, maxime ubi immodicē egerit. Suillus autē & anserinus adeps, & oleū maluae maximē pinguefacit ac lenit, ubi stercora supprimuntur aut acria existunt. Muria uero & colocynthidis decoctū, itemque centaurij, artemisiae, conyzae ac thymi lancinant ac mordent. Egre gie facit & trifolij bitumē olentis decoctū. Quum autem frigiditatis sensus affuerit, cōmodum est silphiū, & gentiana, & bryoniae radix, in omnibus infusis sedis. Ego uero aliquando etiā acopon lassitudinē eximens ex euphorbio paratum dilutū, per clysterem cum foeni graeci decocto immisi, & bene successit.

*Cruris aut alterius cuiusdam membri resoluti curatio.* Cap. xxxvii.

Si crus aut manus, aut aliud membrum resolutum fuerit, communia auxilia in resolutione relata adhibeantur, & exercitia moderata unicuique parti congrua. Utendum est etiā in omni resolutione ungentis quae ad arthriticos referuntur. Cibi uero sint in omnibus faciles cōcocti, attenuatori, uentri commodi, nihil uiscosi, aut mali succi habentes. Vinum sit album, tenue, & non ualde uetus. In summa uitanda est corruptio, frigiditas, ardor, odium, lassitudo, coitus, uini multi potus. Ex epistola Archigenis ad Marsum, portio resolutis conueniens, de qua sic ait: Optimum est hoc pharmacum, & ad eiusmodi affectiones ualde a me probatum. Castorij, seminis rutae syluestris, opopanax, singulorum obolos ii. pyrethri, acori, singulorum obolum unum, piperis grana x. Cum aquae mulse cyathis ii. dimidium ex hoc primum dato: robusto uero totum. Indicat autem obolum habere si liquas tres.

*De conuulsionibus aut distentionibus.* Cap. xxxviii.

Quum statim a principio, aut non multo post principium morbi, fiunt conuulsiones, & permanserint, ex repletione originem ducunt. Quum autem multis sudoribus praegressis, aut uomitibus, aut uentris excretionibus, aut sanguinis eruptione, aut post uigilias, aut famē, aut motus multos & uehementes confatae fuerint, ad euacuationem consequuntur. Et ubi etiam in sanis contigerit aliquas partes repente conuelli, ob repletionem fieri necesse est. Si uero ex febribus ardentibus succedit conuulsio, ob uehementē nimirum totius corporis, & maxime neruofarū partium siccitatem contingit, & est huiusmodi malum maximum ac fere incurabile. Quum igitur corporis partes antrorsum distenduntur, emprosthotonus appellatur: quum retrorsum, opisthotonus, quum uero aequaliter in utranque partem tenduntur, tetanus uo-

catur, conuulsiones itaque ob uehementem siccitatem nemo curauerit. Eas autem quae ob plenitudinē aut inflammationem fiunt curaueris, plenitudinem quidem euacuando, inflammationem uero, proprijs ipsis auxilijs adhibitis. Fit etiam conuulsio in his qui uehementer ob uomitus lancinantur, & sedatur ubi quae molesta sunt per uomitū fuerint reiecta. Auxiliatur conuulsis succus centaurij tenuis potus, & fesele cum aceto mulso aut posca. Castorium autē non solū potum, sed etiam foris illicitum cōmodat. Atque haec exhibemus his qui ob plenitudinem conuellantur.

*De Tetano siue distentione & conuulsione.* Ex Archigene. Cap. xxxix.

Quid significet tetani nomen, iam antē dictū est. Corripuntur autem hac affectione cum ob alias causas, uelut dictum est, tum ex uulneribus, & in foeminis ex abortu. Verū tetani ex uulnere sientes non ita sanantur. Neque autem pueris, neque senibus conuulsio fit tetanica. Infantes enim magis infestat morbus comitialis. Quare negligendū non est, sed uena secanda, si distentio ex uulnere cōsequitur. Copia uero detrahenda est multa quidem, sed tamen nō usque ad animi deliquium. Et paulo post exhibeatur alica cū aqua mulsa. Sit autē modicum quod exhibetur. Et ex aqua & oleo tepido aegri illinantur, & in solio desideant infra umbilicū. Oportet autem & partes quae nō madescunt praerillire, & praesertim caput, & probe contegere ut ne impleatur. Ungenta autem & illitiones adhibeantur ex oleo sicyonio & gleucino, aut irino, aut oleo ueteri. Conueniunt & ungenta lassitudinē eximens moderatē calfacientia, uelut est quod foetidū appellatur, & quod ex sampsocho fit, & quod ex populo nigra, & similia. Quorum cōpositiones in Ser-mone de arthriticis referuntur. Si uero non a uulneribus, sed ex repletionē fiat tetanus, post uenae sectionem, ungentis magis lancinantibus utendum est, quae adarcen habet, & similibus. Deinde etiā cataplasmata locis affectis adhibeantur, quae laxare ac discutere possunt simulque lenire. Et haec maxime musculis circa collū & maxillas ac spinam adhibeantur. Horum autem materia sit foenum graecū, & semen lini, & farina ordacea ac loliacea. His addatur terebinthina resina, & galbanū, & mel ac oleum multū, in quo decocta sunt ruta, conyza, aut artemisia, aut libanotis. Infartiatu etiam aliquando ammoniacum thymiam. Sint autem mollissima ac leuia cataplasmata. Sed & fomentum adhibeatur incumbente cataplasmate, ex uesica magna & oleo calido semiplena. Aut ex sale frictū, aut ex milio in sacculis. Sed & cataplasmata in saccos cōiecta imponantur, ut fomentū citra inquinamentū fiat, & praesertim si capiti id imponere oportet. Vitandae autē sunt assiduae irrigationes capitis. Caput enim inde repletur. Occupet cataplasma & irrigatio, ceruicem & maxillas ac totā spinam usque ad lumbos. Inspergatur irrigationibus castorium. Et cucurbitae cū scarificatione locis affectis omnibus affigantur. Temporis autem successu etiam folia ex oleo assumantur moderate, bis aut ter in die, ita ut quinta olei pars ad ignē calefiat, reliquum in solium mittatur. Domus autem calida appareatur. In potu conueniunt optimū apomeli, & radices silphij decoctū, & ipsa trita, & hyssopi decoctū, & succi cyrenaeici magnitudo erui deuorata, & myrrha troglodytica magnitudine fabae. Ex omnibus autē minimē offendit, & maxi-



& maximè efficax est castorium tritum datum cochlearij mensura. Post hæc commodant sedis illitiones ex ruta & opopanace. Auxiliatur & olei infusum rutacei cum terebinthina. Danda est ipsis & Archigenis hiera drach. ii. pondere cum pari castorio, cum ptisanæ succo ac melle. Deinde quædam ex alijs dentur, & ipsum castorium per se.

*De capitis dolore distinctiones. Ex Galeno. Cap. xl.*

Qui citra distinctionem doloris capitis auxilia descripserunt, maius detrimentum quam emolumentum his qui eis fidem habuerunt, attulerunt. Neque enim omnes ob unam affectionem caput dolent. Sed tum ipsæ affectiones plures sunt, tum curatio ipsarum singularum propria existit. Vna enim affectio est iuxta intemperiem simplicem citra humorum complexum. Alia iuxta humorum qualitatem. Tertia uero multitudo tantum ipsorum humorum contingit. Quarta quum multitudo hæc transitus humorum ac uaporum obturarit. Et ad has adhuc alia, quum ob imbecillitatem in aliquibus capitis partibus spiritus flatuosus innascitur. Vehementissimi igitur capitis dolores fiunt iuxta caliditatem ac frigiditatem. Moderati uero iuxta siccitatem. Ad humiditates autem nullus consequitur dolor. Eodem modo quum ob redundantes humores, siue iuxta omnes capitis partes, siue iuxta unam quancunque tandem dolor contigerit, uehementior quidem ob calidos ac frigidus: moderatior autem ob resiccantes citra caliditatem aut frigiditatem manifestam oboritur. Humectantes autem penitus nullum dolorem inducunt, quantum ad qualitatem ipsorum attinet. Nam ob multitudinem, citra quidem obturationem, grauant caput. Cum obturatione uero dolores inducunt. Si uero multitudo mordacem qualitatem habuerit, dolorem augebit. At uero spiritus flatuosus & uaporosus distentionem efficit citra mordacitatem.

*De dolore capitis ex ardore aut caliditate oborto. Cap. xli.*

Capitis dolores ex ardore solis, aut caliditate obortos sanant quæ frigefaciendi uim habent, citra manifestam adstrictionem. Optima uero ex ipsis sunt quæ essentiam tenuiorem habent. Quapropter nihil melius est ab initio quam optimum rosaceum frigidissimum factum, & sincipiti affusum. Sit autem rosaceum eo anno factum ex oleo omphacino, citra salis ammixtionem. Proximum à rosaceo locum habet chamæmelinum, ubi moderatam frigiditatem inducere uolumus. Quum enim uehementer frigefacere uouerimus, semperuiui succum ammiscere conuenit, aut polygoni, aut lactuæ, aut uuæ acerbæ, aut portulacæ, aut pampinorum uitis, aut psyllij, aut intybi. Pappaueris autem & mandragoræ succus uehementer frigefacit. Quapropter nocius est. Cæterum Erasistratus maximum præseruatiuum in calidioribus habitibus esse dicit, ubi quis in sole uersaturus sit, si spogiam laram, densam, aqua imbutam, & probè expressam capiti imponat. At si dolorosa caliditas in capite inualecat, unam cum spiritu flatuoso, ab initio quidem curatione perrepulsoria utendum est, quæ ex adstringentibus ac frigefacientibus contingit. Postea uero ex mitigatorijs ac concoctorijs medicamentis aliquid ad repulsoria ammiscere oportet. Deinde etiam ex discussorijs quippiam addendum, paulatim detractis pharmacis quæ repellunt.

*De dolore capitis in febribus.*

*Cap. xlii.*

In capitis doloribus in febribus coincidentibus, uena secanda est in prima aut secunda remissione, si nihil impenderit, & præsertim in bono habitu præditis ac multo sanguine refertis. Animaduertendum est autem, ne ob exhalationes ex uentre fiât, aut propter aluum suppressam. Si uero posterius post septimam irruant, præuacuata memorabiliter per clysterem aluo, cucurbitæ occipitio aut ceruici affigantur. Et caput ex olei irrigationibus mitigetur, rosacei quidem, in calidioribus, & hora æstatis, cum modico aceto, chamæmelini uero in non ualde calidis. Anethini autem in frigidioribus habitibus, & in hyeme, quinta aceri parte addita. Frons uero illinenda est ex cypheos confectio in frigidioribus. Crocomagmate autem in calidioribus. Porro medelæ doloris capitis ex febrium magnitudine oborti, in febrium tractatione supra descriptæ sunt.

*Ad capitis dolorem ex ebrietate, & meri potu.*

*Cap. xliii.*

Vina temperie calida maximè generant capitis dolorem, ut quæ omnino quidam uaporibus caput replent, aliquando uero etiam humoribus calidis. Proinde opus est multitudinem quidem euacuare, caliditatem uero frigefacere. Rosaceum igitur aut tale quoddam non ualde frigidum satis est capiti adhibere. Somnum item ac quietem. Et ubi talia per totum diem fuerint adhibita, in uesperam lauare oportet, & boni succi cibis nutrire, non tamen calefacientibus. Qualis est ptisanæ aut alicæ succus, & panis ex aqua, & oua forbilia sine garo, & lactuæ feruifactæ. In potu omnino utendum est aqua. Post omnem uero cibum, parum dandum est de malo puniceo, aut piro, aut pomo, aut uua passa. Sequenti uero die lauatur, & boni succi cibo nutriatur. Et uinum tenue album modicum detur. Cæterum præsumpta ebrietatem arcent hæc. Amygdalæ amaræ quinque aut septem à ieiunio comestæ. Vinum absinthites aut myrteum præsumptum. Et ipsæ myrti bacce præsumptæ. Brassicæ cauliculi præcomesti. Ebrietatem autem extinguunt postea ingesta, centaurij tenuis decoctum, ceruinum cornu, uerbenacæ rectæ semen cum aqua.

*Perfrigerati capitis medelæ.*

*Cap. xliiii.*

In capite recens frigefacto, rutaceo oleo calido sinciput irrigare oportet. Si uehementiore caliditate opus habuerit, parum euphorbij oleo injiciatur, aut unguentum irinum illinatur, aut amaracinum, aut laurinum, aut serpillinum, aut nardinum. Frons quoque talibus inungatur, & narium ac aurium meatus illinantur.

*De capitis dolore à stomacho.*

*Cap. xlv.*

Quidam etiam si modicus in uentre, & maximè circa os ipsius, humor acris fuerit collectus, statim caput dolent, humoribus in uentre prauos uapores ad caput mittentibus, ut aliquibus ipsorum suffusis similia symptomata accendant ex exhalationibus, si non cibum ingesserint. Et propterea famem ferentes læduntur. Augescit enim ipsis huiusmodi humorum malignitas propter inedia. Oportet itaque sic uexatos sanare, ita ut nihil capiti adhibeamus, uerum quam citissimè molestos uetris humores euacuemus, aqua tepida exhibitam in potu, et immixtis penis uomitu proritato. deinde uero post modicum interstitium cibus boni succi et stomacho comodus detur, si fieri potest lotis post uomitum.



Sin minus, ante balneum. Atque hic tantus sit ut ne lædantur dum lauantur. A' cœna uero parum bibant, & sequenti die mane absinthio & eadem diæta utantur. Et de cætero quotidie circa horam tertiam aut quartam modicum panem accipiant cum oliuis albis, aut cū uua passa, aut aliquo huiuscemodi, per experientiam reperto, eò quod singulis optimum est. Aliud enim aliq̃ optimum est, iuxta naturę proprietatem. Interpositis autem horis duabus balneum petant. Pessima porro affectio est, ubi uiriosis humoribus in uentris tunicis absorptis, aut ineluibiler in-fartis, nausæ ac lancinationes inducuntur. Quibus optimum auxilium est aloë pharmacū, quod aloës quidē habet drachmas centū, reliquorum uero quæ recipit singulorum drach. vi. croci uero drach. iiii. aut minus, crocus enim caput percellit. Datur ipsis ex hoc pharmaco drach. i. cum aque cyathis duobus. Cauenda autem sunt in omnibus, & præsertim his, edulia natura capitis dolorem inducentia.

*Quæ ex natura capitis dolorem inducūt. Cap. XLVI.*  
Non solum in his qui caput per stomachi consensum dolent, sed etiam in omnibus capitis affectionibus, uitanda sunt quæ natura capitis dolorem inducunt. Sunt autem hæc: uiticis semen, absinthij succus, lactis potus, glandes quercinæ comestæ, oliuæ nigræ, me-mecyla, eruum. Hoc etiā articulos exoluit. Amplius autem lædunt myrrha, thus, hederæ corymbi. Mentem uero perturbant lentisci fructus, crocus, peucedanum, cyclaminos sicca cum uino pota, styrax modicus quidem potus, tristitiam discutit, multus autē turbulentos somnos facit.

*Ad dolorem capitis ob plagam. Cap. XLVII.*  
Si uulnus ob plagam factū fuerit, glutinatorijs & inflammationem arcentibus pharmacis utendum est, postquam ulceris labia fibulis impositis constrinxerimus. Si uero usq̃ ad pelliculam os caluæ ambiente plaga penetret, diducta pellicula caluariam ambiente, ossesq̃ conscalpro, iuxta concarnationis modum curare oportet. Contingit autem non parū sæpe, in casu præsertim ex sublimi facto, ut quædam partes circa cerebrum aut membranas eius abrūpantur, quando sanè etiam periculum uehementius & acutius imminet. Optimū itaq̃ fuerit in his, nisi ætas prohibeat, & nisi uitalis facultas debilis appareat, a uenę sectione curationis initium facere. Quod si aliquid uenę sectionem impediatur, aluum per clysterem euacuabimus, reuulsionis simul ac euacuationis gratia. Deinde auxilijs ad inflammationes commodis utemur. At uero membranam cerebri sauciata, inquit Archigenes, probè glutinat calaminthæ succus infusus, & farina milij arida inspersa. Deinde butyrum, & rosaceum, & adeps suillus infusus, uetus, simul mixta & tepēfacta infusa.

*De cephalæa. Galeni. Cap. XLVIII.*  
Cephalæa inueteratus & ægrè cedens capitis dolor appellatur, qui ex facili occasione maximas exacerbationes habet, adeo ut neq̃ strepitus, neq̃ uocem uehementiorē, neq̃ lumen splendidū, neq̃ uini potū, neq̃ odoramēta caput replēta tolerare possint, neq̃ item motū. Sed in quiete ac tenebris ob dolorū magnitudinē decubere uelint. nā uelut à malleo sibi pertundi uidentur: quidā uero uelut contundantur aut distendantur, & quæ circa caput sunt sentiunt. Non paucis autem usq̃ ad oculorū radices, dolor progreditur.

Habet autem hæc affectio aliquando continuos dolores, aliquando exacerbationes & interualla, siue ordinata, siue inordinata. Intermittunt enim aliquando eiusmodi exacerbationes, uelut in comitiali morbo correptis, interceditq̃ tēpus aliquod quod omnino accusari non potest. Manifestū igitur est hanc affectionem consimilē aptitudinē capitis, ut facile lædatur, uelut in cephalalgicis, habere. Verū ad maiorem debilitatem deueniūt in hac affectæ capitis partes. Et quidam ex eis cerebri membranas dolitāt. Quidam uero membranā tantum caluariā ambiētem. Dolores igitur cum grauitate, humorū multitudinem indicant, cum mordacitate uero aut humorū aut uaporum acredinem. Cum pulsu autē inflammationem. Cum tensione uero, si quidem citra grauitatē ac pulsum fiat, flatus tenuis & uentosi multitudinē demonstrant. Si uero cum pulsu, mēbranosi corporis inflammationē. Si uero cum grauitate distentio fiat, humorum multitudinē intra membranas cōtenam. Et dolores quidem in superficie hærentes, mēbranæ os caluæ ambientis affectionē significāt. Qui uero in profundo sunt cerebri, membranarū. Quibus enim affectio inter caluariā est, his dolores usq̃ ad oculorum radices procedunt, eò quod oculorū tunica ex cerebri membranis ortū habeant. Si quidē igitur humorum aut uaporū multitudinem reperiis causam, si quidē propter totius corporis repletionē facta est, uniuerso corpore euacuato capitis dolorem sanabis. Si uero uelut debile existēs caput, ad se sublato humores ac uapores susceperit, materiam reuellere oportet in totum corpus, atq̃ ita particulæ mederi. Per clysteres itaq̃ reuulsio fit, & ligaturis extremitatū, & pluribus infernarum partiū confriktionibus. Interdum etiam sanguinis detractio. Caput autem curabis, quādo quidem reuulsorij uti oportet, per repulsorias irrigationes. Post totius uero corporis euacuationem iam caput euacuabis ac discussorij uteris. Deinde his quæ corroborare possunt. Repellit igitur oleum omphacinū, & rosaceū per se, & cum aceto, & quod ex papaueris capitibus, & olei teneris germinibus, & hederæ cacuminibus, ac mēta uiridi apparatus. Adhibeantur autem remedia tepida quidē, ubi frigidior & crudior fuerit humorū multitudo. Frigida uero, ubi calidior & biliosior extiterit. Discutit autem oleū dulcissimū calidū, & hoc magis inueteratum, item sicyoniu. Si uero crassior fuerit humorum multitudo, spondylium aut serpillū, aut pullegij comam, aut calamintham, aut mentā oleo incoquens, multitudinem euacuabis. Eadē hæc etiā robur parti addūt. Quapropter usq̃ ad perfectam curationem eis uti conuenit. Omnium porro maximè discutit, & mirificè corroborat, uerbenaca recta, præsertim uiridis. Imò etiam arida cum radicibus, & simul cum serpillio, oleo incocta. Coniicienda etiam ad ea crocodiliadis maximæ circa aquas nascentis radix. Quin & ipsam per se uerbenacam, si oleo incoxeris, caputq̃ inde rigaueris, omni capitis dolori antiquo, ex frigidityte aut ex crassis humoribus oborto medeberis. Maximè etiā profunt sub aquario uasē nascentes aselli, millepede appellati, si cū oleo coquantur.

*De hemicrania. Ex Galeno. Cap. XLIX.*  
Affectio dolorosa iuxta dimidiam capitis partem contingit, quam hemicraniam appellant, & ut plurimum per circuitum exacerbatur. Fit autem propter influxum



influxum uaporum aut humorum, siue multorum, siue calidorum, siue frigidorum. Et aliquibus cōtingit ut extra caluariā doloris sensum perceptent. Quibusdam autem in capitis profunditatē penetrat. Alii qui uero temporū musculos uehementer dolent. Dilationes autē ex his quæ de cephalæ dicta sunt fiāt. Proinde purgare ipsos oportet, aut prius uenā secare, atque sic localibus auxilijs uti, ita ut quis tum per digitos suæ manus, tum per lintea, dimidiam frontis partem, & maximè circa temporū musculum, confricando excalfaciat, ante exacerbationis tempus hoc faciens. Post exacerbationē uero hemicranicis appellatis pharmacis utendum est, si quidē multa caliditas in doloribus percipiatur, his quæ refrigerans quispiam habent. non præsentē uero caliditate, his quæ multum calefaciunt. Vtriusque uero aliquid ex his quæ robur addunt misceatur, quod adstringentem habeat facultatem. Optimū porro est unguentū quod habet euphorbiū unc. i. ceræ quadrante, olei dulcissimi lib. i. Ex hoc dimidiam frontis partem unā cum temporū musculo illine. Cōmodissimum est ad frigidas affectiones, ut sæpe ex unico eius usu ante balneum, dolor cessarit. Sic autē affectis prodest etiam in aurē infusum oleum tepidū, modico euphorbio adiecto. Satis est enim si ad librā olei, drach. iiii. euphorbiū addatur. Cæterum naturalī quadam ratione aut potentia, euphorbiū ad hemicranicos facit sic adhibendum. Terito ipsum cū aceto, & si quidē dextrū tempus dolet, illinito sinistrū; si uero sinistrū dolet, illinito dextrū: & celerrimè sanat dolorē. Itē intestina terre terito, & dolēs tēpus illinito, mirificè faciūt. Similiter utere carne cochlearū. Vtere etiā paulò post describendis cōibus omnis doloris capitis auxilijs,

*Communis curatio cephalæ & hemicrania.*

*Ex Archigene & Galeno.*

*Cap. I.*

Inueterata & ægrè solubili cephalæ aut hemicrania existente, principium curationis à uenæ sectione, aut purgatione facere cōuenit, alio prius per clysterem euacuata. Manifestum est autem quod multo sanguine refertis uenam secare oportet. Viridis autem humoribus referti, purgandi sunt. Et deinde irrigationibus cōmodis utendum est. Et à naribus sanguis detrahendus. deinde pituitam per os ducentibus, & his quæ naribus induntur utendum. Postea raso capiti illinendum est id quod ex scammonia & peucedano ac aloë constat. Epithema uero conuenit ex amygdalis amaris, & thure ac myrrha. Emplastra uero ex agarico, & quod ex scilla constat, & nigrum ex cucumere syluestri, conueniūt pustulas locis inducentia, & quæ in profundo sunt ad superficiem transferentia. Non incongruum est etiam malagma ex baccis lauri. Nos autē utimur cataplasmate ex cantharidibus, & mirificè facit, dum per longū tempus ulcuscula ab hoc pharmaco scientia sanie manāt. Oportet autem munitam esse uesicam per lactis potum ac irrigationes, eò quod facilè ab unguentis ex cantharide lædatur. Perseuerante uero affectione, secundæ sunt arteriæ circa aures, & præsertim quæ in temporibus sunt. Quidā etiā ustione profunda usi sunt in cephalæ, qui hoc solum cauerūt ne quis musculus sub cauterium caderet. Adhibentur autem cauteria nucleiformia, ubi magis dolor heret. Et licet usque ad os urete quo squamæ discedant. Barbari uero luniformem diuisionem faciunt circa anteriore capitis partem, su-

pra frontem, à sinistra aure usque ad dexteram, pelliculam caluam ambiētem exoluentes, & capitis os deradentes, caput tamen munientes. Et nō potest temere assumpra esse uideri his qui mali difficilem tractionem nouerunt, propter quam neque talia auxilia maiora quàm opus est existunt. Veratrum autē non minus cauterijs prodest, imò etiam magis. Inducendi igitur sunt prius per uomitum à raphanis. Deinde dandum est ueratrum. Ego uero tum his, tum comitialibus, ueratri albi bulbum tritum & in puluere redactum exhibui drachmæ unius pondere, uelut in

Sermone de purgatorijs dictum est. Purgatur enim hinc efficaciter cum ualde multa excretionē. Deinde interpositis quibusdam diebus de surculis exhibeo drach. ii. Amplius enim hinc landnuntur quàm excernunt. Et rursus tertio similiter præbeo. Nam ad affectionem iam firmatam, & in ipsis ut ita dicā ossibus fixam, non est alius efficacior modus. Post hæc reparatis uiribus infra purgamus, per interualla quædam per nostram hieram, quò illuc repere cogamus materiam sursum uergentem. Vitare autem oportet frigiditatem, ardorem, lassitudinem tum reliqui corporis, tum ipsius capitis, per uisum, auditum, olfactū & gustum, & præcipue tactum. Viranda sunt etiam acriora edulia, uelut ceparum, alliorum, & similiū: Item ea quæ inflant, & quæ difficulter transeunt, uelut sunt casei, lac, fungi, tubera, bulbi, rapa. Eligantur autem uentri commoda & quæ facile concoquuntur, friabilia, non pinguis, non uirosa, stomacho grata, urinam cientia. Fugiendū est etiam mel & omnia dulcia. Vinum uero album & tenue sit, & non ualde uetus, neque ualde odorum, & copia moderatum. At uero stœchadem herbam coctam cum aqua, aut aqua mulsā, in omni capitis dolore, uelut solum & maximum remedium exhibeto. Aliud ad omnem capitis dolorem. Os cerui ustum & tritum cum rosaceo dolenti loco illinito. Aut ocymum tritum imposito. Aut mentam cum aceto tritam bis in die illinito. Aut rumicem syluestrem & gallas simul tritas temporibus ac fronti illinito, & euestigiò sanabis. Aliud. Stercus hirundinum antequam in terram cadat, unā cum luto quod in nido reperitur, aceto in ligneo uase madefacito ac illinito. Aliud. Pilulas caprini stercoreis tritas illinito ac alligato, atque hoc mane ac uesperis facito, & sanabis. Aut nasturtium torrefactum cum aceto & rosaceo terito, & cerati crassitudine imposito, & citissimè medeberis. Aut intestina terræ trita illine. Aut cochlearum carnis cinerem, stercus bubulum, thus, æqualibus portionibus cum aceto trita illine. Quidam uero ex nostris præceptoribus, inquit Galenus, hoc utebantur ad hemicranias, piperis drach. ii. crocomagmaris drachm. ii. euphorbiū recentis drachmæ dimidium. Si uero uetus fuerit, drachmā unam, stercoreis columbarum in agris degentium drachmæ dimidiū, atramenti scriptorii boni drachmæ dimidiū. Terito cum acerrimo aceto, & illinito tēporis musculū & dimidiū frontis, ac totā affectam partem. Crocomagmaris præparatio. Croci drach. centū, myrrhæ troglodyticæ drach. quinquaginta, rosarum siccarum drach. quinquaginta, amyli recentis drach. quinquaginta, gūmi drach. quinquaginta. Teruntur cum uino. Ad capitis dolorem temporibus illinitur. Miscetur etiā in præparationes aliorū pharmacorum. Aliud quod nō solum

hemicra



hemisphericis commodat, sed etiam omni inueterato capitis dolori, illitum. In dolore quidem capitis, a tempore ad tempus per totam frontem, in hemisphaerij uero dimidia parti affecta. Croci drach. xv. atramenti sutorij drach. x. aluminis drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. opij, omphacij sicci, chalcitidis crudæ, singulorum drach. iiii. gummi drach. xv. Cum uino falerno uelut collyrium terito, & pastillos formato. Et usus tempore cum posca, aut aceto meraco illine. Aliud. Scammoniae drach. vi. croci drach. ii. comæ hederæ drachm. vi. sulphuris uiui drach. iiii. anisi drach. viiii. feminis apij drach. viiii. diligenter terito & cum ocymi succo pastillos efformato. Hoc multo rosaceo dilutum irrigatio fit capitis lethargicis commoda. Verum in capitis dolore cum aceto adhibetur. Aliud pharmacum non solum in his commodum, sed etiam ad uertiginosos faciens. Radicis peucedani drach. iiii. iridis, myricæ drach. ii. æruginis, acori, singulorum drach. i. spondylii drach. iiii. piperis nigri drach. ii. & dimidiam, serpilli drachm. iiii. myrrhæ drach. ii. castorij drachm. ii. & dimidiam, baccas lauri x xv. rutæ uiridis drach. viiii. mentæ uiridis drach. iiii. opij drach. i. Vino excipe & forma pastillos. Vfus autem tempore, aceto & rosaceo dilutos illine. Sed & cerato rosaceo excepti fronti imponuntur, uelut malagma. Pastillus qui non solum hemisphericis prodest, sed etiam ischiadicis. Thapsiæ drach. iiii. euphorbij drach. iiii. succi medici drachm. iiii. myrrhæ drachm. i. opopanax drach. i. Contusa simul ac trita cum uino efforma, & utere cum aceto. Alius. Radicis peucedani drachm. iiii. croci drach. i. myrrhæ drach. iiii. opij drach. i. Cum aceto formato pastillos, & utere cum aceto in irritationibus. Euestigiò soluit dolores. Alius ad omnem capitis dolorem & hemisphericam, per multam experientiam cognitus. Succus absinthij, succus hederæ, stercoris caprini, cochlearum unâ cum testis exustarum, chartæ ustæ, baccarum lauri, bulborum, thuris, euphorbij, atramenti scriptorij, crocomagmaris, gallarum, foliorum raphani, uitellorum oui, succi maluæ, æquales portiones terito cū aceto, ac formato pastillos, ac utere cum aceto.

*Epithemata ad capitis dolorem.* Cap. LI.

Amygdalarum amararum, floris uiticis, radicis peucedani, mentæ uiridis, uirgultorum rutæ, baccarum lauri, serpilli, spondylii, castorij, singulorum unc. i. rosarum siccarum sextantem. Dissoluito cum aceto, & excipe cerato rosaceo. Deinde in linteum infarta, derasis capillis, toti capiti imposito, & per fasciam deligata usque in sequentem diem seruate, & rursus exoluito, ac renouata imposito. Aliud malagma, ad omnem capitis dolorem. Aeruginis drach. iiii. æris usti drach. iiii. squamæ ferri stomomatis appellati drach. ii. terræ cimoliæ drach. iiii. chalcitidis crudæ drach. iiii. pumicis crudi drach. iiii. terebinthinæ unc. i. ceræ septuncem, olei ueteris quincuncem. Aridis leuissime tritis liquabilia liquefacta affunde, & emollito ac utitor. Si uero durius esse uideatur, oleo amygdalino emolli, & utere uelut dictū est. Facit etiam fronti ac temporibus impositū. Facit quoque mirifice emplastrum nigrum Archigenis corio inductum, & dolenti tempori impositum. Euestigiò enim soluit dolores. Habetur autem inter auxilia ad orthopnoicos descripta Sermonis octauī capite

quingagesimo septimo.

*Quæ naribus indita caput purgant.* Cap. LIII.

Quod si necessitas postularit, etiā per nares caput purgare oportet, post totius corporis euacuationem, anagallidis succo naribus infuso, aut cyclamini. Aut ipsa cyclamini radice insufflata. Aut elaterio cum lacte infuso. Cæterum pharmaco parabili sæpe usus sum nigella pridie in acri aceto macerata, & deinde cum aceto trita, ac naribus infusa. Facit etiam ad narium obturationem. Aliud. Hederæ succus aut calaminthæ, per narifusorium instrumentum naribus infusus, multum mucum ducit. Aliud. Nucleum specilli in aquam tingito, & eo atramentum sutorij leuissime tritum excipito, & nares penitissime indito. Hoc multum purgat, & dolores euestigiò leuat. Aut atramentum sutorium lacte tritum infundito. Purgat maxime istericos. Aliud. Nigellæ tritæ drach. viiii. spumæ nitri drachm. i. salis ammoniaci drach. i. oleo ueteri aut irino, aut cyprino dilue, & tomentum specillo obuolutū medicamento immerge, & ex eo nares assidue illine. Et defluet quicquid caput infestat. Habeat autem pharmacum compagem cerati liquidioris, & seruetur in cornea pyxide. Aliquando pro spuma nitri elaterium adijcito, & facit ad diuturnas lippitudines, ac morbum comitiale. Ducit enim multam humiditatem. Aliud citra molestiam purgans, & confestim dolorem eximēs. Cyclamini siccae drach. viiii. iridis siccae drach. ii. nitri rubri drach. i. Ego uero elaterium pro nitro adieci, & probe trita per stipulam insufflaui, sursumque attrahere iussi, & postea deorsum inclinari, ut collectus humor deflueret. Sed et per sternutatoria caput concutere oportet, quæ describentur in Sermone hoc inferius ubi de narium affectionibus agemus.

*Apoplegmatismi pituitam per os à capite detrahentes.* Cap. LIIII.

Nitri semissem, staphidis syluestris quadrantem, anisi trientem, foliorum lauri uiridium sextantem, uuarum passarum uinaceis exemptis quantum satis his excipiendis. Ex hoc manducandum præbe pro una uice quadrantem, & commansa exspuere iube. Aliud quod commansum, caput purgat. Pyrethri, piperis, hyssopi, staphidis syluestris, singulorum æquales portiones uuarum passarum carne excipe, & manducanda præbe. Verum post horum usum, sale ac melle recurentur. Aliud caput purgans, quod neque caput dolere permittit, neque oculorum caliginem fieri. Prodest & auribus & dentibus. Et qui per tempus ipso utitur, in nullam ex his affectionibus incider. Est autem optimum. Sampsuchi sicci, iridis illyricæ, pyrethri, hyssopi, nitri, piperis, feminis apij, radicis panacis, staphidis syluestris, singulorum drach. iiii. Si uero uim eius intendere uoles, adijce etiam myrrhæ drach. iiii. Singula primum seorsim, deinde simul terito cum aqua, & formato pastillos, pauco melle ammixto. Vfus autem tempore, melle & aqua diluito, ac pro gargarismate utitor. Aut oleo cyprino aut irino, aut ueteri ammixto naribus infundito.

*Smegmata & puluilli inspersiles, caput densantes.* Cap. LIIII.

Smegma densans caput, nitri Bernicarij semissem, baccarum lauri, sinapis, sampsuchi, singulorum sextantem, cyperi undam i. fecis uini ustæ uncia i. Hoc smegmate



smegmate in balneo illito defricetur. Oculis autem linteam multiplex aut sponsia prætendatur. Aliud. Nitri assati lib. i. baccarum lauri lib. ii. staphidis syluestris, sinapis, singulorum lib. i. radice cucumeris syluestris semissem: Vtere uelut dictum est in inueteratis affectionibus. Smegma capitis, faciens ad destillationes & aquosam capitis affectionem, experimento constans. Nitri assati uino extincti semissem, iridis, aristolochiæ, helenij, singulorum unc. i. aceti mulsi quantum satis est. Contusa ac cribrata aceto mulso permisceto, & præaso sincipiti ante balneum illinito, & breui tempore finito, ac affricato. Smegma ad omnem capitis dolorem & oculorum fluxionem, experimento constans. Helenij, myrrhæ, calami aromatici, farinæ lupinorum, farinæ erui, sulphuris uiui, spumæ nitri, æquales portiones prisanæ succo excipe, & pastillos forma. Vsu uero postulante, prisanæ succo dilutis utere. Hoc smegma in balneo sincipiti, inspergere oportet, capillis antea inter se disparatis, ut corpori auxilium adhæreat. præcipe recte ut os claudatur, quo per nares calidum aerem uehementer attrahentes subiectam materiã citius transmittant. Sapo Constantini resiccans fluxiones. Balaustrorum sextantem, myrrhæ, sandarachæ, spicæ nardi, singulorum sextantem, costi, aloës, gallarum, thuris, malicorij, foliorum rosarum, sarcocollæ, singulorum quadrantem, saponis gallici lib. i. decocti lupinorum amarorum sextarium i. Arida contundito ac cribrato, & cum liquidis conterito, saponem adiecto, & pastillos formato ac utitor, ubi opus fuerit diluës quantum satis est cum uino, & illinēs ante balneum sincipiti præaso. Deinde paulo post affricans & abluens. Sapo Andreæ comitis ualde celebris: Floris iunci odorati, casie, cyperi, amomi, folij malabathri, costi, singulorum unc. i. gallarum sesquiunciam, nardi celdicæ, aluminis, iridis, fecis uini antiqui ustæ, gypsi usti, nitri, singulorum scrupul. xii. rosarum siccarum scrupul. viii. salis scrupul. viii. testarum purpurarum ustarum quadrantem, saponis gallici lib. i. lupinorum decocto trita accipe ac utere. Xeromyrō, hoc est ungentum siccum ad capitis fluxione laborantis curationem minimè uanum. Iridis helenij, floris iunci odorati, singulorum lib. i. rosarum siccarum quadrantem, amomi, costi folij, gallarum singulorum semissem. Vtere post balneum, præillito capite ex uino austero, & tunc insperge. Aliud optimū. Iridis quadrantem, gallarum unc. i. casie, costi, folij, spicæ nardi, balaustrorum, rosarum siccarum, carpobalsami, singulorum sextantem, myrrhæ drach. iiii. Cōtundito, ac cribrato, & præillito capite ex uino austero inspergito, maximè post balneum. Alius puluis insperilis Theodosij, caput resiccans. Gallarum, balaustrorum, singulorum trientem, cyperi sextantem, spicæ nardi, folij, corticis thuris, corticis pinus, nardi celdicæ, singulorum unc. i. iridis sesquiunciam. Cōtulis ac cribratis utere. Alius ualde bonus. Iridis quadrantem, gallarum, rosarum siccarum, singulorum sextantem, aluminis unc. i. Vtere uelut dictum in capite calidiore. Alius puluis ad caput humidum, a quo tum oculi, tum aliæ partes fluxione infestantur. Radice pæoniæ unciam i. aluminis scissi unc. i. baccarum lauri drach. iiii. cyperi sextantem, nardi celdicæ semissem, contusa cribrata insperge. Hoc ego sæpe experius sum. Puluis caput corroborans, facit & ad eos

qui oculos asidua fluxione laborantes habent. Florum mali punici satui unciam i. gallarum unciam i. cyperi, iridis, helenij, singulorum trientem, seminis rutæ syluestris, quod Harmala & Belasa uocant, sextantem, radice chamaeleonis nigri sextantem, carpobalsami unc. i. floris iunci odorati sextantem, aristolochiæ, rosarum siccarum, myrti siccae, nardi celdicæ, singulorum unciam i. xylobalsami sextantem, amomi, malicorij, staphidis syluestris singulorum unc. i. contulis cribratis utere. Aliud smegma resiccans omnigenas fluxiones, & præsertim acres, & subcrassas, multo experimento comprobatum. Milij quadrantem, ladani sextantem, floris iunci odorati sesquiunciam, seminis rosarum sicci sesquiunciam, aluminis liquidi sextantem, spicæ nardi unc. i. sinapis sextantem, iridis, acaciæ, piperis, staphidis syluestris, singulorum sextantem, costi, folij, pyrethri, singulorum unc. i. calami, musci quem sphagnum siue hypnon uocant, singulorum sesquiunciam, nitri rubri lib. ii. Nitrum urito & aceto mulso extinguito, & ad reliqua trita ammisceto, ac utitor ita ut sincipiti inspergas, & paulatim affrices.

De Alopecia. Cap. lvi. Quemadmodum plantæ aliquæ ob humoris inopiam resiccatae corrumpuntur: aliquæ uero ob humoris alieni ab ipsarum natura attractione. Eodem modo & capilli, aut propter humorum ex quibus nutrirî consueuerunt inopiam, aut propter eorundem uitiationem corrumpi solent. Et propter inopiam quidem humorum, caluities contingit: propter uitiatos uero humores alopecia & ophiasis: unum quidē ambæ secundum morbosam affectionem malum, nomina uero iuxta figuram habentes diuersa. Serpenti enim similis læsa capitis pars in ophiassi apparet. Alopecia autem sic appellata est, quoniã uulpibus frequenter accidit hæc affectio, uelut tradunt. Humorū igitur prauorum redundantiã causa est affectionis. Quales autem sint hi, ex colore cutis capitis cognoscas. Si enim albidior est, pituitam: Si nigrior, bilem atram: Si pallidior, bilem flauā significat. Et sanè redundantes uitiatos humores euacuare oportet, aut per pilulas ex aloë & colocynthide, aut per Galeni hieram ex colocynthide. Si quidem atræ bilis humor redundauerit, ueratro nigro ad ipsam ammixto: Si uero amara bilis, scammonia: Si pituita, ipsa per se ipsam detur. Post totius corporis purgationem, pituitam per os ducere melius est, atq; ita localibus auxilijs uti. Hæc autem discussoria uitari humoris esse oportet, & essentia tenuium partium. Si uero supra hoc quod discutit uitiosos humores, aptum fuerit pharmacum ad bonum sanguinem attrahendum, optimum sanè tale fuerit. Porro præaso capite locū linteo cōfricare oportet, ac cōsiderare. Si enim post modicam frictionem pars rubescit, affectionē sanatu facile putato. Si uero post multā frictionem rubescit, sanatu difficilem. Deinde Thapsiam recētem tritam, uiribus ipsius largæ aquæ ammixtione exolutis, illinere. Considerare autē oportet post thapsiæ illitionem, num ob uehementiam ultra quā conuenit cutem rubefecerit. Hoc manifestum erit, si flauior colore euaserit. Periculum est enim ne exuratur cutis, si nos sæpe ipsa utamur. Proinde aut ad aliud mollius transire oportet. Aut si ipsa uti uelimus, uim ipsius exoluere, per cerati aut adipis ammixtionem.

Animad



Animaduertas autem ne alopecia ulceretur, quod si fiat, anserino adipe aut alio quodam tenuium paruum illine. Adhibeantur autem hæc auxilia in aëre calido, citra auram frigidam in sole, hyeme uero in balneo. Ex reliquis porro pharmacis huiusmodi affectionibus conuenientibus calidissimum est euphorbium. Minus autem ipso calida est thapsia, post thapsiam uero sinapi, & nasturtium, iuxta aliū autem modum adarce: Deinde nitrum berenicarū, & sulphur, & spuma nitri, & utrunque ueratrum, & erucæ semen, & oleum laurinum, et alcyonium utrunque, uisum & non uisum, & pix, & cedria, & radices calami sepiarum, & cortex, ambo usta. Et murinum stercus, & anserinus adeps, & maxime ursinus. achyenæ. Et amygdalæ amaræ totæ ustæ, & uiperæ pellis ac caput uisum. Et fortibus quidem ex his ceratum liquidum ammisce: Imbecilliora uero oleo laurino aut pisce liquida excipe. Et diuturnas ac ægre curabiles affectiones, per fortia curato, incipientes uero & curatu faciles, per debilia. Critonis medicamenta ad alopecias. Pilorum ursi uistorum, radicum calami uistarum, adianti uisti, foliorum fici uistorum, panniculi Cilicij uisti, singulorum æquales partes adipe ursino & cedria excipe. Visus autem tempore, loco foto & per fici folia confrieto, ac per nitrum deteriso, pharmacum illine. Archigenis ad alopecias. Verbenacam rectam in sole cum aceto tritam, loco prius per nitrum præparato illine, & rarum linteum superimpone, hoc præmadefacto loco tollendum est. Aliud. Alcyonium elarius ad lucernam exurito, & opobalsamo non adulterato extinguito, & cum eodem tritum illinito. Adhæret enim in totum, & non discedit donec pili fuerint exorti. Aliud. Equinos dentes exure, ac utere cum aceto. Ad diuturnas autem alopecias egregie facit thapsiæ succus cerato exceptus, ac loco impositus, ut nihil aliud facere satagas. Decedit enim summa superficies, et sanies effluit, & pili sua sponte enascuntur. Aliud. Squamam ferri stomomatis diu cum aceto in sole tere, & modico oleo addito illine. Aliud, ad alopecias & pilorum defluuium ac uirilgines inueteratas. Buccina usta cum oleo ueteri terito, ad strigmentitiam crassitudinem, & præraso ac confrieto loco illine. Insigne hoc est. Aliud. Asclepiadis. Spumæ nitri partes ii. salis ammoniaci partē i. hæc usta & cum acerrimo aceto ad strigmentitiam crassitudinem trita, illine & affrica, donec pharmacum in profundum penetret, alopecia prius leuiter conscalpta ut locus pilis commodè densetur. & hoc bis per diem facimus. Aliud. Marrubium uiride tritum illine. Aliud. Perdicij herbæ uiridis folijs locū assidue confrica. Aliud. Spœritidis, hoc est cupressi folia trita cum aceto adhibe. Aliud. Herinaceorum marinarum testas ustas cum melle illine. Aliud. Herinacei terrestres pellem, aut caput uisum, adhibe cum melle. Aliud. Alcyonij drach. ii. sulphuris uiui drachmā i. muscarum tostorum ut resiccentur, cyathos ii. Muscas per se terito, alcyonium uero urito, & sulphur uisum & contusum ac cribratum cum aqua contere, & fel suillum & acetum paulatim siccis affunde donec strigmen tostum fiat. Deinde axungiam à rotis currum derafam, & in manu emolliam, ut emplastri forma fiat, ammiscero, & prærasis ac confriectis confidenter, uelut optimū, illine. Aliud. Herinacij terrestres ustinis pice liquida exceptus, alopecias remouet. A-

liud. Sorani, quo etiam Archigenes usus est, & id uel hementer laudat. Alopeciam præscalptam & confriectam, deinde in superficie scarificatam, ceparum aut raphanorum cortice trito intege, addito melle. Aut cum his confrica, & nasturtij semē, & muscerdas, & piper, & ueratrum album, æquis portionibus cum aceto illine. Est enim ualde insigne. Aliud Archigenis. Rhois culinarij drach. iiii. sinapis drach. ii. cum aceto illine. Aliud. Cantharides uistas, & tritas cum melle affrica. Aliud. Corij noui partem lanuginosam, in aëreo uase uisam, cum oleo antiquo, aut melle, aut aceto tere ac illine. Citò pilos producit. Aliud. Cyclamini radicem uiridem tritam illine. Aut sicca uisam adhibe. Aliud. Felis stercore cum sinapi accipere, addito aceto utere. Aliud. Allium uisum cum rosaceo illine. Aut betæ radicem eodē modo. Aliud. Ungulas asini uistas, asphodeli radicem uisam, alcyonium, nitrum, æquis portionibus oleo ueteri excipe, ac utere. Aliud. Herinaceorum marinarum cum testis exustorum drach. ii. muscerdæ drachmam i. aceto dilue, ac illine loco præfricto. Aliud. Alcyonij uisti, cornu ceruini uisti, cyperi uisti ex toto, æquis portionibus utere cum aceto. Aut abrotonum uisum cum oleo uetustissimo adhibe. Ad alopecias & caluiciem ac pilorum raritatem ægre curabilem, in capite, in mento, & in supercilijs. Pilorum ursi unciam i. radices calami quadrantem, filicis cum radice quadrantem, castanearum hispidi corticis quadrantem, lanarum succidarum pinguisimarum sexticem, capita muscarum x x x. muscas quinque sine capitibus. Omnia in nouam ollam cōiecta, in furnum ponito ut exurantur. Deinde cinerem terito. Habeas autem in uino Aminæo prius trita, ladani unciam i. folij malabathri unc. i. myrrhæ sextantem. Et adijciatur his olei ueteris sextans, olei cedrini unc. i. atque ita aridis inspersis excipe. Deinde ubi linteolo alopeciam perfricaueris, & leui scarificatione usus fueris, aut cepa, aut scilla, aut fici folijs exscalpseris, pharmacum ipsum illitum affrica. De cetero uero locum rigido ac aspero linteo confricato, & hoc modo illinendo usque duos menses progreditor. Quod si amplius in hac curatione perseveraris, etiam caluiciem perfanabis. Aliud. Oribasij. Muscerdarum unciam i. stercoris cameli exusti, ordeii uisti, singulorum pugillum unū, foliorum lauri uistorum manipulum unum, excipe sorde ab axibus derafa, hoc est, qui à rotis currum deraditur.

De defluuiio capillorum. Cap. lvi. Est & alia capillorum affectio, quæ ex raritate cutis, & penuria essentiae pilos generantis consequitur. Quapropter etiam curatio hoc modo læsorum, non eundem scopum cum alopecijs habet. In alopecijs enim scopus est, ut uitiatus humor consumatur. In his uero, ut habitus capitis corroboretur, & boni succi alatio procuretur, & cutis densitas ac raritas moderata reuocetur. Soler autem hæc circa pilos affectio plerumque his qui ægrotarunt accidere. Raro uero etiam citra morbum. Et plurimi ægrotantes citra pharmacum, per resicientē corpus uictum breui sanari sunt. Quare pharmaca in ipsis sint quæ moderate cutem densant, unā cum hoc ut non perfrigerent ipsam. Quæ enim ualde adstringunt, omnino etiam frigefaciunt, & alimentum affluxum repellunt. Vnde etiam amplius pili defluunt. Quapropter moderate adstringentia ammisce.



ammiscere oportet humectantibus pharmacis, quale est ladanum, & oleum lentiscinum, quæ ex natura sua adstringunt & moderate calefaciunt. Itaque neque expertus sum, neque mente concipere possum, aliud præstantius fore medicamentum ad defluos pilos, eo quod ex ladanum & lentiscino oleo paratur. Si uero non affuerit lentiscinum, crudo & immaturo oleo utendum est. Illud autem manifestum est, quod raso capiti pharmacum crassius adhibere oportet. Verum ad cutem detonso, liquidius. Quod si magnum fuerit pilorum defluum, & coniectes magnam cutis capitis raritatem factam esse, oleum myrteum pro lentiscino, ad ladanum ammisceris. Potes & unguentum nardinum ammiscere in ætate frigida & tempore hyemali. Commodum est etiam ad hæc pharmacum, unguentum illud diuitum foeminarum, spicatum appellatum, & quod Salca appellatur. Quare his uel solis diuites uti iubeto. Cleopatra porro inquit, ad defluos pilos utere hoc: Terram cimoliam solidissimam in uino austero macerato, addito mororum succo tanto quantum combibere potest, & semen hyoscyami tenuissimè sufficiente mensura adijcito, terito, ac pastillos formato, eosque in umbra siccatos in fictili nouo reponito. Vsu uero expetente, aqua dilutos affricari iubeto. Deinde resiccatos eluito, & per dies quinque rursus illinito. Vtere hoc in capitibus calidioribus. Facit etiam ad faciei ac colli impetigines. Aliud ad defluos pilos. Verbenacam rectam uiridem unà cum radicibus in oleum omphacinum coniectam per plures dies insolato, & oleo excolato utitor quotidie pro communi. Si uero non affuerit uiridis herba, siccam unà cum radicibus contusam ac cribratam oleo ammisceris, ut strigmentitiam spissitudinem accipiat, & ubi per aliquot dies siueris, utere. Et minimè uanum medicamentum comperies. Aliud ad pilos ex morbo defluentes. Chamæleonis nigri radices uino coctas crassius capiti illine. Aliud. Sambucum ustum, & cerato liquidissimo exceptum illine. Auget hoc pilos, & cutem densat, & defluere non permittit. Sed & narcissinum unguentum illitum pilos defluere non sinat. Aliud. Ladanum & rosas in uino ueteri terito ac illinito. Conseruat enim pilos, eosdemque nigros facit. Aliud conseruans pilos: idem etiam nigrefacit. Myrti baccarum nigrarum sextar. i. uirgultorum myrti sextar. i. seminis apij sextar. i. adianti sextarii dimidium, ladanum tantundem, uini nigri sextarios v. Coquito ad perfectam dissolutionem. Et ubi tertia pars restat, adijcito olei omphacini aut alicuius ungenti sextar. ii. ac rursus coquito. Postquam autem bis aut ter ebullierit, expressum ac excolatum humorem diligenter reponito. Vsu uero expetente, in præras omnino utitor, bis per diem illinens ex eo capillos. Cæterum in pueris pulchros ac densos pilos facit, nucis testa usta ac uino trita, & illita. Aliud. Lori arboris folia trita illinito.

Ad supercilia pilis denudata.

Cap. LVII.

Ut ne defluant pili neque à supercilijs, neque alia corporis parte, melanchum ustum & cum aqua tritum impone, ubi pilos emergere uolueris, præsertim uero in supercilijs. Aliud. Apes plurimas uistas ac oleo ammixtas illine animaduersione habita ne aliū locū contingas, ubi pilos nasci nō oportet. Aliud.

Adamantem lapidem cum aqua tritum illine: quod si albos producere uoles pilos, cum aceto eundem terito.

Tingentia ac nigrefacientia capillos. Cap. LVIII. Medicamenta quæ albos pilos tingunt ac nigrefaciunt, ex austeris ac acerbis composita magnopere lædunt. Non enim solum in superficie, sed etiam in profundo cutem alterant, usque ad locum radicum pilorum. Detrimentum uero foeminis utentibus illic accidit, aliquando ad morbum comitalem, aut syderationem, aut ueternum, aut soporem profundiorē: Aliquando uero etiam destillationibus ægre solubilibus corripuntur, ut tabes consequatur. Et scio multas foeminas mortuas esse, ex perfrigeratione à talibus pharmacis inducta. Magis autem læduntur quæ frigidius temperamentum habent. Cæterum quæ citra læsionem adstringentium pilos nigrefacere uolunt, cedria illinantur. Illinantur autem tribus uel quatuor horis ante balneum. Deinde lotæ confricentur. Oportet autem ipsam citra olei ammixtionem adhibere, in capitibus uehementi resiccatione ac calefactione indigentibus. In alijs uero oleum ammiscendum est. Nam unà cum hoc quod consumit humiditates, etiam pilos nigrefacit, & defluos corrigit, & non defluos habitiores efficit. Idem facit & pix liquida cum oleo adhibita. At uero Archigenes pilos nigrefacientia sic describit. Radicis capparis corticem cum lacte asinino ad tertias coquito, & trita in noctem imposito, pilis antea confectis. Aliud. Radicis ilicis corticem aqua coquito donec mollis euadat, & imposito. Aquam uero cocturæ affricato. Aliud. Quod intrinsecus in anemona nigrum est, cum oleo myrteo tritum illinito. Aliud. Corticis salicis succum cum oleo affrica, summe denigrat. Aliud. Lapis Alabandicus siue Alabandinus uocatus, colore subnigricans cum fuluedine ac pelluciditate, quo mulieres ad ornatum utuntur, tritus & cum uino nigro ac oleo omphacino affricatus, superficiem pilorum nigrefacit. Aliud. Malum punicum uiride immaturum accipe, & collum eius diligenter refra, quo id quod amputatum est, congruum operculum fiat. Deinde electis granis, & tenuibus membranis intus relictis, in uacuum mali calicem sesami illoti drach. iiii. in iace, & thuris tantundem, utrisque uicissim locatis donec impleatur, & tunc proprium operculum impone, & luto aut fermento triticeo obline, & in clibano torre. Postea uero lutum aut fermentum adime, ipsum uero malum punicum leuissimè tere, & in uitreo uase repone. Deinde præfricto ac resiccato capite modicum de pharmaco ad paucum oleum ammisceris, ac pilos illine. Et hoc quinquies repete, hoc etiam crispis ipsos facit. Quidam pro sesamo ac thure, nigellæ ac gallarum contusarum, singulorum drach. iiii. in mali punici calicem coniiciunt. Aliud quod pilos denigrat, ac crispos facit. Oportet autem per terram cimoliam pilos confricare, & tunc tingere. Præstat quoque caput prærasum esse, & crassiore medicamento illinere, uitata fronte & omnibus uicinis partibus. In multis celebre factum est, & est ualde necessarium. Sulphuris fullonici, atramenti sutorij, gallarum, calcis uiuæ, spumæ argenti, singulorum sextantem. ferruginis unc. i. Singula seorsim terito, & cum aqua ad ungenti formam reducito, ac



confidenter utitor nihil ueritus calcem. Non enim urit, eo quod uis ipsius à reliquis est oppressa. Hoc & ligna & cornua & lanas tingit. Aliud efficax experimento cognitum. Denigrat pilos ad miraculum usque. Foliorum fici nigræ, foliorum uitis nigræ, foliorum mori, singulorum lib. i. Omnia in aqua pluuiali per diem unum macera, deinde diligenter coque, & præfatis pilis impone. Aut si hoc nolueris, radicibus pilorum liquidius illine. Aliud quod pilos nigrefacit. Ladani, gallarum, amygdalarum amararum depurgatarum, fecis uini, foliorum adianti, singulorum sexuncem. uini è uinaceis expressi (quod loram uocant) sextar. iiii. Omnia in uas æreum stanno obductum conijce, & ad tertias coque. Deinde excola, & in alio uase paruq; ad mellis consistentiā coque, & ad hæc ungenti Mendesi, aut alterius huiusmodi, parem mensuram adde, & conquassata repone, & hoc quotidie utere. Sic autem plumbum potius quam stannum, id metallum quo æneum uas obducitur. Aliud quod à canis præseruat. Colocynthidem syluestrem perforato, & interna probe repurgato. Deinde ipsam oleo expleto, & integrum hyoscyami albi semen adijcito, & per diem unā finito. Et hoc per annum semel cōmode illinito. Aliud barbam nigrefaciens. Recrementum ferri & plumbum in aceto coquito, donec tertia pars restiterit, & illinito, atque ab oleo penitus abstinero.

*Vt fului pili fiant.*

*Cap. LIX.*

Fuluos pilos faciunt lupini crudi, & nitrū cum aqua illitum: loti arboris ramentorum decoctū. Ligustri folia trita cum herbæ lanariæ succo imposita. Fex uini ueteris usta, & cum oleo balanino trita, ut iustam spissitudinem habeat. Hoc ubi dormitum ire uoles, illine, & mane flauī erunt.

*Vt albi pili fiant.*

*Cap. LX.*

Hirundinis fimum cum felle taurino tritum illine, & albi euadent. Aliud. Verbasci albi florem urito, & aceto extinguito, & ad smegma ammixto utitor.

*Vt crispī pili fiant.*

*Cap. LXI.*

Spumam salis cum myrrha affricandam præbe. Aliud. Carpasi succum illine, & manebūt crispī ac nigri. Aliud. Asphodeli radices urito, & tritis cum uino utitor. Aliud. Semen lini uino maceratum modicè coquito ac excolato, & ad succum oui candidum ammisceto, & ex eo uesperī pilos cōfricato, ac caput obligato. Postera uero die in balneo abluito, & hoc sæpe facito. Verum in his qui caput habent quod facile perfrigeratur, in balneo illinito, & illa die non abluito. Aliud celebre. Nucem pineam integram uiridem bonam unam, iridis scrupu. xii. myrti unc. i. baccarum myrti unc. i. polytrichi sesquiunciam, ladani sextantem, gallarū unciam i. mastiches Aethiopice unciam i. pampinorū uitis sextantem, lacrymæ palmæ arboris scrup. xii. adipis ursini scrup. xii. seminis betæ scrup. xii. rhois coriarij scrup. vi. aluminis scissi scrup. vi. olei omphacini sextar. iiii. succi artemisiæ, succi serapiadis tritescularis, succi polytrichi, succi asphodeli, succi anagalidos, singulorum quadrantem. Misce ac utere.

*De his quæ pilos corrumpunt.*

*Cap. LXII.*

Eorum quæ pilos corrumpunt tres sunt differentiæ. Nam quædam proprie psilothra appellantur, quædam attenuatoria, quædam omnino ipsos extir-

pantia. Quæ igitur ipsos penitus extirpant, periculosi usus sunt. Aliquando enim non solum illitas partes corporis, de cætero penitus depiles reddunt, sed & usque ad caput & mentum, superciliæque ac palpebras, nuditas pilorum procedit. At uero attenuatoria & psilothra minimè periculosum usum habent.

*Quæ pilos extirpant.*

*Cap. LXIII.*

Pilos penitus extirpare dicitur thynni hepar putrefactum, ranarum in arundinetis degentium sanies, testudinis marinæ sanguis, uitis albæ lacryma, lacryma hederæ, itemq; bryoniæ, scolopendra marina, stellæ marinæ. His ammiscetur nitrū, amurca & cedria, & oleum quod insulsum appellatur. Item Alcyonia & sandaracha, & his similia. Aliud. Vriticæ syluestris semen cum oleo tritum fortiter affrica, & defluent pili. Tardius autem circa pubem puerorum pilos enasci facit, aliquando uero etiam eos qui sunt, extirpat, uitis lacryma cum oleo illita, & humor qui ex uiridi sarmento dum uritur exudat. Aliud. Succī tithymali characitæ cyathum i. uini & olei singulorum cyathum i. misce, & illine in balneo: Et ubi modicum sudaueris, & deinde per strigilem confricueris, reperies pilos in strigile. Qui uero post dies quadraginta exorietur, lanuginosi erunt. Aliud. Asellorum sub hydris stabulantium drachm. xii. sandarachæ drach. iiii. calcis uiuæ drach. viii. auripigmenti drach. viii. lixiuij ex ligni ficulnei cinere excolati heminas ii. aceti cochlear. ii. Omnia unita in olla coquito, donec experimentum tibi facienti, illita pilos tollunt: Et utere in balneo uelut dictū est. Aliud. Buglosi & semperuiui succum, æquis portionibus cū stercore hircino terito, & uistrea tabella excepta densari finito, ac utitor in balneo. Aliud. Bulbum hyacinthi purpureos flores habentis cum thure & amygdalis amaris terito, & oleo affuso unito, & in balneo ungito ex hoc: itemque citra balneū quotidie, & paulatim pili corrumpentur.

*Psilothra pilorum.*

*Cap. LXIII.*

Ex his quæ pilis denudant, & psilothra appellantur, utile est lixiuium, & auripigmentū, & sandaracha, & calx uiua. Manifestum est autem uehementiam ipsorum frangi, debiliorum & liquidorum ammixtione, prisanę inquam aut oryzæ succi. Crito itaq; tale psilothrum in libris de ornatu describit. Calcis uiuæ partes ii. auripigmenti partem i. Hæc in mortarium plumbeum coniecta, aqua calida aut prisanę succo affuso terito, & ubi nigra facta fuerint, in balneo illini iubeto. Hoc statim corpus glabrum facit, & pilis enascens tenuis emergit. Aliud. Oryzam, fabas, cicer, prisanam, simul in aqua coquito, & ad hoc decoctum primum calcem ammisceto sufficientem, & prout moris est, agitato: Et ubi dissoluta fuerit, auripigmenti unc. i. inspergito, unito, & myrrhæ tenuissimè tritæ unc. i. mastiches unc. i. pumicis torrefacti drach. iiii. opobalsami cochlearia ii. adijcito. Aliud. Sandaracham cum hyoscyami succo tritam illine. Aliud. Fructus fici syluestris sexuncem, & foliorū eius sexuncem, herinacium terrestrem integrum uiuum, succi aconiti, hoc est, iridis syluestris lib. i. ueratri nigri lib. i. fecis uini ustæ lib. i. caricarum pinguium nigrarum lib. i. auripigmenti auricolaris trientem, costi trientē, casia trientem, carpo



carpobalsami trilentē, olei sextar. i. Omnia contusa cum herinacio terrestri uiuo, in duplici uase cū aqua coquito: Sint autē aquae marinae lib. v. donec aqua fuerit cōsumpta. Et ab igne ablata per triduū finito, & ubi sedata fuerint, excolato, ac utere oleo in prima balnei domo antequām sudare incipiunt.

*Quae pilos attenuant.*

Cap. LXV.

His quae pilos attenuāt uti poterit medicus, in his qui duos ac magnos pilos habent. Sunt autem talia exterforiae & attenuatoriae facultatis. Quemadmodum autem in omnibus alijs medicamentis differentia secundum excessum & defectum est, ita etiam in exterforijs. Ordei itaq; farina & fabarum, & erui, spumaq; nitri ac nitrum, moderatiorem uim habēt. Quae uero his fortiora sunt, in his qui duos ac magnos pilos habēt cōueniunt. Quale est nitrum uisū, & nitri spuma & aphrolitū, & testae calinae. Item seplae testa usta ac non usta, & fictiliū ac clibani testae, & pumex ustus ac non ustus, & muricū ac purpurarum ac reliquorum ostreorum testae, alcymiaq; ac herbae lanariae radix. Veratrum item utrumque, & bryoniae radix ac dracunculi, aristolochiaq; ac panacis radix, & canchry ac huluscemodi. Quod si odorata haec facere uolueris, cyperū & melilotum, & rosas siccas, & iunci odorati florem & iridem, & melissophyllum ammiscabis. Diuitibus uero nardum celicam & indicam, amomum, folium malabathri, myrrham & costum. Attenuat etiam pilos cinis sarmentorum uitis, & ficulneus, & ex tithymalis, tritus & in balneo affricatus. Et ab exustis uinaeis cinis, & alumen scissum, & stercus caninum siccum. Aliud smegma illustrans cutem, & pilos lanuginosos faciens, ualde bonum. Mora crudissima cum terra cimolia ac nitro, æquis portionibus trita adseruato, ac utitor. Puluillus attenuans pilos in balneo, multo experimento constans. Punicis costis, testarum seplae ustarū, nitri, cimoliae æquis portionibus utere confidenter. Alius. Testarum purpurarum ustarū sextantem, alcyonij sextantem, nitri bessem, cimoliae bessem, punicis unc. i. omnia tosta terito, & utitor in balneo, ac miraberis. Alius, quo usi sumus in cubicularia. Calcis uiuae ex marmore factae lib. i. auripigmenti unc. i. staphidis syluestris, cimoliae testarum seplae, radices bryoniae siccae, aluminis scissi, singulorū drach. iiii. cerusae unc. i. sampsiuchi, aloës, ueratri nigri, singulorū scrup. vi. Contulis ac cribratis utere, inijciens ex eo in familiare psilotrum drach. iiii. & ouorum candida. iiii. Deinde psilothrū ablue, & rursus siccū affrica, & quotidie in balneo hoc utantur. Aliud smegma attenuatorium, & lanuginē produciens. Farinae fabarū, pumicis, similaginis, spumae nitri albæ, singulorum choenices atticas ii. foeniculi cum pisana cocti, & postea aceto mulso elori ac siccati, tuscū ac cribrati choenices ii. saponis gallici lib. ii. Saponē reliquis antea tritis ammiscē, ac manibus subige, & utere.

*De furfuribus siue porriginē.*

Cap. LXVI.

Quibusdam se scalpentibus, furfuribus similia saepe ex capitis cure decidunt. Contingit autem haec affectio a uitiolis serosis humoribus, quos consumere scopus est in eius curatione. Itaq; discussoria ac exterforia adhibenda sunt pharmaca, ubi per purgatorium medicamentum prius totum corpus euacuauerimus, si uitiatis humoribus fuerit refertū. Quidam

etiam aliqua adstringētia ad discussoria ammiscuerunt, quo per ipsa affecta pars corroboretur, ut ne facile in seipsam suscipiat influentes serosos humores, sed resistat, eosq; repellat, ueluti est sutoriū atramentum, & similia. Deterget itaque furfures in capite: Cimolia cum betae succo aut foenigræci, aut utrisq; simul ammixtis. Aliud. Fabam unā cum cortice molito, & cum betae succo utitor. Aliud. Furfurum dimidiam choenicem in aquae sextar. i. macerato, deinde diu manibus terito, & succum excolato, & ad ipsum aceti heminam dimidiam addito, & ad spissitudinem coquito, & sic affricato. Deinde betae, aut foenigræci, aut lupinorum decocto abluito. Aliud. Terrae cimoliae, sulphuris uiui, æquales portiones terito cū aceto, & affrica in balneo, & calida aqua ablue, & illine non solum in balneo, sed etiam citra balneum. Aliud. Spumae argenti, olei rutacei, aceti, pares portiones terito & illinito. Hoc multo experimento constat. Aliud. Cucumeris syluestris radicem coquito, & decocto utitor. Archigenes de medicamento ex bryonia dicit, praeter omnibus, inquit, hoc tibi paretur. Si igitur iuxta pondus praeparare uoles, sic facito. Cimoliae sexuncem, nitri quincūcem, farinae fabaceae quadrāter, corticis aridi radices cucumeris syluestris sextantem, bryoniae sextantem, farinae ordeaceae ac lupinorum, singulorum unc. i. Aliud. Cimoliae lib. ii. nitri bryoniae, corticis radices cucumeris syluestris sicci, farinae fabarum singulorum lib. i. farinae ordeaceae ac lupinorum, singulorum sextarij dimidium. Singula seorsim leuissimè terito, mensurato ac unitis utitor in balneo. Archigenes dicit, ad furfures farinam foeni græci, & nitrum, & cimoliam, cum betae succo affrica, & fel bubulum aut suillum addito aceto illine. Deinde post horā ablue, & atramento sutorio ac nitro cum modico oleo tritis illine. Aut cuminum, & myrobalanum, & fabaceam farinam, æquis portionibus cum aqua lixiuij terito, & affricato. Aut amygdalas amaras decorticas, cum aqua aut aceto tritas affrica. Postquam uero resiccatae fuerint pilli, calida aqua ablue. Aut malū syluestrem in aqua marina, donec decima pars super sit terito & affricato. Aut nitrum & pumicem, & fecem uini, pari portione cum aqua calida affrica. Aut spumam nitri, & atramentum sutorium, æquis partibus cum uino adhibe, ter aut quater in mense. Hoc adeo efficax est, ut nihil reliquum faciat. Aliud. Thus tritum cū aceto illine. Aut scorpiuri succum illine. Aut scillā assato, & ubi mollis facta fuerit, expressum succū oleo ammixto illine. Victus sit flatus exors, nihil ex crasso humore praeditis habens, uelut sunt tubera, fungi, bulbi, legumina, & carnes bubulae ac similes. Sin autem quae ingeruntur uentri cōmoda, concoctu facilia, & mel cibis addatur. Ad intinctus confert acetū cum sapa. Condimentū sit cuminum, apīū, foeniculum, aliorū parcus sit usus. Et maxime ab omnibus bellarijs abstinentum est. Vinum utile est tenue & albū. Iucunditatis tamen gratia etiam uinum dulce & uinū mulsum permittitur. Ex fructibus uua arefacta optima est, deinde ficus ante cibum. Postea malū punicum post omnem cibū. Et amygdalae uirides cōmodè sunt ante cibū. Et bonæ cōcoctionis potissima ratio habenda est. Deambulationes lenes plurimae



mane ac uesperī optimæ sunt. frigidæ lotio balneis præstat. Verum in calida se lauanti incommoda est multa in aëre conuersatio. Et capitis perfusio solijs melior est. Et post hæc large per frigidam refrigera. Dormire ad satietatem commodū est. Ab ira & indignatione, insolationeque ac uehementi frigore abstineant, itemque ab omnibus quæ caput replent.

*De morbo pediculari.*

*Cap. LXVII.*

Pediculorum generatio quibusdam acruatim in capite contingit, multis humoribus moderatè calidis in profundo cutis collectis, ubi etiā pediculos generari contingit, nō in superficie cutis, in qua furfures consistunt. Itaque pharmaca ipsorum necessariū est siccan- cia esse, & quæ magis ex profundo attrahere ac euacua- re possunt. Lupinos igitur in aqua coquito, & decoctum ipsorum affricare iubeto. Aut myricæ decocto, aut aqua marina, aut muria meraca cum aceto perfundito. Aut hederæ succū melle mixtum illinito. Aut perdicij succum dormitū eunti illinito. Aliud ad pediculos capitis, ac totius corporis. Ligustri florem cū uino tritum, capiti ac toti corpori affrica, ubi dormitū ire uolet. Aut staphidis syluestris partes II. sandarachæ & nitri, utriusque partē I. adhibe cū aceto. Aut rhoem culinariū cum oleo tritum illine. Aut alumine cū oleo trito utere. Aut ueratrū albū, & staphidē syluestrem, ac nitrū, æquis portionibus cum oleo trita, in balneo adhibe. Aut rumicis syluestris radice cū oleo in balneo utere. Aut modico pipere cū multo oleo utere. Aut oleū laurinū aut raphaninū illine. Si uero pili denudati sūt, staphide syluestri cū aceto & oleo utere. Aut alumine liquido cū oleo. Prodest itē ipsis potus allij drachmarū duarū, cū origani triti drachma una ex aqua mulla.

*De achoribus & reliquis pustulis capitis.*

*Cap. LXVIII.*

Vlculculum quod achor Græcis appellatur, in capitis cute consistit, tenuia foramina habēs, per quæ tenuis sanies effluit mediocriter uiscosa. Similis autē est ipsi alia affectio, quæ Corion, hoc est, fauus appellatur. Quæ quia foramina maiora habet, humores mellis similes cōtinentia, Meliceris uocatur, hoc est, fauus mellis. Proinde scopus in his est ut humores affectionē facientes euacuemus. Si uero adhuc influxerint, ut prius influxionē impediamus, euacuato pri- mum corpore per purgatoriū medicamentum, initio sumpto à uenæ sectione, si æger ferre potest. De- inde purgatorio utimur sero lactis præparato ex aqua mulla, ammixtis ad ipsum epithymij drach. III. Relata est autē seri præparatio Sermonis secundi ca- pite nonagesimo sexto. Si uero intempestius est la- ctis usus, colocynthidem perfectā accipe, & semen ejice, & in ipsam tomentū siue pulpam adhuc habentem, sapam aut uinū mullum infunde, & per diem ac noctem macerari sine, & postea calefactū exhibe. Deinde uero etiā caput purgandū est per ea quæ na- ribus induntur, & quæ per os pituitam extrahunt. Conueniunt autē ipsis secantia & discussoria medi- camenta, eò quod uiscosus est humor qui affectionē generat. At uero incipientes achoras, ubi totum cor- pus superfluitatibus caruerit, per adstringētia ac res- pellentia curabis. Talia autē sunt myrti, & pini cor- tex, & rubi folia imposita, plantago imposita, oleæ syluestris succus affricatus, salicis folia & flos im- posita, similiter polygonū. Quædam uero prohibēt ne

achores augeant, simul reprimētia quod influit, si- mulque cōcoquentia ac discutientia quod iam cōtine- tur, ut quæ mixtas uires habent, quibus sanè post principij uti oportet. Tale est oleū myrteum & ro- faceū & lentiscinum, rubi succus cū oleo, portulacæ succus cū oleo, ladanū cum uino illitum, ligustrū & lētes. Quædā uero antiquis & moderatis auxilian- tur, discutientia & extergētia citra sensibilem calidi- tatem, nō tamen aliquid iritans habentia. Quibus utendū est maximè ubi dolor aliquis cū achoribus affuerit. Sed & in his à debilioribus initij facere cō- uenit. Cimolia igitur ad hanc rem apta est, & Cretica ac Samia terra, pompholyx itē ac spodium, & spu- ma argenti & Cadmia tenera, & adiantū cum rosa- ceo illitū, & fœnigræci decoctū affricatum, & malua trita cū loliacea farina imposita. Aut melilotū cū fa- rina fœnigræci ex uino impositū. Item cicerū deco- ctum, & ipsum cicer coctū impositū, nuces rācidæ cōmansæ ac illitæ. quod si his nihil effeceris, siccū ex charta pharmacū illine cū aceto. Si uero acrius tibi uideatur, spumā argenti pari portione adde. Si uero nō affuerit siccū pharmacū ex charta, chartam ure, & cinerem eius aceto subige, ac utere in his qui durā carnem habent. Quædā porrò uehementē adeo uim habēt, ut ualde crassos ac uiscosos humores euacua- re possint, ipsosque dissoluere achoras, etiam si iam in scirrhum indurati fuerint. Talia sunt chalcitis, fex ui- ni usta, sandaracha, & calx. Acetū autem fortissimū est omni tempore ad achoras, & discutiens & repel- lens. Sit autē acerrimū. Discutit etiam optimè lilij ra- dix affricata, & thus cū aqua & nitro, & lupinorū a- marorū decoctū affricatum, & cucumeris syluestris radix cocta, & fici folia cum aceto trita, bulbi cū ni- tro affricati, rutæ folia imposita, farina fœnigræci cū nitro affricata, thus cū aceto illitum, malicoriū cum laurino oleo illitum, alliū cum cauliculo ustu, ac ci- nere cū oleo illito. Hoc ualde bonū est. Aliud. Mu- lier quædā nuces regias mandebat, & puero achor- ras habenti imponebat, & sanatus est. Aliud. Radi- ces anchusæ uistas, ac cū oleo ad strigmentū spissitu- dinē tritas, illine cū penna, & sanabis. Aliud. Thy- mū urito, & cinerem cū uino & oleo subactū illini- to. Aliud. Cnestrū quam in Alexandria liparona uocāt urito, & cinerem cū uino tritū illinito. Aliud. Buccinarum uistarū cinerem cū aqua adhibeto. Est hoc salutare pharmacū non solū ad achoras, sed etiā ad omnem papularū eruptionem. Quod si incideris in achoras inflāmatos & dolētes, dolorem prius li- quido medicamēto concoctorio mollienteque ac leni- mitigabis, quale est parhygrū, & omnia ad sedem parata, & quæ ad carcinomata descripta sunt. Farina itaque fabaceā uino madefactā ac tritam, ut empla- stri formā acquirat, imposito. Facit & ad seruētiōra & agrestia in capite pustularū genera. Aliud ad ma- ximos & inflāmatos dolores, leniens, dolorē exi- mens ac percurans. Collyriū quod aster appellatur, aut aliquod ex Libianis appellatis, aut consimile quoddā cū modico hyoscyami succo terito, & adie- cta sapa ac rosaceo illinito. Alia pinguis cōpositio, ad achoras, pustulas, papulas seruēdas, intertrigines. Est & ad sedem bona. Spumæ argēti drach. VII. fo- liorū rutæ tenerorū drach. x x v. Aceto dilue, & ro- faceo aut myrteo excepta pennis illine. Hoc magno experimēto nobis constat. Alia similis. Spumæ ar- genti



gēti drach. iiii. cerusæ drach. vi. sulphuris uiui drach. iiii. ceræ drach. iiii. rosacei aut myrtei quantū satis est, ut liquidi cerati spissitudinem accipiat. Liquida siccis affūde, & unitis utere. Hæc ad totius corporis pustulas cōmoda est. Alia ad humidos achoras. Ladani drach. viii. cerusæ tātundē, sulphuris uiui drach. viii. utere cū uino & myrteo oleo. Aliud pharmacum. Ladani, baccharū myrti nigrarū, spumæ argēti, sulphuris uiui, seminis hyoscyami, malicorij, æquas portiones terito, & uino ac myrteo, aut rosaceo oleo affuso utitor. Aliud ad feruidas, saniosas & impetiginosas papulas. Verbenacæ supinæ drach. viii. acaciæ drach. viii. myrrhæ drach. ii. uino austero tria illine. Aliud. Facit & ad eas quæ in mento sunt. Baccharū myrti, malicorij, atramenti sutorij, spumæ argēti, æquales partes tritas cū uino & oleo myrteo adhibe. Emplastrū ad achoras uetustissimos. Resinæ pinus siccae, ceræ, adipis suilli, aut bubuli, æquas portiones simul liquatas in aquā excolato, & diutius manibus emolliis utitor. Aliud. Quo usus est Aegyptius in Palladio Magistriano in Alexandria, ubi medicorū auxilia frustra tentasset. Colophonis semissem, ammoniaci thymiamatis sextatē, galbani scrup. iiii. opopanacis scrup. iiii. olei drach. iiii. mastiches, ceræ, singulorū unc. i. resinæ pinus lignosæ drach. iiii. æruginis scrup. iiii. Quod si magna affuerit acrimonia, æruginem ne adijcias. Hoc abscessus discutit, & iam ruptos euacuat ac sanat.

*Ad capitis scabriciem.*

*Cap. LXXIX.*

Rutam & alumen terito cum melle, & præralis pilis illine. Aliud. Sulphur uiuum & staphidem syluestrem terito, & picis sero ammixto illinito.

*Ad parua & densa ac rubicunda capitis ulcuscula.*

*Cap. LXXX.*

In paruis ac densis & rubicundis capitis ulcusculis, marmarū papillis similibus, à quibus etiā sanies effluit, caput radito, & semen lini tritū ac melle subactū imponito. Aut cōchylīū urito, & cū aqua tritū imponito. Aut emplastrum è lolio imponito. Et ubi euacuatī fuerint humores hoc sublato myrsinatū appellatū imponito. Cæterū ad rubicundas papulas in capite, cerusam cū laurino illine. Aut pini corticem cū cerato. Aut testam clibanī cū aceto aut uino. Aut betam coctā impone. Aut betæ succū ad ceratum rosaceum quantum eius admittit, adijce & impone.

*Resiccantia & cicatricem inducentia achoribus.*

*Cap. LXXXI.*

Spumæ argēti drach. xxi. calcis uiuæ tantundē, acetī unc. i. rosacei tātundem, utere. Aliud ualde bonum, quod humida ulcera resiccet, & cicatrice includit. Spumæ argēti, cerusæ, ordeī usti, æquales partes cum rosaceo aut myrteo illine. Emplastrum melinum, resiccans omnē fluxionem, & cicatricem inducens, præsertim in antiquis ulceribus. Spumæ argēti, cerusæ, salis fossilis, singulorū lib. i. aluminis scissi semissem, atramenti sutorij semissem, olei lib. ii. acetī sextar. i. oleum, spumam argēti, & salem, ac cerusam coquito, singula per se & simul leuissimè trita. Vbi uero nō amplius inquinauerint, alumē & atramentum aceto diluta, ad pharmacū ab igne ablatū & aliquo modo frigefactū paulatim adijcto, unito, & in mortarium diffundito, & probè molliato, utitor.

*Smegmata ad achoras, furfures, asperitates, ac scabriciem.*

*Cap. LXXXII.*

Quod si in declinatione fuerit affectio, & omnino ad cicatricem uergat, ad totam affectionē eradicandam huiusmodi smegmatis in balneo utendum est. Teræ Cimoliæ lib. ii. nitri rubri tantundem, myrobalani lib. i. myrrhæ, iridis, piperis, singulorum unc. i. nardi celticæ, costi, calisæ singulorū unc. i. contudit, cribrato, ac utitor in balneo.

*De aurium affectionibus.*

*Cap. LXXXIII.*

Aurium dolores fiunt, tū ob frigiditatem à uentis inductam, aut à frigidis aquis, aut ipsdē medicatis, in quibus homines se lauant: tū ob inflammationē cutis in meatu, aut nerui auditorij in profundo. Fit etiā dolor propter spiritū flatuosū, qui trāsire non habet.

*Ad dolores ex frigidityte.*

*Cap. LXXXIII.*

Dolores itaq; à sola frigiditate obortos, calefacientia quā celerrimè curant. Cepa igitur aut allium in oleo feruefactū frigiditates omnes sanat. Ego uero euphorbio modico ad multū oleū ammixto utor. Aut pipere exactissimè trito cū uino & oleo. Prodest & amaracinum, & optimum nardinum, & laurinum. Sed & ruta in oleo dulcissimo cocta magnifice facit.

*Ad dolores ex aqua medicata.*

*Cap. LXXXV.*

Quum medicata aqua circa auditoriū meatum cōtineatur, oleum assidue infundere conuenit, ita ut aurem eluamus, & per mollē lanam detergeamus, & deinde rursus infundamus. Magnopere uero ipsos mitigat oui candidum cū lacte muliebri tepidum infusum. Omnia enim quæ adhibentur, moderate calida sunt. Prodest ipsis & anserinus adeps. Sed & exuatio per os aquam attrahit. Aut per arundinem, uelut per aquæfusorium instrumentū (siphonē Græci dicunt) exuactione facta, ceparum succū cum anserino adipe instilla. Valde enim mitigat. Si uero quis uno pede auri affectæ proximo exiliat, inclinans quodammodo seipsum, aquam facillè excernit.

*Ad dolores aurium ob humorū crassitudinē.*

*Cap. LXXXVI.*

Si dolor auris cū capitis grauitate obortus fuerit, crassus & pituitosus humores causa doloris existunt. Dinotio autē ex prægressa diætā tibi continget. Nitrum igitur ac spumā nitri auricularibus pharmacis miscabis. Veratrū item album ac nigrum, & amygdalas amaras, & ex aristolochijs eā quæ ad manū est, & cucumeris syluestris ac bryoniæ radicē, & centaurij magni radicē, & parui comā, & iridem, & calsiā. Et in summa, omnia amara contra mordacitatem ac molestiam meatus purgant, & extergent, & crassos humores impactos secant.

*Ad aurium sordes.*

*Cap. LXXXVII.*

Ad aurium sordes ungentū nardinum tepidum instilla, & sequenti die per specillī cōcauum eas quæ expositæ magis sunt expurga, & rursus nardinū infunde. Si uero locus durus fuerit, aut etiā sordes duræ, nitrum torrefactū ac leuissimè tritum in aurem insperge, & acetum calidum instilla, & apposita lana pernoctare sine. Postera uero die, aqua & oleo calefactis elue.

*De sonitu aurium.*

*Cap. LXXXVIII.*

Sonitus in auribus plerunque ex flatuoso spiritu generantur. Fiunt etiam aliquando ob sensus auditus subtilitatem, ex euaporationibus. Dinotio cōtingit tibi primum ex temperatura & habitu hominis. Deinde etiam ex omni prægressa diætā. Sed & ex eo quod aut paulatim, aut acruatim fit sonitus, in-



uenire datur affectionem. Quin & ex eo quod hoc sonitus accidens aut per interualla redit, aut perpetuò permanet, affectio cognoscitur. Exacta uero diagnosis hæc à te fiat. Si enim quis putet à spiritu flatuoso exitum non habente, sonitum fieri, & secantia ac atrenuantia adhibeat, & nihil proficiat unà cum hoc quod etiam his quæ pituitam per os ducunt utatur. Tunc sanè ob auditus subtilitatem, sonitum fieri cōiectet. Ego uero in talibus ammisceo ex his quæ sensum stupefaciunt, uelut est mādragoræ succus, & opium paucissimū. Aut oleū in quo intestina terræ cocta sunt infundo. At uero ad sonitus ob flatuosū spiritū generatos, talia cōmoda sunt. Apolloniū ad sonitus ac bombos & sibilos derepente fientes. Acetum acerrimū calefactum instilla. Aut acetum cū rosaceo calefactū instilla. Si uero perseuerarint, cuminum, rutam, anethum & nigellā, cū aceto coquito, & rosaceo adiecto utitor. Aut colocynthidis medullam in oleo coquito, & oleū infundito. Si uero adhuc remanet ampliori tempore, omnibus amaris & acerbis, & attenuatorijs ac discussorijs utere, quæ paulò antea descripta sunt ad eos qui ob humorum crassitudinem aures dolēt, ita ut singula cū aceto coquas, & mel addas. Facit autē ad inueteratos sonitus, castorium & spica nardi, æquis portionibus cū aceto & rosaceo. Aliud ad sonitus diuturnos. Herbarum lanariæ, croci, castori, ueratri albi, æquales partes tere cum aceto, & informa pastillos, & utere cū uino. Cæterum ad sonitus ex morbo, fomento per absinthij decoctum adhibito, acetum cum rosaceo infunde, aut raphani succum cū rosaceo. Aut aloē optimam cum uino mulso. Si uero adhuc perseuerarint, ueratro nigro cum aceto cocto utere.

*Ad auditus difficultatem ac surditates. Cap. LXXIX.*

Qui difficulter audiūt, per hieram ex aloē, aut per cataportia ex colocynthide purgādi sunt, & pituita per os detrahenda est, & caput omni modo resiccandum ac corroborandum. Utendum est & attenuatoria diæta. In ipsam uero aurem immittenda sunt pharmaca quæ findunt ac secant, & attenuant uiscosos ac crassos humores. Quorum sylua iā antea relata est in his qui ob humorum crassitudinem aures dolēt. Fomenta ad grauē auditum, Apolloni. Ad audiendi difficultatem derepente obortā, & ex capitis dolore, absinthiū cum aqua in olla coctum per arundinē pro fomento adhibe, ita ut alterā arundinis partem cavitati auris adaptes, alterā uero foramini operculi ollæ inferas, quo uapor qui exhalat ad auditorium meatū allabatur. Aliud. Baccas lauri aut folia in aqua coquito, & similiter utere, aut origanū, aut hyssopū eodem modo, aut aquā marinam cum aceto similiter. Est & hoc optimum, urinam tauri, aut bouis, tertia aceti parte addita, pro fomento adhibeto. Itē myrtum cōtusum similiter coctū adhibeto. At uero circulū ex lana auri circumdare oportet, ut ne loci uicini amburantur. Elutiones porro his conueniunt, acetum acre albū, cum parī aquæ mensura, & nitro leuissimè trito calefactū infunde per multos dies. Et postea aqua calida elue, atq; sic subscripta infunde. Quæ auribus in auditus grauitate infundantur. Porri succū irino ungento ammixto infunde. Veratri nigri radicem cum aceto tritam, & melle exceptā, in aurē inde, & per dies quinq; sine. Capræ recens mactatæ cornu urina eiusdē exple, ea

maximè quæ in uesica ipsius reperitur, aut alia asseruata, & cornu in fumum ad dies nouē suspende, ac utere. Clauos caligarū ueterum numero centū, in uino Amīngo ad dies septē macerato, & donec septies ebulliāt coquito, excolato, & adseruato, & usus tempore quātum satis est calefactū infundito. Hocus ego surdū curauī. Aliud. Asphodeli radicē in oleo coctā adhibe. Hoc etiā inueteratā audiendi difficultatē sanat. Optimus est etiā cucumeris syluestris radicum aut foliorū succus cū aceto infusus. Aut capræ urinā & fel eiusdē simul calefacta infunde. Aut castoriū cum baccis lauri & aceto. Aut ueratrū nigrū cum aceto terito, & melle diutius cocto excipito, & collyria ad glādis figurā formato, & in meatū indita per triduū finito. Aliud. Nasturtij seminis quantū satis est, & nitri parū, ficus pinguis carne granulis exceptis excipe, & collyria meatui auris congrua efforma ac inde, & per triduū sine. Hoc sordes multas ducit, & statim alleuat. Aliquādo uero pro nasturtio sinapi conijcimus. Vtere hoc etiā ad aurium sordes. Multū quoq; opitulatur ad auditus grauitatem spōgia in tennes partes cōcisa, ac intorta & melle imbuta meatui indita. Idē cōmodum est ad enascentem in auditorio meatu superfluā carnē. Aliud. Omnis piscis fel infusum prodest, itē perdicis, & capræ. Aliud. Fel tauri cū anguis senecta tritissima aceto exceptum, & meatui inditū, grauem auditum soluit. Quidā cum rosaceo indunt. Aquæ uero fomentum adhibere oportet. Aliud. Saluiæ succū cū oleo omphacino in aurē instilla. Vtere, est ualde cōmodum. Aliud. Herinacei terrestris fel cum oleo infunde. Aliud. Veratri albi drach. iiii. castori drach. i. spumæ nitri drachmam i. infunde cum aceto, & utere uelut optimo. Vtere etiam pastillo ex amygdalis amaris cum aceto mulso. Descriptus est ad aures purulentas.

*Ad aurium inflammationes.*

*Cap. LXXX.*

Moderatas & non pulsantes inflammationes sanat rosaceū cum aceto tepesactū. Et glauciū in cote medica tritum cum uino dulci ac modico aceto. Si uero uehemētior fuerit inflammatio, dolores quidē mitigat, tene, ac candidū oui cum lacte muliebri tepidū infusum. Optimū uero ad ipsos pharmacū est nardinum ungentum, cū modico medicamēto Basilico appellato, aut cū adipe anserino, aut phasianino. Vbi uero magnus est dolor, necesse est stupefacientibus sensum uti, ita ut ad lac muliebre, & oui cādidum modicū opij ammisceamus. Ammiscendū est & castoriū, ad uehemētiores dolores parī mensura, ad leuiiores dupla proportione. Nos autē opiū & castoriū cū sapa probè conterimus, & tepesacta infundimus. Oportet autē omnino non cōtingere auditoriū meatum tempore doloris. Et fomentū adhibere per auriculariū specillū, lana mollissima circūdatum, ita ut lanā tepido Basilico medicamēto, cum nardino aut alio ex his quæ infunduntur tingamus, & ad principiū auditorij meatus indāmus, & pharmacū in profundū destillare sinamus. Et hoc assidue facere oportet. Postquam uero repletus est meatus, lanā supernè obdito. Quod si æstas fuerit, & multæ caliditatis sensus ægrū circa inflamatā aurē uexarit, fomentum per rosaceū bonū fiat. Mitigat porro feruētes inflammationes tepida cū rosaceo instillata, auriculæ muris succus, & polygoni, & portulacæ, & rametorū cucur



cucurbitæ succus. Itē aranei cū rosaceo cocti, & aselli sub hydris stabulantes similiter, & intestina terræ eodē modo. Et blattæ domesticæ interanea cū rosaceo. Et oleū amygdalinū ac hyoscyaminū. Medicamentū auriculare ē succis, ad inflāmatōnes quæ ægrè transmutantur: citò enim ipsas suppurat. Succū ramentorū cucurbitæ, succū calami, succū perdicij, succū brassicæ, singulorū cyathum unum, nitri tostī, myrrhæ, croci, singulorū drach. iiii. unguētī nardini unc. i. aluminis liquidī unc. i. aceti scillitici sextantē, mellis optimi lib. i. excipe & reponē in uitreo uase. Et usu postulante, cū nardino aut rosaceo diluto utere. Aliud, ad diuturnas & ægrè trāsmutabiles inflāmatōnes. Galbanī drach. vii. seuī taurinī drac. iiii. ceræ, colophonix, saponis, singulorū drach. iiii. picis drach. i. Colophonix, picem, seuī liquefacito, & galbanum cū cera præmollitum adijcito, & deinde etiā saponē, & excolatis utitor, ita ut in cote cum aqua aut oleo aliquo diluas. Ad maximos dolores. Aloē optimam uīno mulso dilutā instilla, aut lanas succidas aceto feruefacto, & instillato, insupérque ipsam lanam in aurem indito. Quod si mitius facere uelis, cum aceto aut sapa coquito.

*Ad aures absq; ulceratione humectas, quæ uelut exudāt, & serosum humorem excludūt. Cap. lxxxix.* Misij in linteolum illigatum & prunis obrutum, exurito, & unā cū exusto linteolo terito, & per arundinem insufflato. Aut gallas terito, & linteo illigatas exurito, ac similiter utitor. Aut alumen in testa exustū, & oleo præaffuso tritū insufflato. Porro postquā penitus sedata fuerit inflāmatio, castoriū cū oleo infūdatur, quo detrimētū ex afflictione soluat.

*Ad ulcera in meatu auris. Cap. lxxxix.* Recentia quidē ulcera glaucium curat solū cum aceto tritum, & omnia ex ipso collyria, & quæ ex croco, itemq; ex rosīs fiunt & appellationē habēt. Curat etiā eadem collyrium Damocratis ex myrrha. Quæ uero purē manāt citra dolorem, & moderate hoc patiūtur, per eadē curantur. Quæ uero fortiter purē manant, per pastillos. Qualis est Andronis & præsertim Musæ, cum sapa & modico aceto infusus. Quod si etiā hæc superentur, recrementū ferri cum acerrimo aceto, in caniculari æstu ad solē terito, & pastillos efformato, & utere cū aceto. Si uero nō est canicularis æstus, recrementū ferri leuissimē tritum cū aceto ad prunas coquito donec resiccet, & utere cū aceto. Auriū elotiones. Cæterum Apollonius ad auriū ulcerationes talia scribit. Vīno mulso calido frequenter ipsas elue. Aut myrū cū uīno coquito ac utitor. Si uero foetidū fuerit quod prodit, malicorium & lentē cum uīno coquito, & tepidū infundito. Post elotiones autē cōueniunt ad infundendū, fel bubulum, & maximē porcīnū, in malicorio tepēfactū instilla. Idem facit & caprinū fel, & omnis piscis fel rosaceo ammixto. Aliud optimū. Alumen scissum tritū, cum sapa & aceto in feruētī cinere coquito ad mellis spissitudinē, ac utitor. Facit etiam omne alumen cū polygōni succo, & Erasistrati Panchrestos appellata ab omnimoda utilitate, liquida. Habetur autem inter ocularia medicamēta. Aliud. Aluminis scissi, croci, gallarum, æquis portionibus utre cū uīno. Auricularis cōpositio ad dolores magnos, & pus albū. Amygdalas amaras decorticatas viii. spumę nitri albę drach. iiii. thuris drac. iiii. opij

drachmas tres, croci drach. iiii. galbanī drac. ii. myrrhæ drach. i. aceto trita excipe, & forma pastillos ac utere, si dolor adest, cū rosaceo. Si pure manāt, cū uīno mulso, aut aceto aut sapa. Si uero auditus grauitas affuerit, cum aceto ad diuturnas ulcerationes. Aloēs, thuris, myrrhæ, singulorū drach. iiii. misyos dra. ii. efforma cum aceto, & utere resolutis cū aceto aut rosaceo.

*Ad corruptiones ac factores aurium. Cap. lxxxiii.* Malicorij & lentis decocto elue uelut prædictū est, & utere subscriptis. Aluminis scissi libram unam, atramētī sutorij drach. viii. myrrhæ drach. viii. crocomagmatis drach. viii. uīni dulcis mytei sextar. iiii. Alumen cū uīno coquito, & ubi ad compagem redactū fuerit, reliqua prius trita cum aceto adijcito, & unitis utitor cū sapa & aceto. Aliud, ad purulentas & graueolētes aures. Vrsi fel instilla, si uero aridum fuerit, cum aceto & sapa diluto utere. Summē enim prodest. Aegyptium pharmacū ad omnes relatas affectiones, etiā si fuerint cōgenitę. Amygdalarū amaranū drach. ii. piperis albi drac. ii. fabarū Aegyptiarū internam partem drach. ii. pōdere, croci, myrrhæ, opij, thuris, castorij, singulorū drach. ii. omphacij drac. iiii. atramētī sutorij drach. iiii. spumę nitri drach. ii. Terito cum aceto in quo malicorium eoctum est, & excipe ad strigmētīdā spissitudinem. Vfus autem tempore quantum satis est de hoc pharmaco accipe, & nardino ungento dilutum instilla.

*Ad superexcrecentes in aurium ulceribus carnes, Heraclidæ Tarentini. Cap. lxxxiiii.* Aeruginis drach. viii. squamę æris drach. iiii. mellis heminæ dimidiū, hoc est dodrantē. Arida trita melle excipe, ac coque ut rubicūdum pharmacum euadat, & utere super eminentē locum hoc ponens. Aliud. Aeruginis drachmas quatuor, atramētī sutorij drach. iiii. succū marrubij cyathos tres, mellis quantum satis est, præpara & utere uelut dictū est. Aliud Apollonij Memphitæ deprimit omnē superexcrecentē carnem, citra dolorem. Aluminis scissi drach. iiii. misyos usti drac. iiii. aeruginis drach. ii. lemnij sigilli drac. ii. gummi drac. ii. (alij singulorū tot uncias pro drachmis habēt.) Terito cū aceto, & formato pastillos, ac utitor cum uīno aut aqua. Deprimit & cicatricē inducit. Facit & ad nares exulceratas.

*Ad uermes in auribus. Cap. lxxxv.* Vermes in auribus aut generatos, aut extrinsecus illapsos, amara & acria in summa occidunt, uelut sunt, capparī foliū aut succus, cedria, urina humana uet, singula cū melle: aut aristolochiā tritā insuffla: aut calaminthæ succū infunde. Aut ueratrū album cū uīno: aut colocynthidis decoctum, aut cēraurij, aut absinthij, aut polij cum uīno: aut scordij, aut marrubij succum, aut elateriū cum aceto. Facit & maluę horrensis aut syluestris succus: maximē in his quę sunt inflammatae.

*Ad sang uinis ex auribus eruptiones. Cap. lxxxvi.* Ad sanguinis ex auribus eruptiones, ut ne in grumos coeat, porri succum & acetum mixta infunde, & sanguinē sistet, & grumos dissoluet. Aut malū punicum in aceto coctum infunde. Aut gallum in aceto coquito & excolato, & rubi succum misce to ac infundito. Aut polygōni succum cum modico aceto, aut acaciā, aut amurcam, aut lycium cum aceto instillato.



De calculis aut alijs corpusculis in aurem illa-  
psis.

Cap. LXXXVII.

Si calculus, aut faba, aut consimile quid in meatū au-  
ris illapsus fuerit, elue. Aut specillum lana obuolu-  
tū refina tinge, & extrahe. Aut per glutinosum ali-  
quod pharmacū aut dropacem idem facito. Quod  
si nō successerit, sternutatorium naribus inde, & os  
obtura ac nares. Nam iuxta contingentem spiritus  
extensionem id quod incidit efflat. Hoc autē assī-  
due fiat, donec exciderit. Si uero intus manserit, au-  
ris inflāmata cōuulsiones inducit. Optime uero eo-  
rum quæ illapsa sunt eiectionē adiuuat concussio,  
ita ut si puer fuerit, pede teneatur, & cū concussione  
in caput eleuetur. Si uero perfectæ ætatis quispiā ita  
fuerit affectus, ipsum in tabulā secundum affectā au-  
rem reclinatū, caput ad tabulā firmare iubeto. Dein-  
de leuata tabulæ circa caput parte deferri sinito, idē  
sæpe repetito. Mouebitur enim quod incidit, & ad  
expeditiores meatus partes progredietur, atque ita  
angusta & cōcaua specilli parte immissa scite extra-  
hito. Si uero faba aut cōsimile quid in aurē illapsū,  
in ea maneat, madefactūq; ac tumefactū dolores in-  
ducat, impossibile est ipsum integrū eximere. Qua-  
re per specilli concauū industriē partiiri ac diuidere  
ipsum oportet, atq; sic particulatim extrahere. De-  
inde sapam aut uinum dulce calidum infundere ac  
lenire meatum ex laniatione offensum.

Ad affectiones aurium extra meatū. Cap. LXXXVIII.

Foramina in pulpīs aurium in pueris inflāmata, oleo  
quod in ærea lucerna æruginē contraxit, assidue il-  
line, & sanabis. Ad cōtusas autē aures, myrrhā, man-  
nam thuris, terrā nigram, qua quidam pro smegma-  
te utuntur, cū aceto ad cerati spissitudinē unita impo-  
nito, & nequaquā amplius irritato. Aliud. Sulphur  
uiuū, myrrham, thus, cū pice liquida in splenio im-  
ponito. Philagri ad contusas aures. Mannam thuris  
aut ipsum thus, & aloēm, cū uino & rosaceo terito  
& imponito. his etiam cochleas paruas integras tri-  
tas, si haberi possunt, addito. Aliud. Intestina terræ  
cū modica terra ex qua accepta sunt, tere & impo-  
ne. In quibus uero fractæ sunt aures, intrinsecā ex-  
peditiorem cōcauitatē cartilagineam figulina terra  
expleto, & resiccati sinito, ac solanū cum cerusa illi-  
nito, donec in integrū restituantur. Si uero inflāma-  
tio ad contusionē accesserit, meatui quidem butyrū,  
tepidum, aut adipem anserinum, aut gallinaceū in-  
stilla. Aut etiam ocymī succum cū aliquo ex relatis  
adipe. Forinsecus uero cerusam cum solani, aut po-  
lygoni, aut coriandri succo illine. Aut putamen ma-  
li punici dulcis in uino coctum ac tritum obline.  
Aut glaucio utere. Emplastrum autem hoc adhibe-  
to. Sandycis lib. i. olei lib. i. aquæ semissem. Coqui-  
to simul, donec non amplius inquinent, & utere.

De parotidibus.

Cap. LXXXIX.

Parotides ex genere sunt inflāmationum. Fiūt autem  
glandulis circa aures affectis. Non tamen utimur in  
ipsis, uelut in alijs partibus inflāmatis, in principio  
repellētibus. Imō uice uersa attractorijs utimur, as-  
surgentem humorē ex profundo ad cutem attrahere  
conātes, & naturæ opem ferre, quæ per humorū ex-  
loco in locum, impetuolum illapsum, febres curat.  
At uero quum uehementi impetu fluxus illabitur,  
nihil nos curiosius agentes, omnia naturę permittī-  
mus. Si enim aut cucurbitā, aut pharmacū quoddā

humores ex profundo ad cutem attrahēs adhibue-  
rimus, uehemens dolor hominē occupat, ut ex ipso  
& uigiliæ succedant, & febres intenduntur, ac uires  
exoluantur. Mitigare igitur tunc potius cōuenit, &  
non humorū influxui opitulari, per cataplasmatum  
maximē leniētium usum, quæ ad hoc quod mode-  
ratē humectā habent caliditatem, per quam mitiga-  
re dolores ualent, etiā influentes humores cōcoque-  
re possunt ac suppurare. Vbi uero suppurati fuerint,  
discutere ipsos aggrediemur. Si uero duricia cū do-  
lore apparuerit, emollientia ad attractoria miscebi-  
mus. Proinde ubi uehemēs dolor obtinet, & humo-  
res adhuc influunt, butyro utemur locū assidue illi-  
nentes, aut adipe suillo, aut butyrū & adipem simul  
liquefaciemus, & modica cera adiecta, ut mollius  
ceratū fiat imponemus. At uero moderatas paroti-  
das, in quibus neque multa copia influat, neq; dolor  
uehemēs adest, neque suppuratio expectatur, facile  
curabimus per fomenta ex muria, & cataplasmata  
ac pharmaca discussoria. Quale est Mnasæa empla-  
strum, & emplastrū ex succis, & his adhuc magis ea  
quæ molliora sunt & ceratiformia, ex butyro &  
œsypo parata, quæ assumunt ostrea usta, aut bucci-  
na, aut purpuras. Quale est & hoc. Adipis anserini  
ueteris insulsi sexuncem, butyrī uncia unā, ceræ sex-  
tantem, ostreorū ustorum tritorū sextantem. Ligua-  
bilibus liquatis ostrea insperge, & unitis utere con-  
fidenter. est enim efficacissimū hoc. Aliud ualde bo-  
num. Apochymatis sexuncē, picis bessem, ceræ qua-  
drantem, colophonitæ sextantē, adipis uisulini sesqui-  
unciam, bituminis sextantē. Reliqua liquato ac excola-  
to. Bitumen uero cū modico aceto terito, & liquata  
ad ipsum affūdito, & emollitis utitor. Quin & in in-  
duratis iā ac diuturnis parotidibus, buccina usta &  
omnia ostrea adipi ueteri porcino liquato ammi-  
xta, uelut dictū est, citra omnē molestiā discutiūt o-  
mnes diuturnas ac induratas inflāmationes. Quapro-  
pter utēdū est in duriorib; parotidibus albo empla-  
stro ex buccinis, quod Ariobarzaniū appellatur, &  
eo qd' Dionysia appellatur, & ex misy paratur. De-  
scribētur ea in sermōe de emplastris. Ego uero soleo  
parotidas puerorū & mulierū solo butyro curare.

De narium affectionibus.

Cap. xc.

Ex genere tumorum præter naturā polypi in naribus  
generantur. E' genere uero ulcerū ozænæ. De excre-  
tionibus autē præter naturā sunt sanguinis eruptiones.  
Ozænæ itaq; ex acrium & putredinosorū hu-  
morum influxu fiunt. Nam si solū acres fuerint, in-  
curabilia ulcera facere solent, non tamen graueolen-  
tia. At polypus appellatus, polypi marini carni iu-  
xtā essentiae proprietate, & colore & compage simi-  
lis, ex crasis & uiscosis humoribus generatur. Cæ-  
rerū curatio utriusq; cōmunis est, ozænæ & polypo,  
ut primū caput resicetur ac corroboretur. Manife-  
stum est enim quod uisiosorū humorū redundantia  
naribus ex capite influat. Quomodo uero caput ro-  
borare oportet, iam dictū est, ubi de capitis dolore  
egimus, ubi diuersa smegmata & epithemata descri-  
psimus, quæ sincipiti ac toto capiti præraso imponū-  
tur. Verū ad iā præscripta optimē ad ipsos facit em-  
plastrū ex anemona capiti impositū. Itēq; hoc. Myr-  
rhæ unc. i. thuris unc. i. cochleas integras v. ouorū cā-  
dida ii. Omnia in mortario cōtusa ac mixta illinito,  
lintheo capiti superimposito, & sinito per dies ix.

Atq;



Atque ita postea localibus auxilijs utere.

*Ozenarum curatio.*

Cap. xci.

Postquam itaq; per prædicta caput corroboratum præparaueris, ad nasi curationē procedes, scopum propositū habēs in ozænis, ut affectam partem per pharmaca mixtam uim habentia resicces, repellentia uidelicet ac discussoria. Repellū igitur austera & acerba, quæ in communi adstringentia appellantur. Discutunt autē siccam & calidā uim habentia. Archigenes autem ad dolores in naribus & ozænas talia describit. Calamīnthæ succū infunde. Aut ipsam siccam tritā insuffla per arundinē. Aut erucę succum assidue infunde. Aut mel in nasum stillato, & per sternutatoriū concussione facta, tectoria ulceri obducta excutito. Deinde ueratrū album cū multo nasturtij semine naribus attrahere iubeto, & postea amurcam cū melle illinito. Aut ranunculi succum cū alumine liquido in nasum instillato, & attrahere iubeto, atq; hoc facito donec persanaueris. Si uero antiqua fuerit affectio, etiā acetum acerrimū ammisce-to. Meatus autem nasi ex hoc illinito. Spicam nardi & misy, æquis portionibus trita cū uino austero ad strigmenticiam spissitudinē illine, & lana obtura. Optime uero facit ad ozænas atramentū sutoriū melle cocto exceptū, & chalcitidis eodē modo, & ærugo, & squama æris, & floridum medicamentū ori destinatum. Et hoc, chalcitidis crudæ drach. xii. cadmiæ drach. viii. terito cū aceto ad multos dies sub caniculæ feruore, & exiccato, utere cū uino ipsum diluēs, aut siccum insufflans. Aliud, Mysios, chalcitidis, myrrhæ, singulorū drach. iiii. atramenti sutoriū drach. iiii. aluminis scissi, gallarum, squamæ æris, singulorū drach. iiii. aluminis rotundi drach. ii. thuris drach. i. aceti lib. i. Omnia trita simul coquito in æneo uase, & ubi ad mellis cōpagem redacta fuerint ablatis utere, linamēto intincto & naribus penitissime indito. Siccus puluillus ad ozænas. Fructus ericæ, myrrhæ, nitri, malicorij, singulorum drach. iiii. croci, costi, singulorū drach. ii. trita insuffla. Alius. Aluminis scissi, myrrhæ, singulorū drach. iiii. sandarachæ, rhois culinarij, salis ammoniaci, croci, costi, singulorum drach. ii. trita insuffla, naribus prius uino mulso collutis. Aliud Theodori ad graueolentiā nariū. Amomi, myrrhæ, casie, rosarum siccarū, æquales partes tritas cū ungento nardino dilue ac utere. Aliud, Myrrhæ, casie, rosarū, singulorum æquales portiones contusas ac cribratas melle excipe, & mane ac uesperis illine, donec malum cesset. Aliud. Hedichroo cū uino mulso trito utere. Aliud, lucundū appellatū. Myrrhæ drach. iiii. casie drach. iiii. floris iunci odorati drach. iiii. rosarum siccarū drach. i. terito cum uino mulso ueteri, reponito ac utitor illinens ex eo nares. Aliud. Cyperi quadrantē, sandarachæ, aluminis scissi, myrrhæ, croci, singulorū unc. i. aridum insuffla. Aliud. Apollonij ad polypos. Veratrū & origanum trita insuffla. Aliud. Veratrum nigrū & sandaracham, æquis portionibus cum oleo terito, & lana excepta naribus indito. Aliud. Atramentum sutoriū, æruginem, laser, æquis portionibus, cū oleo illine naribus per specillū lana obuolutū, ad dies nouē. Deinde uolsella trahe ac exime. Aliud ad ozænas quo assidue utor. Ad pastillum Musæ adijce chalcitidis drach. vi. aliquādo etiā xii. & ueratri albi drachmas

ii. Vtereq; cū uino mulso. Aliud. Auripigmētū tritū per specillū large admoue. Vbi uero intumuerit & eminuerit, ueratro nigro arido trito moderato utere, & in septem diebus ut plurimū nasus uacuus redditur. Deinde diphryge trito cū melle expurga. Aut auripigmētum, calcē, & ueratrū albū trita cum melle adhibe. Aliud celebre. Myrrhæ drach. iiii. chalcitidis drach. iiii. casie drach. iiii. spicæ nardi drach. ii. mysios drach. ii. ueratri albi drach. i. Vtere sicco, & cū uino mulso. Aliud bonum. Mysios torrefacti drach. viii. iridis drach. iiii. croci drach. i. excipe melle ac illine. Aliud. Aluminis scissi unc. i. myrrhæ unc. i. thuris sesquiunciā, muscī herbę quæ & dorcadias appellatur drach. iiii. æruginis drach. ii. salis ammoniaci scrup. iiii. terebinthinæ unc. i. mellis trientē, aceti quantū satis est. Aliud, facit & ad polypos. Aeris usti, squamæ ferri stomomatis, aluminis scissi, singul. unc. i. myrrhæ unc. i. thuris sesquiunciam, aristolochiæ, uerbenacæ rectæ, squamæ æris, æruginis, singulorum unc. i. aut omnium æquas portiones, adhibe aliquādo uino diluta, & per linamentū inde. Aliquando uero cum compositione ex moris, aliquādo cū melle. Aliquādo etiam siccū insuffla, aquā in ore continere iubens. Aliud cuius uilitatē ne cōtempseris. Centaurij tenuis usti, polij usti, chamæmeli usti, singulorū drach. viii. æruginis, squamæ æris ustæ, radicis cyclamini siccae, myrrhæ, aloës, malicorij, singulorū drach. iiii. tritis utere prout uoles. Aliud, ad ozænas, & erosiones, & nomas, & crassitudinē, & omnia nariū uicia: Succū foliorū uitis albæ quadrantē, mannæ thuris, atramētū sutoriū, chalcitidis, aristolochiæ, singulorū drach. iiii. terito & siccato ac insufflato. Pastillus ad ozænas Cyri Archiatri Edeffæ. Cadmiæ ter ustæ ac uino extinctæ, plumbaginis, plumbi usti, spumæ argenti, spicæ nardi, thuris, foliorū cupressi, herbæ sabinae, gallarum, Lycij indici, gummi, singulorum drach. iiii. cerusæ, glaucij, folij, balaustiorum, floris iunci odorati, malicorij, aloës, acaciæ, singulorum scrup. viii. florum rosarū & foliorum singulorum scrup. vi. cōtusa & cribrata terito cum aceto, & formato pastillos, ac utere cum uino, aut sapa.

*Polyporum curatio.*

Cap. xcii.

Iam antea dictū est quod ex crassis ac uiscosis humoribus polypus generatur, & propterea mixta materia opus habet, adstringēte & secante, & discutiente, ac siccante. Quorum sylua talis est. Aluminis scissi, myrrhæ, sandarachæ, singulorū drach. iiii. atramētū sutoriū usti drach. i. gallarum drach. i. tritis utere, ubi prius nares uino odorato elueris, ita ut postea per specilli nucleū illinas. Vtere etiā his quæ ad ozænas præscripta sunt. Aliud. Soreos drach. ii. chalcitidis tostæ drach. ii. fructus myricæ drach. i. croci drach. i. myrrhæ drach. i. trita insufflato uelut dictū est. Aliud. Chalcitidis tostæ drach. ii. mysios drach. ii. atramētū sutoriū usti drach. ii. amomi drach. ii. myrrhæ drach. iiii. croci drach. i. terito & utitor siccis. Aliud mirabile. Soreos quadrantem, aluminis scissi quadrantem, gallarum sextantem, myrrhæ sextantē, utere sicco. Aliud ad polypos, ozænas, ægilopas, & quæ citra sectionem ac ustionem remouere uoles. Disparat etiam ossa corrupta. Ramentorum æris rubri unc. i. salis ammoniaci sextantem, aluminis rotundi quadrantem, aceti acerrimi heminas



vi. Arida trita adiecto aceto æris rubri uase exci-  
pe, & ad solem expone ac pistillo æneo sub canicu-  
lari æstu agita, donec resiccentur. Deinde trita uase  
fictili reconde. Vfus autem tempore aqua in ore te-  
neri iube, & per arūdinem naribus insuffla. Ad po-  
lypos & ozænas. Sinapi tritū aquæ misceto, ac sub-  
igito, & collyria glādiformia formato. Deinde gra-  
cile linteolum sinapi obducito, quo ipsum extrahe-  
re possis ubi uoles, & naribus indito, principio lin-  
tei foris relicto, & totam diem finito, & excidet po-  
lypus. Aliud ad polypos & ozænas ac superex-  
crescentē carnem. Aluminis scissi scrup. i. x. alumi-  
nis rotundi scrup. vi. atramenti sutorij scrup. vi. chal-  
citis scrup. x. viii. myrrhæ scrup. x. viii. squamæ  
æris scrup. ix. thuris scrup. iiii. gallarū scrup. xii.  
contusa cribrata terito cū aceto uelut collyrium, &  
formato pastillos. Vfu uero postulante, quantū fa-  
tis est cū melle contere, & linamētum intinge, ac na-  
ribus inde, & ad diem unam sine. Altera uero ex-  
trahe, & sequetur polypus, quod plerūq; fieri solet.  
Aliud Oribasij. Squamæ æris drach. viii. sandara-  
chæ drach. iiii. gris drach. vi. ueratri nigri drach. ii.  
Siccum hoc insufflato, & uelut optimo utitor. Nā  
in diebus decem manifestam utilitatē declarat. Ne-  
chepso rex ad carnē in naribus enatam. Squamam  
æris, & squamā ferri, ac alumen scissum, æquis por-  
tionibus terito ac insufflato, aut per specillum adhi-  
beto, aut in linamento utitor. Asclepiadæ ad po-  
lypos. Atramenti sutorij drach. i. diphrygis usti drach.  
ii. calcis uiuæ drach. ii. sandarachæ drach. ii. sicca  
adhibe. Aut linamētum intortū aqua madefactum  
ac pharmaco imbutum inde. Aliud quo Antipater  
usus est. Atramenti sutorij, sandarachæ, æquales par-  
tes tritas insuffla, & per specillū admoue. Aliud.  
Atramenti sutorij usti drach. iiii. rubicæ sinopicæ  
drach. i. trita insuffla. Naturale Apollonij ad po-  
lypos. Nycticoracem iugulato, & calido ipsius san-  
guine polypum illinito: Reliquū uero in sole sicca-  
to ac reposito, & aridum tritū inspergito. Aliud  
eiusdē ad exulceratos polypos, & ad ozænas. Dra-  
cunculi radicem aridam tritam insperge, facit & suc-  
cus ipsius illitus. Aut cupressi folia, aut pilulæ ficus  
carne exceptæ. Facit & salua imposita. Et laser cum  
atramenti sutorij, aut æruginis pari portione. Ga-  
lenus autem ad polypos inquit & ozænas compe-  
ri egregiè facere subscripta. Primū quidem id quod  
ex malis punicis paratur. Sin autem æquali nu-  
mero ac magnitudine ex tribus generibus accepta,  
de austeris, de dulcibus, & de acidis. Oportet autem  
ipsa recentia matura contundere, ipsaq; tota confrin-  
gere exacte, quo succus ex ipsis exprimi possit. Quē  
modicè coctum reponimus in stanneo uase. Quod  
uero restat solidum & crassum, diligenter in morta-  
rio tundito, & ualde bene in pila terito, ac collyria  
formato, oblonga, & crassitudine & longitudine  
differentia, eaq; siccato. Et usus tempore congruū ex  
his collyrium in nasi meatum inde, in quo polypus  
existit. Nam citra mordacitatem & consensum tol-  
lit polypum longiori tempore. Si uero humidior  
& mollior polypus tibi uideatur, amplius accipies  
de austeris punicis malis: Si uero durior, de acidis.  
Quandoquidem autem molestum est semper colly-  
rium ferre, cōuenit ab eius usu interquiescere, & in-  
terim dum collyriū non adhibetur, succo expresso

uti, & ex ipso internas oris partes illinere, hiantē æ-  
gro, eo maxime loco quo nasus ad palatū perfora-  
tus est, atq; hoc per pennam, aut lanā specillo obuol-  
utam. Cæterū ex siccis pharmacis noui aliquādo di-  
phryge polypū consumptū. Cōuenit in ipsis quoq;  
prædictum collyriū ex malis punicis siccum, leuissi-  
mè tritū ac insufflatum. Aut per specilli nucleū na-  
ribus inditum. Omnia autē hæc assidue facere oportet,  
ut nunquam desit medicamentū loco affecto. Fa-  
cile enim ab influente humiditate eluitur. Philagrii.  
At in eunuchis & molle corpus habentibus, & pro-  
pterea nullam mordacitatē ferentibus, rosas siccas le-  
uissimè tritas adhibe, mirifice enim profunt molli-  
bus & humidis corporibus. Nā pleraq; quæ effica-  
citer polypos eximunt, exacerbant quodam modo  
ubi scopum non contigerint. At uero in diuite quo-  
dam quī odoratum pharmacum expetebat ad ozæ-  
næ curationem, pastillo hedychroo usus sum, sub-  
egitq; ipsum cum uino ueteri odorato. Et mirum est  
quā breuī affectio curata est. Relata est autem hu-  
ius præparatio in theriaces descriptione.

*Ad ulcera in naribus.*

Cap. xciii.

Ulcerā in meatibus nasi simpliciora semper curauimur  
pastillos Andronij, & Pasionis, & Polyidæ, & Mu-  
sæ, & Bithynum appellatum, aliquando uino dulci  
ipsos exoluens, aliquando austero. Et quandoq; per  
acerū uinosum aut acre, ita ut ab affectionū sympto-  
matis, pharmacorū usum inueniamus. Archigenes  
autem pinguibus emplastris eiusmodi ad ipsa usus  
est. Plūbi cremētum tritum, cū uino ueteri ac myr-  
teo oleo, æquis partibus in fictili uase coquito ad  
prunas, semperq; agitato. Et ubi strigmentosum fa-  
ctum fuerit pharmacum, ablatū in pyxide plumbea  
seruato. Oribasij ad nariū ulcera. Spumæ argenti  
drach. vi. cerusæ drach. vi. plumbi usti & loti drach.  
iiii. myrrhæ, aloës, singulorum drach. ii. gallarum  
drach. i. uino & myrteo oleo dilutis utere. Facit etiā  
ad sedis uicia. Aliud Oribasij. Atramenti sutorij  
drach. vii. aluminis scissi drach. vi. gallarum drach.  
iii. malicorij drach. iiii. Ex uino aut aceto terito. A-  
liud eiusdē, ad simpliciora in meatibus nasi ulcera.  
Spumæ argenti drach. vi. cerusæ drach. viii. malico-  
rij drach. iiii. aluminis scissi drach. iiii. terito cū ui-  
no & affuso oleo myrteo, in plumbeo uase seruato  
ac utitor. Optime faciunt ad eadem: Asteris colly-  
ria, & Libiana appellata, & præsertim Cleonis ac  
similia, cum uino & oleo myrteo diluta.

*Ad sanguinis in naribus eruptionem.* Cap. xciiii.  
Sanguinis in narib<sup>9</sup> eruptionē sistit foliorū urticæ succus  
per linamētū inditus. Et ipsa folia trita frōti imposi-  
ta. Itē chalcitis arida trita linamēto excepta ac indi-  
ta. Oportet autē linamentū lucernariū frigida aqua  
tinctū in chalcitide obuoluere. Sistit & Iysimachij  
herbæ succus, & anthyllidis. Et ferulæ pars lanugino-  
sa cū aceto indita. Thus cū polygoni aut porri succo  
asinini stercoreis recēis succus, cū porri succo, & ace-  
to per linamentū inditus. Aut stercus idē ustu insus-  
fla. Aut spōgiā nouā pice liquida imbutā inde. Aut  
hippureos succū, aut ipsam herbā tritā inde, & frōti  
imponere. Aut saluæ folia trita adhibe. Aut ouorū  
testas urito ac terito, & de his duas partes sumito,  
& de galla omphacide partem unā, & linamēto a-  
quā aut aceto tincto excepta indito. Frōtē uero bul-  
bis tritis cū porri succo aut aceto integito. Aut gy-  
psum



ipsum ouī candido subactum fronti ac naribus imponito. Magis autem facit lapis specularis translucidus cum aceto. Aliud. Cochlearum carnes cum aceto tritas adhibeto. Aut cochleas uistas ac tritas, fronti ac naso cum aceto imponito. Apollonius autem inquit, cochlearum carnes cum thure tritas naribus indito, & sanguis sistetur. Iisdem etiam frontem intege. Aut siccum ex anemona pharmacū emplastri forma fronti impone. Aut emplastrum ex salicibus. Optimum autem est hoc, ex cuius usu sæpe laudem assequutus sum. Lapidem molarem feruefactum ac ignitum acerrimo aceto extingue, & uaporem naribus admoue, ac sistetur. Commodū est & per spongas frontē frigefacere, & caput in sublimē leuare, & manuum iuncturas inguināq; ac genua deligare. Apollonius porro ait, pedis ē directio naris unde sanguis erumpit, magnum digitū ligato, & multum ac ægrē sisti se sinentem sanguinis lationem sedabis. Commodum est etiā cera aures obturare, & in ore aquam pluuiam frigidam continere. Sed & cucurbitam occipiti affige cum scarificatione. Et circa uiscera magnam cucurbitam adhibe, si dextra pars sanguine manarit ad hepar: si sinistra, ad splenem. Aliquando etiam uenam secare cogimur. Summe uero facit hoc. Rhoidarij & ochrae æquales partes cum aceto in oppositam nari aurem instilla. Nimirū si dexter nari meatus sanguinē fundit, in sinistra aurem: si sinister, in dextrā. Sed & quæ ad sanguinem spuentes describentur potēda præbe.

*Quomodo sanguis ē naribus eliciatur. Cap. xc v.*  
Mentam tritam melle exceptam ad collyrij formam redige, ac naribus inde. Aut rubrae radicem leuissimē trita oleo subige, & naribus penitissimē illine. Aut graminis florē, aut summā eius asperiorē partē naribus inde, & obtorque donec sanguis erumpat.

*De narium obturatione, & odoratus oblesione,*

*Galenī.*

*Cap. xcvi.*

Oculis & linguæ ac uniuerso corpori sensum ac motū suppeditat cerebrū per neruos. Verū odoratus sensus intra caluariā est in anterioribus cerebri uentriculis uaporosum quendam spiritū habentibus. Cæterum necessariū est prius nosse quomodo nasus cōstructus est, & quæ corpora meatibus ipsius cohærent. Quū itaq; nasus habeat mediū interseptum, & duos memorabiles meatus, qui sanē apparent, unus in singulis naribus, nosse oportet supra nari partes utrunq; ipsorū dextrum ac sinistrū bifariam findi. Et altera quidem pars ad internā oris partem circa palatum uergit: Altera uero recta uelut ab initio ferebatur, ad ipsum cerebrū ascendit. Sunt autem in cerebro duæ propagines oblongæ ac cauæ, principiū quidē ex anterioribus uentriculis habentes, progredientes autem ad illā caluariæ partē, unde nasus initium habet. Iuxta hāc uero partem etiā ossa coliformia sita sunt, per quæ inspiratio & expiratio iuxta cerebrū cōtingit, & superfluitates in ipso expurgantur. Sed & crassa cerebri mēbrana, qua parte coliformia ossa cōtingit, tenuibus cauernis perforata est. Et per hāc sanē primam excolatur crassiores cerebri superfluitates, quas mucū appellamus. Et hæ deferuntur, primū quidem ipsam membranā penetrant, postea uero per coliformia ossa excolatur, atq; sic in nari meatus incidūt. At in transgressu per hos meatus, aliquando pars aliqua ex his quæ deferuntur,

præterfluit in os, per prædicta foramina ex naso in palatum, & præsertim ubi fuerit mucus ille uiscosus ac crassus. Reliquū autem quod deferitur, per nares euacuatur. Adiuuamus autē excretionem per os ex palato, per sreatum. Excretionem autē ex naso, per uiolētoris efflationis ac sternutatoriorū usum. Respirationis equidem ac olfactus gratia facta sunt foramina cerebri in nares. Vritur autē ipsis natura ad retrimentorū cerebri purgationem. Proinde odoratus læsio nō in meatibus nari est. Sed aut anterioribus cerebri uentriculis ad intemperiem perductis, aut meatibus in ossibus colatorijs obturatis, mucō ac destillatione ut plurimū prægressis, aut his partibus perfrigeratis uel humectatis. Nam & aer qui palam per inspirationes attrahitur, tū nares aliquando perfrigerat, tum uicinas ac cōtiguas partes, & hoc maxime ubi ambiēs nos aer frigidus factus est. Archigenis. Primum igitur cōuenit eos qui olfaciendi facultatē lesam habent, aut colatorios meatus obturatos, in siccioribus locis diuersari, quales maxime sunt maritimi, & gymnasijs pro uiribus uti, itēque unctionibus singulis diebus, ita ut erectum habeant collum, & per alios confricentur. Caput quoq; pectine perfricare, oportet, & nitro detergere in balneo, & aqua marina calida abluere, ac caput perfundere, marina calida affusa. Deinde etiam aquæ frigida modicē immergere in egressu. Optimum est & in marina aqua assidue natare. Utendū est & medicamentis quæ naribus indita caput purgant. Cæterum tota uictus ratio attenuatoriæ sit facultatis. Quare etiam acriū rerum esus ex interuallis adhibeatur. Domus in qua degunt, moderatē calida sit, pro temporis anni ratione. Somnus diuturnus incōmodus est ipsis. Dum autem dormiūt, ceruicæ sublimia habeant, & in latus reclīnētur, & non secundū affectam partem, uelut si contingat unum ex colatorijs meatibus esse obturatū. Quotidiana itaq; uictus ratio talis sit. Claro autem instante aere, primum uentrē expurgare tenta, per Archigenis ex colocynthide hieram. Deinde hirudines sublimiori nari parti adhibe, & multū sanguinē trahere sine. Post tertium autē diem, splenio ab intermedio supercilliorum usq; ad malam obturatā nari partem intege, sit autem factū ex emplastris discussoriam uim habentibus. Quale est melinū Serapionis, & emplastrum Icelij, & nigrum Archigenis, & quod ex tithymali succo paratur, & quod ex scilla, ac consimilia. Horū autem usus nō fiat infra quindecim dies. Post hæc pira ex aloē assidue uenter subducatur. Cōmodus est enim frequētiōr ipsius usus. Postea pituitā per os ducentibus utendū est, ex staphide syluestri ac mastiche. Postquam autē sufficiens euacuatio per os facta est, emplastro ex agarico, aut ex cāchry, aut malagma te ex baccis lauri, aut aliquo consimili nasus integatur, & frōs usq; cutis rubificationē. Solēt enim talia mucosam humiditatē per cutē attrahere. Postea uero sternutatorio utēdū est, primū simpliciore, deinde efficaciore, quale est ueratū albū leuissimē tritū. Tertia deinde aut quarta die à sternutatorij usu, radedū est caput, & sinapism⁹ adhibēdus usq; ad frōtē. Deinde lauētur. Et post multos rursus dies si opus fuerit, rursus caput per narifusoriū instrumētū purgetur. Sit autē efficax medicamētū quod adhibetur. Quale est elateriū cū lacte, aut cyclamini succus.

*Aug*



Aut ipsam cyclaminum siccam tritam insuffla. Aut cucumeris sylvestris radicem. Aut nigellam tusam ac cribratam, & oleo uetustissimo addito probe tritam, per nares infunde, & pharmacum per respirationem uehementius attrahere iube. Aquam autem aegro in ore tenendam exhibe. Hoc ego usus sum in quodam adolescente, qui ex muco ac destillatione diuturna olfactus sensum laesum habuit, & ubi consequenter per triduum hoc auxilio usus esset, magnopere auxiliu percipiebat. Quarta uero die attracto uehementius per inspirationem pharmaco, forte mordacitatem in profundo capitis sentiebat, & quum haec paulatim imminueretur, postera die penitus conualuit. Vtiliter etiam nigella assumitur cum aceto. Conuenit autem post horum usum, post triduum uidelicet, sinapismum fronti adhibere, faciei quoque ac naso, & postea lauare. Sed & odora menta assidue adhibeantur odorata haec, Narcissus, sisymbrium, serpillum, lilij folia, uiolae, menta, polium, ruta sylvestris, & thymbra. Omnium uero utilissimum est castoreum aceto dilutum. Quin & potum castoreum tritum cum aquae mulsa cyathis tribus, praem multis auxilijs proderit. Efficacius autem red dicitur, aceti scillitici cyatho dimidio addito. At uero acetum scillinum quotidie a ieiunis trium cochleariorum mensura acceptum, utilissimum ipsis existit. Caeterum post has omnes lancinationes, si adhuc affectio aliquo auxilio opus habet, adhibendus est etiam a raphanis uomitus, ita ut ipsi concisi aceto mulso aut garo madescant. Sequenti uero a uomitu die, aeger absinthij decoctum bibat, aut pulegij. Et post hoc imponendum est naso emplastrum ex scilla, cuius experientiam feci, relinquendumque aliquo tempore ut uaros in loco excitet, & strigmentosam humiditatem extrahat. Habetur autem hoc emplastrum in Sermonis de emplastris tractatu. Atque haec omnia etiam bis ac ter & saepius adhibenda sunt, ad pertinaciores affectiones.

De sternutatorijs, Hippocratis. Cap. xcviij. Sternutatio fit calefacto cerebro, aut humectato eo quod in capite uacuum est. Aer itaque intus existens erumpit, sonitus autem fit, quoniam per uacuum & angustum spiritus transit. Consideremus autem quomodo sternutationes capitis grauitatem sanant. Fieri equidem sternutationes, maximis inspirationibus praegressis, & efflatione celerrime sequente. Appello autem efflationem, acruatam expirationem. Habet enim cerebrum duas has facultates, per quarum alteram superfluitates in anterioribus uentriculis excernit ad seipsum contractas: per alteram uero alas nasi expandit, & spiritum attrahit. Quum itaque a spiritu grauatur, tunc ipsum excernit per contractionem sui. Si uero obturatis in naribus uis, impeditur ex-

cernere grauantem spiritum, aut mucum: tunc uiolento motu ad sternutationem procedit, depellere conans ea quae meatus obturat. Vnde sternutationes capitis grauitatem, uelut dictum est sanant. Immo etiam affectiones quasdam circa cerebrum consistentes. Quales maximè sunt, lethargus, & profundus sopor, ac consimiles. Tales enim per sternutatoria maximè curantur. Sed & ad solem respicientes ad sternutationem iritamus, diffusis uelut arbitror a caliditate crassus cerebri spiritibus. Extrudunt autem sternutationes etiam mucos ex cerebro crassos ac uiscosos, per uehementem spiritus impetum, etiam hos foras coequentes. Porro sternutationem mouet, ueratrum album, herba lanaria, piper, castoreum, cyclaminum, euphorbium, nitrum, herba ptarmica, hoc est, sternutatoria appellata, cuminum, singula seorsim ac simul leuissimè trita & admota. Non autem haec insufflare oportet, sed motam pyxidem naribus admouere, aut per specilli nucleum naribus penitissimè indere. Et simplicia quidem sunt haec: Sunt & composita ex ipsis adeo conflata, quale est hoc. Sternutatorium Heraclidæ Tarentini. Cumini Aethiopici, piperis, herbae lanariae, castorei, singulorum aequas portiones, contusas ac cribratas in creta pyxidem reponere. Vfus autem tempore agitata pyxidem aperi, & naribus adhibe. Aut per specillum penitissimè inde. Aliud. Piperis, ueratri albi, herbae lanariae, euphorbij, castorei, succi cyclamini sicci, aequis partibus utere uelut dictum est. Aliud ad diuturnos capitis dolores, uertiginem, capitis grauitatem, & comitiales. Veratri albi drach. iiii. nitri rubri, herbae lanariae, castorei, piperis, singulorum drachmam unam, utere uelut dictum est.

Ad sedandas redundantes sternutationes. Cap. xcviij. Redundantes sternutationes sedant ea quae etiam grauedinem sanant, oleum rosaceum naribus infusum, & oleum dulce, & unguentum nardinum. Olfactu uero sedant sternutationem, anisum, ocymi festucae siccae tulae, nigella sicca trita. Aut thymum fermento oblitum, & cinere obrutum, & ubi tostus est, tritum adhibe. Singula uero haec raro lindeolo illigata olfacienda dato. Sedat sternutationes & grauedinem, etiam myrrha per se, uel cum thure & uino odorato trita, illitis hinc naribus. Facit & menta, & hedychoon, & cyphi. Sed & aqua tepida fronti aspersa sternutationes sedat. Quin & si ab utraque nasi parte, iuxta magnos oculorum angulos uenas sitas digitis compresseris, sternutationem sedabis. At uero Apollonius naturale auxilium prodit ad hoc, ut pueri non sternutent. Ciconiae, inquit, pennae in domo habeantur, & impossibile est ut sternutent.

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN

### SEPTIMO SERMONE AETII

#### HABENTVR.

|                                                           |            |                                                          |            |                                       |             |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|
| De natura oculorum.                                       | cap. i.    | De inflammatione ob plenitudinem, & de chemosi oculorum. | cap. v.    | De frigida oculorum intemperie.       | ca. xi.     |
| Quot & quae affectiones circa singulas oculi partes sunt. | cap. ii.   | De balneis.                                              | cap. vi.   | De oculorum inflatione.               | cap. xii.   |
| Perturbationis oculorum curatio.                          | cap. iii.  | De uini potu.                                            | cap. vii.  | De tumore oculorum.                   | cap. xiii.  |
| Inflammationis oculorum superficialis curatio.            | cap. iiii. | De uenae sectione.                                       | cap. viii. | De tumore indurato.                   | cap. xiiii. |
|                                                           |            | De purgatione.                                           | cap. ix.   | Vlcerum in oculis communis curatio.   | cap. xv.    |
|                                                           |            | De fomento.                                              | cap. x.    | De illabentibus in oculum animalculis |             |



- De illabentibus in oculum animalculis aut paleis, aut arena. cap. xvi.  
De calce uiua in oculū illapsa. c. xvii.  
De ulcerationibus ab igne. cap. xviii.  
De his quæ oculo infiguntur. cap. xix.  
De sugillatione. cap. xx.  
De puncturis oculorum. cap. xxi.  
De uulneribus profundiorib. ca. xxii.  
De ouiformis humoris excretionē. caput xxiii.  
De oculi prolapsu. cap. xxiiii.  
De ulcerationibus superficialib. ex humorum influxu obortis, nubecula, caligine, epicaumate, encaumate. caput xxv.  
De argemo. cap. xxvi.  
De fossulis, & concauis ulcerum generibus. cap. xxvii.  
De suppuratione aut ungue. caput xxviii.  
De pustulis. cap. xxix.  
De carbūculis in palpebris. cap. xxx.  
De canceratis oculorum ulceribus. caput xxxi.  
De malignis oculorū ulceri. c. xxxii.  
De myocephalis. cap. xxxiii.  
De staphylomatis. cap. xxxiiii.  
Staphylomatū chirurgia. cap. xxxv.  
De ulceribus cicatrice indigentibus. caput xxxvi.  
De cicatricibus & albuginibus. caput xxxvii.  
Materia attenuans cicatrices & albugines. cap. xxxviii.  
Auxilia ad cicatrices & albugines. caput xxxix.  
Albuginum tinctura. cap. xl.  
Ad glaucos oculos ut nigras habeāt pillas. cap. xli.  
De puerorum curatione. cap. xlii.  
De aspretudinibus, ac densitatibus, sycofiq; ac callis. cap. xliiii.  
De oculorum debilitate. cap. xliiii.  
De myopia. cap. xlv.  
De nyctalope. cap. xlvi.  
De hebetudine oculorum. cap. xlvii.  
De obfuscatione oculorū. cap. xlviii.  
De resolutione oculorum. cap. xlix.  
De glaucedine. cap. l.
- De suffusione. cap. li.  
De mydryasi, hoc est, pupillæ dilatatione. cap. lii.  
De tabe pupillæ. cap. liii.  
De macie oculi. cap. liiii.  
De expressione oculorum. cap. lv.  
De confusione. cap. lvi.  
De his quæ in albo oculi nascuntur. caput lvii.  
De pterygijs. cap. lviii.  
Pharmaca ad pterygia. cap. lvix.  
Chirurgia pterygiorum. cap. lx.  
De carnis in angulo magno incrementō. cap. lxi.  
Chirurgia incrementi carnis in angulo. cap. lxii.  
De sanguinis ex angulis eruptione. caput lxiii.  
De concretione palpebrarum ac confectione. cap. lxiiii.  
De pediculis palpebrarum. cap. lxv.  
De pilis pungentibus palpebrarum, & de duplici pilorū ordine, itemq; multiplici quam phalangosam uocant. caput lxvi.  
Pharmaca ut euulsi pili non renascantur. cap. lxvii.  
Agglutinatoria pilorum. cap. lxviii.  
De futura palpebrarum sursum uersus. caput lxix.  
De futura palpebrarum deorsum uersus. cap. lxx.  
De euerfione palpebræ. cap. lxxi.  
Chirurgia euerfionis palpebrarum. caput lxxii.  
De lagophthalmis. cap. lxxiii.  
De lippitudine dura. cap. lxxiiii.  
De lippitudine sicca. cap. lxxv.  
De lippitudine scabra. ap. lxxvi.  
Curatio lippitudinis duræ, siccæ, scabræ. cap. lxxvii.  
De defluio pilorum palpebrarū, quod uitium & madarosis, & ptilosis, & milphosis à Grecis appellatur. caput lxxviii.  
De abscessu in palpebris. cap. lxxix.  
De calculo palpebrarum. cap. lxxx.  
De grandine oculi. cap. lxxxi.  
De ordeolo siue præputiola. caput lxxxii.
- lxxxii.  
De ganglijs, atheromatis, steatomatis, & meliceridibus palpebrarū. caput lxxxiii.  
De uaricibus palpebrarum & malignis agnatis eminentijs. cap. lxxxiiii.  
De ægilope. cap. lxxxv.  
De uestione ægilopis. cap. lxxxvi.  
De anchilope. cap. lxxxvii.  
De carnis in angulo magno decrementō. cap. lxxxviii.  
De his qui tempora inurunt. caput lxxxix.  
De arteriarum sectione. cap. xc.  
De caluariæ circuncisione. cap. xci.  
De frontis per submissum scalpellum excoriatione. cap. xcii.  
De uasorum sectione. cap. xciii.  
De musculorum temporum cataplasmatibus, agglutinatorijs, ac illitionibus. caput xciiii.  
Totius capitis illitiones. cap. xcvi.  
Cataplasmata oculorum lippietium. caput xcvi.  
Illitiones oculorum. cap. xcvi.  
De aridis collyrijs. cap. xcvi.  
De liquidis collyrijs. cap. xcix.  
Collyria ex croco, & ex succis diuersa. cap. c.  
Collyria unius diei, monohemera appellata. cap. ci.  
De collyrijs sistentibus. cap. cii.  
De lenibus collyrijs. cap. ciii.  
De lenibus & albis collyrijs. ca. ciii.  
Collyria libyana, & tephra, ac spodia. caput cv.  
Collyria ex thure. cap. cvi.  
Collyrium Cleonis. cap. cvii.  
Collyria ex rosis uiridia ac alba, caput cviii.  
Collyria diasmyrna, & chiaca appellata ex uino. caput cix.  
Collyria ad aspretudines, & extensoria. cap. cx.  
Collyria enstacta, hoc est, instillatitia appellata. cap. cx.  
Collyria ex cornu ceruino. cap. cxii.  
Collyria Nardina & Theodotia. caput cxiii.



# AETII MEDICI GRAE- CI CONTRACTAE MEDI-

CINAE TETRABIBLI SECVNDAE

SERMO TERTIVS, ET EX

ORDINE SEPTIMVS.

*De morbis oculorum.*

DE NATVRA OCVLORVM. Cap. I.



**C**IRCA oculos varia est & diuersa. Nam & ipsa particula, oculus inquam, non simplex est, sed compositione sortitus est ad suam essentiam constituendam, tunicis nimirum & humoribus, insuperque palpebris ornatus. Natura enim nervos à cerebro ad oculorum regiones descendentes, visus uisidelicet, & partem duarum membrarum cerebrum completentium, quae cum ipsis nervis excurrit, auges & uelut dilatas, tunicis oculorum originem essentiae largita est, ut quae omnium intimam tunicam retiformem appellatam, ex nervo visuo construxit. Aciniformem uero tunicam huic praepositam, ex tenui membrana produxit. Similis est enim acino uuae, & figura, & colore, & rotundiore foramine perforata est iuxta pupillam. At uero tunica quae ambabus his forinsecus praetenditur corniformis uocata, ex crassa membrana originem habet. Quae uero his omnibus foris obducta est, alba illa quam agnatam appellamus, ex pellicula forinsecus ossi capitis circumscissa, quae circumossalis & circumcalualis appellatur, generationem habet ex propaginibus corporum oculi circumdatorum. Ceterum humores in oculo tres sunt: Intimus omnium est qui in cauitate retiformis tunicae continetur, uitriformis dictus: similis est enim & colore, & substantia uitro fuso. Exterior autem ab hoc situs est ad finem retiformis tunicae, humor glacialis siue crystallinus, qui etiam discoformis & lentiformis appellatur: similis est enim colore quidem glaciei, figura uero lentis, aut disco. Forinsecus autem circumfusus est, ouatus siue ouiformis humor: similis est enim colore & substantia, humori albo ac tenui in ouis. Omnium igitur intimus humor uitriformis, ad hoc ut glacialis alat constructus est, qui uero forinsecus ipsi circumfusus est ouiformis, ad hoc ut hunc humectet factus est, & ad hoc ut ipsum à solis splendore iniuria affici non permittat. Palpebras porro constituit tunica agnata: ex his autem singula è naturali statu emota, oculum aegrotare faciunt.

*Quot & quae affectiones circa singulas oculi partes sunt.*

Cap. II

Quae proprie dicuntur lippitudines, & chemoses, & perturbationes, & tumores, & suffusiones ex plaga, & pterygia, affectiones sunt tunicae agnae. Eadem etiam ulceratur, & carbunculo infestatur, & cancerosam affectionem habet. At lippitudo dura & lippitudo sicca, communes affectiones sunt palpebrarum, & ipsius oculi. Ceterum circa externam palpebrarum superficiem, pustulae aquosae, melicerides & steatomata. Verum ex his quae circa internam palpebrarum consistunt, est densitas, aspretudines, sycoses, grandinae, calculi, concretio, conclusio. Et lagophthalmi appellatur, qui-

bus superna palpebra reuulsa est, ut oculum cōtegere non possit. Ectropion uero quibus inferna palpebra euerfa est. Sed & mutilationes & corrosiones, & ulcerationes in palpebris consistunt. Circa palpebram uero extremitatem fit trichiasis, hoc est pili pungentes, & defluuium pilorum, quod madarosis & ptilosis dicitur. Fit & morbus pedicularis, ac porrigo, & paruus instar ordei abscessus. Sed & Milphosis, id est, pilorum nuditas, affectio est extremitatis palpebrae. Rubicunda enim his est palpebrae ala, colore militum, hoc est, minium referens, unde etiam Miltoxis uitiū appellatur. At uero anguli afficiuntur quidem etiam in Aegilopis, sed non soli. Carunculae autem naturalis supra iustum modum incrementum, & eiusdem decrementum, solorum angulorum affectiones sunt. Porro circa tunicam corniformem, consistit caligo, nubecula, argemon, epicauma, coeloma, bothrium, ruptio, prolapsio, unguis, pus, pustulae, carbunculi, canceratae affectiones. At circa aciniformem tunicam fiunt, prolapsio, myocephala, staphylocoma, pupillae dilatatio, quae mydriasis & platycoria appellatur, tabes, confusio, pupillae distractiones. Suffusio uero circa ipsum foramen aciniformis siue uniformis tunicae consistit, hoc est, iuxta pupillam. Sed & ouiformis humor amplior seipso factus, aut crassior, exactum visum impedit. Quin & imminutus idem humor crystallinum resiccat. Quae uero glaucedo appellatur, siccitas est uehemens humoris crystallini. Obscuratio autem obturatio est nervi visui, ut omnino non uideat, qui sic affectus est, pura tamen apparente pupilla. Laesos etiam oculos habet, citra hoc ut aliquid mali appareat circa oculos qui nyctilopes appellantur. Totorum uero oculorum manifesta laesio est, quae expressio uocatur. Est autem prominentia oculi uelut extra positi. Ceterum curationis tractationem à simplicioribus & superficialibus morbis in oculis incipiendam putamus.

*Perturbationis oculorum curatio.*

Cap. III.

Perturbationes oculorum à fumo factas, & ardore, aut puluere, aut alio consimili, facile curabis, si iusseris aegrum à laedente causa discedere, uelut sole aut fumo, aut alio simili. Deinde oculos lauare, primum aqua tepida dulci, postea etiam frigida. Iubendus est etiam splendorē auersari, & oculos claudere. Ex his enim sedatur malum, nulla alia re adhibita, sed solum indigentiore uictu. Si uero ex ardore obortae sunt perturbationes, ampliore potu utendum est. Si enim somnus successerit profundior, etiam lippitudo formidata concoquetur. quare neque à balneis abstinendum est. Verum diæta exquisitior utendum. Perseuerate uero affectione quiescere oportet, & palpebras illinere collyriis ex croco, aut rosas, & maxime collyrio Nili ex rosas. Granas autem, & glutinationes noctu circa oculos fiætes, expurgat, & probe iuuat posca aquosissima, & ipsa aqua per se frigida affusa. Et aliquod ex siccis



siccis delacrymatiuis appellatis, præsertim quod croceum procatalepticum, hoc est, præoccupatium, siue perseveratium, appellatur.

*Inflammationis oculorū superficialis curatio. Cap. IIII.*

Quod si inflammatio superficialis fiat in tunica agnata, & dolor uehemēs non adsit, repulsoria in ipsis adhibenda sunt collyria, ita ut uehementiā mordacitatis ipsorū, per oui ammixturem mitigemus. Plerumque enim tenuis oui liquor cū collyrijs Monohemeris, hoc est, diarijs appellatis, sufficit ad curandas superficiales & incipientes lippitudines, citra magnā inflammationē, & uehementem dolorem. Sæpe enim ita inflammationes mitigauit, ut homo ad uesperam balneo usus sit, & postridie collyrio nardino ad restitutionē in integrū, & corroborationē se illeuerit. Ammiscetur autē ad collyriū nardinū circa primā illitionem, minimū quiddam ex repulsorijs, circa secundā adhuc minus. In quibus igitur collyrijs dominantur adstringētia, plurimū liquorē oui esse oportet, modicū uero collyriū. In quibus autē præuaalent concoctoria, uelut est nardinū, ea crassius adhibenda sunt. Fomentū adhibendū est his per spongiā, si moderatus est dolor, semel aut bis: Si uehemēior, melius est uel quinq; uicibuseo uti, animaduersione tamen habita ad oculi qui curatur sensus lubilitatē aut hebetudinē: Quicumque enim oculi secundū naturā uenas amplas habēt, & sanguine plenas, itēque qui glauci sūt, omnino nō ferūt collyriorū adstrictionē. Quare aquosiora in his collyria adhibere oportet.

*De inflammatione ob plenitudinem, & chemosi oculorum. Cap. v.*

Si plenitudo in toto corpore subiecta est, & inflammatio in oculis magna sit, & dolor uehemēs adest, non amplius sufficit collyriorū usus ad talē affectionē. Vario itaque opus habemus in his medicationis ductu. Et oportet prima ac maxima auxilia adhibere. Quorū etiam Hippocrates in aphorismis meminit, ubi ait: Dolores oculorū soluit meri potus, aut balneum, aut fomentū, aut medicamentum purgatoriū, aut uenæ sectio. At non eidē homini omnia auxilia hæc adhiberi iubet. Sed alij uenæ sectionē, alij purgatorium pharmacū, alij fomentum, alij balneum, alij uini potum. Itaque à balneo initium faciamus.

*De balneis. Cap. vi.*

Balneum cōuenit his quibus inflammatio tumida in oculis est. Est autē tumor mole quidē laxis, sed ad tactū frigidior, & colore albus, & qui influit fluxus, minus mordax est, & minus calidus. Imo neque chemosis in ipso oculo subrubra est, neque distenta. Hæc autē affectio magis in senili ætate contingit, & plerumque hyemis tempore, & magis foeminis pinguibus. Et ut cōpendio dicā, omnibus frigidū ac pituitosum cerebrū habentibus, inflammatio tumida contingit. Quum itaque omnia relata signa uideris, confiderenter balneū assumito: adeo enim ægrum leuat, ut alio auxilio nō habeat opus. Oportet autē magis in aëre morā trahere, & oculos plurimū fouere sicciorē fomento per spōgias multū expressas. Quod ubi feceris, palām percipies tumore in calido aëre disparuisse, & interim ægros penitus ab affectione liberatos. Si uero quid ad perfectā curationē defuerit, nardinū collyriū in balneū ituro instillato. At si moderatus apparuerit dolor, etiā crassius collyriū adhibebis, præcalectū uidelicet in cote, ita ut loto, uelut dictū est, & e balneo egresso, humiditatē diligenter

per spongiā detergeas, & sic idē collyriū illinas, obseruās ne quid ex ipso in oculū præterlabatur. Solet enim magnū damnū excitare. Quare neque sudaribus illinendū est. Fit enim in balneo humorū diffusio, & præterlapsus collyriū mordacitate quadā inducta, materias faciliē ad oculū trahit, & duplicat inflammationes. Si uero relata affectio durabilior fiat, & fluxionis essentia, ad frigiditatem magis ducatur, tum smegmata capitis in balneo adhibenda sunt, & pulueres insperfiles post balneum. Et primū quidē simplicibus uti oportebit. Si uero causa perseverarit, etiā ad cōposita transeundū est, quorū sylua talis est. Baccæ lauri, nitrū tostū uino extinctū, sampsuchus, fex uini usta, & similia. Puluisculi uero mulieribus præsertim cōsueti adhibēdi sunt, qualis sunt ex iride, & apij semine, & cupressi pilulis, & ungentis siccis appellatis. Oportet autē nō immodicē calida esse, neque acria quæ adhibētur, sed leniter calida, & habere adstrictionem ammixture. Horū uero compositiones iā relatæ sunt in præcedēti sermone. Smegmata igitur in balneo inijcere oportet sincipiti, pilis prius inter se disparatis, quo auxilium corpus contingat, præcipiendumque ut in balneo os claudat, quo calido aëre uehemēter per nares attracto, subiectā materiā citius trāsmutent. Post balneū autē detergis capillis, puluisculi inspergantur, uelut dictū est. Et de balneis quidem hætenus. Consequēter etiam de uini potu.

*De uini potu.*

*Cap. vii.*

Vinum attenuat, & incrassatos humores trāsmutat. Et sepe per accidēs aliquod horū euacuationē facit. Cōuenit autē esse uinū colore fuluū, & substantia tenuē, & nō uetus, neque uehemēter adstringens. Dandū est autem uinū his maximē qui ipsi adfuerunt sunt, & qui siccā ac frigidā intemperiem magis prædominantem habēt. Videtur enim societate quandā ad balneū habere uinū ipsum. Quū igitur euacuatione ac trāsmutatione humorū opus fuerit, balneū assumendū est. Quū autē trāsmutatione, & renutritione, ac humectatione & calefactione, moderataque euacuatione, uino opus habemus: miscere igitur uinū oportet aqua calida nō multa. Sit etiā meracius quā pro cōsuetā tēperatura. Sit & aqua quæ adijcitur purissima, & fumī ac odoris exors, & ualde feruida, quo etiā seipsa tenuior euadat, & sufficiat ad amplioris uini tēperaturā. Sit & poculū in quo exhibetur amplius, & conetur eger oculos inter potandū aperire. Sic enim exoluta obstructione, & multa naturali ac saluberrima lacryma influēte, à dolore liberabitur. Statim enim laxantur palpebræ, & seipsis magis mobiles fiūt, ac leuiore. Illud uero considerare oportet, an ne caput hominis faciliē lædatur. talium enim caput faciliē læditur ex uini potu. Cæterū ad reliquias affectionis oculi, collyrio uti oportet, primū leni ac dulci instillato, ad accessoriā perturbationem curandā. Et ubi oculi in quieto statu fuerint, & à feruore inflammationis liberati, tunc repulsoriū collyriū adhibeatur: quale est quod Hermolaus appellatur, & cōsimilia sistentia appellata. Dū enim rubor adest, & inflammatio, adstringentibus collyrijs uti non oportet. Conclufis enim per adstrictionem materiæ reliquijs, dolorem maiorem faciunt. Et de uini potu hætenus. Dicendum & de uenæ sectione.

*De uenæ sectione.*

*Cap. viii.*

Adhibenda est uenæ sectio, si nihil ex sæpe relatis impedierit, in dolore oculorū, in his quibus multa oculorum



lorum distēctio est, & multus rubor, & ad contactū resultus, & ardor, & lacryma multa ac calida, & chemosis iuxta corniformē & agnatā tunicā, ut à uehementi inflāmatione palpebræ euerātur, ut uix oculos operiant, & subrubra apparet tunica agnata, & maiori tumore prædita est, & totū corpus sanguine repletum. Secāda est autem potius superna in cubito uena, humeralis appellata, faciendāq; est maior sectio, ad hoc ut crassior sanguis euacuetur, ueloxq; animi deliquiū succedat, quo dolor eximatur, & inflāmationis feruor extinguatur. Euacuato autē toto corpore, collyrijs & reliqua curatione, reliquæ affectionis percurentur. Utendū est autem collyrijs, qualia sunt cygnaria, & Libiana, ita ut aquosiora calida instillemus. Fomēta in his nō ualde adhibenda sunt, sed per spongiā ex aqua tepida leniter deterfio fiat. Alimēta danda sunt lenia, facilia, cōcoctu & ad digerendū uentri cōmoda, urinam ciētia, nihil acré & falsum habētia aut crassi humoris aut ægrē cōcoctile. Post inflāmationis depulsionē, nardinū aquosius instillandum est usq; ad perfectam sanitatem. Et uenæ quidem sectionis hætenus mentio facta sit. Transcendū est hinc ad purgationem.

## De purgatione.

Cap. ix.

Si neq; ætas, neq; anni tēpus, neq; stomachi in primis debilitas, aut alterius cuiusdam uisceris, neq; aliud quoddā maximum impedimentū fuerit, purgatio assumenda est, in his quibus tenuis & multa lacryma defertur, aut salsa, aut acris, aut frigida. Et uniuersum corpus uitiatis humoribus repleū, & caput superfluitatibus redundās, & aluus assidue suppressa, & copiā ex hoc malarū superfluitatū congregās. Et ad hæc uehemens doloris pexatio adest. Nam in uenæ sectione plenitudinē totius corporis suspectā habemus. In purgatione uero uiciosos humores auersamus. Purgatoriorū autē natura nō una est, sed plures. Iuxta redundantē enim & affligentem humorē, pharmacorū materia euariat. Si quidē igitur aluus assidue fuerit suppressa, aloē ipsis exhibenda est, cū brassicæ succo trita, & in catapotia redacta. Si uero pituita magis redundarit aquosa, exhibe pharmacū ex euphorbio, pipere, & sale ammoniaco præparatum. Si uero bilis abundarit, picrā ex aloē dato, scammonia leuissimē trita duobus scrupulis, aut minus additis, pro uiriū ratione. Si autē atræ bilis humor dominatur, addātur ad picræ dosim, epithymi scrupulus, & scammonia obol. iiii. Cæterū post sufficientē per purgatoriū euacuationem, si quidē simplex & sine uulnere fuerit affectio, adstringētibus collyrijs utendū est: quale est Hermolaus, & similia. Et hæc per instillationē adhibenda sunt. Si uero uulneratus fuerit oculus, teneris utendū est. Qualia sunt cygnaria, & Libiana. Iam igitur Aphorismi Hippocratis scopus, quantum in præsens opus est, relatus est, hoc est, quomodo ad maximos dolores ac inflāmationes citò instare ac reniti oportet. Quando quidē uero in multis maxima auxilia relinquūtur, uenæ sectio maximē & purgatio, considerandum sanē est quomodo tales tractare oportet. Proinde cū uniuer salibus iam relatis signis, etiam peculiaria quædam circa oculū signa uidere est, totū morbū redarguentia ac indicantia. Gramæ itaq; & lacrymæ apparēt, aliquādo glutinosæ ac crassæ, aliquādo tenues & citò destillantes. Et aliās salse, aliās acres, aliās morda-

ces. Et quādoq; calidæ, quādoq; frigidæ. Grama itaq; statim in principio lippitudinis apparēs, magis cruditatis signū est, & diurnā lippitudinē fore significat. Oportet itaq; in talibus leniter curationē facere per dulcia collyria instillata, & reliquū consimilem ductū, quo temporis progressu concoctio uere fiat. Nā repulsoria collyria, quū sint ferē uiribus frigidiora, obstructionē & corporū codensationem faciunt, & dū humorū materias concludūt, maximas inflāmationes ac graues dolores inducūt. Aliquādo etiā ruptionē tunicæ corniformis faciūt, propter humorū distēctionē, & maximē ubi rubor adest, & inflāmatio, & materiæ multitudo in oculis subiecta est. talia uero collyria sunt quæ ex uberiore opio & acacia præparātur. Quale est quod Antoninus, & quod Hermolaus appellatur, & quæ Pelaria appellantur, & his similia. Quidā enim collyrio Antonino amplius usi, unā cū dolorū augmēto, etiam uim uisui in iuriā affecerūt. Nā per immodicā perfrigationē, portulacæ mortificationē magis induxerunt.

## De fomento.

Cap. x.

Fomento utendum est multò, maximē si in principio crassissimæ gramæ apparuerint, quo ipsæ extenuentur. A balneis autem penitus abstinendum est. Aliquando etiā à uino. Cibi exhibendi sunt modici, uentri cōmodi, ac attenuantes. Quod si duriorē aluum habuerint, per betarū ac fursurū decoctū eluatur, cū melle ac sale. Os autē per pharmacum ex moris illinatur, ad materiæ euacuationē. Aut per collutionem aliquam pituita per os detrahatur: pleriq; enim maxillares musculos læsioni obnoxios habentes, manducationem ægrē ferūt. Postea uero, uelut dictū est, simplicia collyria infundantur. Et si quidem calida fuerit affectio, Libianis collyrijs utendum est. Quale est quod à nobis ad huiusmodi affectiones experientia cognitū est, & in Heretomis reperitur, & ab ipso Tephro appellatū est, pompholygemq; nō habet. Vnde etiam nos descriptionē ipsius delegimus. Nā pōpholyx rara inuenitur, & facile adulteratur. Optima est autē pompholyx colore non alba, sed magis ad liuedinē uergens. Signum optimæ est, si in prunas inspersa, auricolorem ignis speciē efficit. Utendum est igitur collyrio Tephro appellato, ad lippitudinem à calido humore obortā. Si uero non affuerit hoc, alio quodā ex Libianis appellatis utendum est, aut cygnario. At si inflāmatio affuerit, cū lacrymæ calidæ influxu, hecatontarchiū collyrium aquosius instillare conducit, si non ulceratus fuerit oculus. Et si quidē inflāmatio prædominatur, addenda sunt ad hecatontarchiū quædā nō adstringētia collyria. Si uero influxus magis præualeat, ipsum per se ipsum aquosius infundatur. Omnibus autem præstat, in quibus gramæ crassæ sunt ac uiscosæ, id quod ex uino paratur, & Isotheū inscribitur, cum albumine ouī infusum, atq; hoc aquosius, ut coloretur solum ouū ex collyrio. Citissimam enim opem affert citra aliud auxiliū. Post collyriorū usum, si puncturā aliquā aut mordacitatē, aut caliditatem perceperit, solum albumen ouī calefactum infundatur. Nam lacryma ex supernis partibus delata, apud palpebram colligitur, & arenæ imaginationē exhibet. Et quidā Medici fidē habentes his quæ ab ægro dicuntur, uelut sit aliquid sub palpebra arenæ, inuersam palpebram spongiā detergent. Et uidentur sibi in præsens quidem



quidem ægrū ab omni suspitione liberare. Verum maximū detrimentum in posterū ipsi inducunt. Dū enim exasperat palpebrā, pungituum dolorē conduplicat. Proinde his quæ ab ægris dicuntur, nō ualde attendere oportet. Doloribus enim perturbati, ignorat id quod ipsos lēdit. Cōuenit igitur post collyrii usum, largo fomēto uti: hinc enim lacrymæ influxus dissoluetur. Deinde solū oui cādīdum præcalescētū infundere. Statim enim à punctura liberantur. Rarefacit enim albumē oui meatus & per uisco sitatē facile euacuat, lacrymā & meatus obducit, ac humorū acrimoniā cōtemperat, & ipsorū tenuitatē ad iustam spissitudinē transmutat. Et in summa, siue punctura infestari, siue nō, infundendū est oui cādīdū per se ipsum, post collyriorū usum. Omnē enim morbosam putredinē deterget. Nā collyriorū essentia quomodocūq; tenuis fuerit, tunicis tamen oculorum ac palpebris insidēs, aspretudinē quandā inducit, quæ ubi oculū cōtigerit, minimē bona censenda est. Quidā porro dolorē obtundere uolentes, & caliditatē & acrimoniā edulcare, lac pro ouo infundūt. Decipiunt autē seipsos ex ignorantia, pro paruo solatio, diuturnā affectionē ægro propinantes. Idem enim faciunt quod hi qui uulneri pinguiā adhibēt, & carnē superexcrecentē augent. Sed & quū lac facile alteretur, à caliditate in oculo præter naturam acrius euadit. Et de calida quidem lippitudine hactenus. Consequenter etiā de frigida dicendum est.

*De frigida oculorum intemperie. Cap. xi.*

In frigida oculorū intemperie minus quā in calida dolores fiunt. Tardius autē curatur, & si successerit in his inflāmatio, tumida fit & colore uelut plūbea. Plerumq; autem oculus his nō ualde perturbatus est, neque rubicundus. Lacryma uero ipsis destillat per paruū angulū, aliquando etiā per magnum modica ac frigidissima. Progressu uero temporis etiā palpebræ inflāmatur, & puncturæ cōsequuntur. Conflatur hæc affectio humorib<sup>9</sup> pituitosis ac frigidis in capite redundātib<sup>9</sup>. Aliquando etiā ex mora in aëre frigido, & maximē post balneū. His igitur rēpestiue præuacuat per clysterē balneū adhibeatur. Sed & uinū dandum est, uelut paulō antē in aphorismo Hippocratis dictū est. Infundendū est autē ipsis incipiente lippitudine collyriū nardinū Zoili ad aquosiorē compagem dilutū. Et quātum lacrymæ imminuuntur, tantū collyrii cōpages inspissetur. Sitq; tibi hic uniuersalis scopus curationis oculorum, ut pro decremento influentium humorum, crassefacias compagem collyriorum quæ adhibētur. Declinante uero lippitudine nardinum collyrium aqua dilutum per specilli nucleum palpebræ sublinatur.

*De oculorū inflatione. ex Demosthene. Cap. xii.*

Inflari oculum dicunt, quū absq; manifesta causā intumescēs, decoloratior & pituitosior ac fortiter pruriginosus sit cū fluxione. Cōtingit autē hoc plerumq; senioribus, pruritu ab angulo ad nasum incipiente, uelut si quis à musca aut culice sit commorsus. Frequēs est hæc affectio in æstate. Curatur spongiæ fomentu. Deinde palpebrā intrinsecus subline melle per se, & cū croco trito. Commodat & liquida Erasistrati panchrestos. Illinendæ sunt & palpebræ forinsecus cū melle. Cōducit & euacuare aluū. Deinde etiā lauare, & temperata calida aqua caput perfundere. Et post balneū dare uinū. At si pruritus uehemens est,

& ætas ac reliqua permiserint, & nihil aliud obstituerit, uena secanda est in cubito, aut aluus purganda. Prodest & aqua marina affusa præsertim hyeme.

*De tumore oculorum.*

*Cap. xiii.*

Tumere oculum dicunt, ubi palpebrā forinsecus eleuari contigit, decoloratiorēq; esse ac grauiorē, & ægrè mobilem. Itemq; dū pallidior apparet. Aliquando etiā album palpebræ aliquantulū excedit nigrum. Est autē tumor laxus forinsecus circa palpebrā obortus, qui digito cōpressus citò cedit, & citò rursus repletur. Est & ut plurimū citra dolorē, & concolor naturali habitui. Fit autē plerumq; à fluxione aquosa. Curandi porro sunt tumores qui circa solas palpebras forinsecus sunt, citra oculi cōsensum, præuacuata per clysterē aluo, solis illitionibus, præmissis fomentis per spongiā. Laxi uero tumores & concolores, præuacuata similiter aluo, & præmissis fomentis, melle illinatur intrinsecus palpebræ sublinato. Prodest & Erasistrati liquida illita. Utendū etiā ad ipsos apophlegmatismis ex melle cocto, uua passa, thymo & pulegio. Acriora uero uitanda sunt, uelut est staphis syluestris, & similia. In quibus autē oculus condolet palpebræ, præuacuata aluo, & inedia imperata, spongiæ fomentū adhibeatur. Aliquando etiā faciei perfusione utendum est, & præsertim ubi pruritus cōsequitur. Deinde absinthiū aut hyssopū tritū supernè illinatur cū melle. Si uero corpus debile fuerit, lentem coquito, & per colum culinarium, aut cribrū, aut rarum panniculum seu linteum excolato, & ammixto melle expressum liquorem illinatur. Quod si æstas fuerit, crocum cum uino mulso illine, aut cū coriandri, aut solani, aut intubi succo. Facit & glauciū. Oculus uero Erasistrati liquida sublinatur, aut aliquo alio medicamento quod plurimam humiditatem ex oculis ducere potest.

*De tumore indurato.*

*Cap. xiiii.*

Fiūt etiā indurati tumores forinsecus circa oculum, plerumq; renitentes ad cōtactū ac duri, progredientes usq; ad malas & supercilia. Hoc autē maximē contingit ex carbunculosis affectionibus, & diuturnis lippitudinibus præcipuē in mulieribus. Oportet igitur ubi palpebræ simul intrinsecus fuerint crassefactæ, ipsas euertere, & collyrijs exasperationi destinatis confricare. Si uero forinsecus solū fuerit affectio, nequaquā oculus sublinatur. Sed frictio totius corporis & induratae partis adhibeatur. Post hæc impendendum est ut oculos claudant, quo interim diutius confricetur. Deinde subscriptū collyrium oculis illinatur. Thuris drach. vi. gummi drac. vi. aluminis scissi drach. i. malicorij drach. i. Trita ex aqua illine, & sicari permittre. Ad uesperam autem linteū molle & lana superligetur. Imò etiā interdiu, si fuerint. Deambulatione utendū est multa & lenta. Vitanda sunt balnea, sol, & reliqua calfactoria, legumina item & bellaria. Ira etiā & detentio spiritus, & uomitus, & coitus tollatur.

*Ulcerū in oculis cōmunis curatio. Scueri. Cap. xv.*

Exulceratur oculus aliquādo extrinsecus aliqua re illabente. Aliquādo ex humorū influxu, aut erosione tunicae agnatæ, siue corniformis, aut palpebrarum, aut angulorū. Curanda autē sunt in cōmuni omnia in oculis quomodocūque fientia ulcera, uniuerso corpori præ omnibus prouidentia adhibita, quo id quod redūdat in habitu tollatur, per uenæ sectionē,



aut purgationē, aut clysterem. Si uero rei circumstan-  
tia omnibus his opus habuerit, omnibus utēdū est.  
Dieta uero constituenda est cōtraria afflictioni, ita  
ut tenuem humorē inspissemus, crassum autem atte-  
nuemus, & uiscosum secemus, corruptorū & acriū  
temperamentū inducētes, & undiq; naturale tempe-  
ramentū ægro exquirētes. Alius autē facile solubi-  
lis semper per cibos reddatur. Et fricatio multa infer-  
narū partiū fiat. Utēdum & deambulationibus plu-  
ribus lentis, & aquæ potui. Et balneū rarissimē ad-  
hibendū. Collyria uero tenera ulcerato oculo infun-  
dantur. Quale est quod Aster appellatur, cōmodissi-  
mum ad ulcera medicamentū. Sed & alba cygnaria  
à colore appellata, & præsertim quæ ex fœnigræci  
succo paratur. Si uero sordidū fuerit ulcus, cū fœni-  
græci succo collyria diluere oportet, & sic infundere.  
Viscositas enim ipsius facile remouet sordes. Possi-  
det autē cum uiscositate etiā laxatoriam facultatem.  
Quare sæpe in ulceribus ipso solo fœnigræci succo  
usū perfecimus quod opus fuit. Si uero multa fuerit  
sordes, ad fœnigræci succū parū mellis addere cōue-  
nit. Oportet autē fœnigræcū exactissimē purgare,  
& sæpe abluere, ac pura dulci aqua madefacere in fi-  
ctili uase probè torrefacto: (uitare enim cōuenit æ-  
neum uas ad eius cocturā) postera uero die diffusa  
aqua, aliā purā adijcere, & ad lentum ignē sumū nō  
edentē coquere. Reijciatur autē primū & secundum  
decoctū, quo omnis amaritudo excludatur. Deinde  
purissima aqua affusa, & olla probè operta, coqui-  
to ad cōpagem mellis liquidioris. postea per linteū  
excolato, fœnogræco nō expresso, sed succo sponte  
defluente cōtentus, utere uelut dictū est. Cæterū deco-  
ctū hoc usq; ad secundā, aut ad summū tertiam diem  
seruare oportet. Inueteratū enim acrius euadit. Post-  
quam autē pura facta sunt ulcera, à fœnigræci succo  
abstinendū est. Et si profundiora fuerint ulcera, libia  
no utendum, aut potius collyrio ex thure. Vbi uero  
incarnata fuerint ulcera & explanata, aut etiā adhuc  
paulò profundiora, adhibēda sunt collyria quæ cic-  
atricē inducere possunt, quale est Cleonis. Et de cōmu-  
ni quidē ulcerū curatione sufficiūt relata. Cōsequēs  
est ut dicamus quomodo ad singulas affectiones in-  
stare oportet. Et primum dicendum est de ulceribus  
ab extrinsecus illabentibus obortis.

*De illabentibus in oculum animalculis aut paleis,  
aut arena, Demosthenis.*

Cap. xvi.

Si in oculū inciderit culex, aut aliud quoddā animal-  
culū, altero oculo clauso, & affecto aperto, animal-  
culum sua sponte prodibit. Si uero palea, aut arena,  
aut tale quid inciderit, tunc etiā idem facere tenta. Si  
uero permanserit, digito exime. Aut potius aquam,  
aut lac, aut aquam mullam instilla. Si autē amplius  
oculo adhæserit per pharmacū quoddam nō inquit-  
nās, & nō acre eripe, quale est qd' ex melle paratur.

*De calce uiua in oculū illapsa.*

Cap. xvii.

Si calx uiua in oculū inciderit, aqua quidē & lac infu-  
sa attrahūt & exurūt. Verū albumē oui infusū, uī u-  
storiā calcis obrūdīt, & eo adhuc magis oleū rosaceū.

*De ulcerationibus ab igne.*

Cap. xviii.

Quæ ab igne sūt ulcera, duriores crustas faciūt. Qua-  
propter frequentius humectentur lacte infuso cum  
albumine oui. Collyrijs autem utendum est ex sti-  
bio, & quod Cleoni inscribitur.

*De his quæ oculo infiguntur.*

Cap. xix.

Si in oculum infixus fuerit aculeus, aut ossiculū, forci-

pe extrahatur, atq; hoc attentē in directū, ne franga-  
tur. Si uero nihil eminuerit, sed æquale corpori fue-  
rit, specilla duo accipito, & nucleis ipsorum utrinq;  
admotis, oculum cōprimito, ut quod infixū est, in  
medio consistat. Vbi uero prominuerit, uolsella ex-  
trahatur. Deinde turturis aut columbæ sanguis in-  
fundatur, aut albumē oui. Si uero statim eximi non  
poterit, oculis infusis & cataplasmatibus ad inflamma-  
tiones congruis curetur. Nam post dies aliquot sup-  
purata punctura, id quod infixum est emerget.

*De sugillatione.*

Cap. xx.

Sugillatio dicitur quum ex plaga quadā, ruptis aut cō-  
tusis uasis in oculorū tunicis sanguis sub tunica sub-  
ierit, & statim quidē cruentus color oculi fuerit, po-  
stea uero liuidus. Sic affectos curare oportet cōmu-  
ni prædicta ulcerū curatione, per uenæ sectionē, aut  
purgationē, & quæ cōsequuntur, infuso cādido oui  
tepido, aut sanguine turturis uel columbæ. Supernē  
uero imponēda est lana uino & rosaceo ac ouo im-  
buta, & deligatio leuis adhibēda. Postera die oculus  
sæpe foueatur per spongiā cum absinthij aut hyssopi  
decocto, forinsecus autē lana imponatur. Quum  
uero oculus ab inflammatione liber factus fuerit, mel-  
le, aut Erasistrati liquida illinatur, aut collyrio aro-  
matico. Bene facit & solani succus cū melle infusus.  
Et thus suffitū cum pari bitumine. Ceterum ad inue-  
teratas sugillationes probè facit hoc. In aeris rubri  
uas pueri incorrupti urinā mittito, & æreo pistillo  
in sole ad multos dies terito, ut multū succum remit-  
tat, & siccātū melle excipito, ac utitor. Apollonius  
autē Memphites ad sugillationes ac uibices, tale col-  
lyrium prodit. Lapidis hæmatitæ, sanguinis asinini  
de corde siccati in sole, æquales portiones cū urina  
pueri incorrupti tere, & cardamines iberidis appel-  
latæ succum adijce ac simul tere, & infunde. Aut col-  
lyria ex his efforma, & usus tempore cū muria in-  
stilla. Aliud. Lapidis hæmatitæ drach. iiii. sangui-  
nis columbæ siccī drach. iiii. sanguinis asinini drac.  
iiii. gummi drac. ii. terito ac utitor, uelut dictū est.

*De puncturis oculorum.*

Cap. xxi.

Omnes pūcturæ in oculo, quales à stylo aut aliqua cō-  
simili re fiunt, post cōmunem prædictam curationē,  
sanguine turturis aut columbæ statim ab initio irri-  
gato, aut oui candido. Et ab initio quidē uitāda sunt  
fomenta & cataplasmata calida. Post quartam uero  
aut tertiam diem, toto copore præeuaquato, spon-  
gis foueto, & cataplasmata ad inflammationes desti-  
nata imposito. Collyria uero adhibeantur leuissi-  
ma, etiā si impura appareāt ulcera. Utēdū igitur est  
spodiaco, & tephro, & astere, ac similibus. Facit &  
collyrium Nili ex rosis aquosum cū ouo instillatū.

*De uulneribus profundioribus.*

Cap. xxii.

Quum profundius & maius factū fuerit in oculo uul-  
nus, ut periculum sit ne effluant ex oculo humores,  
animaduertendum est ne inflammatio succedat, & fe-  
bris subsequatur. Præ omnibus igitur uenæ sectio-  
ne utēdum est, si uires sustineant. nullum est enim ef-  
ficacius auxilium ab initio. Si uero uenæ sectio re-  
linquatur, purgatorio idoneo utamur. sin minus,  
clysteribus aluum subducentibus euacuatio fiat. In  
oculum uero calidum oui instilletur. Et cataplasma  
adhibeatur ex ouo simul contuso uitello, cum rosaceo  
& uino, ita ut leniter tepesfactum & lana exce-  
ptum imponatur. Sequētib; diebus fomentum fiat  
ex decocto rosarum aut meliloti, & infundatur lac  
mulieb're



muliebre cum ovo tepidū. Cataplasmata adhibeantur ad inflammationes descripta, & maxime id quod ex capitibus papaueris, meliloto, croco, & pane paratur. Illinenda est etiā frons ac tempora modico apio cum croco. Sint autem leuia cataplasmata, & superna palpebra sola ex his integatur, quo aperiri possit oculus, & lacrymas influentes excernere. Oculus quoque leuiter deligetur. Si uero aliqui cataplasmata ferre nō possint, his palpebrae, ac tempora, & frons collyrio Nili ex rosis illinatur: Si uero uehemēiores fiunt dolores, caput pilis denudetur, & cucurbita occipiti ac uertici affigatur. Et in noctē quaedam dolorem eximentia in potu exhibeantur. Circa quartam uero aut septimam diem Nili collyriū ex rosis instilletur aquosissimum usque ad perfectā curationem. Cibus dandus est sorbilis, boni succi, uentri cōmodus: oportet enim uentrem semper probē solubilem esse. A uino uero abstinendum est usque ad declinationem. Cauenda sunt autem & quæ caput repleant, & fluxionem iritant.

*De ouiformis humoris excretionē. Cap. xxiii.*

Si puncto oculo ouiformis humor excernatur, ut etiā oculus aliquatū contrahatur, reliqua quidē similiter, uelut dictū est fiāt, ut ne inflammatio succedat. Verum post inflammationis ac ulcerationis declinationem, balneum conducet, & uinum tenue moderatum. Et cibus boni succi, quo humor probē reanutriatur ac rursus expleatur.

*De oculi prolapsu. Cap. xxiiii.*

Prolapsus totius oculi, ex uiolētia quadā capitis plaga contingit, aut ex ulceribus carbunculosis, aut internis uasis ac pelliculis, quibus adhæret oculus, ruptis aut laxatis. Procidit enim quibusdā totus oculus foras, ut à palpebris cōtegi nō possit. Aliquando etiā usque ad malas & supercilia procidit. Atque hoc maxime cōtingit ex casu ab alto loco, aut ex plagis capitis uiolentis. Periculosa est autē affectio. Itaque curatio statim adhibenda est, per uenæ sectionē, aut purgationē. Sed & reliqua adhibeantur quæ relata sunt in cōmuni ulcerum curatione. Contrahendus est cibus, & postea in ouo & rosaceo ac uino simul cōtusus lanam imbue & impone. Deinde uero cataplasma ex meliloto & papaueris capitibus adhibe, cui addita sunt hyoscyami folia cū pane aut psyllio modicē madefacto. Assiduē uero alterentur cataplasmata, ut ne calefactæ partes suppurentur. Sequentibus diebus remittēte inflammatione, cucurbita occipiti cum scarificatione affigatur. Præsentē uero inflammationē, cucurbitæ sunt ineptæ. Assiduē autē ouum & lac tepida instillantur. Remittēte uero inflammatione, collyrio Nili ex rosis cum ouo utendum est. Aut etiam mellis sumi exortis parum ipsi ammiscēdum, ad sanie excernendam. Simul autē sub palpebrā subijciendus est specilli nucleus, ut ne concretio aliqua fiat, quod si prolapsus magnus factus fuerit, & nulla spes est ut uisus restituatur, cataplasmatibus suppurationis utendū est, qualia sunt quæ ex polline fiūt, Sed & lentem cum melle imponere oportet. Et inflammatione declinante balneum petendum est.

*De ulcerationibus superficialibus. ex humorum influxu abortis, nubecula, caligine, epicaumate, & encaumate. Cap. xxv.*

Quæ ex humorū influxu fiunt superficiales ulcerationes, diuersimodē nominantur: caligo enim est ulcus superficiale in nigro oculi factū, consimile caligino-

so aëri, colore cæruleo, quod multū locum nigri occupat. Quū uero in pupilla factū fuerit, nō facile ægrī uidēt. Nubecula autē uocatur profundius ac minus caligine ulcus in nigro, & est colore albius. Epicauma uero dicitur, quū nigrum oculi in superficie exasperatū, inustū fuerit, & colorem cinereū præ se tulerit. Encauma uero est ulcus ut plurimū ex febre fiens, cum crusta impura, in nigro aut albo. Et in nigro dū sit in profundo, plerumque in purgatione, maiore tunicarū corrosione cōtingēte, humores paulatim foras effunduntur, & totus oculus effluit. Has igitur superficialissimas ulcerationes, cū febre aut sine febre fiētes sanare oportet, aluo per clysterē præeua cuata, ita ut collyriū Nili ex rosis aquosius instillemus, & in ipsis interuallis infusionis collyrii, lac infundamus. Præteritis deinde aliquot diebus, ammiscendū est ad Nili collyriū, chiacū appellatū Apolloni, aut aromaticum. Deinde uero etiā meracis his utendum. Citō enim cicatrices, easque tenues & ferē non apparentes inducunt.

*De argemo.*

*Cap. xxvi.*

Argemum est ulcusculū circa iridis circulum factum, partem albi, & partē nigri occupans, & album apparet. Quum igitur profundius & sordidū factum fuerit circa iridis circulū, & citius repurgatum, aliquādo procidit tunica uiformis. Quapropter meatus obducētib. pharmacis in ipsis à principio utendum est, quo ulcera ab inflammatione liberentur, & tunica oculi subnutrita crustam reijciat.

*De fossulis, & concauis ulcerū generibus. Cap. xxvii.*  
Fossulæ appellantur quū in nigro fiunt caua, angusta, & pura ulcera, puncturis similia. Concaua uero uocantur, rotūda & ampliora fossulis ulcera, & minus profunda. Nō igitur ipsa purgare oportet per acria collyria, sed potius per mitia renutrire, & maxime ea quæ fossulæ appellantur. Concaua uero diuturna primū leniter detergētib. curabimus, & deinde ad renutrientia transibimus, qualia sunt quæ ex thure fiunt. Vbi uero explanata fuerint, aut etiā adhuc cauiora sunt, Cleonis collyrio utendū est. Si uero sordes multæ ulceribus insitæ fuerint, aqua mulsā infundatur. Nos autē ad fœnigræci decoctū paratū uelut antea dictū est, modicū mellis ammiscuimus, & citius requestrā assequuti sumus. Vtimur etiā in cauis ac sordidis ulcerib. collyrio Theodori Seueri aquo fiore cū ouo, & citra omnē dolorē repurgat, & celerimē ad cicatricē perducit. Meminisse uero etiā in his oportet prædictæ cōmunis ulcerum curationis.

*De suppuratione aut ungue.*

*Cap. xxviii.*

Suppurationes in ulceribus fientes diuersas appellationes habent. Unguis enim dicitur quum à profundiore ulcere pus defluens, & inter tunicas illapsus, & in circulo iridis figuratum, similem ungui relictō imaginem præ se fert. Ampliore uero pure collecto, & dimidium nigri occupante, aut per totam corneam tunicā pellucēte, suppuratum esse oculum dicimus. Fiūt autē hæc etiam circa exulcerationem, dolore capitis, aut lippitudine prægressa. Contingunt etiam inflammatione prægressa, propter ampliore humorum repletionem diruptis quibusdam uasis, & sanguine ex ipsis profuso suppurato. Consequitur autem ad suppurationem dolor uehemens pulsatorius, & rubor circa oculum totum, & temporum dolor. Curatio faciēda est ab initio relictis somētis, per alui per clysterē euacuationem



tionem. Deinde per uenæ supernæ in cubito sectio-  
nem. Ita ut postea etiā uenam circa magnū oculi an-  
gulum secemus, citra colli ligationē aliās fieri solia-  
ram. Sed & cucurbitā occipiti affigemus, aut hiru-  
dines temporibus. Deinde collyrijs ad inflāmatio-  
nes destinatis utendū est, & maxime Nili ex rosis,  
cum ouo aut lacte aquosius instillato. Post tertiā ue-  
ro diem fomētum per spongiā adhibendum est, mo-  
deratē primum, deinde paulatim semper facta ma-  
iore accessione. Et collyria quidē meatus obstruen-  
tia uitanda sunt. Utendū autē discussorij ac lenien-  
tibus, maxime chiaci Apollonij, & similibus ex  
myrrha paratis, quæ diasmyrna appellantur: Quæ  
enim uehementer discutiunt ac resiccāt, statim quidē  
multā tenuioris euacuationē faciunt. Quod uero re-  
liquum est & crassius cōdensat, & ut ægrè dissolui  
possit resiccāt. Galeni. Medicus quidā apud nos ex-  
pertissimus ophthalmicus etiam capitis cōcussione  
multos sanauit. Et locabat quidem ipsos in sella ere-  
ctos, & utrūq; à lateribus caput appræhēdebat, atq;  
ita cōcutiebat, ut nos manifestē uideremus pus deor-  
sum ferri, & infra manere, propter grauitatē uideli-  
cet. Quū igitur in superficie fuerit pus, & ulceri con-  
tiguū, dum purgatur ulcus omnino etiā in uaporē  
exhalat pus: quum uero ulcus superficiariū fuerit,  
& superius. Pus autē amplius, & in profundo infe-  
rius ulcere, & à pharmacis non excolatur, oculū sub  
pure perpungere oportet, acu oblique circa iridē &  
coronā appellatā immisso, & pus excernere. Atque  
hanc chirurgiā locis non inflāmatīs adhibere opor-  
tet. Suppurationes autē in albo tunicæ agnatæ fiētes,  
scalpro uenæ sectorio ex inferna parte diuidito, &  
tunicā agnatā leniter subexcoriato. Cæterū post hu-  
moris euacuationē, in utrisq; oui cādūm instilla-  
to. Deinde integrū ouum cū uino mulso cōquassa-  
to, & molli lana exceptā oculo superposito ac deli-  
gato. Postera uero die fomento ex aqua calida per  
spongiā adhibito, & ouo infuso, rursus prædictū la-  
næ hapsū imponito, & post tridū collyrio Dio-  
nis illinito, aut quopiā ex his quæ ad perpūctiones  
adhibētur. Est autē Dionis collyriū hoc. Spodij dra-  
c. i. i. thuris, squame æris, myrrhæ, acaciæ, spicē nardī,  
opij, singulorū dra. i. gūmi drac. vi. excipe aqua plu-  
uiali. Vlu uero expetēte infunde cū candido oui, &  
prædictū lanæ hapsū superpone. Si uero postquā  
inflāmatio cessauit, caro ex diuisione prominuerit,  
prædictum collyrium cū lacte dilutum illine. Pro-  
bè etiam deprimit & repurgat chiaci Apollonij.

De pustulis.

Cap. xxix.

Pustulæ fiunt & in albo, & in palpebris. Plerunq; ue-  
ro circa corniformem tunicam. Et aliæ in superficie  
fiunt, aliæ in profundo: cōstat enim tunica cornifor-  
mis ex quatuor uelut mēbranosis corpusculis, den-  
sissimis ac fortissimis. Aliquando igitur sub prima  
membrana pustulā fieri contingit, quando etiam co-  
lorem nigriore præ se fert. Aliquādo sub secūda aut  
tertia cōsistit, quando sanè etiā albidior pustulæ co-  
lor fit, eò quod in profundo tunicæ corniformis oc-  
cultatur: naturalis enim pustulæ color niger est. Tu-  
nica uero corniformis alba est, & cornibus simili-  
ma. In quantū igitur in profundo corniformis tunicæ  
pustula occultatur, in tantū colorē assimilat, & ma-  
iorem dolorē inducit, & molestior est. Nā siue ob  
plenitudinē rupta fuerit pustula, siue ab acrimonia  
corrofa, ut tunica ulceretur, facilis curatu est superfi-

ciaria ulceratio. Difficilis autē profunda. Periculum  
est enim ne reliquū corniformis in profundo tenue  
existēs rumpatur, & uiformis procidat, ac effluāt  
oculi humores. Præsertim si iuxta pupillam ruptio  
fiat. Facta enim iuxta pupillā ruptione, etiam si pro-  
more ægri, tamē aliud quid graue cōsequitur. Nam  
inducta ulceribus cicatrice, homo non uidebit, pro-  
pter inductas cicatrices. Quandoquidē uero aliquā-  
do etiā ob corniformis corrosionē uiformis tuni-  
ca procidit, & superficialis pustulæ imaginationē fa-  
cit, operæpretiū est de his exactius distinguere. Pu-  
stula itaque superficialis, similiter undiq; nigra est,  
nō tamē nigredine exactē saturata. At in uiformi  
tunica pars quæ procidit, aut nigra est, aut cærulea.  
Quod uero maximū signum est, fundum prolapsæ  
uiformis per circulū reperies albū. Alba est enim  
colore corniformis tunica, qua rupta uiformis  
procidit. Sed & pupillæ magnitudo imminuitur in  
uiformis prolapsu, aut sanè omnino euariat secun-  
dū figuram: nō enim pupilla exactē conseruat rotū-  
dam figurā in prolapsu, sed iuxta partē quandā ue-  
lut diuulsa apparet. Proinde relatis signis diligenter  
intēdere oportet, & affectiones inter se distinguere.  
Nā iuxta affectionū differētiās etiam curationē ua-  
riare oportet. In prolapsu enim uiformis, magis  
adstringētibus ac repulsorijjs utimur. In pustulis ue-  
ro his quæ leniter discutiūt. Curādæ igitur sunt pu-  
stulæ ita ut caueamus primū multiloquiū, sternuta-  
tiones, iras, spiritus, detēctiones, clarū splēdorē, deīn-  
de cōtrahendus est etiā potus ac cibus, & ad alui eua-  
cuationē acri clystere utendū est. Tērandū quoq; ut  
lacte aluus soluator, in quibus id neq; acēsit, neq;  
in nidorē uertitur, neq; uomitu reijcitur. In talibus  
enim uitandū est lac, & utendū gallinæ iure, aut eni-  
ci succo, aut aloē, aut per simplicius quoddam aluus  
soluenda. Vitanda sunt etiā uehementiora purgatiua,  
& maxime quæ stomacho sunt magis infesta. Deli-  
gationes autē & multos lanæ hapsos in his reproba-  
mus. Valde enim nocent nō solū in his, sed etiam in  
omni lipplitudine, ex humorū acrimonia facta. Ca-  
taplasmata igitur adhibere oportet, ubi inflāmatio  
affuerit, maxime in principio, leuia quidē, sed lata.  
Sunt enim cataplasmata tenuibus ac mollibus lin-  
teolis illinēda, & super totū oculū imponēda, super  
cilio ac mala & tēpore simul cōprehensio, & sinen-  
da, quā diu fuerint madida. Postquā uero siccata  
fuerint, tollenda & alia imponēda. Adhibeantur ea  
quæ ad inflāmationē cōgruūt, uelut est tenue ouorū,  
& uitelli ouorū tritū cū croco ac modico opio, mo-  
deratoq; passo ac pane. Conueniūt etiā adstringētia,  
uelut sunt mala cydonia cocta, aut malicorium in a-  
qua coctū. Verum uitandū est, uelut dixi, ne oculus  
in his diutius deligetur: est enim nocētissimum hoc.  
Mitigata uero inflāmatione, etiā ab emplastris absti-  
nendū est, propter grauitatē. Collyria uero in princi-  
pio cōueniūt, Nili ex rosis, cū lacte dilutū & infusū.  
Proficiēte autē curatione, adhibendū est id quod ex-  
thure, myrrha, ac croco paratur. Postea etiā nardī-  
na. Forinsecus autem illinendæ sunt palpebræ colli-  
rio Nili ex rosis, frons uero acacia & hypocisthīde,  
cū croco & modico opio. Fomēta ab initio tepida  
adhibeantur. Nam intentā à principio inflamma-  
tiones exacerbant. Postea uero caliditatē intendere  
oportet. Deambulationes & alij motus ab initio nō  
conueniūt. Balnea uero & reliqua uaporatoria fo-  
menta



menta post principium. A uino abstinere oportet per omnē curationē, & aqua calida in potu uti, & cibos molles ac faciliē concoctiles accipere. Fugienda est in his sanguinis ex fronte aut uenis angularibus detractio: procidit enim oculus, & maximē si inflāmatio simul affuerit, aut profundior exulceratio.

*De carbunculis in palpebris Seueri. Cap. xxx.*

Quandoquidem carbūculi sunt ex genere pustularū, & fiunt hi quoq; aliquando in palpebris, oculumq; ad maximū consensum perducūt, age & ad hos pauca auxilia proferamus, dinotiones ipsorū primum exponentes, quū sint etiam aliq; quidam abscessus palpebrarū, qui imperitis carbūculi uideri possint. Nā & ordeolum tuberculū, & panī, & uari circa palpebras fiunt, sed cum tumore quodā hæc, & ferē citra inflāmatōnē, & non cū uehementi dolore. Carbunculi uero ruborē ab initio habent, ut oculū sibi perurri putent: tumorem uero aut eminentiam nō statim inducunt. Nam ob immodicā caliditatem, uelut ruptionē quandā carbunculus sustinet, & quod effluit ex ipso quū sit acre ac mordax, superficiē quidē carbunculi resiccat, & crustā inducit, uicinis uero lotis morbum inserit. Cōsequitur igitur ad ipsos fortis inflāmatio, tū ipsius oculi, tum partium circūsitaram, & maxime glandularum circa aures, ut quandoq; magnarum ulcerationum, & ruptionū oculi causa fiunt, insuperq; prolapsuū, & nuditatis palpebrarū. Et cicatrices à carbunculis crassæ fiunt, & assidue ulcerantur. Et in reliquo quidem corpore sanguis qui effluit ex carbūculis niger reperitur, propter superaffationē. In oculis autē sanguis nō omnino ex carbunculis manat, eò quod neq; reducet in oculo sanguis. Vnde plerunq; etiā albi colore sunt carbūculi in palpebris. Et si quidē emotio affectionis cito contigerit per cōuenientem curationē, carbunculus penitus disparerit. Si uero durauerit, & ægrē discuti poterit, necessariò locus nigrescit. Proinde incipientibus carbunculis nō statim ad cataplasmata & illitiones progredi oportet, sed per clysterem primū aluū euacuare. Deinde lactē moderatē cocto purgare. In sanguineis corporibus etiā uena secanda est. Postea per spongas fomentū adhibendū, primū ex simplicioribus. Adstringentibus enim & frigefacientibus, & aliquando etiā resiccantibus pharmacis usi, hos sanabimus. In principio igitur, quū feruor adest, tumorem extinguere conantes, coriandro trito ruborem oculi illinimus. Et solanū cum passo tritū & carbunculo adhibitū, statim ipsum abolet. Atq; hic ductus in principijs magnopere prodest. At frigefaciētia cataplasmata oculo in carbunculis adhibita, repellunt quidē id quod influit carbunculo, & externas inflāmatōnes sedant, uerū periculū est ne in ipsum oculū impetū faciat: hoc enim solanū aliquando perpetravit. Adhibitū enim cū passo statim quidē tumorem aboleuit, oculus autē hinc repletus est. Cæterū carbunculos iā depascentes uarie curare oportet. Nam quod defluit acre ac mordax existit, ut etiā uicinos locos depascatur, & periculū sit ne oculus ledatur: solet enim erosio his cōtingere. Conuenit igitur spōgia detergere, & oculū moderatē perfundere, rosarū, aut rubi, aut pampinorū uitis decocto. Sit autem tepidius decoctū, aut potius lactei reporis. Quod si eū sordidi fiāt loci, ex eo quod nome depasces preualuit (sæpe enim etiam palpebræ excidunt) ad hu-

ijsmodi fluxiones etiam hypocisthidis succū aquæ ammiscemus, & myrtū & acaciā passo diluta locis illinimus. Oportet enim pro corporis curandi ratione, etiam materias eligere maximē medias. Valde enim efficacia pharmaca loci nō sustinent, qualis est ærugo, & similia. Per mordacitatē enim etiā salutis spem habeat oculus, hac quoq; priuatur: neruosæ enim partes & præsertim carnibus denudatæ, à uehementer mordacibus læduntur, ut etiā cariem inducant. Malicoriū itaq; ex malis punicis acidis cū lenticula feruefacimus, & de rafa interna parte, cum modico melle terimus, & ex eius usu magnopere proficimus: celerem enim purgationē facit, & humores qui oculis inferuntur, quodammodo supprimit. Nā pinguis nomas augent. Aucta uero noma, in uino malicoriū coquere oportet, & per se citra lenticulā imponere. Crustas autē magis malicoriū coctum tritum cū melle impositum resoluit. Sunt & cōposita pharmaca carbunculis conuenientissima. In principijs enim feruorū, pastillus ex halicacabis illitus excellenter extinguit. Frigefacit enim & resiccat moderatē: Si uero cōtrahere oportet carnem superexcrecentē, Musæ pastillum aridū tritum adhibemus. Si uero incarnatione opus est, ipsum Musæ pastillum cū sapa dissolutum illinimus. At si cicatricem inducere intendimus, rursus pastillū ex halicacabis assumimus. Apollonius autē ait: Ad carbunculos oculorū hoc pharmaco utimur. Spodij drach. iiii. lapidis scissilis drach. ii. croci obol. iiii. myrrhæ paululum torrefactæ obol. iiii. Terito cū uino odorato donec arecant, & passi cretici, aut alterius non acris heminā ammisce, cōtere, excipe ac subline. Disparat crustas, & purgat ulcera, siue extra palpebras affectio fuerit, siue intrinsecus in profundo. Facit & ad fluxionē ac inflāmatōnes. Si uero dolor oculum uexarit, hoc collyriū illine, & euestigiò sistet nomē. Recremēti plūbi triti loti & exiccati drac. iiii. spicē nardi drach. i. gummi drac. ii. foliorū oleæ centum uiginti succū. Succum aquæ hemina ad folia adiecta exprimito, excolatoq; & ad reliqua cōterenda utitor. Facit & collyriū Nili ex rosis cū ouo infusum. Maximē uero Nardinū candido inscriptū, per submissionē palpebræ sublitū, usq; ad perfectam curationē: oportet enim ubi pura facta sunt ulcera, fomēto præmisso, specilli nucleū lacte tingere, & palpebris submittere, atq; angulos inter se disparare, ne distorta cōcretio fiat. Et ob hoc neq; oculū deligare oportet, maximē post ulcerū purgationē. Nam circa principia si inflāmatōnes maximæ & distentiones fuerint, lenticulæ coctæ cataplasma cū pane imponere cogimur. Sed & psylliū impositū inflāmatōnes mitigat. In doloribus enim aliarū oculi inflāmatōnū adhibitū, somnū inducit. Sint autē leuissima cataplasmata. Sed neq; diu in cataplasmatū usu perseverare oportet. Augēt enim putrefactionē, & oculum magnopere ledūt, uelut etiā in pustulis prædictum est. Postq; igitur aliquatū mitigauim⁹ inflāmatōnes, statim à cataplasmatīs, tū in carbūculis tū in pustulis abstinebim⁹. At uero in locis circa aures per cōsensū inflāmatīs, splenium ex cerato butyrino imposito.

*De canceratis oculorum ulceribus. Cap. xxxi.*

Vlculcula in nigro oculi fiētia, cicatricem nō recipiētia, parua, dolorosa, parua uasa habentia uaricosa, cancerata dicuntur. Et aliquando quum cicatricem accepisse



accepisse putantur, resoluuntur citra manifestā causam. Fiunt autē in his punctoriū discursus usq; ad tempora. Et cōsequitur in ipsis fluxio humoris moderatē acris ac tenuis. Et albū in oculo itemq; nigrū, semper rubicundū est. Et auersantur cibū. Augentur autem ipsis uehemēter dolores, illitis acrioribus medicamentis. Cōtingit hęc affectio maximē senioribus, ex diuturnis lippitudinibus. Et foeminis quibus menses defecerunt. Curatio porro adhibenda est, habita totius corporis cura, cū prædictione quod fieri non possit ut perfectē sanentur, sed fieri posse ut mitigentur, primū per conuenientem diætā; deinde etiam per pharmaca dolores lenire potentia. Diætā igitur huiusmodi sit. Postquā à lecto surrexerunt, corpus moderate illinant oleo dulci. Caput autē modico rosaceo aut omphacino. Et uiridi sindone oculo prætenta, deambulare iubeto in tenebroso ac nō uentoso loco, cū silentio & absq; alia distentione, ita ut neq; caput agitent, quantū eius fieri potest. Postquā autē ampliore & lenta deambulatione usi fuerint, ad domiciliū tenebrosum, & nō ualde lucidū se recipiāt, & rursus ab alio corpus ipsorum illinatur, excepto capite, cōfrictis maximē lūbis ac infernis partibus. Postea uero lactis moderatē cocti, remora cōcretione superstante, heminæ mensurā accipiant. Nā acrimonias quæ affluunt hebetat, & aluum faciliē solubile facit. Si uero ineptus sit ad lactis potū, pollinē polentę passo moderatē calido diluto inspergito, & sorbendū dato: Postea si fame uexetur, duobus ouis sorbilibus utatur, & somnum diurnū uitent. Circa decimā autem horā cōfricti assumāt panem purū, cum obsonio quodā uiscosum quippiā habente, uelut sunt oua sorbilia, cerebellum porcinū duabus aquis coctum. Ex piscibus muræna, torpedo, glauciscus. Ex oleribus malua, atriplex, lactuca. Assumenda etiā alica ac oryza, & laganū in gallinæ iusculo coctū, & pedes suilli ac tali probe cocti. Omnia uero sint moderata. Vinū bibant & tenue subadstringens, & ipsum moderatum. Ab omnibus autē salsa mētis & leguminibus penitus abstineāt. Item à balneo, nisi necessariū hoc fuerit, aut lassitudinis gratia, aut tardæ concoctionis. Atq; tunc tardandū in ipso est, sed citò exeundū. Doloze uerò & fluxione oborta illinatur pharmaca lenia ad pura ulcera cōuenientia, uelut est spodiācū, & collyriū Cleonis, & similia. In oculū autē assidue infundendū est ouū, aut lac muliebre repidum. Mitigat etiā lentis decoctū infusum, aut plāraginis, aut portulaca. Verū ad temporū dolores utendū est collyrio Nili ex rosis. Si uero ad uehemētes inflammationes cataplasmatibus uti cogamur, cataplasmate ex papaueris capitibus utendū est leuissimū. Antea enim dictū est quod fugere oportet cataplasmata in oculis calidā affectionem habentibus. Ammiscēdum est autē cataplasmati ex papaueris capitibus, in his & crocus, & lac muliebre.

*De malignis oculorū ulceribus.* Cap. xxxii. Fiunt & alia maligna ulcera, partim à magno angulo initū sumentia, partim à nigro, partim ab albo, & oculū citò corrodūt, & præsertim in corporibus uiciosis humoribus refertis, & quæ acrum rerum esu uita sunt. Sanies etiā ab ulcere manat multa ac graueolens, & sequuntur dolores uehemētes ac febres. Sæpe etiam alui fluxus. Depascuntur etiam aliquādo ulcera uicinos oculis locos. Curandæ uero sunt

etiam huiusmodi nomæ, per prædictæ diætæ usum. Veruntamen eiusmodi exhibenda sunt quæ aluum non soluūt. Vnde in his magis uolucriū genere utendū est, maximē montanarū. In oculū uero infundendū est lac, aut ouū, & prædicta collyria. Si uero nome transgressa fuerit oculos, curatio ita fiat. Pompholygem optimē lotam, ex muliebri lacte illinere oportet, & superimponere, sanie prius per aquam elota, deinde per lac. Facit similiter & cerusa lota ac siccata, & cum lacte adhibita. Et plūbi lotura sicca, quæ cōfrictio plumbeo mortario cum plumbeo pistillo colligitur. Facit & plumbi recrementum lotum, & amyllum. Singula cū lacte muliebri. Cataplasmata uero si coacti fuerimus adhibere, mala cydonia cocta adhibeantur, aut rosæ uirides, aut siccæ uino maceratæ, polygonum item ac solanū, & semperuiuum, & seris cum polentæ polline. Si uero uasa in fronte ac temporibus fuerint eleuata, etiam sectionis uasorum rationem habere oportet.

*De myocephalis.*

Cap. xxxiii.

Quum ulcera quæ propter erosionem aut ruptionem corniformis tunicæ fiunt, profunda euadunt, pars aciniformis tunicæ procidit, & quod prolapsum est nigrum aut cæruleum apparet. In circuitu uero circa fundum eius partis quæ procidit, labia corniformis tunicæ alba apparēt. Et si adhuc magis pars prolapsa durauerit, labia ruptionis tunicæ corniformis callosiora facta adhuc magis alba apparent. Diuulsa est autem omnino in uuiiformis siue aciniformis tunicæ prolapsu pupilla ipsa, ut omnino nō appareat, aut & situ & figura immutata. Et per hęc discriminatur myocephalon à pustula. Dicitur autem myocephalon, quoniā figura simile est capiti muscæ. Repulsorij autē & adstringētibz opus habet pharmacis, qualia sunt maxime quæ ex uino fiunt. Est autem & hoc celebre ad ipsum: Cadmiæ, æris, chalcitidis crudæ, singulorū unc. i. æruginis drachm. iiii. myrrhæ troglodyticæ drach. ii. & dimidiā, croci drach. iiii. salis ammoniaci drach. iiii. gummi drach. iiii. Excipe uino ueteri adstringente. Aliud, ad pterygia, carnis incrementum iuxta magnum oculi angulum, aspritudines, Exterit etiam cicatrices. In alio exemplari reperi, etiam staphylomata facere. Misys crudi drach. xii. cū aquæ cochleario terito, deinde croci leuissimē triti drach. xx. adijcito, ac rursus terito, & additis myrrhæ drach. iiii. excipito ac utitor. Post illitionē uero ex ipso factam, spongiā teneram imposito ac deligato. Aliud bonum. Facit & ad data staphylomata. Misys crudi sextantem, croci unc. i. gummi unc. i. tere cum uino & utere. Mirificē etiam facit in ipsis theodotiū Seueri, & si quidem inflammatio non affuerit, crassius illine: si uero affuerit, cum ouo infunde. Adhibeatur ipsis quoque conueniens deligatio. Et inflammationis cataplasma ex papaueris capitibus impones. Aut psyllium aqua calida madefactum. Collyrium Hori faciens ad myocephala cū Theodotio. Facit & ad diuturnas tenues fluxiones. Cadmiæ, squamæ æris, croci singulorum drachm. viii. opij drachm. xii. misys usti, myrrhæ, acaciæ, gummi, singulorum drachm. iiii. Excipe aqua.

*De staphylomate.*

Cap. xxxiiii.

Differentiæ staphylomatum plures sunt: Nam & causæ affectionis uariæ sunt, plerūq; tamē quomodo cūq;



cunq; factū fuerit staphyloma, uisum destruit. Appellatur autē staphyloma, quum corniformis tunica fuerit eleuata, & eminentiā acino uuae similem fecerit. Fit autem aliquando humoribus sub aliquam corniformis tunice striam collectis, à quibus humoribus coactā corniformem tunicā sustinere contingit ac eleuari & incuruari, facereq; staphyloma cūtra ruptionē. Fit hoc etiam ex pustula quadam inter strias corniformis tunice satis profunde cōsistente, quæ tunicam eleuauit, non tamen rupit. Appellant etiam staphyloma quam ob corniformis tunice rupturam, magnus uniformis tunice prolapsus factus fuerit. Differt hoc à primo, quoniam in illo eleuatio sola est tunice corniformis, unde etiam tota moles albidior apparet. In hoc uero ruptura quoq; facta est tunice corniformis, & quod prolapsum est, cæruleum aut nigrū apparet. Quum autē maximum factum fuerit staphyloma, ut extra palpebras transgrediatur, & induretur, ita ut ipsa corniformis circum circa callosa facta sit, & talem affectionē cōstringat, clauus appellatur, quoniā per omnia clauī capiti similis existit. Hæc igitur affectio quomodocunque fiat, duobus malis subiacer, uisus uidelicet detrimento, & figuræ deformitati. Et sic quidē affectū oculū ad naturālē statū reducere, impossibile est artī. Figuræ uero deformitati cōsiliū cōtingere potest, maxime per chirurgiā. Quæcūq; igitur staphylomata recentia sunt, & propter inflammationē eleuata sunt tunice, curāda sunt cataplasmatū ad inflammationes descriptōrū usu, & simili quoq; diæta. In quibus autē sub corniformis strias humores aliqui collecti eleuationē fecerunt, si dolor affuerit, semen lini cū foenogracō ex aqua mulla cocta imponemus. Declinantibus uero doloribus, farinā fabaceam cū rosīs aut semine lini ex aqua impone. Aut rubi folia, aut bryoniæ botros immaturos. cū butyro & terebinthina, æqualibus portionibus impone, & deliga. Ad dolores uero cōuenit etiam solani succus cum lacte muliebri infusus. Collyriū autem ad non inflāmata staphylomata cōmodū hoc est. Alcyoni drach. iiii. salis ammoniaci unc. i. spumę nītri drach. i. lacrymę oleæ syluestris drach. i. gummi sextantem. Excipe aqua. At Theodotium Seueri brasiacæ succo dilutum, & crassius oculo adhibitū, unā cū spongię deligatione, molē dissipat, si nō diuturna fuerit affectio. Cæterū ægrē curātur staphylomata quæ ampliōrē fundū habent, & quæ uenas sanguine plenas habēt. Incurabilia autē sunt eminentiā, & colore uaria, & temporū dolores inducētia. His sane nihil aliud adhibedū est, quā ea quæ dolores mitigare possunt, quæ in malignis ulceribus iam antē relata sunt.

*Staphylomatum chirurgia.* Cap. xxxv.

In staphylomatis quæ angustū habent, & nō maligna sunt, cōmoda est actio secūdum cōstrictionē appellata, cuius hic est modus. Duas acus accipere oportet filiū duplex intortū habentes æquali prorsus longitudine. Deinde hominē ad pedes tuos collocato, capite ipsius reflexo, ita ut occiput ipsius genibus tuis innitatur. Et deinde disparatis palpebris, per medium staphylomatis fundum, ex supernis deorsum acum transmittito. Sit autem non ualde crassa, neq; oblonga. deinde dum detinetur oculus ab acu transmissa, alterā acum duplex filiū habentē similiter transmittito à paruo angulo ad magnū, per mediū itidē staphylomatis fundū, quo figura duarū acuum tras-

missarum cruciformis fiat, aut literæ græcæ x. similis. Nam quū paulō obliquior facta fuerit transmissio, facilius acus extrahitur. Deinde incilis duplicatorum filorū principijs, superna duo principia, superno acus principio subiicientes, inferna uero inferno, strennuē constringimus. similiter autem & oblique acus principia constringimus: optima uero cōstrictio fit rectis principijs ad obliqua ductis, & hoc modo colligatis. Deinde apicem staphylomatis resecamus, solo fundo ipsius relicto gratia filorū, ut ne elapsis ipsis humores oculi effundantur, & oculus cauior fiat. Cur autem staphyloma excidimus: primū quidē compendiarie curationis gratia. Citius enim fila excidunt, & ulceratio curatur. Deinde etiā minori dolore æger affligitur per totū curationis tempus, quū & corpora transpirent, & neq; magna inflāmatio cōsequatur. Post resectionē uero apicis staphylomatis, acus extrahere oportet, filis uelut dictū est cōstrictis, & tunc lac infundere, aut ouī cādidū. Supernē uero oculo imponatur ouī cū rosaceo ac modico uīno cōcussū, & molli lana exceptū. Imponatur etiā temporī alius lanæ hapsus hīdem imbutus. Et facta deligatione, æger in quiete seruetur. Postera die fomentū fiat per spongas probe expressas, & lacte infuso, lana ouo imbuta imponatur & deligetur. Atq; hoc faciendū est per plures dies, donec fila excidant. Elapsis autē filis illinantur tenera ad ulcera descripta, ut pura exulceratio fiat. Deinde cicatricem inducentibus utendum est.

*De ulceribus cicatrice indigentibus.* Cap. xxxvi.

Purgatis oculorum ulceribus, & expletionē indigentibus, animaduertere oportet ut ne carne redundant, sed aliquanto cauius ad cicatricem perueniant. præsertim si in pupilla fuerit ulcus. Nam supereminentes cicatrices uisum impediūt, & deformitatem afferunt, & dum ex palpebris punguntur, fluxiones inducunt. Quæ uero aliquantulū cauæ sunt, melius apparent ac splendorem excipiunt, & decorē si fuerint partim cōcolores. Tales autē consequuntur, si à molibus & meatibus obstruentibus pharmacis, compendioso ad cicatricem inducentiā transeamus. Præstat autem si aliquādo clandestinē caro superexcreuit, citō reprimere ac eminentias attenuare, & sic cicatricem inducere. Vitanda autē sunt tingentia cicatrices pharmacæ, & maxime si iuxta pupillam fuerit ulcus: dū enim denigrantur, impediunt uisum. Sed & deligationes oculorū in ulcerationibus uitandæ sunt, quibus aliqui utūtur uolentes humiliare cicatrices. Deligatus enim exulceratus oculus, & immobilis factus, sæpe palpebris agnascuntur. Porro ulcera ad cicatricē perducta diligenter notare oportet. Quidā enim decipiuntur, & cauiōres factas cicatrices, caua ulcera esse putātes, mollia & replentia collyria illinunt. Deinde cōtingit locos quidē non impleri, uerum tunicas ex hoc crassas fieri. Quū itaq; superficiē ulceris clarā factam uideris, & albam ac leuē: & album oculi naturalem colorē recepisse, & totū oculum à fluxione liberatum, scito cessisse iam ulcus, & cicatricem inductam esse. Est autem optimum collyrium quo usi sumus in puris ulceribus & cicatrice indigentibus, quod Cleoni inscribitur.

*De cicatricibus & albuginibus.* Cap. xxxvii.

Omnes cicatrices in nigro oculi albæ apparēt. Densata enim corniformi tunica subiectus ipsi cæruleus color non translucet. Maxime tamen supereminentes



tes albescunt. Aequales autē minus sunt albę. Caulo-  
res uero quodāmodo cōcolores sunt nigro. Quę ue-  
ro adstringentibus pharmacis usq; ad inductā cica-  
tricem curantur, magis obscurantur, eō quod pellis-  
culę per adstrictionem multum densantur. At uero  
callosas ac diuturnas & crassas cicatrices curare non  
oportet. Necesse est enim in talibus, collyrijs ualde  
acribus uti, & à uehementi mordacitate alię oculi  
partes ulcerabuntur. Si uero etiā suffusio aut glauce  
do affuerit, uanū est cicatrices extergere. Oportet au-  
tem eum qui cicatricem exterere uelit, per uictū cor-  
pus accommodare, quo moderata materia & boni  
succī, in toto corpore adsit. Itaq; ab omnibus acri-  
bus abstinere oportet, falsisq; ac crassi succi cibis. Et  
à multo uino. Et bonę cōcoctionis maximē curam  
gerere, & moderatē boni succi eduljs uti. A balneo  
uero curationis tempore abstinendum est. Illitio au-  
tem facienda est ante cibū, ubi probe cōcoxit, & ca-  
pite ac toto corpore leuis est, uētris onere prius de-  
posito, & nō statim à lecto ad illitionē transeundū,  
neq; ante coenā. Vitanda sunt excoctantia cicatrices  
pharmaca. Quidā enim illinentes ipsas acribus me-  
dicamentis, & excoctant, ac candida ramenta per spō-  
gias detrahentes, ea in coticulis nigris circumferētes  
ostentāt. Deinde illinūt aliquod medicamentū quod  
tingere potest. Verum fluxionibus succedētib; ex  
pharmacorum acrimonia, itemq; inflātionibus,  
& aliquando resolutis cicatricibus, ulcera magis  
profunda fiunt. Deinde cogantur rursus adstringen-  
tibus ac meatus obstruentibus collyrijs uti, & cica-  
trices magis crassas faciunt.

*Materia attenuans cicatrices & albugines, Ga-  
leni.* Cap. xxxviii.

Proinde in his quę attenuari possunt, utendū est phar-  
macis moderatē extergentibus. Exterforia autē non  
minima facultate, participat æs ustum, & squama  
æris, & flos eiusdē, & chalcitis usta. Si uero lota fue-  
rint talia, exterforia quidē adhuc manent. Tanto ue-  
ro imbecilliora actionibus fiunt, quāto etiā leuiora.  
Securius est autem leuioribus uti. At fortiora his  
sunt, Misy, & ærugo. Quare etiam ad sycofes & cal-  
los cōueniunt, si ammiscentur. Quidam his adijciūt  
etiam gallas, pharmacum uehementer adstringens.  
Sed uehementius est adstrictione simulq; acrimo-  
nia atramentum sutorium. Multo uero moderatius  
euadit ustum ac lotū. Eiusdem materię est & squa-  
ma ferri stomomatis. Quęcunq; igitur ex adstrin-  
gentibus multum terream compagem habent, aspri-  
tudines sycofesq; accallos eliquāt, uelut sunt Misy,  
& ærugo, & similia. Quę uero ex succorum gene-  
re sunt, uelut omphaciū & hypocistis, glauciumq;  
& acacia, in subliationibus facile cum lacryma eluū-  
tur. Citra mordacitatem autē extergent, cornu cera-  
ui ustum, & cornua caprarum. At thus tardissimę  
particeps est extergēdi facultatis, eximitq; dolorem  
accōcoquit. Prædictorū uero animalium cornua,  
exterforia quidē sunt, sed neq; uim eximēdi do-  
lorem, neq; cōcoctoriā habent, quum frigidę ac  
siccę sint temperaturę. Thuris autē cortex adstrin-  
git quidē & ipse nō instrēnuē, sed multum omni-  
bus prædictis inferior est. Thuris uero inter onera  
cōfracti pollen, quod mannā dicunt, differt à thure,  
eo quod modicam adstrictionem assumpsit. Parua  
enim quædā corticis segmenta ipsi ammixta repe-

riuntur. Habet & armeniū appellatū uim extergen-  
di, quo uidelicet utuntur pictores. Item atramentū  
indicū, & propterea ulceribus nō inflammatis citra  
molestiam adhibetur. At aloē mixtę facultatis est,  
uelut etiā rosa. Habet enim amarū quiddam, quod  
extergit. Habet & adstringēs quiddam, quo cōtra-  
hit ulcera & ad cicatricē ducit. Sal uero ammonia-  
cus, & lapis Alus, & flos ipsius, fortissima sunt  
pharmaca. Quare etiā ad scabras oculorum affectio-  
nes cōueniunt. Cæterum ex aromaticis cōmodē his  
miscentur, casia & malabathrum, ac amomū, discus-  
soria quidē facultate prædita, uerum etiam adstri-  
ctione participantia. Nam in communi de omnibus  
exterforijs medicamentis nosse oportet, quę mode-  
rata sunt, & quę sycofes ac collas consumunt, ea o-  
mnia etiam ad cicatrices crassas conueniunt.

*Auxilia ad cicatrices & albugines. Cap. xxxix.*  
Ad albugines dracunculi semen habentis occultatum  
in terra simile piperi, id ipsum semen accipe, & tritū  
cum melle illine. Aliud, ad cicatrices & hebetudinē  
uisus. Seminis rutę scrup. ii. armeniāci scrup. viii.  
salis ammoniaci scrup. iiii. ammoniaci thymiamatis  
scrup. iiii. utere sicco. Aliud. Cicatrices recentes ex-  
terit citra omnē molestiam, lac equinum cum mo-  
dico melle assidue illitum. Aut anethi florem purpu-  
rascentem cū modica aqua terito, & per linteum ex-  
colato, ac succū oculo bis in die instillato. Et postea  
cūcumeris hortensis semen cōmande, & expressum  
per linteolum succum in oculum instilla, & hoc as-  
sidue facito. Aliud ad albugines. Sideritidis her-  
bæ fructū leuissime tritum insuffla. Deinde cōpræ-  
hensum manu oculum, frigida aqua paululum pro-  
lue. Exterget etiā generose. Alcyonium milesiū cum  
melle. Ammoniacum thymiamata tritū cum uino &  
melle. Quod si puero paruo albugo facta fuerit in  
oculo, mater pueri ammoniacum cōmandet, & in  
pueri oculum sufflet. Facit & Anemones radix bul-  
biformis leuissime trita illita. Et anagallidis ceruleū  
florē habētis succus cum melle. Aliud Capnī Che-  
lidonī appellati succus cum melle. Nitrū cum oleo  
ueteri, mentę succus mirifice facit. Columbę fimus  
in cote cum aqua dilutus præter opinionē facit. Item  
felis fel illitum. Aliud ad albugines certum. Buty-  
rum liquefactum solum illine, summe prodest, &  
utere. De hoc plura promittere nō oportet, omnem  
enim promissionem uincit. Aliud optimū, Lac mu-  
liebre, melanteriam ex clauis uetustis ac aceto para-  
tam, mel bonum, hæc tria æquis portionibus simul  
mixta & excolata adhibe uelut diuinū pharmacū.  
Aliud. Rumicis hortēlis & plantaginis semen in te-  
sta exurito, & cinerē exacte terito, ac utitor. Aliud.  
Crocum, piper, æquali pōdere lenissimē trita, cum  
felis felle in collyria redigito, ac utitor. Aliud. Pul-  
lorum hirundinum capita detracta in olla exurito  
ac terito, & in corneo uase reponito, ac utitor. Est  
enim utilissimū auxilium etiam ad percussos ocu-  
los illitum. Aliud. Lapidem sarcophagum appella-  
tum, ex quo loculos defunctorum magnos faciunt,  
tundito, cribrato, & cum spūto ipsius ægrī præfer-  
tim ieiuni terito, ac confidenter illinito. Aliud. Vi-  
tulę fel hemina mēsurā ad ignem modice coquito,  
& optimi mellis parē mēsurā adijcito, & myrrhę  
drach. ii. croci drach. ii. simul terito, ac rursus in æ-  
neo uase sufficienter coquito, & in pyxidem æream  
reponito,



reponito, ac utitor. Aliud. Lapidis magnetis uiui, lapidis ophitæ, stibij, æquas portiones tulas, cribratas, ac rursus probè tritas, nietheridis herbæ succo ac optimo melle addito, illine per specillum ex lapide sarcophago factū. Aliud. Galbanū cū melle liquefactum ac simul tritū adhibeto. Aliud collyriū, tollit albugines mirificè ac citò. Squamæ ferri stomomatis drach. ii. aluminis scissi drach. ii. gummi uermiculati drach. iiii. terito ex aqua, & formatis collyrijs utitor. Aliud. Rhani succum, si fieri potest de semine, sin minus, de folijs, sextantē, ammoniaci thymiamatis unc. i. testarū septæ unc. i. mellis atticæ sextantem. Trita excipe ac utere. Quidā solū ammoniacū cum rhamni succo terentes illinūt. Ipse uero succus per se illius cicatrices tingit. Archigenis collyriū ad albugines, quod ex una illitione plurimā albuginis partem tollit. Summe etiā facit ad omnē periculosam ac diuturnā lippitudinē. Cochlearū ustarū drach. iiii. æris usti drach. iiii. squamæ æris drach. vi. squamæ ferri stomomatis drach. xii. æruginis drach. vi. lapidis scissi drach. i. aloës drach. i. omphacij sicci drach. ii. lycij indicij drach. iiii. chalcitidis drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. thuris drach. iiii. corticis thuris drach. ii. croci drach. ii. crocomagmatis drach. ii. spicæ nardi drach. iiii. cytinorū drach. ii. gummi drach. viiii. terito cū aqua, & formato collyria, ac utere cū aqua. Quod si aridū facere uoles, trito collyrio utere sicco. Facit & harma-tium collyriū, & præscriptū ad myocephala ex uino, & his similia. Probè etiā facit ad cicatrices, inquit Apollonius, collyriū pepiesmenon, id est presum appellatū, quæ omnia in tractatu de multi usus collyriorū cōpositione describuntur. At uero theodotū Seueri cū aqua crassum illitū, ad tātam tenuitatē perducit cicatrices, ut sensu cognosci nō possint. Optimū autē in ipsis est siccū collyriū Alexandro regi inscriptū ex croco, spica celtica, & terra ampelitide paratū. Habetur autē inter sicca multi usus collyria.

*Albuginum tinctura.*

Cap. x l.

Iam antè dictū est quod abstinere oportet à pharmacis cicatrices tingentibus. Verū ut ne ignorētur ea quæ hoc facere possunt, etiā horum mentio facienda est. Gallam inquit tritā repositam habe, & usus tempore nucleū specilli calefacito, & eo de pharmaco excipito, ac albugini admoueto. Postea uero atramentū futorium aqua dilutū adhibeto. Aliud. Malicoriū tritum admoueto, & postea atramentū futoriū cum aqua tritum. Aliud. Mali punici dulcis carnē tritam modica aqua adstillata, & leuissimam factā reponito. Et usus tempore, ubi hāc sæpe affricueris, & præadstrinxeris, hyoscyami succum illinito, ad dies x v. hoc & tingit albugines, & dissipat, multoties illitū. Aliud. Facit & ad glaucos oculos. Misy cū aqua tritum in collyria redigito. Similiter autē aliud collyrium ex galla formato. Vfus autē tempore, ubi per collyrium ex galla præadstrinxeris, collyriū ex misy illinito. Aliud siccum. Gallæ drach. i. acaciæ drach. i. atramentū futorij drach. ii. Vtere. Aliud collyriū. Florum mali punicæ, atramenti futorij, acaciæ, gummi, singulorum drach. iiii. stibij drach. iiii. gallarum drach. ii. Aqua excipe. Si uero flores punicæ non affuerint, id quod in ipsis malis inter grana membranæ speciem præfert iniice.

Ad glaucos oculos ut nigras habeāt pupillas. Ca. x l i. Malicorij punici dulcis succum infunde. Deinde inter-

stitio facto hyoscyami cæruleum florem cum uino tritum instilla, aut hyoscyami succum. Oportet autem debito tempore flores colligere ac reponere. Aliud. Acaciæ fructū, & parum gallarum diligenter tere, & anemones succo excipe, ut mellis crassitudo fiat. Deinde liquorem per linteum diligenter exprime, ac repone, & utere uelut dictum est. Aliud. Cucumeris syluestris succum illine. Hic mulieres glaucoculas oculis nigricantibus facit. Aliud. Hyoscyami cæruleum florem in umbra siccato ac reponito. Vfus autem tempore florem uino austero dilutum præillinito: Et postea ipsum florem leuiter tritum per se illinito. Hoc uim suam statim declarat.

*De puerorum curatione. Seueri.*

Cap. x l i i.

Ingens grammarum copia in oculis puerorū reperitur, & inflantur plerunque horum palpebræ à materiæ multitudine. Sunt enim pueri natura humidiores ac calidiores. Itaq; horum collyria perfrigatoria sunt, & aliquo modo resiccatoria, participantia etiā non modica astrictione, quo sordidū copiam influentem repellere possint. Ad tantam enim adstringendī facultatem progressa sunt puerilia collyria, ut etiam aspritudines tollant. Hebetatur enim in pueris collyriorū acrimonia à locali humiditate, & grammarū multitudine. Sed & per allabentium humorum copiam, propter ploratum fientē, collyria eluuntur. Est autē nobis experientia cognitū in ipsis primariū & mirabile collyriū, quod recipit lapidis scissi drach. xx. lapidis hæmatitæ drach. xx. æruginis drach. iiii. chalcitidis crudæ drach. iiii. æris usti drach. iiii. opij drach. vi. myrrhæ drach. vi. gummi drach. xvi. Hæc est collyrij cōpositio ratione approbata, & experientia utilis cognita. Teritur ex aqua. Sed & aliud collyriū ad ipsos utile experientia cōstat, quod recipit: Lapidis scissi drach. xx iiii. Lapidis hæmatitæ drach. xx iiii. æris usti drach. viiii. ammoniaci thymiamatis drach. viiii. misyos usti drach. viiii. opij drach. iiii. seminis hyoscyami drach. iiii. gummi drach. viiii. Excipe aqua. Oportet autem & in his à principio ammiscere lenia collyria, atq; sic paulatim ad efficacem auxiliorū facultatem progredi. Mirifice etiā ad ipsos facit theophilium collyrium, & quod Mono inscriptum est, quæ inter multi usus collyria habentur.

*De aspritudinibus, ac densitatibus, sycosiq; ac callis Seueri.*

Cap. x l i i i.

Quandoquidem ratio auxiliorū cognitionē respicit, & uelut inter se cōdependētes facultates reperit, admonet sanè eadem ut nihil aliud ab ipsis interponamus. Proinde asperitates quæ etiam ab aliquibus densitates uocantur, ex mala curatione sæpe fiunt, dum medici diutius collyria instillant. Quemadmodū enim in externis uulneribus pinguium adhibitiō, carnū quarūdam inutilium causa est: Sic etiam in præsentī fieri cogitare oportet. Sint autem & ex fluxione diuturna minime mordaci: Si enim acris esset, citius oculis damnum induceret, quàm palpebris affectionem infeminaret. Fit etiam aliquādo non prægressis fluxionibus, neque manifesta causa præsentē. Et sunt huiusmodi non similes his quæ ex fluxionibus fiunt. In illis enim densiores & asperiores ac cruentiores euerse palpebræ apparent: In his uero uelut milij grana, aut erui parua semina uidere est, intra palpebras exurgentiā. Estq; hæc species reliquis



reliquis curatu difficilior. Differunt tamen hæ inter se: Nam densitas in superficie est & cū rubore: Aspritudinem uero maiorem inæqualitatem ac eminentia habet, cum dolore simul ac grauitate. Ambæ autem oculos humectant. Quæ uero Sycoſis dicitur, altiores eminentias habet & uelut incisas, & cui aliq̃ rei quàm ficui hianti similis est: Callositas uero aspritudo est diuturna, induratas & callosas inæqualitates habens. Quidam igitur aspritudines radere conantur, partim ferro, partim folijs fici. Est autem hic conatus nociuus. Amplius enim ipsas augent, & duras cicatrices inducunt, & assiduorum fluxionū auctores fiunt, dum semper oculi ex succedentibus durioribus cicatricibus punguntur. Curare uero oportet aspritudines, nullo ulcere circa oculū existente, collyrijs ad pueros relatis, ita ut euerſis palpebris, si nō inflāmatæ fuerint, illinantur, & per specilli nucleum diu affricentur. Qui enim cito ab affricione desistunt, densant magis, & oculis fluxionem inducunt. Si uero permanſerit causa, efficacioribus uti cōuenit. Quale est hoc. Teste sepia drach. viii. punice drach. viii. rubricæ sinopice, ammoniaci thymiamatis, singulorū drach. x. gummi drach. viii. Excipe aqua. Ex huius usu magnā laudem reperies. Statim enim ab illitione cuticulæ quædam in spongiæ admotione excidunt. Oportet autem post collyrii illitionem, aquā frigidā per spongiā adhibere. Est & aliud collyrium ad huiusmodi affectiones, quod recipit cadmiæ drach. iiii. squamæ æris drach. iiii. salis ammoniaci drach. iiii. opij drach. ii. gummi drach. xii. Excipe aqua. Ego uero seueriano sicco collyrio usus profeci, cuius & tu experientiā magistrā habebis. Apollonius autē dicit, ad exasperatas palpebras utendū est pharmacis, quibus etiā crassissimas cicatrices depurgamus. Quale est hoc. Aeris uſti drach. viii. myrrhæ drach. i. squamæ æris drach. i. acaciæ drach. ii. cadmiæ drach. ii. spicæ nardi drach. i. cinnamomi drach. i. croci drachmā i. piperis grana xvi. hyperici drachmas iiii. ammoniaci thymiamatis drachmas tres, æruginis obolos duos, gummi drachmam unā, terito cum uino ueteri austero, & collyria formato, ac utitor. Aliud. Ad fluxiones antiquas, & palpebras densas. Cadmiæ drach. xvi. æris uſti drachmas iiii. seminis hyoscyami drachmā i. opij drachmas ii. myrrhæ, fructus ericæ, acaciæ, singulorū drach. iiii. gummi drach. viii. Omnia sicca leuissime terito, & lac muliebre adijcito, ac simul trita in collyria efformato. Et ea similiter lacte trita crasse illinito, adhibito prius fomento. Liquida cōpositio ad aspritudines: Facit & ad oculos suppuratos. Chalcitidis uſtæ drachmas iiii. croci drach. viii. mellis drach. ix. Arida cū aqua terito, & ubi probe siccata fuerint, mel ammisceto ac utitor. Theophilus liquida. Ad omnes ficosas eminentias, & omnē carnis extuberantiā. Aeris uſti drach. ii. misyos uſti drach. i. myrrhæ, croci, omphacij, singulorū drach. i. uini chij aut alterius adstringentis ueteris, odorati, unc. sedecim, mellis Attici dextantē. Sunt & alia collyria facientia ad aspritudines. Quale est phoenix, & dionysus, & similia, quæ inter multi usus collyria describentur. Cæterū in quibus cum palpebrarum aspritudine, etiā tunicæ oculorum inflāmatæ dolore uexantur, ammiscere oportet aliquid de extersorij, ad propria inflammationi medicamenta: Qualia

sunt collyria ex uino parata. Sedata uero oculorū inflammatione aspritudines exterere oportet. Verum in his qui ulcus habent cum fluxione mordaci, fieri non potest ut huiusmodi medicamēto utamur. Corniformis enim amplius corrodetur, & uulniformis prolapsus maior fiet, & uehemens dolor hominem appræhēdet. Augebitur autem & malignus fluxus. In his igitur collyrium huiuscemodi parare oportet. Pumicem leuissime tritum tragacantho aut gummi madefacto excipimus, & parua collaria formamus. Deinde euerſis leuiter palpebris diutius affricamus. Et postea lac infundimus, & collyrijs ad pustulas ac ulcera destinatis utimur. Cessante uero in temporis progressu fluxione, ad acriora collyria transimus, ac cum ipsis palpebras, uelut dictum est, confricamus. Miscemus etiam ad ea quæ ulceribus conueniunt, collyria ex uino, paulatim augentes ipsorum mixturam, quo neq̃ palpebræ uexentur tunicas oculorum, & ulcera pura facta impleantur ac cicatricem recipiant.

De oculorum debilitate. Demosthenis. Cap. xliiii. Debiles oculi dicuntur, qui neq̃ album, neq̃ splendidum, neq̃ igneum uidere sustinent, sed ex quauis occasione uisum continent & lacrymantur, præsertim inter legendum. Differunt autē hi à fluentibus propter carunculæ naturalis circa magnum angulū decrementum: fluentes enim hoc modo, etiam citra aliquam externam causam lacrymantur, hi uero occasione aliqua oblata. Curadi uero sunt deambulationibus, cursibus, exercitijs supernarum partium, cum frictione & spiritus detentione, capitisq̃ rasura, ac leui oculorum frictione post exercitia, & frigida in caput perfusione. Utendum est & aquæ potu, & uictus ratione media. Conducit & legere cum clamore, iteq̃ sic scribere. Si uero pharmacis opus fuerit, adstringentibus & perfrigerantibus ac meatus obstruentibus utemur.

## De myopia.

Cap. xlv.

Myopes dicuntur qui ex natiuitate parua quidem prope uident, magna uero procul uidere non possunt: Et qui scripta admotis oculis legunt. Et alij quidem inæquales, alij æquales oculos habent. Incurabilis est autem talis affectio.

## De nyctalope.

Cap. xlvi.

Nyctalopas uocant qui die quidem uident, occidente uero sole obscurius. Deinde noctu penitus nihil cernunt. Hoc autē magis fieri uidetur propter aliquam capitis debilitatem, & maxime uisui spiritus crassitudinem, itemq̃ reliquorum oculi humorum ac tunicarum. Quibusdā uero contingit, ut noctu quidem melius uideant, interdiu autem deterius. Et si noctu luna appareat, nihil cernunt. Sed hoc rarum est, illud autem prius plurimis contingit. Curadi porro sunt qui in nocte non uident: Si bono habitu præditi fuerint, uenæ cubiti sectione, itemq̃ ab angulis oculorum: qui uero uitijs humoribus redundat, conuenienti pharmaco purgentur. Postea post uersalem euacuationem utendum est his quæ pituitam per os ducunt, & quæ per nares purgant, & sternutationes ciendæ. Narisusorium autem pharmacum ipsis commodum hoc fuerit. Piperis, staphidis syluestris, singulorum scrup. ii. sinapis scrup. i. tundito ac cribrato, & radicum betæ succum adijcito, ut mellis liquidi cōpages fiat, & cōtrita naribus infunde



infunde, ac attrahere iube. Atque hoc ad dies v. aut vii. facto. Vtere etiam alijs quæ in nares mittuntur, in Sermonē de nariū affectionibus præscriptis. Ante cibum uero bibant hyssopum, origanum, rutam. Diæta autem attenuatoria sit ex toto. Si uero per hæc non successerit, rursus purgatorium dandū est, quale est hoc. Scammoniae obol. iiii. castorij obol. ii. salis obol. iiii. In debilioribus autem scammonie obol. ii. inijce. Talis enim purgatio sæpe euestigio ab affectione liberauit, aut multo meliorem dispositionem induxit. Post paucos autem dies dādum est purgatorium pituitam & bilem ducens, quale est hoc. Colocynthidis obol. ii. scammoniae obol. iiii. salis obol. iiii. Excipe in catapotia sex, & medijs habitibus tria præbe, fortibus autem omnia. Oculi uero illinātur melle cocto, & ad continendum liquore immissum claudantur. Aut oleo uetustissimo similiter illinantur. Aut aluminis scissi in testa exusti drac. ii. salis ammoniaci aut cappadocici drac. i. terito, & cum melle illinito, aut cū lacte muliebri. Aut hyænæ fel cum melle. Vitandus tamen est frequentior acriorum pharmacorum usus. Assidue uero uetudum est oleo uetustissimo. Putatur ipsis prodesse hepar hirci assatum, cum sale citra oleum, calidissimum comestum. Quidam etiam destillante ex hepate dum assatur sanie ipsos illinunt. Aliqui hepar coquunt, & oculos super elatum uaporem detinentes, hoc fomento utuntur. Auxiliatur etiam elateriū ex interuallis cum melle illitum. Et perdicis fel aut capræ syluestris, aut hirci. Buglossi etiam piscis fel illitum ualde prodest. At uero diæta tota attenuatoria sit. Et ab initio etiam à uino abstinendum est. Et uitanda omnia crassefacientia. Cæterum in his qui noctu melius uident, interdū autem deterius, nos coniectamus spiritum multū attenuari, aut tunicas rarefieri, atq; ex hoc spiritū dissipari, ac uisum obscurari. Noctu uero crassefieri colligiq; ac sensum mouere. Et oportet in his robur oculis addere. Herophilus tamē uice uersa in libro de oculis dicit, ad eos qui in die non uident, gummi, crocodili terrestres stercus, misy, hyænæ fel, trita cū melle illinito bis in die, & ieiunis hirci hepar edēdum præbe. Ego uero coiecto hoc magis facere ad eos qui noctu nō uidēt.

*De hebetudine oculorum. Galeni. Cap. XLVII.*  
Hebetudo oculorum est obscuritas uidendi, ob plurimas causas contingens. Aut dum uisuius spiritus in crassatur, aut dum tunicae densantur ac crassefiunt. Aut dum humores in oculo crassi ac uiscosi fiunt. Contingit etiam his hebetudo, qui diuturno morbo detenti fuerunt, & tristitia ingenti. At in senibus unā cum hoc quod crassi facti sunt humores, & tunicae, & spiritus uisuius, etiam debilitas adest spiritus uisui, & imminutio multa, ac collapsio, & uelut corrugatio nerui uisui ac tunicarum in oculo densatarum ac crassefactarum. Nam dū imminuuntur humores in oculo senibus ipsis, & minus de spiritu ex supernis ad pupillam defertur, usq; adeo rugosa fit sæpe corniformis tunica, ut senes partim omnino non uideant, partim male & uix adhuc cerant. Corrugationes enim mutuo inter se incidunt, & tunica uelut conduplicatur, & aliā crassitudinem aduentitiā assumit. Porro auxilia in cōmuni ad hebetudinē, ex eadē materia componuntur, ex qua etiā in incipientibus suffusionibus, & partim in collyriorum formas effinguntur, partim liquida sunt, quæ

etiam induratis inflammationibus tunicarum conueniunt: partim sicca. Horum compositiones in fine huius Sermonis habentur.

*De obfuscatione oculorum. Demosthenis & Galeni.*

*Cap. XLVIII.*

Obfuscatio est perfectū ut plurimū uidendi impedimentum, citra manifestā circa oculū affectionē, pura uidelicet apparente pupilla. Et quibusdā paulatim affectio conflat, alijs cōfertim incidit, ut minimū aut semel in totū nō uideant. Et obfuscationis quidē paulatim cōflatae plures causæ sunt de hebetudine iā relatæ. Eius uero quæ cōfertim incidit causa est obratio nerui uisui, crassis ac uiscosis humoribus cōfertim ipsis illapsis, aut eiisdē nerui resolutio. Præcedunt affectionē assidue cruditates, & meri potus, insolatio, capitis inustio ac ardor, aut perfrigeratio. Aut assidua lectio post cibū, aut balnea similiter assidua post cibū. Et uomitus intempestiui, coitus immodicus ac intempestiuus, spiritus detentio uiolenta, quæadmodū in tubicinis contingit. Hæc enim & his similia, dū modicē fiūt, uisus hebetudinē efficiūt: dū uero immodicē, obfuscationē. Fit etiā aliquando obfuscatio ob fortes capitis plagas, aut casus ex alto, resolutio quādoq; neruo uisui, aut rupto, aut quod omnīu mitissimum est, humorū copia per uehementem cōcursionē illata, & uisuum neruū obturante. In resolutionibus igitur nerui, tarde mouetur oculus, aut omnino nō. Quum uero ex uiolenta plaga in caput facta, aut ex casu, à cerebri connexu ruptus fuerit neruus, primū quidē oculus prominētior fit, deinde cauatur, & alimētum nō sentit. Quum autem ob humorū crassorum aut uiscosorum copiā, neruus cōfertim obstructionē sustinuerit, absq; alia causa, necesse est capitis grauitatē cōsequi, maximē in profundo iuxta radices oculorū. Eos igitur quibus oculi cōfertim obfuscantur, curare oportet, uena cubiti incisa, si plenitudine grauatus fuerit eger. Validissimū enim auxilium in ipsis est uenæ sectio. Deinde interpositis aliquot diebus, fasciā collo circumdabimus, ac cōstringemus, & postquā frontis uenæ eleuatæ fuerint, rursus exoluemus, & hoc iterū atq; iterū faciemus: quo per spiritus motū, humores obrati uolēter concutiantur. Postea eleuatas angulares uenas, ab utraq; nasi parte secare oportet, & fortem euacuationē facere. Ego enim ad tres heminas ex angularibus uenis aliquādo euacuauī. Post hæc cōfertim cucurbita occipitio affigēda est cū scarificatione. Cōtingit enim plerūq; statim incumbente adhuc cucurbita hominē respicere. Sed nō oportet hoc auxilio cōtentū esse, uerū reparatis uiribus, post tertiā diē purgare. Deinde ad diætā deducere. At uero in his quibus paulatim per multū tēpus oculi obfuscantur, præmissa recta uictus ratione, à uenis angularibus euacuationē, uelut dictum est, faciemus. Et in his qui nō multo sanguine abundāt, statim ab initio ab angulis auferatur. Deinde cucurbita occipitio affigatur. Et postea purgatio fiat. Per diætā uero maxime alū facile solubilē facito per cibos, bonæ cōcoctio nis præ omnibus ratione habita. per aliquot autem dies dāda est aloē deuorāda, terebinthina excepta in catapotia, facit & cnici succus cū melle. Vtēdū est & exercitijs infernarū partiū, & deambulationibus pluribus in umbrosis locis. Vitandus est uini potus, & aque potio, uiriliter tolerāda. Vitandus est etiā omnis cibus crassefaciēs, & assiduus coitus, & capitis insolatio.



latio. Neq; uero balneū cōuenit, neq; somnus diurnus, neq; uehementior à cibo motus, neq; legere aut scribere. Vitandæ sunt iræ, indignationes, & curæ pertinaces, & uehementes perturbationes, ac timores, præsertim post cibū, & assidui uomitus. Quotidie autē proluēda est facies aqua frigida, præsertim pluuiali, & illinendū corpus per alios. Perseuerante uero affectione, etiā per narifusoria caput purgetur, ita ut naribus infundamus quæ ad capitis dolorē dicta sunt. Utendū est & pituitā per os detrahentibus ibidem relatis. At uero illitio oculorū, diuturna iā existente affectione, primū per simplicia fiat, ueluti per mel nō fumosum, aut oleū uetus: postea etiā cōpositis utendū est: Nos autē laudem assequuti sumus in ipsis ex Diacenterī collyrii usu, & liquida Aglaidæ cōpositione ad suffusiones destinata. Cōmune uero ad omnē obfuscationē ac hebetudinē hoc est. Videatur autē & ad mēbranarū crassitudines facere. Croci drac. i. myrrhæ dra. i. piperis grana xv. spicæ nardi obol. ii. succi foeniculi drac. xvi. ammoniaci thymiamatis drac. i. mellis quincuncē. Ad omnia leuissime trita foeniculi succū affunde, deinde tere ac resicca, & amixto melle ænea pyxide excipe, ac utere. Ante illitionē uero, fomentū per spongiā in aqua calida marina tinctam oculis adhibendū est. Aliquando etiā tota facies in marinā tepidam immittēda est. Atq; hæc quidē cōmunia in omni obfuscatione. Ceterum his quibus ob coarctationē multorū aut crassiorū humorum ad neruū delatorum, uisus impeditur, post uenæ sectionē, & cucurbitæ admotionē, & purgationem, caput sinapismo integendum est. Et postea etiā caustico pharmaco occiput exulcerandum. Et capitis ex aqua calida perfusione utendum. Præstat autē saluginosam aut nitrosam esse aquam.

*De resolutione oculorum.*

*Cap. XLIX.*

Non solū neruus uisuius, uelut prædictū est, sed etiam totus oculus aliquādo resoluitur, aliquando cū reliqui corporis dextris aut sinistris partibus resolutis. Aliquando uero priuatim circa solā palpebram fit resolutio. Aliquādo uero etiā totus oculus resoluitur. Et si quidē palpebra fuerit resoluta, oculus semper cōclusus est, & palpebra nō sentit. Si uero totus oculus resolutus fuerit, motus ad dextrā ac sinistrā, sursumq; ac deorsum perficere non potest. Et si quis acrius pharmacū sublinat, non percipit morsum. Si igitur palpebræ solius fuerit resolutio, præpurgato per aloëdaria uniuerso corpore, & post aquæ potus & frequentioris deambulationis, ac multæ infernarum partiū frictionis usum, palpebra assidue alumine scisso cū acri aceto illinatur, & collyriis calidioribus, aut eo quod ex sandice cōstat. Quod si hinc nō restituitur, sursum suere ipsum oportet. Totius autē oculi resolutiones ægrè curabiles sunt, maxime in ætate prouectis. Si uero ex natiuitate cōtingerit resolutio, impossibile est hanc corrigere. In quibus igitur salutis spes est, talis curatio faciēda est præ omnibus: si bono habitu præditus fuerit, uena cubiti secetur: Deinde anus per clysterē eluatur. Postea purgatorio corpus euacuetur. Deinde pituitā per os ducētibz utendū. Deinde per ea quæ naribus induntur purgandū. Postea cucurbita occipitio affigenda cū scarificatione. Et hirudines temporibus admouēdæ.

Propinandū etiam castoriū per se, & cum abstinthio. Dandū & pulegium, hyssopū, ruta, cum aceto

mulso ac sale. Postea caput castorio illinatur, cū rosaceo & aceto. Et ex eodē ungento, mollis lana imbuta, oculo clauso imponatur, cauendo ne in oculū instillet. Atq; hæc curatio bis in die fiat. Palpebræ uero forinsecus & frōs, castorio cū croco ex aceto illinantur. Mihi uero uidentur liquidæ ex castorio ac melle ad affectionē commodæ, quæ cōpositiones & sublinendæ & superlinendæ sunt. A uino uero, & carnosio multūq; nutriente ac crassi succi cibo omni abstinentū est, & assumēdi qui excretionēs facile solubiles faciūt, ac humores attenuāt. In primis tēporibus uitāda sunt etiā balnea, & uaporatoria, & insolationes. Vomitiibz autē ex interuallis utēdū ieiunio à raphanis, deligato oculo, & citra multā lācinationē.

*De glaucedine.*

*Cap. L.*

Glaucedo duobus modis dicitur. Glaucedo enim proprie mutatio est cristallini humoris ad glaucū colorem, siccitasq; ac cōcretio. Altera autem glaucedinis species ex prægressa suffusione, fit humore iuxta pupillam uehementissime cōgelato ac resiccato. Et hæc species incurabilis est. At proprie dictam glaucedinem incipientē aliquando sanare datur, ex deambulatione pro uiribus, & totius corporis frictione, ac lauacris maxime capitis. Aestate uero etiam frigide lauacrum conuenit, & tonsura capitis ad cutem. Oculi uero solo oleo antiquo sublinantur.

*De suffusione. Ex Demosthene.*

*Cap. LI.*

Suffusio est prætersusio humorū circa pupillam congelatorū, ut ubi perfecta fuerit, uisum impediāt. Incipiente uero suffusione, talia ægris accidunt. Velut culices parui caliginosa quædam oculis sæpe obuersari uidentur. Et quidam ex ipsis piliformia uident, alij uelut lanarum filamenta, aut araneorū texturas. Quibusdā circa lucernas circuli apparent. Hæc autē ubi apparuerint, aliquādo pura pupilla apparet his qui negligentius considerant. Aliquādo uero colorem maris refert. Augescēte deinde affectione, augescunt etiā accidentia: perfecta uero eadē, homo nō uidebit, pupillaq; colorem ad albedinem mutat, & omnino nō translucet. Plures autē sunt coloris species. Quædam enim suffusiones aërem assimulant, aliquæ uitrum referunt, aliæ albicantes sunt, aliæ ad cæruleū colorem magis mutātur, aliæ glaucescunt, quæ etiam incurabiles sunt. Curādī autem sunt qui suffusione tentātur, in principio sanguinis de cubito detractione. Et si nihil impedit, etiā clysteribus acrioribus, & purgationibus. Deinde quoque cucurbita occipitio affigenda est cū scarificatione, & pituitam per os detrahentibus, ac narifusoriis, ex interuallis utendū. A uino uero abstinentū est per totam curationē, & ab omnibus replētibus caput. Itemq; à balneo, nisi quis lassitudinis ac tardæ cōcoctionis gratia ad lauandum se cogatur. Et tunc omnino nō in aëre balnei moretur, neq; in solio morā trahat. Sed paululū inscēdat, & cito exeat. Diæta uero omnis sit attenuatoria. Medicamētis autē utendū est, primū simplicibus, uelut melle, & oleo ueterij, ac foeniculi succo. Deinde etiā cōpositis liquidis ac siccis collyriis, quæ paulò post describētur inter cōmunia auxilia.

*De mydryasi, hoc est, pupillæ dilatatione. Cap. LII.*

Pupillæ dilatatio appellatur, quā pupilla colore quidē nihil abalienatur, multo uero latior quā pro naturali modo euadit, ut aliquando ad iridis circumlum accedat, & quādoq; in totum uisum impediāt. Aliquando



Aliquando tamen uident, uerum obscure, & quæ uidentur ab ipsis, omnia minora putantur, diffuso uidelicet spiritu uisuo. fit hæc affectio propter humorum allapsum, qui aut aceruatim, aut paulatim feruntur, à quibus citra sensum uuiformis tunica distenditur, & pupilla amplius dilatatur. Est autem affectio ualde ægre curabilis. Quum enim membranosa sit tunica uuiformis, ubi semel distenta fuerit induratur, neque facile amplius contrahi potest. Accidit autem affectio hæc magis pueris, propter tunicarum debilitatem. Sunt & quæ ex natura nigros oculos habent, magnas etiam pupillas habent. Quapropter facile in hac affectionem delabuntur. Curanda est autem affectio, si nihil impedierit, uenæ sectione in cubito, aut purgatione. Si uero hoc fieri non poterit, angulares uenæ soluantur. Deinde cucurbita occipitio affigatur. Utendum est & deambulationibus lætis ac pluribus, in locis umbrosis. Et omni modo conandum, ut materia ad infernas partes detrahatur. Quapropter in principio etiam clysteri utendum est, & infernarum partium frictione per alios. Post deambulationem & inunctionem, facies aqua marina proluatur, hyeme tepida, æstate frigida. Tota etiam facies in aquam mittatur oculis per tempus quoddam apertis. Quod si marina non adsit, parum salis aquæ miscetur, aut posca aquosa assumatur. A uino abstinendum est donec affectio fuerit soluta. Et tota diæta tenuior sit & uentri commoda. Balnei usus rarior sit, & tunc caput non ualde perfundatur. Pharmacis utendum est subadstringentibus, uelut rosa, croco, nardo, thuris cortice, pompholyge, spodio & acacia. Nam ualde acres pharmacorum facultates, humorum copiam attrahentes, distendunt membranas, & latiorē pupillam efficiunt. Quapropter & quæ uehementer astringunt, uelut est chalcitis, misy: & quæ amplius frigefaciunt, uelut cicuta, membranas indurant. Sed & amplius contrahere ac coarctare pupillam incommodum est. Nam hæc res pupillam ad tabem perducit.

## De tabe pupillæ.

Cap. LIII.

Tabes pupillæ dicitur, quum angustior & hebetior facta fuerit. Hoc autem plerisque contingit ex periculosis debilitatibus, aut ingenti capitis dolore. His autem maiora apparent quam pro naturali modo, quæ ab ipsis uidentur, propter pupillæ angustiam. Curatio nem porro in his contrariam midryasi facere oportet, ita ut exerceamus supernas partes, humeros ac manus, cum spiritus detentione. Et caput ac faciem diligenter confricemus. Deinde oculos summis digitis. Facies etiam aqua calida proluatur. Et caput ungento quodam moderate calefacere potente illinatur, quale est irinum. Et modico facto interstitio, oculi rarefaciente, & acriore, ac humiditate attrahente pharmacis sublinantur. Quale est hoc collyrium. Ammo niaci thymiamatis drach. i. crocomagmatis drach. iiii. croci drach. ii. æruginis drach. iiii. Trita cum aqua efforma & utere. Facit & Erasistrati liquida compositio. Victus sit optimi succi & sorbilis. Vinum fuluū & odorū. Somnus excipiat cibum. Sed & balnea conueniunt, & capitis ex aqua calida perfusio.

## De macie oculi.

Cap. LIIII.

Oculus macer esse, & alimentum non sentire dicitur, quum ex uehementi capitis dolore, aut in febribus acutis, paulatim humiliatur & cauatur, & in totum minor fit, & aliquanto obscurior, & uisum impedit. Con-

tingit autem hoc sæpe ex caluæ incisione & perforatione, quando sanè etiā ægrè curatur. Differt autem macies à tabe, quod tabes pupillam solam minorem facit: macies autem totum oculum minorem & humiliorē efficit. Curandi porro sunt sic affecti, spongiarum ex calida aqua expressarum circa oculos fomento. Lac quoque tepidum ipsis infundendum, & ab omni collyrii adhibitione abstinendum. Cibi detur ipsis multum nutriētes & optimi succi. Vinum sit fuluū & tenue. Utendum est balneis, & capitis ex calida aqua perfusione. Exercitijs itē partium supernarum & spiritus detentione.

## De expressione oculorum.

Cap. LV.

Exprimuntur oculi aliquando ut prominentes permaneant. Et hoc contingit his qui strangulantur, & in athleticis certaminibus, & foeminis quæ in partus doloribus amplius distenduntur. Aut ex fluxionibus plurimis, quæ aceruatim à capite defluerunt. Qui igitur ex strangulatione in hoc inciderunt, his uena cubiti secetur. Si uero alias crassi humores influentes oculos impetuerunt, purgentur ueratro nigro, aut scammonia. At expressiones oculorum in foeminis ex partus doloribus sæpe contingentes, purgationes per locos muliebres solunt. Quare has procurare oportet. In uiris autem post uenæ sectionem, aut purgationem, si permanserit affectio, cucurbita occipitio affigatur, & aquæ potus exhibeatur, & cibi contrahantur. Oculo uero imponatur lana melle imbuta cum modico croco, & hapsus lanæ superimponatur, & placida compressionē deligetur. Conducit his etiam post principium, aqua marina frigida faciei affusa, & intybi succus ac polygoni, & psyllij cum opio illitus. Et quæcumque alia comprimere ac contrahere possunt.

## De confusione.

Cap. LVI.

Confusio oculi plerumque ad uehementes plagas consequitur. Sed & ex uuiformis tunicæ inflammatione contingit, ruptis in ipsa uasis, Pupilla uero colore turbida fit, & aut maior, aut minor seipsa euadit. Curandæ igitur sunt confusiones ex plaga, per uenæ in cubito sectionem. Et totus oculus sanguine recens macerati turturis, aut in illius penuria, columbe expleatur. Et mollis lana in ouo cum uino & rosaceo conuassato madefacta imponatur ac deligetur. Et postera die idem fiat. Tertia uero fomentum adhibeatur, & lac instilletur. Postea ouorum assatorum uitelli imponantur, cum melle & croco trito, linteolo illiti. Quum autem pupilla iam purgata fuerit, collyria ad antiquas affectiones destinata sublinantur, quale est aromaticum, & chiacum Apollonij, & similia. Facilius autem curatu est confusio in his quibus pupilla sola ampliatur, colore uero & figura simili permanet. Difficiliter autem curatur in his quibus pupilla diuisa est.

## De his quæ in albo oculi nascuntur.

Cap. LVII.

Omnia quæ præter naturam in albo oculi nascuntur, quæ quidem doloris exortia sunt, in quibus pili sæpe exoriuntur, & quæ non ualde à naturali colore euariant, curabis hamo apprehendens ac extendens, & postea scalpro pterygij destinato resecas. Deinde salem tenuem inspergens, & lanæ hapsum imponens ac deligans, & reliquam curam adhibens uelut in pterygiorum resectione. Quæ uero subrubra, & tumida, ac uaricosa sunt, dolorificaque & aspera, & tempora per consensum afficiunt, ea omnia fugere oportet uelut maligna, & pericula, ac oculorum prolapsum inducentia in chirurgia.



## De pterygijs.

## Cap. LVIII.

Pterygium, unguis latinis quibusdā uocatus, dicitur quum album in oculo amplius augetur, aut carne superexcreuit, ex scabra quadā lippitudine, aut assiduīs fluxionibus. Incipit autem huius augmentum, sæpe quidem ab angulo magno appellato iuxta nasum: Rarius autem à paruo: Et adhuc rarius generatur à superna aut inferna palpebra. Extēditurq; usq; ad nigrum. Quum uero maius factum fuerit, etiam pupillam cōtingit, & uisum impedit. Facilia uero curatu sunt pterygia albicantia, & angustū fundum habentia. His uero contraria, ægre curantur. Nam subrubra post curationem chirurgicā, cariem ac dolores dimidiæ capitis partis inducunt, attamen post symptomatū sublationē oculus liberatur. At pterygia in quibus etiā principia sunt suffusionis, curare nō oportet. His enim sublatīs, citius suffusio conflat. Sed neq; crassa pterygia curanda sunt, & euerſa, & eminentia, ac indurata, & quæ tēpora per cōsensum afficiūt. Sunt enim maligna & cancerata. Quæ uero usq; ad pupillā pertingūt, & propterea uisum impediunt, si tollantur, liberāt quidē oculum à fluxionibus, cicatrix autem quæ ex chirurgia iuxta pupillam succedit, nihilominus uisum impedit. Cæterum ex pterygijs ea manu curare oportet, quæ aucta ad nigrum se extendunt: Quæ uero parua & in albo sunt, ea cōadū est ut pharmacia cōprimamus.

## Pharmaca ad pterygia.

## Cap. LIX.

Pterygia probe deprimit siccum ad scabiem destinātū, ex chalcitide & cadmia compositū, quod ad scabros angulos descriptum est. Et theodotium collyrium Seueri tritum ac siccum adhibuit, & omnia exterſoria collyria, ad aspritudines & sycoſes descripta, & quæ ad myocephala & staphylomata conueniunt, maximē ex uīno parata. Archigenes autē ad pterygia, inquit, atramentū sutorij drach. II. salis ammoniaci drach. II. gummi drac. I. terito ex aceto, & collyria formato ac utitor. Aliud, celebre quod celerimē ipsa consumit. Chalcitidis ustæ ut fulua euadat, drach. IIII. croci drach. I. tritis utere siccis. Aliud, experientia cognitum. Chalcitidis ustæ drach. x. cadmiæ drach. x. squamæ æris rubri drac. I. piperis drac. I. utere. Aliud, ex fundo tollēs pterygia. Atramenti sutorij torrefacti drac. II. æris usti drac. I. siccum adhibe. Et post detractiōem, collyrio ex rosīs cura, aut ex croco collyrio. Aliud. Magnetē lapidem uiuum diligenter terito, & semel in die utitor. Aliud. Populi nigræ succū cum duplici melle illine. Aliud. Atramentum sutorium cum felle suillo, æquali pondere trita illine. Aliud. Sepiæ restas uſtas, cū sale ammoniaco, æquis portionibus tere ac utere. Aliud, facit & ad sugillationes & hebetudines. lapidis magnetis uiui drach. IIII. ærugis drach. I. minij Sinopici drach. IIII. ammoniaci thymiamatis drach. IIII. croci drac. II. Mellis quincuncem. Hoc etiam ad albugines facit. Aliud. Gladium tūdito, cribrato, & modicā aqua terito, & sufficienti pompholygis cinere addito, collyria formato. Et utere cum aqua bis per diem. Aliud. Aes uſtum cum pueri incorrupti urina terito ac utitor. Aliud. Squamæ æris rubri, nitri rubri, punicis, cimmolig, singulorū dra. IIII. Terito ex aceto donec siccetur, & utere. Reponito autē in testaceo uase puro.

## Chirurgia pterygiorum.

## Cap. LX.

Ad pterygij uero sublationē ita chirurgiam aggredi-

mur. Palpebras inter se disparamus, & hamulo circa medium pterygij transfixo, leuiter distendimus, ut ne cuticula corniformis tunica eleuetur. Simul enim sublata maximas inflānationes inducit. Deinde acum accipimus, quæ filū & pilum equinum transmissum habet, & hanc distēto per hamulū pterygio subiicimus. deinde deligatū per subiectū filū pterygium distendimus, filum leuiter sursum trahētes, & fili principij ministro industriē tenendū prębentes. Nos autē utraq; manu pilū tenentes, sursum ac deorsum ipsum cōmouemus, & pterygiū subexcoriamus, initio à nigro facto usq; ad angulū. Deinde cōtinuitate ipsius ad nigrū exoluta per pilum, & distenta per filum, scalpro ad pterygia destinato funditus auferimus pterygij partē iuxta angulum, palpebras & angulū cauētes. Quibus enim palpebræ simul inciduntur, his cōcretiones fiunt. Quibus autem funditus angulus reſecatur, his naturalis eius loci carnis decrementum succedit. Si uero fundum pterygij fuerit relictum, regeneratur, si non pharmaco aliquo ex prædictis fuerit consumptum. Congruentis igitur modi coniecturam facere oportet. Quod si ægri formidolosi oculos aperire non fuerint ausi, hamulo supernæ palpebræ submisso, leniter ipsam extra distendimus, atque sic uelut dictum est operamur. Post detractiōem uero, muriam acriorem oculo infundimus, deinde lanam ouo imbutam imponimus, & oculum deligamus. Sequenti deinde die soluimus, & moderato fomento adhibito, album ac tenerum Seueri collyrium infundimus. Quarta uero collyrijs ad affectiōes commodis utimur, de cætero uitantes tenera & incarnantia collyria. Sunt autem ad affectiōes commoda, nardina & theodotia, & omnia ex uīno fientia collyria.

## De carnis in angulo magno incremento. Cap. LXI.

Encanthidem uocant, quum magnus oculi angulus ad nasum auctus carne superexcreuit, id quod maximē in canibus contingit. Verum in hominibus redundat, qui in mari uersantur. Proinde si benignum fuerit hoc carnis incrementum, dolore uacat, & tenerum est ac laxum: Si uero malignum, durum erit & inæquale, & dolores punctorios inducet. Oportet autem benignum curare ac paruum pharmacis siccis, tum eo quod ex cadmia & chalcitide ad scabros angulos paratur, cum hoc ipso quod optimum est. Aluminis scissi, misyos torrefacti, atramenti sutorij, partes æquales. Hoc egregie consumit omne carnis angulorum incrementū. Utere etiam theodotio Seueri collyrio, sicco trito adhibito, & eo quod ad myocephala ex uīno paratur.

## Chirurgia incrementi carnis in angulo. Cap. LXII.

At uero maius & malignū carnis in angulo incrementū, uolsella appræhensum reſecare oportet. Si uero maior fuerit eminetia, acū duplex filum habentem transmittere ad fundum oportet, deinde filum cōstringere, & paruo interstitio facto, donec caro liuescat, scalpro auferre, & siccum scabiei destinatum adhibere: & hapsū lanæ aut cōduplicatum linteam superimponere. Postera uero die fomentum adhibere. Et post tertiam mellis usu curam absoluerē. Cauendum est autem ne unā cum carne præter naturam aucta, etiam ipsum angulū funditus tollamus, alioquin rhoeas, hoc est naturalis carnis in angulo decrementum succedet.



*De sanguinis ex angulis eruptione. Cap. LXIII.*  
Fit & sanguinis ab angulis eruptio, maxime pueris, ob assiduos eiulatus ac distentiones aperitis circa palpebras uasis. Curadi autem sunt poscæ frigidæ aut aquæ frigidæ perfusione, tum super angulos, tum super caput facta. Infundendū etiam oui candidum per se, & cū aliquo collyrio ad tenues fluxiones conueniente. Utendum & infernarum partium deligatura & cibo crassefaciente. In perfectis autem ætatibus cucurbita occipiti affigenda est cū scarificatione.

*De concretionē palpebrarum ac contra-*

*ctione.*

*Cap. LXIII.*

Concresecunt & agglutinantur palpebræ ad album aut nigrum in oculo, aut inter se, ulceratione prægressa. Quum igitur ad album concretio palpebrarum facta fuerit, & oculi motus impeditur, affectionē hanc Ancylosim uocāt, hoc est contractionem. Quæcunq; igitur cōcretiones iuxta angulū factæ sunt utriusq; palpebræ, eas hamulis distentas dissecare oportet, & linamento indito disparare. Et postea uelut communia ulcera curare. Quæcunq; uero concretiones factæ fuerint extremitatis palpebrarū ad oculi tunicas, eas cæco hamulo distendere oportet, & scalpro pterygijs destinato concretionem exoluere, deinde carnis incrementum sicco aliquo deprimere, & ære leuissimè trito palpebras sublinere, & oculum usq; ad perfectam curationem indeligratum sinere.

*De pediculis palpebrarum.*

*Cap. LXV.*

Pediculi generantur in palpebris lati, parui, multi, ex ingluuie, & illuuiē ac mala diæta ortum habentes. Curatio igitur adhibenda est primum, ut pediculi diligenter expurgentur. Deinde aqua marina tepida affundatur. Et postea subscriptū pharmacum loco adhibeatur. Aluminis scissi drachm. ii. staphidis syluestris obol. i. piperis obol. ii. æris uisti drachm. i. myrrhæ obol. duos, lapidis scissi obolos tres, misyos torrefacti drachm. i. terito ac utere sicco. Adhibenda præterea sunt balnea, & caput discutientibus ac corroborantibus confricandum. Et exercendæ infernæ partes, & uictu boni succi utendum. Similis autē curatio lēdibus quoq; palpebrarū adhibeatur.

*De pilis pungentibus palpebrarum, & de duplici pilorum ordine, itemq; multiplici quam phalangosim dicunt.*

*Cap. LXVI.*

Pilorum pungentium in palpebris exortum, Trichiasim Græci uocant, quam sanè sub pilis naturalibus in palpebris alijs exorti, & intrò nuētes, tunicas pungūt, & oculorum fluxiones concitāt. Dicitur etiam trichiasis, quum ipsæ palpebræ laxatæ sunt, aut ipsarum extremitas intrò nutat, ut pilī non facile appareant, nisi quis distendat ac dispareret palpebras. Vocant autem medici palpebræ laxationem phalangosim, aut casum. Pilorum uero subcretionem, duplicem pilorum ordinem, hoc est distichiasim. Fiunt autem hæ affectiones, & præsertim duplex ordo, ex multa humiditate. Qemadmodum enim in terra largitas aquarū plurimas herbas profert: sic etiam in palpebris, maxime ubi influentes humores minime mordaces fuerint. Si enim id quod influit salsum fuerit, etiā naturales pilos reijciat. Perfecta igitur pilorum pungentium curatio, est consutio palpebrarum sursum uersus. Quādoquidem uero aliqui ob molliciem nō audent seipsos chirurgiæ submittere, auxilium ferendum est ipsis quantum eius

fieri potest. Veteres itaque huiusmodi auxilia ad ipsos conscripserunt.

*Pharmaca ut euulsi pili nō renascantur. Cap. LXVII.*

Pungentes pilos euellito, & euerfa palpebra, sanguinem ranarum recentem illinito, & frigeferi finito. Aut cimum sanguine similiter utitor. Aut chamæleonem album urito, & cinerem sanguine ranarum excipito. Et usus tēpore salua diluito, & præeuulsi pilis loco illinito. Aliud. Succum Chelidonij herbæ quæ etiam capnium dicitur, sufficiente gummi excipito, siccato, ac parua collyria formato, & utitor uelut prædictum est. Aliud. Cochlearum carnes cum uiridium ranarum in harundinibus degentium sanguine, aut herinacei terrestris cruore terito, & atramento scriptorio moderato adiecto sicari finito. Et utere uelut dictum est, uitata pupilla. Aliud. Hirudines urito ac terito, & utitor assidue pilis præeuulsi. Aliud. Intestina terræ in testa ad cinerē exusta, ac leuissimè trita, præeuulsi pilis inspergito. Aliud Lacertam in olla exurito, & ad cinerem tritum par pondus sandarachæ adijcito, ac utitor. Aliud bonum minimè molestum. Siliquas siccas non antiquas diffringito, & humorem qui in ipsarum cavitatibus uiscosior, modicus, ac melleus reperitur, specilli nucleo exceptum, præeuulsi pilis loco illinito. Atque hoc assidue facito. Summe autem facit, inquit Archigenes, herinacei terrestris fel, & sanguis pari mensura, cum modico castorio. Castorium itaq; leuissimè tritum sanguine ac felle excipito, & uelut piscium squamas formato. Vtere autem ita ut pilos radicitus euellas, deinde squamam unam salua ex ore ieiuni dilutam euerfæ palpebræ illinas, & ad dimidium horæ in loco detineas donec siccetur. Dolore quidem afficiuntur ægri, sed pilī non amplius enascuntur. Aliud. Psyllium & cucurbitæ semen, ac cedriam, pari portione uespertilionis sanguine excipe, ac utere uelut dictū est, ne oculum contingas. Aliud. Linteum ex nauī uetus accipe, & in lucernam pro funiculo lucernario inde, & lucerna ex oleo cyprino impleta, fuliginem in æreo uase collige, ac utere pilos euellēs, & locum assidue illinens. Et si renati fuerint, idem repetito. Aliud. Potamogitonis succum & artemisiæ succum, æquis partibus adhibeto. Aliud. Fel uituli, & castorium, & gummi, æquis portionibus citra aquam conterito, efformato ac utitor, præeuulsi pilis illinens ter in die, & comperies successum. Aliud. Porci masculi fel, & adipem eiusdem, in fictile uas nouum densissimum ac leuissimum mittito, & aceti acerrimi heminae quartam partem, & olei aleni tantundem affundito, & denso linteo obligatum ad dies septem finito, & postea diffusa in mortariū terito, & uelut unguentum excipito. Idem etiam in toto corpore probe facit. At uero alenum oleum, amygdalinum oleum esse dicitur.

*Agglutinatoria pilorum.*

*Cap. LXVIII.*

Pilos in palpebris præter naturam introrsum refractos, glutinat mastiche per specillum calidum admotā, & sic pilis ad proprium ordinem refractis. Bitumen eodem modo. Glutinum similiter. Cochleæ glutinositas acu excepta. Hieracij succus. Medicamentū agglutinatoriorū appellatorū liquor. Ammoniā thymia. Compositum autem hoc. Resinæ siccæ, picis siccæ, sulphuris uiui, bituminis singulorū

r 4 drach,



drae. i. ceræ drachmæ dimidium. Liquefacta reponito. Et usus tempore specillum igne feruefacto, & phar-  
macum contingito, ac eo pilos reglutinato.

*De futura palpebrarum sursum uersus. Cap. LXXIX.*  
Ad futuram palpebrarum sursum uersus faciendam, æger desideat ad sinistram chirurgi partem, humili-  
or ipso, ad splendidam lucem. Sunt autem ministri  
duo probè periti adstātes, alter retrorsum, alter à la-  
tere. Et chirurgus primū per collyrium, aut superfi-  
ciarias scarificationes, notet sufficienter quantum in  
palpebra redundat, & corrugatae cutis resectionem,  
ut neq; plus neq; minus quam oportet rescindatur.  
Si enim latius resecta fuerit, æger lagophthalmus  
euadit. Si uero angustius, rursus palpebra laxatur,  
& pili similiter pungūt. Notetur etiam circa mediū  
palpebræ iuxta extremitatē locus superficialia cēsu-  
ra. Post factā uero notationē, euerfa palpebra, sub-  
sectionem intrinsecus facimus ultra pilos præter na-  
turam exortos, quo ipsi ad naturales foras tendant.  
Aliquando uero in ipsos pilos præter naturales, si  
penitus insiti fuerint, subsectionē facimus, ut succe-  
dens cicatrix ipsos rursus enasci prohibeat. Nihil  
autem uetat etiā duas subsectiones facere, unā ultra  
pilos præter naturam exortos, quo extremitatis pal-  
pebræ fiat resiccatio. Alterā super ipsos præternatu-  
rales pilos. Sit autem profundior subsectio: Adiu-  
uat enim refractionē & palpebræ leuitatem: & ab  
altero extremitatis siue marginis palpebræ termino  
usq; ad alterū procedat. Deinde linteola parua dupli-  
cata, figura triangulari imponantur, unū iuxta ma-  
gnū angulū, alterum prope paruum. Super hæc  
autē linteola minister qui retro adstat apices magnorū  
digitorum firmet, & uno impetu palpebram disten-  
dat, imprimēs digitum sub supercilio, quo æqualis  
palpebræ tensio fiat. Signū autē sit tibi optimæ ten-  
sionis palpebræ, quū media nota proprium seruarit  
locū, hoc est circa medium fuerit reperta. Post distē-  
tionem uero, primū faciendā est obliqua & ad ueru  
similitudinem sectio superficialia infernē, ut ne ex  
superna influēs sanguis chirurgiam impediāt. Sitq;  
hæc sectio propinqua palpebræ extremitati. Deinde  
supernē luniformis sectio fiat. Initiū autē & ipsa  
sumat ex infernis à magni anguli loco, & delata ad  
notam, rursus deorsum uergat ad parū angulū.  
Sitq; etiā ipsa superficialior, ut ne musculi laedi-  
antur. Deinde minister qui à latere stat, palpebram disten-  
dat. Postea hamulus in circumscriptæ fasciolæ prin-  
cipium transfigatur, in sinistro oculo, ad parū an-  
gulū, in dextro ad magnū. Distento autē hamu-  
lo per sinistram manū, fasciola scalpro ad hanc rem  
destinato subexcorietur, animaduersione habita ne  
si profundior excoarctatio fiat, musculi uulnerentur,  
& incurabilem habeāt palpebræ laxitatem. Post cu-  
tis autem excisionem, ad futuram sursum uersus ue-  
niendum est. Et prima futura media fiat. Deinde u-  
trinq; aliæ duæ, ut in totū quinque fiant futuræ. Post  
futuram, distēta palpebra propter uulnera, modera-  
tum spleniū glutinosum futuris sub supercilio im-  
pone. Super ipsas uero sectiones spleniolā parua  
glutinatoriā & inflammationem arcentem uim ha-  
bentia imponantur. Postea lana ouo imbuta toti oculo  
imponatur, ac deligetur. Quandoquidem uero  
augescens & acris ac salsa fluxio illota, pilos natura-  
les reijcit, & palpebræ marginem duram efficit: pi-

lis autem præter naturam subenatis etiam augmen-  
tum præbet: difficilisq; sit in his palpebræ euersio:  
conuenit acum robustum filum habentem, per me-  
diam marginem palpebræ trāsmittere, & filum sur-  
sum trahere, atq; sic per specillum palpebrā pro ut  
moris euertere, & sectionē, uelut dictum est, facere.

*De futura palpebrarum deorsum uersus. Cap. LXX.*  
Quod si inferna palpebra pilos pungentes produxe-  
rit, futura deorsum uersus probatur. Et prius quoq;  
in his sufficiens laxatae superfluae cutis resectio no-  
tetur. Nam & hic latiore fasciola excisa, euersio con-  
tingit: angustiore uero, inutilis est chirurgia. Post fa-  
ctam notationem, linteola complicata uelut dictū est  
angulis imponantur, & palpebra distendatur. Post-  
ea minister digito malæ impresso, ipsam detrahat.  
Fiat autem prima sectio luniformis inferior. Deinde  
ad ueru similitudinem & obliqua appellata cir-  
ca palpebræ marginem. Facienda est autem excoar-  
ctio, & futura, uelut antea dictum, & reliqua eodem  
modo. Cæterum sola deorsum uersus futura con-  
tenti sumus in inferna palpebra, uitata subsectione,  
ut ne palpebræ euersio contingat.

*De euerfione palpebræ. Demosthenis. Cap. LXXI.*  
Palpebræ amplius euerri solēt, ulceratione prægressa,  
& carne ipsarum superauicta. Aliquando etiam à du-  
riore cicatrice palpebra contrahitur ac eueritur. Cō-  
tingit autē hoc magis circa infernas palpebras. Cu-  
randa uero sunt moderata carnis incrementa, arido  
subiecto. Aëris uisti drachm. i. atramenti sutorij, mī-  
syos tostī, chalcitidis tostæ, singulorum drachm. i.  
Aliud. Aëris uisti drachm. viii. misyos torrefacti  
drachm. ii. chalcitidis tostæ drachm. i. atramenti su-  
torij drachm. i. Aliud. Ad inueteratas iam euersio-  
nes. Aeruginem in testa torrefactam terito, & per se  
adhibeto. Aut plumbi uisti parem portionem am-  
misceto.

*Chirurgia euerfionis palpebrarum. Ana-  
tyli.*

*Cap. LXXII.*

Maiores uero carnis incrementa scalpro auferre oportet,  
deinde aëre uisto trito contingere, aut aloë cum  
manna thuris. Et sequenti die fomento adhibito simi-  
liter curare. Tertia uero die post fomentum melle  
utendum est usque ad perfectam curationem. Si ue-  
ro maior fuerit euersio, sic chirurgia faciendā est. Ex  
inferna palpebræ parte duæ sectiones fiant, literæ  
Græcæ Λ. figuram habentes, ita ut angusta literæ Λ.  
pars infernē sit ad malam, lata uero supernē ad pal-  
pebræ marginem. Deinde fasciola illa literæ Λ. fi-  
guram referens excindatur, resecta simul etiam sub-  
iecta carne. Non est enim charitilaginosa inferna pal-  
pebra. Cutis tamen indiuisa seruanda est. Deinde  
labia excisionis futura contrahenda. Sufficiet enim  
una futura iuxta partes marginis palpebrarum fa-  
cta. Sic enim incuruata & eleuata palpebra, ad in-  
ternas partes reuertetur. Si uero cicatrix ex aliqua  
causa extra palpebram facta, palpebram euerterit,  
tollenda quidem est, uelut dictum est, ex internis  
partibus palpebræ fasciola illa literæ Λ. figuram re-  
ferens, non profunda sectione facta, & labia sectio-  
nis uelut dictum est, per futuram cōtrahenda. Post-  
ea cicatrice forinsecus per hamum distenta, acum  
duplex filum habentem, sub totius cicatricis car-  
nosam molem transmittimus, à paruo angulo ini-  
tium facientes, & ad magnū ipsam acum ducētes.

Deinde



Deinde acu sic posita, filum utriusque ipsius partibus subiicimus, & per ipsum totam carnosam cicatricis molem distendimus. Et sic ipsius excisionem facimus, tollentes simul cum carnosam mole, etiam infixam acut. Post chirurgiam autem, externam sectionem linamentis disparamus, & conduplicato linteo ex frigida aqua imposito, deligatione utimur usque ad tertiam, frigidam irrorantes, & linteum complicatum incumbere sinentes. Tertia uero die solvimus, & spogias ex aqua tepida adhibemus. Fomentum enim in his non conducit. Cauere enim oportet, ne forte glutinatio intrinsecus non succedat. Postquam uero exciderit suturae, corporibus glutinatis, de caetero impavidè fomentum adhibeatur, ad hoc ut etiam cicatrix tenuior fiat, & oculus mitigetur. Deinde repressiva collyria palpebrae intrinsecus sublinantur. Externa uero sectio disparata seruetur, per omnem curationem mollioribus pharmacis adhibitis. Continget enim ex intrinseco cutis incremento, auxilium quoddam, ut palpebra intro uertatur. Si uero propter carnis in angulo magno incrementum, facta fuerit palpebrae eversio, exciso eo incremento, palpebra ad naturalem habitum reuertetur. Caeterum illud nosse conuenit, quod supernae palpebrae eversio curabilis est. Sed & illa quae ob infernae palpebrae resolutionem contingit, sanari non potest. Similiter & ea quae propter resectionem latioris fasciolae in futuris deorsum uersus contingit. Et quae ob latam cicatricem fit, ulceratione uidelicet pregressa, quemadmodum in carbunculis contingit.

De lagophthalmis. Demosthenis. Cap. LXXIII. Lagophthalmi appellantur, in quibus superna palpebra reuulsa est, & apertus est oculus inter dormiendum, uelut in leporibus fieri solet. Contingit autem affectio aliquando ex sutura sursum uersus, palpebra plus iusto reuulsa, ut oculum contegere non possit, aliquando ulceratione spontanea praegressa, uelut in carbunculis. Curandi uero sunt hi luniformi sectione in tota cicatrice facta, ut superior sectionis circumferentia sursum tendat, apices autem deorsum ad margines palpebrarum spectent. Postea rametis linteolorum sectio disparetur, & palpebra deorsum detrahatur, & aequalis naturali figurae fiat. At uero in conuulsis palpebris qua parte contrahuntur, istuc sectio fiat, & palpebra similiter laxetur. Verum in curatione fugere oportet resiccata medicamenta, & aquam mulsam. Adhibendum est autem emplastrum tetrapharmacum, & succo foeni graeci perfundatur. Et in summa totus curationis ductus laxatorius ac impinguas in his assumatur.

De lippitudine dura. Demosthenis. Cap. LXXIII. Lippitudo dura est, quum palpebrae duriores fuerint, & ipse oculus durior, & ad motum pigrior fuerit, dolesque ac rubicundus, & praesertim quum post surfectionem ex somno, palpebrae difficulter aperiri possunt, & nulla humiditas euacuatur, graem uero in angulis consistunt paruae, contortae, subaridae. Et quum ipsas palpebras euertere uolumus, non facile a nobis uerri possunt, ob duriciam.

De lippitudine sicca. Cap. LXXV. Lippitudo sicca est, quum subaridus factus fuerit oculus, & pruriginosus, & leniter dolens, citra duriciam palpebrarum.

De lippitudine scabra. Cap. LXXVI. Lippitudo scabra est, quum anguli ulcerosi sunt, ac ru-

bicundi, & ualde pruriginosi, & palpebrae rubicundae, & lacrymae falsae ac nitrosae destillant.

Curatio lippitudinis durae, siccae, scabrae. Cap. LXXVII. Praedictarum affectionum diligens cura habenda est. Neglectae enim suffusionum, glaucedinis, & lippitudinis diuturnae, ulcerationumque ac staphylomatum causa fiunt. Curanda itaque est lippitudo sicca, cum reliqua corporis cura, etiam per ea quae humiditatem ad oculos prouocant, qualia sunt sicca pharmaca postea describenda, stratiotica appellata, & collyrium diacentetum, ac similia. Dura uero lippitudo similiter curanda est, per pharmaca humiditatem excernere potentia, sublima Erasistrati liquida compositione ac similibus. Ad haec etiam mollioribus ac humectantibus utendum est, uelut calidae leniter temperatae prolutione. Et fomentum per spogias assidue adhibendum. Vitanda uero sunt pharmaca frigefaciencia, meatus obstruentia, & agglutinatoria, & aquae frigidae affusio. Ex his enim oculus magis induratur. Si uero simul fuerit scabra ac dura lippitudo, (ex humorum enim acrimonia palpebrae indurari solent, ut anguli quidem erodantur & ulcerosi sint, oculus autem & palpebrae aegre moueantur & indurentur) in talibus praemisso spongiae fomente, primum per siccum ad scabriciem paratum medicamentum, anguli contingantur. Et moderato tempore interposito, rursus spogia fomentum adhibeatur, & pharmacum humiditatem detrahare potens sublinatur. Quale est Erasistrati liquidum, & collyrium stratioticum, & diacentetum. Est autem compositio siccis ad scabros angulos medicamenti haec. Chalcitidis crudae drach. v. cadmiae drach. v. Haec trita in ollam induntur, quae addito operculo, gypso oblinitur, & in uas acetum dilutum habens imponitur, ut olla forinsecus quidem made fiat, non diffluat autem in ipsam humor, & sinitur ad dies vii. Deinde siccatur in sole, ac teritur. Aliud. Philoxeni siccum, Achariston appellatum, (eod quod digna ipsi gratia referri non possit) ad corrosos angulos, & scabras affectiones, & lippitudines siccas. Cadmiae drach. ii. chalcitidis crudae drach. i. aloes obol. ii. aeruginis obol. ii. piperis grana x. florum rosarum drach. ii. Tritis utere. Aliud. Ad scabra lippitudinem. Cadmiae drach. i. aeris usti drach. i. spicae nardi drach. i. piperis torrefacti obol. ii. Trito cum aceto in sole, & siccato utere uelut probato. Aliud. Meneclis, ad corrosos angulos, facit ad delacrymationem. Spodij drach. ii. omphacii siccis drach. ii. spicae nardi obol. ii. piperis torrefacti grana xv. tritis utere. Aliud. Cadmiae sextantem, salis ammoniaci sextantem, solij malabathri sextantem, piperis unc. i. utere. Aliud. Facit & ad carnis in angulo decrementum. Costi quadrantem, aeris sextantem, fuliginis cedriae unc. i. misce ac utere. Aliud. Ad scabras lippitudines, sycofes, putredines, & carnem superexcrecentem. Cadmiae drach. ii. chalcitidis drach. vii. piperis grana quinquaginta, spicae nardi drach. i. Cadmiam & chalcitidem terito cum uino, & ubi siccata fuerint, nardum & piper leuissimè trita adijcito, & in puluillum reductis utitor. Aliud. Capitonis ad lippitudinem siccam, & corrosos angulos, ac oculos humectos, & palpebras ficosas. Cadmiam ad polentae magnitudinem confringimus, deinde melle Attico subacta in fictile uas mitimus, & operculo foramen habente imposito, eoque luto oblito, uas rectum inter prunas locamus,



Iocamus, ac uentilamus. Quum autem albidior factus fuerit uapor exhalans, sublatam ollam aperimus, & cadmiam uino uetere extinguimus. Deinde eius accipimus drach. viii. aeris usti drach. viii. stibij drach. iiii. Et armenij si affuerit, drach. viii. & hæc confusa ac cribrata, cum uino uelut collyrium terimus, & resiccaturum tollimus ac utimur, per specilli nucleum sublinctes palpebras, mane ac uesperis. Nos autem cadmiam, & reliqua omnia simul adipe uiperæ subacta torrefacimus, & postea uino extinctis siccatisq; ac tritis utimur. Aliud. Tomenti purpuræ ueræ drach. viii. cadmiæ drach. xx. aeris usti drach. x. lapidis hæmatitæ drach. x. Omnia trita ac melle subacta, uelut prædictum est torreto, & extinctis uino, ac tritis & arefactis utitor. Aliud. Archigenis, ad omnia prædicta. Amurcam coctam terito cum melle, & utere. Utendum etiam collyrijs & siccis medicamentis, infra inter multi usus pharmaca describendis.

*De defluuio pilorum palpebrarum, quod uitium  
& Madarosis, & Ptilosis, & Milphosis à  
Græcis dicitur.* Cap. LXXVIII.

Madarosis & ptilosis extremitatis siue marginis palpebrarum affectiones sunt. Et Madarosis quidē, ipsum solum pilorum defluuū est, ex acri fluxione obortū. In ptilosi uero & crassescunt & callescunt hæ partes, ut composita sit affectio ex madarosi & lippitudine dura. Quare etiam auxilia in hac similia sunt relatis ad illā. Optimum autē est ad ipsos pilos, siccum Philoxeni ad pruriginosos ac corrosos angulos. Facit & ad uisus hebetudinē. Cadmiæ drachmas viii. salis ammoniaci drachmas ii. croci drach. ii. spicæ nardi drach. ii. piperis albi drachmā i. utere. Aliud stibium muliebre, facit ad corrosos angulos, ac pilos. Stibij usti & lacte muliebri extincti drachmas xiii. aloës, myrrhæ, spicæ nardi, singulorum drachm. ii. ordeï usti leuissimè triti drachmas iiii. utere sicco. Aliud. Ad ptilos & corrosas palpebras. Medullam bubulam ex anteriore dextro pede, cū fuligine terito ac utitor. fuliginem autem sic facito. Papyrū pro funiculo lucernario in lucernā inde, & oleo sesamino repletum accende, & supra lucernam leue testaceum aut æneum uasculum pone, eoq; fuliginē excipe, & paulatim per prunam collige, ipsaq; cū medulla trita utere. Facit etiam egregie uituli coagulū. Aliud Sosandri, ad milphoses, & inueteratas affectiones. Facit etiam ad carnis in angulo incrementū. Cadmiæ, stibij, chalcitidis crudæ, misyos crudī, singulorum drach. viii. Hæc confusa & melle subacta torre uelut dictū est, deinde uino extinctis ac tritis, adijce spicæ nardi drach. ii. croci torrefacti drach. ii. piperis drach. i. & simul contritis, utere. Cæterū simplicia ad ptilos, & corrosas palpebras facientia hæc sunt. Amurca cocta, lyciū indicum, armenium quo pictores utuntur. Nam cū aqua illitū consumit uitiosos humores, & pilos naturales auget. Rubigo ferri ad multos dies in sole trita, & cum uino ac myrrhā in collyria redacta. Spodiū ceparū succo exceptum.

*De abscessu in palpebris. Demosthenis. Cap. LXXIX.*  
Abscessus in palpebris internos, apice ipsorum inciso, & humoris expressione, curare oportet. Deinde muria infundatur, & lana ouo imbuta imposita deligetur. Postera die fomentum adhibeatur, & mel sublinatur, & de cætero collyrium repressum instilletur.

Externos uero post sectionem & humoris euacuationem, impositis linteorum ramentis ex melle, & addita lana deligabimus. Quicunq; uero abscessus palpebræ charilaginem corruperint, si quidē extrinsecus fuerint, eos possibile est ouo, ac melle purgatos, capitali sicco medicamēto incarnare. Si uero intrinsecus fuerint, euerfa palpebra, & nudata chartilaginīs parte derafa, æs leuissimè tritum adhibeatur, & supra palpebram ouum cū uino & rosaceo conquassatum imponatur. Postera die fomento adhibito, æs leuissimè tritū inspergatur, & rursus supra palpebrā ouum ponatur. Tertia uero die mel palpebræ sublinatur. Et postea collyriū repressiuū adhibeatur.

*De calculo palpebrarum. Cap. LXXX.*

Calculū in palpebris dicunt, quū euerfis palpebris, totis similia circa ipsas extiterint alba ac aspera, uariorū speciem præ se ferentia. Eorū curam facere oportet euerfis palpebris, & cute iuxta apicem tenui scalpello dissecta, ita ut per specilli concauitatē tumorem molis collectæ exscalpamus. Deinde æs ustū tritum adhibeamus. Et ouum cum uino & rosaceo in lana exceptum imponamus ac deligemus. Postera uero die, eadem curatio repetatur. Tertia mel sublinatur. At uero in totis forinsecus palpebris innascentibus, post dissectionem & scalpturam, splenium emplastrī tetrapharmaci imposito.

*De grandine oculi. Cap. LXXXI.*

Grandine affici dicunt palpebras, quum euerfis ipsis rotundæ quædam eminentiæ pellucidæ grādini similes apparent, quibus dissectis humor euacuatur similis candido oui. Curatio autem faciēda est euerfis palpebris, & incisione per scalprium facta, ita ut humore excreto subiectū aridum pharmacum affricetur. Aeris usti drachmas ii. squamæ aeris drachm. i. sandarachæ drachmā i. æruginis, salis ammoniaci, croci, singulorū drachmas iiii. myrrhæ obulos duos, utere tritis. Fiunt etiam aliquando extra palpebras grandines subduræ, fabis similes. Has si quis uiolentiū contingat, dolores intentos inducit. Et quādoq; animi exolutionem. Has autem curare oportet cute iuxta apicem incisa, & scalptura per specillum concauum facta. Sanatur facile mellis & ramentorū ex linteis impositione, & fomentis. Si uero pharmacis ad grandines uti uelis, his utaris. Fici syluestris grossos coctos impone. Aut fici folia. Alia illitio optima. Pollinis tritici quadrantem, sulphuris uiui unc. i. terito cum aqua, & formato pastillos, ac utitor. Faciunt & ea quæ ad ordeola descripta sunt.

*De ordeolo siue præputiolo. Cap. LXXXII.*

Ordeolum aut præputiolum uocant, quum in palpebris forinsecus iuxta pilos maximè suppuratum quoddam tuberculum factum fuerit, figura ordeo simile. Facile uero curatur nuclei specilli calefacti fomento. Sed & ceræ albæ calidæ fomento id discuties. Aut de musca capite abiecto, reliquo corpore ordeolum confrica. Aut galbanum molitum modico intro addito impone. Aut cum cera emollita parum misyos crudī commollito, ac imposito. Faciunt & ficus sicæ cum uino mulso coctæ, & cum modico galbano tritæ. Aut sagapenum cum aceto tritum illine. Facit etiam ad grandines. Fomentum uero loco adhibeatur per spongiā, & per panem calidum. Post humoris excretionem mel illinatur. Deinde collyria ulceribus commoda.

*De gan*



De ganglijs, atheromatis, steatomatis, & meliceridibus palpebrarum. Cap. LXXXIII.

Fiunt aliquibus extra palpebras etiam hæ affectiones. Curantur autem gangliaceras & malagmas ad ganglia describendis, & aquæ calidæ affusione. Est enim nervi cōtortio ganglium. Melicerides autem, & parva steatomata, ac atheromata, curantur aliquando utorio medicamento apici ipsorum imposito, donec incumbens cutis in profundum crustam accipiat. Deinde post crustæ casum, exscalpta tunica humorem continente per specilli concavitatem. Si vero tunica eximi non possit, per subiectum pharmacum erosivum cōsumatur. Sandarachæ drach. ii. arsenici drach. i. squamæ æris drachm. i. ueratri nigri drachm. i. elaterij drachm. ii. chartæ in cinerem exustæ drachm. ii. utere cum rosaceo. Magna vero chirurgiæ curantur, quemadmodum in reliquo corpore ex fundo ablata, unâ cum tunica humorem continente. Deinde labia cutis per suturam contracta curentur, uelut in sutura palpebrarum sursum uersus fieri solet. Cauendum autem ne lata fasciola cutis in chirurgiâ auferatur, ut ne lagophthalmi fiant.

De varicibus palpebrarum & malignis agnatis eminentijs. Cap. LXXXIII.

Varices in palpebris ne cures: Sunt enim maligni: Neq; etiam agnatas eminentias in palpebris tumidas, dolentes & subrubras, & ad digitorum compressionē in seipsas se contrahētes. Sunt enim etiam hæ malignæ ac incurabiles.

De ægilope. Scueri. Cap. LXXXV.

Ægilops abscessus est iuxta magnū angulum. Est autem affectio ægre curabilis, propter corporū tenuitatem subiecto osse corrupto. Ob situs autē uicinitatem etiā ipsi oculo damnum infert aliquando, per naturale paruum iuxta angulū foramen. Incipiente itaq; inflammatione, statim in prima die conandum est ut repellatur, ipso solo inflammato loco illito ex collyrio Antonino, aut alio quodā uehementer repellente, ac stupefaciente. Solet enim hæc illitio id quod confluit dissipare. Si uero perseverarit inflammatio, tentandum est ut similiter uelut aliæ inflammationes curentur, per discussoria medicamēta, quæ citra mordacitatē agūt. Coassatur enim oculus ex acribus, & in ipsa affecta parte inflammatio augetur. Nos autē in inflammationibus nōdum transmutatis, ex emplastri Barbari, aut Leænæ, aut Athenæ, aut ex salicibus, aut ex aceto & oleo parati usu, abscessū discutimus ac resiccamus. Asclepiades autē ad ægilopas pharmaca talia conscripsit. Succus illecebræ, quā quidam portulacā syluestrem uocant, aut semperuiuum paruum, succi solani, singulorū sexuncem, thuris drachm. viii. galbani sexuncem, mastiches quadrantem, thus tritum cū succis coquito & ubi dissolutum fuerit, galbanum præmollitum adijcito. Mastichen enim improbamus. Aliud. Thuris drach. viii. myrrhæ drach. viii. ladani drach. i. ceræ drach. viii. aluminis scissi drac. iiii. spumæ nitri drac. iiii. coaguli leporis drac. iiii. Tundito hoc pharmacum, & cum fece ungētī irini emollito. Si uero uictis discussorij medicamentis inflammatio suppurabitur, quā celerimē secare oportet, & humorem euacuare, ac subscrisptis uti. Bdellij, myrrhæ, ladani, spumæ nitri, colophonis, singulorū drac. iiii. ceræ drac. x. ungenti irini quantū satis est. Alij pro colophonia, oleū fo-

lia trita habent. Et cum axungia ægilopi imponunt. Et sordes subalares oculum cū axungia eodem modo. Aut ueratri nigri radicem madefactam impone. Aut perdicium herbā pro cataplasmate adhibe. Aut farinam erui cū melle. Aut cinerem lignorum uitis aceto subactum impone. Aut staphidem syluestrem & ammoniacum thymiana cū melle impone. Aut alumen scissum cum terebinthina uelut splenium impone. Si uero ad angulū repserit, ad superficiem autē omnino non processerit, tunc scalpro ad uenę sectionē, aut pterygij destinato, mediū angulī corpus diducere oportet, & bonam carnē ex profundo producere. Deinde ipsam enatā carnem resiccare. Id quod continget, si penitus non pingui loco adhibuerimus. Quare sanē in principio post apertionem lentacula cocta, aut malicorio cum melle utemur. Repurgato uero loco, & nascente iam carne, utrum leuissimē tritum, siccum inspergimus, & in eius usu perseveramus usq; ad absolutam curationem. Est enim admirandum auxiliū, cuius efficacia satis expendi nō potest. Sed & alumē scissum leuissimē tritum, & modica terebinthina exceptū, ad emplastri formam, purgat & incarnat ac cicatricem tutō inducit. Oportet autem & in ulceris cauitatem de pharmaco indere, & forinsecus paruum splenium ex ipso imponere. Profecto nos hoc curationis ductu usi, alio auxilio ad recentes ægilopas non indigimus. At uero quæ ab antiquis ad hanc affectionem descripta sunt auxilia, huiusmodi sunt. Ægilopa curant, si non per profundū corruptum fuerit os, chamemeli folia commansa imposita. Aut maluæ folia commansa cum sale impone. Post apertionem uero ipsa malua trita utere usq; ad cicatricem inductam. Aut solanū maxime halicacabum, aut myrtum commansam impone. Aut cœnanthes, aut auriculæ muris folia. Facit & ægilopis frumentacei succus cum farina frumenti impositus. Et plantaginis folia manducata ac imposita. Thus item & columbinum sterus cōmiscuntur ac imponuntur, & lapidescunt ac inhaerent usq; ad inductā cicatricem. Aliud. Propolis, terebinthinā & thus, paribus portionibus splenio illita adhibe. Facit & siccum pharmacū ex eruo cum melle. Aliud. Fel porci fumo resiccatū terito, ac exulcerato ægilopi imposito. Aliud. Thus tritū pice liquida excipe, & emplastri forma impone. Incipientes enim ægilopas hoc pharmacum dissipat. Iam uero ruptos sanat, ulceri inditum, & superimpositū. Aliud ad ægilopas experientia cognitum. Itemq; ad strumas. Radicē lilij recentē ad emplastri formā terito, & imposito. Rumpit enim, & repurgat, & usq; ad perfectā curationē cicatrice includit.

De uestione Ægilopis. Cap. LXXXVI.

At in quibus affectio diuturna os corrumpit, aut ad angulum in fistulā abiit, cicatrice superficiē inducta, in his triāgulari incūbentis carnis detractione facta & angusta sectionis parte ad angulū adaptata, & deinde spōgia oculo imposita, cauteria ignita ipsi sectioni adhibemus, usq; ad os ad squamæ remotionē inuertes, ita ut etiā obliquas in ulceris cauitate partes, & maxime supernas inuram. Si enim post primū cauterij admotionē spectaueris, apparebit tibi angustissima cauernula, q̄ supernē ex obliquis humorē ulceri trāsmittit, uelut lacrymā. Quare oportet cauteriū cauernulæ fortiter apprimere. Et ubi sufficiens facta fuerit



fuerit ustio, lenticulam coctam cum melle adhibere. Elapsa uero crusta, & ulcere aliquo modo purgato, alumen scissum tritū terebinthina liquida exceptum modica, ut emplastri forma fiat, cavitati ulceris indimus, & splenium ex eodē factum, supra ulceris cavitatē imponimus. Celerrimē enim repurgat, incarnat, & cicatricem inducit. Probē etiam incarnat uisum leuissimē tritū inspersum. Vtere, & probabis.

De anchilope.

Cap. LXXXVII.

Circa predictum locū ubi ægilops fit, colligitur etiam lentus humor melleus aut pultaceus, plerumq; in tunica contentus, dolorem nō inducēs, paulatimq; augetur. Curatur autem chirurgia, quemadmodum etiam reliqua circa corpus atheromata, ita ut superficies dissecetur, & subexcorietur, & tunica humorē continens funditus tollatur. Post sublationē autem ipsius, quo secura curatio fiat, & affectio non regeneretur, cauteriis ignitis crustas loco inurimus: Et deinde lenticula cum melle curamus. Elapsa uero crusta, alumine cum terebinthina, uelut antea dictū est, usque ad cicatricem inductam.

De carnis in angulo magno decremento. Cap. LXXXVIII.

Carnis in angulo oculi magno imminutio ac decrementum fit, quū exulceratione, aut pterigij, aut incrementi carnis ablatione, totus angulus funditus fuerit sublatus, & allabentem lacrymā continere nō poterit, sed ad malas defluit. Contingit hoc etiam aliquando ex male curatis ægilopis. Et uocatur hoc uisum Græcis Rhoeas. Dicuntur autē etiam Rhoeades, qui ob assiduas fluxiones oculorum, semper lacrymantur. Curandi uero sunt illi quibus angulus funditus sublatus est, adhibito pharmaco locos densare potente ac consolidare, quale est quod tephrū dicitur. Si uero callus fuerit, præirare oportet per aliud quod acrius medicamentum. Sed & chirurgia utendum est. Collū enim fascia circumdata cōstringitur, & uas circa nasum notatur. Deinde uas illud scalp pro biangulari dissecatur. Deinde spōgia oculo imposita, cauteriū loco apprimitur, non usq; ad os, sed ut cutis & sectio solum flammam sentiat. Sit autem cauterium triangulare. Postea lenticula cū melle adhibetur. Vbi uero pura facta sunt ulcera, oculus disparatus seruator, donec angulus carne pura fuerit repletus, ut ne concretio fiat. Probē facit in ipsis etiā alumen cum terebinthina. At uero oculos præ diuturna lippitudine flētes, aut humectos, curare oportet præ omnibus aquæ potu, & parco cibo, exercitijsq; ac deambulationibus, & capitis frictione ac rasura, & frigida perfusione. Est & diæta optimi succi ac incrassante utendū, & oculi sublinendi ex medicamentis meatibus obstruentibus, frigefacientibusq; ac adstringentibus. Post aggressionē uero frigida aqua & posca oculi proluatur. Optimū autem pharmacū ad hos experimento cōstans hoc est: Plantaginis folia exuccato & excolato, ipsumq; succum in fictili nouo ad solem exponito, & linteo tenui puro uelato, quotidieq; agitato, & resiccato tritum reponito, & pro collyrio sicco utitor. Stibiū ad anguli magni decrementum Alexandri regis ualde bonū. Facit etiam ad ptilosim palpebrarum. Terræ ampeliridis, croci, nardi celticæ, æquales portiones tulas melle subigito, & in ollam missa, addito operculo foramen habente, eoq; oblito, prunis imposito, & non uenulato. Quum autem non amplius caliginosus

uapor per foramina exhalaret, ab igne tollito ac frigeri finito. Deinde tusa, cribrata, ac trita in tenuissimum puluillum pro stibio adhibeto. Aliud. Stibium ad Rhoeadas. Aeris uisū sesquiunciam, stibij sesquiunciam, croci unciam i. spicæ nardi unciam i. folij malabathri trientē, rosarum uiridium sesquiunciam. Reliqua leuissimē terito. Deinde rosas per se bene leuigatas aridis unito, & simul tritis donec siccetur utitor. Aliud stibium, multa experientia cognitum. Aeris, cadmiæ, stibij, singulorum sextantem, piperis grana xiiii. chareophylli unc. i. spongiarum nouarum quadrantem, mellis quantum satis est. Aes, cadmiam, stibium, tusa sufficiente melle subigito. Deinde ipsa spongia excepta in ollam mitito, oblinito, urito. Et ad cinerem exactissimē tritū piper & chareophyllū adijce, & tulsis, cribratis rursus exactissimē tritis utere.

De his qui tempora inurunt.

Cap. LXXXIX.

Quidam barbaris legibus seruientes, in diuturnis oculorum fluxionibus, tempora inurunt, aut per pharmacum, aut per medullā lignorum nucis iuglādis, quod hyscas appellant. Quidā etiā ferrum candefaciunt, & uestionē perficiunt. Ego itaq; eiusmodi affectionem ex temporū actione cōflatam uidi. Hi enim immodeste pharmaco usi, & uestione usq; ad profundum facta, unā cū alienis humoribus, etiā naturales consumpserunt, & ad extremā siccitatem oculum deduxerunt, & nō intelligebant se morbum incurabilē præparare. Quid enim aliud contingere poterat, quā quod hic contigit: Primum dolor molestus, & immodicus ardor. Quū igitur tentassemus per collyria obtundere dolores, amplius ægrū grauauimus. Liquidum enim collyriū oculo illitum, uelut arenulas quasdam producit, ab immodica caliditate torrefactum. Et quū rursus per ouū mitigare uellemus, rursus per caliditatem etiam ipsum crassefactū est, & uelut ad membranas quasdam redactū, quæ ægre ab oculis secedebāt. Sed & lacte usi sumus, & ipsum similiter inspissabatur, & in summa, uelut ab igne humores coacti inspissabantur. Proinde multo labore insumpto, quū scæni græci succū instillassemus, moderate dolorē mitigauimus. Nam & hic à morbo superabatur. Postea uero rationē ducē sequuti, ad rosæ uisum deuenimus, tepescentes hoc ac infundētes, ut etiam æger nobis absentibus, ipsius solius usu ab accedentibus alleuaretur. Quin & ad alia multa utile nobis uisum est rosaceum ad oculos. Si enim ex natura siccitas affuerit, ut egre mobilis & penitus lacrymarum exors sit oculus, etiam his commodum est pro collyrio sublitum.

De arteriarum sectione. Seueri.

Cap. xc.

In chirurgijs circa caput & frontem, unus generalissimus nobis scopus est, ut ægrū à fluxionis affectione liberemus. Verū priuatas & uelut particulares aggressiones facimus, propter uires, propter accidētia, propter locos, propter materiæ fluxionum qualitatem. Quum igitur arteriarum genus unum sit, loci uero diuersi, nūc de posterioribus expendemus. Hæ enim uelut principia quedam earū sunt, quæ circa superficiem capitis existunt. Cōuenit igitur in magnis doloribus, cario, staphylomatis & prolapsibus, arterias in posterioribus capitis partibus secare. Statim enim utilitatem inde percipiunt ægri. Præradendi autē sunt loci, & sic pulsus exacte per tactū norandus



notandus, & spatium dimetiendum ab auribus triū digitorum, ad caluam posteriorem appellatā. Conuenit autem secare non obliquè, sed trāsuerſim, uſq; ad os, & membranā caluam ambientem exactiſſimè radere, & ſanguinis excretionem uſque ad anīmi deliquiū expectare, in quibus uidelicet uires robuſtæ ſunt, & dolor uehemēs. Sic enim ſopies accidens ſymptoma. Deinde cuneolum ſectiōni parērem indimus, & linamēta conuulſa plurimo cuneolo imponimus, & lanæ hapſo poſca imbuto pro linamentorū custode utimur. Deinde ligamento utimur ſufficienter adſtringentes, & ad frontem ambo principiā ducentes ac deligantes. Poſtera die uīno & oleo ligamentū rigamus, & non ſoluimus. Tertia die ſoluimus, & uibices moderatè proluimus, & os deradimus. Et poſtea quoq; oſſis raſura utimur, & hoc facimus, uſq; ad quatuor, aut quinq; dies, donec os ſanguinē emiſerit. Hoc enim ſignū eſt ſufficientis raſuræ. Cæterum medicamētis, quæ linamētis ilinuntur, utendū eſt in his, ex pumice et cera ac oleo paratis. Et poſtea cephalico ſiccō appellato ex eruo utendū eſt. Sed & id quod à nobis præparatur, unice ad hos facit. Statim enim poſt oſſis raſurā impoſitū, carnē producit. Accipit autē farinē triticeę tenuiſſimæ par. ii. colophonix liquidiffimæ partē i. Hoc ubi ſiccū inſperſum eſt linamētis & ſplenio, cuſtos linamēti adhibēduſ eſt ex aliquo pharmaco è ceruſa parato. Nā & ad cicatricem inducendā confert.

*De caluariæ circuncifione.*

Cap. xci.

Sed & caluariæ circuncifionem, perifcyphiſmū Græcis dictū, aſſumimus, in quibus diuturna & tenuis oculorū fluctio exiſtit, & multa uafa fluctionem delegantia. Oportet igitur raſos locos notare, ut ne in coronalem futurā, aut tēporū muſculos, ſectio fiat. Facienda autē eſt ſectio paululum ſupra frōtem trāſuerſa initio à tempore ad tēpus facta, ita ut mēbrana caluā ambiens ſimul diſſecetur, & diligenter radatur. Deinde cuneolis ſectiōni inditis linamēta adhibemus, & reliqua conſequēter facimus, uelut prædictum eſt in arteriarū ſectiōne, aſſumpta ex uīno, & oleo irrigatione. A tertio die curatio ſuppuratoria fiat. Deinde ea quæ reſiccationem promittit. Si quidē igitur à ſolo ſincipite oculi fluxione inſeſtantur, prædicta ſectiōne contenti ſumus. Si uero unā cum ſupernis uafiſ, etiā ex temporibus fluxio feratur, poſt factam relatam ſupernam ſectiōnem, alias duas luniformes aſſumimus, unam ab utraq; parte. Habeat autē principium, tum ea quæ à dextris fit, tū quæ à ſiniſtris, à principijs trāſuerſæ ſectiōnis ſuperne factæ, ita ut ex ſupernis ad tempora deferantur, uſq; ad mediū frontis. Procedant autē luniformiter ad ſupercilia cōuerſæ, ut ne temporū muſculos iniuria afficiant. Sit autē figura trium harū ſectiōnum ſimilis literę Græcę  $\pi$ , ita tamen ut apices ad internas partes incuruatos habeat hoc modo) (. Oportebit autem & hic cuneolos ſectiōnis indere, & cōſequētia facere, uelut antea dictum eſt: Porro dicunt Aethiopus à natiuitate frontem circuncidere, ut ne oculorum fluxione inſeſtentur.

*De frontis per ſubmiſſum ſcalpellum exco-*  
*riatione.*

Cap. xcii.

Frontis per ſubmiſſum ſcapellū exco-  
riationem, hy-  
poſpatifmum Græcis appellatū, aſſumūt qui defor-  
mitatem cicatricis maximæ per circulum ſientis in

frontis circuncifione, deſtant. Verum hæc curatio imperfectior illa eſt. Vnde magis frontis circuncifione perifcyphiſmo appellato utendū eſt, ita ut rei magis neceſſariæ curam habeamus.

*De uaforum ſectiōne.*

Cap. xciii.

Vaforum ſectiōne aſſumimus uno oculo affecto, & in oculorū perpetuis lacrymis, & in hemicrania. Aſſumimus autē in his, quibus manifeſta & eleuata ſunt in fronte uafa. Vas uero atramēto notamus, & ſummis utriuſq; manus digitis, frontis cutem ab utraq; notæ parte eleuamus, & ſuperficiariam ſectiōnem in ipſam notam, ex directo uafiſ facimus. Et rursus paulatim ſubiacentes cuti membranas diſſecamus, donec nudum uas apparuerit. Atq; ſic hamulis duobus trāſfixis labia ſectiōnis eleuamus, & paulatim per ſcalprum ſubradentes, uas à circumſiſtis mēbranis liberamus. Et cæco hamulo ſubiecto, uas ex profundo attollimus, & ita eleuato acum duplex filum habentem ſubmittimus, & mox ablata acu filū diſmittimus. Idē etiā in altero uafiſ termino facimus. Et poſtea uas perpungimus, & euacuationē fieri ſiſnimus. Sufficienti uero ſanguine euacuato, utroſq; terminos uafiſ, per ſubiecta iā fila deligamus, & medium ipſius reſecamus: atq; ita linamentis inditis, & hapſo lanæ ex aqua frigida impoſito, deligatiōe utemur. Poſtera die uīno & oleo irrigamus. Tertia uero exoluimus, & moderata pſuſiōe facta linamēta ex aqua mulſa indim⁹, donec exciderint fila. Et uſq; ad perfectam incarnationē eadem utimur. Eſt enim bonum auxiliū. At uero cicatricis inductionem per emplaſtrum melinum facimus, aut per id quod ex cadmia paratur. Leonides porrò, ſoleo, inquit, ubi mixta eſt fluxio, & à fronte, & à muſculis temporum, iuxta paruos oculorum angulos tēporibus uicinos, ſupra ſines ſuperciliorum, cruſtas inurere per cauteris nucleoformes, id uehementer cauens, ut ne temporum muſculos contringam. At in fluxionibus à ſincipite, conſtringo collum, & uafa in fronte magis eleuata noto, & hæc ipſa præraſis pilis inuro. Illitio ualde celebris ad diuturnas fluxiōes. Viperarum capita in olla probe exurito, & cinerē cum lupinorum amarorum decocto tritum temporibus illinito. Et miraberis de medicamēti efficacia.

*De muſculorum temporum cataplaſmatis, agglu-*

*tinatorijs, ac illitionibus.* Seueri. Cap. xciiii.

Quandoquidem fluxiones ad oculos ex ſuperincumbentibus locis ſuppeditantur: Nam hemicranæ, & caries, & fluxiones capitis, dolores oculorū augēt: operæprecium eſſe puto etiam ad hos pauca auxilia referre. Utendum igitur eſt agglutinatorijs & illitionibus, uelut dictum eſt, in his quibus oculi fluxione inſeſtantur, & in quibus uafa circa frontem ac tempora eleuata diſtenduntur. Nā ſi influxio non ex uafiſ circa frontem, & tēpora, ac palpebras contingit, ſed ex profundius ſiſtis agglutinationes & illitiones magis lædunt. Inſuper autē ſi citra inſlāmationē fluxiones oculorū ſiunt, agglutinatoria ipſas cohibent. Si uero inſlāmatio aſſuerit, humores ex circumſiſtis locis ad inſlāmmatos impuſſos, per compreſſionem magis diſtendent. Itaq; agglutinatoria ex ſimilagine & ouis ac thure compoſita uiſanda ſunt. Reſiccata enim diſtendunt uafa, & fluxiones augent. Quæ uero mollia permanent, aut diſtentionē non efficiunt, & tum frigidityte, tum adſtrictione

s uafa



uasa deprimunt, his utendū est. Si igitur calida fuerit intemperies quę lædit, Crocum, opium, myrrhā, thus, ex aqua trita, & ad strigmentitiā spissitudinem redacta illinimus, & statim inducto somno, dolorem depellimus. Idē præstant & fluuiatiles strigiotæ cum aloë contriti. Sed & polygonum cū mastiche tritum ac illitum, dolorem mitigat. Et mādragoræ cortex cū thure mirificè facit. Et mastiche cū succo brassicæ illotæ trita mirificè resiccat. Item fabrorum fuligo, quam uulcaniam appellant, leniter cum ouo subacta. Et calx uiua cum ouo in frigidis intemperiebus. Et hirundinum stercus cum mastiche & oui candido.

*Totius capitis illitiones Seueri. Cap. xcv.*

Totum caput intemperie calida affectum, acacia cum uino trita illinendum est. Nā acetum in huiusmodi capitis illitiōibus uitare oportet. Facit & samia terra cum plantaginis aut solani succo trita. Si uero frigidior fuerit causa, ut æger clarè frigiditatem in capite sentiat, & lacrymas frigidas deferri, contraria calidæ affectioni auxilia adhibenda sunt. Nasturtio enim cum ouo trito multum profecimus. Et per erucæ semen cum aceto tritum idem effecimus. Sed & thapsia cum sinapi aceto trita, magnopere prodest. Et cochleæ Africane cum thure ex aceto tritæ, multā fluxionis illationem relidunt ac excindunt. Et hirundinū nidus cum stercore in ipso reperto, aceto subactus graues dimidiū capitis dolores sanat. Et euphorbium cum aceto tritū. Vtere etiā smegmatis & puluillis inspersilibus, supra ad diuturnum capitis dolorem descriptis.

*Cataplasmata oculorum lippientium, Dioscoridis. Cap. xcvi.*

Cataplasmatibus uice imposita mitigant oculorum inflammationes, folia rubi aut auriculæ muris, aut tribuli uiridis, aut portulacæ, aut semperuiui, aut polygoni, aut intybi, aut coriandri, aut cupressi. Aut hyoscyami folia irita. Aut cucurbitæ ramēta. Aut peponis caro, aut calicum papaueris decoctum affusum. Aut ipsi calices cocti triti impositi. Commodus est etiam panis aqua madidus tritus cū modico rosaceo impositus. Et ouum cū rosaceo ac uino conquassatum, & hapso lanæ exceptū ac impositū. Aut ouorū assatorū uel coctorū uitellos, cū modico croco, & opio phaseoli magnitudine, ex sapa tere ac impone. Aliud Asclepiadæ, ad maximos humorum influxus ac dolores. Rosarum siccarum drach. i. opij drach. i. croci drach. i. efforma in pastillos cū passo, in quo melilotum coctū est. Et usus tempore ex ipsis terito cum passo, & ammixto pane imposito.

Aliud ad maximos dolores ac uigilias. Psylli semē in feruētē aquā cōiectū, paululum finito. Et ubi dissolutū fuerit, conquassato, ut emplastri formā acquirat, & ex eo oculū integito. Suauē enim somnū inducit. Aliud Demosthenis, ad dolores & prolapsus oculorum, egregiè facit. Calices papaueris in aqua mulla coquito, & ipsos quidē expressos abijcito, aquā mullam autē triticeo, aut ordeaceo polline ammixto imposito, modico etiam rosaceo adiecto. Aut polentę florē p polline, aut panē purā accipito. Cæterum cataplasmata omnino tēpora compræhendant, & supercilia cū frōte. Solam autē supernam palpebrā cataplasmate integimus, infernā non comprimētes, quo aperiri oculus possit, & lacry-

mam illatam excernere. Assidue uero permutentur, & maxime æstate, ut ne feruēfacta exacerbent. Ad contactum autem summè tepida apponantur, hyeme uero leniter calida.

*Illitiones oculorum.*

*Cap. xcvi.*

In uehemētibus doloribus palpebras forinsecus illinire oportet, maxime quidem collyrio Nili ex rosis, aut aliquo dolore eximēte ex croco parato, aut croco trito cum modico papaueris succo, affuso lacte aut hyoscyami succo. Aliā illitio Asclepiadæ, ad doloris uexationes. Aloës, lycij Indici, rosarū uiridiū, croci, opij, myrrhæ singulorum æquales portiones terito cum uino, & formato pastillos, ac siccato in umbra. Vsu uero expetente, passo dilue, & oculos ac tempora illine. Aliā illitio repulsoria optima. Foliorum mali siccorum tusorum ac cribratorū lib. i. myrrhæ sextantē, glaucij sextantē, gummi sex uncē. Excipe aqua. Illitio Asclepiadæ mordax, euectigio fluxionem cōpescēs. Facit & ad lippitudines scabras. Aeris usti drach. iiii. croci drach. iiii. piperis drach. ii. opij drach. ii. gummi drach. iiii. Excipe aqua. Hæc forinsecus illita maximos humorū illapsus relidit. Verum uitare oportet ne quid de pharmaco in oculum præterlabatur. Aliud phloginū in scriptū linimentū. Aeris usti ac loti drach. x i. croci drach. v i. piperis drach. i i i i. myrrhæ drach. i i i. opij drach. i i i. gummi drach. x i i. Terito cum uino ueteri odorato adstringente. Aliā illitio ex sandyce, ad perfrigerationes & resolutiones palpebrarum, quales cōtingunt & in his qui canino more conuelluntur. Facit etiā ad acuendum uisum ante balneum illita. Sandicis drachm. x iiii. crocomagmatis drach. v i. piperis drachm. iiii. gummi drach. vi. Excipe aqua. Aliqui adijciunt etiam opobalsami drach. iiii. & illinunt ad heberudinem uisus.

*De aridis collyrijs, Galieni. Cap. xcvi.*

Ex aridis pharmacis quedā affectionē in oculis cōgregari prohibent, humorū uidelicet influxiones impediētia, ex quibus oculi affligi solent. Præstantissimum autem ex his apparuit, & experientia iudicatum est, quod ego composui, inquit Galenus: & ob id apud multos in usu est, ac ferè per omnes gentes, quibus Romani imperant. Ac primū sanè ipsius cōpositionē scribā, quum præstātius esse putem, nullis omnino affectionibus corripī, quā eas quæ iam præoccuparunt sanare. Vtilissimū autē est sanis oculis pharmacū. Vritur lapis phrygius in fabaceas magnitudines confractus. Eum uero in ollam nouam missum, deinde forinsecus luto oblita olla, addito operculo foramen habente, eoq; oblito, ollam prunis imponimus. Quū autē lapis ignitus factus fuerit, tunc iā ollam in aliud uas purum euacuare oportet, & recenti butyro extinguere. Facta autem extinctione, rursus in eandem ollam missum, prunis adhibemus, ac uentilamus. Ignito uero lapide, ubi purum uaporem efferri uiderimus, rursus euacuatum extinguimus uino ueteri fuluo odorato. Deinde rursus missum in ollam lapidem, tertio urimus, & rursus extinguimus melle Attico non multo. Postremum autem melle extinguitur, ut mellis qualitas in lapide permaneat. Cæterum diebus trita ac præleuigata in promptu habere oportet, ita ut in tenuissimū puluē redacta sint subscripta. Aeris usti unc. i. piperis albi unc. i. folij malabathri unc. i. sti



bñ drach. xii. His ammisce lapidis usti, tusi, cribrati ac triti lib. i. Et postquam omnia simul probe fuerint unita, & reponere medicamentum uoles, adijce opobalsami primarij drach. xii. Sit autem opobalsamum tenue, & pellucens compage, non crassum. Impedit enim crassitudo, ne siccum pharmacum euadat. Utendum autem est ipso ad palpebras solas, inducto specillo citra tunicarum oculi contactum. Iubendus est homo cui hoc sublinitur, palpebras apertas habere. Hoc itaque à me compositum est, non permittens hominem qui ipso recte utatur, oculorum lippitudine apprehendi. Stibium ornandis palpebris praeseruatuum, pueris maxime commodum. Stibij drach. xvi. plumbi usti ac loti drach. viii. Squamæ aeris drach. i. croci drach. i. florum rosarum, myrrhæ, spicæ nardi, thuris, piperis, singulorum drach. i. palmularum ossa decē. Omnia in fictile uas cōiecta diligenter torrefacito, deinde tuis ac tritis opobalsami primarij cōpage tenuioris cochlearia duo adijceto: Et tritis ac siccatis utitor. Aliud Seueri, facit ad oculorum & palpebrarum pulchritudinem. Stibij quadrantem, purpuræ ueræ ustæ sextantem, spicæ nardi unc. i. Vtere. Stibium ornans palpebras. Stibij usti & loti drach. viii. ossium palmularum ustorum drach. viii. atramenti sutorij drach. ii. nardi celticæ drach. ii. Vtere, constat experimēto. Aliud, faciens ad decorē, angulos rarefactos ac humectos moderate resiccās. Cornu ceruini usti, purpuræ ustæ, singulorum drach. iiii. folij scylmatis unc. i. Vtere. Stibiū optimū ad tenuē fluxū, & corrosos angulos. Nutrit hoc etiā oculos debilitatos, in multis affectionibus cōprobatū, & mirifice omnibus se opponens. Facit etiā ad ornatū. Inductū enim multo tēpore in angulis permanet. Habet autē hoc modo. Carnis purpuræ torrefactæ drach. iiii. succi anemones drach. vi. stibij usti & uino extincti drach. iiii. succi baccarū sambuci drach. iiii. spinæ ægyptiæ drach. ii. ordeij usti drach. ii. gallarum nigrarum drach. ii. acaciæ drach. ii. mororū rubi aridorū tusorum drach. iiii. costij tui drach. iiii. folij tui drach. iiii. Singula seorsim terito, & simul in uase plumbeo reposito, ac utitor. Aridū Danai, quod uelut res sacra in regia urbe uēditū est numismatis cxx. & cū multo labore ab eo impetratum. Praeseruat ab omni lippitudine, palpebris inductū. Aeris usti unc. i. unguis siue onychas aromaticos ustos magnos tres, piperis grana xxi. ordeij usti grana xxi. palmularum ossa usta ix. æreas muscas xxi. folij scrup. ix. sanguinis draconij scrup. iiii. Aes accipe quod ab æris uasis dederaditur, & in fictile uas missum, ac prunis impositū, ad triduū ure, ita ut quotidie ter ipsum urina pueri incorrupti extinguas, & postremū aqua dulci. Aereas autē muscas accipe ex locis ubi boues degunt, aut si ibi nō reperias, ex mortuis animalibus. Aliud palpebras ornans, pharmacū quod prosperē accōmodatur. Facit & ad diurnas lippitudines. Stibij usti & uino extincti drach. iiii. plumbi usti ac loti drach. viii. fuliginis thuris, spicæ nardi, myrrhæ tostæ, croci tostij, squamæ aeris, singulorum drach. i. Tritis utere. Aridum ad angulos calidiores & rubicundos ac exasperatos: Seueri croci drach. iiii. cadmiæ lotæ drach. ii. cerusæ drach. i. Aliud Seueriani, cerusæ bellem, cadmiæ trientem, salis ammoniaci sextantem, piperis sextantem, folij trientem. Aliud palpebras or-

nās, facit & ad lippitudinem siccā. Sanat etiā omnē lippitudinē, post mitigatos dolores illitū. Aeris usti leuissimē triti unc. i. cedriæ puræ trientē. Aes cū cedria ad strigmentū spissitudinē terito, & in arūdinē mittito, & hanc obturatā forinsecus totā luto oblinito, & in clibano prunis obruito, & per diē ac noctē finito: & exemptam terito, & collyrij Pelarij drach. xxi. adijceto, & croci drach. ii. & folij scrupul. ii. & utitor. Aliud siccū collyriū celebre, resiccans multas fluxiones, & uisum acuēs. Optime quoque attenuat cicatrices. Aeruginis unc. i. cadmiæ unc. i. chalcididis unc. i. stibij unc. i. mellis mensurā congruam. Omnia leuissimē trita, & melle subacta, in ollā mittito, & addito operculo foramē habēte, oblinito, ac urito donec tenuis uapor progrediatur. Deinde exēpto ac trito utere. Quod si ipsum paululū mordax facere uolueris, post uestionem adijce piperis grana xxi. Aliud aridū ualde bonū: Cadmiæ sextantē, mellis sextantē, aeris usti drach. iiii. salis ammoniaci drach. ii. piperis drach. iiii. spicæ nardi drach. ii. Cadmiā leuissimē tritam melle subige, ure, & uino austero extingue, & cum reliquis tere ac utere. Est delacrymatiuū. Facit & ad asperas palpebras. Aliud siccū ad lacrymantes oculos, & eos qui à lōga lippitudine nō probe sanati sunt. Est etiā praecupariuū. Cadmiæ drach. viii. aeris usti drach. viii. stibij drach. iiii. Cadmiā cū ære in frustra crassiora contusam, & melle subactā in olla exurito, uelut antea dictum est, & uino ueteri odorato extinguito, ac siccato. Et deinde stibium per se ustum in olla ammisceto, & tuis cribratis ac tenuissimē tritis utitor. Quidam etiam armeniāci drach. duas ammiscent. Hoc siccū pharmacū sæpe cū uino uelut collyrium cōtrui, & siccato usus sum, inducēs ipsum palpebris mane & uesperī. Aliquādo autē etiā stibij drach. octo inieci.

Aliud siccū crocū, procatalepticū, id est, praeseruatiuū. Aloēs, croci, glauci, sarcocollē, singulorum uncia unā leuissimē tritis utere. Aliud, quo utor, & affectiones illino. Sistit fluxionē in una die, si dēse ac sæpe illinatur. Facit etiā ad egilopas, & palpebras corrosas, & pilos pungentes in palpebris, post euulsos pilos, pilorum locis illitū. Sarcocollē, croci, glaucij flauī, aloēs, chelidoniē, singul. unc. i. myrrhæ troglodyticæ drach. quatuor. Chelidoniā tusam cribratā reliquis adijce, & cōtritis utere. Ego cū aqua uelut collyriū cōtero, & sicco utor. Aliud siccū collyriū celebre, uisum acuēs, inoffensos cōseruās oculos. Stibij scrup. iiii. fuliginis purpuræ ueræ, rosarū siccarū, singulorum scrup. ii. croci scrup. iiii. folij scrup. iiii. spicæ nardi scrup. iiii. Tritis uere. Fuliginē autē sic facito. Lanā purpuræ cedria tinctā incēde, & pelui leuissimo, aut ereo uase cōtege, & cōflatā fuliginē penna collige, ac utere. Aridū albū, uisum acuēs. Facit ad pruritus, & uestiones ex sole, & lippitudines incipiētes ex frigiditate, ante & post cibum. Cadmiæ drach. ii. salis ammoniaci drach. i. piperis drach. ii. aluminis scissi drach. ii. folij drach. ii. cerusæ oboli dimidiū. Terito cum uino albo, & siccato utitor.

Aliud siccū acre. Cadmiæ drach. xxi. salis ammoniaci drach. ii. spicæ nardi drach. i. piperis albi drach. i. tritis utere. Aliud optimum. Cadmiæ drach. viii. croci drach. ii. salis ammoniaci drach. ii. spicæ nardi drach. i. piperis albi drach. vi. Tritis utere. Aridū Seueriani, Cadmiæ ustæ & lotæ drach. viii. salis



salis ammoniaci drach. ii. piperis albi drach. ii. folij drach. i. cōtusis, cribratis, ac probe tritis utere. Aliud aridū acre, Cadmiæ drach. viii. testarū sepia sextante, salis ammoniaci unc. i. piperis unc. i. folij unc. i. utere. constat experientia. Aliud aridum uisum acuens, Oribasij. Radicis chelidoniae sextantem, aloës sextantem, folij unc. i. piperis decorticati drach. iiii. ueratri albi drach. i. Vtere. Aridum Apollonij ad uisus hebetudinē. Cadmiæ drach. viii. fecis uini ueteris siccae uisae drach. v. piperis albi drach. v. salis ammoniaci drach. x. sandarachæ drach. ii. folij drach. ii. nitri uisti drach. iiii. Aliud aridū ad suffusiones & hebetudines. Viperam masculam totam uiuā in ollam mittito, & succi fœniculi cyathum unum adijcito, & thuris non secti granum magnum addito. Deinde totam ollam forinsecus luto oblitam, urito donec in cinerem redigatur indita, teritoq; ac utitor hoc arido medicamento uelut celebri. Faciunt & uiperæ capita uisae, trita, & inducta. Aliud. Incomparabile. Veratri albi & piperis æquas portiones tussas ac tritas adhibe per triduum, purgatione prius per uentrem facta, & per os ac nares. Aridum ad incipientes suffusiones, glaucedines, & pellicularum crassitiem, Cadmiæ drach. xxi. salis ammoniaci drach. x. sandarachæ drach. iiii. ueratri albi drach. ii. folij drach. ii. utere. Ego si aliquando opus habeo arido collyrio ad præsentis affectiones commodo, hoc trito & in leuissimum puluillum redacto utor. Aliud siccum acuens uisum, experientia cognitum. Cadmiæ drach. viii. folij drach. viii. spicæ nardi, drach. ii. piperis, croci, auripigmenti, salis ammoniaci, chelidoniae, singulorum drach. ii. artemisiæ, folij malabathri, singulorum drach. i. utere.

De liquidis collyrijs. Galeni. Cap. xcix.

Liquida ocularia medicamenta cōponuntur ex succis, & liquoribus, felleq; ac melle, & ammoniaco thymiamate, ita ut ammisceantur ipsis etiam moderatiora quædā, uerum uiribus nō repugnantiā, myrrha inquit, & thus, & crocus, & galbanū, & quæcunq; alia huiusmodi, quæ tunicas rarefacere, & crassitudinē humorū ac spiritus attenuare possunt, & humiditatem præternaturalem discutere, & tunicis oculorum per suum temperamentū, robur præbere. Liquidū acuens uisum. Succū ex malis punicis expressum, in uas fictile Atticū leuissimum ac densissimum mittito, & tenui linteo obligatum ad solē exponito, donec mellis crassitudinem acquirat, & parem mensurā mellis ad succū adijcito, & fictili uase exceptū reponito. Inueteratum enim melius euadit. Quum autē dormire uolueris, ex hoc leuiter oculos sublinito. Hoc pictoribus, & scriptoribus, & aurisuforibus ac senibus cōuenit. Aliud. Ampullam uitreā oleo expleto, & iniectis fœniculi folijs teneris in solē exponito ad dies quadraginta. Et expresso fœniculo, oleo utitor. Aliud uisum acuens. Adipē uiperæ in uitream ampullā mittito, & ubi liquatus fuerit, specillū in eo tingito, ac illinito. Hoc ualde cōmodū est. Aliud uisum acuens. Colocynthidis semen tustum, cribratū, ac leuissime tritum cū melle adhibeto. Ex perimento cōstat. Aliud ad uisum acuendū, & ad suffusiones ac cicatrices oculorū. Chameleontis nigri radicem uisā, ac leuissimè tritā illinito. Aliud. Intestina terræ in testa ad cinerem exure, & cinere trito cum melle utere. Ego hoc arido usus sum ad albugi-

nes. Aliud ad inchoantes suffusiones. Mel, oleum uetus, & fœniculi succū, æquis portionibus misce ac utere. Aliud. Sagapeni drach. ii. spumæ nitri drach. v. mellis lib. ii. Aliud Demosthenis. Ego uero sub scripto utor: Caucalidis succū, coronopodis succū, chamædryos succum, æquis portionibus excolato, ficcato, collyria formato, ac utitor. Si uero liquido uti uoles, cum melle tritis utere. Aglaide liquidū ad principium suffusionis. Floris æris obol. v. piperis obol. v. croci drach. ii. castorij drach. ii. fellis galli drach. i. omphacij drach. iiii. & dimidiam, spicæ nardi obol. i. lapidis hæmatitæ obol. ii. spumæ nitri obol. ii. floris salis drach. xxi. opobalsami drach. xxi. mellis quincuncem. Omnia trita in argenteo uase reponito. Erasistrati panchrestos liquida cōpositio. Ad inflationes pruriginosas, & lippitudinem scabram, aures purulentas, ulceras ægre recipiētia cicatricem, cynāchen siue anginā, & ad nomas in ore ac pudēdis. Aeris uisti drach. ii. myrrhæ drach. iiii. misyos tosti drach. iiii. piperis drach. i. croci sesquidrachmam, uini austeri ueteris cochlearia. iiii. passicretici cochlearia ii. trita rursus terito cum uino, & ubi id combiberint, passum adijcito, & unita in æreo uase ad mollem ignem coquito, usq; ad mellis spissitudinē, & in ænea pyxide reponito. Alia liquida ex succo uerbenacæ. Facit ad hebetudinem uisus, pupillæ debilitatem & obfuscationē, facit & ad corrosos angulos, ad tenuem fluxum, & inchoantes suffusiones. Fellis capræ drach. viii. mellis attici sexuncē, lycij indici drach. iiii. piperis drach. iiii. succi uerbenacæ rectæ deuncem, & sicci succi drach. viii. piperis ac angustissimo cribro excretum, postea diu in mortario terito, & sicco succo adiecto, simul terito. Deinde etiā liquidum succū, & mox lyciū addito. Et ubi leuigata fuerint, mel adijcito, & mox fel ipsum & unita excipe, ac utere. Quidā ipsam herbā, uerbenacā dico, tūdunt ac cribrāt, & drach. viii. adijciunt. Si uero siccus medicamentum euadat, collyrium efformato ac utitor. Siccum cassij, ad uisum acuendū & ad glaucedines, antiquas lippitudines, uisus hebetudines, ac obscuraciones. Fel taurinum totū in æneā pyxidem euacuatum, ad dies x. finito, deinde trita adijcito, croci, myrrhæ, opobalsami, singul. drach. i. piperis grana xx. mellis Attici duplum fellis. Et omnia simul trita in uas æneum inijcito, & ad mollē cinerē ad mellis spissitudinem coquito, & in ænea pyxide reponito, ac utitor uelut bono. Simul enim ut illitum est, efficaciam suam declarabit. Alia liquida Bolæ inscripta, ad suffusiones. Fellis felis partem unam, mellis Attici duplum, succi hieracij parem mellis mensuram, misce & utere. Alia ad suffusiones celebris. Fellis coruorum recentium trientem, sagapeni perlici drach. i. succi cyreniaci unc. i. opobalsami unc. i. mellis dodrantē. Alia ualde celebris, ex cuius usu successum habui. Fellis capræ drach. iiii. opobalsami drach. ii. croci drach. ii. spicæ nardi, cassiæ, lacrymæ oleæ æthiopicae, aluminis scissi, medulæ struthocameli, myrrhæ, singul. drach. i. mellis unc. xvi. præparato diligenter, & reponito in pyxide æris cyprij, ac utere. Alia. Theriaces Andromachi drachm. iiii. succi cyreniaci drachm. vi. opobalsami drach. ii. mellis non fumosi drach. v. Theriacam primum uino ueteri dulci dissolue, & opobalsamum ac mel adijce, & utere.

Alia



Alia liquida Apolloniæ, ualida cõpositio ad suffusiones. Sagapeni drach. II. succi cyrenaiçi obol. II. ueratri albi drach. IX. rutæ syluestris drach. I. spumæ nitri obol. III. mellis quadrātem. Alia. Omphacij drach. I. myrrhæ drach. I. salis ammoniaci drach. I. opobalsami, lacrymæ oleæ Aethiopicæ, ammoniaci thymiamatis, singulorū drach. I. fellis hyænæ drachm. II. Excipe melle & utere. Alia. Fellis hyænæ, adipis uiperæ singulorum sesquidrachmā, croci drach. I. omphacij drach. I. opobalsami drach. I. myrrhæ drach. III. & dimidiā. Mellis quantum satis est. Alia, ad suffusiones, etiam si fuerint diuturnæ. Lapidem Scyticum cum felle aspidis tritum illine. Breui liberat. Sit autem Aspīs quæ Acōtias appellatur. Fel eius reperitur ad dorsum hepatis annexum. Alia, ad omnem uisus hebetudinem ac suffusiones, facit etiam ad palpebras pungentes pilos producentes. Mellis sextantem, opobalsami drac. II. myrrhæ drach. II. succi cyrenaiçi drach. I. opobanacis drac. I. utere. Alia, ad suffusiones, ut æger intra quinq; dies uisum recipiat, adeo magnū ac admirādū auxilium est. Facit etiam ad asperitates palpebrarum. Et raro quis tale habere potest. Adipis uiperæ, fellis galli albi, floris æris, succi rutæ syluestris, lactis canini, opobalsami, æquis portionibus tritis utere. Aliquando uero pro æris flore, atramentum futorium cõiungo. Alia liquida nigra. Ad hebetudines, & fluxiones, ac affectiones. Clauorum caligarū ueterū prælotorū ac probe siccatorū librā I. in sextar. I. aceti acerrimi mittito, & per dies quinq; finito. Deinde in olla fictili aut ferrea, lēto igne donec ter ebulliat coquito & excolato, & mellis despumati & colati lib. I. adijcito, & ad mollem ignem usq; ad strigmentitiam spissitudinē coquito, ramulis fortibus absinthij tribus simul colligatis agitando. Deinde ubi coactū fuerit medicamentum, atramenti futorij leuissimē triti unc. I. inspergito, ac utitor per spicilli nudeū angulos inde cōtingens. Alia repellens fluxiones, & detergens oculorū tunicas. Attenuat etiā cicatrices, & forinsecus supernæ palpebræ illita repellit fluxiōes, si statim ab initio illita fuerit. Melā terig, uelut iā diximus de clauis, præparatæ, & mellis parē mensuram, & succi fœnigræci tantundem, simul mixta & excolata, ad lentū ignem coquito, assidue agitando donec mellis cõpagem acceperint, & repositis utere. Cæterum fœnigræci succum præpara uelut dictum est in ulcerū oculorū tractatu. Sed & dū excolas fœnigræci succū, ne exprimas ipsum, sed spōte defluentē iniice. Si uero ubi paratū fuerit pharmacum & frigefactum, grumī in ipso fuerint, totum paulatim in mortarium transfundito, & dissolutis grumis reponito ac utitor. Alia liquida, ad ficosas eminentias, & omnem carnis extuberantiam, & ad carnis in angulis incrementum, & ad incipientes lippitudines. Misyos tostī drach. VIII. myrrhæ drach. II. mellis quod satis est. Alia. Misyos tostī drach. VI. atramenti futorij drach. III. myrrhæ drach. III. mellis quod satis est. Orisbasi liquida ad suppuratos ex ulceratione. Atramenti futorij drach. VIII. croci drach. VIII. myrrhæ drach. III. mellis lib. I. Alia liquida eiusdem. Mellis sextantem, opobalsami drach. II. succi cyrenaiçi sesquidrachmam, opoponacis sesquidrachmam. Ex eodem liquida Balsi, ad suppuratos oculos. Croci, aloës,

myrrhæ, singulorum sesquiunciam, uini quadrantem, mellis sexuncem. Crocus teritur cum modico uino. Deinde aloë & myrrha, & ubi ad compagem redacta fuerint, inspissata melli adijciuntur, & unita reponuntur in uitreo uase. Vtere hoc bis illinens in die, aut si res urgeat, etiam ter, & oculum deliga. Repurgat, incarnat, cicatricem inducit, usque ad finem illita. In plerisq; uero post repurgationem, ad collyria transimus, & maximē id quod inscriptum est scutulare, capræ faciem præferens. Alia liquida experimēto cõflans. Succī uerbenacæ recte, lycij indicij, æquales partes, hoc est, sing. unc. I. mellis tantū dē. Alia liquida ex adipe uiperæ. Mirificē facit ad incipientes suffusiones, & hebetudines oculorum sanat. Succī rutæ, opobalsami, succi fœniculi, succi chelidonie circa sepes nascentis, adipis uiperæ in duplici uase eliquati, mellis non fumosi, singulorum æquas portiones simul mixtas per purum linteam excolato, & utere cõfidenter, ita ut aliquādo mellis sesquiunciam, & reliquorum unc. I. cõiicias.

*Collyria ex croco, & ex succis diuersa. Cap. c.*  
Collyrium ex croco ad initium lippitudinū. Glaucij drach. XXIII. sarcocollæ drach. XVI. croci drach. VIII. gummi drach. VIII. tragacanthæ drach. III. Arida omnia trita ac leuissima facta, tragacantha madefacta excipe. Aut sic præpara. Sarcocollam aqua terito, deinde glauciū cribratū adijcito, ac rursus terito. Deinde crocū siccum leuissimē tritum, & tragacanthā siccā in tenuissimū puluillū redactā, & gūmi similiter insperge, quo eadē die aut postera in collyria redigātur. Nam collyria diu in mortario manentia nigrescūt, & uires immutāt. Vtere aut ipso, aquosum infundēs per ouū, lippitudine incipiente. Incipiente uero declinatione crassum instilla. Cōstāte autē declinatione fiēte, cū aqua illine. Aliud ex myrrha. Glaucij drac. XLVIII. sarcocollæ drach. XLVIII. croci drach. XXIII. opij drach. VI. myrrhæ drach. VI. tragacanthæ drach. XLVIII. lapidis hæmatitæ drach. VI. gūmi drach. XVI. Excipe aqua. Vtus est per ouū. Aliud Phosphorus appellatū, ad dolorē, & omnē inflammationē, & intētos humorū influxus. Glaucij drac. XXIII. sarcocollæ drach. VIII. croci drach. VIII. opij drach. VIII. myrrhæ drach. VIII. misyos usti drach. VIII. gummi drach. XII. Excipe aqua.

Aliud Euchrona colore bono dictū. Facit ad ea quæ Phosphorus. Cōmodat & asperis palpebris. Est & pueris cōmodū. Glaucij drac. LXIII. sarcocollæ drach. XXXII. croci drach. XXIII. opij drach. VI. myrrhæ drach. VI. hæmatitæ drach. VI. tragacanthæ drach. XVI. gūmi drach. XVI. Excipe aqua, & instilla in principio per ouū. Aliud dolorē eximēs ex succis ad omnē doloris uexationē. Somnū inducit cōfestim. Glaucij drach. XLVIII. sarcocollæ drach. XVI. croci drachm. VIII. opij drachm. III. Lycij indicij drachm. III. succi rosarum drachm. III. succi mandragoræ drach. III. succi hyoscyami drac. III. succi cicutæ drachm. III. tragacanthæ drac. XVI. gummi drach. XLVIII. Excipe decocto meliloti. Componitur autem hoc modo. Accipe meliloti lib. I. aquæ pluuialis sextar. VI. Coquito ad tertias, & excola liquorem ad pharmaci præparationem. Collyrium ex succo polygoni. Succī polygoni sexuncem, lycij indicij drach. VI. aloës drach. III. myrrhæ drach. III. thuris drachm. III. opij drachm. III. acaciæ ni



græ primariæ drach. xii. Vini ueteris odorati quā tum satis est. Facit ad omnes in oculis affectiones, re primit fluxiones, & sedat dolores. Amat autem bal neū. Quare ubi illeuisti, lauari iube. Facit & ad ulce ra. Collyrium ex succo Rhamnī, ad chemoses & dolores, de quo quidam magnopere gloriantur. Ae ris sextantem, cadmiæ sextantem, opij sextantem, aloës scrupu. xii. croci scrup. xii. acaciæ bessē, gū mi bessē, succi fructus rhamni lib. i. Aquæ quantiū satis est. Si uero abundas, succum fructus totum inij ce, & gummi aqua macera. Collyrium è succo uerbenacæ, quod maximas humorum influxiones intra secundam illitionem exoluit. Croci drach. iiii. meliloti drach. vi. glaucij drach. xii. opij scrup. iiii. amyli drach. iiii. gummi drach. i. terito, & succum uerbenacæ rectæ affundito, efformatoq; ac utitor. Est & alia efficax compositio, ut uix credi possit, fa cit ad lippitudinem, tumores laxos, & inflationes, omnemq; humorum influxionem, & desperatas in oculis affectiones intra triduū remouet. Croci drac. xiiii. amyli drach. xii. glauci drach. xvi. albuminis oui drachm. iiii. tragacanthi drachm. iiii. tere, & suc cum uerbenacæ rectæ affunde, efforma q; ac utere. Collyrium ex succo fœniculi. Cadmiæ dodran tem, stibij bessē, misyos crudi sexuncem, ompha cij sesquiunciam, chalcitidis unc. i. croci sesquidra chmam, folij unc. i. succi fœniculi bessē. Et rursus aliud fœniculum cum aqua pluuiali decoquito, & cum eo decocto prædicta terito ac efformato. Hoc multi præparatum habent.

*Collyria unius diei, monohemera appellata. Cap. ci.*  
Collyria unius diei cum candido oui illita, plerūq; statim ab initio lippitudines absq; humorum multi tudine factas curant. Reuera enim non parum sæpe hæc magnas inflammationes mitigauerūt, ut in ues peram quidem homo balneo usus sit, postera uero die collyrio nardino illitus fuerit ad instaurationē ac corroboracionem. Ammiscetur autem ad nardi num in prima illitione, parum quiddam de acribus ac sistētib; appellatis collyrijs. In secunda uero illi tione, paulò amplius quiddam de iisdem. Sufficiunt enim duæ pharmaci adhibiciones, & deambulatium cula aliqua non multa ante balneum, ad perfectam restitutionem. Collyria igitur unius diei, quæ pri uatim seculenta nominantur, multam habent aca ciam. Quædam uero aut omnino modicam, aut omnino non habent. Complectuntur autem in se, alia æris squamam, alia æs ustum modicum, cum multis alijs quæ moderatè adstringunt, & conco quunt ac discutiunt. Talia autem sunt, crocus, myr rha, lycium indicum, Sed & castorium ac thus citra adstrictionē concoquunt, simulq; discutiunt. In qui bus igitur adstringentia prædominantur, plurimum oui liquorem, & parum de pharmaco esse oportet, & præsertim si quid ex metallicis pharmacum in se complectatur. In quibus uero crocus, & myrrha, ca storiumq; ac thus, & lycium præualent, paulò cras siore pharmaco utendum est. Fomentum præterea omnino adhibendum est ipsis per spongiam, si qui dem mediocris sit dolor, semel aut bis in die; Si ue ro uehementior dolor urgeat, præstat ter aut qua ter, & sæpius uti, in longis præsertim estiuis diebus. Fiat autem fomentum per meliloti ac fœnigræci de

coctum. Oportet tamen horum collyriorum usum uitare, in quibus humorum multitudo in toto cor pore adest. Nam monohemera quum sint facultate frigida, obstructionem corporum, & densationem meatuum faciunt. Si uero materiæ multitudo in ocu lis fuerit, ruptionis corniformis tunicæ causa fiunt. Nos autem in recentibus lippitudinibus, Theodo tio Seueri illito ex aqua, & spōgia forinsecus oculo imposita egrum ab affectione liberauimus. Et ple runq; balneo uti iubemus statim post primam illi tionem. Cæterum Monohemera collyria hæc sunt. Collyrium Monomelum appellatum, eò quod ex unica specilli inductione, inquit, curat. Est autē mul ti usus. Facit ad diuturnas ac ægre solubiles affectio nes, & maximè in quibus etiam palpebræ exaspera tæ sunt, per subiectionem illitum. Oportet autē post illitionem diu claudere oculum. Facit etiam ad con fusiones oculorum, & ad staphylomata. Est etiam pueris commodum. Vtere cum aqua diluto in his qui mordacitatem ferre possunt, in alijs cum ouo. In omnibus autem per subiectionem palpebræ sub line. Si uero uehemens fuerit inflammatio, cum ouo infunde. Habet hoc modo. Cadmiæ drach. x xiiii. æris drach. xii. chalcitidis tostæ drach. xii. opij drac. xi. piperis grana x xiiii. mellis sesquiunciam, gum mi drach. x xiiii. Excipe aqua. Mel postremū adij citur. Pelarium, quod in principijs aquosum cum aqua dilutum adhibetur. In uigore uero aquosum cum ouo. Ad diuturnas autem affectiones crassius cum ouo. Deinde sensim progressu facto, etiā aqua ad ouum ammiscetur. Ad finem uero ex aqua sola diluitur. In ulcerationibus tamen minus efficax est. Cadmiæ drac. xvi. cerusæ drac. xlviii. acaciæ drac. x xiiii. opij drach. iiii. amyli, tragacanthæ, gummi singulorum drachm. xii. æris usti sesquidrachmam, mirrhæ drach. iiii. croci sesquidrach. Excipe aqua. Aliud pelarium Antoninus appellatū. Cadmiæ drach. x xiiii. cerusæ drach. x xiiii. acaciæ, opij, sin gulorū drach. xviii. gummi, tragacanthæ, amyli, singulorum drach. ix. myrrhæ drach. iiii. æris usti sesquidrachmam. Excipe aqua. Hoc magis facit ad exulceraciones. Aliud pelarium, quod Comitem uis uocant. Cadmiæ quadrantem, cerusæ quincun cem, pompholygis quadrantem, opij sesquiunciam, acaciæ, myrrhæ, gummi, singulorum drac. viii. tra gacanthæ quadratē, amyli sexuncē, æris usti drac. iiii. croci drac. iiii. Excipe aqua. Est autem opij nū ad chemoses, & reliquas lippitudines etiam in uigo re, & ad omnes ulceraciones in quibus densæ factæ sunt palpebræ. Repurgat enim & replet ac cicatri cem inducit. Maximè uero hoc utor, si pro pompho lyge, cadmia ter usta ammixta fuerit. Pelarium Edessenum; Tragacanthæ, gummi, acaciæ, amyli, sar cocollæ, singulorum drach. ii. opij drach. iiii. cerusæ drachm. viii. cadmiæ drach. xvi. Excipe aqua.

*De collyrijs sistētib; Seueri. Cap. cii.*

Collyria quoq; quæ sistētia appellantur, repulso ria sunt. Sistunt enim inordinatum fluxionis impe tum. Et quædam ex ipsis Hermolai uocantur, quæ dam uero Hexacontarchia, ex eo, uelut puto, quod uniuersus ipsorum apparatus sit sexaginta drachma rum. Quædam autem Hecatontarchia. Multæ uero sunt etiam horū materiæ, ob quorū copiam medi cus



cus indignatus, uelut in pelago uertigine affectus, à scopo aberrat. Oportet igitur omnium facultates discernere, & ad unum finem horum efficacias adaptare. Nosse enim oportet quod omnia sistentia collyria frigefaciunt & adstringunt, alia magis, alia minus. Sed & reficiant aliquo modo. Proinde ad calidiores lippitudines talia commodant, non tamen statim à principio, priusquam concoctio apparuerit. Optimū uero & admirandū nobis uisum est: Album Seueri collyriū, quod ex fœnigræci succo præparatur, & cadmia, & cerusa, ac tragacantha. Et quod post ipsum scriptū habetur. At ubi ad concoctionem perducta est affectio, rursus ex multis sistentibus commodum reperimus Hecatontarchiū, & adhuc magis ipso, id quod post ipsum scriptum habetur. Recipit autem Hecatontarchiū: Aeris drach. xii. cadmiæ drach. xv. myrrhæ drach. iiii. acaciæ drach. xx. opij drach. iiii. gummi drach. xx. Quidam etiā croci drach. i. Excipe aqua. Hoc collyriū aquosum ad illitionē assumptū, ad complicatas affectiones commodum compertū est, in quibus est inflammatio, & distentio, & fluoris influxio. Attenuat enim palpebras, & ipsarum densitates ac aspritudines exæquat, cum aqua illitū. Sed & uisus hebetudines sistit, adstringens ac uelut exprimens incubentes oculo humores. In his tamen qui subtili oculorum sensu præditi sunt, cum oui candido collyriū diluere oportet. Si uero oui candidum desit, panem purū non aridū, neque multi salis participem, aqua maceramus, & aquā excolatā ad illitionem accipimus. Sin minus, farinā purā mades facimus excolamusque ac cremore utimur. Conuenit autem ut ne acruatim auxiliorū mutationes faciamus, neque aliud illinamus, & aliud superillinamus. Oculus enim à peregrina innouatione magis perturbatus iniuria afficitur. Itaque hecatontarchio, uelut dictum est, utendū est ad complicatas affectiones, ita ut aquosum ipsum faciamus in usu. Hic enim est admirandus ipsius ductus. Est & aliud collyriū sistens, ex eadē materia constans, sed dissonantiā solum in apponderatione habens. Excedit autē præcedens in sua actione. Vidimus enim operum ipsius euentum. Sed & hoc à uulgo medicorum ignoratur. Accipit autē, Aeris usti quadrantē, cadmiæ quadrantē, opij, myrrhæ, singulorū drach. iiii. acaciæ, gummi, singulorum septuncem & uncia dimidium. Excipe aqua. Hoc collyrium inenarrabilem quandam uim habet, & tempestiue adhibitum, desperatas affectiones sanat, & graues dolores mitigat ac sedat. Tempus autem adhibitionis eius est, lippitudinis uigor, quando concoctio facta fuerit, & gramæ in oculo conspectæ, & uelut subcructum quiddam in oculo apparuerit. Siue enim chemosis fuerit id quod affligit, siue palpebrarum inflammatio, congruum est ipsis hoc auxilium. Tantam enim quietem ex eius usu ægri consequuntur, ut quum antea diu uigilias tollerant, statim ab illitione somnū assequantur. Confidenter igitur ad pharmacum accurre, considerans num tenuis lacryma post collyrii illitionem defluat. Habebis enim & in hoc successus signum, si omnino non post illitionem lacryma defluat. In quibus enim ex prima illitione lacryma sistitur, sed in adstricti permanent, & uelut somnus succedit, in his statim sanitas expectanda est, ut non opus sit secunda illitione. Si uero adstrictio fiat in prima il-

litione, infundendum est ipsis oui candidum per se moderate calefactum. Verum in secunda illitione aut tertia, ab eo symptomatis accidente liberabuntur. Primum enim oculus uelut re peregrina offensus, mordetur: Deinde uelut aduetus, magis delectatur. Pruritus enim modicus ipsis oboritur cum quadam uoluptate. Atque hoc est signum successus. Nam corpora in profundo liberata, causas ad superficiem propellunt. Præcipiendum est autem, ut quibus illitum est pharmacum, oculos ne aperiant ante collyrii concoctionem. Commoti enim meatus rarefiunt, & collyrium ad profundum cōdescendens, mordacitatem inducit. Post concoctionem autem collyrii spōgias adhibere oportet, non magno facto somēto, & ipsū collyriū aquosius illinere. Distenditur enim palpebra in crassioribus illitionibus, ut ægre ferat æger, & palpebræ grauentur. In principio igitur cum ouo illinatur aquosius dilutum. (At uero coactio eius fiat in feruida cote, calefactum enim crassius se ipso euadit). Nam sic adhibitū in dolore admirandū collyrium compertū est. Etenim ex hoc ductu etiam paruā in ipso apparētem adstrictionē penitus excludimus. In uigore uero itidem cum aqua adhibeatur. In declinatione autē cum aqua, & sub palpebrā illinatur. Etiam si enim densitas relicta fuerit, & hanc itidem sanat. Magnopere quoque pueris confert. Curat enim etiā horum ardores. Possemus porro plura auxilia recensendo, maiorē legentibus difficultatem parere, uerum quū paruo labore susceperimus, imò potius experientia inuenerimus præscripta collyria, efficacias ipsorum simul cum præparationis modo candide exposuimus. Collyriū sistens ex oleo. Oribasij. Cadmiæ ustæ & lotæ drach. xl. aeris usti & loti drach. viii. opij, myrrhæ, singulorū drach. x. acaciæ drach. centum, gummi drach. centum uiginti. Terito ex aqua, & ad excipiendum adijce olei omphacini quadrantē, & drach. iiii. Adhibetur in principio aquosum cum ouo. Aliud ex oleo, uelut expertus sum, facit ad principia lippitudinis, & fluxiones, & ueteres affectiones, & ad corrosas palpebras. Cadmiæ drachm. xx. aeris drachm. xx. myrrhæ drachm. vi. opij drach. i. acaciæ, gummi, singulorū drachm. xlviii. olei omphacini sextantem. Terito cum aqua. Collyrium Scutulare appellatum, capræ faciem præferens, & sistendi uim habēs, in principio quidem cum ouo crassum, & ad declinationes similiter. Ad uigores autem aquosum. Facit mirifice ad suppuratos oculos, & sordida ulcera paulatim repurgat, & dolorem euestigio eximit. Cadmiæ sesquiunciam, aeris sesquiunciam, croci drachmas iiii. aloës bessēm, lycij indicij sextantem, acaciæ sexuncem, opij sesquiunciam, myrrhæ drachm. iiii. tragacanthæ unc. i. gummi sexuncem. Hermolaus paruus. Cadmiæ unc. i. croci drachm. iiii. myrrhæ drachm. iiii. aloës drachm. viii. acaciæ drachm. viii. gummi drachm. xx. Excipe aqua. Vtere hoc ammixto alijs collyrijs lenibus, & infunde in principio cum ouo. Hermolaus magnus. Facit ad prædicta multo melius. Cadmiæ bessēm, spicæ nardi sesquiunciam, aeris sesquiunciam, croci trientem, aloës bessēm, lycij indicij sextantem, acaciæ sexuncem, opij trientem, myrrhæ trientem, tragacanthæ unc. i. gummi sexuncem. Excipe aqua. Collyrium Olympionid. Facit ad maximas doloris



uexationes, & chemoses, & in summa est ex collyrijs prosperi successus, statim enim liberat. Cadmiæ lotæ drachm. viii. sibiij lori drach. viii. aloës drac. viii. myrrhæ drach. iiii. croci drach. iiii. opij drac. iiii. gummi drach. viii. Excipe aqua. Vfus est cum ouo. Temperatura uero crassior sit. Ego pompholygis drachm. iiii. & thuris drachm. iiii. adijcio. Collyrium Ericerum Achariston appellatum, ab erica, & dignæ gratiæ desperatione. Facit ad maximas humorum influxiones. Ex huius usu in Aegypto successum sentiunt, præsertim in agrestioribus corporibus. Cadmiæ drachm. xvi. æris usti ac lori drachm. viii. opij drach. iiii. seminis ericæ drach. iiii. acaciæ drach. viii. myrrhæ drach. iiii. gummi drach. xvi. Terito cum aqua & excipe. Vfus est cum lacte muliebri. Temperatura sit media. Vbi uero circa oculos affectio est, à collyrio abstinere oportet. Ego porrò hoc usus sum. Cadmiæ drachm. xvi. æris usti lori drachmas iiii. seminis ericæ drach. ii. opij drac. ii. myrrhæ drachmā i. acaciæ drach. i. gummi drac. viii. Excipe aqua. Vfus in principijs sit aquosus, & lauato. In declinationibus autē crassum cum ouo illine. Aliud Ericerum, quod cum magno labore accepi, uelut magnū donum. Facit ad prædicta multò melius. Et ad asperas palpebras, & ad ipsorum debilitatem. Si non prius mercedem acceperis, ne illianas. Cadmiæ drach. viii. æris usti drach. iiii. chalcididis crudæ drach. viii. aloës drach. vi. opij drach. iiii. croci drac. iiii. seminis ericæ drac. iiii. acaciæ drachm. xii. gūmi drach. xii. Excipe aqua. Aliud Ericerum celebre, quod appellatur fissum Achariston, eò quòd digna gratia ipsi rependi non potest. Facit ad fluxiones antiquas, & dolores maximos qui sunt citra ulcerationē, ab initio usq; ad finem cū aqua cohibet diuturnos fluxus in ulcerationibus aquosum cum ouo. Aspritudines autē attenuat cum aqua, & albugines deterit, & diuturnas uisusurbationes sanat. Et post sublata pterygia commodū est. Attenuat enim pelliculas, & cicatrices planas efficit. Valde utile est in suffusis post perfunctionē. Per lenem enim adstrictionē, robur oculo addit. Est etiam pueris commodū. Cadmiæ drach. xvi. æris drach. iiii. seminis ericæ, opij, myrrhæ, singulorum drach. viii. acaciæ drach. iiii. gummi drach. viii. Huius equidem periculum ego non feci. Quæ uero de ipso dicta sunt, præstat id quod ipsum præcedit.

De lenibus collyrijs. Galeni. Cap. ciii.

Ex collyrijs lenibus appellatis quædam terrea essentiam habent citra frigiditatem aut caliditatem manifestā, in medio quodāmodo horum consistentia. Et ex his ipsis aliqua, modica frigiditate aut caliditate participāt. Aliqua uero omnino nullā talē uim præse ferunt. Totū itaq; genus ipsorum obstruendi uim habet, contrariam his quæ ab obturatione liberant. Qualis est Samius Aster appellatus, qui tenuiorum partium est quàm terra simpliciter samia nominata. Et pompholyx lota, & cinis ipsius lotus. Et cadmiā usta ac lota. Huic autē parum quiddam facultatis extensoriæ adest, siue post uersionem, siue sine hac lauatur. Pompholyx autem & spodium modicam adstringendi uim habent, quemadmodū etiam ustu ac lotum plumbum. Est enim mordacitatis exors, habet autem & astrictionis quippiam. Est & amyalum lene, & cerussa lota, uicina est facultati plumbi

usti ac lori. Lene est item foenigræci decoctum. Et quod in ouis est album ac tenue. Et lac boni succi in horum genere esse putandum est, itemq; gummi ac tragacantham. At stibium non lotum quidem, fortē adstringendi uim ostendit. lotum autem exoluuitur, ut propē mordacitatis exors euadat. Alterum porrò genus est eorum quæ paruum habent mordacitatem, ex eo quòd ammixta sunt ipsis quædam ex modicè adstringentibus: qualia sunt rosæ & thus, quum modicam quidem adstrictionem habeant rosæ, & parū de extensoria facultate ipsum thus. Quū autem moderatè calidum sit thus, ob id quandam concoquendi ac dolores eximēdi uim habet. Ex eodem uero genere cum ipso, in concoquendo ac moderatè discutiendo, putandus est crocus, & myrrha, quæ inter se differunt, eò quòd crocus moderatè adstringit, myrrha uero citra adstrictionē discutit, & humiditates non instrenuē resiccāt. Adhibentur igitur à medicis lenissima ad affectiones ægrius curabiles, in quibus ulcus est aut solum, aut cum tunicæ corniformis corrosione, & uiformis prolapsu, sanie mordacissima effluente. In his enim nullum aliud pharmacum conuenire uidetur. Quum adstringentia quidem effluentem sanie detineant, & propter hoc ex mordacitate dolorem augeant. Acris uero affectionem intendunt. Laxatoriorum autem ac discussiorum pharmacorū facultas, euacuare quidem potest quod generatur: neq; autem ulceratum renutrire, aut cicatricem inducere, neque quod prolapsum est reprimere ac concludere. Quemadmodū neq; concoctoriorum facultas, etiam si concoquere affectiones non parum possit. Quid uero dicere amplius opus est de pharmacis acidis aut amaras uires habentibus, quòd huiusmodi affectiones mordent ac exacerbant. Ad maiorem autem malignitatem procedunt, quæ nitrosam ac salsam uim habēt. Adhas igitur affectiones conuenire uidetur relatorum lenium pharmacorum genus, quod citra mordacitatem curare potest ulcera cū acri fluxione, per multum tempus uitiatos humores in affecta parte consumens ac resiccās, qui sanē uitiati humores bonum sanguinem locis influentem corrumpunt. Vocātur autem talia collyria à Medicis Libyana & Cygni, adhibētque ipsa oculis trita cum lacte mulieris boni succi, eò quòd uitare cupiunt obstructoriam uim ouorum. Quum enim serosa quædā extensoria pars in lacte contineatur, usus ipsius congruus fit ad propositam curationem. Ulcera enim quæ impletionē indigent, extensorijs citra mordacitatem opus habent. Si uero non affuerit tale lac, per foenigræci decoctum talia collyria terere præstat, quum etiam ipsum aliquam extensoriā uim habeat. Proinde quæ spodiaca ac tephrica collyria, à cinere & spodio appellantur, communem habent uim leniendi ac frige faciendi, & moderatè mordacitatis exortem.

De lenibus ac albis collyrijs. Cap. ciiii.

Aliud porrò est album collyrium, quod multos later, ob præparationis utilitatem, putatūque est à plerisque hoc nihil posse. Magnā uero ex hoc utilitatem percepi ad propositam affectionem. Egregiè itaq; facit ad omnem calidam lippitudinem. Efficax est etiā ad pruriginosas ac corrosas palpebras. Nos enim sepe multis perpetratis in tali intēperie, nullū successum habuimus, serò autē aliquando huius copiam adepti



adepti, magnam uim cōperimus in ipso, in ægrè curabili ac ferè incurabili affectione. In tantū enim mitigatus est eger, ut ex deo esse collyrium diceret. Sed & ad suppuratos oculos eximie facit. Resiccet enim humorē ipsorum citra mordacitatem in breui tempore, & oculum imperturbatum conseruat. Curat etiam compediō rubores sub paruis angulis in albo oculi fientes. Adest autem ipsis iuxta medium, uelut pustula quædam, à qua etiam totus rubor cōtingit. In prædictis igitur affectionibus, inter quas etiā ulcerationē posuimus, eximie facit, ut neq; fœnogræco opus habeamus. Nam & hoc in collyrii compositionem recipitur. Videtur autē ipso aliàs aliter, in doloris uexatione, cum oui cādido: sic enim ipsum statim mitigat. In quibus autē dolor non præualet, palpebræ uero crassefactæ sunt, etiam cum aqua infundimus. Aliquādo etiā illinimus. Et in summa ad omne lippitudinis principiū, reliquam collyriorū materiam superfluam ducimus. Excedit enim ui sua omnia eiusdē generis. Est enim lenius ac doloris magis mitigatiuū quā alia: alia enim opium recipientia & amyli, & quandoq; etiā myrrham, adstrictionem aliquā inducunt. Hoc autem collyriū ab his liberum est, nam crocū excedit in efficacia, & ad feruores ac ardores palpebrarū facit. Et ad solis æstus. Sed & tenues ac acres fluxiones obtūdīt cum aqua illitum, aliquando & cū rosarum decocto. Et glaucos oculos habentes, & eos qui prominentē habent crystallini humoris sitū, bene illustrat aquosum infusum. Et in quibus oculorum natura nō fert adstrictionē, his omnibus optimū est auxilium. Compositio autē collyrii hæc est. Cerusæ lib. i. cadmiæ semissem, tragacanthæ quadrantē. Præparatur hoc modo: Cadmiā racemosam prunis ignitis obruimus, & flā mā uentilando excitamus. Et ubi ignita fuerit cadmiā, ablātā lacte asinino extinguimus. Deinde rursus prunis ipsam obruimus, & ignitam rursus lacte extinguimus. Et tertio idē facimus. Deinde rūdimus & angusto cribro excernimus, & in profundū quoddā mortariū coniectā, aqua fontana pura affusa terimus. Et postea desidere sinētes, per aquæ fusoriū instrumentū, aquā unā cū superstāte concretione extrahimus, & rursus aliam puram aquam infundimus, & ubi satis cōtriuimus, & rursus desidere sinimus, rursus aquā per idē instrumentum extrahimus. Et hoc sæpe facimus, donec non amplius concretio aquæ superstat. Postea uero cadmiā exactē siccamus, & semissem siue sexuncem apponderamus, ipsamq; in mortariū collyriacum cōlectam, aqua pluuiali purissima affusa, exactissimē terimus, ut nulla asperitas linguæ occurrat. Atq; sic ad cerussam prædicto modo ablutam, cadmiā adijcimus, & ipsa ad dies x v. cū aqua pluuiali cōterimus. Et tunc tragacantham albā ac lucidissimam accipimus, eamq; lotam, & reiecto quod in ipsa est arenoso, in fœnigræci decocto maceramus, & per diem ac noctē solum macerari sinimus. Plurimum autem iniicere oportet de fœnigræci succo, præparato uelut dictum est in principio huius Sermonis capite decimo quinto. Nam à tragacanthā, uelut à spongia, absorbetur. Postera igitur die in mortario puro paulatim tragacantham leuigamus, & alia prius trita in mortariū adijcimus, & probè per mixta patinis uitreis excipimus, & tenui linteo contexta, in locum humiditatis exortē, ubi uentus spirat, reponimus. Dehiscit

enim collyrium, & efformationem moratur, si in humido depositum fuerit loco. Non enim tantum temporis postulat ad contritionem, quantū ad efformationem. Est itaq; hæc collyrii præparatio. Et poteris ex hac methodo, ad eiusdem generis materias trāsire. Talia autē sunt libyana, & tephra ac spodiaca appellata, itemq; cygnaria, & alba quæ ex rosis, & quæ ex coriandri succo præparantur. Quibus omnibus præferendum compertū est propositū collyrium. Optimum uero experientia iudicatū est & hoc, Cadmiæ ustæ ac lotæ uelut dictum est trientē, cerusæ similiter lotæ unc. xvi. amyli recentis unc. xvi. opij drac. iiii. tragacanthæ trientē: reliqua cum aqua terito. Tragacantham autem fœnigræci succo diligēter uelut dictū est præparatā, macerato. Amylum uero neq; acidū sit, neq; graueolēs. Aliud, Nialamnon appellatū, tenerum, dolorē eximens, stupefactiuū, ex genere cygnariorum. Facit & ad ulcerationes, post primū uigorē dolore præsentē crassum illitum. Cerussæ lotæ sexuncem, cadmiæ ustæ & lotæ trientē, pompholygis per lintheum lotæ sextantē, opij sextantē, tragacanthæ sextantē, gummi sextantē. Excipe aqua. Aliud collyriū Asclepiadæ dolorem eximens, facit ad fluxionē omnis generis, ulcera, doloris uexationes, pustulas, prolapsus, chemoses, affectiones omnis generis. Cerussæ lotæ dra. viii. terræ samiæ drachm. viii. cineris pompholygis lotæ drac. ii. tragacanthæ drac. ii. opij drach. ii. gummi drach. iiii. Excipe aqua. Vsus est cum ouo. Aliud Athanasia appellatū, Cadmiæ ustæ & lacte asinino extinctæ, ac lotæ lib. i. opij quadrantē, cerussæ lib. i. succi mandragoræ lib. i. amyli ordeacei libr. i. Tere cum aqua, & ad efformationē adijce ouorū recentiu albumina, quantū satis est. Collyriū, Cignus reginæ, ad maximos dolores ac affectiones: Cadmiæ lotæ drac. xvi. cerussæ lotæ drach. viii. acaciæ flauæ drach. ii. opij flauī drac. ii. tragacanthæ drac. ii. gummi albi drach. ii. amyli drac. ii. Terito cū aqua. Et amyllum postremū insperge. Nā si morā traxerit in mortario, acelsit, & collyriū acre facit. Ad excipiendum uero adijce ouorū recentiu quatuor candidū. Collyriū Bolæ. mitigat & cōcoquit omnē inflammationē. Cerusæ tostæ drac. xxxii. croci drac. iii. opij drachmas quatuor, amyli recentis drac. viii. gummi drach. xxxii. Excipe aqua. Aliud collyrium ex spuma argenti quod Augustū uocant. Spumæ argenti ustæ ac lotæ sextantē, pompholygis lotæ unc. i. cadmiæ ustæ ac lotæ sextantē, amyli sextantē, gummi sextantē, tragacanthæ unc. i. Excipe aqua. Hoc maxime & dolores eximit, & fluxiones intercipit, & oculum imperturbatum seruat.

*Collyrialibyana, & tephra, ac spodiaca. Cap. cv.*  
Collyriū libyanum Asclepiadæ. Ad pustulas, epicaumata, ruptiones, coelomata, oculos suppuratos, chemoses, staphylomata, doloris uexationes, & affectiones. Deterit etiā cicatrices. Cadmiæ ustæ ac lotæ drac. xvi. cerussæ ustæ ac lotæ drac. xvi. stibij usti ac loti drac. xii. amyli drac. xii. cineris pompholygis drach. viii. plumbi usti ac loti drac. viii. tragacanthæ drac. viii. opij drach. ii. gummi drac. vi. Et ad excipiendū ouorū cādida viii. Oribasij inexuperabile, collyriū inquit, Philumeni tenerū libyanū, ad suppuratos oculos, in uigore, ulcera, dolores, chemoses. Cadmiæ, cerussæ, pompholygis singulorum drach. xvi. stibij drach. duodecim, amyli drac. xii. plumbi usti, terræ



terræ Samiæ, tragacanthæ, singulorū drachm. viii. gummi drach. vi. myrrhæ drach. ii. opij drach. ii. Excipe aqua. Vfus est cū lacte muliebri, aut cum ouo. Aliud lybianū Oribasij. Ad principia, & ulcerationes. Cadmiæ ustæ & lotæ drach. xii. amyli dra. xii. plūbi usti & loti dra. viii. cerusæ lotæ dra. viii. tragacanthæ drach. xvi. gūmi drach. xiiii. stibij usti ac loti drach. xii. terræ Samiæ, pompholygis lotæ, singulorū drach. viii. myrrhæ drach. ii. opij drachm. ii. Excipe aqua. Aliud collyrium, Aster Magni, quod præparari solet. Cadmiæ lotæ drach. xxxii. plumbi usti ac loti drach. xxxvi. cerusæ lotæ drach. xxxii. stibij usti ac loti drach. xiiii. pompholygis lotæ drach. xxxii. thuris dra. viii. terræ quæ Aster appellatur drach. viii. myrrhæ, opij, singulorū drach. iiii. tragacanthæ, gummi, singulorū drach. xvi. amyli drach. xxxvi. Excipe aqua. Asclepiadæ, aster in exuperabilis, dolorem eximens. Facit ad doloris uexationes, pustulas, staphylomata, ulcera sordida & serpētia, facit ad inueteratas affectiones. Et cicatrices exterit. Cadmiæ ustæ ac lotæ drachm. xvi. stibij usti drach. xii. cineris pompholygis lotæ drach. viii. myrrhæ drach. ii. opij drach. ii. tragacanthæ drach. viii. gummi drach. vi. Excipe aqua. Aliud collyrium Vranium, uelut Oribasius habet, ad ulcera, pustulas, ruptiones, inustiones, prolapsus, staphylomata, oculos suppuratos, corrosiones, nomas, carbunculos, & ad omnes magnas affectiones. Maximè conuenit ad ruborē ac glaucedinē oculorū. In principijs aquosius infunditur. Quum autem tenuis fuerit & mordax & feruida fluxio, utere cū lacte. Vbi uero crassam fluxionē dissoluere uolueris, cū aqua. Cadmiæ ustæ ac lotæ sextantē, squamæ æris lotæ trientē, terræ Samiæ ustæ ac lotæ sextantē, cineris pompholygis lotæ unc. i. opij drach. vi. gummi trientē, stibij loti sextantē. Excipe aqua, & utere cōfidenter. Collyriū Spodiaceum Demosthenis. Facit ad inflammationes & fluxiones, cadmiæ drach. xiiii. stibij loti drach. vii. cerusæ lotæ drachm. xiiii. terræ Asteris drach. vi. thuris drach. iiii. opij drach. vi. gūmi drach. v. Terito cū succo foliorū oleæ. Succum autē sic facito. Tenera oleæ folia lauato, deinde in pila tundito moderata aqua affusa, ut sufficientem succū remittant, deinde exprimito, & per lintheū purū excolato, ac utitor. Aliud Spodiaceū admirandū, tenerum, faciens ad fluxiones & epiphoras humorū impetuosas, ulcera, inustiones, pustulas. Cadmiæ ustæ ac lotæ drach. viii. stibij usti ac loti drach. ii. terræ Asteris drach. iiii. opij dra. ii. gūmi dra. ii. Excipe aqua. Collyriū Tephron, inspissat ac adglutinat tenues fluxiones uelut præcedēs. Optimū uero est hoc ad calidas fluxiones. Cadmiæ ustæ ac lotæ dra. xxv. stibij loti drach. viii. terræ Samiæ dra. vi. cerusæ drach. vi. opij dra. v. gūmi dra. viii. ouorū recentū albumina sex. Excipe aqua. Collyriū Philagri penitus lene. Obfuscat enim fluxionū mordacitatē. Quapropter cōfidenter ipso utendū est in acris ac tenuibus fluxionibus. Obtundit enim has & reficcat. Hoc Syricum aut Sandycē appellāt. Pompholygis lotæ dra. xxv. cerusæ ustæ ac lotæ drach. xxv. terræ Asteris, plūbi usti ac loti, singul. dra. xxv. gūmi albi dra. xl. aquę pluuialis purissimæ nō olentis quod satis est. Singula seorsim usta lota, siccata, ponderata, adijcito ac terito. Et in fine gūmi addito, deinde amylū. Aliud

eiusdē, ad ulcerū repletionē, præsertim malignorū. Cadmiæ ustæ ac lotæ drachm. xxv. pompholygis lotæ drach. xxv. tragacanthæ drach. x. Excipe aqua. *Collyria ex thure.*

Cap. cvi.

Collyriū ex thure ad fluxiones, & chemoses, & caua ulcera. Cadmiæ drach. viii. thuris drach. viii. cerusæ drach. xl. opij dra. vi. terræ Asteris drach. vi. gūmi dra. vi. Excipe aqua. Vfus est cū ouo. Aliud Delicatū inscriptum. Ad inustiones, pustulas, chemoses, præsertim in his qui nullā omnino mordacitatē ferre possunt. Cadmiæ lotæ dra. viii. cerusæ lotæ dra. xlviii. thuris drach. viii. opij drach. vi. amyli drach. viii. gūmi drach. xvi. Excipe aqua. Vfus est cū ouo.

*Collyrium Cleonis.*

Cap. cvii.

Collyriū Cleonis, uelut Demosthenes habet, ad ulcera pura & iam cicatrice indigentia, ex cuius usu nos ualde laudati sumus. Nam profundissima ulcera & pura celerrimè replet, & compēdiō ad cicatricē perducit, tenuibus & obscuris cicatricibus relictis, & ulcera absq; inflammatione conseruat. Habet hoc modo. Spodij loti drach. iiii. plūbi usti ac loti dra. iiii. squamę ferri stomomatis lotæ drach. i. gūmi dra. ii. Excipe aqua. Et utere cum lacte aut ouo. Vtimur autem ipso, inquit Apollonius, in profundiore ulceratione, cū cremore tragacanthæ aquoso. Quidā croci sesquidrachmā inijciunt, & pro spodio pompholygis, cadmiā ter ustā accipiūt. Est autem lene quidem & mordacitatis exors, uerū graue. Quare nunquam crasso ipso utendum est, sed aquoso.

*Collyria ex rosis uiridia, ac alba* Cap. cviii.

Collyrium Nili ex rosis, ad dolores, fluxionē tenuem ac multram, pustulas, prolapsus, & ulcera sordida, & palpebras asperas. Rosarū uiridiū resectis unguibus drach. xiiii. croci corycij dra. xii. opij drach. i. spicę nardi dra. i. gūmi drach. vi. Excipe aqua. Vfus est cum ouo. Temperatura sit liquosissima. Quidam etiam ad confusiones & pupillæ dilatationem ipso utuntur. Collyrium ex rosis Diagoræ, quod Magnū appellatur, aut uiride ex septuaginta duab. rosarum drachmis. Ad chemoses, & doloris uexationes, pustulas, epicaumata, siue inustiones, staphylomata, prolapsus, oculos suppuratos, fluxiones antiquas, lippitudines inueteratas, & affectiones ægrè curabiles. Rosarum uiridiū exunguiū drach. lxxii. cadmiæ lotæ dra. xiiii. croci dra. vi. stibij dra. vi. æruginis drach. ii. spicę nardi drach. ii. opij drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. gūmi drach. xiiii. squamæ æris drach. ii. Excipe aqua. Collyrium quo usus est Florus in Drusi matre, quæ parū abfuit ut ab alijs Medicis excæcata fuisset. Acaciæ drach. xlviii. rosarum siccarum drach. xlviii. meliloti drach. xlviii. spodij pōpholygis drach. xiiii. croci drach. xiiii. malorum mandragorę drach. xii. seminis hyoscyami drach. vi. opij drachm. vi. myrrhæ drachm. iiii. æris usti drachm. iiii. gummi drachm. xl. Vini falerni heminas iii. aquę pluuiæ heminas iii. Aquam & uinum misceto. Et in hæc rosas, melilotum, hyoscyami semen, & mandragoræ mala, aut si hæc non adsint, corticem inijcito, & ad triduum macerari sinito. Deinde expresso liquore ad pharmacī compositionem utitor. Vtere hoc uelut probatissimo. Aliud Philagri ex rosis, ad inflammationes congruum, si suprā relato leni Philagri collyrio fuerit ammixtū. Rosarum uiridium.

exunguium



exungulum drachm. LXXX. æris usti drach. XXXII. Tere cum uino odorato ueteri astringente, & utere. Collyrium album ex rosis nostrum inquit Oribasius, ad uigores & ulcera, & oculos suppuratos, inustiones crustas, & ulcerū sordes. Cadmiæ ustæ ac lotæ, stibij usti ac loti, rosarum recentium exunguiū, singulorum drach. XVI. cerusæ lotæ drach. VIII. croci drach. VIII. opij drach. IIII. gummi drach. XVI. Excipe aqua. Vfus est cum ouo aut lacte. In declinatione cum aqua. Aliud eiusdem. Facit ad uigores. Cadmiæ ustæ ac lotæ, drachm. XVI. rosarum recentium exunguiū drachm. VIII. opij drachm. IIII. lactis drach. IIII. gummi drach. IIII. tragacanthæ drach. III. amyli drachm. IIII. Aliqui etiam samij Asteris drachm. II. Collyrium ex rosis album, quod cum hyoscyami succo præparatur. Cerusæ uncias XXV. croci quincuncem, opij librā I. myrrhæ quincuncem, rosarum uiridium exunguiū lib. I. cadmiæ ustæ ac lotæ bessē, gummi librā I. Cadmiā, crocum, rosas cum aqua terito. Deinde cerusam adijcitur. Succos autem & gummi, in hyoscyami succo macerato, & efformato. Vtere ad tenuissimas ac acres fluxiones, & in his quæ sunt cum ulceratione: generose repellit. Collyrium uiride ex Albano. Ad doloris uexationes & affectiones ueteres. Cadmiæ lotæ drach. VIII. spodij loti drach. VIII. æris usti ac loti drach. VIII. opij drach. VIII. galbani drach. VIII. myrrhæ drach. VIII. gummi drach. VIII. Excipe aqua. Quidam spodium non adijciunt.

*Collyria diasmyrna, & chiaca appellata ex uino.*

Cap CIX.

Collyrium diasmyrnum odoratum Synerotis, pharmacum accommodatū ad inueteratas affectiones. Facit & ad rheumatas, hoc est, angulos antrofos, siue carnis in angulo magno decemētum, & ad ægilopas. Cadmiæ lotæ drach. XXVIII. lapidis hæmatitæ loti drach. XXVIII. spodij pompholygis drach. XXIII. myrrhæ drachm. XLVIII. croci drachm. XIII. opij drachm. VIII. piperis grana XXX. gummi drachm. VI. Terito cum uino ueteri astringente. Vfus est cū ouo in recentibus affectionibus. Temperatura sit aquosa. Aliud Asclepiadeū Paccij. Ad doloris uexationes, fluxū tenuem & multū, inustiones, pustulas, pellicularum eminētias, aspritudines, diuturnas affectiones, & eos qui à multis illitionibus læsi sunt, cōfestim opitatur. Cadmiæ lotæ dra. XII. Aeris usti drach. XII. croci drach. XII. squamæ æris lotæ drach. XII. myrrhæ drach. IIII. lapidis hæmatitæ drach. IIII. spicæ nardi drach. IIII. piperis grana XXXIII. rosarū siccarum drachm. IIII. opij drach. IIII. gummi dra. XII. Terito cum uino ueteri odorato astringente. Vfus est cum ouo. Temperatura uero aquosa. Collyrium Isophoton, hoc est, uiro par, ab aliquibus autem Isotheon, hoc est, deo par appellatum. Facit ad oculos suppuratos, & ulcera impura, accaua, & fluxionum principia, præsertim in corporibus repletis, in quibus grammarum copia crassissimarum in oculis reperitur. Est & pueris commodum, & ad aspritudines bonum. Cadmiæ drach. VIII. æris usti drach. IIII. rosarum siccarum drach. IIII. croci drach. I. folij drach. I. lapidis scissi drach. I. myrrhæ drach. I. gummi drach. VI. Tere cum uino uetere odorato astringente, & utere in omnibus prædictis cū ouo aquosius per se infundens. Post perfectam uero resti-

tutionem cum ouo dilutum illine per subiectionē, & lauato. Si uero adstringantur post illitionem, cādidum oui infunde. Verum ad attenuandas cicatrices, cū ouo aquosius illine. Quidā etiam piperis grana nouem scripturæ adijciunt. Nos autem in his piper reijcimus. Collyriū Dionysius. Facit ad mycephala, aspritudines, fluxiones, hebetudines. Maximē autē facit ad fluxiones inueteratas. Cadmiæ dra. XIII. æris drach. V. lapidis scissi drachm. III. lapidis hæmatitæ drach. IIII. casia drach. I. aloës drach. II. croci drach. II. spicæ nardi drach. III. folij drachm. II. lycij drach. I. piperis grana XXI. opij drach. I. myrrhæ drach. IIII. acaciæ drach. II. gummi drach. VI. Tere cum uino Chio, aut alio austero ueteri, & utere uelut efficacissimo, etiam ad oculos purulentos, & aspritudines, in principijs cū ouo, deinde cum aqua. Efficacia eius superat omnem pollicitationē. Collyriū Chiacum. Ex Demosthene, inquit Apollonius, & ad pura ulcera & proserpentia, & eminentias, & ueteres affectiones, asperas palpebras, sycofes, euerfiones, clauos, staphylomata, omnes doloris uexationes, lippitudines scabras. Facit etiam cicatrices obscuras, & recentes ac crassas cicatrices attenuat. Oportet autem modò crassum, modò medium, modò aquosissimū sublinere. Et quandoq; ex interuallis, quādoq; assidue. Facit ad carbunculos & suppurationes: pus enim percolat. Et in summa ad omnia oculorū ultia optimū est. Spodij drach. III. æris usti drach. II. croci drach. I. myrrhæ obol. IIII. opij tantundē, piperis grana XII. gūmi dra. I. Terito cū uino Chio, aut alio austero uetere. Aliud Chiacū Oribasij. Ad staphylomata & oculos purulentos, ulcera pura & sordida, & ad antiquas affectiones. Cadmiæ, rubricæ sinopicæ, gallæ omphacitidis, croci, rosarū recentium exunguiū, gummi, singulorū quadrantē, opij unc. I. Tere cū uino chio, aut alio austero uetere maris exorte. In principijs ad cygnariū aut pelariū quoddā miscetur. Cicatricē quoq; optimē inducit cū aliquo horū, & per se. Fuscū nostrum inquit Oribasius. Ad oculos purulētos, & magnas affectiones, & omnē ulcerationē, præsertim diuturnā: Rosarū exunguiū sextā, cadmiæ teneræ dra. XXIII. cerusæ drach. XVI. opij drach. XXIII. æruginis dra. XII. æris dra. I. seminis ericæ drach. XII. stibij drach. VIII. myrrhæ drach. VI. spicæ nardi drach. IIII. croci drach. IIII. acaciæ dra. IIII. nitri drach. IIII. lycij dra. IIII. aluminis scissi drach. III. chalcitidis ustæ dra. III. castorij drach. III. omphacij dra. II. gūmi drach. XXXIII. Terito cū uino austero ueteri odorato, & utere aquoso, per sœnigraci succū, aut ouū diluto. In progressu uero crassius adhibe. Collyriū Aromaticū, ex Demosthene. Ad inflammationes ex humorū crassorū multitudine obortas. Attenuat breui ac diffundit, & discutit humores. Facit & ad impura ulcera. Pompholygis drach. I. æris usti drach. II. myrrhæ drach. III. lapidis hæmatitæ dra. IIII. opij drachm. IIII. piperis grana XVIII. croci drach. II. gummi drach. III. Tere cum uino chio, aut alio austero. Collyrium Scylacium inscriptū, ex semine hyoscyami. Facit ad chemoses, & affectiones fluidas diuturnas omnigenas. Facit etiā ad staphylomata, & repellit fluxiones. Primū cum ouo aquosum, deinde etiā solidum illitū cum ouo. Cadmiæ, æris usti, lapidis hæmatitæ, chalcitidis ustæ, singulorū quadrantē, misyos sesquiunciā, ammoniaci thymiamatis



matis sesquiunciam, myrrhæ sesquiunciam, opij  
 sesquiunciam, hyoscyami seminis unciam unam, aloës  
 sexuncem, gummi sexuncem. Tere cum uino austero.  
 Aliud collyrium mirifice facies ad myocephala. Con  
 sumit etiam prerygia, & carnis in angulo magno in  
 crementum deterit, iteque cicatrices. Est & ad aspritudi  
 nes commodum. Cadmiæ unc. i. æris usti unc. i. chal  
 citidis crudæ unc. i. æruginis rasæ drach. iiii. myrrhæ  
 sesquidrachmā, croci drach. ii. salis ammoniaci drach.  
 i. gummi drach. iiii. Terito cum uino austero. Colly  
 rium Philagrii, de quo ita scribit: Tertium ab his est  
 meum collyrium, quod appellamus Præseruatiuum,  
 repellens in principio fluxiones, & roborare potes  
 debiles & læsioni obnoxios oculos. Quare non so  
 lum in principijs lippitudinis, sed etiam sanis, præser  
 uationis gratia ipsum adhibere oportet. Cytinorū,  
 hoc est, florū malī punicæ, qui floribus anemones  
 similes sunt, drach. xxv. acaciæ flauæ dra. xxxv. glau  
 cij drach. xvi. aloës drach. v. myrrhæ troglitidis dra.  
 iiii. atramenti Indici drach. vii. folij malabathri drach.  
 i. omphacij sicci drach. iiii. gummi drach. v. opobalsami  
 ad excipiendum drach. v. Terito cum uino uetere auste  
 ro. Collyrium ex Bdellio & Styrace concoctorium.  
 Philagrii. Cuius multā experiētiā habeo, non solū  
 probè concoquētis, sed etiam læsiones ex frigore ob  
 ortas citra inflammationem sanantis. Bdellij drach. vi.  
 thuris masculi drachmas x. myrrhæ drach. x. sarco  
 collæ drach. v. castorij drach. ii. galbani drachmas v.  
 styracis drach. v. croci drach. v. lycij drach. ii. ammoniaci  
 thymiamatis drach. ii. gummi drach. ii. Excipe aqua.  
*Collyria ad aspritudines, & extensoria. Cap. cx.*  
 Collyrium ad aspritudines Phoenix appellatus. Facit  
 & ad milphos, & diuturnas affectiones, & ad eos  
 qui palpebras & angulos exacerbatos habent. Lapi  
 dis hematitæ usti ac loti drach. xxxii. æris usti ac loti  
 drach. xvi. lapidis scissi usti ac loti drach. xvi. ærugi  
 nis drachmas sedecim. Cadmiæ racemosæ drachm.  
 iiii. opij drachmas sex, chalcitidis tostæ drachmas  
 quatuor, gummi drachmas xvi. Excipe aqua. Col  
 lyrium ad aspritudines Mono inscriptum. Lapidis hæ  
 matitæ sexuncē, lapidis scissi sexuncē, æris usti qua  
 drantem. Cadmiæ lib. i. æruginis rasæ quadrantem,  
 chalcitidis tostæ unciam unam, opij sextantem, gum  
 mi sextantem. Excipe aqua. Est & pueris commo  
 dissimum. Collyrium Theophiliū, ad pueros miri  
 ficum, & aspritudinibus commodum. Cadmiæ lib. i.  
 æris unc. xiiii. æruginis quadrantē, opij lib. i. gum  
 mi lib. i. Excipe aqua. Vfus est cum ouo in principio  
 aquosi. In declinatione uero cum ouo crassius illi  
 nito. Aliud collyrium, Xyster à deradendo appella  
 tum. Facit ad albugines. Cicatrices attenuat, & ocu  
 lum imperturbatū conseruat. Ammoniaci thymia  
 matis, minij sinopici, singulorū quadrantē, cerussæ,  
 gummi, singulorū sextantem, pumicis tostī unciam  
 unā, excipe aqua. Collyrium aliud ad aspritudines.  
 Facit ad milphoses, ulcera, fossulas, ualde uetusta  
 uulnera, staphylomata, myocephala. Lapidis hæma  
 titæ trientē, lapidis scissi trientē, æris usti trientē, cad  
 miæ sextantē, æruginis sextantē, chalcitidis ustæ unc.  
 i. opij trientem. Rosas uirides si affuerint, sin minus,  
 siccas, per diē ac noctē aqua macerato, & cum expres  
 so ac excolato cremore terito. Aliud collyrium  
 Xyster appellatum, celebre ad aspritudines. Pumicis  
 usti, ostreorū ustorum, misyos usti, gummi & aqua

les portiones aqua excipe. Collyrium ad aspritu  
 dines Eutonum, ab efficacie pertinacia uocatum. Ex  
 Oribasio, Aeris usti drachm. x xiiii. cadmiæ drach.  
 x xiiii. æruginis drach. ii. croci drach. iiii. opij drach.  
 iiii. myrrhæ drach. iiii. gummi drachmas nouem. Ex  
 cipe aqua. Egregiè facit ad asperas palpebras ac cal  
 losas, lippitudines scabras, euerisiones, fluxus diutur  
 nos, citra ulcerationē, ammixto cygnario, aut colly  
 rio ex croco, facit ad uigores. Sit autem quod am  
 miscetur decima ipsius pars. In summa palpebras  
 euertere nō est opus, sed simpliciter illinere. Hoc alij  
 Harmation, id est, currum. Alij opisthobares, à gra  
 uitate. Nos autem Eutonū uocamus. Aliud eius  
 dem, collyrium extensorium, inquit, Gryali, ad aspri  
 tudines ex duobus lapidibus. Hematitæ lapidis dra.  
 x viii. scissi lapidis drach. x viii. æris usti drach. ix.  
 cadmiæ drach. ix. æruginis drach. ix. chalcitidis ustæ  
 drach. iiii. opij drach. vi. gummi drach. ix. Tere cum aqua  
 & illine donec tolerarit æger, nō confricans palpe  
 bras, neque subiiciēs specillū, sed per specilli nucleum  
 explens oculum. Aliud eiusdē, ad multas affectio  
 nes. Chalcitidis drach. x x vii. cadmiæ drach. x x ii. æ  
 ris usti drach. xvi. lapidis hematitæ drach. x iiii. cro  
 ci drach. xvi. misyos drach. xvi. myrrhæ drachmas se  
 decim, opij dra. x iiii. gummi dra. x iiii. Tere cum uino  
 uetere. Collyrium ex oleo folijs. Facit ad diuturnas  
 fluxiones. Deprimit etiam aspritudines, & oculū cor  
 roborat. Syrici sexuncē, æris quadrantē, opij trien  
 tem, gummi drach. viii. Foliorū oleæ tenerorū à fi  
 bris depuratorū drach. viii. Cum uino spathite re  
 runtur folia exacte fibris exemptis, ita ut per se in  
 mortario biduū probè teras, uinum paulatim irro  
 rans. Quum autē leuissima facta fuerint, es adijcito,  
 & simul diu terito, & sic uinū affundito. Si enim ab  
 initio infusum fuerit uinū, folia innatantia incontrita  
 permanent. Contrito autē ære, syricū adijce, deinde  
 opium, postea gummi, & efforma, ac utere ab initio  
 infundēs. In declinatione uero etiam illinens. Ego ue  
 ro, uelut Demosthenes iubet, folia in mortario mit  
 to, ac cōtundo, uino sufficiente paulatim instillato,  
 exprimoque ac excolo, & cum uino excolato reliqua  
 tero, retrimento foliorū reiecto. Collyrium Harna  
 tion, id est, Currus inscriptum: quo usus est Ptole  
 meus rex. Exterit cicatrices. Acuit uisum, & ad aspri  
 tudines commodum est. Aeris usti ac loti drachm.  
 viii. ammoniaci thymiamatis drachm. viii. cor  
 ticis thuris drachm. viii. gummi drachm. viii. Ex  
 cipe aqua. Vfus est cum aqua. Quædam descri  
 ptiones habent etiam æruginis drachm. ii. Aliud,  
 ex lapide Hematite, ad uisū acuendū, cicatrices & cal  
 los exterit. Ammoniaci thymiamatis drach. x x iiii.  
 æris usti ac loti drach. x x iiii. lapidis hematitæ drach.  
 x x iiii. æruginis drach. viii. gummi drach. x x iiii.  
 Excipe aqua. Extensorium Oribasij. Facit in princi  
 pijs, & ad chemoses, aquosum cum ouo infusum. Cad  
 miæ drach. viii. æris drachmas duodecim, croci dra.  
 iiii. myrrhæ drach. iiii. opij drach. vi. lapidis hematitæ  
 drach. x viii. lapidis scissi drach. x viii. chalcitidis to  
 stæ drach. vi. æruginis drach. x ii. gummi drach. ix. Te  
 rito cum uino, & utere cum ouo. Collyrium exten  
 sorium Philagrii per se adhibitum, & cum colly  
 rio suprascripto Philagrii ex rosis. Aeruginis dra.  
 vi. pumicis drachm. xvi. testarum sepia drachm.  
 xvi. gummi drachm. x x ii. His ego inquit adijcio,  
 squam



squamæ æris drach. xvi. ubi fortius ipsum efficere uolueris. Collyrium Rinema, hoc est lima inscriptum. Facit ad callosas affectiones, & cicatrices exterit. Facit etiam ad suffusiones. Cadmiæ drachm. xlviii. ammoniaci thymiamatis drachm. xlviii. opij drach. xvi. lapidis hæmatitæ drach. xxiii. galbani drach. xvi. aloës drach. xvi. opoponacis drach. viii. fellis taurini drach. viii. salis ammoniaci drach. iiii. æruginis drach. xvi. myrrhæ drachmas xvi. gummi drachm. xl. Excipe aqua. Temperatura sit aquosa. Collyrium exterforiū albuginum, per unam illitionem multā efficaciam ostendens. Facit ad pterygia, & carnis in angulo magno incrementum. Est autem collyriū lene & mordacitatis exors. Conchylj purpuræ carnis ustæ drachmas decem, æris usti drachmam unam, squamæ æris drachm. ii. æruginis drachm. vi. atramenti sutorij drachm. iiii. aluminis scissi obolum unum, lapidis scissi drachm. i. lapidis hæmatitæ drachmam unam, stercoris crocodili drachmam unam, lycij drachm. i. succi omphacij sicci drachm. v. chalcitidis obolos duos, myrrhæ drach. iiii. thuris masculi obolos duos, corticis thuris drachmam unam, florum mali punice drach. i. Excipe aqua. Collyrium Hæladæ, albugines tollens ualde citò, ut mireris. Lapidis armenij quo pictores utuntur, gypsi, atramenti sutorij, floris æris, æruginis, testarum sepiæ ustarum, ammoniaci thymiamatis, lapidis magnetis trahentis, lithospermij, gummi æqualibus portionibus utere, & excipe aqua. Aliud quod præparat Petrus Archiathros, & ipsi bonum testimonium præbet. Salis ammoniaci scrupulos sex, lapidis armeniaci scrupulos duodecim, seminis raphani scrupulum unum, seminis uiolæ albæ scrup. vi. ammoniaci thymiamatis scrupulos nouem, gummi scrup. xii. Excipe succo rutæ. Facit & ad suffusiones incipientes. Collyrium Pressum. De quo Apollonius dicit, optimum esse pharmacum ad cicatrices, & superexcrecentem carnem. Et ad asperas palpebras, & sycofes, & euerfiones palpebrarum: calculos item ac grandines, & induratas affectiones, & pterygia, & carnis in angulo magno incrementa, & lippitudines scabras, & pellicularum crassitudines, & multæ ac crassæ fluxionis depurgationem. Sed & aquosum ac multum fluxum cohibet. Consumit autem & depurgat securè, attenuatq; ac exterit sufficienter mordens. Verum oculum imperturbatum seruat, iucundissimumq; ac leuissimum est, & quod debet facit. Est autem hoc, Aeris usti ac loti obol. v. croci drachm. ii. myrrhæ trogloditidis obol. iiii. spicæ nardi obol. ii. casie obolos tres, cinnamomi obol. ii. opij obol. ii. piperis grana x. gūmi drach. i. uini Chij aut alterius austeri odorati quod satis est. Quod si ad hanc descriptionem spodij drach. iiii. addere uolueris, ad omnem fluxionem ac lippitudinem optimum euadet. Collyrium Isidori Memphitæ ad acuendum uisum. Inungebam, inquit, non uidentes, & incipiebant uidere. Appellatur Rhinariū, id est, limula. Ego hoc præparau. Ammoniaci thymiamatis drachm. xvi. æruginis uermiculatæ drach. xii. testarum sepiæ quod molle est, drach. viii. sagapeni drach. viii. opoponacis drachmas duas, succi cyrenaici drachm. i. gummi drach. i. Omnibus aqua prætritris, succi foeniculi drach. xii. adijce, & mellis Attici drach. xii. Et efforma col-

lyrium ac utere. At uero quidam amicus ipsum nūc sic præparat. Ammoniaci thymiamatis unc. xv. æruginis rasæ deuncem, & drach. ii. testarū sepiæ trientem, & uncia dimidium, sagapeni quadrantem & drachmas sex, opoponacis sextantē, succi cyrenaici sextantem. Excipe aqua. Gummi autem non recipit. Aliud, ad uisus hebetudinē, albugines, suffusiones, Harmatium, id est, Currus appellatū. Fellis hyænæ drach. iiii. spumæ nitri drach. iiii. gūmi drach. ii. æruginis drach. iiii. sagapeni drach. iiii. galbani drach. ii. ammoniaci thymiamatis drach. ii. baccarū lauri decoratatarum drach. lxx. aristolochiæ rotundæ drach. i. Excipe aqua. Collyrium ad incipientes suffusiones, ut aqua etiā ex auribus fluat, uocatur Aureū. Sagapeni persici puri drach. viii. æruginis drachmas sex, ammoniaci thymiamatis drach. ii. gūmi drach. ii. Excipe aqua. Tere & utere aquosum illinēs, & intra quinque dies efficaciam suā tibi comprobabit: splendidā enim reddet pupillā ac claram. Collyrium Martiani, quo inquit, in meipso usus sum ad imminētē mihi suffusionem. Chelidonij capnitiidis circa sepes nascentis, rutæ, foeniculi, coriādrī, herbas singulas per se exucato & excolato, & de succo uniuscuiusq; quadrantem cōijcito, & opobalsami drach. iiii. mellis Attici drach. iiii. adijcito, ac terito, donec strigmentitiā habuerint spissitudinē, & tunc succi conyzæ tenuia folia habētis uncia unam addito, ac terito. Et ubi probè habuerint ad excipiendū, gummi puri tusi ac cribrati quantū satis est pro tua uelut Medici cōiectura adde quo collyriū fiat, efforma ac utere, ad incipientes suffusiones cum uino. Ad hebetudines uisus cum aqua, illitū autem ad solē locato. Collyriū Proteus. Cui nullū simile est ad initia suffusionis, & ad omnē uisus hebetudinē. Cicatrices etiā ac callos exterit. Cadmiæ drach. xl. cerusæ drach. xl. piperis albi drach. i. succi cyrenaici drachmas octo, croci drachmas sex, opij drachmas decē, sagapeni drach. xii. lacrymæ oleæ Aethiopice drachmas duodecim, auripigmēti drach. viii. myrrhæ drach. xii. ammoniaci thymiamatis drach. viii. gūmi drach. viii. opoponacis drach. xvi. opobalsami drach. xii. Excipe aqua pluuiali. Vfus est cū aqua. Collyrium Hermophili Thalassærum, hoc est, marinum, ad omnē hebetudinē accommodatum, & ad omnem incipientē suffusionem. Estq; odoratissimum. Cadmiæ drach. xvi. æruginis drach. iiii. atramenti Indici drachmas sedecim, piperis albi drach. viii. succi Medici drach. iiii. opobalsami drach. iiii. gūmi drach. xii. Excipe aqua, & utere cū aqua. Temperatura diuersa est iuxta affectiones. Collyriū Indicū Regiū inscriptū. Facit ad principia suffusionum, & omnē uisus hebetudinē. Et cicatrices exterit. Cadmiæ ustæ & lotæ lib. i. & trientē, atramenti Indici sexuncē, cerussæ trientē, piperis albi sexuncem, fel hyenæ integrum quantū est, fel scarorū piscium decem, fel perdicū iiii. opij uncia unā, opobalsami sextantē, opoponacis sextantē, sagapeni sextantem, gūmi lib. i. Excipe succo foeniculi. Collyriū fuluū Panchreston, ab omnimoda utilitate inscriptum, accommodatū ad scabros ac corrosos angulos, & intentos pruritus, & palpebras ficosas, cadmiæ drach. lxxx. chalcitidis ustæ drach. xl. piperis albi drach. xl. gummi drachm. xl. Excipe aqua. Quidam adijciunt his etiam croci drachmas duodecim, myrrhæ drach. xii. Collyrium psoricum Ptolemæi, accommodatum



datum ad scabros ac corrofos angulos, & intentos pruritus, milphoses, hebetudines: Pforici drach. x l. sandarachæ drac. xxx. chalcitidis ustiæ dra. xxviii. croci drac. xxiii. myrrhæ drac. xii. opij drach. ix. cassiæ drach. xii. piperis albi drach. x l. piperis nigri drach. xvii. omphacij drac. xvi. misyos usti drach. iiii. folij drach. i. gūmi drach. xxvi. Excipe aqua. Collyriū Hygieni aureū, ad corrofos angulos, & scabras affectiones, sandarachæ drac. xxiii. piperis albi grana xii. myrrhæ drach. vi. croci drach. vi. gūmi drach. xii. Excipe aqua, & utere cū aqua. Collyrium Diacēton ex Demosthene, Aeruginis obol. iiii. misyos tantundē, succi papaueris tantundē, gummi drach. iiii. Excipe aqua. Facit ad prædictas affectiones, & ad uisus hebetudinem, & incipientes suffusiones. Attenuat etiam cicatrices. Sit autem calidum. Collyriū Stratiotæ compositio hæc est. Cadmiæ drach. viii. cerusæ drach. xvi. piperis albi drac. ii. æruginis, opij, omphacij, singulorū drach. ii. gūmi drachm. iiii. Facit etiam ad asperas palpebras. Collyrium extensoriū. Aeris usti, croci, ammoniaci thymiamatis, singulorum sextantem, gummi unc. i. Excipe aqua. Facit ad oculos purulentos, argema, nubeculas, caligines. Ad aspritudines uero cum melle. Collyrium celebre, priuatim ad cicatrices in oculis faciens. Facit etiam ad uisus hebetudines, aspritudines & pterygia. Testarum sepia, pumicis, squame æris, ammoniaci thymiamatis, æruginis, cornu ceruini usti, singulorū lib. i. myrrhæ sextantem, thuris sextantem, opij quadrantem, gummi bessem, ofsium palmularū ustorum dextantē, mellis sextantem. Excipe aqua. Hoc præparabat Afer, & ualde ipsi confidebat. Nominabat autem ipsum Phœnicem nigrū, eò quod ofsium ustorum palmularum, (quæ phœnices appellantur) dextantem recipit.

*Collyria enstacta, hoc est, instillatitia appellata.*

Cap. cxi.

Collyrium instillatitiū Paccianum appellatū, cadmiæ drac. lxiii. misyos dra. xxxii. stibij dra. xxxii. atramenti sutorij dra. xxxii. piperis albi drac. xxxii. æruginis dra. xvi. opij drac. xvi. opobalsami drac. xvi. gūmi drac. lxiii. Excipe aqua pluuiali. Facit ad acuendū uisum, & callos exterit. Collyriū Aromaticū inscriptum. Aeris usti drach. xvi. æruginis dra. iiii. myrrhæ dra. iiii. spicæ nardi drac. ii. piperis albi drac. iiii. opij drac. iiii. croci drac. iiii. opobalsami drac. ii. gummi drachm. iiii. Excipe aqua. Aliud instillatitium nō perturbans, Oribasij. Cadmiæ drach. xvi. cerusæ drach. viii. opij drachm. iiii. opobalsami drach. iiii. æruginis drac. ii. omphacij drac. ii. piperis albi drach. ii. gūmi dra. v. Aliud instillatitiū, uisum acuens, cadmiæ uste, & urina pueri extinctæ drach. x. stibij dra. vi. atramenti sutorij sesquidrach. æruginis sesquidrachmā, piperis drac. ii. misyos drach. ii. opij drach. i. opobalsami drach. i. gummi drac. vi. Excipe aqua. Aliud nigrū, uisum acuens. Facit & ad corrofos angulos. Stibij usti ac loti drac. xl. acaciæ drac. xl. gummi drac. xl. cadmiæ drach. xvi. nardi celticæ drach. viii. myrrhæ drachm. viii. croci drachm. viii. omphacij drachm. vi. opij drachm. vi. Excipe aqua.

*Collyria ex cornu ceruino.*

Cap. cxii.

Collyriū Asclepiadæ ex cornu ceruino. Ad ulcera, & pustulas, & cicatrices exterit. Cornu ceruini usti ac

loti drach. iiii. plūbi usti ac loti drach. iiii. squamæ æris lotæ drac. ii. thuris dra. iiii. opij drachmā unā, gummi drach. iiii. Excipe aqua. Aliud, ad calidiores affectiones, & acerrimas fluxiones cum ulceratione. Cornu ceruini usti ac loti drachm. xvi. spodij pompholygis lotæ drac. viii. squamæ æris drac. ii. croci drac. ii. acaciæ drach. viii. thuris drac. viii. opij drac. ii. myrrhæ drach. i. gūmi drac. viii. tragacanthæ dra. i. amyli drac. iiii. terito cum hyoscyami cremore. Collyriū ex cornu ceruino, uelut Oribasius habet, maximè quidē ad ulcerationes in uigore, clauosq; ac staphylomata, & huiusmodi omnia, ut non simul sint palpebræ densatæ. Et ad ulcera ægrè recipientia cicatricē, & resolutas cicatrices. Cadmiæ drachmas sex, acaciæ drach. xl. stibij drachm. xxxii. plumbi usti ac loti drac. viii. cornu ceruini usti ac loti drach. viii. gummi drach. viii. æris dra. xvi. opij drachm. xvi. myrrhæ drachm. iiii. thuris drach. iiii. Excipe aqua. Vtere uerò ad caua ulcera cum lacte ad sordida, cum succo scœnigræci. Aliud collyrium ē cornu cerui, efficacissimè exterit cicatrices in oculis, cū aqua illitum. Vtere etiā ad exulceratos oculos, cum ouo instillans. Aeris usti ac loti deūcem, & scrupul. vi. cornu ceruini usti ac loti tantundem, stibij loti sextantem, & uncia dimidiū, testarum sepia trientem, & uncia dimidiū, æruginis sextantem, ammoniaci thymiamatis sextantem, & uncia dimidiū, myrrhæ sextantē & uncia dimidiū, thuris sextantem & uncia dimidiū. Opij sextantem & uncia dimidiū, acaciæ quincuncem, & scrupul. xv. gummi deuncem. Excipe aqua.

*Collyria Nardina ex Theodotia.* Cap. cxiii.

Collyrium nardinū Zoili, ad ueteres lippitudines, & myocephala, & ulcera uetera ac staphylomata. Cadmiæ dra. viii. æris usti dra. viii. stibij dra. viii. cerusæ dra. iiii. castorij dra. iiii. spicæ nardi sesquidrachmā, aloës sesquidrachmā, folij, croci, chalcitidis tostæ, atramenti sutorij, lycij Indici, opij, singulorum drac. i. myrrhæ drac. ii. acaciæ drac. xx. gūmi drac. xx. Excipe aqua. Collyrium nardinum Candidi leuissimum ac ualidissimè resiccans. Facit ad myocephala & staphylomata mirificè, & maximè glaucis oculis conuenit. Vtere etiam in his qui nullam omnino collyrij mordacitatē sustinere possunt. Cadmiæ ustæ & lotæ lib. i. cerusæ septuncem, stibij loti sextantem, croci trientē, myrrhæ troglodyticæ trientem, aloës unc. i. acaciæ unc. i. opij sextantem, spicæ nardi unc. i. gummi bessem. Excipe aqua. Theodotium nardinū. Cuius multā experiētiam habemus in myocephalis, & diuturnis ulceribus oculorum, & confusionibus. Maximum extensorium est & uementer corroborat debiles oculos. Cadmiæ lotæ, stibij loti, acaciæ, gummi, singulorum drach. xxv. rosarum siccarum depurgatarū drach. xii. æris usti loti drach. viii. myrrhæ troglodyticæ drach. viii. castorij, lycij indici, croci, folij, spicæ nardi, chalcitidis tostæ, cerusæ, glaucij, seminis ericæ, opij, gallarum omphacinarum, singulorū drach. ii. Excipe aqua. Vtere in principijs cum ouo instillans. In deditionibus cum aqua. Collyrium Nicariū Zoili, ex lacte nardinum. Ad affectiones & fluxiones diuturnas, ulcera, fossulas, myocephala, staphylomata, ueteres lippitudines. Tingit etiam cicatrices, & ipsas incōspicuas facit. Cadmiæ ter ustæ & muliebris lacte



de extinctæ ac lotæ drach. c viii. stibij usti ac muliebri lacte extincti ac loti drach. x. æris usti et extincti ac loti drach. x x x vi. cerusæ lotæ drach. x x iiii. myrrhæ drach. x ii. opij drach. x ii. spicæ nardi drach. iiii. aloës drach. iiii. acaciæ drach. c viii. gūmi drach. c viii. Excipe aqua. Collirium Hygidium, quod quidā Ammonij dixerunt. Facit ad incipientes suffusiones, & inustiones. Et ad omne ulcus, & oculos purulentos, confusiones, chemoses, prolapsus, & ad diuturnamyocephala, staphylomata, unguis ulceris genus. Repurgat, replet, & ad cicatricem perducit. Eos uero qui ob aliquā causam, aut propter capitis aut oculi dolorē, dormire nō possunt, præclare ad somnū perducit, uelut somniferū medicamentum. Vtere cū ouo, aut lacte, aut aqua, tēperatura sit mediā aut crassior, pro sensus ægrorum subtilitatē. Habet autem hoc modo: Cadmiæ lotæ drach. x vi. cerusæ lotæ drach. x vi. castorij drach. vi. nardi Indici drach. iiii. stibij loti drach. x l. æris usti loti drach. x v. rosarum drach. x x. squamæ æris ustæ drach. v. Aloës drach. vi. casia drach. iiii. myrrhæ drach. vi. lycij Indici drach. iiii. lapidis scissi loti drach. iiii. & dimidiā, croci drach. vi. plumbi usti ac loti drach. viii. & dimidiā, opij drach. iiii. acaciæ drach. x l. gummi drach. x l. Excipe aqua. Est ex ualde celebribus. Collyrium Indarium: Piperis drach. ii. cadmiæ drach. iiii. costi drach. i. stibij drach. viii. gallarum drach. iiii. spicæ nardi drach. iiii. nardi drach. iiii. acaciæ drach. iiii. gūmi drach. iiii. opobalsami drach. ii. Excipe aqua. Facit ad uisus hebetudinem. Exerit etiā cicatrices. Collyriū Theodotiū Paccianū. Facit ad maximos humorum illapsus, et doloris molestias. Liberat citra uenæ sectionē. Cadmiæ ustæ ac lotæ drach. viii. æris usti ac loti drach. viii. stibij loti drach. x vi. croci drach. iiii. castorij drachm. iiii. æruginis drach. i. aloës drach. iiii. myrrhæ troglodyticæ drach. iiii. lycij Indici drach. ii. opij drach. ii. acaciæ drach. x x iiii. gummi drach. x x iiii. Excipe aqua. Vfus est cum ouo. Temperatura sit crassior. Collyrium, quod tumorē laxum palpebris inducit, appellatur Testamentū Aurifabri, reliquit hoc moriēs templo Ephesio dicatū, quō hi qui à Medicis relicti essent, in tēplo sanitatem cōsequerentur. Inuentum est autē ab Adriano Cæsare. Facit ad humorum illapsus, & aspritudines, & ad omnes desperatas affectiones, pustulas sanat, caua ulcera explanat, cicatrices incōspicuas facit, oculum imperturbatum cōseruat. Instillatur cū ouo aut lacte, prout necessitas experit. Sit autem in omnibus dilutū aquosum. Optimū est insuper ad acuēdum uisum. Habet hoc modo: Cadmiæ lotæ drach. viii. stibij loti drach. x vi. spicæ nardi drach. iiii. myrrhæ troglodyticæ drach. ii. croci drach. i. castorij drach. ii. squamæ ferri stomomatis drach. iiii. æris usti ac loti drach. x ii. æruginis drach. ii. cerusæ drach. iiii. piperis lycij, Indici, opij, thuris, opobalsami, casia sing. dr. ii. lapidis scissi drach. iiii. æruginis uermiculatæ drach. iiii. atramenti futorij drach. ii. succi fœniculi drach. iiii. fellis capræ drach. iiii. gummi drach. viii. Terito cū uino Aminæo aut Falerno, aut alio austero ueteri odorato. Collyriū Testamentū, uelut habetur apud Asteriū. Cadmiæ drach. l x x. stibij drach. l iiii. myrrhæ drach. v. & dimidiā, spicæ nardi drach. x. croci drach. x. castorij drach. vii. squamæ ferri stomomatis drach. x iiii. folij drach. x iiii. æris usti drach.

v. & dimidiā, piperis drach. vii. cerusæ drach. x iiii. lycij, thuris, casia, opobalsami, singulorum drach. x iiii. opij drach. vii. lapidis scissi drach. x iiii. æruginis uermiculatæ drach. viii. atramenti futorij drach. x iiii. gummi drach. l x x. succi fœniculi drach. x iiii. fellis caprini drach. x iiii. Terito cum uino aminæo.

Collyrium Theodotiū Magnum, Cadmiæ lotæ bessem, æris loti bessem, stibij loti uncias x x v. rosarū siccarū, cerusæ, chalcitidis, gallarū, æruginis, lycij Indici, croci, aloës, spicæ nardi, myrrhæ troglodyticæ, ramentorū ebeni, castorij atramenti Indici, thuris, opij, sarcocollæ, pōpholygis, singu. unc. i. cornu ceruini usti ac loti unc. i. acaciæ unc. x x v. gūmi unc. x x v. Excipe aqua. Quidam uero etiā folij uncia unam adiiciunt, & amomi unc. i. rosarū uerō quadrantem, gummi uero & acaciæ, singulorum unci. x x iiii. Reliqua autem eodem modo. Facit ad incipientes lippitudines, & exulcerationes omnes, & fluxum recentem, ac ueterem, inflammationes, carbunculos, oculos purulentos, nomas, puncturas, prolapsus, myocephala, staphylomata, palpebras asperas, & ad desperatas affectiones. Et ad ardores solis, aut caldis, aut pulueris, aut similis rei. Tollit etiā pterygia inflāmata cū butyro. Ad ulcera uero cū ouo adhibetur. Ad maligna autem cum lacte muliebri. Theodotium Seueri. Aliud quoddā collyrium etiā apud nos reperitur, inquit Seuerus, à ueteri quoddā descriptum. Et hoc quidem cōpositā materiā habet, uerum efficaciam diuersam. Nam omnibus simul rellatis collyrijs cōmodius cōpertum est. Quare etiam ipsius præparationē referre necessarium puto, quū neq; oibus hoc sit notū. Recipit autē cadmiæ drach. x x iiii. æris usti drach. x ii. stibij drach. x l. cerusæ drach. viii. chalcitidis tostæ drach. iiii. misyos tosti drach. iiii. ramentorū ebeni drach. ii. nardi Celticæ drach. iiii. folij drach. iiii. spicæ nardi drach. iiii. croci drach. iiii. castorij drach. vi. aloës drach. viii. lycij Indici drach. iiii. rosarum siccarum drach. iiii. gallarum drach. ii. opij drachmas ii. myrrhæ drach. viii. acaciæ drach. x l. gummi uermiculati drach. x l. Cadmiā prunis obruimus, & uentilamus, & ubi ignita facta fuerit, ablatam lacte asinino extinguimus. Stibium uero in fictile uas coniectū, addito operculo, foramen habente urimus, & similiter lacte extinguimus. Vsta uero singula per se tusa ac cribrata lauamus, & diligenter siccamus, & deinde pōderata ad præparationem adiicimus. Ceterū gummi nō cōtusum inspergimus siccū, sed madefacimus: sic enim neq; lignosum quiddam, neq; arenosum, cū ipso penetrabit dum excolatur, & optima coactio collyrij fiet. Quidam ad relatā præparationē adiiciunt etiā costi drach. viii. Et magis ita cicatrices exerit, inquit, & pterygia ac carnis in angulo incrementū consumit. Verū ad inflammationes & ulcera incommodus est cōstus. Huius igitur auxiliij actiones ac efficaciam dicere non est facile. Audiētes enim uix crediderint. Nā desperatas affectiones ad naturalem statum reuocat. Et ut in summa dicā, omnia quæ Theodotij appellatis nardinis, & his quæ ex cornu ceruino parantur adsunt, multo plus in hoc comperiuntur: in recentibus enim affectionibus eo illito, & spongia oculo imposita, ægrum ab affectione liberauimus. In diuturnis autem ac desperatis, partim instillantes, partim illinentes, scopum attingimus. Nam in facili so-



lubilibus oculi affectionibus ipsum illinimus. In ca-  
uis autem & sordidis ulceribus, diluto ipso utimur  
cum ovo aut fœnigræci succo. Quandoq; etiã cum  
aqua multa. In myocephalis autem, crassius cū aqua  
sublinimus per subiectionem. Sed & cicatrices simi-  
liter attenuamus. Ad tantam autem tenuitatē perdu-  
cit cicatrices, ut penitus nō cognoscatur per sensum.  
Et in summa, inenarrabilem quādam uim possidet.  
Etenim in staphylomatis, brassicæ succo dilutū col-  
lyrium, & crassa copia oculo adhibitum, unā cū spō-  
giæ deligatione, molem inconspicuam facit. Quin  
& carnis in angulo magno incrementum consume-  
re potest hoc collyrium tenuiter tritum, & in siccū  
puluillum redactum, itemq; pterigia attenuare. Sed  
& ad alia mirificum compertum est collyrium. Et

nos quoque permittimus posteris per experientiam  
deductis, ut auxilio testimonium præbeant. Eam e-  
nim quidam ad diuturna ulcera ac fistulas sedis ipso  
usi, scopum atigerunt. Vnde non absurdum fuerit  
etiã ad polypos ac ozænas narium ipsum adhibe-  
re. Collyrium ex succo fœniculi. Cadmiæ dodrā-  
tem, stibij bessem, misyos crudi sexuncem, æruginis  
sexuncem, piperis quincuncem, atramenti sutorij  
sexquinciā, chalcitidis unc. i. croci sesquiunciā, fo-  
lij unc. i. omphacij sesquiunciā, spicæ nardi trien-  
tem & unciae dimidium, opij quincuncem, & uncie  
dimidium, opobalsami trientem, gummi sextantē,  
succu fœniculi bessem. Et rursus aliud fœniculum in  
aqua pluuiāli decoquito, & cum decocto illa terito  
ac efformato. Hoc à multis præparatur.

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN

OCTAVO SERMONE AETII

HABENTVR.

**A**D superciliorum ornatum. Cap. i.  
De hypopijs, hoc est, ijs quæ sub  
oculis fiunt suggillationibus. cap. ii.  
Vngenta præseruantia faciem ne à so-  
le aut uento exuratur. cap. iii.  
Vt ne rugosa fiat facies. cap. iiii.  
Ad faciei nigredines. cap. v.  
Smegmata & medicamenta faciem niti-  
dam reddentia. cap. vi.  
Cataplasmata æstiuā, odorum corpus  
reddentia. cap. vii.  
Potiones ad eos qui tetrum habent cor-  
poris odorem. cap. viii.  
Ad menti scabricem. cap. ix.  
Ad faciei lentigines remedia, quibus e-  
tiam ad maculas à sole prouocatas,  
& ad uaros uti licet. cap. x.  
De maculis à sole prouocatis, quas Græ-  
ci ἐπιφύσεις appellant. cap. xi.  
De stigmatis siue notis ex plaga illatis.  
cap. xii.  
De uaris faciei, qui tum lonthi, tum A-  
cnæ Græcis uocantur. cap. xiii.  
De ficosis faciei tumoribus. ca. xiiii.  
Ad manantes menti papularū eruptio-  
nes, ex Critone. cap. xv.  
De impetiginosis tum menti, tum reli-  
qui corporis tumoribus. cap. xvi.  
Ad molestum oris odorem. cap. xvii.  
Ad labiorum fissuras. cap. xviii.  
De dentium affectionibus. cap. xix.  
Ad inflammatas gingiuas. cap. xx.  
Ad cruentas gingiuas. cap. xxi.  
Ad excrecentes gingiuas putrescen-  
tesq; ac tumentes. cap. xxii.  
Ad corrosas & ab ulcere serpente in-  
festatas gingiuas. cap. xxiii.  
Ad parulidas, hoc est, gingiuarum inflā-  
mationes. cap. xxiiii.

De epulide, hoc est, excrecenti gingi-  
uarum carne. cap. xxv.  
De gingiuarum fistulis. cap. xxvi.  
Cura dentium à calido morbo doloroso  
affectorum, ex Adamanto sophista.  
cap. xxvii.  
Cura eorum quibus ex frigidityte den-  
tes dolore afficiuntur. cap. xxviii.  
Cura dentium ab humiditate dolore affe-  
ctorum, & laxatorum. cap. xxix.  
De dentibus lima atterendis. ca. xxx.  
Cura dentium à siccitate dolore affecto-  
rum. cap. xxxi.  
Cura dentium ob caliditatem & humi-  
ditatē dolore affectorum. cap. xxxii.  
Curatio erosorum dentium. cap. xxxiii.  
Vt dens citra dolorem, & absq; ferro  
tollatur. cap. xxxiiii.  
Smegmata uaria ad denigratos liuen-  
tesq; ac rarefactos dentes. cap.  
xxxv.  
De ancyloglossis, & qui uix loqui pos-  
sunt. cap. xxxvi.  
Ad ranunculū sub lingua. ca. xxxvii.  
Ad linguā inflāmatā, desquamatā ac  
tumore inflatā. cap. xxxviii.  
Ad aphthas, hoc est, oris ulcera. cap.  
xxxix.  
De gurgulionis affectionibus. cap. xl.  
De ablatione columnellæ. cap. xli.  
De oris inflammationibus. cap. xlii.  
Illitiones ori commodæ. cap. xliii.  
Summaria doctrina de usu omnium illi-  
tionū ad os apparatus. c. xliiii.  
De tōssillarū inflāmatiōibus. cap. xlv.  
De crustosis & pestilentibus tonsilla-  
rum ulceribus. cap. xlvi.  
De āgina, et eius speciebus. ca. xlvii.  
De glandulis. cap. xlviii.

De suffocatore uocacione. cap.  
xlix.  
De deuoratis in tōssillas spinis atq; his  
quæ in asperam arteriam delabun-  
tur. cap. l.  
De arteriarum pharmacis. cap. li.  
Ad inueteratas affectiones uariæ arte-  
riacæ. cap. lii.  
De destillatione siue catarrho, & na-  
rium muco. cap. liii.  
De tussi. cap. liiii.  
De pharmacis dolorem leuantibus &  
conferentibus tussi. cap. lv.  
De suffitionibus. cap. lvi.  
De orthopnoicis, anhelosis, & agrē  
spiritum ducentibus. cap. lvii.  
De cordis tremoribus. cap. lviii.  
De sanguinis reiectione. cap. lix.  
Curatio eorum qui ob destillationē  
sanguinem expuunt. cap. lx.  
De his qui ob frigiditytem organorum  
respirationis sanguinem expuunt.  
caput lxi.  
Curatio eorum qui iuxta alium quem-  
cunq; tandem modum sanguinem ex  
pulmone reiectant. cap. lxii.  
Communes methodi exhibendorū au-  
xiliorū in singulis reiectionis san-  
guinis specielus post sanguinis in-  
hibitionem. cap. lxiii.  
De asperæ arteriæ ulceribus. cap.  
lxiiii.  
De pectore suppuratis. cap. lxv.  
De peripneumonicis. cap. lxvi.  
De phthysicis seu tabidis. cap. lxvii.  
De pleuritide seu laterū morbo. cap.  
lxviii.  
De ea quæ pleuritis esse putatur, quā  
tamen non sit. cap. lxix.

AETII



# AETII MEDICI GRAE- CI CONTRACTAE MEDI-

CINAE TETRABIBLI SECVNDAE

SERMO QVARTVS, ET EX  
ORDINE OCTAVVS.

\*

*De faciei, oris, & tonsillarum affectionibus: Cui annexum est, De destillatione, & tussi,  
aspera arteria, pulmonis, ac thoracis affectionibus.*

AD SUPERCILIORVM ORNA-  
TV M.

Cap. I.



**Q**UANTVM quod ad hanc rem attinet, iam antè à nobis dictū sit, ubi de defluuio capillorum capitis, Sermonē sexto mentionē fecimus, dicemus tamen & hic nō importunè, sed ut habet, paucis. Illitio augēs

superciliorū capillos, atq; etiā aliarū corporis partium, eadē etiā eosdem nigros reddit. Nucū ponticarū interiora in uase figulino torrefacta contere, & pinguedine caprae sylvestris excipe, atq; cū hoc ipso partes inūgi praecepe. Aliud. Adīati unc. i. ladanī sextātem, pāsi cretici heminā unā, cōtunde ac subiige cū passo: deinde torre, ut dictū est, ac rursus cum pingui caprae sylvestris, aut urli cōtere, & utere. Potes & huc accommodare ea, quorū meminimus Sermonē VI. Itē ex armeniaco lapide, de quo Sermonē II. cap. XII. diximus, sicco trito supercilia insperge.

*De hipopijs, hoc est, his quae sub oculis sunt  
sugillationibus.*

Cap. II.

Quod hipopia sub oculis fiant, ipsum nomen indicat: siquidem hypopium Græcis hypophthalmiū significat, quod Latinis, sub oculis sonat. Sunt autē hypopia ex genere suffusionū sanguinis in locum contusum: fiuntq; ex plaga, quum tenuibus sub cute uenulis contulis, sanguis per fissuras sub ipsam cutē, affatim effunditur, neque id uno loco. In grumos enim coit statim, & liuet locus, progressuq; tēporis nigrescit. Quare medela occurrendum est, antequā nigrescat, cura potissimum ad hoc adhibita, ut concretus sanguis discutatur. Quod si tunica quoq; rūpatur uenularū, ex quibus effunditur sanguis, miscendū est his quae discutiendū uim obtinent, parum quiddā ex cōstringentibus. Nā si in principio sola discutiētia exhibeantur, nō tantū id quod effusum est discutient, sed per ipsas uenarū contusarū fissuras amplius quiddā elicient ex sanguine in ipsis uenis contento. Quum uero in naturam suā redierint uenulae, etiā citra admixtionē cōstringentiū, ad discussoria trāseundū. Atq; ego sanè in principio utor Nili ex rosis collyrio, ex eo in aqua dissoluto, locū sugillatū illinens. Vtor autē pro fomēto, decocto melleiloti & foenigræci. Deinde collyrium quoq; in eodem decocto dissoluo, aut etiā in solo foenigræci decocto. Quod si reliquiae quēdā restiterint ipsius affectionis, dissolutis ex myrrha collyrijs in foenigræci decocto, illino bis in die, prius tamen cum spōgia in decocto madefacta loco foto. Idē praestat in principio, nō praesente ex rosis collyrio glauciū illitum, & sex olei coquēdo cōdensata. Inueteratū autē iam

malū ex sandice collyria tollūt, & quaecūq; praeclearè omnino discutiunt, qualia Diosco. inter facile parabilia enumerauit. Ea enim quae sub oculis fiūt sugillata, inquit, & liuores iā inueteratos tollūt, raphani cortex cū melle illitus, bryoniae radix uino aut cerato excepta, bulbus cū uitello oui impositus, aqua marina calida pro fomēto, aut muria uel salugo, caseus antiquus cū decocto hyssopi impositus. statim autē tollit sepiæ testa cū aceto illita, sinapi cerato exceptū, cucumeris sylvestris radix cōtrita cū melle, lini semen cōtritum cū lacte. Critonis compositio. Ad liuores alē infixos. & ea quae sub oculis fiūt sugillata, seminis uiticis albi drach. III. radicis herbae lanariae siue radiculæ drach. tres, nitri rubri, corticis raphani, hyssopi, farinae fabarū, uniuscuiusq; drach. tres, mirobalani drachm. x l. cineris pulmonis agni exusti drach. x l. bulborū rubrorū drach. x l. radicis rapsiæ aut succi drach. x l. corticis thuris drach. unam: excipe cerato ex oleo rosaceo apparato, ac linteolo infariū impone. Oportet autē assidue amouere, cum cautione, ne locus exulceretur. Ego autem expertus sum, nucem pingue, uetustate rancidam, certissimū ad liuores remedium. Porro reclinato ac supino remedia adhibere conuenit, ut adhæreant spatio horarum trium quā optimè contrita.

*Circunlitiones praeseruantes faciem, ne à sole aut  
uento exuratur.*

Cap. III.

Circunlitio faciei, quae aurea appellatur: Lupinorum siccorum sextarios III. aquae pluuialis sextar. x IIII. iniice in uas aereū stāno obductū, sinasq; madefieri per triduū: quarta autē die decoque ad prunas usq; quò dissoluantur lupini: deinde per colū exprime liquorē, ac eū seorsim decoque, atq; ubi condensatus fuerit, in uas uitreū reponere. Vbi uero uti uelis, quātum satis uidebitur accipe, & cū eo in modica aqua dissoluto faciē illine. Alia ualde laudata. Similaginē lotā & per pānū percolatā sinas desiderare, aquāq; abijce, fecem autem cum albumine oui permisce, donec mellis crassitiē accipiat, & cum hoc faciē obline uersaturus in sole: quum uero à sole recesseris, frigida multa ablue. Alia. Boni coloris faciē hæc reddit, atq; itē uniuersum corpus. Mastichē cū oleo omphacino dissolutā circūline: aliquādo autē & olei loco medullam ceruinā, aut uitulinam accipimus: aliquādo ceratū liquidum. Alia. Cupressi ac ilicis scobem in oleo decoctā oblini. Alia. Solani succum cum oleo illine. Alia. Nuces pineas cum modico aceto cōtere, adiecto melle sufficienti, ac oui crudi uittellis, atq; hoc ipso faciē oblini: neq; refert etiā si citra acetū eo utaris. Alia. Hec in æstate conuenit, faciē praeseruās: tragacanthi, ammoniaci thymiamatis, costi contusi, cuiusq; sextantem, aluminis liquidū drachmas



chmas  $\text{IIII}$ .thuris sextantem, amyli sexuncem, oua cruda recentia  $\text{XIII}$ . mellis libras tres, mulsi sextarios tres. Tragacanthū, ammoniacū, & thus in mulso madefieri per noctē unam, in uase uitreo finito: oua autē integra in acetū uetus & acre proiecta, per triduum macerato: alumē uero optimē lauato: dein de omnia simul in mortariū fictile coniecta ac diligenter cōmixta, melle cocto excipito, atq; utere, faciem ex eis oblinendo. Ante ingressum uero balinei medicamentum hoc tollatur, atq; id particulatim auellere conuenit leni tractu ex facie induratum: deinde aqua tepida abluere, & spongia abstergere: quod ubi factum est, manna thuris in albumine oui dissoluta, faciem illinito.

*Vt ne rugosa fiat facies.*

Cap.  $\text{IIII}$ .

Faciem corrugatam extendit medicamentum hoc: cornu cerui non antiquū in aqua decoque, donec succulentum quid remittat, percola deinde ipsam aquam, & cū ea farinā fabaceā subige, ac pastillos informa, cosq; in umbra exicca. Vbi autem usus postulauerit, quantum opus fuerit in aqua dulci dissolue, ut cerati liquidi crassitiem accipiat, & cum eo faciem oblinere iube, atq; cum adglutinatum fuerit, faciem aqua tepida abluere præcipe.

*Ad faciei nigredines.*

Cap.  $\text{V}$ .

Ad faciei nigredines his utendum est, iridis contritæ, farinæ ptissanæ, farinæ fabaceæ, cuiusq; sextarium unū & dimidiū, salis ammoniaci, cornu ceruini usti ammoniaci, thymiamatis, cuiusq; sextantem, in aqua dissolue, & pastillos informa, quos in umbra exiccatos adserua, atq; usus tempore, in aqua resolutos ante balineū faciei illini. Aliud. Farinæ ptissanæ, thuris, iridis, farinæ fabarū, farinæ erui, spumæ nistri, costi, cuiusq; choenici partē quartam, amygdalas amaras  $\text{XX}$ . informa cum cādido ouorū & lacte asinino, exicca in umbra, ac utere ut dictum est.

*Smegmata & medicamenta faciem nitidam reddentia.*

Cap.  $\text{VI}$ .

Quandoquidē post unguentorum ablationem pleriq; faciem extergere conantur, utendū ad hāc rem cōpositionibus infra scriptis. Smegma illustriorē reddens faciem. Amygdalas decorticatas  $\text{XL}$ . thuris, spumæ nistri, gummi cuiusq; drachmam unam, farinæ fabaceæ drachmas  $\text{XII}$ . excipe oui candido, & in pastillos digere, quibus cum aqua solutis, passim tum in balineo, tum citra balineū utaris. Aliud. Smegma faciei celebre & admirandum, quod & faciem illustriorem reddit, & rugas expolit, asperitates pellit, incipientem elephantiasin arcet, si quidem cū alijs remedijs adhibeatur: usus eius etiam reliquo corpori cōueniēs est. Mastiches, thuris, ammoniaci thymiamatis, iridis, cuiusq; uncia unam, tragacanthi sesquiciam, succi uuæ acerbæ immaturæ dodrantem, seminis peponis unā cum concluso in ipso humore dextātem, cādidi ouorum  $\text{XXI}$ . similaginis sextarios quinque: contunde omnia, ac cum candido ouorū, & humore peponis, succoq; uuæ acerbæ commisce, & in pastillos redige, ac exicca, post uero contusos ac attritos, in uase uitreo ad usum adserua. Smegma faciei, quod simul & ipsam rubicundam reddit. Farinæ erui, fabarū, lupini, ptissanæ, ciceris, bulborum narcissi, cuiusq; sextarij Italici dimidium, similaginis sextarium unum, contunde ac cribro tenuissimo excute: deinde oui candido commixta, in pastillos

digere, & in umbra desicca. Vsu uero expetēte, quantum libet accipe, & in aqua dissolue, atq; à balneo utere. Aliud faciem illustrans, & uniuersum corpus: dissipat autem & rugas, & cutem depurgat. Vitis albæ radicem delibra, ac in sole æstiuo exicca, deinde contusæ ac cribratæ Italici choenici dimidium accipe, iridis contusæ tantundem, myrobalani siccae decorticatæ tantundem, farinæ fabaceæ choenici unū: hæc in uino ueteri odorato subacta, in pastillos digere, quos in umbra exiccatos adserua: & usu expetente, contusis & cribratis cum aqua utere.

Aliud Cleopatrarē reginæ odoratum & preciosum. Costi, myrrhæ troglodyticæ, iridis, spicæ nardi, amomi, folij malabathri, calsiæ, floris iunci odorati, cuiusq; unc.  $\text{I}$ . Myrobalani lib.  $\text{IIII}$ . spumæ nistri lib.  $\text{I}$ . cōtundito, cribrato, utitor. cōfert uniuerso corpori. Aliud efficax & odoriferū. Floris iunci odorati, iridis cuiusq; drach.  $\text{II}$ . mastiches drach.  $\text{I}$ . contende, & cum succo ptissanæ crassissimo pastillos forma, & in umbra desicca. Vbi uero usus expetit, in aqua dissolutos illinito, & post horē spatium frigida abluito. Aliud, splendidam & erugatam reddens faciem, ac totum corpus: Farinæ fabaceæ Italici modium unum, similaginis Italicos sextarios quatuor, trifolij cōtusi sextarios quatuor, myrobalani tantundem, iridis contusæ tantundem, ammoniaci thymiamatis libram unā, costi tantundem, cādidi ouorum recentium crudorum sexaginta, seminis peponis unā cum humore choenici unam, succi uuæ acerbæ tantundem, subige & informa pastillos, quos sufficienter in umbra exiccatos à balneo illine. Preclarē facit, & ad eas quæ in collo sunt & reliquo item corpore nigredines. Aliud ad faciei nigredines, multo usu exploratum. Thuris sesquiciam, cerusæ probè lotæ, spumæ argenti in decocto cicerum alborum, ad solem frequenter ablutæ, amyli recentis, scobis marmoris albißimi, mastiches puræ, spumæ nistri albensis, testarum sepiæ, singulorum unc. unā, saponis Gallici unci. duodecim, cādidi ouorum decem, appara, & utere, ut dictū est. Aliud mirabile faciem depurgans & illustrās. Farinæ foenigræci trientē, terræ Samiæ quæ Aster appellatur, quadrantē, amyli trientē, mastiches sexūcē, medullæ ceruinæ recentis sex uncem, tragacanthi trientem. Tragacanthū in lacte muliebri, aut asinino macerato, ac cum eo dissoluto, reliqua tenuissimē trita in pastillos digerito, quibus in umbra desiccatis, ut prædictum est utitor. Aliud smegma. Ricini seminis interioris dra.  $\text{VIII}$ . bulborū narcissi siccorū ac decorticatorum drac.  $\text{VIII}$ . similaginis drac.  $\text{IIII}$ . thuris drach.  $\text{II}$ . candidum ouorum  $\text{VIII}$ . appara ut dictū est, & utere. Sapo quo usa est Pelagiā patricia, ad faciem illustrandam. Saponis Gallici sexuncem, cerusæ sextantem, mastiches uncia dimidium, medullæ cerui unc.  $\text{I}$ . spumæ nistri albæ trientem, ceræ albæ quadrantem. Præmacera saponem in aqua in uitreo uase ad dies  $\text{V}$ . aqua pluuiāli quotidie permutata, & sapone excolato. Postea in ollam nouam immitte saponem, & sexta die rursus affusā pluuiāli aqua, ad lentas prunas decoque, donec sapo dissoluatur. Deinde ceram & medullam adde, & ad dissoluta mastichē & spumā nistri insperge, olla amota, et assiduē per spathum commota. deinde etiam cerusam modica aqua trita adde, & medicamentū in testā

missum



missum contentè manu subige, & reposito in uitreo uase utere uelut dictum est. Smeagma ex Rufi libris, ad totius corporis erugationē. Ficus pinguisimas, uitis albę radicem siccā delibratā, sepiaē testā ustam, farinā eruit: unumquodque seorsim contunde: dein de etiam simul, & modico adstillato melle, utere. Aliud smeagma, quod uniuersum corpus odore imbuuit. Terræ cimoliæ bessēm, iridis tenuissimè tritæ drach. xxiij. nardi Celticæ drach. xxiij. cyperī, cardamomi, styracis flauī & pinguis, cuiusq; drach. xii. styracē in uino ueteri odorato dissolue, & in prōptu habet: terrā uero cimoliā in fictile uas cōiectā carbonibus impone, atq; ubi satis cāduerit ab igne, eā ad dissolutum styracē inijce, deinde reliqua sicca tenuissimè trita insperge, ac simul sufficiēter unita in pastillos digere, quibus in umbra exiccatis, post uero tritis & cribratis utere.

*Cataplasmata æstiuā, odorum corpus reddentia.*

*Ex Critone.*

*Cap. vii.*

Quū sudores corpus uexāt, magna oboritur ex eis molestia, præsertim in æstate. Nā & sordes multas inuehunt, & tetrum odorē de se præbent. Quare subscriptis remedijs uti conuenit, non ad mulieres tantum, sed ad ipsos etiam uiros. Non importunum enim esse puto & in hoc smeagmatum tractatu harū rerū mentionē facere. Cataplasma, hoc est, inspersio totius corporis odorē bonum efficiēs, æstiuum. Rosarum siccarum quadrantē, casiaē quadrantē, amomi, costi, spicę nardi, cuiusq; drach. ii. aluminis liquidi sextantē, dissolue in uino ueteri odorato, & in pastillos digere, quos in umbra exiccatos usu expetente contundito, ac cribrato, atq; in balneo inspergendos exhibeto, ita ut diligenter perfricent, & cū frigida aqua abluant. Aliud. Spumę argenti in decocto cicerū ad solē inalbatæ, amomi, casiaē, folij malabathri, costi, spicę nardi, aluminis liquidi, iridis, omniū par pondus, appara, & utere ut dictū est. Potes autē prescriptis cataplasmatibus uti quocunq; tēpore uelis. Aliud odorum & lene. Rosarum uiridiū & tamē siccarū dra. xl. myrrhę troglodyticę drachmas octo, iridis Illyricę, spicę nardi, casiaē, cuiusq; drach. viii. uino odorato subige, & pastillos informa: quibus ubi uti uelis, cōtritis & cribratis corpus insperge, maximè à balneo. Aliud. Amomi, casię, spicę nardi, costi, folij, myrrhę, singulorū æquales portiones. Vini quod satis est, para ac utere uelut dictū est. Aliud. Casię, iridis, myrrhę, aluminis optimi, pares portiones uino subige, & pastillos forma ac utere. Aliud. Iridis, spicę nardi, floris iūci odorati, cuiusq; drach. iiii. amomi drach. ii. myrrhę dra. ii. meliloti drachmas quinque, appara & utere similiter. Archigenes autē inquit: Ad omnes corporis tetros odores, atq; eos qui grassoniā à Græcis appellatur, ante omnia cōducūt exercitia, inunctiones, siccę fricationes, alui frequēs subductio. Sunt etiā cibi ad destruendū hoc malū cōmodi, itēq; illiutiones. Cōueniunt itaq; oleū rosaceū, melinū, myrteum, iris sicca per se in puluerē redacta & intrita. Aut, alumē liquidū in aqua uel uino dilue, & myrrham tenuissimè tritā admisce, ac ad mellis crassitudinē redige, & ex eo collū, locos sub alis, inguina, & reliquos exudantes locos inunge. Aliud. Aluminis liquidi drach. iiii. myrrhę drach. iiii. spumę argenti lotæ drach. ii. casiaē drach. i. contere, & cum eis sub alis locos,

intermedia coxarum & inguina cōfrica: tollit enim euestigio eorum foetorē. Aliud. Casiaē drach. iiii. aluminis scissilis drachm. ii. utere cum uino per se.

Aliud. Mastiches quadratē, aluminis scissilis unc. i. utere cum uino. Aliud. Myrrhę troglodyticę, iridis illyricę, florum rosarum siccarū, æquales partes cōtunde, & cribra, ac forma pastillos cum uino, eosq; in umbra sicca, ubi uentus non spirat. Deinde cōtusos ac cribratos in pyxide reponere coopertos, ut ne transpirent, & utere à balneo inspergens ac defricans locos leniter, atq; ita imbibi sine, & postea frigida ablue, & manet odor, de quo meritō mireris. Probè facit & alumen cum uino, & crocomagma cū myrrha. Et cupressi ramenta ac alumen cū uino.

*Potiones ad eos, qui tetrum habent corporis*

*odorem.*

*Cap. viii.*

His uero qui foetentē habent corporis odorē, eiusmodi potiones exhibere conuenit. Cardui radicē in uino albo decoctā propina, & eiciēt urinā crassam & foetentē. Aliud. Resinā terebinthinā oliuę magnitudine cū pari melle decoque, & quotidie deglutiedā exhibe, & uinum insuper absorbendū. Aliud. Myrrhā & serpyllum paribus partibus terito, & in pilulas formato, quarum duas deuorandas dato, & uinū insuper absorbendum. Hęc etiam ad oris graueolentiam faciunt.

*Ad menti scabricem, ex Galeno.*

*Cap. ix.*

Fiunt & in mento aspredines ut plurimum seroso humore à capite destillante, & præcedentibus fursuraceis in collo ac uicinis partibus squamis, aliquando autē usque ad auditorios pertingit ac perreptat meatus. Estq; omnino hęc affectio dolorosa, pruritus inferens, ac distendēs corpus: quare subscriptis remedijs est subueniendum. Critonis. Amurcam ex oliua prius quàm exprimatur destillatē, decoque quousque cogatur, eaque assiduē locos inunge.

Aliud. Myrrhę uncia unā, ouorum crudorū uitellos quinque, myrrhā cum lacte dilue, deinde adijce ei oua, eaq; simul passo excipe, ac assiduē illini, & miraberis effectū. Aliud pharmacū efficax, quo multos hac affectione detentos liberauimus. Glaurij dra. xvi. gūmi drachmas quatuor, lacrymę oleę tātundē, dissolue, & ad strigmentitiā crassitudinē cū passo redige, atq; assiduē illine. Exulcerata autē cute & circundolente, sequentibus utendum. Pinguis compositio ad faciei manantes & squamosas affectiones, ac asperitates, utilis etiam existit sedi, conuenitq; ambustis ab igne. Spumę argenti uncia unam, cerę tyrrhenicę trientē, ouorum assatorum uitellos tres, adipis anserini bene subacti trientem: spumam argenti in farinā redige, ac adijce ei oua, deinde his simul unitis infunde quantū sufficit lactis, ut ad strigmentitiā crassitiē redigatur, postea cerā liquefactam unā cū pingui, refrigeratāq; ac erasam, conijce, ac simul cōmisce, atq; in pyxide reconde. Vsu uero exigente, de eo quātum satis esse uidebitur accipe, ac cū rosaceo dilutum impone. Potes autem & sedis remedijs, & quę ad ambustos ab igne descripta sunt, cōsimiliter in hac affectione uti.

*Ad faciei lentigines remedia, quibus etiam ad maculas à sole prouocatas, & ad uaros*

*utilicet.*

*Cap. x.*

Vitis albę itemq; nigrę radices cum oleo decoque, donec succulentę reddantur. Tollit etiam tum



lentigines, tum uaros, oleum amygdalarum cum cera, radix lilij cum melle. Maxime omnium autem lentigines delet gummi & nitrum æquali pondere, melle permixta. Aliud. Brassicæ semen aqua contritum illini, absterfo tamen & confricato prius loco. Vbi uero exaruerit atq; cutis attollatur, proluet aqua multa frigida, & illinito pingui anserino, aut medulla cerui, aut etiã cerato ex aliquo huiusmodi apparato. Cauedũ aut est, ne quis post excoꝛiationẽ incidat in ea quę faciẽ offendere possunt, qualis est aër frigidus, aut uentus, aut prolutio faciei. Aliud. Sandarachã attere cũ melle ad strigmeti densitatẽ, & per dies sex illinito, arefacta autẽ cute atq; eleuata, utere galbano cũ modico nitro & aceto dissoluto. Aliud, ad uibices ac lentigines: Columbe stercus cũ acri aceto tere ac utere, & miraberis. Ad diuturnas autẽ lētigines his utere. Radicis cucumeris syluestris sextantẽ, cimoliæ unc. i. in puluerẽ redige ac repone. Vsu uero expetẽte, quãtũ suffecerit in aqua dilutũ illini. Aliud. Bulborũ depuratorũ unc. i. thuris unc. i. cõtete, adiecto cochlearũ terrestriũ magnarum cruore. Oportet autẽ ipsas adhuc uiuas stylo pũgere, atq; id quod effluit mucosum, pharmaco inñcere: quod ubi usus tẽpore dissolueris, melle exceptũ inũge. Eũdem effectũ præstat ari radix, sicca cũ melle, & umbilici, ueneris radix, cerato liquido excepta ac illita.

Smegmata ad lentigines in calli modum obduratas. Quandoquidem contingit aliquando sublati lentiginibus callosam reddi cutem, ac uix curabilẽ fieri affectionem, utẽdum est post lentiginũ excoꝛiationem huiusmodi smegmatis. Farina erui choenici Italici dimidium, farinæ hordaceę tantundem, scille assatæ sextantem, omnia in puluerem redacta, candido oui excipe, & in pastillos redige, quos in umbra desiccatos adserua: usu uero expetente cum aqua dissolutos illinito, & post modicã temporis intercapẽdinẽ frigida abluere iubeto: aut cremore in quo furfur maceratus est, maxime si adest inflammatio.

Aliud. Spumę nitri drachmas octo, alcyoni dra. viii, galbani drachmas octo, amygdalarum amararum delibratarum drachmas tres, melle excipe, ac illitum sinas areferi. Deinde iube faba dentibus contrita extergi, ac ablui aqua moderatẽ frigida: cautosq; esse præcipe, ne aut à uento, aut à sole lædantur.

De maculis à sole prouocatis, quas Græci ἐφελιδας uocant, ex Critone. Cap. xi.

Fiunt etiã in facie maculæ, quas Græci ἐφελιδας uocant, eò quòd à sole prouocentur, maxime circa malas & nasum: & apparent sanẽ non in alto fixæ, sed instar flosculorum productæ, quare leniter eas confrictas attollere oportet, ac sinere areferi, cõmone re q; ut uno aliquo ex smegmatum genere extergantur. Discutiũtur enim ab illis, aut certẽ ita abscedũt, ut digitis auelli queant. Verum non uiolenter id facere conuenit, sed leniter & paulatim. Quòd si adhuc inhæreãt, nihilo leuiore reddite, subscriptis utẽdum est. Brassica contrita, & illita, ad maculas à sole productas, & lentigines, atque omnia alia quæ mediocri extersione ac repurgatione indigẽt, utilis est. Similiter autem & sepiæ testæ ustæ, aut testæ purpurarum, ac buccinorum cum melle illitæ. Oportet autem has testas in crudam ollam coniectas in fornacem immittere ac assare. Oribasij ad maculas à sole prouocatas, uarosq; & uirilignes. Farinæ erui li-

bras duas, seminis erucae libram unam, amygdalarũ amararũ, cucumeris syluestris radicis, cuiusq; librã unam, in uino mulso dissoluta & contrita illini, ac post horæ spatium spongia absterge. Aliud ualde admirabile. Ceræ tyrrhenicæ drachm. xv. olei rosacei drachmas septem & dimidiam, pinguis anserini unciam unam, spumæ argenti loræ & dealbatæ unciam unam, cerussæ unc. i. gummi drachmas quatuor, mellis Attici unc. i. dissolutis illini faciem: & post spatium horarum sex spongia deterge, ac laua cum sapone. Aliud Oribasij. Lupinos in lixiuio per triduum maceratos contere, & cum eis lentigines illini, donec auelli possint. Aliud. Saponem Gallicum aqua tritum modico adiecto melle inũge, & per horas tres inhærere sine, aut stercus columbinũ linoleo exceptũ ac in puluerem exustũ, cum oleo contere, ac illine cõfidenter. Idem probẽ efficit myrobalanos contrita illita: itemq; bulbus crudus per se uel cũ oui luteo & aceto aut melle. Exusti autem bulbi unã cũ alcyonio illiti depurgat lētigines: quod facit elateriũ quoq; illitũ, & cassia cum melle, brassicæ semen cũ aceto, hederæ folia uino decocta, radix umbilici ueneris cũ cerato liquido illita: aut cucumeris syluestris radix: aut fici uirgula in aceto decoque, ac cõtulis utere: quod idẽ & uirilignes sanat. Aut rubiã oleo cõtita, aut costũ aqua cõtusum, aut nitri spumã cerato liquidiorẽ exceptã, aut lupinos crudos cũ lixiuio coactiliariorũ decoctos & cõtufos, cũ melle illini. Aliud. Radices narcissi delibratas in aceto decoque, ac tere, iniecta farina erui sufficere, & pastillos informa: quos in umbra exiccatos, in usum adserua. Qui ubi postulauerit contritos cũ melle, ad uesperam illine: mane autẽ rursus abluĩ præcipe. Aliud. Lilij bulbos quinq; cõtete, & conñce spumæ nitri lib. i. deinde melle quantũ suffecerit cõmistũ illini, usquequo integrẽ curentur, ut iã antea dictũ est. Aliud. Amygdalarũ amararũ partes ii. melanthij torrefacti partẽ i. unumquodq; seorsim contere, & cũ melle cõmisce: illinito autẽ ad uesperã, mane q; abluito cũ aqua dulci. Vtere autẽ uno aliquo ex smegmatis superius ad faciei nigredines præscriptis: itemq; his quæ sunt illis uicina, ac similia. Vtile autẽ est & hoc, præsertim si fuerint diuturnæ, buccina exure, ac cũ melle contere, & ad uesperã illine: mane autem ablui cum aqua dulci præcipe.

Aliud ad solares maculas, ualde pulchrũ. Oua integra in aceto macerato, donec testa quàm tenerissima fiat, deinde superius perforato, ac extrahe ab eis candidũ: post uero iridis Illyricę tusæ ac cribrate, & melanthij in tenuissimum puluerẽ redacti, & thuris equas partes cũ eis cõtedito, adiectoq; melle sufficere, ut dictũ est, utitor. Quòd si adhuc perseverauerit affectio, huiusmodi excoꝛiatorijs utẽdũ erit. Excoꝛiatoriũ macularũ à sole prouocatarum & lentiginũ. Melanthij quadrantem, seminis ocymii quadrantem, radicis ari quadrantem, aqua subigito & imponito, ac finito adglutinari: post aliquantũ uero interstitiũ detrahito, atq; aqua calida quàm plurimã proluito. Aliud. Quod ad callosam faciẽ cõducit, siue per ætatem, siue per continuã pharmacorũ acriorũ excoꝛiationẽ calli sint cõtacti, seminis erucae sexuncem, ammi, cardamomi, radicis ari, costi, cuiusq; quadrantem, contundito, cribrato, ac reponito. Vbi uero necessitas exigit, quãtũ satis uidebitur accipito, acetoq;



acetoq; subactum imposito satis cōdensatū: quū uero adglutinatum fuerit, acetum aut aquam per spōgiam instillato. Facta autem excoꝛatione, multam aquā calidā adfundito: à prolutione uero subie tam mixturā panniculo laneo exceptā imposito. Cerusæ drach. viii. spumę argēti lotę drach. iiii. adipis anserini sexuncē, medullę ceruini sexuncē, cęsypī medicamēti quadrantē, adipis suilli recētis quadrantē, olei sesamini quantum sufficit. Oportet autē fomentū adhibere bis in die: eleuata autē cute, sequens ceratū est imponendū. Adipis caprini à fibris depurati & loti lib. ii. olei susini sexuncem, olei rosacei, & amygdalini, cerę, mastiches, cornu ceruini usti, salis ammoniaci, cuiusq; unc. i. terrę cimolię trientē. Ea quę eliquari possunt liquefacito & percolato, deinde rursus ad carbonēs lentē decoquito, & ad ea quę sicca sunt in mortariū adfundito, ac probē unitis utitor. De exulcerata mēti scabrie. Utendum est ad eā his, quę paulō pōst in capite uidelicet decimoquinto descripta sunt, ad manātes mēti papularū eruptiones.

De stigmati siue notis à uerbere illatis. Cap. xii. Stigmata appellant, quę in facie, aut alia quapiā corporis parte infliguntur, notas, quales uidemus in manibus eorum qui militiam exercent. Atramento autem utuntur illi tali: lignorum spinę Aegyptię & maximē corticis libram unā, æris usti sextantē, gallarum sextantē, atramenti sutorij unciam unā, cōtundito ac cribrato, primumq; æs ustum cū aceto terito, deinde & reliqua cōtrita cōiuncto, affusisq; aque quidē partibus duabus, succi uero porri parte una, & probē unitis utitor. Oportet autem locis prius cū acubus punctis sanguinem extrahere, & primū porri succo illinire, postea uero ipsum adhibere pharmacum. Porro quibus eiusmodi stigmata extirpare penitus uolumus, illis subscriptas mixturas adhibebimus. Calcis partē i. nitri assati partē i. cum lixiuio coactiliā uerito, & nitro asperso locū prius preparato & extergito: deinde illinito continenter. Idē quoque ad uerrucas myrmecias dictas, efficax existit. Aliud, quod stigmata tollit. Piperis drach. ii. rutę dra. iiii. auripigmēti drach. iiii. cōtere, & adiecto melle, in pyxide figulina reponere. Vbi uero usus expetit, supra stigmata prius nitro conficta, resinā terebinthinā impone, uinculo adhibito in dies v. postera autē die sexta solue, atq; acu stigmata penetra, & cū spōgia sanguinē exterge, salemq; tenuissimū in ipsas puncturas insperge: quē tamdiu inhærere sinas, donec stadia decem quis cursu cōfecerit: deinde prædictū pharmacū linteo exceptū impone, neq; soluas per dies quinq;: sequenti uero sexta solue, & stigmata scalpēdo expoli, atq; ubi quod nigrū fuerit detraxeris, rursus pharmacū ipsum illinito cum pēna. Eruit enim in uiginti diebus citra magnā exulcerationē, non relicto etiam uestigio cicatricis. Idem efficiunt mordendo erodentia medicamina in uulnerū tractatu descripta.

De uariis faciei, qui tum Tonthi, tum Acna Græcis uocantur. Cap. xiii.

Solet circa faciei cuticulam tuberculum oboriri, paruum quidem, sed durum, quod uari nomine appellatur. Id sanē à crasso humore producit. Quare cura eius per ea quę duriciem emolliunt, & tumorem discutiunt, medicamina perficitur: quorum sylvam eiusmodi tibi parabis. Liliј radicem tritam cum mel-

le illinito, aut cyclamini radicem cum melle, aut narcissi radicem cum melle, aut cassiam cum myrrha & melle, aut plumbaginem cum aceto, aut pulegium tenuissimē tritum, ac cerato exceptum impone.

Aliud, Mellis & aceti acerrimi, cuiusque æquales partes simul permixtas illini, ac digito circumterere. Aliud. Sepiæ testæ ustæ sextantem, costi sextantem, myrobalani unciam unam, contere cum aqua & illini, arefactum uero rursus humecta. Aliud. Costum contunde, & cribratum in tenuissimum puluisculum redige, deinde cum felle caprino commixtum in cerati modum effinge, & cum eo uaros ad uesperam illini: mane uero à somno, lacte, qualecūq; adfuerit, faciem abluere iube. Aliud. Alumen scissile quā tenuissimē contere, & resina terebinthina exceptū impone. Quū autē diu perstiterint uari, his utendū erit, Saponis Gallici drach. iiii. ammoniaci thymiamatis drach. i. thuris drach. i. dissoluito in aqua, & ad cerati densitatē reducito, sicq; illinito, ac post horę spatium ablui cū calida præcipito.

Aliud. Rhois culinariј, hysopi, pulegiј, salis fossilis, seminis ocymi, cuiusque æquales partes, cerato rosaceo excipe, ac utere. Aliud, quod ad eminentiores faciei affectiones, itemq; pruritus efficax est, necnō ad principij elephantiasis. Gummi albi & nitri equas portiones, acri aceto dilue & illini. Vbi uero exaruerint, subscripta mixtura depurga. Saponis Gallici lib. i. ammoniaci, spumę nitri, thuris, mastiches, cuiusq; quadrantē, saponem, & ammoniacū in uase fictili cū aque choenice unā decoquito. Vbi uero dissoluta fuerint, sicca cōtrita ac angustissimo cribro excussa, inijcito: deinde transfer in pilā, probeq; cōtusum uitreo uase recōdito. Necessitate uero expetente faciem illinito, & post paruū interstitiū multa aqua abluito: prius leniter facie conficta. Hoc pharmacum semper ad uaros utere. Aliud ad uaros, celebre. Nitri rubri sextantē, cimolię unciam unā, thuris drach. iiii. farinę erui unciam unā. Vtere autē hoc modo: Accipe halcyoniū, ac per se optimē cōtere, deinde iniecto oleo simul tere, & ex eo faciem ad uesperā illini. Mane uero à somno præscripta compositione exterge. Aliud smegma, quo per omnē curā uarorū uti conuenit. Farinę fabarū, farinę sesami, medullę peponis sicce, cuiusque drach. iiii. contere, & cum his exterge. Aliud. Nitrum cū myrrha tritum aqua permixtum exhibe, eoq; extergatur.

De ficosi faciei tumoribus. Ex Galeno. Cap. xiiii. Est & hæc una aliqua ex mēti affectionibus, in hoc differens à uariis, quod non solum crassus existit humor à quo producit, sed serosa etiam tenuitate participat, ob quam & citius exulceratur, si quidem nō ut conuenit cures, & sicciorib. etiamnum indiget remedijs, quā ea sunt quę uariis adhibentur. Oribasius ad Eustathium. Ficos appellant germina ulcerosa, rotunda, subdura, rubicunda, quę consequitur etiam dolor. Nascuntur autem ut plurimum in capite, atque etiam reliquo corpore, de quibus Crito sic scripsit. Ad ficosas mēti eminentias, Critonis. Spumę argenti drach. iiii. thuris drach. ii. salis fossilis drach. ii. sandarachę drach. i. contrita simul impone. Aliud ualde præclarum. Elaterij drach. ii. salis fossilis tantundem, chalcanti drach. ii. sandarachę drachmam unam, misce: & cum specilli instrumēti, quod melā Græci appellant, extremo admora



imponere, præhumectato prius loco quo pharma- cum melius infideat: post impositionem uero cata- plasmate seminis lini aqua dissoluti superne conte- ge. Aliud, Archigenis, ad capitis & mentis ficos. Chal- canthi assati, aluminis scissilis, glutinis, cuiusque æqua- les partes, squamæ æris duplum: glutinum in aceto maceratum dilue, & cum eo reliqua trita commit- te. Vbi uero uti uelis, in aceto rursus dilue, ac ex eo ficosas eminentias inunge, & rasura tenuis linteoli contege. Inhæret autem pertinaciter, atque citra cicat- tricem ficos depurgat. Vt utem & hoc ipso phar- maco ad callos fistularum leniendos in collyria infor- mato. Quod si humidi sint tumores, nimirum aqua effluente ex eis, uelut à fonte, pura, subscriptis reme- diis utendum erit. Pastillus ad ficosas mentis eminentias. Reprimit autem omnes tumores qui accidunt illis, qui male cicatricem obdixerunt: quemadmodum uide- mus in his, quibus palpebræ aut labia sunt confuta: Squamæ æris sextantem, misyos assati sextantem, au- ripigmenti sextantem, diphrygis drachmas tres, chal- citidis ustæ drachmas quatuor, æris usti drachmas quatuor, glutinis fabrilis drachmas quatuor: cõpo- ne & utere ut dictum est in priore. Nam & ob eius usum, magnum nomen adeptus sum.

*Ad manantes menti papularum eruptiones, ex Cri- tone.*

Cap. xv.

Conferunt quidem & his plurima eorum quæ antea ad capitis ulcera manantia præscripta sunt. Proprie autem profunt hæc: Spumæ argenti, chalcanthi, ma- li corij, baccarum myrti, singulorum æquales partes cum uino & oleo myrteo tritas illinito. Aliud. Præclarum & hoc est: Verbenacæ supinæ drachmas octo, acaciæ drachmas octo, myrrhæ drachmas duas: cum uino tritis utere. Aliud. myrrhæ unciam unam, thuris sextantem, acaciæ trientem, utere cum ui- no. Aliud. Spumæ argenti, ladani, baccarum myr- ti nigrarum, seminis hyoscyami, mali corij, æquali- bus partibus cum uino & oleo myrteo aut rosaceo permixtis utere. Aliud, quod & ad ea quæ instar faui melle manant ulcera, melicerides Græcis appel- lata, cõducit: siue ea in mento, seu in capite existant: quæ à Syris appellatur Sanalia. Spumæ argenti & bacca- rum lauri, æquales partes cum aceto ac oleo myrteo illinito. Experimentum enim bonum de se præbuit sæpe.

*De impetiginosis tum menti, tum reliqui corporis tumoribus ex Galeno.*

Cap. xvi.

Præterea & hæc affectio ex mixto quopiam genera- tur humore, nimirum serosis & tenuibus acribusque humoribus unâ cum crassioribus permixtis: quæ propter etiam facile in pso- rā & lepram transit. Indi- get itaque hæc affectio pharmacis fortiter desiccanti- bus. Quod si uero in pso- rā aut leprā trāsierit, ad hoc quod desiccantia remedia adhibenda sunt, necesse erit & repurgantibus uti. Itaque Crito ista scripsit, ad eas quæ in mento prodeunt impetigines, lichenas appel- latus. Affectio, inquit, est insuauissima, & pruritus inferens, & circumtensionem, & periculum non mi- nus. Proserpit enim aliquando per uniuersam faciem, & oculos ipsos cõtingit. Quare diligentiori cura utendum erit, ubi ea quæ iam longo tempore perseuera- runt, ab his quæ recēs prodierunt discreuerimus. Ad recētes igitur impetigines cõueniunt hæc: Perdicij her- bæ folia cõtinenter in loco cõfrica, aut thus, aut am- moniacum cum aceto terito, aut etiā cum perdicij succo,

ac illinito. Aliud. Liquorem qui ex humidis ole- gnis dum cõburuntur effluit, illini. Idem facit quod ex brassicæ caule dum aduritur, destillat, illitum. Aliud. Maluæ agrestis semē depuratum collige, contere ac expressum inde succum repone, eumque assidue illine.

Aliud. Portulacæ succum cõtinenter illinito.

Aliud. Lacrymam syluestris oleæ cum aqua dilui- to, & adiecto modico styrace, unito ac imposito. Vbi uero iam diu durauerint impetigines, uiticis fo- lia cum aceto trita illini, aut hastulæ regiæ radicem in aceto decoctā & tritā adfrica. Aliud ad diuturnas impetigines. Chamæleonis nigri radicē in aceto decoque, cõtere, & illine. Verum quum ad diuturnas im- petigines multa & uaria excogitata sint remedia, particulatim de singulis dicā, initium sumēs à pastillis. Pastilli. Pastillus ad impetigines in quacumque corpo- ris parte cõsistat: Alcyonij usti drach. ii. sulphuris ui- ui, thuris, pyretri, spumæ nitri, cuiusque drach. ii. cha- mæleonis nigri radicis dra. iiii. hastulæ regiæ radi- cis dra. iiii. glutinis drachmas quatuor. Glutinum in aceto dilue, & cum eo reliqua excipe, desicca, & utere cum aceto. Pastillus ualde celebris. Foliorum fici siccorum dra. xii. chalcitidis crudæ dra. x. calcis uiuæ drach- mas octo, misyos crudi drachmas quatuor, thuris drachmas quatuor, sulphuris uiui drachmas octo, aceto subige, & cum aceto utere. Pastillus ad impe- tiginas. Qui & callos extirpat, & cicatrices supra opinionem: Thuris, testarum buccinorum ustorum, fimi columbini, alcyonij, gummi, singulorum æquales partes contere cum lacte, & informa pastil- los, ac utere cum aceto. Pastillus alius. Lacrymæ oleæ syluestris drachmas quatuor, thuris drachmas quatuor, sulphuris uiui, alcyonij, spumæ nitri, halicæ cõtusæ & cribro excussæ, cuiusque drachmas octo, halicam in acetum multum atque acerrimum cõiectā tam diu decoque, donec uiscosa reddatur: reliqua uero cum ea ipsa cõmissa in pastillos informa, ac cum aceto utere. Circūlitiones ad impetiginē. Ad impetigi- nes maxime feras: Nitri, chalcitidis assatæ, ammoni- aci thymiamatis, succi serapiadis tres testiculos habē- tis, æquales partes cõtunde, & cum aceto illini: efficac- est & ad humentes impetigines, atque ego sane usus sum, & ex animi sententia successit. Aliud. Sterco- ris dorcadis unciam unam, thuris unciam unam, cõtutis ute- re cum aceto, ita ut cum nitri spuma impetiginē prius cõfrices, & miraberis. Aliud, quod & ad impeti- gines & uiriliginas ac lepras ualde cõmodum existit. Stercoris muris, chalcanthi, sulphuris uiui, cuiusque bessæ, farinæ fabarum uncias xiiii. aceti sextarios quatuor. Muscerdam cõtunde, & cum aceto deco- que: atque ubi bis aut ter efferbuerit, sulphur inspe- ge & chalcanthum, animaduersione habita, ne effer- ueant & effundantur: deinde ubi parum saltem con- cocta fuerint, etiam farinam fabacæ inijce, & simul ad strigmenti crassitiē decocta redige, & ablatiis ac reconditis utere. Ad lepras quidē linteolo exceptum impone, ac post quintum tandē diem abstrahere. Ad impetigines uero aceto dissolutum cõtinenter in- unge. Illitio cocta, ad diuturnas impetigines, quæ citra exulcerationem eas summouet. Halicæ mo- la tritæ ac cribro quam arctissimo excussæ uncias quatuordecim, chalcitidis, cimoliæ, sulphuris uiui, misyos, cuiusque sextantem, spumæ nitri, aluminis scissilis, alcyonij, radicis hastulæ regiæ, thu- ris



ris, lacrymæ oleæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, cuiusque uncia unā, acetī choenicas tres. Alcyonium, hastulam regiam cum aceto decoquito: atque ubi ad medicatam redactū fuerit, percolato. In colamento uero ammoniacum, thus, & reliqua sicca dissoluit: halicam uero in aceto quod superest decoquito: deinde reliquis adijcito, ac simul commisisit. Aliud ualde præclarum. Acetī acerrimi sextarios octo, farinæ hordeaceæ uncias uiginti quatuor, mannæ thuris uncias quatuordecim, radicis ruminicis syluestris drachmas octo, radicis albucī drach. viii. ueratri albi drach. x. alcyonij dra. x. cardamomi drachmam unā, terræ cimoliæ drachmas octodecim, glutinis drachmas xvi. spumæ nitri drachmas xvi. uirgultorū halicacabi uiridium fasciculū quantum manu comprehendere potes, appara & utere ut dictum est. Quod si hæc affectio diutius producat, extendaturq; & in callos transeat, nihilominus his quæ dicta iam sunt utendum est: maxime uero congruum est quod sequitur. Misys, myrrhæ, thuris, aluminis scissilis, cuiusque drachmas octo, aloës, sulphuris uiui, cuiusque drachmas quatuor: hæc cū passo ad strigmentī crassitudinem redige, & his ac ter in die loco prius confrieto, illine: foris autem conseruandi pharmaci gratia pelliculam uesicæ, aut ex ouo suprapone. Oribasi lichenicum pharmacum, facit idem etiam ad pruritus. Chalcanti, sulphuris uiui, nitri, thuris, æqualibus portionibus utere: ad impetigines quidem, cum aceto: ad pruritus uero, cum uino. Aliud, quod impetigines in paucis arceat diebus, ualde commodum, quare præexigendam suadeo mercedem. Sulphuris drachmas octo, calcis drachmas octo, chalcitidis crudæ drachmas octo, thuris drachmas quatuor, misys drachmas quatuor, foliorum capparis uiridium depuratorū drachmas duodecim, cum aceto tere, ac in forma pastillos, & utere. Emplastrum liquidum, multi ad impetigines experimenti, cuius rei nuper adeo periculum feci. Picis siccæ, ceræ, resinæ colophonæ, ueratri triti, olei, æquales partes. Per experientiam cōmēdatum hoc tibi habere, propterea & mercedē præexige. Quādoquidem uero plurimi sunt, qui illitio-num usum auersantur, malūtq; adhibere emplastra, utpote quæ neque per sudores obortos defluant, neque arefacta etiam cutem circumtendant, annectam & horum aliquot apparatus. Emplastrum ad impetigines, quod citra exulcerationem eas submouet. Ceræ, picis liquidæ, thuris, resinæ terebinthinæ, sulphuris uiui, cuiusque sexuncem. Quæ liquefieri possunt, liquefacito, siccaq; cū eis committito. Aliud quod similiter citra exulcerationē opitulatur. Picis liquidæ libram unam, mannæ, sulphuris uiui, farinæ lupinorum, cuiusque unciam unam, galbani sextantem, Picem calefacito, & galbanum præmolitum adijcito: liquefactis uero, ac ab igne ablatis reliqua inspergito ac unito. Vtere autem hoc ut uehementer commodo. Aliud, quod citra exulcerationem auxiliatur. Chrysocollæ siccæ qua aurifabri utuntur, chalcitidis assatæ, misys assati, squamæ æris, diphrygis, salis ammoniaci, terræ cimoliæ, cuiusque drachmas quatuor, æruginis drachmas duodecim, chalcanti drachmas vi. lapidis asij, æris usti, utriusque drachmas sex, foreos drachmas quinque, aluminis liquidi drachmas quatuor, contunde o-

mnia diligenter, & adiecto aceto sedulo in sole subferuentis caniculæ æstu contere, donec ipsum pharmacum æruginem contrahat. Apparetur autem in alio quopiam mortario, thuris sextās, myrrhæ sextans, aloës uncia una, ladani uncia una, opoponacis uncia una: hæc in aceto diluta & ad strigmentitiam crassitiem redacta, illis quæ antea in æruginem commutata sunt inijce, ac rursus contere, atque his omnibus aristolochiæ contusæ & cribratæ unciam unam adijce, & rursus tere. Quum uero omnia in formam emplastri redacta fuerint, liquefabilia liquefacito, ac affundito. Sunt autem liquefabilia hæc, ceræ drachmas centum, terebinthinæ drachmas cc. galbani drachmas nouem, olei libram unam, emollita in usum adseruato simul omnia. Hoc ipsum pharmacum duplici aspectu se uidentibus offert. Aliud, quod similiter ad dictas impetigines efficacē est, ut etiā ea quæ intus relinquuntur reprimere possit. Picis, bituminis, resinæ pinus, ceræ, sulphuris uiui, mannæ, æquas portiones, olei cyprini quantum sat fuerit: Liquefabilia liquefacito, & inspergito sicca: in tenui autem pellicula excepta imposito. Emplastrū aliud ad impetigines. Picis siccæ quadrantē, picis liquidæ unciam unam, salis unciam unam, resinæ colophonæ, ceræ, sulphuris uiui, cuiusque unciam unam, nitri fului unciam unam, chalcitidis unciam unam, olei sextantem: utere. Excoriatoria impetiginum. Verum ubi iam affectio stabilis facta fuerit, & pharmacorum adhibitioni & molimini resistit, ut edū erit excoriatoris. Ea enim ex facili superficiem auellunt. Excoriatorium impetiginū, quo Pamphilus usus est Romæ: & plurimum sanè profecit, quum in urbe mentagra grassaretur, quæ impetigo uera existit. Squamæ æris drachmas octo, auripigmenti drachmas quatuor, sandarachæ drachmas quatuor, æris usti, ueratri albi, cantharidum, reiectis alis & pedibus, singulorum drachmam unam & dimidiam: unumquodque per se contere: deinde simul contusa cedria excipe, ac in densitatem strigmentitiæ redacta, in pyxidem æris Cyprini reponere. Vbi uero necessitas exigat, nitro ac modico aceto impetigine confrieta, pharmacum hoc cum specillo lato, spatho melam Græci uocant, illine: atque ubi iam adfricueris, modicumque temporis spatium intercesserit, cū specillo derade, ac rursus aliud illine: bisq; ac ter eodem repetito, locos illitos cum pellicula uesicæ bouillæ, aut alterius cuiusdam animantis contege: post pelliculæ uero impositionem fasciola leuiter colligato, ac finito pernoctescere, si quidem tam diu sustineat: si uero non, ad horas aliquot, donec bullas exuscitet sanie crassa & glutinosa repletas: quibus productis lauari iubebimus, atque remorari aliquādiu in balineo: etenim hoc ipsum curā adiuuare solet. Sit autē calidius ipsum balineū. Quod si prohibeat quid balineo uti, fomenti utendum est calida aqua multa: quæ ubi iā ad molestiā usque affusa fuerit, extergere cōuenit, ac panē cū aqua multa subactū imponere. At ubi sordibus ulcera scatuerint, emplastrū uiride spleniolo exceptū adhibeto, modico itidē de excoriatorio præscripto admixto. Exclusa autē sanie, & nullo amplius tectorio ulceri incumbente, exemplastro albo linteolum paruum illitum imponimus: eoq; utimur donec omnino ad cicatricem perducatur, quotidie fomento adhibito, ac no-



ac nouo spleniolo ex emplastro albo illito. Porro ante admotionē excoriatoriorum, uicinas impetiginis partes munire oportet pharmaco quopiam ex his quæ ab inflammatione locos tuentur, atque ita excoriatorium ad impetiginem solam adhibere. Excoriatorium ad mentagras, ut citra cicatricis uestigium ad sanitatem perducantur. Efficax est & ad alopecias ad solem uel ad ignem illitum. Vbi uero bulla producta fuerit, eā acu penetrare oportet, excluso autem humore, ceratis curare: cicatrice enim indurata, enascuntur pili. Atque ita quidem ad alopecias adhibetur. Ad impetigines uero utendum est eo modo qui prædictus est in excoriatorio primo. Pharmacum uero ipsum huiusmodi est: Sandarachæ, auripigmenti, squamæ æris, ueratri nigri, cuiusque drachmas duas, elaterij drachmas quatuor, uentriū cātharidum drachmam unam, excipe cedria, usus autē iam antē ostensus est. Emplastra uiridia post excoriatoria adhibenda. Post ipsum excoriatoriorum usum, subiecta uiridia emplastra adhibenda sunt: nimirum ad ulcerum ipsorum repurgationem. Viride emplastrū, quo Pamphilus usus est ad mentagram, post eruptionem scilicet bullarum, Cerae libram unam, resinæ pinus siccae libras duas, æruginis quadrantē, olei ueteris besselæ, aceti acerri mi quantum suffecerit. Aeruginem ad solem cū aceto conterito, liquefabilia liquefacito, & frigefacta, ac in mortarium coniecta simul unito. Aliud. Aeruginis drachmas II, mannæ drachmas IIII, galbani drachmas III, adipis uitulini drachm. XII, ceræ drachmas octo, resinæ pinus drachmas octo, aceti quantum satis uidebitur, committe. Aliud, quod euchron, hoc est, boni coloris, appellatur. Aeris uisti quadrantem, aluminis rotundi, æruginis, salis ammoniaci, mannæ cuiusque sextantem, ceræ libras duas, resinæ pinus siccae libras duas, olei dextantem, aceti quantum ad sicca conterenda suffecerit. Emplastra alba ad cicatricem perducentia. Verum ubi iam per præscripta emplastra uiridia, ulcera ipsa repurgata uideris, utendum erit emplastris albis, quo absque cicatricis uestigio ad sanitatem perducantur, quare nequitiam hæc reliquenda censeo, ut quæ ea multa ad tactum lenitate committunt. Emplastrum album, quod aquosum appellatur. Hoc emplastro Magnus medicus usus est, post impetiginum excoriationem. Cerussæ, spumæ argenti, ceræ thyrrenicæ, aquæ puræ, singulorum libram unā, olei omphacini libras duas. Spumam argenti, cerussam, & aquam simul contere, atque ubi tenuissima facta fuerint, oleum guttatim instillatum simul contere, donec sufficienter fuerint cōnita: deinde in fictili uase ad ignem adhibe, ac continenter agita: quum uero aqua cōsumpta fuerit, inijce ceram: Atque hoc modo in mortarium infusa emollito, ac utere. Aliud. Cerussæ libras duas, misyos crudi sextantem, terebinthinæ unciam unam, ceræ sexuncem, olei libras tres, aquæ chœnicas duas, compone ut prædictum est, ac utere. Licebit etiā uti ceratis sedis, & quæ ad ambustos descripta sunt tenerioribus.

*Ad molestum oris odorem.*

*Cap. XVII.*

Ad grauem oris odorem, qui citra exulcerationē accidit: Irin in uino ueteri odorato maceratā, ad colluendum continuē exhibe, atque etiā in ore retinendam aliquandiu: aut myrrham in uino meraco

dilutam colluendam præbe: aut acre acetum colluat quotidie, uespere dormitum iturus: mane uero spicæ nardi decoctum ore colluat, aut ipsam sub dentibus conterat: aut potamogetonis folia quotidie dentibus contrita expuat: aut rosarum floribus continuē confricato: aut fici syluestris radicem urito, & cinerem eius cum melle illinito: aut parum cyperi, aut floris iunci odorati contundito, & gingiuas continuē confricato: aut cimoliam cum sale terito & affricato. Aut hordeum cum sale, melle subactum & lintheolo illigatum urito, & contritis utere: aut similaginem melle subactam ac exustam adhibe. Aliud. Salis albi, pumicis, origani, cuiusque unciam unam, iridis sextantem, floris iunci odorati sextantem: his simul contritis dentes fricato & uniuersum corpus. Bonum enim odorem facit, & dentes dealbat.

Aliud, ad foetorem oris. Chalcitidis crudæ drachmas XII, ueratri albi drachmas octo, trita illine.

Aliud. Chalcitidis drachmas XII, cadmiæ drachmas octo, in aceto tere, & per aliquot dies ad solem æstiuum expone, deficcatoque utere. Vtile est & ad sanguinolentias gingiuas, itemque putrescentes. Bibant autem & ipsi ea quæ præscripta sunt illis, a quibus per totum corpus teter odor transpirat, in hoc ipso Sermone, capite octauo. Aliud, ad crassitiē labiorū. Prominet in plerisque superius labrum, aliquando etiam inferius, ex defluxu uehementi a capite delato, ut præ densitate labrum intumescat, & ad sermonis prolationē præpediatur: ultra hoc, quod alias indecentia quadā faciem dehonestet. Quare curabis hos aut incisa uena, aut purgatos per consuetas excretiones. Post hæc aut adhibebis illitiones ac pophlegmatismos, quibus defluxus pituitæ a capite tollitur ac sedatur. Deinde illitionibus ad os descriptis illines palatum: quibus præmissis, porri succū cum oleo uetustissimo ad interna labiorū illini, aut foliorum brasicæ succum unā cum oleo ad affectum labrum continue admoue: aut glauciū cū uino, aut cimoliā, aut Musæ pastillum, aut pastillū ex halicacabis cū uino.

*Ad labiorum fissuras.*

*Cap. XVIII.*

Oui internam pelliculam fissuris labiorū adglutina, aut quod pelliculæ similitudine, circa palmarum ossicula adheret, aut araneorū a trabibus dependentium texturam maxime albā. Eas uero quæ in altum magis se extendunt fissuras, cum adipe anserino, aut caprino curabis, aut cū medulla bouilla, aut ceruina, ita ut cū semper uiuo atque terebinthina unita, illinas. Aut gallā omphacinen trita, terebinthina aut œsypo liquido, aut melle excipe, & impone.

Aliud. Gallā & mastichen quā tenuissime trita, œsypo, id est, lanæ succidæ sordibus, in formā cerati redactis, excipe, ac utere. Aliud. Gallarum unciam unā, cadmiæ unciam unam, cerussæ quadrantem, cōtere cum rosaceo, & illine. Aliud. Cyperi sextantem, gallarum unciam unam, aluminis scissilis drachmā unam, contere, ac siccū insperge. Aliud. Mastichen cum uino trita & dilutam illine. Aliud. Fecem aceti ustam, myrteo aut rosaceo cerato exceptam, impone. Idem etiā ad magnas in extremis ac summis corporis partibus inflammationes conducit. Aliud. Testarū ouorum ustarum, gallæ, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum æquales partes lanæ succidæ sordibus exceptas impone. Ad omnia labiorū ulcera, & ad ea quoque quæ cacoethe appellat.

*Ostrea*



Ostrea usta tenuissimè trita insperge. Ego autè & non usta contriui, eisq; usus sum, neq; male cessit.

Aliud, ad fissuras labiorum. Muscè pastillum cum sapa aut uino dilutū, satis crassum illinito. Optime prodest & id quod ex amurca, ad ulcera oris quæ aphthas appellant, apparatus. Idèq; similia remedia efficiūt, quæ ad fissuras sunt descripta, atq; etiā pastillus ex halicababīs cū uino. Ad tubercula in labris.

Utèdū est & ad hæc præscriptis ceratorū formis, atq; etiam hoc ipso quod subiecti: Radicis rumicis ustæ, nitrī usti, terebinthinæ ustæ, singulorū æquas portiones, cōtritas cerato excipe, & illine. Aliud. Adipem anserinum, melle ac solani succo mixto adhibe. Confriētis autem prius ulceribus, cum penna sæpe illini. Repurgat enim tubercula in internis labris oborta. Colluat autem ea & ante illinitionē & post eam, cum lacte.

De dentium affectionibus.

Cap. XIX.

Pars quædam ex tertia coniugatione neruorum à cerebro utrinque delatorum, distribuitur quidem in pelliculam quæ ipsum os, & linguam, ac gingiuas complectitur ac ambit, sensum eis suppedians. Ingenerat autem seipsam tum superiori, tū inferiori maxillæ inuoluens, ac omnibus dentibus ad eorū radices substrata, ut ob hanc causam inter ossa soli dētes dolore afficiantur. Illi ipsi sanè nerui delatum ad se nutrimentū suscipientes: quod in ipso liquidius existit, sibi lucrifaciunt: quod autem siccius quàm cōueniat existit, tanquam alienum à se abijciunt. Ea ipsa uero à neruis redundans superfluitas in concauitatibus locellorū, in quibus ipsi dētes sunt infixi, aggregatur, paulatimq; tenacior ac densior seipsa facta, ob diuturnam isthæ conuersationem, in ossium formā transmutatur. Atque hoc modo nutrimentū dentibus accedit. Itaque dētes hac nutritione suscepti, usq; in senectutem augescunt. Vnde sanè in senibus ob defectum connutrientis materiæ attenuantur dētes, mobilesq; fiunt, ac excidunt. Cæterum quantū augescunt ipsi dentes, tantum ex attritione ciborum cōsumuntur. Impossibile est autem citra nutritionem augeri. In uniuersum itaque duabus affectionibus dentes sunt obnoxii, & his quidem cōtrariis: Indigentia uidelicet, & abundantia eius quod defertur ad eos alimentum. Indigentia ergo sicciores & alimentum non sentientes, atque ob id tenuiores eos efficit. Abundantia uero consimilem in eis dispositionem facit, ei quæ contingit in carnosissimis partibus inflammationi. Huius igitur adfectionis cura iuxta eundē scopum fiet, quem propositum habent hi, qui inflammationibus medētur. Nimirum ut abundantia partim discutiendo, partim repellendo euacuetur. Eius uero quæ indigentia alimentum contingit, tenuitatis dentiū nullum remedium existit. Necessarium est enim laxari ac commoueri dentes, ubi compages eorū flaccidiores reddantur, quum nō solum ipsi dentes, sed & loculi eos continentes graciles fiant. Hæc igitur adfectio necessario accidit senibus, quibusdā citius, alijs serius. Auxilio autè eis erunt pharmaca adstringentia, quæ gingiuas confirmant, & ad arctius complectendum dentes adiuuent. Qui uero facile exterruntur dentes, eos, si quidem id ex mollicie eorū cōtingat, duriores reddere conuenit, & affectionibus minus obnoxios, per austeram uidelicet & acerbam adhibita remedia.

Ad inflammatas gingiuas.

Cap. XX.

Gingiuas autem ob inflammationem dolore affectis, optimum remedium existit oleum lentiscinum con duplicato uasculo calefactum, ac in ore retentum: Sit autem recens oleum. Nocium enim existit inueteratum. Repellit autem oleum lentiscinum citra asperitatem, & discutit absq; mordacitate quibus maxime indigent inflammata. Atqui asininū lac in ore retentum, ubi maxime infestauerint dolores, eos mitigat, ac ex tempore sedat. Et hoc quod ex uino ad tertiam usque mensuræ partē decocto, apparatus, quod sapat dicimus itemq; hepsēma, & palmarum stillamentum similiter ore retentum calidum uehemēter lenit. Oportet autem aquam calidam ad palmarum stillamentum adfundere, quo crassities eius diluatur. Valet etiā semperuiū minoris decoctū per se, aut cum rosaceo melle: aut cum sapa, aut palmarū stillamēto in ore retentum. Conuenit etiam inflammationis gingiuas hyoscyami succus, aut decoctum per se calidum, aut cum sapa ore retentum. Supra opinionem autem lenit succus portulacæ. Insensibilissimū uero inflammationis gingiuas est acetum, omniaq; acerbata, & acris, & salsa.

Ad cruentas gingiuas.

Cap. XXI.

Cruentis uero ob bilis acredinem gingiuas, præter opinionem utilis est foliorum hyoscyami succus, aut decoctum cum sapa, aut cum palmarum stillamento calidum ore retentum. Folijs autem ad manum non existentibus radicem eius decoque cum passo, & retinendum exhibe decoctum. Vtile est & alumen scissile cum myrto, si quàm tenuissimè trita adhibeantur. Vbi uero adstrictas iam cognoueris gingiuas, colluendā sapat calidam exhibeto. Aliud. Asclepiadæ, ad cruentas gingiuas. Balaustiorum, florum rosarum, ramorum myrti, singulorū æquales partes, cum posca dilutione decoquito, & liquore inde percolato, ac cum in ore retinendum exhibeto. Aliud. Ramorum lentisci, balaustiorū, radicis mali cotoneæ, singulorū æquale pōdus in posca decoctū exhibeto. Epithema ad sanguinē ex gingiuas erumpentem. Polentę partem unam, uinaceorum uua tantundē, succi sanguinariæ quantū satis est, cōtere, & ad cerati crassitiem redacta, impone ad sanguinolentū locū, aut simul cū succo tādū tere donec arefiāt, atq; hoc modo trita insperge. Aliud. Spongiā nouā siccā in sanguine taurino madefactā in uasē fictili exure, contere ac reponere. Vbi uero uti uelis, cineris ipsius drachmas quatuor accipe, thuris drachmas duas, chalcididis crudæ drachmas duas, & simul trita insperge. Aliud. Terebinthinæ acetum torrefactæ drach. IIII, æris drach. II, tritis utere. Calidas uero in ore inflammationes & gingiuas corrosas, in quibus salsæ cuiusdam aut mordacis humiditatis sensus percipitur, maxnōpere iuuant dulcium aquarum balnea, quæ superfluitatem quidem per sudores euacuant, sanguinis uero acredinem obtundūt. Quare si nihil prohibuerit, bis ac ter lauans, nō lædes. Illinendum est autem caput oleo rosaceo cum aceto.

Ad excrecentes gingiuas, putrescentesq; ac tumefactas.

Cap. XXII.

Ad gingiuarum tumores, easdemq; excrecentes & putrescentes, conueniunt tum colluta, tum ore retenta, oleū ex immaturis oliuis expressum, oliuarū cōlymbadum muria, cedria cū aceto, gallarū decoctū,

u pruni



pruni folia ex aceto decocta, cytinorum decoctum, corticis mori aut etiā foliorū eius decoctū. Arida uero & trita, gingiuis admoueri cōmodē possunt hęc: radix aristolochiæ, plantaginis semē tritū, bitumē tritū, foeniculi radix usta, pulegiū ustū, diphryges, rubigo ferri, chalcanthum assatū, gallæ, cytini, malicoriū, balauſtia. Optime autē prodest gingiuis à fluore affectis: aceti & mellis, cuiusq; librā i. aluminis sextantē. Decoque ad consumptionē aceti, & utere.

Aliud. Aluminis scissilis, myrrhæ & thuris, æquales partes cū melle illine, ac postea uino collue. Medetur autē ex his gingiuis & humore pregnantibus, lac asininū calidū collutū: foliorū oliuæ decoctū, aspalathi decoctū, Platani folia in aceto aut uino decocta. Sicca autē adhiberi possunt, rubigo ferri, balauſtia, & cytini. Aliud siccū: Quod ad putredines oris gingiuasq; depastas ac cruentatas efficax est: ad tōsillas etiā, ac glādulas & columnellā siccū admouetur: ad quassatos uero dentes, aceto dilutū detinetur in ore. Gallarū quæ omphacitides appellātur, aluminis scissilis, æquales partes accipe, ac ut ualde efficaci utere. Siccū floridū, quod Græci antherō appellāt. Cyperi dra. viii. crocomagmatis, myrrhæ, aluminis scissilis, iridis, cuiusq; dra. ii. croci dra. i. sandarachę dra. iii. permixtis utere. Alius siccus puluis, floridus Oribasij. Cyperi, croci, utriusq; dra. ii. aluminis scissi, sandarachę, iridis, gallæ, cytinorū, singulorū dra. iii. floris rosarum, dra. vi. misce ac utere. Ad putredines in ore. Foliorū oleę ustorū, radicis latucae, malicoriū, singulorū dra. i. costi parū, utere.

Ad corrosas & ab ulcere serpente infestatas gingiuas.

Cap. xxiii.

His qui corrosas gingiuas habent cū tumore atq; etiā dolore, atque etiā quibus à serpente ulcere depascuntur, summe auxiliatur fomentum hoc. Specillo auriculario lanam innecte, ac in feruēs oleum intinge, eamq; donec exæquentur gingiuis adhibe, & quousq; undiquaq; appareant albæ. Ita enim ulcus serpens sistitur, atq; ex sana carne id quod corrosum est connutritur. Post hæc autem utere adfrictorijs ad gingiuas descriptis. Proprie autem cōuenit galla tenuissimē trita, acerabuli mensura, cum myrrhæ magnitudine fabæ, quibus tritis utere siccis. Præter opinionem autē ad corrosas, & quæ serpente ulcere infestantur gingiuas prodest id quod ex chalcitide & cadmia constat siccū. Sint autem chalcitidis crudæ drachmæ duæ, cadmiæ uncia una. Cadmia in aceto ad solē estiuū aliquot diebus sufficienter conteratur: deinde adijciatur quoq; chalcitis, & similiter cū ea cōteratur, adfuso sæpe aceto: post uero ambobus exiccatis, tritis & cribratis: utere siccis, sed cum cautione, ne quid ex pharmaco hoc deglutiatur. Præclare facit etiā in serpente gingiuarū ulcere, id quod Helio caës, hoc est, sole ustum appellatur siccum, constans ex calcis partibus duabus, auripigmenti una & dimidia. Verū cōterere oportet & hoc ipsum in aqua, sub exoriētis caniculæ ardoribus, ita ut ter aqua diffundatur, & postea pharmacū desiccetur. Cauēdum etiā, ne ex hoc quicquam deglutiatur. Admirandā etiā opem corrosis gingiuis affert, id quod ex chara usta constat siccum, siue per se solum, siue cū melle adhibeatur. Aliud, ad ulcera serpentina gingiuarum. Aluminis scissilis, florum rosarum, cuiusq; drach. ii. salis fossilis drach. iii. croci drach. i. utere

siccū, aut cum melle cocto. Floridum ad gingiuarū abscessus, ac ulcera oris profunda ac crustosa. Aluminis scissilis, cyperi, cuiusq; drachm. iiii. myrrhæ drach. viii. sandarachę drach. iiii. iridis drach. iiii. croci drach. unam. Aliud: Cyperi drach. iiii. sandarachę dra. iiii. myrrhæ, croci, aluminis scissilis, iridis, cuiusq; dra. ii. utere siccū, & cū melle. Denudatas autē gingiuas carne implet pharmacū hoc. Seminis rosarū nō antiqui partes duas, calami odorati Indici partem unā, siccū tritū adhibe. Aliud. Florum rosarū dra. iiii. calami dra. iiii. malicoriū drach. ii. aluminis scissi drach. i. Optime autē carnem gignit & hoc quod ex eruo constat, siccum capitale. Relatum est autem in his quæ uulneribus adhibentur remedijs.

Ad parulidas, hoc est, gingiuarum inflammationes.

Cap. xxiiii.

Parulis est inflammatio partis alicuius gingiuarum cum tumore, quæ ubi non dissoluitur, suppuratur. Quare in principio adiuuare oportet quo submitatur, per dissoluētes uidelicet collutiones, quales sunt succus ptisanæ, decoctum seminis lini, aqua mulsa calida, aut mulsum. Deinde siccis deprimēda est eminentia carnis. Conuenit autem eis hoc: Sulphuris uul, piperis, aluminis scissilis, partes æquales. Deprimit autem parulidas alumen omne ustum, aut etiam sorī, si trita adhibeatur. Quod si suppuretur, ferro uenæ incisio distractam & excisam linamento imposito disparato, aut cum linetoli rasura. Amat autē magis excisionem gingiuarū abscessus. Simpliciter enim incisi, in fistulam proficiunt. Post excisionem medicandum est ipsum hulus per collutiones: & cauum quidem eius, eo quod ex eruo constat siccū capitālī impleto: ubi uero ad æqualitatem perueneris, eo quod floridum appellatur utitor.

De epulide, id est, excrecente gingiuarum carne.

Cap. xxv.

Epulis est excrementia carnis ab inflammatione conſequota, iuxta interiorem dentem molarem, aliquando cum febre & uehementi dolore internarum mandibularum, ut neque os ægro aperire liceat, contingens. Primum itaque inflammationē soluere oportet per collutiones eam submittentes, qualis est aqua mulsa, succus ptisanæ, decoctum seminis lini. Proderit autem & totam maxillam cataplasmate ex semine lini & aqua mulsa integere. Vbi uero inflammatio soluta fuerit, & hiare iam poterit infirmus, medicari oportet epulidem siccū deprimente: maxime eo quod iam in parulide dictū est, atque etiā eo quod ad serpentina gingiuarū ulcera descriptum est, ex chalcitide & cadmia. Imponenda est etiā rasura linetolorū. Vbi autē serius caro cōsumeretur, siccū quod carnē excedit apponatur: uelut est ærugo per se, aut cum æqualis ponderis galla, aut siccum quod appellatur flauum: deinde rursus rasuram linetoli impone. Qd si adhuc morā traxerit epulis, forcipe arrepta, excindatur cum tenui scalpello, aut si manus ensiculo paruo. Sequentibus uero diebus curetur hulus per collutionē aquæ mulsæ, & per capitale siccū, rasura linetoli adimposita. Postremū florido siccū tota cura cōpleatur. Deprimit autē epulidas, galla per se, chalcitis cruda & usta, sorī ustum, alumen omne ustum, balauſtia, squama æris in aceto ad solem aliquot diebus exposita, contrita, & rursus exiccata.

Probe



Probe facit & hoc; aluminis scissilis drachmas II. gallarum drachmas quatuor, salis torrefacti drachmam unam. Vtere sicco.

*De gingivarum fistulis.*

Cap. XXVI.

Gingivarum fistulas dissecare ac explanare conuenit, atque post incisionem curare huiusmodi eo modo quē paulo antē diximus. Vbi uero usque ad radices propinqui dentis fistula ipsa extenderetur, conandū est, ut quātum possibile sit, per fistularia collyria explanetur, & per siccum, quod flauum appellatur, melle exceptum curetur, & consimili modo id quod constat ex eruo postea adhibeatur. Quod si confusio & perturbatio aegri non comitetur aut potius libenter hoc ferat, priuabis eum dente affecto. Hocq; modo eruetur & fistula, & confidet gingiua: atq; omnino facilis erit, ea quae deinceps requiritur, cura.

*Cura dentium à calido morbo doloroso affectorum,*

*ex Adamanto sophista.*

Cap. XXVII.

Gingiuis dolore affectis propter inflammationem aut corrosionem, conuenientia ad hanc rem remedia locis affectis nudis adhibenda sunt, quae sanè aut omnis mordacitatis expertia sint, aut mediocriter acerba, & terrei temperamentis. Vbi uero dentes solū patiuntur, aut cum eis simul cōcreti nerui & pellculae: tum ipsis curatiuis pharmacis, ea quae tenuium partium in sua substantia existunt adiungimus, quo uis ipsorum in profundū perferatur. Et si quidem frigidus sit morbus, calida tenuium partium adnectimus. Si uero calidus, ea quae refrigerare possunt, & simul tenuium partium existunt, commiscemus. Calida itaq; existente affectione, & uigente aetate, & temperamento calido, & regione & aëris statu cōsimili, ad collutionem oris preparabimus, in aceto albo decoctam radicem halicacabi, semperuiū minus, portulacam, perdicium, & glycyrrhizam. Quod si intolerabilis existat caloris sensus, ut edū est hyoscyami folijs, aut semine papaueris hortensis, & semine lactucae, decoctis in aceto albo. Si uero unā cum dentibus gingiuae ipsae doluerint & inflāmatae fuerint, acetū ut acutū & hostilē gladium deuita: suo enim acore gingiuas corrodit: maxime itaque cōsolatorium eis existit, lac asininū. Ego autem aliquando cuidam huiusmodi temperamenti existenti, & in hanc affectionem delapso, oleum rosaceū & myrteum in ore detinendum exhibui, & sanè urī sibi uidebatur hic homo, tanquā à face accenderetur. Niuē itaq; cū melle rosaceo miscui, & moderatē tepesci, quo frigoris uehementia frangeretur, & ore detinendū exhibui, & à dolore liberaui. Maximū etiam auxiliū affert, ea quae ex papaueris capitibus apparatus antidotus soporifera, si tepida ore retineatur. Similiter & lac asininū assidue collutum: & sapa quoq; ore retenta. Optimum etiā remediū eis existit, pastillus qui ex seminibus cōstat soporifer, & consimiles, sapa subacti, & affecto loco obducti. Oportet autem & caput madefacere ex rosaceo cum modico aceto diluto: idemq; auribus instillare cū aceto. Aut terrenos uermes oleo decoctos in propinquā aurē instilla. Aut millepedes sub aquario uase stabulantes, quae & aselli à Græcis appellantur, eodē modo. Similiter & araneos, & blattę interanea oleo decocta in aurē infunde. Nutriatur autē ex ptisana, halica, ouis, lactucis, & cucurbita, & quęcūque tandē his potestate sunt propinqua. A uino autē absteineat. Ad cōmanducandū

uero exhibe sub dolentem maxime dentem, herbae perdicij radicē, aut hyoscyamum: praesertim in balneo, ita ut contineat in ore succum ex eo donec inde egrediatur. Suffire etiā conuenit egro hyoscyami semē, aut canis mortui dētem. Inde enim statim dolor sedatur. Eodem modo etiā terrenos uermes suffito.

*Cura eorum quibus ex frigidityte dentes do-*

*lore afficiuntur.*

Cap. XXVIII.

Frigidus dentium morbus cognoscitur ex figura tum capitis, tum reliqui corporis, & ex ea quae praecessit diæta, itemq; exercitio, ac reliquis quae ad hunc ordinem referuntur. Medeberis autem diæta omni ad caliditatem ordinata. Sint itaq; cibi, ptisana cum pulgilio decocta aut cū ruta, aut cui post cocturā additum est piper. Similiter & halica, olera, petroselinū, & similia. In potu exhibendum est uinum, modicū tamen, & mulsum, atq; etiam quod appellant Conditum. Sero uero ubi dormire uoluerit, confectionē ex calamintha cito penetrantem, aut poru, aut linctū deuorandam exhibe. Ad oris collutionem, in aceto decoquito origanum, calamintham, hyssopum, pulegium, dictamnium, satireia, tithymalli radicem, chamaeleonis nigri radicem, uerbenacę rectae radicem, eryngij radicem, uerbasci radicem, ueratri nigri & capparis radicem. Vnumquodque enim eorum aceto decoctum ac ore collutum dolores dentium sedat, qui à frigidityte sunt oborti. Ad eos uero quorum sensus citius afficitur, hæc cum posca decoquatur. Porro ex uino si decoquas praedicta ac colluaster aut quater in mense, premuniunt ac conseruant eos qui frigidiore temperatura sunt, ne dolore dentium adficiantur. Obseruatum est & pinguium lignorum, ueluti cedarū ac picearum, decoctū ipsis prodesse: cōrunduntur autem hæc ac cū caricis decoquuntur adufo uino: collutum enim hoc ipsum dentium dolores mitigat. At uero & ipsas tedas contusas in oleo decoquere licebit, oleumq; calidum in ore continere. Quinetiam ipsas tedas conuassatas solas ore detinere commodū existit, circa affectum maxime dentē. Succus etiā balsami in ore retentus, non paruā de se praebet cōmoditatem. Itemq; castoreū cum nardo auribus infusum. Quod si omnes ex æquo doleant dentes, in ingressu balnei cedriā in os coniectā usquequo egrediatur contineat, & dolore liber erit. Commodum etiā erit manducandas & loco dolenti ad mouendas exhibere, radicem pyretri, radicem tithymalli, & ricini. Similiter autem & theriacen, aut Esdrae antidotum, sapa dilutum ore detinendū exhibe. Praclare facit & Philonis antidotus illita, & quae appellatur Sotira. Suffito autē canis mortui dentē, ita ut fumus inde progressus ore excipiat. Post uero ipsum dentē ustum, & modico aceto tritū, calidum ore retinendū præbe, & dolore liber erit. Poteris & alcyonium suffire. Capitis uero cura in primis habenda est. Ad id ergo huiusmodi insperione utaris: helenij quadrantē, iridis sextantē, aristolochiae lōgæ unciam unā. Quod si fortiter infestauerint dolores, fomentū adhibe ex milio, aut eruo, aut tritico torrefacto cū bacis lauri, modico adiecto sale. Vt ne putrescant molares immobilesq; conseruentur. Succum racemorum uitis albæ libram unam & dimidiam, corticis radiceis mori sexuncem, decoque ad dimidium, calidūq; ore retinendum per septem continuos dies exhibe. Qui enim hoc utitur nunquam dentis dolore afficie-



tur. Collutio, proprie ad dentes ualēs. Corticis radicis hyoscyami drach. viii. pyretri drach. iiii. spicæ nardi drach. i. mellis dodrantem, aceti libras tres: decoque cum aceto in fictili nouo, & percola: deinde adiecto melle utere.

*Cura dentium ab humiditate dolore affectorum, & laxatorum.* Cap. xxix.

Assumamus autem mox alium egrotum, qui uniuersam corporis mixturam, in primis uero capitis habeat humidiorē, uiuatq; delicatius, & domū habeat in humiliore loco sitam: instet aut tēpestas humida, & hora uerna, quā adficitur. Qui snā sanā mentē habens, his uisus, non dixerit à superabundante humore in hoc morbum esse productum: Etenim quum nerui qui se ad dentes inserunt, permadescunt, laxioresq; fiunt unā cum circumadherentibus corporibus, necessariò dentes mobiles fiunt: uerum multis hoc citra doloris sensum accidit. Sæpe enim iam diximus, humiditatē per se non solere dolores inferre. Et dictū quoq; antea est, ob ætatē senilē quibusdam dentes laxari, & quod pharmacis adstringentibus gingiuas, ac densantibus easdem, senes queāt iuuari. Porro percussis etiam dentes laxantur, his maximo pere prodest alumen scissile, cū myrrha troglodytica tritū, ac inspersum ad dolentē dentē, atq; id ubertim & continuē facere oportet. Nā ipsum cōfirmat. Eos uero quibus ab humiditate uacillant, curare conuenit per dietā ad siccitatē ordinatā, & cū diuturniore abstinentia ciborū. Cibi itaq; eis cōuenientes sunt forbiles, halica, panis ex iure madidus, aut oryza, aut polenta cū aqua mulsa. Neq; male cōuenit eis miliū & lenticula, pisces muria cōditi, uolucres montanæ & sicciores. Ex oleribus, brasiica, & similia. In potu aqua exhibēda est, sed nō multa. Quod si concoctio nō non officeret, aqua mulsa danda esset: itaq; si hanc ferre nequeunt, ad aquā modicū uini addatur. Tēpore autē ad afflictionis, fouere cōuenit locū cū milio & sale. Collutiones exhibendæ adstringentes, & desiccantes, aut salæ, nisi gingiuę simul sint affectæ. Quare gallas, quas omphacitidas appellant, ex acri aceto decoctas, & alumen aceto permixtū exhibebimus: itemq; spinę Aegyptiæ semen, malicoriū, myrti baccas, cytinōs, balauſtia, oliuę folia, platani folia, cūpressi pilulas, rumicis syluestris radicē, lappæ radicē, folia rubi, & quæcunq; alia acerbā in se qualitātē complectūtur: ita ut his cū aceto puro, aut etiā aqua mixto, aut uino decoctis, os colluere præcipiamus, & in eo detinere adhibitū liquorem, sensui uidelicet ægrī maxime gratū & conuenientē. Iudicata etiam & perpēsa eorū quæ offerimus potentia, nimirum plusne an minus exhibere oporteat, iuxta exuperantis humoris multitudinē. Ego autē optimā ad collutionē oris expertus sum, oliuarū muria conditarum aquā, in quā uidelicet cōduntur. Etenim omnē oris humiditatē muria ipsa extergit: corporū uero hiatū & laxitatē, oliuarū spissamētū coercens corroborat & firmat. Aliquando etiam oliuarū albarū contusarū & expressarū accepimus succū, eoq; cū rutæ succo & melle permixto, confricauimus dentes: postea uero inspersimus indicam nardum cum pari pondere aluminis rotundi, & salis duplo adiecto. Optime quoq; faciunt ad hanc rem illitiones acerbæ: uelut est confectio de moris ori ualde conducens, maxime si alumen scissile habeat adiectum, & ea quæ ex

nucum succo apparatus eodem modo. Aut alumen scissile, & misy pari pondere cedria excepta, in cerati liquidi densitatem redige, & cum eis dentes illine, ac pituitam defluere permittit: deinde lacte asinino calido mordacitatē eleuant, aut uino dulci. Aut alumen, & myrrham troglodyticen inspergito, aut cū aceto, aut melle illinito. Sicut autē insersiones semper eis sunt cōuenientes. Ultra hoc enim quod dentes commotos firman, etiam ex humiditate hiantes gingiuas cōmittūt. Itaq; spodiū cypriū lotū, & exiccatū inspergēs, os collui præcipe ex aqua myrti aut rubi, aut alicuius consimilis decocti. Postea rursus spodio insperso, quiescere iube. Aut etiam rubiginē ferri siccam tritā admoue, aut fori uſtum. Aliud, ad laxatos dentes & gingiuas humectas. Aluminis scissilis in fictili uſti drach. vii. myrrhæ dra. iiii. gal larum, florum rosarum, iridis, singulorum drach. ii. croci dra. i. utere. Aliud. Cornū cerui uſti drach. viii. rhois culinarij drach. iiii. omphacj sicci drachmas ii. balauſtiorum drach. iiii. corticis pinus, myrrhæ, croci, singulorum drach. i. Aliud. Alumē rotundum cum duplo salis pondere tritum, dentibus ob humiditatem labantibus inspergito. Aliud. Myrrhæ, aluminis scissilis, amyli, pompholygis, æquales portiones, sicce, tritæ, inspergē, labāres dētes firman. Aliud remedium, quod laxatis ac dolentibus dentibus præsentem fert opem. Aluminis scissilis sextantem, radicis struthij sicce tritæ uncia unā. contritis simul affectum dentem adsperge, teneatq; donec salua os impleatur: & tūc sanē ipsam expuat, & effundat, moxq; dolore liberabitur. Aliud, quod & dentes dealbat. Aluminis scissilis trientē, mastiches unc. i. thuris drach. iiii. folij drachm. iiii. Aliud, quod & firmat, & corroborat dētes. Aeruginis, aluminis scissilis, aut magis quod appellatur phorimō, minij, singulorum æquales partes: utere sicco, aut cū passo. Aliud. Florū rosarum, balauſtiorum, myrrhæ, mastiches, cuiusq; unc. i. chalcididis assæ, thuris masculi, corticis pinus, cuiusq; dra. iiii. salis ammoniaci unc. i. Vtere sicco. Aliud, quod & ad exulcerationes oris cōmodū est usurpare. Rubiginē ferri, aut ipsum ferrum multa rubigine oppletū, igni candefacito, & in aceto puro, aut cum aqua diluto, aut uino, in his quibus sensus facile læditur, exstinguito, ac liquorem ipsum in quo extinctio facta est, ore cōtinendū exhibeto. Dentes enim firmat, & ulcera curat, præclarē etiam facit siccum, quod floridum appellatur. Aliud, Galeni. Quo ego utor, inquit Galenus, polytrichi palearū uſtarū sextarium unū: continet autem sextarius harū unc. xxviii. aluminis scissilis quadratē, aluminis rotundi quadrantē, spicæ nardi sextantē, folij unc. i. pipēris unc. i. pyrethri drachmas. v. contusa & cribrata gingiuis usque ad dentium radices adhibeto. Vtile etiam existit his, thus cum pipere manducatum: itemq; rubus commanducata ac ricini radix. Prodest etiam Esdræ antidotus sapa diluta ac ore retenta, eodemq; modo theriace Andromachi. Quinetiam in uesperam potu accepta theriace magnificē auxiliatur. Scribit Archigenes, ut uerum & naturali modo ad labantes dentes accommodatum. Dentem, inquit, canis mortui in nomine eius, qui ægrē habet acceptum, super prunas pone, uaporemq; inde prodeuntem æger aperto ore admittat, & fir-



& firmabuntur ei dentes. Similiter autem & exustū canis dentem cum aceto calido tritum, ore retinendū exhibe. In his uero qui facile ab aceti sensu offenduntur præbe cum uino.

*De dentibus lima atterendis.*

Cap. xxx.

Solent ferè dentes moti ac labantes reliquis esse prominentiores, maximè quum ex uerbere hanc affectionem incurrerint. Quare uisum est mihi eos lima atterendos esse, in quantum scilicet præ alijs prominent, ne in loquendo uel etiam manducando, eos qui obijciuntur, offendant. Adreftatur autem & experientum ipsum, quantum sanè ego eius rei periculum feci. Ferream namque limulā ad hanc rem apparatus, quo citius ac efficacius res procederet. Nam multæ aggressiones cōcutiunt dētem, quiere opus habētem, si modo aliqua spes est, mori dētis firmandi. Sit autem caput ipsius limæ obtusum, forma nuclei, & quā leuissimum. Itaq; aliquando quidem inæquales quædam dentū eminentiæ apparent, in quibus partes tātum aliquas lima atterere opus est. Aliquādo autem æquali planicie extremitates prominent, quare equali etiam ac plana per limam attritione indigent. Oportet autem molle quoddam linteolum gingiuis ipsis usq; ad dentium radicē adhibere. Deinde leniter sinistra manus digitis apprehendere, cauteq; ac citra offensionem limam adfricare: ne dum limam tolerat, dens ipse cōcutiatur. Quod si omnino dolorem percipiat eger, dum lima adhibetur, aut ob id quod uehementius digitis dentes apprehendantur, quiescere statim conuenit, interimq; collutiones, dolorem mitigantes, offerre: deinde rursus, ut dictū est, rem aggredi, & paulatim lima deterere. Atque hoc non prima saltem die bis aut ter conari, uerum & secunda repetere: ita ut ægro imperes, ut neq; sermone nimium utatur, neq; ullum aliquem duriores cibū adsumat. Utatur autē cibus sorbilibus, aut pane madefacto. Quod si citra laxitatem, quibusdam dentes præter morem auget, eos similiter lima atterere oportet, ac collutiones eos cohibentes ac densantes offerre.

*Cura dentium à siccitate dolore affectorum, ex Adamanto Sophista.*

Cap. xxxi.

Quartus iam ex ordine subiiciendus est ægrotus, qui uidelicet à sicca intemperie afficitur. Eam autem efficiūt, autumnalis tempestatis cōstitutio in primis, & uita erūnosa, tenui accedente diætā. Præterea regio sicca, & ambientis nos aëris status cōsimilis. Ad hæc accedit id quod nunc adest corporis ipsius temperamentū siccū, & maximè si caput eiusmodi sicca intemperie est affectum. Sicis autē insidet semper, nisi adsit frigiditas unā cū siccitate. Minimū etiā spiritus enīciunt sic adfecti. Et ob siccitatē dolor intolerabilis ferè eos concomitatur: austerorum & acerborum usus maximè contrarius eis existit. Quare confectio ex moris sepe his uehementē dolorem induxit. Itaq; collutiones minimū adstringentes, & mediocriter humectantes apparare oportet: aquam calidā per se, aut furfurum decoctum, aut radicis dulcis, aut prisanæ succū, aut amylium cū sapa aqua calida diluta: lac per se, maxime asininū, malug decoctū, & alia quæcūq; his sunt similia. Cibus autem his conueniens est succus prisanæ, micæ madefactæ, cucurbite, malug, oua sorbilia, & quæcūq; his prosunt qui humectatione indigent. Atq; hætenus quidem simplicium intempe-

rum curam ostēdimus. Manifesta uero & hinc sic ea, quam cōpositæ requirunt: Nimirum ex dictorū mixtura cognobiles, & ex tēperatura ostensorū auxiliiorū curā accipientes. Verū propter eos qui se nuper ad hanc disciplinā contulerunt & in expertos ad huc, age paucis unius tantum cōpositæ intemperiei mentionem faciamus, quæ ut manifestum exemplum ad reliquas cognoscendas statuetur.

*Cura dentium ob caliditatem & humiditatem dolore affectorum.*

Cap. xxxii.

Sit sanè regio calida & humida, tempus autē anni uerū, & aëris quoq; status calidus & humidus, qualis est austrinus. Cōtingat itaq; eger, qui caput habeat, quod facile eiusmodi humiditate impleatur, cuiusq; coma plurima sit & subrufa, & totius corporis temperamentū calidum & humectū, & cōsimili quoq; utatur diætā. Quis autē, qui saltē probatus medicus haberi uelit, in hoc calidū & humidum esse morbū nō imaginetur? Medeberis igitur ita affecto bisariā: Si enim excessus naturæ cōtigerit iuxta qualitates tantū, scopus curationis dirigendus est ad alterationem solam: Si uero unā cum qualitatū excessu, & humorum multitudo adfuerit, palam est primum oportere corpus euacuare, deinde ad temperiem reducere: cuius rei in omni corporis intemperie memorem esse conducit. Eū uero qui à calido & humido morbo affectus est, de quo nūc dicere institui, per uenæ incisionē euacuare cōueniēs est, utpote à sanguinis multitudine exagitatū. Calidus enim & humidus sanguis ipse existit. Incidere autē oportet uenam cubiti superiorē, quæ Græcis humeralis appellatur: quæ si non contingat, eam quæ media existit. Quod si quid prohibeat uenæ incisionem facere, modico & tenui uictu superfluum & non necessarium detrahit humorem. Atq; hoc modo etiam circa reliquas cōpositas intemperies operaberis: ita ut eas quæ iuxta qualitatem tantum cōstiterint, alteres, & contrarijs qualitatibus permutes. Eas uero quæ cum substantia quadam cōsistunt, humore per conuenientes purgationes detractō euacues: nisi quid & in his purgationem fieri præpediat. Reliqua autem quæ adferre oportet auxilia, ueluti sunt collutiones, & uictus constitutio, facile ex prædictis inuenire licet. Qui enim formam tractandi simplices morbos cognouerit, in promptu habebit & circa mixtos conuenientia remedia inuenire. Cognoscitur autē affligens humor, quum ex reliquis circa corpus signis, tum ex consequenti dolore. Flauæ namq; bili dolor pungitius comes existit. Pituam uero sequitur unā cū frigiditate distensio locorum: & fece quidē sanguinis siue atra bile affligente, sensus adest, uelut corporis cula quædam in profundo confringantur: ubi uero æqualiter omnes auget, multitudine eorum in corpore coaceruata, grauitas concomitatur. Verum enim uero & sapor ipse influentis humoris ægro specimen sui ostendit. Aut enim amaritudinem, aut faldedinem, aut acedinem sensu perceptat.

*Curatio erosorum dentium ex Galeno. Cap. xxxiii.*

Erosiones & cauernæ dentium ex influxu acrimie & erodentis maxime naturæ humorum generantur: quemadmodum etiam ulcera in cute, citra aliquam externam causam. Manifestum igitur hinc erit, quo modo sanandi sint erosi dentes: nimirum per excicationem influentis uictiosi humoris, qui si paucus fuerit



fuerit, localla remedia ex desiccantibus pharmacis conflata suffecerint: si uero multus fuerit influens humor, totius capitis respectu habere conuenit: contingit autem aliquando caput affici, ob reliquum corpus affectum, quare in his uniuersi corporis cura nos gerere oportet. Archigenes itaque ad hos haec remedia descripsit: Sori resina, terebinthina exceptum, denti circumlinito, atque in cauerna indito. Praclare facit & hoc: Sulphur uiuum lycio exceptum cauernae impone, & prius depurgatum dentem per orbem ex eo intege: aut gallam tritam lycio aut resina terebinthina exceptam ad cauum intrude, similiterque depurgato denti appone. In maximis uero dentium doloribus summe prodest hoc: Senectam anguium uisam ac tritam cum oleo in mellis crassitudinem redige, eodemque modo, ut dictum est, utere. Aut senectam ipsam non uisam dentibus adfrica: inde enim excident, aut melanthium torrefactum ac tritum cum oleo similiter adhibeto: aut melanthium torrefactum & acris aceto adfuso tritum cauo denti indito ac circumlinito. Si stetur enim erosio, neque quicquam addet ultra.

Aliud. Melanthii partem unam, alii dimidiam, & salis parum quiddam, simul contrita circumponito. a dolore enim liberat. Proderit autem & ad erosiones dentium uti ea quae supra ad motos dentes descripta est collutione, ex succo uidelicet bryoniae & cortice mori. Aliud. Veratrum nigrum tritum & melle cocto exceptum in cauernam impone, & praemundatum similiter ex eo integito dentem. Aliud. Thuris partem unam, atramenti sutorii partes duas, contere cum passo, donec cerati crassitudo fiat: utere ut dictum est, & cito sedabis dolorem. Aliud. Galbani partes duas, thuris partem unam, contere cum passo ad cerati crassitudinem: utere ut dixi, & eo ipso die sedabitur dolor. Aliud. Alumen scissile in caua intrude, & a dolore liberabit. Aliud. Fel ursi indito, & ab erosionem liberabis. Aliud. Rhododaphnes uirgultum exustum & tritum, insperge cauernis, & medeberis. Andromachi compositio, ad dentes molares, quae eadem hora dolores sedat. Piperis, pyretri, succi tithymalli, galbani, singulorum aequales partes, galbano exceptas, cauernis impone.

Aliud Asclepiadae. Eo, inquit, usus adseruauit caua dentium citra dolorem. Gingiber in aceto mulso decoctum, & probe tritum, in caua imposito, similiterque extrinsecus ad dentem admoueto. Praclare etiam facit ex duobus piperis generibus composita antidotus, cauis indita: atque etiam oleo amygdalino aut nardino aut rosaceo diluta, & in uicinam affecto denti auriculam instillata. Aliud. Ego autem ad caua dentium cum dolore affecta, Esdrae Antidoto utor, quam sapia diluta, & calefacta ore retinenda exhibeo. Mirum enim quam dolores ea mitiget, uerum si ad manum non adsit, theriaca Andromachi eodem utor modo. Fomentum etiam affecto denti adhibere conuenit huiusmodi. Origani sicci ramulos feruente oleo imbutos egro denti apprime. Aut ricini uirgulto similiter utere: aut staphida syluestrem scalpello probe adaptatam, ac affixa, itemque pyretrum adhibe similiter: aut ceram super affectum dentem pone, eamque cum specilli extremo ignito apprime. Id enim continuè facere non ab re est. Est autem & haec quaedam fomenti species: primum optimè praemundato dente, hyoscyami semen suffuso, exurgentemque hinc su-

mm aeger admittat infundibulo adhibito, ad affectum dentem: mirum in modum etiam erosiones dentium mitigat, canis mortui dens, quemadmodum & ante dixi, eodem modo suffusus & exustus in aceto tritus oreque retentus, probe etiam auxiliatur uermes terreni suffusi. oleum quoque in quo uermes terreni decocti sunt, in uicinam affecto denti aurem tepidum infusum, dolorem uehementer lenit. Idem praestat blattae domesticae capite detracto adeps, cum rosaceo liquefactus ac auri instillatus. Eodem modo & hederæ albæ acinos quinque cum rosaceo tritos & in punice cortice calfactos in aurem assidue instilla. Auxiliatur etiam radicis hastulae regiae succus, itaque nasturtii similiter instillatus. Prodest quoque in uicinam affecto denti narem infundere anagallidis ceruleae succum, aut radicis betæ succum aut atramentum sutorium cum lacte. Apollonii. Cumini quantum tribus digitis apprehendere potes, myrrhe, magnitudinem fabae, interioris cucumeris syluestris, duplum cum lacte muliebri in collyria redige, eaque in utramque narem immitte: atque ubi tamdiu haeserint, donec quinque stadia quis cursu conficere possit, extra here iube, fortiterque ipsum pharmacum emungere. Idem etiam ad aurium dolores eodem modo sumptum prodest.

*Vt dens citra dolorem, & absque ferro extrahatur.*

*Cap. XXXIII.*

Quod si dentem tollere animus sit citra dolorem, hoc ce pharmaco auferendus erit uehementer ad hanc rem congruente. Pyretrum acerrimo aceto in dies quadraginta conditum, deinde tritum, in usum adserua: qui ubi postulauerit, reliquos dentes cera praemuniatos custodito: ipsum uero qui dolet circumcirca purgatum hoc pharmaco integito, & post horae interstitium digitis extrahito, aut scapello exigito. Aliud. Sori acerrimo aceto, ad dies decem, in sole aestiuo contritum ac exiccatum, praemundato denti imposito, & excidet. Aliud. Sandaracham eodem modo apparatus, imposito. Aliud. Sori & tithymalli succum galbano excepta depurgato prius denti apponito. Aut cucumeris syluestris radicem, ut pyretrum apparatus, eodem adhibe modo. Aliud. Grana cnidia trita ac galbano excepta, circumponito, & excidet. Aliud. Praclare facit lappæ herbæ radix feruenti cinere calfacta, & denti assidue apposita: pauca enim mora dentes tollit. Aliud. Cucurbitæ syluestris radicem cauo impone, & dentem eruet. Aut ipsam cucurbitam rufam & cribratam per aliquot dies in aceto macerato, donec ad mellis spissitudinem redigatur: deinde in eo ipso pharmaco scalpello frequenter dentem circūradito, atque os claudere parumper iubeto: deinde dentem digitis apprehensum trahere, & sequetur. Aliud. Vermes terrenos in testa exustos, in cineremque reductos contere, & circumraso prius denti uberrimè adsperge, & per diem ac noctem excidet sua sponte. Itaque eo confidenter utere: ut mysterium enim celebratum est iam saepe. Poteris autem & citra scalpelli rationem inspergere, idemque opus patrabit. Aliud. Corticem radicis mori teneriorem tritum, ad dentem quem erutum cupis, solum impone, & excidet. Aliud. Sori, gallam, staphida syluestrem, alumen scissum, sulphur uiuum, piper longum in puluerem redige, & adiecta cedria subige: deinde ceram modicam liquefacta adfunde, simulque committe. Vbi uero uti uelis,



ex hoc, quantum opus fuerit emollito, ac depur-  
gato prius denti circumponito. Aliud. Erucam &  
brassica natā frequētius ad ipsum dentē adhibe, ca-  
detq; sua spē. Enīcū etiā dentē syluestris oleæ lacry-  
ma cauo eius indita. Itēq; rhus qua coria inficiūtur.  
& lacryma & succus syluestris fici, itemq; tithymal-  
li. Cauernā autē supnē galbano aut cera obturato.

*Smegmata uaria ad denigratos, liuentesq; ac ra-  
refactos dentes.* Cap. xxxv.

Liuent aliquando dentes per uniuersam ipsorum sub-  
stantiā, nō dissimile quiddam inflammationi patiē-  
tes, ob influxum uidelicet uitiosorum humorum.  
Quare consimili cum his qui erosionem passi sunt,  
indigent curatione: nimirum per desiccantia phar-  
maca: suntq; smegmata eis conuenientia. Apollo-  
nius itaq; ad denigratos dentes hæc præscribit: Sal-  
sibile melle subactum in fictili uase torreto, ac tritū  
modica myrrha misceto, eoq; dentes cōfricato. A-  
liud. Pulegiū ac salis æquales partes melle subige,  
ac aceto acerrimo adfuso exure. Aliud, quod gin-  
giuas adstringit. Polentam aceto acerrimo suba-  
ctam in olla exure, ac contere, cumq; ea dentes con-  
frica. Hoc enim & gingiuas ipsas cōercet. Aliud.  
Cōmuniter autē ad omnes, eiusmodi dentifriciū uti-  
mur: radice aristolochiæ exusta, aut osse ceruino us-  
to & trito, utere: nā & dētiū doloribus medetur.

Aliud. Cornu cerui ure, modicaq; mastiche ad-  
mixta utere. Aliud. Talos ouillos exure, ac cōtri-  
tis utere. Ad eadem pollent etiam buccina sale ex-  
pleta & usta, pumex assatus & uino extinctus, sepiæ  
testa usta, cōchē ustē, cochlea terrestris usta cū melle:  
his autē singulis odoris cōmendandi gratia parū iri-  
dis illyricæ miscetur, aut floris iunci odorati, aut ca-  
lami Indici, aut spicæ nardi. Optimè autem facit, in-  
quit Archigenes tum ad dētes à dolore præseruan-  
dos, tum ad gingiuarū erosionē, atq; etiā decorē den-  
tium pharmacū hoc: Lanæ succidas linteolo illiga-  
tas ure, & salis torrefacti tertiā earū parte admixta  
contere, & pro dentifricio utere. Aliud. Mel &  
salem in cerati formā contrita, linteoloq; ligata exu-  
re, deinde parū iridis Illyricæ admisce, & dentes ex  
eo confrica. Aliud dentifricium, Sulphur uiuum  
tritū dentibus adfricato. Smegma Oribasij. Sa-  
lis ammoniaci, cyperorum, iridis, singulorū æqua-  
les partes aliquandiu adfricato, postea uero gingi-  
uas ex uino odorato colluito. Aliud smegma opti-  
mum. Pumicis trientem, testarū sepiæ quadran-  
tem, mastiches, aluminis scissi, foliorū malabathri,  
cuiusq; unc. i. Aliud. Pumicis usti quadrantē, te-  
starum sepiæ quadrantē, cornu cerui usti sextantē,  
salis assati sextantē, spicæ nardi trientē, cyperorū un-  
ciā i. costi scrupu. iiii. Smegma pulchrū. Mar-  
moris drach. iiii. foliorum malabathri unciam i.  
amomi unc. i. cornu cerui usti sextantē, balaustio-  
rū unc. i. iridis sesquenciā, mastiches drach. iiii. myr-  
rhæ drach. vi. costi drachm. iiii. Bouis etiam talus  
ustus optimè dētes extergit, motos firmat, affectos  
à dolore liberat. Aliud dentifricium, quod oris  
odorē cōmendat, dentes dealbat, & ab erosionē ac  
labefactione custodit. Nitri, testarū sepiæ, myr-  
rhæ troglodyticæ, æquales partes cōmitte, ac utere.

Aliud optimū. Aluminis scissi sesquenciā, ma-  
stiches unc. i. iridis unc. i. rosarū calyces siccos un. i.  
cōtritis utere, & aqua calida inde os collue. Aliud

dentifriciū. Buccinorū ustorū, salis torrefacti, testa-  
rū sepiæ ustarū, scobis marmoris præconesij, singu-  
lorū unc. i. costi scrup. viii. cōtusis utere. Aliud,  
Timocratis, qd ad gingiuas humore pregnantēs &  
cruētas, ad putredines, parulidas, hoc est, gingiuarū  
inflammationes, motos dētes, dolētesq; oīa itē oris ui-  
tia pdest. Accipe perdicij herbæ foliorū teneriorū  
modiū Italicū, salis albi & tenuis sextariū i. mellis  
sextarium i. contunde simul ac in massam molliorē  
redige, quā in ollā cōiectā luto obturata ut circa os  
operculi foramē relinquant, per quod cū uirga agite-  
tur, ita diu autē super prunas positā torreto, quousq;  
fumus inde procedens purus uideatur. tum sanē ab  
igne ablata frige fieri finito: atq; piperis longi drach.  
iiii. accipito, piperis albi drach. v. piperis nigri dra-  
ch. vi. pyretri dr. vi. aluminis scissilis usti & cū uino au-  
stero extincti drach. ii. pumicis usti, myrrhæ, hyssop-  
i, pulegiū, seminis apij, singulorum drach. ii. mentæ  
siccæ drach. iiii. iridis drachmas iiii. hæc omnia in so-  
le prius exiccata, contundito ac cribrato, itēq; quæ  
in olla usta sunt admisceto, ac utitor. In aliquibus  
uero, utpote in frigidis dentium affectionibus, hæc  
magis conueniunt, siue ex potu frigida, aut pōmo-  
rum frigidorum comestione sint obortæ. Conue-  
niunt etiam his qui à frigido humore afficiuntur,  
ubi prius per collutiones ac manducationes pituita  
sufficienter fuerit detracta.

*De ancyloglossis, & qui uix loqui possunt.*

Cap. xxxvi.

Ancyloglossi quidam sūt ex natiuitate, quidam ue-  
ro ex aliqua affectione: Ex natiuitate sunt, quum  
membranæ inferiores, quibus lingua innititur, du-  
riores & mutilæ è natura sunt productæ. Ex affe-  
ctione autem ancylosis & incuruatio linguæ con-  
tingit, præcedente ulcere, & cicatrice dura sub lin-  
gua relicta. Qui hoc modo affecti sunt, difficulter  
loquuntur, quare etiam Mogilali à Græcis sunt ap-  
pellati. Qui uero ex natura ancyloglossi existunt,  
principio quidem tarde in sermonem prorumpunt,  
ubi uero loqui cœperint, citra obstaculū & satis fe-  
stinanter loquuntur. Impediuntur tamen in prolā-  
tione nominum aut uerborum, quorū aliās difficil-  
is pronuntiatio existit, ueluti in quibus R, aut L,  
aut K, literæ, frequenter occurrunt: hos sanē adhibi-  
ta manu per solam chirurgiam curare oportet. Ad  
eam itaque perficiendam ægrum desiderare oportet,  
eiusq; linguam sursum ad palatū attollere: & si qui-  
dem membranæ ipsæ curuitatis causa existāt, incur-  
uo uncino eas apprehensas & extensas excindere, a-  
nimaduersione habita ne simul subiacētes uenas dis-  
secemus. Si uero cicatrix curuitatis causa fuerit, simi-  
liter uncino apprehensa extendatur, & quicquid  
d durum adest, & quod cum naturali carne non con-  
sentit excindatur. Ab opere autem patrato aqua fri-  
gida aut posca os colluat: postea inspergatur manna  
thuris, imponaturq; linamēta conuulsa: sequētib;  
uero dieb. curetur ulcus collutione aque mulsæ, aut  
illitione unguētī Aegyptij, linamentis cōuulsis si-  
mul impositis, ut per eorū interstitiū cicatrix didu-  
cta, coalescat, neq; rursus eadē cicatrix relinquatur.

*Ad ranunculum sub lingua.* Cap. xxxvii.

Ad ranunculum sub lingua (est autem tumor earum  
quæ sub lingua sunt partium, præcipue uenarum)  
utendum sanē iisdem remedijs quæ ad aphthas oris



ulcera describemus, maximè tamè his quæ sunt ex eis fortiora. Proprie autè eis profunt etià hæc: æruginis rasæ, chalcitidis, gallæ, æquales partes insperge. Cū passo potes etià pro collutiōe usurpare. Aliud: Farinam erui cū melle præfrictis locis, illine. Aut etià gallā tritā cum melle, aut rosarū semen eodē modo. In corporibus autè molliori sensu præditis, rhoēm rubrū cū melle: aut rhois drac. viii. florū rosarum drac. iiii. croci drac. ii. costi drach. ii. misyos, æruginis, æquales partes, cōmisce, & cū his locos sub lingua confrica. Decoctum uero foliorum oleæ colluant assidue. Aliud. Nuces iuglandes ueteres integras, unā cū cortice exustas contere, deinde piperis grana xii. adijce, thuris grana mediocria iii. hæc cū melle sufficere mixta illinito, & miraberis. Aliud. In inueteratis uero & perfectæ ætatis, eas quæ sub lingua sunt uenas dissecatō. Extrinsecus uerò mento adhibendū ex ouis pharmacū. Magis autè conuenit id quod Græci uocant Sphæron. Aliud. Artemisiam maximè uiridem cum sale tritam ad locos sub lingua adfricato.

*Ad linguam inflamatam, desquamata, ac tumens, & ad palatum ac gingiuas.* Cap. xxxviii.

Glaucium in cote cum aqua dilue, eoq; locos illine, & eodem die sedabitur. Aliud, ualens etià ad lingue exulcerationē. Paliuri folia manducet & expuat. Vbi uero lingua infletur, doloreq; afficiantur eius partes uicinæ, similiter & mandibula, ita ut loquela præpediatur, folia oleæ tenera trita, & oleo perfusa, illinito, egregie enim auxiliantur. Aut origanum passo decoctum colluendum exhibeto: aut pruni folijs cum melle tritis utere. Ad linguam uero cui superficies instar squamarum aut corticis decedit, optime facit, amurca æreo uase, donec cogatur, decocta, & illita. Ad linguam putrescentem, & fere demortuā. Succum foliorum uitis albæ cū misy permixtum illinito: depurgat enim, et carne replet. Quidā etiā hic mel adijciunt. Ut uero ad cicatricē perducatur, radicē uitis albæ, contritā et cribratam insperge. Melius autè erit eam melle permiscere, ne dissipetur. Ad lingue abscessus. Quod si abscessus in lingua fiat, fursures in aqua decoctos donec liquor lubricus fiat, percolato, & huic succo mel adijcito. Simulq; calidū ore detinendum exhibeto. Hoc autè sæpe facere oportet. Aut enim abscessum discutiet, aut rumpet. A ruptura uero florido sicco utendum est.

*Ad aphthas, hoc est, oris ulcera, ex Gal. Cap. xxxix.* Quæ in superficie oris fiunt ulcerationes, Græci aphthas appellant, habentes in se quiddā igneæ caliditatis: fiunt autem ut plurimum infantibus, quum uitiolum existit lac nutritis, aut aliàs puer non probè concoquit: facile autem medelam recipiunt, utpote quæ ex his quæ mediocriter adstringunt, ut plurimum contingit. Aliquādo tamè diuturniores existunt, ob temporis uidelicet tractum, indissolubili quodam marcōre emergente, aut etiā ea quæ appellatur Nome, malo nimium semper ulterius serpente. Fiunt etiā aliquando in his, qui ad perfectā ætatem peruenerunt, tum propter uitiosorum humorū ad os defluxum, tum propter acredinē eorum quæ bibuntur accomeduntur. Cognitio omnium facilis est, utpote uisui ac tactui subiecta. Ad tactum quidem, calidiores quàm conuenit loci sūt, tumoresq;

excitantur. Visu uero cognoscuntur ob colorem. Quæ enim rubicundiores existunt, sanguinei humoris dominium indicant: flauiores, bilis amarulentæ: albidiores, pituitæ. Liuentes uero & nigrefactæ, bilis atræ. Etenim qui ista probè discreuerit, singulorumq; simplicium uirtutem cognouerit, facile constituet modum utendi tum simplicibus, tum compositis pharmacis: consideratione simul super corporū naturis habita, num'ne molles sint, & humectæ, an duræ, & siccæ. Siquidem fortioribus corporibus, fortiora etiā remedia sunt adhibenda: imbecillioribus autem molliora: infantibus itaque conuenientia sunt, ea quæ in cibis eis offerunt mulieres, uelut est lens cum modico pane, & medulla ceruina, aut uitulina. Oportet autem miscere cibis aliquid ex malis acerbis, pirisq; ac mespilis: aliquando etiā lactucæ quiddam & intubi, ac portulacæ cibo admiscendum est, inflammata uidelicet ulceratione existente. Quod si infans ipse cibū capere non possit, nutriticē eius huiusmodi uictu curare oportet: necnon ora infantium pharmacis conuenientibus illinire. Si quidem enim subrubræ infantium ulcerationes fuerint, à principio cū his quæ mediocriter adstringunt & refrigerant: consequenter uero his, quæ citra mordacitatem discutunt. Si uero subflauæ ulcerationes fuerint, hsdē similiter est utendum, uerū magis frigidis. Si uero subalbæ & pituitosiores fuerint, extergētibus utendū est. Si aut nigra, his quæ generose discutunt. Ad maiores uero pueros, pharmacis eiusdem generis facultate præditis utaris, uiribus tantū ipsorum auctis ac extensis. Ad eos autè qui iam perfectæ ætatis existūt, durioraq; corpora habēt, efficacioribus remedijs utimur. Moderata itaq; remedia ad oris ulcerationes recētes hæc sunt. Omphaciū in uino dissolutum aut mulso, rhus culinarijs eodē modo. Pro infantibus in principio sufficit flos rosarū, ipsaq; rosæ siccæ cū mulso, aut melle rosaceo. Inueterato autem iam malo, in minoribus quidem pueris admirādā opem contulit hoc, inquit Asclepiades. Remedium Asclepiadæ. Gallas contusas aqua decoque, & cum decocto percolato parem mensuram mellis permisce, rursusq; decoque, donec ad mellis crassioris spissitudinē redigatur: eoq; ut maximo remedio utere, ita ut locis illitū satis diu digitis adfrices, aut tomento lanæ purpureæ digito circumuoluto locis apprimas. In his uero qui perfectioris ætatis sunt, durioraq; corpora habēt, in uniuersum satis mihi fuit crudo misy uti, cū uino adstringēte: quod sanè tū intendit, tū remittit uires suas, iuxta uini uim aut magis, aut minus adstrictoriā, atq; etiā secundū quod densior aut liquidior uini & misyos mixtura apparatus. Si uero sordidū apparuerit ulcus, misy cū uino mulso tero. Alijs autè & qui adhuc fortioribus indigent remedijs, ærugo & cū uino & cum mulso utilis existit. Neq; uero malū pharmacum his chalcitis existit cruda cum oleo trita. Illiniuntur autè ex his pharmacis, solæ particulæ oris affectæ. Quod si collutiones obtulerimus, siue mediocriter, siue intense adstringētes, ea cautione utemur, ut fortioribus corporib; fortiores, mollioribus imbecilliores exhibeamus. Porro si in putredinē aphtha uertatur, nō conuenit amplius aphthā, eā affectionē appellare. Neq; enim ea quæ aphthas sanāt pharmaca, his adhibemus, sed



sed fortiora, qualia quædam in capite De crustis oris paulò post dicentur. Atqui si putrescere incipiât, maximè in infantibus, præclare facit præscripta ex decocto gallarum & melle illitio, & anthera stomatica cū melle illita, et id quod ex rosarū floribus constat: rhoë, croco, et costo, quod ad colūnellas inflāmatas describetur, siccū pharmacū: oportet autem id illinire cū melle. Nec minus egregiè facit centaureæ minoris exustæ cinis illinitus cū melle, & sphæritis, hoc est, cupressus pilulas ferens, exusta eodem modo. Proprie autē, inquit Archigenes, facit cornu ceruinum ustum, tritum, & adfrictū. Ad aphthas autem quæ proserpunt summè efficax est, fœniculi radix usta, per se, & cū melle illita. Itemq; amurca in æreo uase, donec in mellis crassitudine cogatur decocta, ac illita. Aliud, quod & ad aphthas & ad reliqua oris ulcera cōducit, Aluminis scissilis sextatē, gallarū unc. i. cōterito, ac oleo subigito, aut digito in oleo madefacto siccū excipito, eoq; exulceratos locos quāmplurimū extergito. Detrahit enim cutē, asperitates tollit, ulceraq; ad cicatricem perducit.

De gurgulionis affectionibus, ex Galeno. Cap. XL.  
Gurgulionem quidam etiā columnellā appellant, uue uero nomine accipienda est quædam in eo affectio, quum scilicet uuæ acino simile summum gurgulionis apparet. Lorum uero uocant aliam quandam eius affectionem, quum ex suffitu nimium ignitus gracilescit, & loro similis propēdet. Verum hæ adfectiones raro circa gurgulionem accidunt: inflammatur autem frequentissime. Euenit etiam aliquando, ut citra inflammationem nimium humectus laxior fiat: uelut in destillationibus continuis contingit: itaq; inflammatione incipiente repellentibus pharmacis opus erit, quæ adstringētis facultatis esse oportet. Et si quidē moderatus fuerit humorū influxus, ea quæ moderate adstringunt sunt adsumenda, ubi uero fortius inualuerit, acerbæ etiam sunt adiungenda. Collutiones igitur moderatæ sunt ex palmis decoctis, aliquando in sola aqua, aliquando etiam adiecto modico melle. Similiter autem & ex rosis, radice dulci, pampinis uitis, rubis, iunco rotūdo odorato, terebintho, rhamno, cypero, & siliquis. Itēq; ex radice mori, hypocistideq; & malis coroneis, ac piris austeris. His autē fortiores existunt, myrti, & baccarū eius decoctum, & uirgultorū molliū ilicis, & uniuersi quercini generis, similiterq; & glandiū: itemq; decoctum mespilorū & cornorum. Præclarissime autem omnium facit decoctum gallarum, rhois culinarij, eiusq; quo coriorum infectores utuntur, spinæ Aegyptiæ, myricæ, aut ericæ seminis siue fructus, utriusq; mali punici floris & putaminis. Horum unumquodq; & singulatim & cū alijs decoctum in aqua, gargarissandum exhibere oportet. Mirum uero quantum eorum mixturæ, simplicium & immixtorum usum excedunt. Vtilis est etiā affricus cochlearij frigidissima aqua repleti, & posca frigida in balneo colluta. Conuenit quoq; arida trita gurgulioni ad mouere, ita ut submisce & paulatim ad superiorem & extrinsecā regionē adferantur, & per cochleare aut specilli cōcauum supra linguā immittantur. Itaq; ex aridis moderata sunt, rosæ siccæ, & flos earum, & prædictarum plātarum germina exiccata, hypocistis, rheon ponticum, lapis coriariorum quo calceamenta ut resplendant expoliunt, à

Græcis ageratos, uelut non senescens, appellatus, & is quoque qui samius aster appellatur, & omphaciū siccum. His imbecilliora sunt minorisq; acrimoniæ, gummi, tragacanthus, sarcocolla, & amylū, quibus utēdum erit, ubi gurgulio à nimium adstringētibus remedijs fuerit compressus, aut à mordētibus ac discussorijs irritatus. Fortiora prædictis sunt, lapidis hæmatites, necnon phrygius ustus, minium sinopicum, & terra lemnia, quæ appellatur sphragis, diphryges, fructus Aegyptiæ spinæ, rhus culinarijs. Adstringunt enim hæc euidenter, citra tamen exasperationem. Acerba autem sunt, balauitia, & cytini, & malicorium, ac galla. Adstringunt etiam sufficienter omnia aluminis genera. Atq; hæc quidē simplicia sunt huic loco conuenientia. Ex quibus & cōposita fieri possunt, quum uehementi molle & lene quoddam adiungimus, aut discussorio quiddā adstringens admiscemus, iuxta temperaturam corporis cui medemur. Diuturnæ autē adfectioni impossibile est per repellentia perfectū auxiliū adferre, maximè ubi ægroti corpus plurimo humore repletum, aut affecta particula natura debilior extiterit. Itaque sæpe in principio statim, aut paulò post omnino aliquid ex discutientibus ad adstringētia adijcere cogimur. Si uero uehemens adfuerit dolor, etiam ea quæ eum mitigant adnectemus, atq; quum multa omnino sint quæ discussoriā uim obtinēt, à mollioribus est incipiendū. Ab acribus enim inflāmata exacerbatur. Ob eā igitur rē cōposita in usum uenerūt, tum ad reliquorū membrorū inflammationes, tum ad eas quæ fiunt in gurgulione, uelut quū alumen miscemus cum iride Illyrica, aut thure, aut myrrha. Tu uero perspecta caloris in ipsa inflammatione magnitudine, considerataq; influxus ad eam multitudine, atq; amplius in toto corpore humorū quantitate ac copia perpensa, uel eorum quæ adstringunt, uel quæ discutiunt, augebis mixturam. Optimum autē pharmacum ad inflammatos gurguliones, tum in principio, tum in uigore adhibitum existit hoc: rhois culinarij drach. octo, florū rosarū drach. iiii. croci drach. ii. costi drach. i. contusa & cribrata in uitro reponere. Vsu uero expetēte dimidium cochleare in duobus aquæ mulsæ aquosioris cyathis dissolutum ad gargarissandum adsumatur. Vtilis est etiā eis pastillus ex croco, qui iris à quibusdam appellatur. Cōplectitur autem myrrhæ dra. viii. aluminis liquidi drach. ii. croci drachm. viii. dissoluitur in uino. Quidam etiam aloē adijciunt, quam nos reprobamus. Hic itaq; pastillus fluidioribus, & magis humectis inflammationibus summe conuenit, dilutus in uino ac illitus. Miscetur etiā gargarismis. In corporibus durioribus prodest quoq; pastillus Musæ. Prodest etiam efficacissime pastillus Andronis: facit & id quod Asclepiades descripsit, lapidis agerati drach. iiii. floris lapidis asij drach. iiii. terræ samiæ drach. iiii. aluminis scissi drach. ii. croci torrefacti drach. ii. gallarum drach. ii. cōtritis utere. Hoc etiam nos usi sumus, inquit Galenus, optimumq; sæpe sumus experti, præter quā quod statim à principio, & quum rubicundus & calidus existit inflāmationis tumor, minime adhibēdū uideretur. Vbi uero diuturnum adest malum, & corpus prius est euacuatum, semel tantum in usum assumptum, magnam statim ostendit utilitatem. Ad laxatam columnellam, Gallarum



Gallarum drach. x x xii. diphrygis drach. xii. illini cum melle. Aliud philosophi. Apparatur temporis necessitate instante. Inueteratum enim uires amittit. Nuces uirides accipe & exiccato, & palmarum ossa, atq; de ipsis ubi uelis sufficere exurito, & amborum æquales partes misceto, ac siccis tritis utitor. Sufficere enim discussoria existunt. At uero quum in alijs adfectionibus, tum ad columnellas citra inflammationem laxatas, gallæ omphacine, salis ammoniaci, amborum æquales partes, per cochleare admotæ, præter opinionem auxiliantur. Præclare facit & in his, cyrenæicus succus tritus adhibitus: qui si non adsit, ipsum laser. Aliud, ad columnellas laxatas. Mellis librā i. florum rosarū sexuncem, aluminis liquidi bessem, succi hypocyttidos quadrantem. Alumen, & mel simul decoquito, deinde reliqua trita adiecto, ac rursus paululum decoquito, eoq; utere aliquando aqua calida dissoluto, aliquando aqua mulsa ad gargarissandum, aliquando quoq; eius illitu ipsam columnellam reprimes ac eleuabis. Bonū hoc remedium esse adstruit Galenus, eoq; uti iubet. Aliud, quod & colūnellas iam excidēdas sanat: facit idē & ad ulcera gingiuas depascētia, omneq; oris ulcus serpens. Fructus spinæ Aegyptiæ, gallarū, fructus myricæ, balaustrorū, foliorū malabatri, aluminis scissi, calsiæ, singulorū æquales partes. Utere sicco. Aliud, Asclepiadæ. Rosarum siccarum non madefactarū sextarium Italicū unum, nardi celticæ cum radicibus ac circumscita ipsis terra, fasciculum manipulare unū: simi columbini agrestis sicci ex ipsis nidis detracti drach. iiii. myrrhæ drac. viii. gallarum omphacitidū numero xlv. confusa & cribrata per arundinem insufflato, & per specilli cauum adhibeto. Aliud, siccū ad ualde laxatas colūnellas, iteq; tumentes. Piperis drach. i. myrrhæ drach. i. aluminis scissi drach. ii. gallarum drach. ii. contritis utere: euestigio enim eas firmant, ac resiccant. Aliud parabile, quod & ad laxatā & suffocantem columnellam ualeat. Nitrum tritum digito excipe, & adfrica, destillabit enim inde plurima pituita, eaq; cruenta, & sanabitur. Aliud naturale, Philumeni. Picem liquidam accipe, eaq; extremum pollicis tui infice, alteraq; manuincipitis capillos distende, ac picē illine. Recurret enim statim uua. Quod si quis omnino ab adfectione uuæ & tonsillarū securus esse uelit, quotidie per morborum interualla quum lauetur, & à calido lauacro egreditur, modicam frigidā aquam sorbendo deglutiat. Quod ipsum & ad tussim, & lateris dolorem, humidisq; stomachi uitijs multis utile fuit. Per ea itaq; quæ dicta sunt in naturam suam reducere gurgulionem oportet, omni conatu & molimine adhibito, neq; festinandum ad eius excisionem.

De ablatione columnellæ ex Galeno. Cap. xli. Quod si cōtinuè adfligat colūnella, periculumq; sit ne suffocatio aut tabes inde inferatur: aut quum gracilis & loro similis sit, propterea quod alimentum nō sentit, quod sanè aliquando accidere solet: aut quū resolutionem patitur: sit enim & hoc in aliquibus: tūc sanè refert utrū excidatur, an non. Optima eius auferendæ oportunitas existit, quum suffocatio urget, ut tum imminente periculo, ægroto auxilium feramus: itaq; quo manum commodius adferas, eger in splendentī & claro loco collocetur: & tunc quidem

os eius diducatur: mox uero immisso forcipe producatur, ita ut uolsellam huic rei idoneā, iuxta mediū ipsius colūnellæ, aut magis adhuc inferius adhibeamus: atq; ita pducta obtorqueatur. Obtorta enim uelut stupida efficitur, & uelut illaqueata curuatur ac liuescit, citra magnā sanguinis eruptionē. Quapropter immorari oportet aliquādiu, ac eā detinere quousq; æger tolerare possit: tuncq; auferre non supra forcipē incisionē facta, sed ad eius fundū. Quum enim pelliculis referta sit ipsa colūnella, & ob pductionē cedat, plixa sanè inspiciebibus apparet. Vnde multi inexpertī medici, siue per errorē, seu per ignorantiā altius incidētes, eam funditus auferūt, maximiq; incōmodi autores ægro existunt. Quare relinquere oportet fundū eius circa palatum. Ab excisione aut ægro offerenda est posca diluta, qua leniter os coluat. uehemens enim ipsius allabentis plaga, sanguinis eruptionē excitat. Quum aut hinc morsum perceptat, aquā frigidā colluat, atq; hæc uicissim fiant, donec sanguis sistatur. Sequētib; deinde diebus ex radicis dulcis & palmarū decocto gargarismus exhibeatur. Similiter & illitiones ad tonsillarum inflammationes descriptæ. Porro Galenus ait, ab excisione semper diphryge utor, donec cicatrix obducatur. Cicatricem enim tum huius membri, tum reliquorum omnium exulceratorum probè constringit ac committit.

De oris inflammationibus.

Cap. xlii.

Quum uniuersum corpus multitudine humorū redudat, aut unius tantum alicuius noxi humoris multitudo in corpore augeat, conuenienter utimur incisione uenæ, aut purgatione, aut clysteri, & abstinentia ciborū. Quod si neutrū horū adfuerit, ad localium auxiliorum opem statim confugimus, in principio quidē reprimendo per ea quæ adstringunt & frigefaciūt. Ex adstringentiū sylua est atramentum sutoriū, & similia. Verum adeo fortibus, & quæ simul uim uenenosam complectuntur ac nociuam, minime conuenit uti ad oris adfectiones sanandas, nisi magna cogente necessitate. Plurimum enim nocuum mentum infert, si quid ex his ad stomachum ac uentriculum fuerit delapsum, aut ad asperæ arteriæ extremum & pulmonē. Inest autem huiusmodi remedijs & circa gustum insuauitas quædā, quæ quidē usus tempore molestiam infert, & permanet etiam totam diem. De fœminis quid attinet dicere? maxime opulentis, quæ ob delirias in totum pharmacorū ad os descriptorum adfrictum egrè ferunt. Iam & uiros quosdā uideas, qui non ob delicias solum, sed ex natura fastidientē stomachū habent, atq; huiusmodi pharmaca non ferunt. Itaque ea quæ ex stomacis appellatis pharmacis, hoc est, quæ ori cōueniunt, mitiora existūt, et ocum cōplectuntur, & myrrhā, & alumen. Cæterum cōfectio ex moris & malis punicis, & similes quædā, cū solo melle medentur, habetq; gustū amplius suauē. Quin & cōfectio ex succo nucū cū solo melle apparata suauem exhibet saporem. At uero succus mororum pro debiliore habendus est pharmaco. Fortius uero, & quod nulli inferius existit, est succus corticis nucū. Inter hæc medium tenet, quod ad uim adstrictoriam attinet, succus mororum nascentium in rubo. His singulis admiscere potes, si quidem uehementius efficere uelis pharmacum, succum uuæ acerbæ nondum



nondum maturæ, pari pondere: aut si id non uideatur, eius dimidium. Andromachus coniicit, croci, myrrhæ, succi uuæ acerbæ immaturæ, aluminis scissi, singulorum drachmam unam.

*Illitiones stomaticæ ori commodæ. Cap. XLIII.*  
*Confectio ex moris.*

Confectio ex moris sic adparatur, quæadmodum docet Eras: succi mororum heminas v. uini austeri heminam i. mellis heminam unā. Succum unā cum uino decoquito, donec ad strigmentitiam crassitudinem redigatur, deinde adiecto melle rursus decoque, donec probè cogatur: deinde in pila eis admisce croci sesquidrachmam, myrrhæ sesquidrachmam, omphacii sicci sesquidrachmam. Optimum autem est omnibus oris illitionibus simul incoquere, radicis dulcis drachm. viii. ad eiusmodi sanè mensuram, qualem præscripsi. Est enim radix dulcis natura mitis, & ob id asperitatem ex astringentibus illatam lenire potens. Facit, inquit Eras, hæc cōfectio tum ad tōsillas, tum ad inflamationes oris, illita, & gargarismi modo colluta. Poteris autem succū mororū cum solo melle adparatum, in usum recondere, ob dulcedinē ori cōmendādam. Confectio ex malis punicis Galeni. Accipe mala punica in uigore perfectæ, maturæ, & recēta, ita ut ex triplici eorū differētia, dulciū, acidorum, & austerorum, æquales partes unā cū corticibus in mortarium coniectas, contundas, & ab eis succum exprimas: deinde cōfectionem adpares hoc modo. Coniice succi heminas quinque, mellis heminam i. radicis dulcis drach. viii. Primū uero succum cū radice dulci decoquito, ac percolato, deinde adiecto melle simul coagmentato, & utitor. Hæc cōfectio commodius exhibetur his qui oris inflammationem patiuntur, habentq; simul stomachū fractū, & qui cibū auersatur. Uilis est etiā bibita ad alui adfectiones. Expediit aut ei, ueluti reliquis oris remedijs adijcere, in principio quidem ea quæ adstringunt circa uigorē, ea quæ concoquunt, iuxta inclinationē, ea quæ discutunt. Facit etiam ad oris ulcera, & quæ adpellantur Aphthæ. Cōfectio ex malis punicis, Asclepiadæ. Pharmacū ad os prosperè accommodatū, quod etiam ad ulcera serpentia cōducit: Succī mali punici Italici sextarios vi. mellis lib. i. croci drac. iiii. myrrhæ drac. iiii. Succū perse satis diu decoquito: deinde adiecto melle rursus donec probè coagmetetur decoquito: postea in mortario crocum & myrrham simul cōmittito, atq; hoc ut maximo remedio, utitor. Remediū oris ex musto. Andromachi: quo inquit, ut pulcherrimo utor. Galla numero xxx. rhois quo coria inficiuntur choenice i. musti optimi ex uua aminæa alba sextarios sex. gallas contusas unā cū rhoē per diē & noctē in musto macerato: deinde ad quartas decoquito, & per linteolū percolato: rursusq; succū donec mellis specie accipiat, decoquito, & adiecta croci drach. i. aluminis scissi drach. i. myrrhæ drac. i. probe misceto, & in usum recōdito. Facit enim & ad auriū & sedis quoq; exulcerationes. Cōfectio ex succo uuæ acerbæ, ex ferula medicamentario libro. Sorani. Illitio ad os adparata ex succo uuæ acerbæ, incipientibus inflammationibus accommodata. Valet etiā ad humore prægnātes gingiuas, & ulcera pura tōsillarum. Succī uuæ acerbæ ad coagmentationē decocti sextariū i. florum rosarū drac. xii. croci drac. iiii. mellis

heminā i. adpara ut prædictū est. Eodē modo etiam adparatur cōfectio ex succo malorū cotoneorum & pirorū, pirastrorūq; & mespilorum, ac mororū rubi, similiterq; ex aliorū pomorū succo, atq; item cornorum: nisi quod plus mellis inijcitur ad ea quæ magis adstringūt. Succus enim pirorū & reliquorū pomorū ac fructuū aliquādo æqualē portionē mellis admittit. Eorū uero quæ plurimū adstringunt, ueluti est succus corni, aliquādo duplū mellis suscipit. Cōfectio ex nucibus, Galeni. Fit etiā ex succo uiri diū nucū pharmacū ori cōmodū, hoc modo. Extrinsecum corticē nucis uiridē, quo tinctores utuntur, in pilā coniectū contunde, succumq; expressum per linteolū excola: eiusq; heminas v. mellis heminā i. & radicis dulcis drac. viii. hoc modo cōmitte. Succū unā cū radice dulci usquequo cogatur decoque, & percola: deinde adiecto melle simul decoque rursus, ac utere iuxta eā quā describemus methodū. Est itaque pharmacum ex nucibus omnium efficacissimū. Verum stomacho utilissimum existit id quod ex malis punicis est cōfectum.

*Summaria doctrinæ de usu omnium illitionum ad os adparatarum. Cap. XLIII.*

In principio inflammationū, oībus oris remedijs utiliter quiddā ammiscetur ex his quæ restrictoriæ facultatis existūt ac repellūt. Quapropter cōmodū est solum succū cū melle adparare, ac reponere: Sūt autem restringētia parabilia quæ in principio miscere conueniūt: rosæ, flos earū, baccæ myrti, myrtus ipsa, lentiscus, rubus, omphaciū. Post hæc cytini et balaustia, mali punici cortices, gallæ, fructus spinæ ægyptiæ, omnia aluminis genera, rhus tū culinarius, tū quo coria inficiuntur: horū unūquodq; aqua decoquitur donec probè cogatur, atq; ita percolato decoctū illitionibus cōmiscetur. Optimus est etiā mali punici succus in principio ammixtus. Frāgēda autē sunt ipsa mala ac cōtūdēda in mortario unā cū corticibus suis. Deinde exprimēda ac percolāda decoquēdaq; donec in totū cogātur, atq; sic in præsentēs illitiōes ex eis ammiscendū est. Quod si sumptuosius adparare uelis pharmacū, nēpe diuitibus utendū, adijcies corticem cassiæ, indicā nardū aut celticā, aut foliū malabathri. Post principiū autē ubi constiterit influxus, sufficit cōfectio ex moris, croco modico ac myrrha adiecto, ad inflamationis concoctionē. Quum uero ad uigorē peruenerint inflammationes, parum utendū est illitionibus oris. Verū collutionibus & gargarismis mitioribus inflammationem concoquere oportet, uelut est ea quæ ex furfuribus fit, & radice dulci. Aliquādo etiam remedium oris ipsum decoctū ex caricis constans gargarissandum exhibere conuenit aqua mulsa permixtū, aut sapa calefacta, aut cū sola aqua calida, non præsentē melle aut sapa. Optimum cēsetur circa inflammationum uigorē oleum lentiscinum cōduplicato uasculo calefactum, & ore retentum: uerū cauēdum ne sit inueteratum. Vbi uero iam concocta fuerit inflammatio, & dolorum uehementia quieuerit: tum sanè & discussoria ad oris remedia admiscemus, cuius generis sunt, hyssopum, pulegium, thymus, calamintha, thymbra, menta, in sapa, aut aqua mulsa decocta & percolata, ita ut ex decocto cuiuscunq; tandē istorū oris remedium permisceatur. Ex parabilibus discussorijs est decoctū caricarū ad mellis spissitudinē redactū. Nā singula



singula prædicta efficaciora fiunt, si diutius coquantur. Fortius autem prædictis existit spuma nitri, & nitrum ipsum maxime Bernicariū ustū, atque nitro adhuc potētius est sulphur uiuū. Porro ad diuturnas et obduratas inflammationes adhibenda sunt ea quæ præclarius discutere possunt: cōtusa uidelicet ac cribrata, de quorū numero hæc sunt. Si diuites existāt egri, costus & amomū, & quod appellatur macer, perquā calidū & adstringēs, & succus sanē cyrenaicus ad discussione obduratarū inflammationū aptissimus, aut aliquis eorū qui ei successerūt, uelut est laser. Pauperibus autem pro sumptuosis illis pharmacis adijcere cōuenit dictamnū, aut acorū, aut meon, aut pyretrū, aut parū cardamomī, aut sinapis. Sit aut pondus singulorū quæ adijciuntur, iuxta eā quā in principio diximus apponderationem. Nimirum ut ad libras quinq; succi, una mellis adijciatur, & annexorū sint drachmæ quatuor uel quinque.

*De tonsillarum inflammationibus ex libris*

*Philumeni.*

*Cap. XLV.*

Tonsillæ frequētissime inflammationē incurrunt: calidi enim & humidī sunt earū loci. Verū hac adfectione magis arripiuntur hi qui plurimo sanguine abūdāt: & pueri, utpote mixturā habentes tenerā & multo cibo se explētes: & infantes adhuc lactētes ex hauſtu lactis id malū cōtrahētes. Infertur autē hæc adfectio plerūq; à nimia meri potioe, & à multa ac auidiore deuoratione ciborū, maxime acriū & asperorū: acciditq; ita adfectis difficultas trāsglutiēdi, & dolor aliquādo etiā febris. Incipiente itaq; inflammatione, cibū subtrahere oportet, & aquæ potū exhibere, præsertim febre simul irruēte. Exhibēdi etiā gargarismi adstringētes & repellētes, uelut est lēticulę decoctū cū rosis, myxis, & palmis: reliquaq; quæ in principio inflammationis gurgulionis adsumuntur. Cauendū autem ne mel in principio ad gargarismos cōijciamus, ne per acrimoniā malū iritemus. Verū quum uehementius adfectio ipsa inualeſcit, & periculum suffocationis suspectū est, uena cubiti incidēda est, repetita sanguinis detractio: maxime si iuuenis sit æger, & multo sanguine abūdet, cibi autē offerendi sunt sorbiles & uentri cōmodi: quod si uēter nō probè egerat, injiciendus est clyster: infantium uero uētres glāde immissa, & sedis illitionibus irritare oportet. Post euacuationē gargarissent decoctionē surfurum calidam aut ptisanæ succum, in quo decoctæ sunt uuę passę, aut sapā tepēfactā, aut decoctū radicis dulcis, aut pasum cum decocto ficuum & hyssopi. Hæc omnia tepida exhibenda sunt, frigus enim nō tolerāt inflammationes, sicut neq; plurimū calorē. multū autē proderit oleū amygdalinū auribus infusum. Extrinsecus leniter fouere cōuenit spōgīs expressis, & cataplasmata quoq; imponēda sunt ex farina ordeī aut semine lini, aut fœnigræci, aut his simul mixtis. Remittēte autē iā inflammatione & decreſcēte, mel in gargarismos admiscere cōuenit: quod in principio & in augmento minime facere oportebat: quo tēpore etiā calidiores gargarismi profunt. Extrinsecus autē lana mollis oleo tinēta collo circūponēda. Quod si ex usu acriorum collutionū aut illitionum inflammatio exaspertur, & mordacitas inde accidat, leniores gargarismi colluendi sunt, quales sunt, succus ptisanæ, aut halicæ, & micarum siliginearū cremores, qui tepidissimi offerantur: lac etiā tepidū gargarisandū. Remittē

te autē inflammationē et dolore prædicta oris remedia sunt illinēda, immisso digito medio, ita ut cum leni adhibita illitione partes tonsillarū, quæ intumuerūt, cōprimatur, quo contenta in se materiā excludant. Verūtamē non uiolenter cōprimere oportet, quæadmodum quidā faciunt, qui autores ob id sunt, quo inflammatio amplius augeatur. Si tamē obrigerit aliquis ab eiusmodi curatione læsus, cōtēti erimus exhibitione gargarismatū lenientium, nihil illinentes. Permanēte uero ac immorante diutius inflammationē, atq; ubi tonsillæ ipsæ subrubri coloris fuerint, neq; melius à prædictorū remediorum admotione habuerint, permutationē in pus expectare oportet: cito enim tonsillæ abscedunt. Abscessu autē factō, inflammationis signa augescunt, & exacerbationes ad uesperā fiunt fortiores, cū horrore & inæqualitate, aliquādo etiā cum febre. Quare ubi suppurationē futuram speramus, coadiuuare oportet ut quā citissime fiat. Sint autē gargarismi eis exhibēdi calidiores uelut aqua mulsa calida, & decoctū caricarū ac hyssopi. Verū ad molliendos & maturandos tonsillarū abscessus, maximopere auxiliatur unguētum quod appellatur Aegyptiacū, quod ex resina therebinthina, & melle & oleo dulcissimo adparatur: & extrinsecus cataplasma impositū ex ordeacea farina & fœnogræco cū decocto caricarum & altheæ ac melle. Quū autē pus perfectū fuerit, dolores minuuntur, et inflammationis tumor mollior redditus digito cedit: tunc sanē acriores collutiones exhibēdæ sunt, atque prædictæ quoq; oris illitiones. In cibo accipiāt frusta panis aqua macerata quā maxima, & reliqua similiter quæ eis p cibo offeruntur aceruatiū ingerāt. Vehementiore enim ex his circa tonsillas obuoluitōe facta cōsimili modo tumores adſciuntur, ueluti sectionē sustinerēt. A ruptura autē aqua mulsa gargarisanda p se, postea etiā admixta lēticula & rosis, atq; his sanē immorādū est, donec penitus ad cicatricē perducatur. Neq; uetat sepe adijcere quiddā ex prædictis oris remedijs. Quod si ruptura eis serius contingat, ob soliditatē uidelicet corpusculorū incūbentū, inferatq; inflammatio ipsa dolorē, diducere abscessum cōuenit ad prolaciēdā puris excretionē. Leonidæ. Itaq; si perfectæ ætatis sit æger, eū desidere facito, postea diducto ore linguā cū specillo lato, aut instrumēto linguæ deprimēdæ apto, deprimito, ipsumq; abscessum cū scalpello aut adcula penetratē ducito. Si uero puer sit æger, caput eius intra genua eius qui manū admolitur cōtineatur. Deinde facta abscessus dissectione caput eius inclinetur ad humeris cōmodiorē exclusionē. Ab opere autē parrato aqua lactei teporis frequēter colluāt. Post multā autē interapedinem ab opere patrato, & in sequētib; deinde diebus aquam mulsam gargarissent: adhibeaturq; eis unguētū ad exulceratas tonsillas cōueniēs: quale est quod ægyptiū crocū appellatur, & quæ ei similia existūt. Est autē Aegyptiū hoc. Unguentum ægyptiū crocū. Croci dra. iiii. mellis sesquilibram, olei rosacei sextantē, succi fœnigræci & seminis lini decocti quadrantē. Crocum in succo dissolue: deinde de oleo adiecto, ea simul commisce, et mel prius despumatum cōijce, & permixtis utere.

*De crustosis & pestilentibus tonsillarum ulceribus.*

*Cap. XLVI.*

Crustosa & pestilentia tonsillarū ulcera ut plurimum nullo



nullo præcedente tonsillarum fluxu incipiunt, aliquando autē à consuetis fieri inflammationibus, maxime efferatis perficiuntur. Fiunt autē frequentissime pueris, atq; etiā ætate iam perfectis, maxime his qui uisiosis humoribus abundant, in his quæ uere contingere solent pestilentibus constitutionibus. In pueris uero oris ulcere, quod aphtham uocant, præcedente omnino perficiuntur. Sūt autē partim alba, maculis similia, partim cinereo colore, aut similia crustis, q̄ ferro inuruntur. accidit autē ægris siccitas in trāsglutinatio, & suffocatio coaceruatim incidit, maxime quū rubor subeat mentū, aut ubi hæc acrimonia præterierit. Nome quæ depascitur, locos excipit, succeditq; unā putrefactio. Archigenis. Festināter itaq; auxiliū adferre oportet his qui sunt ætatis perfectæ, atq; cōfidēter uenā brachij incidere, si quidē nihil sit, quod id fieri phibeat. Multæ enim uirgines circa uigoris ætatē mēsiū purgationē appetētes, hac affectione apprehenduntur, quæ præcipuæ uenæ incisiōe opus habēt. Incidēde autē sunt in eis tali uenæ, & unica sanguinis detractioe facta euacuādæ, nō autē ad usq; animi defectionē. Deinde glandulis & sedis illitionib. ac clysteribus utendū erit; itemq; cucurbitulis iuxta lumbos, ac colligationibus extremitatū, atq; omnibus modis conandum est, ut diuersio ab affectis partibus fiat. Postea etiā gargarismis uti cōuenit, uelut est lenticulæ decoctū, & myxarū ac palmarū cū melle & pisanæ succo, deinde furfurū decoctum in decoquēdo uiscosum factū, adiecto melle. Potest etiā remediū oris ex moris, & maxime id quod ex malis punicis cōstat colluendū exhiberi, hydromelite permixtū. Philumeni. Infarcitur autē hydromelitis & costus & iris, ac aristolochia, & similia post principiū. Probē autē facit id quod ad columnellas præscriptū est. siccū pharmacū ex rhoē, flore rosarū crocōq; & costo. Foliorū etiā glaucij siccorū decoctū optime facit, quāquam gustus uehementē amari existat. Ego autē & glaucij succo cuius ad collyria usus existit, in aqua mellis meraciore diluto, p̄ gargarismate utor, aut etiam cū iridis decocto. At uero fruticis ipsius sicci, glaucij inquā, cōtusi & cribrati optimus usus existit si insuffletur. Conādū autē est in uniuersum ne digrū quidē locis admoueamus, aut leni saltē tactu manū admoliamur. Etenim inscī ad quos maxime in rebus dubijs homines cōfugiūt, uehementius illinūt, simulq; inflamatū locū comprimūt, simulq; crustā detrahūt, qđ minime facere conuenit prius quā eleuatā, & uix innitēte crustā cōspiciamus. Quod si enim adhærentē adhuc crustā auellere aggrediamur, ulcerationes magis in profundū pcedunt, & inflammationes cōsequuntur, augēturq; dolores, & in ulcera serpētia proficiunt. Itaq; sicca quidē remedia insufflare cōuenit; liquida uero cū pinnula illinire, ita ut quantū licuerit quā penitissime pinnulā immittamus. Vredū est etiā cōpositione ex semine rutæ syluestris ad anginā descripta, & ea quæ ex ustis hirūdīnibus cōstat, ita ut cū melle liquefactas illinamus, & cū hydromelite permixtas colluēdas exhibeamus. Profuit etiā aliquibus aristolochia & iris, & chalcitis adhibita cū melle. Aliquādo etiā Andronis & Musæ pastilli. Mirabiliter autē crustas aufert caninū recrementū melle illitū, & ustarū hirūdinū cinis, & cētaureæ minoris ustæ cinis cū melle, & cochlearū terrestriū maxime nudarū ustarū cinis

cum melle. His uero de quibus medici desperarunt, fel crocodili exiccātū & tritū ad crustā insperge, aut illine cū melle. Oportet autē post iritationes à pharmacis eiusmodi factas, lenire cū radicis dulcis decocto, et qui ex uino scybelite, mastiche chia, myrrha, & croco cōstat gargarismo, deinde cū amylo & tragacantho. Cohibito autē iā ulcere pascēte, lac gargarissandū, samia terra permixtū; et febrīū quoq; curā habere cōuenit; uehementes em incidere solēt; atq; in repurgādis explanandisq; ulceribus maxime sollicitū esse; cōuulsionē enim infantes plurimi passi sunt in ulcerū repurgatione; aliqui uero uia trāsglutinandi exiccata, sunt strāgulati. Sunt etiā quibus corroduntur gurguliones, atq; ubi diutius perstiterint ulcerationes, & in profundū proserpserint, cicatrice iam inducta, adstrictiorē uocē edunt, reflectiturq; ipsis potus in ipsas nares. Nam et ego puellam noui, quæ post quadragesimū tandē diē consumpta est, quum se iam à morbo recolligeret. Verū ad septimū usq; diem plurimi periclitantur. Vbi uero inflammationes & ulcera serpētia semper amplius extendantur, forinsecus fomētū adhibere oportet, & cataplasmatibus cōmunibus uti, cū cautione ne refrigeremus. Feliciter enim res procederet, si intrinsecus detentā materiam extrā queant transferre. Contegantur itaq; semper post cataplasmata, partes circa mentū, cū nardino & cyprino cerato, cū circumpositione lanarum molliū. Vbi autē crustæ solutæ fuerint, & ulcera ipsa mundata, antheris, hoc est, floridis remedijs utendū est. Sanant enim in totū ulcerationes ipsas, tum sicce adhibitæ, tum illitæ cū melle. Sunt autē crustarum tum oris, tum tonsillarū, cōposita pharmaca huiuscemodi. Asclepiadæ illitio ad exulceratas inflammationes. Florū rosarū drach. viii. croci drac. iiii. balustiorū drac. i. myrrhæ drac. i. nucū pinearū repurgatarū drac. iiii. Subactis melle ad illitionem utere. Asclepiadæ, ad oris putredines. Rhois culinarij dra. iiii. acaciæ drac. i. omphacij drac. i. medullæ ceruinæ aut uitulinae drac. iiii. in uino dulci diluta, melle despumato excipe, & ad illitionem utere. Andromachi remediū oris odoratū ac tenerū, ad inflammationes ac crustas optimū. Nucū pinearū depuratarū drac. iiii. amyli dra. ii. aluminis scissillis dra. i. florū rosarū drac. i. croci drac. i. mellis quantū suffecerit.

Aliud, ad omnes tum oris, tum tonsillarū adfectiones. Rhois culinarij dra. iiii. florū rosarū drac. i. croci drac. i. costi drac. i. illine cū melle, aut cū aqua mellis gargarissandū exhibe. Critonis ad crustas. Misy assatum aut crudum illine cum melle: statim em eas tollit. Sint autē misyos drac. iiii. & libra una mellis, quo modo etiā uti poteris chalcitide. Archigenes autē inquit: Ad crustas optime conuenit stercus caninū cū melle; quod tum optimū erit, quū ossibus canes fuerint nutriti. Magnopere enim auxiliatur, neq; odium sui inducit in cibo oblatū. Licebit etiam uti plurimis eorū quæ ad anginā descripta sunt auxiliorū. Aliud Archigenis, ad crustas in ore: Hirūdinū ustarū & stercoris humani æquale pōdus cū melle illine. Accipiendū est stercus nō quodcūq; obtigerit, uerū puerū blduo prænutrire oportet pane & lupinis, ac uino modico, atq; deinde tertia die stercus eius accipere & exiccare, atq; repositū seruare. Vsu uero expetēte cōtrito uti. Efficax enim & ad anginas existit. Experti etiam sumus, inquit Galenus,



pharmaca à Sorano descripta præclare facere, quæ sanè ille iuxta dictionū seriè descripsit. Remediū ad crustas oris cōferēs & ad gingiuas humore pregnātes & graueolētes. Misyos usti drac. viii. Iridis illyricæ drac. iiii. croci drac. i. in puluerē redige, ac pyxide lignea reponē. Vtere autē p se uel cū melle. Florida cōpositio, ad prædicta similiter efficax. Iridis illyricæ drac. iiii. sandarachæ dra. iiii. cyperi dr. iiii. aluminis scissi dra. ii. myrrhæ dra. ii. crocomagmatis dra. ii. in puluerē redige ac utere. Quidā etiā flores rosarū, & gallas adijciūt, singulorū dra. ii. Vtere autē ad putrefacta, et ad abscessus gingiuarū sicco: ad crustas uero cum melle. Philagrī, ad oris erosiones. Seminis lentisci nōdum denigrati drac. iiii. gallarū dra. iiii. costi dra. i. folij dra. i. utere. Theodori, ad tonsillarū ulcera, gingiuarūq; & pudendorū, ad putrefacta & carbunculos. Aluminis scissilis, sandarachæ, myrrhæ troglodyticæ, singulorū equale pondus accipe, ac utere sicco. Hermi, ad omnes oris adfectiones, ab ulcere quod aphtha adpellatur usq; ad crustas & carcinomata. Ericæ semē tritū, succo hyoscyami excipe, & utere cum melle. Aliud, ad ulcera quæ serpūt in ore, gingiuis, ac lingua. Misy cū succo foliorū uitis albæ, quā bryoniam adpellant, dilue, et cōiecto simul melle tere, ac ad illitōnē utere. Diuinitus extergit ac repurgat. Vbi uero repurgata fuerint & carne explera, bryoniæ radicē cōtusam & in puluerē redactā adhibe. Ea enim ad cicatricē perducit. Aliud eiusdē, ad oris putrefactiōes, ulcerationes, & ulcera quæ serpūt. Foliorū uitis albæ quadrantē, aluminis scissilis tritē, misyos crudi dra. iiii. atramēti sutorij dra. ii. cōtere quousq; arida fiant, & in puluerem redactis utere siccis. Repurgat, explet, reprimūt illatū fluxū. Ego uero præcedēs expertus sum. Collutione autē utendū est ad oīa oris ulcera, & ea q; serpūt, putrefactionesq; & gingiuas denigratas. Verbenacæ rectē decocto ex uino, quod calidū ore retinēdū exhibe. Aliud diuinū remediū. Oleæ uiridis folia aqua decocta colluenda exhibe.

De angina, et eius speciebus, ex Galeno. Cap. XLVII. Anginæ quatuor differētiæ existūt. Vna, quū fauces fuerint inflāmatæ: fauces autē pharinga Græcis appellatā, uoco intra os locū, ubi tū stomachi, tum asperæ arteriæ extrema cōueniūt. Altera quū neq; circa oris regionē, neq; iuxta fauces, imò nec forinsecus, quicquā adparet inflāmatū: & tamē suffocationis sensus infestat ægrū iuxta asperæ arteriæ extremū. Tertia, quū exterior gutturis regio unā cum interna fuerit inflāmata iuxta mētum. Ad hæc autē & circa ceruicē quēdā adfectio oboriri solet, ex luxatione & discessu cuiusdā in collo uerticuli in anteriore regionem: unde cauus apparet locus, & quū extrā attingitur, dolore adficiatur: qd cōtingit ob distracta intro uerticula, & cōsistēte circa musculos faucium, aut extremitatis arteriæ inflāmatōnē. Hæc autē species pprie cynāche à ueteribus est adpellata. Lingua enim à luxato uerticulo iuxta radicē suā impulsā, ex proprijs locis excedit, & difficultas magis circa respiratiōnē infestat, unde cogūtur aperto ore semp hiare, atq; aērē adtrahere. Oēs autē prædictæ adfectiones cōmunē habēt difficultatē trāsglutiēdi: ita tamē ut in alia plus, in alia minus hoc malū augeat. Accidit etiā eis potū adsumptum ad nares reflecti. Atq; hæc sanè sunt adfectiones: curatio autē earū in paucis uariat.

Areteus autē inquit, Anginæ causæ multæ existunt, maxime aut frigiditas magis quàm ardores, & plagæ, & ossa ex piscibus ad tonsillas impacta, et potus frigida, ebrietas, nimia satietas, & quæ spiratione attrahūtur mala. Archigenes autē ait: Occultæ anginæ causam esse in quibusdā, neruos qui ad stomachū deferuntur, dum male adficiuntur, et post inferioribus mēbris, pulmōni inquā & cordi, respirandi principiū inflāmant. Arterijs uero quæ carotides adpellantur, itemq; alijs adiacentibus inde inflāmatōnē trāsmittūt. At uero quod hī qui sic adficiuntur nō fiant attoniti, inde est quod huius adfectionis causa intēperies sola existit, nō etiā coartatio locorū. Cōueniunt igitur, inquit Archigenes, eis ea quæ uomitoriā uim obtinēt, uelut est elaterium, & squama eris illita cū melle. Ego autē, inquit, ab occulta angina præhēsos ex sinapis gargarismo releuo, moxq; in balneū induco, atq; ita multos à periculo liberaui, quibus adfecta particula, obliuioni tradita fuit, p distributionem uidelicet in uniuersum corpus sanatos. Areteus autē inquit Cucurbita accipiat, primūq; infra umbilicū adhibeatur, mox ad latera deorsumq; & scapulas, ita ut assidue à loco uno ad alterū trāseratur, & in admotione ex supernis locis deorsum trahatur. Quod si uehemēter urgeat suffocatio, sinapi aqua tritū & uili panniculo exceptū pētori impone. Ad delingendum uero cōueniunt eis: sinapi, nitrū, hyssopum, scylla assa, sulphur uiuū, omnia paribus portionibus cū mellis cochleario permixta delingenda exhibe. Archigenes. In principio igitur compendiarium & præceptum auxilium omnis angina requirit, quandoquidem autē ferè iuuenibus accidit, euestigio cubiti uenam eis incidere oportet, nisi quiddam maioris periculi impediatur: auferre aut sanguinem parce, non usquequo animi defectio sequatur: citius enim hī animo linguuntur, & aliās sanè ex refrigerationibus & animi defectione perfacile materia à faucibus ad pulmōnē defertur, et inuitabile periculū infert. Curandū etiā ut modica fiat diductio uenæ. Nā quum in alijs, tū in magnis uenę diductiōibus acuatim animi defectus irruat: neq; tamē angustiores facere uenæ incisionem cōuenit, ne sanguis uelut percoletur, & crassior eius pars intus remaneat, quæ causa huius adfectionis existit. Vtilis est autē eis repetita detractio in sequenti die, nisi præpediat egri timor, aut animi deliquitū. Quod si quid uenę incisionē fieri prohibeat, per clysterem infundendū est centaureæ, absinthij, calaminthæ, & aristolochiæ decoctū, admixto melle & plurimo nitro: postea etiā purgatiua danda, quæ magis pituitam ducunt: cōuenientissimum autē aliquādo in angina esse uidetur, elaterium: uerum non oportet nisi cum sero lactis & cnico in sero cocto ipsum propinare. Conuenirent etiā eis ex aloë & colocynthide catapotiā, si modo queant ea deglutire. Si uero confidentior contingat medicus, bonum est et hierę Archigenis ex colocynthide drac. iiii. cum aliqua ex prædictis decoctione per clysterem infundere, ubi prius aliquo stercorum eductiuo euacuauerit. Post uniuersales autē euacuationes, cucurbitas adponere oportet, et si quidē tumor circa maxillas, aut sub mēto persistat, in ipsum tumorem, & cū scarificatione plurimum sanguinem extrahere, saleq; respergere scissuras, & cōfricare. quod si nullus extrinsecus



trinfecus tumor adpareat, ueluti fieri solet in ea quæ occulta adpellatur cynanche, retro sub colli neruo infigenda erit cucurbita iuxta primū uerticulū, et cōstanti adtractione utendū, & frequentius cucurbita auellenda. Ea enim instantia factis uertebrarū discessibus, ac luxationibus probe se opponit. Deinde ubi paulisper à reliquorū remediōrū adhibitione quiesueris, cataplasmatīs utendum, tum eadem die, tū etiā in sequenti. Maiorē uero spem in sequentibus dieb. in illitionibus & gargarismis reponere conuenit. Itaq; ubi initium sit cū multa inflāmatione, ea quæ leniter adstringunt offerēda sunt primū: uelut est rosarum, lentium, palmarumq; decoctum, flos rosarū ex hydromelite, rhus cum hydromelite decoctus, et decoctum myxarum. Quod si excoꝛiatio contingat corpusculorum, panis cremor exhibendus est calidus, aut fursurum decoctum colluant, aut etiam lac solum. Ego autem, inquit Archigenes, siccū pharma cū in promptu habeo. Ex rhoīs culinarij drachmas vii. florum rosarum drachmas iiii. costi autem & croci, cuiusq; drachmas ii. Ex quo sanē in aquā mulsam inspergo, & in gargarismate utor, atq; inflāmationes & ulcerationes tōsillarum facillime sano, etiam si contingant quibus illæ ad summū progressum minentur. Quin & illitiones mansuetiores inflāmatis cōmodæ sunt, uelut est ea quæ ex moris cōstat, & rhoīs culinarij cremor in hydromeliti coctus donec cogatur. Oportet autem premacerare sufficienter rhoēm ipsū, donec abūde aqua mulla ex eo colorem accipiat, & in sapore uim eius repræsentet. Probe etiam facit mali punici integri unā cum corticibus fracti ac contusi succus melle permixtus: ita ut ad succi partes tres una mellis cōiiciatur, & donec cogatur decoquatur, ac illinatur. Quod si ad dictorū remediōrum malum cedat, sed semper multitudo humorum augeſcat, uenæ sub lingua incidēdæ sunt, aut quæ sunt in fronte, aut etiam circa magnos angulos oculorum: forinfecus autē assidue lanæ circum collum ponantur oleo calido madefactæ, aut ceratū ex oleo cyprino adparatum adhibeatur, aut si malis ex gleucino siue musteo. Quod si diutius moram traxerit, abscessum expectare oportet, & tū sanē conuenientius erit ficuum decoctum ad colluendum: multoq; magis si hyssopū ei cōiiciatur. Neq; uero incōmodus fuerit in his qui aliquo modo sunt exulcerati, crocus cū aqua mulla: & decoctū radicis dulcis. In uigore autē omnīū utilissimus existit succus pisanæ aut halicæ ore collutus: nā et à multis malis liberat, et abscessus metum eximit cōfestim. Qui si nō adsit, fursures probè cocti ei succedere possunt. Atq; hæc quidē his cōueniunt. At in angina siue inflāmatione ac ulcere, ubi sola multitudine ægri obaturati periclitatur, in his quæ acriora sunt periculū est faciendū. Sunt enim tunc etiā in principio cōuenientiora: post uniuersales tamē euacuationes: itaq; hydromeli meracius pſuerit, si cū eo hyssopū aut origanū decoquatur. Si uero in superioribus partibus, aut iuxta fauces malū persistet, sinapi tritū cū aqua mulla et percolatū gargarissandū exhibebimus. Cōuenit etiā cassiæ decoctū, & iridis, & radicis panacis, gentianæ, cētauræ, aristolochiæ, agarici, & radicis cucumeris agrestis: unūquodq; autē cū hydromelite satis diu decoquatur, donec succulentum reddatur. Vſus sum etiā in occulta angina ex sinapi garga-

rismo, & sæpe à periculo ægros liberaui. Illitio autē his ualde cōueniens, his inquā, qui citra exulcerationem anginā patiuntur, est ea quæ ex semine rutæ syluestris adparatur: & quæ ex uſtis hirundinibus constat: quarum apparatū paulò post unā cum alijs remedijs describā. Iuuantur etiā fotu uaporis intra os accepto hoc modo. Origanum, hyssopū, satureiā, feniculi semē, cum aceto plurimo & nitro feruefacto in olla diligēter operata, operculo foramē habēte in medio, deinde arundine ori ægri & foramini adaptata, sinas foueri. Si uero ex feruore arundinis os aduratur, ouum uacuū paruū utrinq; perforatū ore contineant, & per ipsū arundo immittatur. Mollius autē fomētum fuerit, si pro aceto poscā affuderis, aut aquā. Cæterū magis lancinantiā offerre illis oportet, quo rursus infurgat caro, & transmutare queat eam quā in profundo pertulit coarctationem. In dubium enim sæpe uenit & ferè desperationem præ feritate morbus, ut & odiosa exhibere quibusdam necessarium fuerit: si quidem humano stercore quosdā uſos esse constat pro illitione, & magnū sanē cōmodum repperunt. Alij autē recentī uſi sunt, alij uero exiccato et trito, ita ut cum nardo uel myrrha id permiscētes foetorem celaret. Ab acrioribus autē & his quæ dilaniantē uim obtinent, ad mediocria est trāseundum: uelut est Andronis pastillus, et similia. Vſilia etiā his sunt, ea quæ uomitoriā uim obtinēt, maxime illis quibus grauitatis sensus circa uentrē hæret. Archigenis remediū, quo utor, inquit, ad occultas anginas, mirabiliter etiam cōducit anhelosis. Elaterij oboli dimidiū, spumæ nitrī obolos tres, sinapis drach. i. contere cum aqua et informa. Mouet autē uomitum elaterium cum oleo aut melle tritum & penitissime illitum. Multo autē efficacius id præstat, si squama æris ei cōmiscatur, aut ipsum æs uſtum, oleo cyprino tritū & illitum. Probè etiā facit fel tauri illitū, & nitrum cum aceto mulso potatum, & cētauræ succus cum melle, & aselli sub aquario stabulantes uasē cū melle delincti. Quidā nasturtij semē tritū bibēdum exhibuerunt quātum cochleari accipi potest cum aqua mulla. Nec ita lōge post pituitā uomuerunt illi crassissimā & tenacem, statimq; à plurimis molestijs sunt liberati. Aliud. Stercoris gallinacei albi, & colore cerusam referētis bonā copiā exiccata & reposita adserua. Vbi uero uſus postulat, quātū cochleari accipi potest, in aqua aut aqua mulla dilutum ppina. Etenim desperatos etiā sanat: quod si bibere nequeat, tritum cū melle q̄ penitissime illini. Aliud, ad idē. Cētauræ drach. viii. nitrī dra. viii. salis cōmunis dra. viii. cōtere et reponere siccū. Vſu uero exigēte melle imbue, et cum pinnula illine, aut quomodo uidebitur utere confideter. Nā periculū eius factū est. Aliud. Absinthiū cōtufum & cribratum, adiecto nitro trito, illine cū melle. Aliud, Elaterium cum felle taurino & melle cōtritum illine. Cōpositio ex semine rutæ syluestris ori cōmoda, Andromachi. Ad anginas & desperatos, inquit, hac utor. Sūme etiā prodest stomachicis, & ad tormina intestinorum, fabæ magnitudinis exhibita ex frigida: Seminis anisi, seminis apij, floris iunci odorati, ammi, aluminis scissi, iridis illyricæ, seminis rutæ syluestris, quod quidā harmala, alij besafa adpellāt, cinnamomi, myrrhæ troglodyticæ, aristolochiæ lōgæ, singulorum unc. i. cassiæ, cro-



comagmatis, rosarū siccarū cuiusq; unc. i. costi qua drātē, cineris hirundinū recēs ustarū quadrātē, croci sesqunc. spice nardi dra. iiii. amomi dra. iiii. gallas omphacitidas numero octo, cōtere & melle excipe ac utere. In principio quidē pharmacū hoc cū decoctione aliqua mediocriter adstringēte, quales sēpe diximus, dilue. Iuxta uigorē uero cū prisanæ succo. Iuxta remissionē autē & declinationē melle aut hydromelite, aut uino mulso. Inueterata autē & uelut indurata inflammatione aceto mulso. Philagrius autē inquit, Aliquādo post prædictas uniuersi corporis euacuationes, & adhibitiones cucurbitularū, & incisionē uenarum sub lingua, miscemus etiā alia q̄dam ad præscriptū pharmacū, quæ partim quidē irruētē fluxū restringunt, partim autē oīa quæ iā incidēt discutiunt. Cōficiuntur autē ex rutæ cōpositione dra. viii. gallæ omphacitidis dr. viii. & stercoris canini albi, ac humani stercoris sicci, cuiusq; dra. viii. Verū quēadmodū & antē dictū est, stercus canū accipere oportet eorū, q̄ antea p̄ biduū ofsibus sunt nutriti, humanū uero ex puero biduū pane & lupinis nutrito. Vomitoriū Martiani, q̄d & ad opertas & manifestas anginas prodest: præexige, inquit, mercedē. Aeris usti dra. xii. atramenti sutoriū dra. xii. myrrhæ dr. i. elaterij dra. i. spumæ nitri dra. i. fellis taurini dr. iiii. excipe melle & cū pinnula quā penitissime illine. Archigenes autē inquit: Stercus humanū quale prædiximus accipe & exicca, ac in uili pāniculo ligatū exure, atq; cū aqua mulsa dilutum propina. Est em̄ remediū eorū qui iā suffocātur. Antonius uero Musa inquit: Stercus caninū quale prædiximus accipe & exicca, cōtusoq; & cribrato utere ad anginas cum melle, quā penitissime illinēs, ut trāsglutire possint. Eo em̄ nullū potētius pharmacū noui, inquit Gale. neq; ex angina laborantibus, neq; ad magnas tonsillarum inflammationes, neq; ad glandularū tuberculorumq; gutturis suffocationes iā periculū minantes, p̄bē facit etiā cū aceto mulso & pice liquida illitū caninū stercus. Summe etiā auxiliatur ad anginas, cōfectio ex ustis hirūdīnibus, cuius cōpositio hæc est. Cōpositio ex hirūdīnibus ustis. Cineris hirūdīnū syluestrium ustarū dra. viii. croci dra. ii. spice nardi dra. i. excipe melle, & permisce hoc modo ubi iā incubuerint adfectiones. Oportet autē exurere hirūdīnes hoc modo: Pullos hirundinū uiuos nō deplumes, addito cōgruentis modi sale in fictile uas conijcimus, idq; obturatum super prunas ponimus, donec puluis & cinis fiat, quo cōtrito utimur. Aliud, ex hirūdīnibus, itidē ualēs ad anginas. Hirundinū ustarum numero xi. succi myrti uiridis cyathos xii. myrrhæ obolos iii. mellis cyathos ii. hirundinū pullos exure et contere, deinde omnibus simul mixtis utere. Aliud cuius experimentū constat. Folij, costi, gareophylli, piperis, cuiusq; unc. i. sandarachæ trientem, excipe melle despumato, & illine. Aliud. Cochleas nudas citra testam in hortis repertas in ollula exure ac cōtere, cinereq; melle excepto utere. Est em̄ eiusmodi remediū, quod præsentem opem affert. Simili modo etiā cancrorū ustorū cinere utendum est cū melle: & decoctū quoq; cancrorū ore collutū utile existit. Ego autē cancrum in aquæ hemina ritū percolo, ipsamq; aquā calefactā gargarissandā exhibeo: crassa em̄ educit multa, & releuatur cōfestim æger. Aliud. Centauream mino-

rem siccata exure, cineremq; illine cum melle.

Aliud. Maxillæ porcelli ustæ unc. i. stercoris canini albi dra. iiii. malicorij unc. i. gallarū unc. i. costi dra. iiii. piperis torrefacti scrupulos vi. misce cum melle ac utere. Valde autē magna sollicitudine ac cōtentione opus est etiam tum quum malum remittere uidetur: etem̄ ea quæ iam ex profundo corporū circa fauces adtracta sunt, ex improviso in pulmonem transferuntur, si negligantur, atq; ita repēdina mors ægro inferitur.

De glandulis.

Cap. XLVIII.

Omnibus hominibus carunculæ quædā exiguæ naturales iuxta utraq; tonsillas extant, antiades Græcis, Latinis glandulæ appellatæ, quæ quū naturalē modū seruant, nihil molesti inferunt. Verū ubi iuxta affectionis proprietatē augetur, & modi maioris q̄ secundū naturā suam fiant, tunc sanē & transglutinationis & spirationis difficilis causæ existunt. Cōsistunt autē ferē in totum citra inflammationē, & paulatim etiā augetur. Aliquando autē & inflammationē patiuntur. Diducto itaq; ore manifeste apparent glandularum tumores maiores, citra quidē inflammationē tonsillarum corpusculis cōcolores. Inflammatæ uero rubicundæ & inferētes dolorē. Quare quum inflammatio affuerit, gargarismis & illitionib. ad tonsillas inflammatas descriptis est utendū. Quū uero citra inflammationē cōsistunt, conari oportet ut per cōmoda pharmaca paulatim deprimantur, & per admodi digiti cōpressionē. Remedia autē ad glandulas absq; inflammatione auctas talia conueniunt. Gallæ omphacitidis, salis ammoniaci, aluminis scissi, cuiusq; unc. i. adhibe siccum. Aliud. Myrrhæ sextatē, gallarum dra. viii. misyos dra. ii. salis torrefacti dra. ii. utere sicco. Aliud. Gallarum, misyos, myrrhæ, aluminis liquidī æquales partes accipe, & siccis utere, uel cum melle. Aliud, Asclepiadē. Remediū ad glādulas accommodatum: gallarum omphacinarum dra. iiii. diphrygis dra. i. myrrhæ dr. iii. croci dra. iii. mellis quantum suffecerit. Hoc pharmacū citra ulcerationē glandulas reprimat. Aliud, Apolloniadæ. Diphrygis dra. ii. chalcitidis assatæ dra. ii. gallarum dra. i. croci dra. i. myrrhæ dra. i. excipe melle & utere. Chirurgia. Verum si pharmaca uincantur, excindere glādulas oportet. Quod ut cōmodius fiat, æger in claro & splēdido loco collocetur, & diducto ore unaquæq; glandula uncino producat & excindatur: excinditur autē ex ea id quod supereminet, iuxta medium eius, quod præter naturā excreuit. qui em̄ dum omnē quæ præter naturā accreuit carnē excindunt, etiā naturalē carnē ex fundo auferūt, periculosę sanguinis eruptionis autores fiunt. Post excisionē autē posca frigida colluēda detur, ad sanguinis uidelicet inhibitionē, & post eā frigidissima aqua. Postquā autē sanguinis eruptio constiterit, satis lōga interapedine tēporis facta aqua mulsa tepida exhibeatur. Sequētib. uero diebus etiā cū ea illitiones adferātur, quales sunt ad ulceratas tonsillas descriptæ. Raro autem, quando uidelicet ulcera eminentiora adparent, florido sicco ipsas tonsillas attingimus. Per hoc enim eminentiæ deprimuntur, & cicatricis inductio perficitur.

De suffocatorum reuocatione.

Cap. XLIX.

Reuocantur aliquando suffocati ac strangulati, aceto ori infuso cum pipere, & semine urticæ. uerum difficulter



culter tractari possunt ut admittant: cogere itaque oportet ac ori infundere, ad uomitionemque irritare. Rubore autem circa collum dissoluto, statim respiriunt ac relaxantur: quare oleo multo calido & lana, aut cerato, collum assidue circum circa est amplectendum. Similiter etiam naufragos reuocare oportet, si quidem respiratio adhuc in eis seruetur. prius autem in caput ipsos suspendere conuenit, ac cogere quo absorpta aquam euomant, siue pinnularum, seu digitorum iritatione, forinsecus uero manuum impositione iuuare oportet uentris firmitatem.

*De deuoratis ac fixis in tonsillas spinis, atque his quae in asperam arteriam delabuntur. Cap. I.*

Si in asperae arteriae extremum, atque ipsam adeo asperam arteriam, aliquid eorum quae deglutiuntur praeterlapsum fuerit, tussis prouocanda est, per acetosam aliquam qualitatem: & sternutatorium quoque naribus admouendum. Ex uehementi enim agitatione, & instantia, & spiritu simul cum uiolentia quadam expulsiōe adiuuante, eiusmodi consueuerunt excerni. Si uero iuxta tonsillas, aut iuxta principium stomachi seu gulae spinae aut ossa fuerint infixae, ita ut oculis subiaceant, atque plurima sui parte extra tonsillas promineant, uolsella apprehensa extrahere oportet. Quum uero in inferioribus gulae locis quid adhæserit, hoc modo educatur, Spongiam paruum resina terebinthina madefactam, aut carunculam crudam recentem incisam, unā cum filo ualido ipsi alligato, deglutire coge, & mox comprehensam per alligatum filum rursus extrahe, hoc enim modo saepe etiam id quod infixum fuit, simul extrahi consueuit. Conuenit etiam panis recentis interioris buccellas deglutientes exhibere citra commanducationem: aut caricam aliquantisper circummanducatam, non tamen penitus dissolutam. Quum autem ad fundum usque ipsorum corporum penetrarit, neque extrahi potuerit, aqua mulla gargarissanda exhibeatur, & cibi forbiles, uelut psisana cum melle, aut halica similiter: aut micæ aqua mulla calida maceratae offerantur, forinsecus uero ceruici atque uniuerso collo lanam oleo calido imbutam imponere oportet. similiterque cataplasmate calido laxante ac deprimente collum contegere conuenit: uelut est id quod ex semine lini cum aqua mulla adparatur. Hoc enim ductu tunc locus ipse suppuratur, tum spina commota, simul cum his quae deglutiuntur, deducitur. Aliud, ad educationem eorum quae in tonsillas deuorata sunt. Statim te ad aegrum desidentem conuerte, ipsumque tibi attēdere iube: ac dic, Egredere os, si tamē os, aut festuca, aut quicquid tandem existit: Quēadmodum Iesus Christus ex sepulchro Lazarum eduxit, & quēadmodum Ionam ex ceto. Atque adprehensio egri gutture dic: Blasius martyr & seruus Christi dicit, Aut ascēde aut descēde.

*De arteriarum pharmacis. Cap. II.*

Asperae arteriae extremum & subiacentem ipsi asperam arteriam, cum suis proprijs musculis, pellicula quaedam fortiter complectitur & ambit. Quādo igitur adfectio aliqua siue iuxta eā ipsam pelliculam, aut circa extremi ipsius arteriae musculos contingit: remedia quae uim medendi eam obtinent, arteriaca communiter adpellantur. Afficitur autem pellicula haec aut ob nimiam humectationem, aut asperitatem, aut ulcerationem. Vocis enim nocumēta, uidelicet eius interceptio, hoc est non posse loqui, & rauditas in lo-

quendo, ad plures causas consequuntur: aliquando quidem propter diuturnos ex capite defluxus, aliquando uero propter suppurationem thoracis & talem. Ex uociferatione etiam magna & plurima raudedo uocis oboritur, & ob frigidi & insueti flatus inspirationem, & ob plurimam ac insuetam portionem uini meraciorem. Verum haec affectiones magnitudine inuicem distant. Etenim uehementius humectis uocis instrumentis, uocis interceptio contingit: mediocrius autem rigatis, uox raucosa perficitur. Itaque qui ex uehementi clamore, amplius uoce uexantur, cōsimile quiddam patiuntur his, qui reliquis corporis particulis fatigatis & ex labore afflictis, afficiuntur. Nam & pellicula quae arteriae extremum atque ipsam asperam arteriam ambit, per magnas uociferationes extra prolato spiritu percussa, inflāmatur. Et iuxta arteriae extremum, ultra hanc plagam, musculorum ipsum mouentium actio offensa, maiorem affectionem operatur. Musculi enim illi uocem operantes, ob magnas uociferationes, non solum ab erumpente spiritu percussi laeduntur, uerum etiam superextensi uehementer, maximam sustinent lassitudinē. Curatio autem horum coincidit cum his, qui alias particulas corporis habent fatigatas. Balneum enim dulcium & bene temperatarum aquarum magno opere iuuat omnes phonaecos Graecis appellatos, qui uocis exercitio magno utuntur: citharædos inquam & praecōnes, & tragædos, quum contendendo oblaeserint uocem. Quēadmodum autem oleum forinsecus illitum omne corpus a fatigatione refocillat: sic & cibi mordacitate carentes & deprimentes, ac laxantes, tum affectam arteriae pelliculam, tum ipsos musculos, et pharmaca arteriaca uim obstruendi meatus habentia iuuant. Quum igitur afflictiones ac lassitudines uelut distendentes circa extremi ipsius arteriae musculos, & ipsam pelliculam generantur: in principio quidem lenissima edulia conueniunt: pharmaca uero obstructoriam meatuum uim habentia. Sedata autem inflammatione aliquod ex modice repugnantibus est adhibendum: deinde rursus aliud, sed priore praestantius, ut paulatim ad medium repurgantium perueniatur: deinde ab hoc adhuc fortius discussorium adhibeatur, ut hoc modo semper ad uehementius progressus fiat, quādo uidelicet diutius ueluti indurata adfectio in uocalibus organis perstiterit. Primi itaque ordinis erit tragacanthus, & gummi, & aster samius, amyllumque, & ex halica ac trago probe decoctis sorbitio: lac etiam conueniens est, & dulciarii panes, oua sorbilia, & nutes pineae madefactae, sesama, & sapa quae sireon quoque & hesperema adpellatur. Haec itaque inflammatis affectionibus circa arteriam arteriaeque extremum conueniunt: quibus utendum donec moderator inflammatio fiat. A uini autem potu abstineant hoc tempore in totum. Postquam autem inflammatio moderator reddita est, passum theracum exhibendum est, & sapa: butyrum quoque conueniens est, & amygdalae unā cum sorbitionibus decoctae, lac item ac mel diutius cocta, amylo ipsis infecto, quod si non adsit, panis siligineus siccus contusus & cribro excussus, lacti dum coquitur infarciendus est. Manifestum itaque est quod per huiusmodi uictum, tum pellicularum, tum musculorum circa arteriae extremum atque ipsam arteriam, inflammatio sedatur. Relinquitur autem humiditas



multa, propter quam impossibile est uocem esse claram, nisi rursus edulsi utatur & pharmacis mordacitate carentibus & repurgantibus, uelut est faba elixata, & pisana, & semen lini torrefactum. Hæc enim medium obtinent, inter ea quæ mediocri uel prædicta sunt, & ea quæ meatus obstruunt pharmaca. His autem amplius repurgat resina terebinthina, & thus cum despumato melle, amygdalæ amaræ, brassicæ & probe decocti porri. His uero adhuc fortiora sunt, farina erui, hormini semen, iridis radix & panacis. Omnibus autem prædictis maxime mollibus, passum creticum, deinde theracum & scybelites conuenienter miscentur: sapa quoque quæ sireon & hepsima uocatur, ex musto ad tertiam partem mensuræ decocto adparata omnium maxime meatus obstruit, citra etiam mordacitatem meatus lenit. Quod uero ex caricis adparatur decoctum ad mellis spissitudinem, magis discutit ac repurgat. Omnium itaque simplicium pharmacorum uires nosse oportet, eum qui aliquod compositum est factururus. Qui enim eas nouerit, etiam eis quæ ab alijs composita sunt recte utetur, maxime quum indefinite fuerint descripta. His igitur præexplicatis, arteriacas compositiones à ueteribus descriptas subnectemus. Arteriaca ad uocis asperitates, in principijs exhibita lenissima: gummi drach. ii. tragacanthi drach. i. sapa sextarium i. Gummi & tragacanthum contusa et cribrata, cum sapa conterere donec dissoluantur, deinde super prunas fumum non emittentes decoque, donec non inquinent testæ instillata. Exhibe autem ex ea sub lingua tenendum. Alia arteriaca. Gummi quincuncem, paksi sextarium unum, mellis lib. i. Gummi modica aqua dilue, & ad reliqua coniectum super prunas non fumantes decoque, ut prædictum est. Ante somnum uero delingendum exhibe. Antonij Musæ, ad uocis interceptiones. Brassicæ uiridis cauliculos depurgatos manducandos exhibe, & quod instar palarum exuccum est ex puere iube: succum autem ipsum deglutire. Aliud. Succus eryngij aqua decocti heminam i. succi ficuum aqua decoctarum tantundem, gummi leuissimum triti drach. viii. decoque simul diligenter, donec ad arteriacæ crassitudinem redigatur, & delingendum exhibe ex eo ante somnum usque ad cyathum mensuram. Alia arteriaca, ad asperitates, rauitates, tussesque & sputum sanguinolentum. Amygdalarum amararum decorticatarum numero xxv. seminis lini torrefacti drach. iiii. tragacanthi drach. ii. oui in fermento assati uitellum, tragacanthum in modica aqua maceratam, unam cum reliquis omnibus passum excipe. Si uero sonus uocis sit fractus, mel per passum ammisce, maxime si ex pectore aliquid educi oportet. Aliud. Brassicæ succum cum melle decoctum delingendum præbe, & confestim auxiliabitur.

*Ad inueteratas affectiones uariæ arteriacæ. Cap. lxi.*

*Oribasij ad asperitates & suppressam uocem.*

Croci drach. vii. radice dulcis, spicæ nardi, cuiusque drachmas iiii. myrrhæ drach. iiii. thuris drach. iiii. seminis hyoscyami drach. i. mellis despumati unc. vi. piperis albi grana l. exhibe sub lingua tenendam magnitudine fabæ. Alia arteriaca sub lingua tenenda, ad suppressam uocem, raucosos & cruenta reiectantes. Tragacanthi drach. vi. gummi drach. vi. myrrhæ drach. ii. obolos ii. thuris sesquidrachmam, piperis albi grana xx. croci drach. i. succi radice dulcis drach. vi. carnis phœnicobalanorum numero iiii. paksi Cre-

tici quantum satis est. Gummi & tragacanthus contusa & cribrata passum macerantur cum radice dulcis succo: quod si non adsit succus, radicem tusam, & donec cogatur decoctam coniungimus quadruplici potest. Alia arteriaca, quæ etiam ad tussim prodest. Seminis lini contusi & cribrati, uuarum passarum pinguium sine uinaceis nucum pinearum tostatum, nucum auellandarum mundatarum, æquales partes in farinam redactas melle cocto sufficienti excipe, et cochleare exhibe ante somnum. Eclegma quo utimur. Vini scybelitæ sextarium i. gummi sexuncem, mellis dodrantem. Gummi pauca aqua præmacera, deinde omnia simul contrita in diplomate decoque acutere. Aliud, Charixeni. Succus radice dulcis drach. vi. tragacanthi drach. vi. croci drach. ii. myrrhæ, thuris, cuiusque drach. i. spicæ nardi drach. i. paksi protropi choenices iiii. decoque donec in mellis modum cogantur, siccis probe commixtis, acutere. Eadem enim potestate ualeat qua & sequens. Aliud, sub lingua tenendum ad suppressam uocem, ac reliquas circa arteriæ affectiones. Tragacanthi drach. xii. gummi drachm. xii. myrrhæ drach. iiii. thuris drach. iiii. carnis phœnicobalanorum numero vi. radice dulcis drach. vi. paksi protropi aut theracis quantum excipiendis his satis est. Sic autem passum ipsum præcoctum ad mellis crassitudinem. Exhibe fabæ Aegyptiæ magnitudine sub lingua detinendum, & dissolutum deglutendum.

Alia arteriaca faciens ad uocem fractam, raucosam & suppressam, inflammationes tonsillarum: utilis est phonascis & ante & post certamen exhibita: iuuat refrigeratos: prodest ueteri & recenti tussi, spuentibus sanguinem, & sursum reiectantibus, & coeliacis: conducit etiam ad anhelitus foetorem. Croci drach. iiii. myrrhæ drach. i. succi radice dulcis drach. i. paksi Cretici sextarios iiii. passum ad tertias decoque, & cum eo prædicta excipe ac utere. Aliud, ad ulceratam arteriam, Charixeni: conuenit etiam phonascis, hoc est, qui uocis exercitio utitur ante certamen, & post exhibita: facit & ad circūdolentes oculos, extra imposita lana ex eo madefacta, & ad interaneorum adfectiones delineta. Gummi drach. xii. tragacanthi drach. xii. thuris drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. croci drach. ii. succi hypocistidis drach. ii. paksi scybelitæ sextarium unum. Gummi & tragacanthum contundito & cribrato unumquodque seorsim, et cum modico passum diluito, reliqua uero fracta & præmacerata similiter cum modico passum conterito. Crocum uero in raro laneo panno ligatum, in ollam appendito, in qua reliqua coniecta, ac assidue agitata decoquuntur: deinde extracto croco, et probe contrito, reliqua omnia in pilam coniungantur, & ut cocta sunt cum croco uniantur, & utitor. Alia arteriaca, ex cuius usu sæpe magnam laudem adsequutus sum. Nuces pineas sexaginta, amygdalas amaras delibratas quadraginta, carnem phœnicobalanorum vi. succi radice dulcis scrup. xii. croci scrup. i. myrrhæ scrup. i. tragacanthi scrup. vi. paksi Cretici quantum sufficit. Quibus uero educatione ex pectore opus fuerit, mel & sapa adde. Alia, Andromachi. Pinguedinis gallinæ recentis quadrantem, mellis heminam i. decoque simul, & cum rutæ ramulis agita donec cogatur. Exhibe eam ieiunis, & post cibum, & ad noctem. Sorbitio ad suppressum sonum maxime ab humore: conuenit etiam phonascis. Porros in aqua ad tertias decoque, atque ipsos quidem abijce



abijce, aque uero halice succum ammisce, & mel, & ouorum lutea III. quæ ubi commiscueris ad tertias decoque, & excola: deinde adfusa sapæ optimæ sextario uno, rursus donec cogantur decoque, ac ramulis anethi circumagita. Da ex ea mane & uesperis cochleare unum. Arteriaca necessaria, phonacis comoda: expertus sum etiā eius ualorem ad raucescentes ob humiditatem plurimam. Costi, folij, spice nardi, amomi, piperis, cassiæ, mastiches, cuiusq; drachmas quinque, opij drachmas duas, mellis & succi mororum æqualiter mixtorum quantum satis fuerit. Excipe pharmacū cum eis, quo uiscosa coactio reddatur, & utere. Exhibe sub lingua tenendum magnitudine nucis auellanae: caueto ne nimis solidum facias, ut facilius sub lingua liquecat. Alia arteriaca, ad affectiones asperæ arteriæ, & pulmonis ad reiectātes sanguinem, & omnia uicia manifesta: maxime uero prodest crebrum & rectū anhelitum ducentibus. Scillæ depurgatæ coctæ drac. VI. seminis lini drac. II. seminis urticæ drachmas duas, succi uerbenaçæ exiccatæ drachmas duas, thymi drachmā unā, farinæ erui drach. II. pulegij, iridis, betonicæ, anisi, nasturtij, apij, seminis foeniculi, seminis anethi, piperis, foeni græci, cuiusq; drac. I. excipe melle Attico, exhibe mane & uesperis quātum cochleari accipi potest. Alia, ad arteriæ adfectiones, & pulmonis ulcera, reiectiones puris et sanguinis, destillationes ad pectus, & ad educationem eorum quæ in pulmone coaceruata sunt ualde efficax. Resinæ terebinthinæ, croci, thuris, myrrhæ trogloditicæ, terræ quæ Aster appellatur, cinnamomi, nucum pinearum purgatæ, radicis dulcis, singu. dra. IIII. amomi, tragacanthi, carnis palmarū pinguiū cuiusq; drac. III. spice nardi drachmas duas, cassiæ drachmas duas, costi drac. unam, galbani depurati obolos quatuor, mellis Attici libras sex. Mel & terebinthinam in diplomate decoque, atq; ubi cōdensari coeperint, galbanū præmolitum ammisce, ac donec non inquinari amplius decoque, deinde agitando frigesacito, & cum reliquis cōtusis in pila permisceto. Vsus eius est sub lingua detentæ. Alia, quæ similiter ad omnia prædicta efficax est. Spice nardi drach. IIII. croci drach. I. piperis grana triginta, radicis dulcis drach. I. nucum pinearum depurgatarum numero centum, styracis drach. II. balaustiorum drach. III. tragacanthi drac. I. cinnamomi drac. I. amomi drach. I. thuris drach. I. mellis sesquilibram, aut pasci Cretici heminas VIII. passum in duplici uasculo siue diplomate coquitur ad mellis spissitudinem, & ad reliqua arida in pila trita affunditur. Tragacanthus autem tunditur, cribratur, & diluitur unā cum styrace in uino modico dulci, atq; ita ammisceatur, exhibe ex eo cochleariū unum. Expertus enim sum ambo hæc adscripta magna celebritate probari. Compositio ex capitibus papaueris uaria. Capita papaueris centum & uiginti in aquæ sextarios tres coniecta ad dies quinque macerato, deinde ad tertias decoquito, & abiectis capitibus ad aquam mellis sextarium unum ammisce to, quibus simul ad spissitudinem mellis decoctis, ita ut non diffuant, croci, myrrhæ, acaciæ, succi hypocistidis singu. drach. I. infarcito, & ante somnum delingendum exhibeto. Prodest reiectantibus sanguinem, coeliacis ac disentericis. Ego autem ad huiusmodi ex capitibus papaueris compositionem, quā-

do scilicet ad libram unam aquæ, decem papaueris, capita injiciuntur, prædicta commisceo, & pro pharmaco fluxiones sistente ac repressiuo utor. Alia, ex libris Asclepiadæ, panacea Mithridatis. His qui uocis exercitio utuntur ante et post certamen utilis, facit ad glandularum inflammationes, columnellā laxatam, & ad gingiuas humore turgentes, & ulcera serpentia oris, ad motos dentes, & destillationem, tulsim ueterem & recentem sanguinem spuentes ac sursum reiectantes. Vtor ea aliquādo citra admixtionem, aliquando autem passo aut scybelite uino, aut aqua calida diluta. Etenim ad tonsillarū inflammationes atque consimiles adfectiones utendum est pharmaco hoc diluto: ad eas uero quæ in profundo hærent, immixto & puro. Verum compositio ipsa hoc modo habet. Radices filicis quā crassissimæ diligenter lauantur, donec terrenæ sordes in totum discedant, deinde refrigerantur, in frustra digitali magnitudine dissectæ: ex quibus lib. III. accipimus, & capita papaueris agrestis mediocria centū & quinquaginta, radicis symphyti depuratæ, corticis radicis mandragoræ, rhei pontici, rosarum siccarum, iridis illyricæ, radicis dulcis, balaustiorum, singulorum quadrantem, cassiæ trientem, nardi celticæ sesquunciam, aquæ pluuialis sextarios quindecim. Omnia prædicta crasso modo contunduntur, & per triduum madescunt, deinde sequenti die in diplomate ad tertias decoquuntur, exprimuntur, & percolantur: in huius autem decocti parte, subscripta per diem & noctem maceramus. Sunt autem gummi puri libr. I. tragacanthi pellucidi libr. I. myrrhæ trogloditicæ sextans, succi radicis dulcis sextans, croci sextans, succi hypocistidis sextans, mastiches uncia una. Sequenti deinde die diligenter, & paulatim hæc trita diluimus, & quod superest ex ipso decocto ac expresso liquore, paulatim adijcimus. Et postea uinum scybelites, aut theracum, aut aliud dulcissimum, sextariorum XXXIII. mensura in uas fictile diffusum decoquimus, donec ad mellis crassitudinem redigatur: deinde adiectis etiam tritis omnibus rursus ad coactionem decoquimus, & ablatis utimur. Datur ex hac quātum cochleari excipi potest.

Compositio ex capitibus papaueris, ad tusses humidas, dolore adfectam arteriam, & fauces, & ad destillationes à capite ad pectus: utilis est etiā ad uigilias. Capita papaueris Thebaici mediocria unā cum ipso semine decem, aquæ pluuialis sextarium unum, radicis dulcis parum quiddam, per diem unum præmacerato, deinde donec flaccida tactu fiant capita, decoquito, exprimito, & percolato, ac ad decoctum dimidium eius mellis adijcito, & rursus super prunas ad mellis crassitudinem decoquito, ac utor. Accuratioꝝ huius antidoti adparatus, atq; etiam partim usus prædictus est Sermonem quinto de proprijs ægrorum potionibus, loco. Quod si magis adstringens alui profluuiorum facere uelis, & sanguinem spuentibus commodum, succi rhois rubri drachmas duas adijce, & acaciæ drachmas duas: hæc autem in passo diluta, tum demum quum ab igne ablaturus es pharmacum, in ollam conijce, & parumper feruefieri sine, ac utere, cochlearium exhibens ante somnum.

De destillatione siue catarrho, & narium muco,  
ex Galeno

Cap. LIII.  
Destilla



Destillationis & muci causa est cerebrum, quod quidem à frigore ad frigidā intemperiem deducitur, ab æstu uero calescit & repletur. Vinū quoque ultra modum potatū caput replet, & balnea calidiora, & largior perfusio capitis ex aqua calida, maxime si aliās calidius caput existat: & cibus sanè qui in uentre incoctus perseverat, neque infra excernitur, in caput impetū facit. Repletū itaque caput rursus ad subiecta membra humores demittit: & si quidem ad nares hoc ipsum excrementū defluat, Coryzan siue mucū adpellare consueuerūt, & Latini amplius grauedinē: si uero ad gurgulionē, morbum Vuā appellatū generat. Est autē affectio circa gurgulionē consistens, aut aliās ipsum gurgulionē tumidū facit. Promptissima itaque est ad nares & ad os defluxus delatio, quāuis aliquibus etiā ad oculos, aliquando & ad aures deferatur. Atqui delationem ad os etiā stomachus siue gula excipit, & aspera arteria, atque ipsum adeo arteriæ extremū. Quod sanè extremū, ob ipsum ad se delatū à capite defluxū superhumectatū, in principio rauosam uocem producit, & progressu temporis etiā paruā. Quod si amplius augetur malum, uox ipsa in totum perditur. Nam ipsa aspera arteria unā cū suo extremo permadescit. At si acrior fluxus ipse existat, non tantū uocis damnum prædictæ particulæ patiuntur, sed grauisima etiā erosio accedit, talis naturæ, quales circa cutē accidere sepe uidemus citra ulā externā causam, eoque modo etiā pulmo ipsis exulceratur, uocaturque hæc affectio tabes. Quod si ad gulam & in uentriculum fluxus deferatur, si quidē frigidus existat, in frigidā intemperie corpora perducit, calidus uero in intemperie calidā: exulcerat etiā ea temporis progressu, in principio uero appetitioni nocet & concoctioni. Si itaque frigidus fuerit defluxus, tardas concoctiones & cruditates, ac ructus acidus efficit. Si uero calidus fuerit, in corruptionē adiget cibos, unde nidorose, aut foetentes, aut acide eruptiones producantur, aut etiā alterius cuiusdā quæ nominari nō potest, aut etiā nomē habentis qualitatis. Vbi uero altius penetrarit nocumentum, etiā intestinum ieiunum adficit, & ad colū usque pertingit, atque ad mesenterij uenarum uasa, per quæ ad hepar distributio atque digestio alimenti contingit, aliquibus itaque deiectio appetitus accidit, aliquibus uero appetitiones præter naturā, quas adpellat caninas, aut etiā uitiosorum ciborū concupiscentia, qualis mulieribus prægnantibus pica morbo infestis contingere consuevit. Manifestum autem est & gurgulionem & tonsillas adfici. Quin & parulides & glandulæ, & dentium erosiones, ulcerationesque & putredines oris, ad serosas ex capite in ipsum os destillationes sequuntur. Cæterum uulgus Medicorum aut gurgulionē resecat, aut pharmaca exhibet quæ per asperam arteriā sputi electione in pulmonē dilapsa educant. Alij uero uentris curam gerunt, quemadmodum alij dentium, & oris, aut etiam affectionum in naribus, aut oculis, aut auribus curam moliuntur. Principium inuentionis Galeni. Melius autem erat, mea quidem opinione, uelut fontem malorū excindere, sanato uidelicet capite, quod si impossibile sit facere, ob uehementiam naturalis intemperiei, omnino tamen eius saluti consulere oportet, indicatione ex figura ipsius accepta quomodo ei subueniri possit: non enim mox, ueluti aliqui Medici omnibus capi-

tibus semper ex thapsia & sinapi cataplasmata adhibent, sic et te facere uolo. Etenim si à calida intemperie caput uexatur, omnia calida pharmaca nociua existunt. Oportet itaque ipsos balneis multis calidis potabilium & dulcium aquarum consolari, simulque generatos in capite uapores calidos discutere, & temperaturam omnem in melius mutare. Noctius autē est eis usus aquarum natura sua calidarum. Quæ cunctæ enim sulphurulentæ sunt, & bitumē olent ob caliditatem suam, contrarię sunt capitibus natura calidis. Quæ uero aluminosæ, coarctatione sua caput offendunt: uerū calidas dulces non adpellamus sua natura calidas: neque enim inuenire est quæ suapte natura calidæ existant, ac non aliqua medicamentaria qualitate participant. Qui uero caput uehementer calidum & perustū habent, & ob id assidue à destillationibus uexantur, his melius est hora æstiuā ex rosaceo ungi, ex solis rosis et omphacino oleo citra spissamētorū adiectionē adparato. Quædā autē capita propter calidiorē arteriarum temperaturā, tū uerrigine, tum dolore apprehenduntur: in quibus etiā arteriarū incisione utimur. Quare considerare oportet præcedentē destillationis causam, & præhabita diætā, atque ita remedia contraria afferre: in uniuersum autē pauco cibo & quiete utendum est, uitato etiā frigore & calore: si uero cibi incocti amplius in uentre innatent, ad uomitū æger est inhortandus. Philumeni. Valde utile est his qui destillationē patiuntur, si eorū plantæ pedis cū pice in oleo plurimo dissoluta constanter fricentur, ex eademque inguina & sedes perungantur, nares uero ex thure & myrrha cū uino & oleo contritis, ac ad mellis crassitudinē reductis illinantur, & unguentum irinum simul naribus instilletur. Melanthium etiam torrefactū linteolo illigatum odorent, aut hedychroō manibus teneant & assidue odorēt, aut cyphi eodem modo. Cōuenit etiā inflammationē arcetia emplastra fronti imponere, uelut est Icelię, & emplastrū oxerū adpellatū, itemque barbarū cruentis uulneribus destinatū, & athena. Gargarissent autē assidue passum scybelites, aut sapā calidā: sorbitionibus uero utantur decocto hyssopi, ficuū & nucū pinearū, atque iridis, itē halica ex passo decocta. Si uero ab his nihil leniatur destillatio, neque tamē amplius augetur, sed eodem modo ad plures dies persistat, præsentissimū auxiliū capitis irroratio existit, maxime in æstate, & capitis temperatura calidiorē. Oportet autem in balneis ex alto frigida aqua delabente caput subdere, ut uiolentum inde sustineat insultū: euectigio enim densitatem dissoluit. Animaduersionē tamen habere oportet, an thorax inde facile offendi possit: consuevit enim promptē à capite frigiditatem transsumere ac fortissimas uexationes perferre. Porro diuturnas destillationes foris clyster sanat, aut uomitus à raphanis ieiunis factus, aut purgatio exuberantis humoris, & irrigatio capitis ex unguento irino, aut optimo nardino. His uero qui cōtinua & inueterata iam destillatione adficiuntur, caput radere oportet, & factis scarificationibus bituminosa emplastra imponere: pharmacis autē deglutitis utēdū huiusmodi. Eclegma ad destillationē. Mellis sextantem, butyri recentis unciam unam, decoque, & in duas partes diuisum delingendum exhibe, his qui educatione opus habent. Manducatio ad eandem. Semen hormini, semen papaueris nigri, semen lini

torre-



torrefactum æquis portionibus cōtunde, & cribro excute, melleq; cocto excepta commanducandam mane exhibe. Probè etiā ad destillationes facit antidotus ex capitibus papaueris soporifera, ante somnū exhibita: etenim somnū dulcē infert, & reprimi influxū. Eius adparatus paulo antè inter arteriacas compositiones dictus est, & in quinto similiter Ser mone de proprijs ægrorū portionibus loco. Cata potiū ualde celebre ac dolorē leuās. Styracis dra. vi. myrrhæ dra. i. & dimidiā, terebinthinæ drac. ii. opo panacis dra. ii. iridis dra. ii. piperis albi, spicē nardi, nitri, seminis hyoscyami, opij, cuiusq; dra. i. arida cō tundito ac cribrato, reliqua uero in pila citra liquo= ris admixtionē contusa simul committito, & grana in erui magnitudinē informata ante somnum deglu tiēda exhibeto, neq; quicquam ultra sorbitiones ad mittito. Dantur ad summū grana iii. medium iii. minimum ii. Aliud, quod etiā dolorem leuās, tum tussis, tum destillationi opitulatur. Styracis, drach. iii. myrrhæ drachmam unam, opij drach. i. galbani drac. i. contunde in pila, & sapa affusa subi= ge, & catapotia erui magnitudine informa, quorū similiter ad summū iii. exhibe, medium iii. mini= mū ii. absorbeant etiā insuper passi calidi diluti cya= thos duos. Asclepiadē remedium. Pyrethri, costi, utriusq; drach. ii. piperis albi drach. i. contusa & cri brata repone. Vsu uero expetēte apprehēsis naribus pharmacū adtrahere præcipe. Aliud. Piperis dra. ii. seminis urticæ drach. ii. croci, myrrhæ, costi, cuius que drachm. i. Vtere ut dictum est. Caseus autem te ner & recens comestus utilis est, & cauliculi brasi= cæ crudi à ieiunis comesti, similiter & brasiica deli= cator cocta & comesta. Qui uero calidiori prædicti sunt tēperatura, lactucæ cauliculos parumper ferue factos comedant, in posca uero ipsos intingant.

De tussi.

Cap. LIIII.

Tussis causæ uarię sunt. Nam & humor à capite ad as= peram arteriā destillans tussim efficit, & asperitas so la pelliculæ asperā arteriā intrinsecus ambientis tuf= sim iritat: qui præterlabitur etiā cibi ac potus tuf= sim mouēt, & lumbrici stomachū infestantes, tussi culas paruas excitant: & acris humor stomachū per turbans, ac iritatuam aliquam qualitatem ad fau= ces demittens, imaginariā tussim producit, quemad= modum etiā in his qui stomachi morsum sentiūt, & saliuæ ad eū influxu uexantur, euenire solet, quū nihil molesti iuxta asperam arteriam obuerfetur. In temperies quoq; frigida respirationis instrumento= rum, tussis causa existit: uerum hi moderate ac mini= mē uolenter tussiunt, adeo ut non solū per spiritus compressionē, retinere queant & impedire tussim, sed sanare etiā sæpius, per respirationis inhibi= tionē frigefactas particulas calefaciēdo. Signum au= tē ob solam intemperiem frigidā tussientium est, si per crebras inspirationes iritentur, frigiditate uide= licet exinde intensiore facta & aucta. Quādo igitur hi leniter inspirant ac aērē adtrahunt, & in calida do mo uersantur, parū uel omnino nihil tussiunt. Quæ uero cum titillatione partium, ab utraq; palati par= te contingunt tusses, palām ostendunt defluxum à capite ad asperam arteriam deferri, itemq; ad pul= monem. quod si nihil expuant sic adfecti, tenuē esse defluxum indicat, qui expulsionē spiritus dissectus, præ tenuitate sua rursus fluxum reflectit, id uero ex

humore per sputū reiecto manifestè apparet: crassio rē enim priore habet compagem, etiā si sit à spiritus impulsione reiectum. Manifestum autē est, quod hu mor in pulmone & thorace deſentus, in morbo late rali, inflāmatione pulmonis, & iabe, maxima tussis causa existit. Medemur autē tussi à tenui defluxu fa= ctæ, per antidotum ex papaueris capitibus inspissan tes, aut per alterius cuiusdā pharmaci dolorem leuā= tis usum, & per cibos boni succi. Si uero crassus aut uiscosus fuerit affligēs humor, per ea quæ extenuāt & discindunt medebimur. Instrumentorū autem re spirandi frigiditatem per calefacientia emendamus. Quæ uero ab asperitate fit, per lenientia & mordaci= tatē arcentia sanatur, qualia sunt ex arteriacis cōposi tionibus simpliciora. His itaq; præexplicatis, ea quæ à ueteribus descripta sunt ad tussim remedia subne= ctemus. Nos uero ad præscriptā methodum animū conuertentes, atq; uniuscuiusq; simplicium pharma corum uires docti, facillè ad quamcunq; affectionem cōueniētia remedia afferemus, etiā si à priscis indefi= nitè sint descripta. Remedia autē hæc sunt. Styrax, nucis auellanæ magnitudine deuoratus, tusses sedat ac destillationes. Vtilis est etiā ad raucedinem.

Aliud. Ficus siccas pingues in uino dulci meraco madefactas, unā cū uino deuorādas exhibe, hoc tuf= ses mitigat. Terebinthinā & mel coctum delingēda præbe, & uinū dulce dilutū insuper absorbendū: hoc enim attenuat, & educit. Aliud. Filicē cōtusam & & cribratā passo instar polētæ insperge, & absorbē= dā exhibe. Prodest etiā sanguinem reiectantibus.

Aliud, quod ad tusses noctu molestiā exhibentes cōducit. Mētæ ramulos tres tritos, affuso aceti co chleari, ante somnū absorbēdos præbe. Adiuvat cō= coctionē, stomacho utile est, & crassitiem discindit.

Aliud. Nucū pinearum torrefactarum, amyli, radice dulcis, seminis urticæ, seminis lini, cuiusque sextantem, iridis, piperis, hyssopi, seminis nasturtij, amygdalarū amararum, singulorū unciam unā. Ex cipe melle probè despumato, & præbe ex eo cochlea rium mediocre. Compositio ex marrubio ad tuf= sim. Marrubij sextantem, hyssopi unciam i. iridis drac. iii. pulegij drac. iii. calaminthæ montanæ drach. iii. bulborum scillæ scrup. vi. nucem unam pineā bonam & integrā, caricas pingues v. aquæ sextariū unum & dimidiū, mellis heminā unā, utere. Ecde= gma tussientibus aptum. Nucum pinearū repurga= tarū drach. xii. palmarū pinguium dra. xviii. iridis dra. xii. seminis lini torrefacti drac. viii. tragacanthi drach. xii. amygdalarum dulcium delibratarum drac. xvi. mellis despumati quantum sufficit. Traga canthum in uino dulci modico maceratam & dilu= tam, primum cum despumato melle decoquito, atq; ubi semel ebullierit, reliquis in mortario probè con tritis affundito, & utitor, cochleariū exhibens mane & uespere de digito delingendum. Mellis enim tan= tum adijcere oportet, ut delingibile pharmacū fiat.

Aliud eclegma ad tusses recentes. Vini dulcis ueteris sextariū unum, mellis Attici libram unam, decoque, cum rutæ ramulis assidue agitando, exhi= be ex eo mystri i. mensura. Est etiā utile stomas= cho. Alia remedia ad tussim cōducentia. Copta rium, hoc est, placentula, tussi accomodata. Semi= nis lini cōtusi & cribrati, uuæ passæ pinguis & exa= cinatæ, cuiusque sextarium Italicum unum, nucum pinea



pinearum torrefactarum, nucum auellandarum repurgatarum, singulorum sextarium dimidium, piperis sextantem, myrrhae unciam unam, croci unciam unam, mellis sextarios quatuor. Semen lini contusum cum melle decoquito, atque ubi coactum fuerit & inspissatum, reliqua optimè contrita ammisce to, & simul unito. Exhibe ex eo magnitudine nucis auellanae. Ad tussim inueteratam remedium optimum. Cumini, piperis, seminis urticae, cuiusque unc. i. mellis despumati sextarium i. contrita cum melle subigito, ac parumper feruefacito, reponito, ac uti- tor ex eo præbens cochleariū delingendū. Aliud admirabile. Piperis, pulegij, hyssopi, calaminthæ, cuiusque sextantem, petroselinū unc. i. mellis despumati sextarium i. da cochlearium. Aliud simplicius bonum. Mellis quadrantem, butyri recentis quadrātem, cumini quā tenuissimè triti drach. iiii. Mellis prius despumato butyrum ammisce, & simul calefactis cuminum insperge, & paulatim delingendum cochlearium unum exhibe. Aliud, ad tusses pituitā repurgans. Hyssopi unc. i. pulegij sextantem, iridis, sinapis, seminis nasturtij, anisi, piperis, singulorum un. i. tusa ac cribrata, melle despumato sufficienti excipe, & cochlearium exhibe. Hyemis autem tempore, & febre non infestante accepturum, piperis sextantem adijce, & pro aniso, foeniculum aut cuminum, & pro nasturtio sinapi, ut sit sinapis sextans siue unciae duæ. Aliud, ad diuturnas tusses. Comæ hyssopi, pulegij, de superiore anno, ammi, piperis, erui rufi decorticati, iridis cuiusque sexuncem, spicae nardi drac. iiii. terebinthinæ trientē, butyri recentis sextantem, mellis despumati sextarios ii. Butyrum & terebinthinā cū melle liquefacito, ac reliquis unito: utere exhibitio cochleari paruo. Aliud, thoracis affectionibus cōmodum. Lomentū fabacei fricti ac tenuissimè triti septuncē, seminis lini septuncem, iridis contritæ quadrantē, nucū pinearū torrefactarū dra. ii. pulegij triti dra. ii. seminis urticae dra. i. piperis dra. iiii. mellis despumati choenice m. Mellis despumato lomentū insperge, ac parūper decoque: de inde reliquis in mortario ammixtis utere. Aliud, Acoli, Hyssopi, pulegij, ammi, piperis, erui rufi, iridis, cuiusque dra. vi. terebinthinæ drach. iiii. spicae nardi dra. iiii. butyri recentis sextantem, mellis despumati sesquialibrā, utere. Aliud, ad tussim ex sty race. Amomi sextantē, cassiæ sextantē, styracis sesquialibrā, spicae nardi sesquialibrā, croci unc. i. piperis unc. i. mellis despumati sextarium i. exhibe cochlearium.

Ad tussim sicā. Siccam tussim sanant etiā paulo antè præscripta pharmaca. Aliquādo autē & aquae feruefactæ sorbitio. Qui enim ob pituitæ crassitudinē nihil educere possunt, ab humectantibus plus emolumentū sentiunt: maximè eo quod quodammodo simul extenuatoria participant facultate.

De pharmacis dolorem leuantibus & simul con-  
ferentibus tussi. Cap. LV.

Hocce pharmacorum dolorem leuantū genus, hi qui ante ætatem nostrā fuerunt, cōposuerunt, tussietibus & sanguinē reiectantibus præcipuè conducens, atque etiā his, qui ultra has affectiones tabescunt: itemque ad alios dolores & affectiones quæcunque circa pulmōnē & pectus, ac asperā arteriam, reliquaque interiora mēbra cōsistunt, præterquā quæ propriè colicæ appellantur. Differunt enim hæc à colicis similiter anody

nis, hoc est, dolorem leuantibus appellatis, tū aromati & odoratorū seminū, tū eorū quæ urinā cient admixtione. Colicæ autē facultates ac cōpositiones his uehementiores sunt, excellentē uim stupefactoriam complexæ, ob multitudinem uidelicet eorum quæ refrigerandis naturæ existunt, uelut est hyoscyami semen, & cicutæ, papaueris succus, & mādragoræ cortex: quibus sanè ad colicos necessariò ob doloris magnitudinē utimur. Atqui in thoracis affectionibus aliqui styracem & crocum ammiscuerunt: aliqui autem calefacientia: alij etiam aromatica, & cum pauca uel adstrictoria exiccantia: quidam etiam nobis familiaria, uelut anisum, apium, foeniculum, daucū, & seseli, quæ uehementiū pharmacorum uires & inuicunditatem obtundunt, ampliusque urinā expellunt: quidā etiam ea quæ asperitates leniunt addidere, uelut est tragacanthus & radix dulcis, ac uinum dulce. Quæcunque autē ex eis de pharmacis stuporem inducentibus, minus participant: ea etiam tabidis exhibemus. Sunt autem à ueteribus cōposita doloris leuamenta huiusmodi. Catapotium. Pharmacum ad tussim accomodatū, inueterata maximè existēte affectione. Efficax est ad diuturnam destillationem, dolorē capitis difficulter spirantes, & inflammationes pulmonis, ad uesciæ quodque ac uulue affectiones, inscribitur Panacea, ab alijs etiā Stichus. Myrrhæ, opij, piperis, styracis, castorei, galbani, æquales partes cū sapa dulci subige, & in catapotij figuram redige, ac ciceris magnitudine exhibe: absorbeat autem à sumptione aquæ mulsæ cyathos duos. Harmonia.

Aliud pharmacū uehemēter efficax quod harmoniæ adpellatione inscribitur: ualet ad destillationes, & in exuperabilem defluxū. Styracis, castorei, piperis, cardamomi, cuiusque drac. iii. opij, myrrhæ, seminis hyoscyami albi, cuiusque dra. iiii. passo probe cocto excipe, & catapotia ciceris magnitudine informa, & ante somnū præbe deuorāda. Alia confectio, ad tusses diuturnas egregiè & cōcinnè ualēs: itemque ad humētes & ob humoris crassitudinem diu durantes, quæ Symphonos adpellatur, & febrē optimè sedat. Ea omnes ueteres celebres usi sunt. Piperis, opij, cardamomi, cuiusque drac. i. croci, sulphuris uiui, myrrhæ, seminis hyoscyami albi, cuiusque drac. iiii. mellis cocti cochlearia iiii. Hoc enim modo nos apparamus: uerū sunt qui gentianæ, & dauci, cuiusque drac. ii. ammiscēt. Alia, ad tussim & tabē Isofathmos appellata. Folij, petroselini, hyssopi, rosarū siccarū, anisi, opij, croci, costi, seminis hyoscyami, myrrhæ troglodyticæ, spicae nardi, iridis, æquales partes cū melle sufficienti subige, datur fabæ magnitudine ad noctem:

Alia, isotheos adpellata, ad tussim, tabem, omnes morbos internos, & certo circuitu affligētes affectiones. Spicae nardi dra. ii. myrrhæ dra. i. croci, costi, piperis albi, cuiusque dra. i. galbani dra. i. secis opobalsami, cinnamomi, mandragoræ succi sicci, castorei, cuiusque dra. ii. seminis dauci sesquidra. cassiæ sesquidra. mellis despumati quātū satis erit. Facit ad dolorē stomachi, icoris, pulmonis, oculorū, sanguinis reiectionē, abscessus dysentericos, uoluolū, renū ac coxendicū affectiones, difficulter spirantes, dolores laterū, unice tamē iliorū ac præcordiorū, profluuiū muliebre, & muliebres suffocationes. Prodest cōtra letalia uenena ante & post cibū sumpta, & ad omnē sanguinis eruptionē cū frigida, ad uiperæ & phalagij mor-  
sus in



sus in uini cyathis III. quartanarius ante febris accessione datur ex ea oboli II. cum uini cyathis II. sed prologo tamen antea aegro. Sanat aegre spirantes, & qui nisi erecti spiritum ducere non possunt, & anhelosos, etiam si iam ad multos annos affectio durauit. Sanat quoque antiquas à capite ad pectus defluxiones.

De suffitionibus.

Cap. LVI.

Quaquam antea sufficientissime de suffitionibus dictum sit, in Sermonem De clysteribus & euacuantibus, ac alijs quae aegris offeruntur, qui sane tertius huius operis fuit, dicitur tamen nunc quoque, sed paucis. Pastillus suffumigabilis tussientibus & orthopnoicis commodus. Abrotoni, sandarachae, sinapis, cardamomi, & quales partes contundito & cribrato, & cum aqua in pastillos redigito ac suffito, ita ut aeger ore fumum suscipiat. Alius pastillus. Sandarachae sextantem, terebinthinam sextantem, costi scrupulos sex, folij scrupulos VI. mastiches scrup. VI. laseris scrupulos III. piperis grana XL. redige in pastillos ac utere eodem modo. Alius. Castorei, sandarachae, galbani, sulphuris uiui, colophonis, propolis, terebinthinae, mastiches, croci, chamaeleucas aqua les portiones, cum aqua in collyria redige, & ipsa per infundibulum suffito. Si uero non adsit chamaeleuce, his conyzam parua aut capparidis corticem adijce. Aliud bonum suffumigium, per experientiam à nobis inuentum, quatuor speciebus constans. *Styracis*, terebinthinae, sandarachae, mastiches, & quales partes excipe, ac similiter utere. Creditur anhelosos & purulentos sanare: itemque tussim & laterum affectiones, quemadmodum etiam ea quae paulo ante hic sunt praescripta, atque ea quoque quae tradidimus in tertio Sermonem. Epithema ad tussim optimum, ex sertula campana. Sapsuci, sertulae campanae, praelij, iridis, cuiusque sextantem, myrrhae unc. I. thuris quadrantem, resinae pinus lib. I. olei irini lib. I. utere.

De orthopnoicis, anhelosis, ac aegre spiritum ducentibus. Ex Galeno.

Cap. LVII.

Qui frequenter respirant citra febrem, quemadmodum solent à uehementi cursu fatigati, eos asthmaticos, hoc est, anhelosos, Medici uocare consueuerunt, ab accidente uidelicet, hoc est, anhelando: eosdem etiam ab altero accidente orthopnoicos adpellant: desident enim ac pectus erectum habere uidetur, ob timorem, ne suffocentur, & stratum quoque iuxta superiores partes, ad quas pectus ipsum reclinatur, erectius sibi adparant, ne dormientes strangulentur. Inspiratio enim minor ipsis contingit, quam respirationis frequentia ex postulat, quamuis pectus plurimum ipsis diducatur. Ex quo manifestum fit, coarctationem locorum praeter naturam intrinsecus adesse, cuius etiam manifeste aegri sensum percipiunt. Fit autem coarctatio locorum inspirationis, quum aut crassorum & tenacium humorum multitudo pulmonis bronchia obstruxit, aut tumor quicquam abscessui similis in ipso consistat. Similiter autem difficulter spirant, qui asperam arteriam à multa destillatione habent repletam, aut quadam defluxione ex uterinis locis acruatim in ipsas arterias delabere. Distinguuntur autem inter se haec affectiones: nepe quod destillatio etiam sanis ex manifesta causa repente accidit, in totum ferè citra febrem concomitantibus etiam proprijs destillationis signis. Si uero tumor abscessui similis in pulmone fiat, necessario febris consequitur, neque ita diu post, inflammatione

in pus transmutata, pus reijcitur cum tussi. Si autem crudum tuberculum gignatur, uelut Antipatro Medico contigit, iuxta leues pulmonis arterias, hi neque grauitatem magnam sentiunt, neque ab orthopnoea in tantum infestantur. Qui uero proprie orthopnoici & difficulter spirantes adpellantur, in totum febrem non habent: grauitatis autem sensus eis contingit, neque quippiam purulentum per sputum reiectant. Porro curatio praedictarum affectionum quiddam commune habet, quiddam etiam cuique proprium. Commune quidem ut superflua substantia humoris has affectiones generatis consumatur, & expellatur. Proprium uero, ut si à crassis & tenacibus humoribus fiant, per extenuantia & incisua pharmaca consumptio fiat: si uero à tumoribus abscessui similibus affectiones fiant, per extenuantia & desiccantia consumantur: quae curatio omnibus in profundo corporis abscessibus communis existit. Vini autem potio ambabus conuenit, tenuis saltem temperaturae, in uniuersum autem paucus potus conuenit, quibus abscessus alicubi adest, multus uero, quibus bronchia tenacibus & crassis humoribus sunt obstructa. Etenim repurgantia hos humores pharmaca necessario tusses commouent, uerum non facile per sputum reijcitur ob crassitudinem id quod repurgatum est: humectatione igitur multa indiget, quo facilius efferatur: & ob id sane largior potus anhelosis est exhibendus. Pharmaca uero eis conueniunt incidentia citra uehementem calefactionem. Crassi enim & tenaces humores à uehementi calore uiscosiores redduntur, glutinosi quoque, & ut difficulter auelli possint: quapropter maxime prodest eis acetum scilicet linum, & ipsa quoque scilla assa cum melle trita & delincta, & acetum mulsum ex ea adparatum. Maximum autem remedium inquit Archigenes, purgatio frequentior existit per pharmaca fortiora: & uomitus à radicibus, per interualla suscepti. Cataplasmata uero ex ficibus & ordeacea farina: magis uero ex loliacea habente resinam & mel ac ceram ammixta, infarciri potest etiam ei iris & manna. Malagma ta autem conueniunt, quaecumque exulcerant cutem & attrahunt saniem, quale est Cissophontis, & quod constat ex baccis lauri, & quod ex semine rosmarini constat, & emplastrum ex herbis, & quod icesium adpellatur, itemque quod uocatur Thraseae. Quod uero cyzicenum emplastrum dicitur, si irini cerati equalem sibi portionem assumat, & uniuerso pectori imponatur, humiditates consumit, & habitum corroborat. Omnium autem conuenientissimum huic affectioni hocce est, inquit Archigenes. Emplastrum nigrum Archigenis. Ceræ lib. I. resinae pinus siccae lib. I. iridis sesquilibram, bituminis lib. I. picis lib. I. aeruginis unc. I. myrrhae sexuncæ, thuris sexuncæ, radicis cucumeris syluestris, centaureae, lapidis asij, styracis, culusque sextantem, misyos crudi sesquiunciam, chalcidis crudae sesquiunciam, salis ammoniaci unc. I. galbani, terrae cimoliae, terrae ampelitis, cuiusque unc. I. olei lib. II. aceti lib. I. aut ut ego soleo lib. II. styracem cum modico oleo liquefactum in mortario per bene coterem, metallica uero cum aceto dissolue, herbas autem contunde, & cribro excute, liquefactis uero quae eliquari possunt, & percolatis, ac ab igne ablatis, contrita adijce, atque herbas insperge, omnibus autem simul unitis & emolitis utere. Hoc sane multos occultos abscessus discutit, & in uapore resoluit, alios autem aperit: quicunque autem

aut febricitant



autē iā rupti sunt, & fluidi tamen adhuc permanēt, eos mirabiliter exiccat: eiusmodi enim pharmacis uix aliud praeſtantius reperiri poſſit. Cōueniens eſt etiā praedictis affectionibus Amythaonis epithema, atq; eo adhuc magis Polyarchion, maximē tempore coarctationis locorū. Pectus uero cū urticis cōfricetur accedatur, ac ſcilla decorticata fricetur, dein de lauacro ac oleo calido loci rubefacti curētur: aſſidue autē lenioribus ſolutiuis aluum emollire oportet, quale eſt, cnicī acetabula duo optimē contuſa, & cum ſero lactis decocta, ita ut percolatum ſerum, & modico melle permixtum bibatur. utendum eſt etiā ex thymo, laſere, & pipere ſalis confectionibus, quibus addita eſt ſcammonia, aut etiā his quae fiunt ex roſmarino. Ego uero etiā herbae ſabine optimum uſum expertus ſum, ſi per ſeipſam drach. pondere trita ſumatur, & ſequenti die duarum drachmarū pondere, tertia triū. In aliquibus autē & quarta die uſq; ad quartā drachmā pondus auxi. Quod ſi bene procedat purgatio, ſimulq; cruēta educat, non eſt quem nō melius ſpirātem in poſterū reddat. Porro interiectis duobus aut tribus diebus, abſinthium potandū exhibui, maximē ſi ſtomacho aeger langueat, quod ſi non contingat ſtomachum languere, irim bibēdā dedi, aut abrotonū, aut caſtorium ex aceto mulſo. Mirum in modum autem efficax eſt, quod ex elaterio cōſtat, & octaobolon appellatur. Elaterij aereoſos II. ſpumae nītri obolos III. ſinapis drach. I. haec in aqua diluta in octo catapotia informo: manēq; duo, tantundemq; uelſperi exhibeo. Purgat enim citra moleſtiā ſupernē, aliquandiu quidem permanēs & ſoluens. His uero qui robuſtiores ſunt, poſt triū dierū ſpatiū ruruſ exhibeo. Atqui quae ex colocynthide cōſtat hiera noſtra, hoc eſt, Archigenis, aſſidue praebita mitiorem ſpirandi difficultatē correxit ſaepiſſimē, atq; id breui & perfectē. Verū ſi magis in profundo haerit, auxiliatur cum aceto mulſo ſcillitico potata. Aliud ad difficulter ſpirantes, qui etiā aſthmatici appellantur, Ariſtolochia clematidis, abrotoni, ſulphuris uiui, ſeminis rutae agreſtis, caca-minū thymi, ammoniaci thymiamatis, aequales partes cum aceto tritas in paſtillos redige, & ex eis obolos III. exhibe cum aceto mulſo ad triduū. Alia remedia aſthmaticis commoda, ex Aſclepiade & Dioſcoride. Ariſtolochia rotūda cū aqua bibita, anhelos auxiliatur: itē centaureae maioris radix, & minoris ſuccus: & ſtoechas trita ac cum aqua potata, & ſphōdylī ſemen, & calaminthae montanae coma, & hyſſopū, & iris, ac melanthiū, & radícula & uitis alba, itē aſellos, qui & millepedae appellātur, ſub aqua rīo uafe ſtabulātes, ſextarij meſura in fictile uas cōiectos, ad carbonē ignitos torrefacito, atq; ubi inaluerint, terito, ac melle exceptos cocto, ante & poſt cibum duorum cochleariorū meſura delingendos exhibeto. Aliud. Scillae crudae ſuccū exprime, & cum eiufdem meſurae melle permixtū ad prunas decoque, eiufq; cochlearia duo delingenda praebe ante & poſt cibum. Summē autem hoc prodeſt, euidentēq; eiuf rei periculum feci, inquit Archigenes. Aliud, Archigenis. Radicis centaureae maioris drachmas VI. petroſelini drach. VI. ammoniaci thymiamatis drach. III. ſulphuris uiui, bituminis, cardamomi, radicis panacis, ſeminis urticae, iridis Illyricaе, cuiuſque drachm. II. thuris, myrrhae, caſtorei, ni-

tri, ſagapeni, abrotoni, poliī, chamæpityos, ſaluig, cuiuſq; drachm. I. piperis albi drach. III. Haec omnia trita cum melle miſcentur deſpumato, dantur ex hoc oboli IIII. Etenim aſſidue potatum hoc, quibuſdam perfectē medetur, citra moleſtiā autē efficax exiſtit, dato hoc cum hydromelitis calidi cyathis IIII.

Aliud, quo etiā ego uitor, ad multos uſus cōmodū. Scillam ſuluam manum magnitudine ſua implētē, fermento obductam, in furnum cōſicco, ut quā optime aſſetur, deinde ubi molliſſima facta fuerit, ſuperficie eiuf exuſta reiecta, reliquū optimē contero, atq; ei quantum trimembri ſeſſione facta, duae aſſatae ſcillae partes ponderant, tantum farinae erui albi adſicco, & ammoniaci thymiamatis drach. IIII. radicis panacis drach. IIII. iridis, & abrotoni, & acori, cuiuſq; drach. II. piperis grana XX. haec omnia ſi mul trita & unita in orbiculos digero pondere ſeſquiobolares: ex eis autem drach. I. aut etiā obolos tres, aut duos, cum tribus cyathis lactis aſinini recēs mulcti, aut aquae mulſae exhibeo. Pueris uero tantū unum orbiculum praebeto. Aluum hęc meſura mouet: quod ſi hac amplius quiddam exhibeas, & urinā cies, & cōpacta ac inſtantē mali irritationē diſſolues: etenim & comitiales ſanat, & uuluā ſtrāgulatā, & lumborū languidos dolores, & febres debiles ac per circuitum repetentes. Cū aceto menſes ducit per craſſitudinem ſuppreſſos, ad quos cōſequuntur ueritigines, interceptiones uocis, contractiones, dolores articuloſū, pigrities, & ſpirandi difficultas. Eueſtigio enim ſanguinem euellit, & ab omnibus moleſtijs liberat: quare tenuitatem huius pharmaci ne contemnas, ſed abundantem uirium eiuf ſupelleſtilem, qua ſi per manus a maioribus traditam aſſumas. Alia porio ad ſuſpirioſos. Poliī, abrotoni, caſtorei, chamæpityos, ammoniaci thymiamatis, aequales partes melle excipe, & ſabae magnitudine exhibe. Quidam ſpumae nītri albi cochleare, in aquae mulſae cyathis tribus exhibuerūt. Aut hoc modo. Spumae nītri drach. IX. piperis drach. I. laſeris drachmam unā, da cochleare cum aqua calida. Alia. Caſtorei drach. VII. ammoniaci thymiamatis dra. VIII. piperis grana XL. excipe paſſo, & ſabae magnitudine praebeto in aqua mulſa. Alia. Abrotoni drach. II. radicis bryoniae drach. VIII. rutae horreſis drach. VIII. caſtorei drachmas quatuor, artemiſiae drachmas IIII. epithymi drach. IIII. datur ex ea ſcrupulus unus & dimidiuſ cū aceti mulſi cyatho I. Alia. Iridis drach. VIII. ammoniaci thymiamatis drachmas IIII. datur drach. I. cū hydromelitis cyathis tribus. Alia. Herbae ſabinae, his qui integra aetate conſiſtunt, ſcrup. VI. alijs uero ſcrup. III. buryri ſcrupulos XII. mellis ſextatē. Praebeto delingēdam ad dies III. & intermiſſione per triduum facta ruruſ praebeto. Paſtillos doloris leuamentū orthopnoicis & aegrē ſpirantibus praebens. Opī drach. I. ſulphuris uiui, plātaginis, ſeminis hyoſcyami, ſucci radicis dulcis, ſtyracis, myrrhae, thuris, terebinthinae, cuiuſq; drach. II. croci drachm. I. cum uino maris experte contere, ac in paſtillos triū ſcrupulorum digere, quos bibendos exhibe. Porro ſi radicis dulcis ſuccus non adſit, ipſam radicem fractam ac tuſam ſatis diu decoquito, atq; hoc totū cum decocto eiuf committito. Alius, Andromachi, ad idem. Scillae aſſatae, ſulphuris uiui, bituminis, aequales partes, melanthij drachmas II. caſtorei drach.



drach. ii. anisi obol. iiii. cum aqua pastillos informa trium aut quatuor scrupulorum: exhibe ante somnum, cū aquæ calidæ cyathis duobus. Catapotium, suspensio dolorum leuans, Rutæ uiridis sextantem, styracis sextantem, terebinthinæ sextantem, opij drach. iiii. ex his catapotia siliquæ pondere singula informa, tria q̄ ante somnum exhibe deuoranda, à sumptione autem ebibant aquæ calidæ cyathos duos. Remedium pulchrum Philagrii, ad anhelosos. Radicum symphyti in petris nascentis, radicis centaureæ maioris, iridis illyricæ, singulorum sextantem, aquæ sextariū i. radices fractas per biduum in aqua macerato, deinde ad tertias decoquito, & percolato, & tantundem mellis decocto adijcto, rursum q̄ donec cogatur decoquito: deinde rhei pontici contusi ac cribrati unc. i. inspergito ac unito. Exhibe circa primam horam diei cochlearia duo. Quod si non adsit rheon, centaureæ maioris radicem contusam & cribratam uncia pondere iniice, aut eodem modo radicem symphyti. Hocce pharmacum pulmonis & thoracis firmitatē & robur præbet, simul q̄ humores ad eū delatos repurgat, desiccet, & expellit. Aliud, ad orthopnoicos. Boli armeniaci drach. i. cum uino diluto bibendam præbe. Ad tussis autē inde sequentes antidotum, Isotheū appellatam, paulo antē inter tussis remedia descriptam, exhibe ante somnum nucis auellanae magnitudine cū aqua mulsa. Asiduus enim huius antidoti usus in totum ab hac affectione liberat, etiam si fuerit inueterata: confidenter itaq̄ ea utaris. Quod si non adsit, pæoniæ antidotum præbe: quæ ipsa quoq̄ si haberi non possit, eam quæ zopyrios appellatur, quarū descriptiones in Sermone De colicis habentur. Suffusiones etiā eis sunt commodissimæ: de his in tertio Sermone plenissimè dictum est, & paulo antē inter remedia tussis. In earum autem usu undiquaq̄ stragulis contegantur, atq̄ ore sedulo hiantes fumū fortiter admittant: mucus enim & lacrymæ multæ sputū q̄ uberatim ducuntur, & per uehementem tussim pituita uiscosa ex profundo effertur. Verum quod latere te nolim, antequam ad eiusmodi rerum ac lancinationum adhibitionem perueniatur, uentrē subducere oportet, uel per clysterem, uel pharmacū solutiū. Profunt etiam suspensio fricationes pectoris, ex pumice cum nitro, fece uini uista, cum flore lunci odorati. Cuius generis & hoc est. Auripigmenti, pumicis, spumæ nitri, cuiusq̄ unc. i. alcyonij sextantē. hæc contusa & cribrata cum unguento aliquo calorigo commisceto, pectus q̄ & dorsum donec ignescat confricato, ex frequenti enim huiusmodi perfrictionis adhibitione spirandi difficultatē & tussim, omnē q̄ purulentam pectoris affectionem propulsabis. Cæterū inueterato malo, & medicina omni frustra adhibita, ad uisionem confugiendū erit: itaq̄ iuxta medium commissuræ clauicularum, utrinq̄ una crusta inuratur, cum cautione tamen ad motis manibus & distēta cute, ne aspera arteria oblædatur. Deinde aliæ duæ paruæ iuxta carotidas colli arterias infligende paululum sub mento utrinq̄ una, incumbētis cutis tantum perustione facta. Infligendæ autem adhuc aliæ duæ sub mammillas, inter tertiam ac quartam costam: rursum q̄ aliæ duæ retrorsum uersus inter quintam ac sextam costas. In medio etiam pectore unam inurere oportet: & iuxta principium ossis pe-

ctoris (quod à capitis gladii similitudine xiphoides Græcis appellatur) supra os ipsius uentris, unam simili modo. Et adhuc alias duas inter octauā & nonam costam utrinq̄ unam. Tres etiam retro inurendæ sunt crustæ, una iuxta medium dorso, reliquæ duæ ab utraq̄ uerterarum parte, paululū infra mediam crustam. Omnes autem infra collum inustas, mediocriter latas esse conuenit, neq̄ ualde in superficie consistentes, neq̄ rursus nimium profundas. Vlcera autem crustarum satis multo tempore fluida permittere oportet.

De cordis tremoribus, Ex Galeno. Cap. LVIII. Cordis tremor siue palpitatio, multis tum adulescentibus, tū senibus inculpate sanis accidisse uisus est. Doleat aut caput ita affecti, citra aliquam alterā externā causam: atque omnes hi ex uenæ incisione opē fenserunt: aliqui etiam ex eis in totum ab hac accessione sunt liberati per extenuatoriam dietam & pharmaca consimilia, post uenæ incisionem adhibita. Noui autem & ego quēdam, qui singulis annis, ueris tempore, tremoris accessione afficiebatur. Hunc ubi expertus essem per triennium ex uenæ sectione iuari: in quarto per uenæ sectionē euasit, antequam hoc malo apprehenderetur: atque hoc modo pluribus deinceps is agebat annis, cōsentanea simul utēs dieta: ueruntamen & is quoque ante senectutem facto functus est, quemadmodum alij omnes. Aliqui quidem in febribus acutis compræhensim animo destituti, similiter mortui sunt: aliqui uero etiā citra animi deliquium, stuporis attoniti modo affecti, repente uitam cum morte commutarunt. Plures autē hac affectione laborantes ad ætatem peruenerunt, minorem quidem annis quinquaginta, quadragesimum tamen ætatis annum exceperunt.

De sanguinis reiectione, ex Galeno. Cap. LIX. Sanguis qui ex pectore & pulmone, aut aspera arteria educitur, omnino cum tussi reijcitur. Si uero ex locis circa fauces, aut gurgulionem sanguis feratur, per excreationes excernitur. Si uero ex aliquo loco oris aut gingiuarum, simpliciter expuitur. Aliquando autem à capite aut partibus gurgulionis delatus sanguis, ad asperæ arteriæ extremum incidit, & tussim commouet, imaginationem q̄ facit uelut ex pectore educatur. Itaq̄ si quis pluribus ex ordine diebus sanguinē excreat & emungat, neq̄ capitis dolore, aut grauitate aliqua quæ etiānum adsit, antegressis, neq̄ plaga istic illata: cōsiderare oportet diligenter omnē narium meatū, atq̄ etiam oris locū illum ubi nares ad palatum sunt perforatæ. Contingit enim aliquādo hæc accessio, hīrudine ad locum hunc affixa. Cæterū aliqui per uomitū citra tussim sanguinem ex uentre reiectant, aut ex uenis adiacentibus in ipsum delatum, aut hīrudine deuorata. Verū sanguis uenarū ex hepate aut splene in uentrē delatus grumosus est, niger q̄ euomitur: qui uero ex hīrudinis præsentia procedit, tenuis est, & saniosus siue ex uentre, siue ex naribus, siue ex stomacho pferatur. Atqui & localis dolor qui cōcomitatur, affectam particulā ostēdet. Si em̄ ex stomachoeductio fiet, non magna sanguinis eruptio continget: graciles enim sunt stomachi uenæ. Sed & cum nausea ac uomitu sanguis effertur, et in deglutiendo mordacitas percipietur, maxime si adstringētia, aut acria deglutiantur: si uero ex uentre educatur, nausea pluri-



mæ comitantur & uomitus, & si à cibo sumpto eductio cōtingat, sanguis cibis permixtus efferetur. aliquādo etiā pituita ac bilis simul euomētur. Si uero ex hepate & splene sanguis in uentrē deferatur, aderit tumor. Si uero ex pectore & pulmone, aut aspera arteria sanguis expuatur, impossibile est eum citra tussim per sputum reijci. Fit autem sanguinis eductio ex pectore, aut ob uenæ rupturam, aut oris uenarum apertionem, aut ob corrosionem. Venarū itaq; pulmonis rupturæ cognoscuntur ex eo, quod post aliquam præcedentē causam manifestā, statim sanguinis eductio consequitur. Præcedentem autem causam dico, delapsionē ex alto, aut si grauius aliquod corpus pectori inciderit. Aliquibus autē ob clamorem magnum, quomodo cūq; editū uasis uenarum ruptura accidit: & citra manifestam externā causam copia sanguinis cum crudo ac flatuoso spiritu, distendens pulmonis uasa, rupturam efficit. Cæterum ob sanguinis multitudinem factæ rupturæ cognitionē exhibet sanguinis effusio repente & coaceruatim facta. Magna enim pulmonis uasa existūt, ac arteriarum speciem habentia: sanguis aut in eis tenuis & calidus est, perq; saltum spiritus uī ac impetu excernitur. De uenarum apertione. Venarū autem ora aperiuntur, si quidem dispositiones præcesserint calidæ: ueluti si calidis balneis plurimis usus sit homo, habiterq; in calida regione, consimili existente maximè anni tēpore, cibis quoq; et portionibus calidis utatur. Etenim multitudo sanguinis calida existens, uenarum pulmōni incūbentiū ora aperit & dilatat, atq; hoc modo coaceruata effusio contingit. De uenarum corrosione. Quibus uero ex corrosione uenarū pulmonis sanguinis euacuatio contingit, his per interualla modica sigillatim cum tussi expuitur. Ipsa autem uasorum corrosio ex acris contingit humoribus, siue à capite in pulmōne delabentibus, seu in ipso pulmōne generatis. Possibile est etiam propter corrosionem, coaceruatā sanguinis eductionem cum tussi fieri. Quum enim præcedenti tempore per modica interualla sigillatim, ut dictum est, & cum tussi sanguinē expuerit quispīam: & post sequentibus dieb. neq; casus, neq; alia quædā externa uiolenta causa acciderit, & tamē sanguinis eruptio multa prodierit, magnā corrosionē factam esse ostendit. Multi autem hoc modo affecti particulas pulmonis simul cum sanguine extulerūt, aut tectoria ulceribus obducta. Impossibile itaque est latere eductionē propter corrosionem uenarum factam. Quare diligentem animaduersionē habere conuenit, nūmne spumofus sit sanguis: nam & hoc firmissimum signum eductionis ex pulmōne existit: deinde nūmne bronchiū particula quædam, aut tuniculæ arteriæ seu uenę simul efferatur. Horū em̄ nihil apparet in his, qui ex succingente thoracē membrana sanguinem spuēdo educūt. Maximum etiam signū elationis ex pulmōne est, si omnino citra dolorem effertur. De eductione sanguinis ex alijs pectoris partibus. Sanguis autem qui ex alijs pectoris partibus educitur, nigrior est, & iam in grumos coactus, cum tussi etiam & dolore reijcitur particulæ affectæ, ac foetidum odorē de se præbet: aliquando & pure ammixto effertur. Verū hoc signum cōmune est. Si uero iuxta asperā arteriā ulceratio fiat, paucissimus sanguis expuitur, paucissimo omnino

pure permixtus, doloris autem sensum iuxta exulceratam arteriæ partem æger percepat. De sanguinis à capite eductione. Si uero à capite sanguis deferatur, si quidē plurimus sit, plurima adest capitis grauitas aut dolor: si paucus, pauca. aurīū sonitus iuxta proportionem affectionis, rubor faciei: uenæ frontis emicant, & uertigines accedunt. causa autem ista præcedens manifesta est, nimirum plaga, aut frigiditas, aut calor, aut ebrietas. Vini enim potatio larga cumulatim caput replet, & cumulatim etiam ex rupto uenæ uase effundit. In parua autē ebrietate modicum adest sanguinis sputum, & consueta fieri per nares sanguinis excreatio cohibetur: aliquādo etiam ad palatum conuersa, imaginationem exhibet, ueluti ex pectore sanguis ipse educatur. Si itaq; à capite sanguis deferatur, titillatio palati accidit, & frequēs excreatio, atq; hoc modo expuunt: iritantur enim ad tussim, & tamē non ualde tussunt. Si autē à palato ad asperā arteriā destillat, tum tussunt, & qđ delapsum est educunt: & ob id quidā decepti, ex pectore eductionē fieri autumāt. Defluit aut aliquādo à capite per gulam seu stomachum in uentrem, uomituq; reijcitur, atq; ob id putatur à stomacho prodire. Habet autem & suam figuram sanguis à capite delapsus. Est em̄ nō adeo crassus, colore nigro, leuis, æqualis, immixtus, altero uidelicet aliquo pure uel pituita, & cū excreatione statim se in linguā infert rotundus, facileq; reijcitur per sputum. Si uero palatum consideraueris, densius atq; uelut exulceratum ipsum inuenies, & ut plurimū sanguinolētū, ppter destillantē ad ipsum à capite sanguinē. Curatio autē his qui sanguinē à capite educunt, sufficit simplicior & exigua. Adstringentia enim per collutiones palato adhibita frigida sufficiunt: nā à calidis & rarefacientibus collutionibus plus sanguinis erūpit, quare signum id est adeo à capite prodeuntis eductiōis. Si itaq; à capite feratur, multūq; sit quod defertur, euacuatione opus erit. Quare citius per nares, aut p uenæ alicuius incisionē euacuare oportet, ne per negligentiam consuetudo fiat sanguini in hos locos delabendi.

*Curatio eorum qui ob destillationem sanguinem expuunt.* Cap. LX.

Qui ob destillationē sanguinē expuunt, his uenā incidere oportet statim in principio, acri simul clystere adhibito & euacuata aluo: deinde confrictis quā plurimū manibus, brachijsq; accruribus per pharmacū calefactorium ac extenuatorium, extreme eorum partes colligentur, postea uero capiti raso pharmacum ex stercore syluestrium columbarū impone, & post horarum trium interstitium in balneum deducto, citraq; capitis cum pinguedine contactū lauato: post uero capite mediocri pileo cōtecto forbitione multa ex solis austeris pomis connutrito: deinde dormire uolenti, theriacen Andromachi ex uiperis recens adparatam exhibeto. Sequēti autē die omnibus corporis partibus, capite rātum excepto, confrictis in quiete adseruato, rursusq; in uesperā theriacen exhibeto. Quod si ex his destillatio sistatur, tertiā die mane mel parum coctū præbeto, quiescereq; finito, ac totū corpus defricato. In cibo exhibe pitisanæ succū, modicūq; panē madefactum. Quarta autē die mane post acceptum ex uiperis pharmacū, rursus plurimū mellis præbeto, capitū simul phar-

maco



maco ex stercore columbino imposito. Deinde loris & mediocriter nutritis, quinta die ea quæ humores qui in pulmonem defluerunt, uehementer repurgare queant exhibeto. Post uero per interualla ad caput cerato ex thapsia apparato utaris. Vniuersam autem curationem renutriendo ac refocillando corpori destinatam impendito.

De his qui ob frigiditatem organorum respirationis sanguinem expuunt, ex Galeno. Caput LXI. Qui uero ob frigiditatem membrorum respirationis ruptis pulmonis uenis, sanguinem expuunt, his euectio uenæ secare cōuenit, secundaria facta detractio ne eadem die, & postridie similiter, uidelicet ut paulatim euacuationem faciamus, & ut ad contrarium diuersio fiat, quam anrispasm Græci appellat. Eius enim gratia uenæ sectio adhibetur. Deinde fricatione extremarum partium, & ut dictum est, ligatione facta, in uesperam ex seminibus pastillū exhibeto. Sequenti uero die post repetitā sanguinis detractio nem, uniuerso pectori ceratū ex thapsia imposito, quod in uesperam rursus ne ulterius quā cōuenit calefaciat, detrahito, atq; iterum pastillos ex seminibus dato. Tertia autem die ex thapsia ceratū ad horas circiter tres rursus imposito, hominemq; lauato. Cibū autem præbe primis diebus sorbitionem, tertia autē ad succum ptisanæ, pisces qui facillē cōcoquuntur probeq; conditi sunt adde: ante somnū etiā rursus pastillum ex seminibus exhibe. Nam & somnum conciliat, & dolores leuat, & exiccat. Inflammatione autem ruptarum uenarum sedata, & partibus ad bonam temperiem redactis, ea quæ thoracē repurgant præbe, adhibito simul usu theriacis ex uiperis apparatus. Deinde etiam lactis potu, alijsq; cibis utaris. Hoc modo sanē eos qui se mox eodem die medicandos exhibent, poteris curare, non tamē similiter qui post duos aut tres obueniunt dies. Alii enim eorū immedicabile ulcus habēt, maximē qui per uitiosos humores erosionē sunt passi. Quorum aliquibus sputum ipsum sanguinis aut muricæ saporem exhibere referunt.

Curatio eorum qui iuxta alium quemcunq; tandem modum sanguinem ex pulmone reieciunt. Cap. LXII. Difficiliore autem curam ulcera in pulmone consistētia habent: conari itaq; oportet quēadmodum nos fecimus, ita ut ægro præcipiamus, ne respiret ualde, & ut sileat semper. Incidere aut statim uenam oportet in cubito internam, ac sanguinis detractio nē reiterare, bis, aut etiam ter, paulatim, gratia diuertēdi. Non enim euacuatione indigent tales, nimirum ab affectione ipsa euacuati. Quapropter etiam fricationibus utantur, aut etiam totius corporis membrorum cum latis lintheolis constrictione. Posteaquā uero hæc exacta fuerint, primum quidē poscam dilutam & tepidam bibendam exhibere conuenit: ut si quis sanguinis grumus in uiscere hæreat, inde dissolutus ejiciatur, neq; quicquam obstat, bis & ter in tribus horis hanc potionem iterare. Post hæc autē pharmaca inductoria & obstruendi meatus uim habentia, simulq; adstringentia exhibeantur, aut ex posca diluta in prima sanē die, aut ex decocto malorū, aut baccarum myrti, aut alterius cuiusdam adstringentis. In uesperam uero rursus exhibendū est pharmacum: abstineatq; eger ab omni cibo, si uirium robur adsit: sin minus, satis erit sorbitionem præbere.

Optimum autē est & secunda die rursus parum sanguinis detrahare ex eadem quæ prius incisa est cubiti uena, si modo uires ad id tolerandū sufficiant. Cibus etiam & pharmacis similiter utendū usque ad diem quartū, pectore in orbē madefacto, æstate quidem ex uino, oleoq; melino & rosaceo, hyeme uero ex unguento nardino. Si uero emplastris uti uelis, optimum pharmacum nostrum Barbarum appellatum habebis. Conducunt etiam reliqua ex bitumine, aceto & pice apparatus, & maxime quod ex salicibus, & quod ex lolijs cōstat. Maximū em hoc est, cui diligenter attendere animum oportet, ac mox facta uasorum ruptura inde remedium offerre incipere, quo cruentū adhuc uulnus cōcrescat, prius quā inflammatio appræhēdat: etenim si inflammatio præuenerit, parū spei est ad huiusmodi uulneris cōglutinationem, quippe quæ se in multum tempus extēdit. Eluere enim oportet, tum pus, tum serosum sanguinem ipsius ulceris: posteaquā inflammatio fuerit soluta: reliquam aut curam, quemadmodum ad tabidos fieri solet, ordinare. Ex Archigene. Porro si à stomacho aut uentre sanguinis reiectiones cum uomitu procedant, uena incidēda est in cubito superior, humeralis appellata, etiā si ex hepate in ipsum uentrem deferatur. Si uero à splene sanguis feratur, quod ex tumore circa splenem considēte cognosces, incisa uena quæ inter paruum & anularem digitum in sinistra manu est, probē ac propriē auxiliaberis. Cæterum & cibos & potus magis adstringētes dare conuenit his, qui ex uentre per uomitum, citra tussim sanguinem reieciunt, non tamen uehementer & actu frigidos: Ex uehementi enim frigiditate plagæ inferuntur: Quare suffecerit, si nō calidi existāt, neq; nimiam humectationē inferāt: fontana igitur aqua, nō ualde frigida, neq; multa, in potu exhibeatur: Et cibi pauci similiter mediocriter frigidi, ac naturæ quoq; adstringentis.

Communes methodi exhibendorū auxiliorū in singulis reiectionis sanguinis speciebus post sanguinis inhibitionem. Cap. LXIII.

Ex Galeno. Primum periculū in reiectione sanguinis est, ne ultra modū eiuseuacuatio fiat. Curatio autem post eius cohibitionem eiusmodi existit. Reiectionis quidem sanguinis quæ ob apertionem fit uenarum, per obturationē occlusionemq; dilatati oris ipsius uenæ curatur: quæ uero ob uenæ rupturam fit, per conglutinationem sanatur: quæ ob corrosio nem, per renutricationem, & ea quæ carne implent corrosa. Obturatur quidem dilatatum & apertū os uenæ ab adstringentibus. Conglutinatur autē rupta uena ab iisdem, & quæcūq; in compositione eis amixta citra mordacitatem desiccant: ac glutinosum quiddā in se complectūtur, uelut est lemnia terra, et quæ samius aster appellatur, & his similia. Renutritur autem corrosum à cibis boni succi, & pharmacis carne explentibus, siue sarcoticis à Græcis appellatis. Conueniunt igitur adstringentia eis qui non tussunt, qui corpus boni succi habent, & qui ob apertionem oris uenarum, aut rupturam sanguinem reieciunt. Adstringit autem optime acetum, & portulaca comesta: succus autē eius bibitus efficacior existit: plantaginis succus cyathis tribus, aut sanguinaria succus eodem modo: Succus uuæ acerbæ in sole probē desiccatus drac. una, rhois aut gallæ decoctū



cyathi mensura, cortex glandis maxime castaneæ drachma i. radicis rubi decoctum mēsurā cyathorū trium, mora rubi, & flos balauſtiorum drachma i. acacia & hypocisthis eodē modo. Vinacea cochlearij mensura, similiter lapathi acuti semen. Efficacius autem operatur radicis althææ decoctum, radicis symphyti decoctum, atq; ipsa quoq; sicca trita potui inspersa, centaureæ radicis drachmæ duæ, quas febricitantibus cum aqua, febre carentibus cum uino exhibebis: lapidis hæmaritæ drachma una cū mali punici succo, aut corallij lapidis eodem modo, radix equiseti. Mora ualde cruda & immatura. Forinsecus autem pectori irrigatio adhibenda ex uino adstringente cū oleo rosaceo aut myrteo. Si uero multa sanguinis eruptio fiat, maxime in æstate, & citra tulsim eius reiectiones contingant, neq; debilis sit æger, sed robustus & carnosus: Acetū pro uino adhibendum est, non in sordidis amplius lanis, sed spongij exceptū, fasciaq; lata æger conuinciendus. Aliquando aut acaciam, aloē, aut omphacium acetato permiscere conuenit, & cutem ex oleo myrteo preillinare, ne mordacitas ex irrigatiōe succedat, aut etiam emplastrum Barbarum, aut ex salicibus, aut aliud simile impone. Quod si æger ferre nequeat ex irrigatione prouenientem iniucunditatem & molestiam, neq; toleret item emplastrorum incommoditatem, huiusmodi cataplasma est ad mouēdum: ex palmis uidelicet & acacia, alumine, malicorio in puluerem redactis, symphyto, polenta aut lentium farina apparatus. Si uero neq; cataplasmatum grauitatē ferre queat, neq; calſieri sustineat, illitionibus utēdū. Loti itaq; aut melpili corticem, & rhoēm culinarium, paucaq; rhamni, aut sanguinariæ folia in acetato decoquito: deinde in eo decocto aloēs succum, aut acaciæ, aut omphacij, paucumq; gūmi diluito, & pectus ac dorsum ex eo illinito, atq; ubi exiccatū fuerit, rursus inungito, quo crassitudinē accipiat illitio seu unguētum, & ne denudati frigore circūueniantur. Illa uero hora qua areſcit illitum, ab ægro multus aer est arcendus. Quod si inflamationes succedentes febres inferant: solent enim uehementer acutæ irruere & periculosæ, aliquādo etiam lenes & obusæ, quum uidelicet in tabē sunt transiture: tum omnis ueluti in febribus est ordināda diæta: nō tamē aceruatim, sed quiete & paulatim, ut ne rursus rumpantur cōglutinata, abstinendum a uino & sorbitionibus, ammiscenda quæ leniter adstringunt, uelut sunt palmæ, & similia. Cataplasmate utendū pane calido, deinde semine lini. Vbi uero perseveret malum, omnia ut ad tabidos facienda. Exiccatoriā porro citra mordacitatē uim obtinet succus ocymij: qui si acetato cōmiscetur, cōuenientior fiet, & est quoq; nobis in usu familiaris, citraq; formidinē eū porrexeris. Adstringit autē & desiccāt simul rheon ponticum. Assumere autē oportet hanc ipsam pōticam radicē ad recētes ac inueteratas sanguinis reiectiones & ad pectoris fluxiones, in principio quidē ex posca decoctam. Si uero per circuitus redierit reiectionis, omnino parū quiddā bibēdū præbe cum aqua. Quum uero asperitas & tulsis molestiā intulerint, passo cretico decoctā, deinde contritam præbe. Magis autē desiccāt arefacta in potum inspersa. Exiccat etiā citra mordacitatem samius aster, & minium sinopicum, & terra lemnia bis in die data drachmæ

pondere ex aqua. Citra mordacitatem etiam & præclare omnino desiccāt bolus armeniacus, ut nihil eo hac parte præſteret: eius itaq; drach. i. exhibere potes cum aqua cōfidēt. Exiccat etiam coagulum hœdi, cerui uero magis inspissat. Quod si stomachus æger sit, semel exhibe quod adstringit, & semel quod desiccāt. Aliquando autem mane adstrictoriū damus, circa sextam autem horā desiccatorium, in uesperā uero qd inspissat. Quando uero inspissantibus opus fuerit, amyllum detur, & gummi, ac tragacanthus, quodlibet per se, atq; etiam inuicē permixta. Simplicia ad sanguinem reijcientes pharmaca. Huius generis, inspissantium uidelicet, est & gluten pisciū, & symphytum manducatum ac deuoratum. Cibos etiam eiusdem cū prædictis pharmacis facultatis exhibere oportet, tum his qui propter apertionem uenarum, tum qui ex stomacho sanguinem reijciunt: nimirum adstringentes, uelut est halica ex posca, aut micæ panis eodem modo, aut oriza, oua mollia, rhoēm culinarium tenuissimē tritum infarctum habentia, plantago cocta, intubū, lens cū prædictis condita, aut lapathum acutum: in quibus uero inspissantē materia magis opus est, lac coctū refrigeratur, daturq; tum ob corrosionē, tum a stomacho sanguinē educantibus. Hi enim adstringente materia et carnis expletionē opus habent: aliquando autē lacti cocto amyllum infarcitur, ac modicum omnino coaguli. Cauere enim oportet immodicum eius usum, neq; statim post eius admixtionem lac ipsum exhibere, sed post aliquantulam dilationē: ualde enim in uentre concretum mortē inferre consueuit. Conducit etiam palmas cum halica decoquere, aut cum similagine. Inspissant autē simulq; adstringūt oua crassiora rhoē infarcta, maxime si sint assata, lens cum priſana decocta, miliū coctum. Fugienda autē in omnibus uehementer adstringentia, & excellenter inspissantia. Eligenda uero simpliciora & minus molesta ex uniuerso genere eorum quæ sunt prædicta. De cōpositis ad sanguinem reijcientes pharmacis, Galeni. Iuxta primam quidē rationem ex adstringentibus & desiccantibus ac inspissantibus pharmaca cōponuntur ad curationem reiectionis sanguinis conuenientia. Quum uero adstrictoria, & tenacia ac desiccantia, uias præcludant, & difficulter per corpora digerantur, uī quadā opus habet præparante ac aperiente eis uias ipsas, & ob hoc ipsum calida & tenuiū partium eiusmodi pharmacis miscentur, quæ iuxta omnē ipsorum cōsiderationem cōtraria sunt sanguinis sistendæ reiectioni. Miscentur etiam eis stuporē inducentia, quo profundiorē somnum inducant: quæ sanē cōmodissima sunt his qui a tulle lancinantur omnibus, maxime tamē qui simul sanguinē reiectant. Hi igitur scopi sunt cōpositionis pharmacorū ad sanguinis reiectionē conuenientiū: quæ uero per experientiam cognita sunt a priscis medicis cōposita pharmaca, deinceps dicentur. Potio hæmoptoicis cōmoda. Lapidis corallij, terræ samie quæ aster appellatur, succini, mastiches, cuiusq; drach. vi. amyli, thuris, gūmis, cuiusq; drac. iiii. Exhibe cochlearium unum siccum cum posca, aut cum aliqua prædictarum decoctionum. Alia potio. Terræ samie asteris, lapidis agerati, terræ lemnia, æquales omnium partes accipe, & ex eis cochlearium unū præbe cum cyathis duobus decoctionis plātaginis. Alia



**Alia.** Terræ lemniae drachm. xvi. terræ asteris drach. viii. sarcocollæ drach. iiii. gummis drach. ii. præbe cochlearium cum decocti palmarum cyathis duobus. Sit autem decoctum ipsum crassum. **Alia Andromachi.** Coralli torrefacti drac. i. thuris obol. iiii. acaciæ drac. i. balaustrorum obolos v. gummis obol. ii. candidum ouorum duorum. Huius quam partem cum aquæ cyatho uno & dimidio exhibe. **Alia, Asclepiadæ.** Radicis sanguinariæ manipulum, radicis symphyti tātundem, rhois rubri acetabulum, aquæ sextarios iii. decoque ad tertias, & expressi, ac percolati liquoris cyathum unum præbe, & ad singulas exhibitiones gummis triti drach. i. coniice. **Alia ualde præstans,** cui testimonium præbeo. Thuris, terræ asteris, cuiusque drac. viii. croci drach. i. amyli drac. i. succi plantaginis sicci drach. i. contusorum & cribratorum cochleare unū dato cū posca. **Alia, per experientiam.** Coralli drach. viii. thuris drach. viii. dato cochlearium cum uino myrtite diluto. Eadem etiam ad fluxum muliebrem efficax est. **Pastillus ex electro.** Præclare facit ad hemopticos undecunque sanguis efferatur, ad tussim ueterem & recentem, tabidos, cruenta reiectantes, supurationem pectoris, tormina intestinorum, uelice fluctiones, & ad inflatos: est etiam aurium affectionibus commodus. Psylli drachmas quadragintaquinque, ramentorum electri, iridis, mastiches, croci, cuiusque drac. quatuor, opii drachmas quindecim. Psyllium in aquæ calidæ sextarios tres coiectum, parumper macerato: atque ubi uiscosum ac lubricum factum fuerit, liquorem inde exprimito, eoque præscripta diluito: terito, ac pastillos informato. Ex his obolos tres cubitum ituris exhibeto. **Pastillus Dosithei,** ualde celebris. Virgultorum rubi sextantem, radicis symphyti, fructus spinæ ægyptiæ, succi hypocisthidis, lycii, opii, thuris, rhei pontici, terræ asteris, singulorum sextantem, rhois culinarii quadrantem, rosarum siccarum drachmas quatuor, baccarum myrti quinquuncem, croci, terræ lemniae, corticis qui macer appellatur, cuiusque drachmas duas. Excipe succo plantaginis, aut uino scybelitæ, & informa pastillos. Eos cum decocto symphyti aut sanguinariæ exhibeto.

**Alius pastillus,** ex cuius usu magnam nominis famam sum adeptus. Terræ asteris quadrantem, amyli recentis quinquuncem, tragacanthi, sesquiciā, gummis quadrantem, glutinis piscium unc. i. acetum quantum suffecerit. Gluten more eorum qui arcus faciunt dissoluto, per triduum in sufficienti aceto maceratum, quarta deinde die exemptis ex eo pelliculis repurgatum paulatim tolle, & in mortario cum pistillo contunde, & quam diligentissime dissolue, aut super calidum cinerem pone. Difficulus enim solubile existit. Vbi uero solutum fuerit, rursus in ære aut ferro, aut, ut dictum est, cinerem calido cum aceto decoque, & sufficienti tempore assidue agita, ut quam crassissimum fiat, deinde in mortarium coniectum satis diu utere. Atque unumquodque prædictorum per se contusum ac cribratum in promptu habens, maxime tamen tragacanthum, in mortarium ad dissolutum gluten insperge, omniaque diligenter unita uitreis lancibus solidis excipe, & exicca, pastillosque informa mediocres. Durant autem aliquandiu donec formentur. Eos cum posca exhibe, & utere ualde confidenter. **Pastillus ex Corallio,** qui nunc

celebris & in usu apud omnes empiricos existit. Terræ asteris, balaustrorum, coralli, succi hypocisthidis, acaciæ, myrrhæ, rhei pontici, dauci, omphacii, tragacanthi cuiusque unciā unam, thuris sextantem, opii drachmas quatuor, amyli scrupu. sex. aluminis scissi scrupulos duodecim, terræ lemniae scrupu. vi. rhois rubri quadrantem, radicis dulcis sexuncem, symphyti radicis trientem, gummis scrupu. xviii. croci scrupulos sex, fructus spinæ ægyptiæ drach. quatuor. Dilgere in pastillos cum succo plantaginis, aut uino austero uetere, & exhibe ante somnum obolos tres cum posca. Facit etiam ad tormina intestinorum. **Pastillus ex ægyptia spina,** quo plurimum utor. **Pharmacum Clidion** appellatum, quod prospere omnibus sanguinem reicientibus conducit: itemque coeliacis, intestinorum torminibus, & stomachi fluxionibus. **Cytinorum,** fructus spinæ ægyptiæ, balaustrorum, acaciæ, succi hypocisthidis, singulorum drachmas sex, lycii, rhei pontici, opii, cuiusque drac. quatuor, myrrhæ drach. iii.

Contusa & cribrata diligenter baccarum myrti, aut rosarum decocto excipito: aut uino myrtite, & in pastillos redigito, & iuxta cuiusque uires cum rosarum, aut baccarum myrti, aut pampinorum uitis, aut palmarum decocto exhibeto, aut cum frigida aqua. Quod si lycio non abundes, hoc modo apparere potes. Rhus, qua coriorum tinctores utuntur in quadrupla aquæ portione ad triduum maceratur, uirga frequenter agitata: quarta autem die decoquitur usque quò aqua ipsa rhois comam exæquet. Et tunc quidem rhus expressa abijctur: aqua uero percolata, donec in mellis spissitudinem cogatur decoquitur, atque ita pharmacis adijctur. Quum uero bibendum præbes hoc prædictum pharmacum, spongiæ posca madefactas stomacho aut pectori impone: atque ubi restiterit sanguis, pectus aut locos fluxione laborantes ex omphacio in aceto diluto & aliquid tantulum tepefacto inunge. Conuenit etiam sanguinem reicientibus pastillus Philippi, qui in tractatu De intestinorum torminibus describetur. **Positio ad sanguinem reiectantes.** Succo saluæ cyathos duos, mellis unciā unam, exhibe ieiunis in potu, & euestigio sanguinem sistes. Quæ grumos sanguinis concretos dissoluant. Sanguinem in grumos concretum lixiuium ex cinere fici, & uitis, & quercinum dissoluit, similiter etiam thymus & saturia, cum aceto. Coagulum leporis aut hoedi, ciceris magnitudine ex aceto: itaque mox ubi quis ex alto ceciderit, ac sanguinem reiecerit, lixiuium per se bibendum exhibeto, aut cum modico aceto.

**De asperæ arteriæ ulceribus.** Cap. LXIII. Quæcunque in aspera arteria ulcera fiunt, iuxta pelliculam eam intus ambiētem, & maxime prope eius extremum, aut in ipsa adeo arteriæ extremitate, sanabilia omnino existunt: Et nos non paucos hoc modo affectos curauimus. Reijciunt autem hi per spurum purulenta pauca ac cruenta, aliquando etiam tectoria quædam ulceri obducta, sensusque doloris ab eis manifeste percipitur iuxta exulceratum locum. Hos itaque in quiete adseruare oportet supinos reclinatos, atque ipsi quæ capiti subiiciuntur sublimius instratis. Admonere etiam ut quantum possibile sit renitentur, & ne tussiant: Deinde forinsecus loco affecto desiccantia imponere. Veluti sunt Emplastra Barba  
y 3 rum,



rum. Ex salicibus, & ex lolijs adpellata, ac eis similia. Pharmaca aut eis exhibenda sunt, quae supra ad ulcera inter arteriaca, & ad pectore suppuratos sunt descripta: Quae etiam sub lingua detinere conuenit, ut paulatim liquefacta in asperam arteriam delabantur: tum uero maxime obniti, & non rursus. In potu autem exhibendum est lac quotidie recens mulctum ab adstante adhuc animali, adijciendum etiam mellis quidam his qui lac difficulter concoquunt, & quibus in casei modum in uentre concreuit.

De pectore suppuratis, ex Archigene. Cap. LXV. Empyici, hoc est, pectore suppurati uocantur, quibus abscessus in succingente costas intrinsecus membrana, aut in aliqua alia pectoris pellicula factus, acerrimum ruptus est, & in uacuum pectoris locum effusus inter pulmonem & membranam costas succingentem. Qui si non quam citissime per sputum reijciatur, tabidi fiunt, febricitant aut pectore suppurati indefinenter hecticen, hoc est, habitualement febre. Rumpuntur autem suppurationes, aliquae quidem sursum uersus, aliquae uero deorsum. Quae deorsum rumpuntur, in aluum & intestina, ac uesicam transfunduntur, per uasa quaedam transmissione ad ea membra facta. Quae cunctae uero sursum rumpuntur, in uacuum uidelicet thoracis locum, periculosiores existunt. Cognosces autem suppuratos hoc modo. Quum lateris dolor praecesserit, deinde uehementes febres geuerint, & ex magna parte quoque dolor, grauitatis autem sensus remanserit intus in lateribus in profundo thoracis, simulque transfluere aliquid appareat, iuxta multiplices reclinacionis permutaciones, & maxime quum ab uno latere in alterum decumbunt, tunc sane multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdam sonitus saepe sensibiliter in reclinacionibus ipsorum auditur. Cognoscitur itaque suppuratio facta tum ex praedictis, tum quod nihil relatu dignum per sputum reiectarunt in eo qui praecessit uehementi lateris dolore. Nouimus autem quosdam citra febre suppuratos, ex seroso aut pituitoso humore ex reliquo corpore in uacuum thoracis delapso, isticque putrefacto. Itaque quibus ex gymnasiarum exercitijs, aut ex casu aliquo saepe sensibilis conuulsio facta est, quae dolorem circa profundum thoracis intulit, Nitrum, acetum, & oleum cyprinum conijciantur, his addatur rosmarini semen, Canchry appellatum, large probeque contritum, aut pyrethrum eius loco, seu staphis syluestris: haec simul calefiat, deinde excolata ipsis locis ex lana succida repletis irrorentur, aut cum lana imponantur. Utilis enim haec irrigatio existit, saepeque sola malum omnem discussit. In quibus aut inflammatio praecessit, ultro uenam cubiti incidere oportet, si nihil phibeat, & mediocriter euacuare, ut alleuatio tantum aliqua contingat. Nutrire uero ex prisanæ succo & aqua mulsa, excretioni consulendo, & in quiete diligenter custodiendo. Ad primum quidem ex oleo pingui irrigaciones lana conuoluta exceptae ac impositae conducunt. Quod si febris absit, passum etiam moderatum cum multo oleo commisceatur, lanaque succida excipiat. Haec enim irrigatio in his qui febre carerent, usque ad tertiam sufficere debet. Si uero febres simul adsint, & ruptura consequatur ipsius puris, rutaceo, aut anetino oleo, foeniculum aut flos cypri madescat. Aut quod magis ad hanc rem conueniet, ipsi oleo incoquantur cum radice maluae. Conuenientius est autem oleum cyprinum, cum spissamentis apparatum.

Haec autem calefacta & lana molli excepta imponantur. Post haec autem cataplasmata adhibere conuenit ad febres quidem sedandas, ex pane in aqua mulsa decocto, uiridi apio, aut foeniculo, simul decoctioni iniecto, aut apij aut foeniculi semine insperso. Commodius autem ad haec butyrum pro oleo adijcitur. Deinde cataplasma quoque ex semine lini adhibeatur: quod si maius malum sit, etiam foenugraecum addatur. Quod si frigiditas suppurationis causam praebuit, irionis etiam semen cataplasmatibus indatur. Tardatibus autem suppurationibus, ordeaceae farinae caricas coctas addere oportet, & althaeae radicem, terebinthinamque resinam ac stercus columbinum. Fit etiam ad tardantes rupturas utile cataplasma ex solo stercore caprino, quod & collectionem maturat et disciuit. Optimum etiam discussorium est ex lolijs cataplasma, si bitumine permisceatur. Ablatis autem cataplasmatibus, ceatis affectae partes contegantur ex butyro apparatis, & habentibus quoque admixtam irin, parum de bacis lauri, & rutam. Etenim ad hoc quod a frigore tutantur, adiuuant etiam reiectionem. Tempore reiectionis congruit emplastrum ex succis constans, & mnaseae, & simpliciora melina, postea uero icesij & quod ex lolijs apparatus. Si uero fluxus timor immineat, id quod Thraseae appellatur, erit aptum. Ego uero assidue eo quod ex syluestri cucumere constat uitor, omnium enim efficacissimum existit. praescriptum autem hoc est in anhelosorum tractatu. Adiuuare igitur oportet puris excretionem quocumque reperire cognoscatur. Quod si ad aluum proreperit, magis emollientia sint ea quae offeruntur: si uero ad uesicam serpat, ea quae urinam magis cient adhibenda. Si uero per tussim puris repurgatio fiat, nihil conuenientius aut familiarius exhiberi potest quam prisanæ optimo melle permixta. Caeterum ea quae urinam cient, cibis commodè ammiscantur, undecumque tandem puris excretio contingat. Commoda est etiam faba cocta in omni suppuratorum differentia exhibita, si ei parum ex seminibus erui maceratis, & duplici ex aqua decoctione dulcoratis adijciatur. Alij comestio quoque utilis ad repurgacionem existit. Inter potionum genera simplicissima est aqua mulsa cum iride & plurima radice dulci decocta, utilis est & radice dulcis succus commanducatus, & cum ammixto sesamo temperatus. Conuenit etiam hyssopum aqua mulsa decoctum. Eclegma autem prodest hoc, Nucum pinearum, tum quae pityides, tum quae strobili appellantur, amygdalarum amaranthi, seminis lini, amyli recentis, aequales partes, mellis quantum suffecerit. Optimum autem est & piperis parum ac seminis irionis addere. Quod si tussis infestet, butyrum recens tepidum cum melle tepefactum delingendum praebet. Aliud eclegma, internos abscessus repurgans, ut etiam pelliculas maximas educat. Cardamomi drach. viii. saga peni drach. iiii. myrrhae drach. iiii. opij drach. ii. castorei drach. ii. piperis dra. i. cum aqua in pastillos duorum obolorum pondere redige, & cum aqua calida pastillum unum pro una uice exhibe. Thespiana ad internos abscessus. Seminis apij drach. iiii. opij drach. iiii. melanthij drach. iiii. castorei drach. ii. seminis dauci, iridis, sinapis, cuiusque drach. vii. excipe melle cocto, & praebe nucis auellanae magnitudine ex aqua. Eclegma ex eruo, suppuratis commodum. Erui madescenti & inde torrefacti, decorticati, & in farinam



nam redacti, drac. viii. nucum pinearum drachm. viii. amyli drach. vi. piperis drachmas v. succi rutæ drach. i. mellis cocti quantum suffecerit. Eclegma magnum ex marrubio. Spicæ nardi, piperis, succi marrubij, cuiusq; unc. i. mellis libr. iiii. uini ueteris dulcis libras ii. Succum cum uino & melle decoque, atq; ubi ea coacta fuerint, sicca cōtusa & cribrata insperge, ac simul unitis utere. Aliud. Amomi sextantem, casia quadrantem, styracis calamitæ sesquiunciam, spicæ nardi sesquiunciam, croci unci. i. piperis unc. i. nasturtij drach. iiii. thuris drac. iiii. mellis libras iiii. utere ut optimo. Antidotus Panchrestus ab omnimoda utilitate appellata. Conducit tussi antiquæ, suppuratis, orthopnoicis, tabidis, præcordiorum distensionibus, & omni inflationi. Mouet menses foeminarum, & quæ ex abortu aut partu relinquuntur, secundas etiam ac partus educit, & uesicæ abolet affectiones. Terebinthinæ drachm. viii. styracis drach. vi. myrrhæ drac. v. croci, iridis, galbani, cuiusq; drach. iiii. seminis hyoscyami, corticis mandragoræ, irionis torrefacti, opopanacis, cuiusque drac. ii. piperis drach. i. spumæ nitri drach. i. cū passo coge in pastillos, ex quibus obolos ii. cum aquæ mulsæ cyathis iiii. præbe. Alia antidotus Aristarchi, Paulina appellata. Vim habet admirandā. Prodest tussientibus, reiectatibus sanguinē, tabidis, suppuratis, pulmonis abscessibus, conuulsionibus, & rupturis: ad stomachi subuersiones, bilis per uomitum ac secessum eruptionem, coeliacos, dysentericos, uesicæ affectiones, uteri strangulationes, et ad febres per circuitum repetentes, una hora ante exacerbationē exhibita. Facit & ad malū habitum corporis, & ad eos qui alimentū nō sentiunt, ad exitialia pharmaca, & uenenatorū morsus. Habet autē hoc modo: Cinnamomi, costi, galbani, castorei, opij, piperis nigri & longi, styracis, singulorū unc. i. mellis sextarium i. Sicca contundito ac cribrato: galbanum aut cum modico melle decoquito ac excolato: deinde omnia simul unita in uase uitreo reponito, ac fabæ Aegyptiæ magnitudine exhibeto cum aquæ mulsæ cyathis duobus irrorato de pollice modico aceto. Vtere etiam his quæ ad tabidos describemus. Exhibe quoq; confidenter antidotum Isotheum appellatam, ad tussientes supra præscriptam. Licebit et pæonia appellata antidoto uti, quæ in Sermone tertio & decimo cum alijs multi usus antidotis describetur. Farinas quoq; apparare conuenit ex eruis albis madefactis primum, deinde resiccatis ac decorticatis & mola tritis. Hæc enim farina & lacti dū decoquitur adijcitur, ammixto etiā melle, et uehementer cōmoda redditur. Admiscetur etiam alijs sorbitionibus: & eclegmata ad difficulter purulenta reijcipientes apparata, ex hac conflunt. Commodum est autem & amygdalas amaras delibratas sorbitionibus infarcire. Facilem autem puris reiectionem facit porrum capitatum cum sorbitionibus decoctū, atq; etiam per se aquæ incoctum, & in cibo acceptum. In potu aqua offeratur probe cocta: si uero uino opus habeat, theræum detur, aut aliud dulce paucum. Ab aceto autem & omni alio uinoso genere, et ab aqua quoque frigida abstineant. Tempore uero quo cicatrix obducitur, uinum scyllinum utile est præpotatum, aut absinthites, & oenanthinum in uomentibus & purgatis per uesicam: hyssopites uero & scyllinū

his qui per tussim: pulegiatum, qui per aluū purgantur: maxime si nigricantia subeant unā cum purulentis, aut grumosa quædam coactiones. Quoniam autem per intervalla colligi solent & rūpi quoque supurationes, curam adhibere cōuenit ne post factam earum curationem recurrant: id fieri potest per lactis potationem, & hieræ ex colocynthide constantis purgationem. post etiam dropaces locis adhibeantur, & smegmata seu extensoria aciora cutem rubefacere potētia, & epithemata eiusdem usus, uelut est id quod ex euphorbio fit: item quod ex baccis lauri. Assumendæ etiam arenæ ingestiones: & acrium ciborum comestio utilis eis existit per interstitia adhibita, maxime uero alliorum, coctorum. Multos autem suppuratos post cicatricis obductionem illæ sos conseruauimus per salsamentorum comestione. Assidue etiam acetum mulsum præbendum est, sit autem ex scylla apparatus, pectus quoque assidue ex abrotoni decocto repurgandum: item ex centaureæ & hyssopi alijsq; conlimilibus decoctionibus frequenter potatis. Quod si sæpe puris collectio contingat, securius est crustas per cauteria pectori in orbem inurere: quemadmodum in anhelosis est prædictum.

## De peripneumonicis.

Cap. LXVI.

Peripneumonia inflammatio est pulmonis, cum febre acuta. Cōsequitur autem affectos thoracis grauitas absq; dolore. Quod si pelliculæ ipsius, quæ cum thorace secundum longitudinem ipsius sunt connexæ, sint inflammatae, etiam dolorem percipiunt, & spirandi difficultas simul irruit, & surrecti sedere uolunt. Pulmo enim cordi incumbens suffocationem infert. Rubicunda eis est facies, & maxime malæ, nasus in summo fit limus, uenæ temporum eleuantur, prostratus est appetitus, respiratio calida, linguæ siccitas, aquæ frigida, magis autem aëris frigidi cōcupiscentia, tussis sicca. Si uero quid efferatur, spumosum est ac biliosum, & aliquādo cruentum & floridum uehementer, quod etiam pessimæ significationis existit. & si quidem mortale malum fuerit, ungu illæ amplius aderunt, aut somni breues stuporem ac delirium inducentes: & imaginatione mētem uicissim perturbante non sentiunt ualde præsentia mala: extremitates frigide, ungues liuidi incuruātur, quarta aut summū septima die hi moriuntur. Verū si ad salutem permutetur morbus, sanguinis eruptio ex naribus abundanter sequitur, aut alui exturbatio multis ex euntibus biliosis & spumosis humoribus. Aliquando autē inflammatione in pus commutata, per uentrem aut urinam pus excernitur, statimq; ab omni molestia liberatur. Quod si in pulmonē irruerit acruatim, aut suffocat, aut cū grauibus accessionibus in tabē permutatur. Itaq; si nihil obstiterit, statim uena secanda est in cubito, & si sustinuerint uires, ex utroq; brachio sanguis extrahendus. Primū quidē modicus & non usq; ad animi defectionē, ut uidelicet adseruetur ad repetendā detractionē. Si uero quid prohibeat fieri uenæ incisionem, acri clystere subluere oportet ex decocto hyssopi, et colocynthide, & ruta melleq; ac oleo plurimo, iniecto etiā nitro ac sale. Eorū uero qb. uena incisa est, sedē illi re oportet his q̄ flatus educūt, & secessum iritant: ueluti est mel cū cymino & ruta, ac modico nitro. Post uniuersales aut euacuationes peripneumonicis aqua



mulla in potu exhibenda est, in qua decoctum sit hyssopum, aut iris sicca trita, mensura duorum cochlearium aquae mullae inspergenda. Quod si suffocatio urgeat, etiam nitrum inspergere conuenit ad decoctionem hyssopi. Cibus sit extenuatorius, pitisana cum origano aut hyssopo decocta, aut modico pipere trito ad eius succum insperso. Aliquando autem sal pro nitro conueniendus est, prout expedit, & sustinuerint vires. Porrum etiam capitatum bis coctum praebetur, & halica cocta ex aqua mulla: quae omnia inflationis sint expertia. Potus exiguus sit quantitate: humiditas enim noxia pulmonem existit. Sub lingua autem detinendum praebere mel in pastillos redactum, cui in decocto inspersa sint hyssopum & calamintha quam tenuissime trita. Vt quoque conueniet eclegmaris quae in pleuritidis describuntur: atque uniuersa dieta eorum qui a peripneumonia conualescunt, eadem sit quae pleuriticoe & suppuratorum. Pectus uero lanis cooperiatur cum oleo & nitro. Conueniet etiam cera to cōtegere tum pectus, tum latera, ex oleo rutaceo, aut cyprino apparato, quod habeat simul iridem siccam tritam inspersam, aut eplithema ex cera, & terebinthina, medulla ceruina, œsypo liquido, butyro, & iride tenuissime trita imponatur. Sint autem horum partes aequales.

De phthysicis seu tabidis, ex Galeno. Cap. LXVII. Phthisis proprie est exulceratio pulmonis, ad sanguinis spuitiones consequens, quum uidelicet sanguinis eruptione suppressa, ulcus non fuerit coagulatum, neque cicatrix inducta consequitur etiam phthisis in suppuratis & peripneumonicis, aliquando etiam in adfectionibus pleuritidis, difficillime autem curatur ulcera pulmonis, propterea quod citra tussim non repurgantur: tussientibus autem mutuo ulcus dirumpitur, ipsisque quasi per circulum reuoluuntur mala. Iancinatis namque a tussi inflammationis, altera rursus maturatione inflammatio opus habet, rursusque periculose per tussim pus repurgare necesse erit: quare ex omnibus difficilis curatio ipsae subornatur, quod neque pharmacorum vires ulcus perungere ualeant, prius quam in uentre permutetur: & quod iuxta respirationes pulmo semper mouetur, & tussiendo lacinatur. Progressu uero temporis cartilaginee quoque asperae in pulmone arteriae aduruntur: quemadmodum in externis ulceribus ossa, quae sculpturam ad squammularum discessum ac detractionem non admittunt. Diuturna autem pulmonis ulcera etiam si aliquando curentur, callas tamen & fistulas reliquias post se in ipso pulmone relinquunt, quae temporis progressu ex leui occasione facile refricantur: unde contingit aliquando & rectorium ulceri obductum, & modicas sanguinis guttas una cum alijs quae inde per sputum reiciuntur, efferri: ut alio plane principio opus sit ad ulceris curationem. Notae autem quae ex sputo sumuntur, in tractatu de febribus sunt praescriptae, nimirum quinto huius operis sermone: unde superfluum existimo hic de eis uerba facere. Medicari itaque pulmonis ulceribus oportet, eo apparatu quo facile sursum efferatur humores, cura simul adhibita ne alij congregentur. Itaque cataplasmata in principio assumenda sunt, ex semine lini & tenuissimo polline, cum decoctione foeniculi & althaeae, oleoque & melle ammisceri possunt, etiam ipsis althaeae folia trita. Adhibeantur autem haec omnia statim post exacerbationum remissionem. Post

temporis deinde intercapedinem, ad cerata transeundum ex buryro & oleo laurino ac cera apparata. Repurgationis autem tempore, epithemate utendum est, ex terebinthina, & oleo cyprino, & buryro, & ex medulla ceruina, ac adipe taurino, iridisque farina, & œsypo, hoc est, lanæ succide sordibus, aequalibus omnium partibus commistis. Post etiam emplastro Mnaseae, aut aliquo ex simplicioribus melinis utendum. Locis autem fluxione laborantibus, id quod ex salicibus constat adhibendum, quod etiam exiccationis tempore conueniens existit. Sicut & hoc quod ex syluestri cucumere apparatus supra ad anhelosos descriptum, & quod ex lolijs sit eodem modo. Ne autem cutis ipsa distendatur, primum locum ipsum inungito, atque ita glutinosa pharmaca imposito: sic enim facilius auelluntur. Optimum autem ad eos malagma tempore quo cicatrix obducitur, hoc est, Ceræ libr. i. picis libr. i. uisci quercini unc. i. ammoniaci thymiamatis trientem, galles hyposithidis, aluminis scissilis, acaciae, malicorij, seminis apij, rhois culinarij, cutisque unciam i. olei myrtini aut rosacei trientem. In hyeme autem paulo plus. Sicca cum succis in aceto contere, liquefactisque quae eluari possunt, & ab igne ablatis uiscum inijce ad quod deinde liquefactum in cacabo etiam reliqua trita conijce, ac simul unita in pillam transfunde, & emollitis utere. Inter pharmaca uero potabilia simplicissimum est aqua mulla per se, & cum amylo, aut iride & radice dulci in ea decoctis. Omnium autem conuenientissimum phthysicis est lac asinum potatum: quod si non adsit, bubulum aut caprinum, & caeri crudi triti cum lacte potati, aut cocti in cibo sumpti, assidue iure eorum in super absorpto. Conuenit etiam eis adeps ceruinus recens in sorbitionibus eliquatus. Quod si molesta tussis incubuerit, thymus tritus & hyssopum melle cocto excipiuntur, & sub lingua tenenda exhibentur. Congruit etiam butyrum recens cum mellis & terebinthinae aequalibus partibus decoctis. In his uero qui tolerare possunt, plus butyri accipiat, si tamen recens existat: optime enim repurgat. De hac itaque mixtura cochlearium unum ieiunis detur. Bonum est et amygdalas amaras maxime cum pitisana decoquere, & porrum capitatum cum pitisana, aut altera sorbitione decoctum, aut etiam per se bis coctum accipere. Vinum autem thereum & scybelites praebetur, mediocri tamen ualde mensura. Eclegma uero phthysicis congruum tale est. Mellis optimi libram unam, uuarum passarum pinguium exacinarum sextantem, croci, iridis, seminis hyoscyami, tragacanthi, cuiusque drach. iiii. styracis flauae unc. i. nucum pinearum drach. vi. amyli unc. i. Exhibe ex eo cochlearium ieiunis. Tragacanthus in uino dulci modico teritur: styrax uero in pila dissoluitur reliquis coniectis ac permixtis. Aliud. Foeniculi succum cum pari melle decoquito, & ad sextarii mensuram croci drach. i. rhei pontici drach. ii. aliquando etiam hypodisthidis drach. i. adijcito. Quod si iuxta asperam arteriam extremum asperitas adsit, conijce & radice dulcis tritae drach. ii. detur cochlearis mensura a cibo. Aliud. Scillam optime assato, eiusque medullam siue medullam terito, & ad unam scillae sex mellis partes conijcito, & ieiunis inde cochlearis exhibeto. Aliud eclegma celebre. Marrubij, hyssopi, iridis, radice dulcis, pulegij, dictani, saluiae, caricarum, palmularum passarum, sing. unc. i. crassius contudito, ac in aquae sextariis tribus



tribus ad triduum madefacito: deinde ad tertias decoquito ac percolato, mellisq; libra i. adiecta, rursus donec cogatur decoquito, & post farinæ orobi scrupulos xii. terebinthinæ unc. i. amyli drac. iiii. mastiches tritæ drac. iiii. tragacanthi unc. i. adijcito. Tragacanthū primū in modico decocti madefactū conterito: deinde adiectis ei reliquis siccis, etiā ea quæ decocta sunt affundito, simulq; coactis utitor, exhibito ieiunis cochleari. Licebit & ante somnū exhibere, experimento eius utilitas cognita est. Aliud, ad phthysicos fluxioneq; thoracis laborātes. Seminis cucumeris satui desquamati drach. viii. amygdalarum delibratarū dra. iiii. seminis lini drach. ii. seminis papaueris albi drac. ii. Cōtusa & cribrata cū tragacanthi cremore cogito, & in pastillos digerito. Iuxta uirium autē tolerātiā alijs drachmā i. alijs obolos ii. præbeto: eis qui febre carent, cū uino dulci & myrti cremore: febricitantibus uero, cū cremore solo. Aliud, quod & ad phthysicos & suppuratos præclare facit. Farinā erui albi succo scillæ subactā exiccato: aut scillā assatam ac tritā, farinaq; erui subactā eodem modo exarescere finito. Vsu autem expetente, pastillos ipsos exiccatos contundito ac cribrato, melleq; permixtos cochlearis mēsurā ieiunis dato. Optimè eū repurgat. Aliud, multo usu cognitum, citra molestiam repurgās. Farinā erui unc. i. hyssopi quadrantē, seminis urticę quadrantē, iridis unc. i. mellis quantum suffecerit. exhibe ieiunis cochleare, ac confidenter utere. Aliud, experimento cognitū, quod ad phthysicos & suppuratos facit: magis tamē frigidis tēperaturis cōducit, Iridis illyricę sextantē, farinā erui albi sextantē, hyssopi, pulegii fumo nō siccati, seminis urticę, cuiusq; dra. viii. piperis gran. xii. Excipe melle, ac præbe cochlearia ii. mane unū, alterū ad uesperā. Potes et catapotia inde formare, atq; alternis dieb. exhibere. Aliud, phthysicis, & tussi ueteri aptum. Cardamomi torrefacti drac. xvi. thuris, galbani, iridis, piperis, cuiusq; dra. iiii. cassiæ, croci, myrrhæ, cuiusq; drac. iiii. opij drachmam i. cōtundito ac cribrato: & cum aquæ cyathis tribus, ac passis duobus, cochleare i. aliquando etiam duo præbeto. Licebit etiā pastillos inde formare cū passo. Aliud coptarium, siue placenta, ad phthysin, ex eclegmatum materia apparata. Ex amygdalis uidelicet amaris decorticatis, nucibus pineis recentibus, propter oleaginosum in eis saporē aqua præmaceratis: semine lini, amylo recēti hoc modo. Nucum pinearum quæ pityides appellantur sextantiū i. seminis lini sextantiū quartā partē, amyli quincuncē, piperis drac. i. mellis boni cocti & despumati quantum satis erit. In his qui caput quod facile obleditur habent, pityidas uitare oportet, proq; eis semē urticę cōijcere. Eclegma ex orobis apparatū Dionysio prætori. Erui albi torrefacti & desquamati, ac triti unc. i. costi trientem, croci sextantē, iridis unciam i. nucum pinearū unc. i. piperis grana l. seminis lini, uuarum passerarum à uinaceis depuratorum, terebinthinæ, sing. unc. i. butyri drachm. iiii. mellis quantum his cogendis satis erit. Summe hoc phthysicis auxiliatur. Antidotus ex orobo, ualde celebris, ad phthysicos suppuratos, & inueteratā tussim: optime repurgat, & cicatricem obducit. Amygdalarum amararum delibratarum sextantē, farine erui trientē, hyssopi trientem, iridis trientem, amyli sex-

tantem, piperis, panacis radicis, croci, cuiusq; scrupulos vi. succi omphacii exiccati drac. iiii. nucū pinearum torrefactarum sextantem, mellis despumati libr. i. aceti unciam i. Farina erui in aceto per diem unum maceretur, postea simul coactis omnibus, ex eis cochleare unum ieiunis præbeatur. Alia antidotus ad phthysicos, quæ etiā ad omnem tussim inueteratam conducit. Amygdalarum amararum decoricatorū sextantem, seminis urticę torrefacti dra. iiii. succi radicis dulcis sicci, radicis symphyti, cuiusque sextantem, terræ asteris, nucum pinearū torrefactarum, seminis lini torrefacti, sesami, uuarum passerarū à uinaceis depuratorū, sing. sesquunciam, farine erui albi sextantem, iridis unc. i. terræ lemnis unc. i. sapæ & mellis quantum suffecerit ad eorū coactionē. Exhibe ieiunis cochlearis mensura: aliquando etiā ante somnū. Vtere & uaria ex capitibus papaueris cōpositione, supra ad destillationes descripta, exhibēs ex ea ante somnū. Vtere & his quæ ad suppuratos sunt descripta. itē arteriacis remedijs supra præscriptis conuenientissima etiam eis est cōfectio isotheos appellata, ad tussim descripta: & antidotus pæonia, quæ in Sermone xiii. cum alijs multæ utilitatis antidotis, est relata: ea confidenter utaris. Prodest & Mithridatis cōfectio, & quæ Esdræ inscribitur, miro modo: itē ex uiperis theriace Andromachi, per interualla exhibita: quæ omnes in tertio & decimo Sermone sunt descriptæ. Vltra opinionē autem efficax est, bolus armeniacus drachmæ pondere ex uino tenui albo. Catapotion phthysicis ualde commodum & bonum, cui nullū cōparari potest: faciens ad omnē tussim inueteratam, & purulentas reiectiones: quod in tribus diebus utilitatē suam demonstrat. Styracis flauis, piperis albi, myrrhæ troglodyticæ, castorei, galbani puri, opij Achaici, aut Asiani, omnium æquales partes, cū galbano & styrace subige, ac catapotia informata erui magnitudine, quorū tria aut v. ante somnū exhibe deuorāda: calida aqua insuper ad sorbendū data, & admirandam uim uidebis. Porrò diutius perseverante malo, ac iā inueterato, cauteria admouere oportet, pectore in orbem inusto, quæadmodum in suspiriosorum prædiximus curatione.

De pleuritide siue laterum morbo. Cap. LXVIII. Pleuritis exquisita & propria, inflāmatio est membranæ intrinsecus latera succingentis, dolorem pungitiuum uehementer inferens cum acutissima febre. Cōsequitur hac affectos spirandi difficultas, & tussis aliquando quidem sicca, aliquando uero cū reiectione, ac primū quidē cruentorū: inflammatione uero matura facta, purulentorum, pulsus adest durus, & secantis quippiam modo habens. Si itaq; dolor circa mammas innititur ac usq; ad clauiculam se extendit, citra dilationē cōfidenter uena secāda est. Si uero deorsum ad præcordia uergat dolor, corpus purgandū. Quod si mediocris infestet dolor, & nō pungitiuus: neq; adsit tussis, neq; febris acuta, non opus est magna remedia adhibere. Clyster eū efficacior eis primū infunditur, deinde euacuatione aliquod operæprecium faciēte, adhibetur etiā irrigatio ac fomētiatio lateris affecti: itē sacculi ex furfurib. et pulegio ac mēta impletī: et dicta extenuatoriā uim habēs. Archigenē In his uero q̄ acuto morbo, ut diximus, infestatur, si qdē circa mamas ac clauiculā hæreat dolor, uenam



nam incidere oportet, ut dictum est, in brachio, non eo quod recta ab inflammato latere procedit, sed opposito. Sanguinis autem multitudo extrahatur, non usque ad animi deliquium, periculum enim ne in peripneumonia morbus permutetur; si quidem refrigerato ualde corpore, pulmo rarus & calidus existens lateris uicinus propter & facillime morbum susceperat. Itaque modicum extrahere oportet, & post sufficientem temporis interapedinem, rursus repetita incisione modicum auferre. Quod si animi defectionem timeamus, usque in sequentem diem eius repetita ablatio differenda erit. Deinde clyster alio adhibeatur, si non ut conuenit, feratur. Clysteri autem confidenter uti oportet ex oleo rutaceo, eliquatis in eo terebinthina & butyro: deinde forinsecus latus ex oleo calido fouere, in quo ruta, anethum, flos cyperi decocta sunt. Latam item sulphuratam, aut ipsum sulphur inspersum habentem, adhibe calido oleo imbutam, ita ut insperso modico thymo trito imponatur, leniterque ac prouide colligetur, atque hac sane irrigatione utendum est ad tertiam usque diem: quarta deinde cataplasma adhibeatur ex polline ac lini semine, melleque ac oleo rutaceo: sitque uehementer leue ipsum cataplasma. Quod si liquidior relectio existat, farina etiam lolij, & seminis irionis ammiscenda, aut foenum graecum ac nitrum inspergendum. Si uero repurgamento liquido prodeunte adhuc perseveret dolor, suppuratum fieri hominem spes est. Quare sinapi etiam in cataplasma commiscendum, & nasturtij semen, ac rosamarinij semen canchry appellatum, itemque pyretrum: aut farinam lolij, ceram, & bituminum, cum oleo eliquatis permixtam impone. Cura etiam adhibenda est ut calida permaneant cataplasmata: quod hoc modo fieri potest. Oleo calido uescam bubulam semiplenam reple, eamque frequenter cataplasmati admoue. Post septimum autem diem, si eodem modo dolor persistat: cucurbita lateri affigenda est, & cutis scarificanda. Manifestissima enim in pleuriticis utilitas ex cucurbitulae appositione apparet: uulnuscula autem scarificati loci sale aut nitro inspergenda, si quidem sustinere queant: in alijs uero linteolum oleo madefactum ac sale conspersum imponatur. Sequenti deinde a scarificatione die optimum est rursus cucurbitam affigere, quo sanguinis saniosus ex impactis uulnusculis extrahatur. Haec enim detractio priore commodior existit: non enim sanguis, sed sanies in secunda detractio auferatur. Tertia uero die post sanguinis detractio, ceratum cyprinum aut rutaceum tum pertusae cuti, tum uniuerso lateri imponendum: neque unquam affectus locus nudus relinquendus: quod si permutati in pus humoris signa appareant, & non per exhalationem discutiatur, coadiuuare permutationem oportet, althaea & caricis in complexum cataplasmatum coiectis. Post uero etiam epithematis utendum: relectionis maxime tempore, huiusmodi mixtura apparatus. Butyri, terebinthinae, oesypi, id est ex lanae succida sordibus pharmaci, ceram, medullae ceruinae, iridis, omnium aequales partes conijce, modico oleo cyprino aut rutaceo ammisce. Optimum est etiam sulphur tenuissime tritum cerato liquefacto inspergere. Admirabiliter quoque eis auxiliatur brassicae radix sicca, una cum cauliculis exusta, cinere eius axungia ueteris uilla sufficiente excepto, ita ut ne perfluat in corpus, ipsumque inquinat. Praeclare enim discutit, & mi-

tigat dolores. Probè etiam auxiliantur brassicae, itaque cupressi folia tenera trita, & cum axungia imposita, aut marrubium eodem modo, aut cinis sarmetorum, aut ficus pingues cum pari axungia commixtae. Eundem usum praestat stercus caprinum cum axungia impositum. Aliud epithema, pleuriticis ualde commodum. Opopanacis unc. i. foliorum rutae sextantem, olei cyprini lib. i. ceram sex unc., terebinthinae sex unc., galbani sesquiunciam. Opopanax in oleo cyprino dissoluitur: galbanum autem cum rutae folijs conteritur: quae uero eliquari possunt, liquefiunt, & refrigerata tritis ammiscuntur. Aliud, experimèto cognitum. Rutae sextantem, sulphuris uiui unc. i. nitri sesquiunciam, adipis suilli trientem, ceram sex unc., olei cyprini sex unc., butyri, oesypi liquidi utriusque sextantem, terebinthinae unc. unam. Aliud epithema ad pleuriticos, in quibus dolor diu perseverat. Ceram, resinae pini, picis, baccarum lauri decorticatarum, singulorum lib. i. ammoniaci thymiamatis sex uncem, galbani trientem, pyretri sextantem, aeruginis unc. i. nitri sextantem, euphorbiae unc. unam, alij tantum dimidiam accipiunt, olei laurini aut communis antiqui trientem. Appara & utere. Rubefacit cutem, & grauitatem leuiorem facit. Epithema foetidum, pleuriticis commodum. Resinae pini lib. unam, ceram sex unc., rutae uiridis trientem, olei cyprini sex uncem, sulphuris uiui, opopanax, sagapeni, galbani, cuiusque drachm. iiii. De potionibus pleuriticorum. Potionibus iuuantur pleuritici in principio quidem aquae mulsae, in qua ruta est decocta, post etiam hyssopum, aut calamintham, aut origanum, aut iris, aut radix aristolochiae. Alia, euestigio auxiliatur. Radicis phu fasciculum in tribus aquae sextarijs decoquito: & expresso liquore ad sextarium unum, mellis trientem conijcito, rursusque decoquito, ac cyathos tres ante cibum exhibeto. Alia. Chamaepityos manipulum in tribus aquae sextarijs appara, & utere, ut dictum est. Alia. Stoechadis tenuissime tritae drac. i. exhibe ex aqua mulsae, aut simili modo chamedryn, aut chamaepityos modo apparatus praebere in potu. Prodest & dracunculi radix cocta in cibo sumpta, aut ari radix eodem modo. Sub lingua uero tessellas ex melle cocto eliquantes deuorent. Eclegma autem eis conueniens hoc est. Eclegma ad pleuriticos. Seminis urticae, seminis lini, nucum pinearum, amyli, singulorum cyathum unum, amygdala amara decorticata x. v. piperis grana quinquaginta. Noces pineas ac lini semen parumper torreto, deinde alia trita ac cribrata simul cum his melle despumato sufficienti excipito, et ieiunis cochleare unum exhibeto. Aliud. Butyrum recens cum pari mellis mensura decoquito, ac inde cochleare praebeto. In pluritudine uero diuturna exhibe seminis balsami drac. i. ex aqua mulsae, aut etiam gertianae dra. i. radicis cetaureae maioris dr. ii. ex uino, aut radicis symphyti ex aqua mulsae. Quod si liquida & cruda relectet, conuenit hoc: myrrhae troglodyticae dr. ii. croci dra. i. piperis gra. x. v. mellis despumati lib. i. cogito simul, ac inde cochleare dimidium praebeto. Oribasij antidotus ad pleuriticos & oes pectoris fluxiones. Seminis rosamarinij, opopanax, sagapeni, castorij, anisi, seselis, cuiusque drac. viii. myrrhae, opij, cuiusque drac. iiii. bituminis dra. iiii. & dimidia, piperis drac. ii. thuris sesquidrach. Vtere, araci magnitudine exhibes cum hydromelitis cyathis iiii. Antidotus alia pleuriticis ualde



ualde commoda. Baccarū lauri dra. viii. seminis rutæ syluestris drac. octo, aristolochiæ longæ dra. vi. myrrhæ drac. iiii. gentianæ drac. iiii. mellis despumati lib. i. Datur nucis pōticæ magnitudine, aut fabæ, aut araci. Prodest suppuratis, cōuulsis, itēq; ruptis. Cæterū & antidotus quæ ex quatuor rebus appellatur, præclare facit. habet aut hoc modo: Gentianæ, myrrhæ, aristolochiæ, baccarū lauri, æquales partes melle cocto excipe, & fabæ magnitudine prebe: his qui febre carēt ex uini cyathis iiii. febricitantibus uero cū aqua mulsa. Efficax est ad conuulsiones, rupturas, orthopnoeā, tormina interaneorū, et morbum regiū, & eos qui uenenū hauserunt: resistit etiā serpētū uenenis potata: præstat idē & ad morsus locum imposita. Quidā eā mysteriū appellāt. Alia antidotus ad pleuriticos pharmacū accommodatum. Extrahit menses & partus, & quæ à partu relinquuntur secundas. Dictāni, sagapeni, opoponacis, trisaginis, cuiusq; drac. iiii. myrrhæ, seminis rutæ syluestris, herbæ sabinae, comæ cetaureæ minoris, piperis, cuiusq; dra. octo, radicis gentianæ drac. vi. baccarū lauri dr. xvi. aristolochiæ rotundæ drac. ii. mellis despumati quātum cogendis his satis est. Datur nucis auellanae magnitudine cū hydromelitis cyatho i. cibi porro pleuritidis exhibendi sunt sorbiles qui in principio uerrē subducāt: uelut est ptisanæ succus cū melle, citra salē aut alterius rei admistionē. Post hæc etiā nō colata integra ptisana exhibēda: deinde micē quoq; ex aqua mulsa. quod si à melle abhorreat æger, oleum optimum in principio ptisanæ affundes, decoquesq; simul capitātū porrum, deinde modico sale condies, et exhibebis. Remittente uero ac declinante iam malo in petrosis aquis degentes pisces exhibendi, & colūbæ, omnisq; diæta tenuis cōstituēda. Alius autē assidue subducatur, in maximis præsertim doloribus: sed tamē cauendū ne fortiora solutiua exhibeātur. Mastichen itaq; tenuissime cōterito, eiusq; scrupulos ix. cū cum aqua tepida, aut lactei teporis aqua præbeto. Solutur em̄ à calida aliis. Vbi uero hanc potionē obtuleris, amygdalas amaras decorticas x. in promptu habe: easq; tritas cum pauco melle delingendas præbe, aquā etiā calidam modicam insuper bibendam. Profectu autē ex his consequente, etiā cum subscripta Asclepiadæ hiera purgabis, quo omnes morbi reliquæ extergantur: quæ enim relinquuntur à morbis, recidiuas facere cōsueuerūt: & non pura corpora quo plus nutries, eo amplius lædes. Hiera Asclepiadæ, quæ omnes abscessus in profunda corporis parte cōsistentes unā cum tuni culis ipsorum educit, phthisicis ac pleuriticis cōmoda: facit & ad eos qui assidue reuomunt cibū. Colocynthidis medullæ drac. x x x ii. marrubij, stœchadis, trisaginis, cuiusq; drac. x iiii. myrrhæ, spicē nardi, piperis longi, floris iunci odorati, calsiæ, cinnamomi, cuiusq; drac. iiii. croci drac. iiii. radicis cetaureæ maioris drac. iiii. galbani drac. iiii. Excipe melle cocto, & pleuriticis duarum nucum ponticarum magnitudine exhibe ex aquæ mulsæ cyatho i. phthisicis uero & suppuratis unius tantum nucis magnitudine itidem ex aqua mulsa.

De ea quæ pleuritis esse putatur, quum tamen non sit.

Cap. LXVIII.

Ex cruditatibus plurimis, & cibis humoris crassi ac pituitosis, ueluti sunt bulbi, ac fungi, & conlimiles:

crudi humores uiscosiq; & tenaces in corpore generantur: qui aliquando repente se in uacuum thoracis locum ingerunt, aut in ipsum etiam pulmonem. Multitudine itaq; sua succingentem latera intrinsecus pelliculam distendentes inferunt dolores: ut imaginatio factæ inflammationis in expertis exhibeatur: quin etiam uias spiritus intercipientes uehementem spiradi difficultatē inducunt. Vnde quidā medici errore seducti, uena cubiti incisa, multoq; sanguine euacuato, mortis causam ægris præbuerunt. Quare interrogare oportet, num eo cuius mentionē feci, uel sint cibo, diligentēque perdiscere formam ipsius respirationis, contingere etiam pulsus, & tactu explorare caloris qualitatem. Etenim in his non ob dolorem respiratio ut plurimum intercipitur, sed quod uias spiritus sunt obturatæ, & respirationis forma uelut laqueo collo circumdato contingit. Supini autem ferē in totum decumbunt semper, præ importabilita etiam, neque probē loqui ualentes. Ut plurimum uero non febricitant hi: aliquando & frigidius solito corpus eorum inuenitur. Quod si febre afficiatur aliquando, debilissima ipsis febricula existit, minimeq; sunt siticulosi: & quod ad hæc uel maximum signum est, pulsus difficulter mouetur, minimus & tardissimus præter solitum morem existens. Horū itaq; curatione suscepta, calefacientia, incisua, & repurgantia intrinsecus & extrinsecus offeremus: & primum quidem à simplicioribus incipiemus. Clysteri ergo cōsuetu aluum à stercoribus repurgabimus: deinde etiam efficaciori utemur ex decoctione calaminthæ, aliquando centaureæ, mellēque plurimo, ac nitro et oleo. Colocynthis autem in his quod ualde stomacho aduersetur deuitanda. Post alui euacuationem rutam & anethum in oleo decoquemus, & ex eis quā plurimum fouebimus affectos locos: lanas etiam oleo madefactas imponemus. In potu dabimus aquam mulsam, in qua hyssopum, aut pullegium, iris, caricæ plurimæ sint decocta. Succum etiam ptisanæ tenuissimum exhibebimus cum melle, quo inde uenter leniter subducatur. Eclegma autem ipsis commodum huiusmodi est. Seminis urticæ, hyssopi, iridis, nucum pinearum, amygdalarū amararum, singulorū æquales partes, modico pipere adiecto, optimo melle despumato excipe, ac inde ad summum cochlearium unū ieiunis præbe: deinde interstitio facto, exhibe aquā mulsam, ut dictū est, ac post horas duas succum ptisanæ: tertia deinde die ex farina ordeī, ac semine lini, multoq; fœnogræco cataplasma imponatur: adiciamus etiam sinapi tritum, & lauri baccas, ac parum nitri, & ex liquidis oleum rutaceum, aut cyprinū, aut anethinū. Apparandum autē est eo modo, ut thoracem & costas cōprehendat. Ablato autem cataplasmate, thorax ceraso ex butyro & terebinthina, cæsypoq; liquido, et cera, taurino adipe, ac iride, æqualibus portioibus acceptis contegatur. Aliquando etiam ex medulla ceruina & oleo cyprino. Sulphur quoque uiuum ceraso liquefacto infarciendum. Stomacho uero lanam conuolutam, unguēto nardino ac modico uino madefactam imponemus, eiq; incumbere semper sinemus. In his uero quibus suffocationis periculum imminet, uomitorijs ad anginam descriptis confidēter utemur, & maxime eo quod ex elaterio, sinapi ac nitro constat, primum quidem ipsum cū oleo & pauco



pauco melle quàm penitissimè illinendo: deinde etiam bibendum, quemadmodum illic diximus exhibebimus. Assidue etiam aquam mulsam absorbendam præbebimus, in qua hyssopum est decoctum. Porro humoribus dissolutis reiectare eos incipiet, & tussis in eis augetur: quare antidotum isotheum appellatam, tunc eis ante somnum exhibebimus, nucis auellanæ magnitudine ex aqua mulsâ. Sônû enim dulcem infert, & humores quo facile sursum efferantur præparat, ac tussim sedat, doloresq; dissipat. Est autem suprâ ad tussim descripta. Quando uero etiam uenter eis non bene excernit, mastiche tenuissime trita scrupulorum nouè pondere cû aqua tepida, aut lactei teporis bibenda offeratur, deinde amygdalæ amaræ decorticatæ tritæ ex melle præbeantur delingendæ, & aqua calida post eorû summptionem absorbenda. Feliciter autem procedente curatione, & columbarum pullos in cibo offeremus,

cum porro capitato cocto, anethoq; & oleo, modico sale & pipere adiecto. Vinum bibant fuluum, uetus, mediocri mensura. Atqui edegma prædictum ex semine uidelicet urticæ quotidie ieiunis præbebimus. Ante somnum uero isotheum antidotum alternis aut singulis diebus, donec ab omnibus molestiis ægri liberentur. Ceratum autem quod pectori adhibetur, singulis diebus renouetur. Et si quidem uenter adstrictus sit, mastiche cum amygdalis & melle præbeat. Edegma Galeni, ad diuturnum pectoris dolorem citra febrem. Fœnumgræcum aqua macerato, deinde decoquito, & prima aqua diffusa, & palmarum pinguium carne adiecta rursus coquito, ac exprimito succum: quem deinde melle largius permixtum rursus ad prunas decoquito, donec ad mediocrem spissitudinem redigatur: & ex hoc multo antè reliquum cibum tempore delingendum exhibeto.

## OCTAVI SERMONIS AETII

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN

NONO SERMONE AETII

HABENTVR.

|                                                                                        |                                                                                               |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b> E cardiacis. Cap. I.                                                          | bimodo conuelluntur. cap. XVIII.                                                              | tem curare oporteat, ex libris Philumeni. cap. XXXV.                     |
| De his quibus atra bile stomachus infestatur. cap. II.                                 | Viridis aspidis usus. cap. XIX.                                                               | Cura eorum qui ex debilitate, alui fluxione laborant, ex Gal. ca. XXXVI. |
| Ad eos qui flauâ bilē euomunt. cap. III.                                               | De appetitus perditione. cap. XX.                                                             | De cœliaca affectione, Archigenis. cap. XXXVII.                          |
| Ad eos qui stomacho exuruntur, & siticulosi sunt. cap. IIII.                           | De appetitu canino. cap. XXI.                                                                 | De colliquatione. cap. XXXVIII.                                          |
| De singultu. cap. V.                                                                   | De appetitu canino, qui ex immodica transpiratione, ac cutis exolutione contingit. cap. XXII. | De lubricis, ex Herodoto. c. XXXIX.                                      |
| De bulimo, hoc est, ingēti fame. ca. VI.                                               | De uitioso appetitu. cap. XXIII.                                                              | De lato lumbrico. cap. XL.                                               |
| De animi deliquio, ex Philumeno, cap. VII. <i>saluo</i>                                | De cruditate, Galeni. cap. XXIIII.                                                            | De ascaridibus. cap. XLI.                                                |
| De his, qui in <i>balneo</i> animo linguuntur. cap. VIII.                              | De crapula, Philumeni. cap. XXV.                                                              | De abscessu in intestinis. cap. XLII.                                    |
| De stomachi imbecillitate, & supinitate, ac subuersione, ex Gale. cap. IX.             | Quæ cura aluo adstrictæ exhibenda, ex Galeno cap. XXVI.                                       | De dysenteria, hoc est, torminibus intestinorum. cap. XLIII.             |
| De nausea, ex Galeno. cap. X.                                                          | De inflatione, Galeni. cap. XXVII.                                                            | De tenasmi cura. cap. XLIIII.                                            |
| Cataplasmata & epithemata ad nau seas & uomitus. cap. XI.                              | De uoluulo, Archigenis. cap. XXVIII.                                                          | Cura dysentericorum. cap. XLV.                                           |
| De cholera seu bilis effusione. cap. XII.                                              | De his qui ab acri humore coli dolore infestantur, Galeni. cap. XXIX.                         | Cura eorum qui aurum aut æs, aut tale quippiam deglutiuerunt. cap. XLVI. |
| De stomachi adstrictione. cap. XIII.                                                   | De his qui à frigidis & pituitosis humoribus, coli dolore infestantur. cap. XXX.              | Communia remedia dysentericorum, quæ supernè exhibentur. caput XLVII.    |
| De humoribus à capite in uentrem destillantibus. cap. XIII.                            | Pharmaca ad colicos. cap. XXXI.                                                               | Composita pharmaca, quæ supernè exhibentur. cap. XLVIII.                 |
| Dieta conueniens his qui stomachum habent dissolutum, aluum autem adstrictum. cap. XV. | De antidotis dolorem leuantibus, insusisq; colicis accommodatis. ca. XXXII.                   | Quæ infernè dysentericis infundantur. cap. XLIX.                         |
| De stomachi inflammatione. cap. XVI.                                                   | Quæ colicis infundantur, & per anum subdantur. cap. XXXIII.                                   | Epithemata dysenterica. cap. L.                                          |
| De stomacho exulcerato. cap. XVII.                                                     | Cataplasma colicum, ex libris Seueri. cap. XXXIIII.                                           | De lienteria. cap. LI.                                                   |
| De his qui à stomacho, comitialis mor-                                                 | Quomodo aluum fluxione laboran-                                                               |                                                                          |



# AETII MEDICI GRAE- CI CONTRACTAE MEDI-

CINAE TETRABIBLI TERTIAE

SERMO PRIMVS, ET EX  
ORDINE NONVS.

\*

*De stomachi, alui, ac interaneorum affectionibus.*

*De cardiacis.*

Cap. I.



**Q**UOMODO eos, qui cardiaci appellantur, curare oportet, aut eos etiā qui aliter ob stomachi afflictionem animo linquntur, iam absolutissimē prae dictū est in quinto huius tractationis sermone, ubi ad febrium curā hāc annexuimus. Nunc uero quum affectionē stomachi ac alui remedia opportunē ex ordine describemus, necessariū uisum est & hic paucis eorū mentionem facere. Cognoscemus igitur eos qui cardiaci dicuntur, quum acuta febris & maxime aestuosa affliguntur hoc modo. Pulsus si inuenero densum & obscurum, & extremarū partium frigiditatē, sudores circa faciē & ad pectus usq; glutinosos, & odorem corporis terrestrem nares percellentem, & pulsus circa ipsum cor uehementiores & magnos, & ad hāc accedant desperatio, angor animi, & corporis iactatio. Hoc modo affectum, cardiacū esse dico. Os uero uentris primū est quod in ipsis afficitur, per consensum uehementer oblādēs cor ipsum, propter uicinatē. Porro ueteres os uentris cordis appellatione Cardian uocarūt, ab accessionibus nimirum quae ex eo accidunt & inferuntur. Aëris itaq; frigidi admissio ne & uentilatione eis auxiliari oportet. Spōgia igitur ex posca frigida imbuta, facies permadescat, & aqua lactei teporis paulatim absorbēda praebeatur. Odoramenta autē uaria offerantur, malum cotoneū, pulegium, cucumer, & similia. Stragula eis incubentia collantur: operimenta uero quibus cōteguntur, mollia sint, & usu priore detrita: pauimentū irroretur, ac folijs consternatur myrti, platani, ac quercus, maxime uero uitis atq; ipsis etiam rosis. Solē autē domus in qua decumbit nō admittat, siq; minime alta, sed depressior, et nō ualde lucida. Exudantibus uero partibus myrtus sicca trita inspergatur, aut cimolia, aut cenanthe, aut ordeū: imprimis uero collo & thoraci, & locis sub alis ac inguinibus ea sunt adhibenda. Eodē modo auxiliatur malicorium cū manna inspersum: aut galla per se, & cū sulphure uiuo, aut samia terra admixtum habēs gummi. Illinuntur etiā ad coërcendos sudores, oleū myrteum, cēnāthinū, rosaceū, melinum, & lentiscinum. Circūlita autem sudores cohibēt, manna & amyllum cādido oui excepta, aut bulbus albus, & piper, ac urticae semē, et gūmi, modico cerato myrteo excepta, aut oui candido subacta, quae sanē crassius inungere conueniunt: adglutinantur em̄ & exarescunt, & potissima in eis spes cōsistit naturalis caloris reexuscitandi. Neq; uero pinguefactae cuti huiusmodi inunctiones sunt adhibēdā: uerū linteolo probē prius extersā inūgātur. neq; mox ubi calor apparere incipit, auferātur, sed postq; sufficiēter extreme corporis partes fuerint cōcalefactae, quod ubi cōtigerit statim tollātur, et tho-

rax cooperiatur, atq; sicubi uarosum quippiā aut ucerosum ex inunctionis adustioe circa thoracē appareat, blāde tractetur, ac aliquo ex his q̄ ad ambustos ab igne descripta sunt, pharmaco locus curetur, maxime uero cōueniet id qd̄ ex ordeo cōstat. Extreme uero corporis partes, siue ad gēua usq; & cubitos, siue usq; ad locū sub alis & inguina sint refrigeratę, fece usta & sulphure uiuo cōspērgēdā, aut pyretro, aut piperide, aut bulbis tritiscū pipere illinēdē a brachijs usq; ad digitos, & a fœmore usq; ad extremos pedes, gracilibus linteolis simul circūpositis. Idē prestat sinapi & pyretro, ac adarce. Porro mollibus corporib; sufficit aliquando oleū sicyoniū aut gleucinū illitū, cū multa fricatione ac cōcalefactioe partiū extremarū: quanq̄ nihil uetet piperis ac ceræ modicū his ammiscere, quo spissiora fiāt, & melius adhærescant. Fasciculus quoq; ex lana pura in oleo calido madefactus incubat semp̄ circa uesicę regionē. Capitis fomēta frigida sint, qualia ad phreniticos sunt descripta: frōs spōgia ne madefiat, sed ex acacia, galla, terra samia, ac syluestris punici flore illinatur. Optime facit etiā omphaciū, & gūmi, uerū unūquodque eorū ex rosarū decocto aut succo, aut aliquo cōsimili diluatur prius, & deinde illinatur. Quod si quis sanitatis tēpore nimitū repletus existat, & stercora antiqua recto intestino insideāt, tūc sanē clysteri simpliciore euacuare oportet: ex succo ptisanę, et modico melle, paucissimoq; sale, & oleo quoq; modico adiecto. Illinenda est etiā singulis dieb; sedes ipsa ex cumino, ruta et nitro, cū modico melle cōmixtis, ob inflationū uidelicet educationē. Si uero nulla stercora in intestino recto subsideāt: neq; aliās etiā excrementorū multitudo insit intestinis: ægri autē cibū nō sentiant & tabescāt, ptisanę succū aut halicę p clysterē infundere oportet tepesactū, cōquassato cū eo ouo crudo. Ultra hoc em̄ quod ea q̄ stomachū inferne molestia afficiūt, euocat et educit, etiā alimētū optime corpori sufficit ex lāguore ob nō acceptū cibū misere affecto. Auxiliatur itē cardiacis cataplasmatīs modo, stomacho, ac sinistra māmā imposita, folia rubi cū pane, aut myrti folia, ipsaq; myrti bacce, aut pāpini uitis, aut plātago cū pane, aut mala cotonea & palmę, aut intubuscerato exceptus. Imbecillioribus polentam cum palmis imponere sufficiet, aut palmas uino madefactas unciaē unius mēsurā contere, deinde adiectis aloēs drachmis quatuor, mastiches drac. iiii. simul tere, & affuso eliquatę ceræ sextatē, & olei, si quidem hyems sit, neq; multus caloris sensus ægrum cōtingat, nardini: in æstate uero rosacei, aut melini triente simul misce, ac utere eodem modo. Quod si ex uisceribus quoddā inflāmatum sit, panē cū modico uino et melle decoctū impone, admixtis in his qui imbecilliores sunt malis repurgatis, aut cenanthe. Reprimūt autem sudores stomachumq; & cor ipsum firmitatis autorem placat ac cohibet ca-

z taplasma



cataplasma ex palmis, & oenanthe, & acacia, rosis, alumine, hypocisthidae & rhoë rubro: ita impositum ut si nistrā māmam atq; ipsum uentrē cōplectatur: sit etiā tactu molle & leue, ac assidue permuetur. Reuocato aut ex accessione ægro, si loci quidā circa præcordia sint inflāmati, puidere oportet ut per cōmunia cataplasmata ab inflāmatiōe liberentur. Cibi offerēdi, panis ex aqua frigida, aut ex uino albo & tenui frigidoq; ac diluto: pedes suilli, taliq; & rostra: ex uolucris macræ, & nō foetidæ, in ptisanæ decoctione eliquatæ, aut etiā per se. Frigida autē hęc exhibeantur, si calorīs sensus circa stomachū sit, et eger inflāmatiōe nō uexetur. Alijs calida exhibenda, si militer autē & potus calidus dādus, uinū tenue, album, dilutū: immodicam autem uini exhibiti multitudinem pulsus ægroti ostendet. Eo usque enim exhibendum est uinum, donec pulsus subremulus esse desinat, & robustior fiat.

*De his quibus atra bile stomachus infestatur. Cap. II.*  
 Ex Herodoto. Quibus stomachus ab atra bile in febribus uexatur, similes accessiones cardiacis patiuntur. Accedunt autē ad hęc, fortis stomachi morsus, cū eius exolutione, & capitis uertigine, ac frigido sudore, paruusq; & obscurus adest pulsus. pgressu uero temporis augetur morsus, atq; hinc in dolorē q̄ difficulter leniri potest, trāsit. Cæterū manifeste apparēs fluxus bilis uomitus has accessiōes leuiōres reddit, atq; autē bilis soluit. Vomunt autē ferē in totū hoc modo affecti pituitā acidā in uentre coaceruatā ex assidua cruditate, propter uētris ipsius debilitatē. Qui uero citra febrē ab atra bile stomacho infestatur, his accedit tēpore quo humor ipse generatur et producit, tristitia, & somnus cū accessione imaginationū alienarū, contractioq; & dolor poplitū ac surarum. Acutius quā antē consueuerunt, cernūt, & deiectum habent appetitum: ructus autē & excreationes foetidas & pisces olētes. Coaceruata uero bile cū multa desperatione intolerabiliter ignescunt, ut omnia eis mēbra ardere uideātur: in primis autē stomachus uelut à palis igne candefactis pūgatur, afficitur. Sudores animi deliquiū inducētes per omne corpus destillāt, & ferē semper sputi influētis reiectione uexantur, quum morsum sentiūt, multamq; habēt uomentī cupiditatē. Et aliquādo quidem frustra lācinantur, quādoq; autē pauca quædā biliosa aut acidā pituitā, quæ in uētrē defluerūt euomūt, modicoq; tēpore à malo leuati, rursus idē patiūtur, atq; in uniuersum his qui ueratrū sumpserūt similes existūt. Pulsus autē aliquādo densiores, aliquādo etiā rariores & minores fiunt, plurimum uigiles permanēt, & si quidē dormierint cū perturbatione æstuosiores exurgūt, ebulliente ut uerisimile est delato in uentrē humore. Sæpe etiā acceptū cibū unā cū atræ bilis humore euomūt: ferē in totū em post duas ab accepto cibo horas accessione appræhēdūt, maxime quū acré aliquē aut salsum cibū aut potū ingesserūt. Excremēta alui retinētur, aut præter naturā incocta excernuntur. Effertur autē aliquādo & bilis inferne per aluum, atq; adiuuat affectionis declinationē. Aliq; aut ob retētā bilē, etiam atræ bilis affectionibus, & delyrijs mētē alienantibus sunt appræhensi. Quod si contingat, siue febris adsit, siue nō, si quidē iuuenes sint, sanguineq; abundēt, & reliqui numeri ad uenę incisionē requisiti adsint, uena secanda est, repetita

sanguinis detractione, & hoc tamē per infusum clysteris, corpore prius euacuato. Atqui ad animi usq; deliquium id facere nō oportet, ppter stomachi imbecillitatē. Colligādæ autē adstrictæ extremæ corporis partes, & ad paucum cibū ægri cogendi, stomachus uero lanis succidis fouendus est ex aceto plurimo, modicoq; rosaceo, aut melino, aut lentiscino. Quod si amplius permaneat stomachi imbecillitas, ex rosarū succo foueantur, siue intubi aut portulacę cum rosaceo: adstringētia etiā & leniētia cataplasmata imponantur. Qui uero unā cū morsu circa uentrē ac intestina inflantur, ijs cōueniētissimū est acretū, in quo pulegiū est decoctū, & cum inū calidum forinsecus uentri per spongiā impositū. Dolo re uero perseverante, alumē liquidū cum atramēto sutorio trito, & aloë melle excepta imposito, & alumine in acetū coniecto & calefacto, stomachū per spongiās foueto, aut aluminis ac aloës æquales partes cerato myrteo exceptas ad os uētris apponito, aut hederę folijs in uino decoctis uentrē integito, aut plantagine cū sale trita, aut marrubio cū pane & rosaceo subacto, aut bulbis rufis cum pari pōdere aluminis cooperito. Optimū em hoc est, inueterato malo remedium: quā & bulbi ipsi cum nitro triti & impositi celerē curationē præstant. Optimē etiā conductis gregarij bouis stercus aridum uino decoctum & impositū. Epithema quoq; ex seminibus adhibēdū: itē bulbi cū stercore bouis ac nitro pmixti. Ex Dioscoride. Conueniētissimū omnium his qui atrā bilē generāt, inflatisq; & morsum sentientibus, pulegi decoctum existit potatū, aut aqua in qua ferrum est extinctum: itē intubi succus potatus: bibant autem aquā, eamq; calidā. Si uero plurimi calorīs sensum percipiant, frigida danda, sed modica, & maxime tēpore exacerbationum. Aestuantibus enim & in anxietate existētibus, omniq; miseria afflictis, frigida ad absorbendū cōcedēda, per interualla tamē, & nō ultra cyathi mensurā. Nō enim humectatione opus habent, sed refrigerationis tantū gratia, frigida permittitur, et ut melior intrinsecus tēperatura fiat. Utile est ipsis & mentæ succus cū succo mali punici dulcis. Quod si aquam bibere non possint, parum uini aquosi cōcedendū est inter cibos, calida aqua probē diluti. Cibus maxima ex parte sit frumētaceus, et optimi succi in omnibus: simplicior autē & qui facilius concoqui ac cōmutari possit in febricitantibus. His uero qui febre carēt, adijci possunt ex oleribus, lactucę cauliculī ac maluæ, pisces petrosi aquis degentes, & ex uolucrū genere, nō graue olētes, macrę & mōtanæ: ex ostreis quę testa integūtur, herinacel recētes. A salis uero & acris in totum abstineāt. Molestas autē mordacitates & nauseas, hausta plurima tepida aqua per uomitū soluāt. Si uero id nō bene tolerant, quiescere iubeto, & extēse manus palma stomachū foueto, quo delatū ad ipsum biliosum infernē per aluū excernatur. Quod si uenę incisionē non faciamus, secunda ac tertia die per clysterem euacuandū est, & modico cibo æger cōnutriendus, deinde in potu exhibendū pulegi decoctum ieiunis, reliquaq; suprā dicta. Fomētum etiā ex aceto adhibendū, & cataplasma ex stercore bubulo ammixtis bulbis & nitro. Porro postquā febris cessauerit, aut ubi etiam in totū nō febricitauerint: & tamē diutius malū molestia affligerit, & iritationes per longa interualla



terualla repetuerint, purgandum est corpus ex hiera Archigenis, aut Ruffi. Qui uero spuri multitudine stomacho uexantur, his conyza arida maximè tenuis māducanda, aut pulegium, & mastiche chia ex aqua potanda. Exhibendū est etiā lac in potu n̄isdem quēmadmodū in proprio capite de ipsis ex professo est ostensum. His uero qui stomachū ualde exolutū habent, serū lactis per acetū mulsū fisci exhibeatur, ita ut ad primū seri haustū epithymi tenuissimè triti scrup. i. x. & scammoniae obolum i. aut ii. iuxta uirium tolerantia inspergamus. Deinde serū ipsum per interualla paulatim bibāt, sitq; eius potari mēsurā ad minimū quinque cyathorum. Bonū est & cucurbitulā ad dorsum affigere, aliquando etiā ad stomachi regionē, & scarificatione facta, sufficientē sanguinem ex fissuris extrahere. Quo uero penitus affectio hæc destruat, quotidie horā unam ante ciborū sumptionē exerceantur, ac frigida lauētur, maximè in mari, & arena sub caniculæ ardoribus obruantur. Abstineāt autē ab omnibus atrā bilem generantibus, maximè carnibus bubulis, uino nigro, brassicæq; & lēte. Diligentissimè autē de ipsorum diætā in sexto Sermone, ubi de atra bile affectis egimus, est prædictū. Quod si inflatio eis augescat, ruīā & cuminū in oleo decoquamus; indeq; uentrē quā plurimū irrigabimus, ex eodēq; oleo quincuncē per clysterē infundemus, si tamē clysteri stercorūeductiuo prius ipsos euacuauerimus, in quo decocta sint ruta & cuminū. Deinde splenium magnum aluo ac uisceribus imponendum ex epithemate quod ex seminibus cōstat. In cibo uero succus prisanæ detur, qui ex aceto, melle, cumino, & aniso sit conditus. post etiā gallina n̄isdem cōdimentis apparata exhibeatur, potus uero sit uinum rufum mediocri mensura.

Ad eos qui flauam bilem euomunt. Cap. III.

Ex libris Philumeni. Qui flauam bilem euomunt, siue in febribus, siue citra febres id contingat, eis cōueniunt ea quæ ad nauſeā, ac nimia stomachi humectationē describētur. Quare omnibus ad illos descriptis odoramentis, manducatorijsq; & fomentis utatur. Decubitus autē eorum, a cibo præsertim & potu supinus adornetur, & spōgia ex posca imbuta ad os uentris imponatur, maximè si non uilis & contemptibilis sit dolor. Fricatio etiā & constrictio iuncturarū manuum, ubi pulsū exploramus, adhibeatur, & reliquarū similiter extremarū corporis partium. Cataplasmata autem ex palmis, malicorio, & similibus accipiātur, quæ ex uino quidē aut posca sint decocta, cū pane autem & acacia, & hypocistide permixta ac contrita; quin & rhus & syluestris punicimali flores cōmodè cataplasmati admiscantur. Atq; uniuersi corporis curatio ex oleo fiat, modico nitro ammixto, quo sudorē ex cute eliciamus, & fluores transferamus; & ob id etiāalui per inferna excretio plus quā oportet facta uomitus desiccet, quare ex absinthio & aloē portionē cōueniēter exhibebis. At uero affectione diutius perseuerāte, si ægrī uires nō repugnēt, etiā hieræ catapotia ex colocynthide ab Archigene descripta apparabimus, deq; eis minimū drach. i. summum iii. dabimus. Et si nihil obſtet cataplasmate ex sinapi præcordia rubeficiemus. Præclare enim sensum ipsum ad cutē transfert. Verū hæc diuturnæ affectioni remedia cōueniunt. Tēpore autē exacerbationis & circa accessionis acumē, cucur-

bitula plurimū auxiliatur cū multa flāma ori uētris affixa, fortiterq; abstracta, rursusq; secūdo ac tertio adglutinata. Cibus quales uomētibus solemus exhibebimus, sæpe & paulatim sumēdos, & quotiescūq; reuomuerint acceptos, toties alios post modicum interuallū offeremus. Ante cibum aquā tepidam dabimus, & uomere cogemus: bilioso enim humore circū circa adhærente unā cū aqua reiecto, stomachus elotus ac leuior redditus statim retinet oblatum sibi cibū. Mitigat autē dolores & stomachi morsus portulacæ succus tū per se, tum cū unguēto nardino aut melino mixtus. Qui uero stomachū habet uehementer exustū, eis utile est lapathi acuti semen, triū obolorū pondere ex aqua; aut mastiches tenuissimè triatæ cochleare bibendū præbe leiunis ex aqua. Maximè omniū autē morsus sedat lac asininū: aut si hoc non adsit, bubulū recens mulctum potatū, absq; dilatione enim auxiliatur: si uero neq; hoc adsit calidū, quartā eius partē aquæ addere oportet, & feruefactū bibendū præbere. In balneū quoq; & ad uini potationē celerius ducēdi sunt qui bilē uomūt, quouidelicet ad cutē materiā transferamus. Cæterū & uinū subadstringēs firmitatē corporibus addit, ac cibos retinere cogit. Utendū est etiam aliquando ceratis ex lentiscino aut cœnanthino oleo, admixtis absinthio, aut aloē, aut galla, aut cœnanthe.

Ad eos qui stomacho exuruntur, & siticulosi sunt. Cap. IIII.

Sitis fit aut ob penuriā humiditatis, aut abundantiam caliditatis: siccitatis remediū est somnus, caliditatis uigiliæ. Verū his qui ob multi uini potum sitiunt, frigida aqua potata auxiliatur. Quibus autē longo iam tēpore stomachus estuat, eis auxiliatur, simulq; sitim sedat, radicis dulcis succus potatus, atq; ipsa etiā radix ex aqua, pampinorū uitis cremor, & portulacæ succus. Ab imbecillitate autē uires recolligētibuscum sitim sedāt, ficus siccæ cibo acceptæ, & symphytum in petris nascens cōmanducatum. In cataplasmatibus uero ad stomachi ardores conducunt, sanguinaria, intubum, sonchus, apium hortense, pampini uitis, portulaca, unumquodq; cum polenta aut pane. Qui in superficie uruntur, his ramentorū cucurbitæ succus opitulatur cum rosaceo, aut omphacij succo. Sitim autē quæ in febribus oboritur, lenire solet capitis irrigatio ex frigidissimo oleo, aut rosaceo, ex alto nimirū sincipite irrorato. Sitim etiā adimit stomacho exustis cucumeris semen cōmanducatum, decorticatū uero & tritū ex aqua potatū ualde n̄isdem auxiliatur. Eodē modo prodest lactucæ semen manducatū & potatum: item semen portulacæ. Aliud adipson, sitim optimè tollens. Cucumeris satiui seminis decorticati dra. viii. tragacanthi dra. iiii. tragacanthum contundito & cribrato, semen uero contrito, eisq; ouorum crudorū recentium cadida adijcito, & simul omnibus contritis catapotia informato, ac in umbra exiccato. Ex his deinde unum sub lingua detinendū præbeto, ut paulatim dissolutū deglutatur. Aliud adipson, ad stomachi nimia humectationē commodū, in his præsertim quibus humida & calida dispositio adest. Rosarum uiridium unguibus earum reſectis drachm. vi. radicis dulcis drachm. iiii. spicæ nardi drach. iiii. excipe uino dulci, & redige in catapotiorum formam, indeq; ciceris magnitudine sub lingua detinendum præbe, refrige-



rat, & firmitatem addit. Aliud. Seminis cucumeris, seminis portulacæ uiridis, tragacanthi, cuiusq; drach. iiii. radicis dulcis drach. ii. Excipe portulacæ succo, & in cataportia redige magnitudine fabæ, & utere uno pro uice sub linguam exhibitio. Absorbent etiam malorum cotoneorum cremorem, aut pisorum, aut omphacii succum cum aqua. Aliud adipson. Seminis portulacæ uiridis, seminis peponis, succi radicis dulcis, tragacanthi, singulorum æquales partes, aqua subigito, & ad fabæ magnitudinem reducito, ac utitor.

*De singultu.*

Cap. v.

Singultus accessio stomacho accidere solet ob repletionem, aut euacuationem, aut frigiditatem: aliquando etiã ob humorum acrium & medicata qualitate prædicatorum mordacitatem, quos ubi uomitu reiecerint, statim à plurimo singultu liberantur. Quin & hi qui phar macum ex tribus piperis generib. biberunt, aut ipsum adeo piper, si statim uinum à sumptione eorum ingesserint, omnino singultuunt. Cibus quoq; in mordacem qualitatem corruptus aliquos singultu facit, & oris uentris frigiditas singultum inducit, maxime uero omnium pueris frequenter singultus accidit ob stomachi frigiditatem, & alimenti corruptionem. Fit etiã in febribus singultus, stomacho præsertim aut aliquo alio uiscere inflamato. Frigiditate itaq; singultum præcedente, oleum lana exceptum stomacho imponendum, in quo ruta, cuminum, & absinthium sint decocta. In potu etiã ruta cum uino exhibenda, aut apium in aqua mullsa decoctum, aut cuminum tritum, aut calaminthe, aut asarum, aut pulegium, aut dictamnium, aut celica nardus, quodlibet eorum per se aut simul mixta. Vtile est & acetum scyllinum sorbillando acceptum. Castorium autem eis qui integræ sunt ætatis, tum ob frigiditatem singultuibus, tum ob humorum multitudinem similiter affectis, drachmæ pondere ex posca dandum: quin & stomacho forinsecus impositum utriusq; commodum existit cum oleo sicyonio aut antiquo. Quando uero ex repletionem singultus oboritur, quomodo in totum frequentissime consistit, uiolento motu opus habet. Vomitus itaq; remedio fuerit, & extremarum partium adstrictio, compressio spiritus, uociferatio concinna, cum plurimo clamore, deambulatio longa & concitata, gestatio atq; adhuc magis equitatio, cucurbitulæ cum plurima flamma pectori, stomacho, & dorso affixa: sternutatio etiã conuenienter prouocatur, eis qui ob humorum multitudinem singultuunt. Singultui autem ex euacuatione oborto maxime contraria sternutatio existit: sanantur autem hi per alimentum conuenientis assumptionem, & per ea quæ defectum explent. Singultus in altiore sopore, aut animi deliquio, aut tetanis obortus, mortem non longe abesse præfagit. Cæterum & his aqua mullsa assidue bibenda exhibere conuenit, aut aqua puram mediocriter feruifaciam. Conducit & castorium ex aqua mullsa potatum pondere trium obolorum. In his uero quæ à malo uicti sunt, præclara remedia recusanda sunt. Porro mordacitate singultum producente, primum sufficiens remedium uomitum ipsum reperiemus: deinde etiã sensus stupefactionem, & morsum inferentium alterationem ac discursionem. Stupefiunt itaq; sensus per refrigerantia. Alteratur autem mordacitas per obtundentia. Eiusmodi mixtæ facultatis subiectum pharmacum existit, & quæ ei assimilari possunt. Habet autem hoc modo. Asclepiadæ phar-

macum, ad eos qui stomacho exuruntur, & ad uehementes singultus, uoluuolosq; stomachi affectiones. Costi, spicæ nardi, chrysobalani, croci, rosarum uiridium, mastiches, cuiusq; drachmas iiii. asari, aloës, cuiusq; drach. ii. opii drach. i. subige cum psyllii cremore, & digere in pastillos, quorum tres pro uice dato. Ego uero chrysobalano reprobata, pastillo qui aster appellatur ad hos utor, qui paulo mox ad stomachi subuersiones describetur. Obtundit autem mordacitatem, & ex ea obortum singultum sedat, intubi succus potatus, cucumeris semen decortiatum tritumq; bibitum: lactucæ semen eodem modo, item portulacæ succus potatus, ipsaq; portulaca in cibo sumpta: myxarum decoctum in potu acceptum: maxime omnium tamen præstat lac recens mulctum potatum.

*De bulimo, id est, ingenti fame.*

Cap. vi.

Bulimos ex stomachi frigiditate oboritur, indigentiaq; ac uirium imbecillitate, & ab externo frigore fere in totum initium capit. Vox ipsa Græca est, & à Latinis magna fames interpretatur. Fames enim in principio multa adest, quæ tamen non usquequaq; perdurat. Nam postea repente animo linquntur, cum extremarum partium refrigeratione, & spiritus defectione. Et sanè quidam in locis desertis, aut in balneo in malum istud collapsi, ex instanti perierunt, auxiliij facultate destituti. Peregrinationes autem & itinera longa, maxime per niuem facta, affectionem hanc inducunt. Eos itaq; qui in itinere, aut aliàs fame magna citra febrem infestantur, resouebimus ac reuocabimus aceto aut pulegio ad odorandum exhibitio, aut terra quęcunq; tandem obtigerit aceto conspersa: item pomis ac alijs qui inueniri possunt fructibus. Auxiliatur & panis recens naribus admotus, & caseus boni odoris, caro suilla assata aut cocta: & in uniuersum omne quod ualde nutrit, maxime uero quod nidorosum ac probe conditum habet odorem: his enim ut plurimum multi refocillantur. Cæterum & extremæ eorum partes fasciis cōstringendæ sunt, manuumq; ac pedum summitates calide aque feruientiorem imponende, & ipsi quoq; stimulis eorum maxillis, crinibusq; ac auribus uellicatis excitandi. Reuocatis autem ab exolutione panem ex uino diluto offeremus, aut aliud quiddam eorum quæ acuatim uires reparare possunt, uelut sunt, oua sorbilia, halica cum uino. Compediosissimum enim auxiliū ex cibo sperare possunt, quem etiã si oblatum acceptare non possint, ori indere oportet uiolenter, cogereq; ut ipsum transglutiant. Euestigio enim & à fame & ab animi deliquio liberantur, & celeriter excitantur. Accedit etiã in febribus, raro tamen, neque cito, uerum circa uigorem ac declinationem. Si itaq; remissionis exacerbationum febrilium tempus, eius accessio irruat, aut circa exacerbationis declinationem, intrepidè eis cibi sunt offerendi. Si uero in principio accessionis febrilis, aut in uigore apparuerit, per prædicta odoramenta conabimur eos primum reuocare, maxime per ea quæ frumetacei generis existunt: uelut est, polenta aqua madefacta, aut posca, aut panis calidus uaporem adhuc emittens. Fricatio etiã extremarum partium adhibeatur, & cataplasmata ex palmis, aut malis cotoneis, aut polenta, in uino diluto decoctis, atq; hæc usq; ad remissionem facere oportet, ut oportune cibum offeramus. Quod si ex his nihilo melius habeant, audendum est per ciborum ingestionem auxiliū



auxilium adferre. farinæ itaq; crassioris cochleare unum ex aqua mulla, quæ lactis speciem ac teporē in tactu de se præbet exhibeto. Buccellas item unam atq; alterā uino madefactas. His enim refocillati ac respiciētes, ex improviso deinceps usq; ad remissionis tēpus perueniunt, in quo tū corporis curationē, tū sufficientē ordinabimus cibū. Vitabimus autem omnino in his qui hac affectione sunt apprehēsi, longiorē cibi dilationē ac inediā, & ne alternis tantū diebus cibū offeramus. Verū solerti ratiocinatione facta, singulis horis simplicissimum modicumq; cibum dabimus. Assidui enim bulimi & exoluūt & in animi deliquia incidunt, quibus ægrè auxilium reperitur.

De animi deliquio, ex Philumeno. Cap. VII.

Animi deliquium siue in febribus, siue citra febres contingat ex præmanifesta causa, uelut est, plurima sanguinis aut uētris excretio, aut assidua surrectio, aut motus, aut dolor, aut timor: auxilium fert ex causarū ablatione, de quibus absolutissimè in febriū tractatu à nobis est prædictū, quinto uidelicet Sermone. Dicitur autem summam, & paucis etiam hoc loco de iisdem. Frequentes igitur surrectiones eis prohibendæ sunt, & acuatim facta euacuatio cohibenda, doloresq; mitigandi: causæ etiam quæ timorem inducunt soluendæ, siue forinsecus accedant, siue ex humoribus in corpore oboriantur. Extremæ corporis partes animi deliquis irruentibus constringantur: cucurbitæ etiam aliquando tum posterioribus, tum anterioribus stomachi partibus affigantur, & in latus etiam apponantur. Caput autem agitatū leui manus impositione cum coarctatione etiam cōprimatur. Odoramenta quoq; offerantur, & aperro ori digitus aut penna immittatur, facies uero ac stomachus uehementissimè fricetur. Hoc enim modo præoccupati refocillantur, uiresq; recolligunt, neq; in periculum animi deliquij incurrunt. Reuocatis autē, si quidē febre careant, cyathi III. aut IIII. frigida aquæ in potu exhibendi, quam tamen paulatim & per interualla absorbeant, aut cremorem palmarum, uuarum passarum, malorum cotoneorum, rosarū, aut pampinorum, aut alicuius consimilis, aut uuæ acerbæ nondū maturæ succum cum frigida aqua. Aut mentæ ramulos tres tritos cum mali punici dulcis siue acidi succo præbeto absorbendos: aut polentam cum punici succo, Forinsecus autem stomacho ea imponenda sunt quæ suprā ad cardiacos & bilem uomentes sunt descripta.

De his, qui in balneo animo linguuntur. Cap. VIII.

Qui in balneo animo linguuntur, aut magis animo linqui incipiunt, eos celeriter educere oportet, neq; multa aquæ infusione humectare. Qui autem iam inciderunt, celerrimè exportandi sunt: & reliquum quidem corpus leui quopiam uelamine cooperiendum: facies uero spongia frigida imbuta madefiat, aut frigida aspergatur. fricanda etiam facies, stomachusq; & pedes: os quoq; aperiendum pennarū aut digitorū immisione, omniq; modo conandū quo humor ipsius animi deliquij autor euomatur, aqua tepida ori instillata. Esi enim nihil inde euomant, stomachus tamen iritatione firmatur, quæ animi deliquium soluit: auxiliatur etiam ad oris apertionem auditoriorum meatuum cōpressio, similiterq; ossium quæ à petræ duritia, lithoidea, hoc est, petro

sa appellantur. Qui uero uilioris sunt conditionis etiam alapis sunt cædendi, capillorum quoque facta euulsione. Et uociferatio quidem unius, utilis est: multorum autem & simul edita, nocet. Cæterum à uehementi animi deliquio cōualescentibus, tū in calidam, tum in frigidam aquam demissiones, uelut mortis causæ timendæ. Aut enim laxatis corporibus, calore discusso & resoluti pereunt: aut à frigidity adstrictis, extinguuntur.

De stomachi imbecillitate, & supinitate, ac subuersione, ex Galeno. Cap. IX.

Quæ supinitas stomachi appellatur, ex intemperie quacumq; tandem oboritur, nullis humoribus uitiatis. Oboritur etiā ex multitudine humorum, nulla tamen maligna qualitate accedente: stomachus enim à largo humore fortiter madefactus, ad similitudinē amplitudinis totius uētris laxatur, adeo ut cibus obuolui, eosq; contegere non possit, & propterea circa ipsum humores supernatant, quos ubi uentriculus abrumpere omni impetu annititur, anxietatis accessionem perfert, ac prius quàm cibus præbeatur, extremæ imbecillitatis. Faciliū autem hæc affectio curatur, inter reliquas stomachi affectiones longo tempore perseverantes. Opus uero habet pharmacis humorem desiccare ualētib; cohibereq; ac adstringere laxatum corpus. Itaq; si in profundum usq; humiditas extendatur, & crassa tenaxq; existat, pharmacum miscere oportet extenuatorium & ueluti consumptiuum, quale est acetum & acētū mullum. Si uero eiusmodi humiditas non existat, neq; in profundum usq; corporum extendatur, adstringentia sola ad curationem sufficiunt. Magnum autem signum ad cognoscendum, frigidāne sit an calida hæc affectio, sensus ægri præbet: siquidem aut nullam, aut aliquam sitim perceptet. Supinitates igitur stomachi ex uitiatis humoribus oborte, picra curatur, quemadmodum paulo post dicitur, utpote quæ cellerrimè uitiatum humorem repurgat. Subuersiones uero & nausæ ex imbecillitate stomachi factæ, per intemperiei correctionem sanantur, & per incumbētis humiditatis desiccationem. Si quidem autem calida affectio existat, carapotia ad ipsa & sitim tollentia exhibeantur, quæ ad eos qui stomacho exuruntur sunt descripta, & maxime quod ex rosis, spica nardi, & radice dulci constat. Ad frigidiores uero & humectiores affectiones conueniunt subscripta. Asclepiadæ, ad stomachi subuersiones. Succī acinorum mali punici acidi sextarios III. succī mentæ sextariū I. conijce in uas fictile, & decoque assidue, agitando, & ubi coacti fuerint ablatis recōdito, & ante cibum mystrum unum aut duo exhibeto. Aliud. Vuam acerbā immaturam arefactā, contusamq; & cribratā in promptu habe, & cochlearij mensura ex aquæ frigide cyathis duobus præbe. Aliud, quod calidioribus dispositionibus magis commodū est, sicut etiam præcedens: Mala punica matura & in uigore perfecta quinque aut sex numero, integra unā cum putaminibus contunde, & infusis aquæ pluuiæ sextarijs tribus usque quo ad tertias omnis liquor redactus fuerit decoque, exprime, ac percola, liquoremq; expressum rursus per se decoque, donec ad mellis spissitudinem redigatur: ac inde cochleare unum aut duo exhibe: his qui febre carent, cum uino: febricantibus uero, ex aqua. Aliud ualde bonum



num: Succo mali punici acidi, ac intubi, æqualibus portionibus permixtis, mentæ siccae tenuissimè tritæ, parum quiddā insperge, & cyathi mensura bibendum præbe. Idem facit oxylapathi semen tritum ex aqua potatum: similiter & semen portulacæ. Vtere etiam confidenter ad stomachi subuersiones, amazonom pastillo, & eo qui aster appellatur, quorum compositionem paulo post in nausæ tractatu describo. Vtere quoque cataplasmatibus & epithematibus, quæ mox post sermonem De nausea describentur.

De nausea, ex Galeno.

Cap. x.

Nausæ ex uitioso humore tum calido, tum frigido gignuntur. Qui in uentre continetur, aut in concauitate ipsius innatat, aut in tuniculis eius infartus instar uisci adhæret, atque ægrè auelli potest: aut serosior & medicatior existens in ipsis uentriculi tuniculis, uelut aqua in spongia, imbibitur. Atqui eiusmodi humores ex uentris intemperie tum calida tum frigida aliquando generantur. Aliquando autem ex alijs partibus prius affectis in ipsum uentrem, uelut excrementa illarum confluunt, utpote ex hepate, aut splene, aut capite, aut ex uniuerso corpore. Quando igitur aliæ partes prius afficiuntur, omni modo uniuscuiusque propriæ accessiones concomitantur: & ipse æger primum affecti membri læsionem sentit: aut enim caloris sensus iuxta affectum membrum ipsi contingit, aut frigoris, aut grauitatis, aut etiam tactui nostro durum succubis. Si uero uniuersum corpus uitiosis humoribus repletum est, id ipsum ex colore, & eruptionibus papularum circa cutem cognoscitur, atque ex ipsa adeo urina. Quod si nihil horum adsit, certum est uentrem ipsum aliquo modo egrotare. Si itaque cibi in uentre nidorosi sunt, nullo huiusmodi cibo assumpto, uelut sunt pisces, aut oua in sartagine fricta, aut alij cõsimiles, necesse est ratiocinari causam calidam esse, quæ hoc in uentre operatur. Si uero acescunt in uentre cibi, nullo huiusmodi cibo sumpto, uelut sunt pisces, aut oua in sartagine fricta, aut alij cõsimiles, necesse est considerare frigidam causam esse, aut atræ bilis humorẽ uentrem infestantem. Manifesta autem erit cognitio & scientia causæ, quā habes suspectā: frigidis enim pharmacis cibisque ac potibus statim adiutum hominem uidebis, si quidem calida dispositio extiterit. Si uero frigida, calidis cibis & pharmacis iuuabitur, à frigidis uero lædetur: cæterum & sitis ad calidam affectionem concomitatur: siti autem ferè in totum carent, qui frigidam intemperie habent, nisi falsa sit pituita. Atqui ex diligenti uomitus inspectione eiusmodi quoque cognoscuntur affectiones. Si enim intemperie quadam uenter afficitur, assumptos cibos ad intemperiei naturam permutat, ut appareant uomitu redditi cibi, citra alicuius humoris complexum, in nidore aut acorem permutationem suscepisse. Si uero humor quispiam uitiosus amplitudini uentris innatet, & cibum corrumpat, ipsi cibi manifeste eiusmodi humore madefacti apparent, & in illius naturam permutati. Quum uero cibi amplitudini uentris innatent, humorẽ ipsum affligentem producunt, qui ubi infartus, aut imbibitus, ut dictum est, in uentris tuniculis fuerit, si quidem calidus sit, siticulosos facit, & ciborum inappetentiam inducit: si uero frigidus sit, ciborum appetentiam excitat, & sitim extinguit. Nausæ autem utrisque accedunt, & inanes uomendi iritationes, quæ lancinant tantum, & nullum

humorem educunt. Prædictum autem & antea est, quod si tenues humores & uenenosi existant, quos etiam Græci *ixōgas*, hoc est, serosos appellant, per profundum solidorum uentris corpusculorum procedunt, & uelut aqua in spongia imbibuntur. Si uero tenaces sunt, circa internam uentris superficiem uisci modo adhærent. Serosi itaque humores, utpote tenuium partium existentes, non solum ante cibos, sed & post acceptum cibum, uomitum inducunt, perpetuo nimirum motu uersati. Qui uero superficiem uentris infartui adherent, ante cibum magis inanes uomitiones mouent. Diligenter itaque considerare oportet, num uentris tantum affectio hæc sit, aut alicuius alterius membri. Deinde qualis affectio existat, an calida, aut frigida, humidæ aut sicca. Et si quidem ex alia quadam parte, aut ex uniuerso corpore humores in uentre confluant, priorem curam membri prius affecti habere oportet: ita tamẽ ut neque uentrem ipsum negligamus. Qui enim primum affectam particulam curat, uelut fontem omnium in uentrem influxionum excindit. Ventre autem solo affecto, dispositionis in ipso qualitate cognita medicabimur. Calidam itaque intemperiem semper refrigerare oportet, in quocunque tandem membro existat, frigidam autem calefacere: eodemque modo humidam desiccare, & siccam humectare. Innatantes autem amplitudini uentris humores euacuare, siue per uomitum, siue infernè per aluum cõmodius id fiat. Qui uero in tuniculis uentris infartus adhæret, aut imbibitus est uitiosus humor, per repurgantiam ipsumque incidentiam ac euacuantiam pharmaca est curandus. Intemperaturæ enim in humoribus consistentes pharmacis humores euacuantibus opus habent. Qui uero absque uitiato humore, ab intemperie sola quacunque tandem, maximè tamẽ calida & sicca infestantur, in tabem omnino perueniunt, pharmaco euacuare purgati, etiã si exhibitum pharmacum imbecillius existat: quale est ex aloë picrum appellatum. Quo modo igitur unamquamque intemperie, siue simplicem, siue mixtam curare oportet, iam prædictum est in quarto huius tractationis Sermone: dicitur tamẽ oportune & hic de eadẽ re, sed paucis. De intemperie frigida. His itaque qui ex frigida intemperie afficiuntur, pharmacum ex tribus piperis generibus commodum existit, aut quod ex calamintha constat, aut aliud quoddam cõsimile, ex uino tenui aut aqua potatum. Forinsecus autem stomacho mastichæ chîa, unguento nardino diluta & trita, purpureaque excepta lana imposito. Vinum uero exhibendum est rufum, subadstringens & uetustius, & cõsimiles etiã cibi. De intemperatura calida. His uero qui à calida intemperatura afficiuntur cum mediocriter adstringentibus & refrigerantibus forinsecus stomacho ac uentri adhibitis, medeberis, ita ut quanto magis calor excellat, eo amplius refrigerantia adaugeas. Cibum autem exhibebis halicam ex uino albo & tenui, & subadstringente: ex uolucris, macras & non foetidas, ac quæ his cõsimiles existunt. Si autem humor tenuis biliosus aut serosus in uentris amplitudine continetur, tenuissimo priscano succo exhibitio uomere cogimus, digitis aut pinnis immisisis. Aut aloës dra. i. cum aqua tritam potandam damus: calidorum enim in uentre humorum optimum pharmacum est aloë, & in una sæpe die stomachicos sanat: si uero pituitosi aut uiscosi & crassi humores amplitudini uentris innatent, aceto myllo utendum est, in quo ex incidentibus.



cidētibus, ac repurgantibus, mediocriterq; calefaciē-  
tibus quēdam sunt decocta: his uero quibus uisiosus  
humor intrinsecus circa superficiē uētris infartus ad-  
heret, ut egrē auelli possit, ex aloē picra appellata cō-  
positio utilis existit, quæ uiscosum humorem repur-  
gare cōsueuit, crassumq; extenuare, per uires eorum  
quæ cū aloē sunt cōmixta: quod si serosa humiditas  
tuniculis uentris sit imbibita, quæ ut prēdictum est,  
non solum ante cibum, sed post acceptum etiam uo-  
mitus mouet, primum Amazonū pastillus cōueniē-  
ter exhibetur, qui picræ est subscriptus. Mediocriter  
enim per hunc uomitibus prohibitis, deinde ex aloē  
picra appellata utimur. Cuius compositio hæc est:  
Aloēs drach. c. xylobalsami, mastiches, croci, spicæ  
nardi, asari, cinamomi, cuiusq; drac. vi. cōtere & re-  
pone arida, & exhibe perfecto pondere scrupulorū  
xii. ex aquæ frigidaē aut calidaē cyathis xii. Andro-  
machus ad prēdicta etiam floris iunci odorati drac.  
vi. adiicit: & aloē lotā coniungere iubet. Verū quod  
cognoscere opere precium est, ad uētris subductionē  
illota aloē convenientior existit: quæ enim lota est,  
multū à medicamentaria facultate deponit: quā cōfi-  
dētius etiā exhibere quis possit, eis qui nō ualde fe-  
bricitāt, & quibus firmitatē uentri addere uolumus.  
Quare scire oportet ex uitiatīs humoribus affectio-  
nes circa stomachū & uentrē, per pharmaca ex aloē  
utiliter subduci & euacuari posse: quæ in maximam  
perniciē perueniunt per adstringentiū eduliorū, po-  
tionū, ac pharmacorū exhibitionē. Asclepiades autē  
picrā eodem quo Themison modo apparare iubet.  
Habet autem hoc modo: Aloēs dra. c. mastiches, cro-  
ci, spicæ nardi, asari, cinamomi, cuiusq; un. i. & pro  
xylobalsamo carpobalsami unc. i. cōtundito ac per  
angustissimū cribrum excutito, siccumq; ne in aērē  
transpiret adseruato, & drac. i. tantū ex frigida præ-  
beto, nisi menses ciere uelis, nam tum præstat præbe-  
re ex uino. Educit mēstrua fœminarū: facit & ad uul-  
uæ affectiones: propriē autē ad stomachi subuersio-  
nes: conducit hepaticis, affectionibus renum atq; om-  
nino admirandā potentiā habet. Ad refrigeratos au-  
tem & qui pituitā crassā & uiscosā in uentre ha-  
bent, subiectū pharmacum cōmodum existit. Calefa-  
cit enim & extenuat ac dissecat crassitiem, uiscositā-  
temq; repurgat. Habet autē hoc modo: Corticis ra-  
dicis fœniculi uiridis sexuncē, aceti sesquiseptariū,  
aloēs quadrantem. Cortex cum aceto ad tertias deco-  
quitur: deinde percolato aceto mellis attici unc.  
xv. adiungimus, & ad mellis crassitudinē coquēdo re-  
digimus, & cōtritæ in mortario aloē paulatim hoc  
ipsum acetū multum coctū affundimus: postea uero  
simul unita tollimus, ac utimur. Datur ad summum  
mensura cochleariorū trium. Alia cōpositio quæ  
dulcis appellatur. Aloēs septuncē, iridis sextantē,  
mastiches sesquunciam, nardi celticę uncia unā, pipē-  
ris drachmas quatuor, myrrhę dra. iiii. aceti choeni-  
ces septē, cyathos septē, mellis libras tres, sextarium  
unū, corticis radicē fœniculi libras tres. Corticē fœ-  
niculi in aceto præmaceratum ad tertias decoque &  
percola, residuoq; aceto mel adijce, ac rursus deco-  
que usquequo probē cogatur, deinde sicca in morta-  
rio simul ammisce, & cochleariū unū exhibe. Cōdu-  
cit frigidioribus temperaturis, & aluū pituitosiorē  
mediocriter soluit, & caput leuius reddit. Amazo-  
num pastillus. Facit ad uoluulosas stomachi sub-

uersiones. Voluulosas autem fortes stomachi sub-  
uersiones appello, quemadmodū enim in uoluulis  
uomitibus cum uehementi cōtentione fiunt, & sterco-  
ra reuomunt: ita etiam alios uomitus cōcitatos uol-  
uulosos appellare possumus. Consequuntur autem  
huiusmodi uomitus, ubi magna molestia affectis  
membris à serosis medicatisq; ac uenenosis humori-  
bus est illata: & si aliquo modo imbecillior fuerit  
uēter, geminatur malū ex mordacitate. Quapropter  
ita instruenda curatio est, ut simul odoras qualitates  
affectis membris offeramus: quales sunt aromatum  
quorundam & seminum in ciborum usum uenien-  
tiū: uelut est anisum, & apiū, & similia. Quemadmo-  
dū enim graueolentia omnia stomachū subuerrere  
consueuerunt: sic odora corroborant, maximē quæ  
nobis sunt familiaria, & in cibo accipiuntur. In quib-  
us itaq; cōiectamus serosos humores in uentris tu-  
niculas imbibitos esse, his hoc pharmacū magis con-  
ueniet. Quibus uero circa superficiem uētris tunicu-  
larum infarti adhærent, eis picra utilius exhibetur.  
Quod si exhibitā picrā reuomant, cōiectare oportet  
mixtā esse affectionē, & tū tuniculis imbibitos,  
tum superficiē infartos humores, in uentre abunda-  
re: quare utile fuerit pastillum præbibendum exhi-  
bere, ut mediocriter uomitū prohibeat: deinde autē  
pharmaco picro uti. Est autem pastilli cōpositio hæc:  
Seminis apij drachmas vi. anisi drachmas vi. comæ  
absinthij dra. iiii. myrrhæ drach. ii. pipēris drac. ii.  
opij drac. ii. castorij drac. ii. cinamomi drach. vi. in  
pastillos redigito, & ad summum drach. i. exhibeto.  
Ego uero, inquit Galenus, præscriptum pharmacū  
citra myrrhæ admixtionē apparare cōsueui, ob me-  
dicamētariā eius uim, pipēris pro eo cōiiciens dra.  
ii. ita ut in uniuersum pipēris drach. iiii. accipiātur.  
Datur stomachicis ex uini diluti cyathis iiii. Chole-  
ricis autē siue bilem effundentibus ex aqua frigida.  
His autem qui cibum reuomūt, si quidem siticulosi  
fuerint, & caloris sensus eos circa os uentris infestet,  
& sanitatis tempore frigidam bibere sint adsueri, si-  
militer ex frigida præbe: si uero non ita habeat, ex  
calida. Coeliacis, & ad intestinorum tormina ex de-  
cocto myrti, splenicis cū aceti mulsi cyathis tribus.

Asclepiadæ pastillus inexuperabilis, aster appella-  
tus. Pharmacū quod prosperē accōmodatur, dolorē  
leuans, somnum inducens, multæ omnino utilitatis:  
etenim morbos circa stomachum mirabiliter sanat,  
acidos ructus & difficilem concoctionē aufert, inte-  
stinorum tormina, & uoluulos, inflationesq; curat.  
Prodest hic pastillus ad capitis dolores potatus, &  
aceto dilutus forinsecus frōri illitus. Ad dolores au-  
rium facit perdicij succo liquefactus: facit & ad den-  
tiū dolorem tritus & galbano exceptus, aut ficij suc-  
co, & cauernę inditus. Ad oculorū affectiones & flu-  
xionū impressiōes passo diluitur, & lana ex eo irri-  
gata imponitur. In tonsillarum affectionibus tepesa-  
ctus ac dilutus ex aqua mulsa præbetur gargarisan-  
dus. Vtilis est ad omnē sanguinis fluxū uino myrti  
te dissolutus. Ad destillationē inueteratasq; & recen-  
tes tussis affectiōes, uino scybelite aut thereo eliqua-  
tus. Prodest suppuratis, & phthisicis marrubij deco-  
cto liquefactus, prodest dysentericis, cholericis, &  
sanguinē reiectantibus, sanguinarie succo dilutus  
prodest ad omnium reptiliū plagas ex rutę decocto  
potatus. Soluit per circuitum repetentes febriles ac-  
celsiones,



cessiones, si duabus horis ante aduentantem febrem ex uini diluti cyathis III. exhibeatur. Foeminarum menses ciet artemisia succo dilutus ac potatus, facit & ad uescicæ affectiones uino mulso solutus, quomodo & ad uulvæ strangulationes prodest potatus, facit ad articulorum dolores & podagram gentianæ decocto dissolutus ac potatus. Compositio autem eius hoc modo habet: Castorei, opij, myrrhæ, cuiusq; drac. IIII. spicæ nardi, calsiæ, terræ lemnis, corticis mandragoræ, cuiusq; drac. IIII. croci drach. VI. dauci, styracis, anisi, seseleos, seminis hyoscyami, cuiusq; dra. VIII. myrrham, styracem & opium in uino odorato dissolue: reliqua autem contusa & cribrata insperge, ac simul unita in pastillos redige, ciceris magnitudinem æquantes, quibus in umbra de siccatis utere. Et de pharmacis quidem quæ in potu sumuntur hætenus. Decubitus autem sursum uergens in omnibus quomodocumq; nauseantibus & uomentibus adornetur, in conuenienti & affectioni contraria domo. Quæ frigida quidem sit, affectione existente calida. Contra uero calida, ubi frigida affectio existat. Extremæ corporis partes fricentur, manibusq; calefactis palpentur, quin & uiolentius adstringantur, deinde pedes & manus in aquam solito calidior rem demittantur. Odoramenta autem admoueantur naribus olfacienda boni odoris: uelut rosæ, mala cotonea, pulegium, menta, malabathrum, spica nardi. Caput uero fomento olei dulcis frequentius irrigetur: in calidioribus uero ex rosaceo. Stomachus absinthij cremore irrigetur, rosaceo in calidioribus ammixto: nardino autem in frigidioribus, apio insuper, aut cumino, aut petroselino adiuncto. Ex quibus si nullum commodum sentiat, ad cataplasmata ex palmis transeundum, quæ paulo post dicentur. Conueniunt etiam ea quæ aloen, absinthium, & mala cotonea accipiunt, & aliquando quoq; alumen. Idem præstant & cerata ex his apparata. Si uero inflammatio circa præcordia existat, communia cataplasmata adhibeantur. His qui stomacho exuruntur, frigida etiam aqua quam plurimum decocta, deinde rursus refrigerata absorbenda præbeatur, ita ut cyathi unius mensura, aut duorum, aut etiam trium, paulatim tamē absorbeatur. Colluta etiam & in ore retenta, nausæas tollit, his quibus propter obstaculum aliquod porus eius negatur. Eodem modo assumitur posca diluta. Portulaca etiam comanducata, & ossa myxarum, & cucumeris semē cochlearij mensura mirabiliter prodest. Porro affectione diutius permanente, & cibis præmorbo non retentis, cucurbita ad os uentris cum plurima flamma affigatur, donec locus rubescat, atque ipsa adhuc affixa cibis præbeatur. Ad quotidianas autem nausæas, & acrescentem cibum, ac uomitus, coriandri semen tenuissimè tritum, cochlearij mensura, ueluti farinā aquæ inspersum bibendum præbe, aut mastiches cochleare ex frigida aqua, aut lactucæ albæ semē cochlearij mensura ex aqua, præbe his qui stomacho exuruntur.

*Cataplasmata & epithemata ad nausæas & uomitus.*

Cap. XI.

Cataplasmata ad eos qui cibum non retinent, quos ueteres propriè stomachicos appellauerunt. Farina foeni græci, & maluæ semen aridum tritum, mellis commisceatur. Si uero præduritie contundi non possit, maluæ semen, ipsum decoctum & tritum mo-

dico oleo adiecto in malagmatis formam reducito, & uitior. Aliud. Lolij & irionis farinam subige cum melle, & pro oleo liquidam picem ammisce. Ceratum autem conuenit ex olei irini fece, ceræq; ac modico castorio. Aliud ceratum. Ceræ quadrante, olei irini sexuncæ, galbani unc. I. opopanacis dra. IIII. castorij dra. IIII. Opopanax aceto teritur. Manifestum est autem talia in frigidis dispositionibus adhiberi. Cæterum epithemata hæc ad prædictas affectiones per experientiam, ut Galenus inquit, conducunt: non modo eorum qui ea descripserunt, uerum nostro quoq; iudicio comprobata. Asclepiadæ epithema ad stomachi subuersiones & choleras, siue bilis effusiones. Oenantes, croci, florum rosarum, sertulæ campanæ, mastiches, singulorum drach. VIII. cum passis palmis subige, modico rosaceo affuso, & uestis detritæ panniculo excipe, stomachoq; ac uentri impone. Aliud. Oenantes, omphacij, florum rosarum, mastiches, singulorum drach. IIII. aloës, aluminis scissi, utriusq; drac. IIII. uini dulcis myrtei quod satis est. Trita excipe palmis passis, & utere. Aliud epithema, ad stomachi imbecillitatē, & dolorem, & ad eos qui cibum retinere non possunt. Palmarum passerum sexuncæ, oenantes unc. I. thuris unc. I. mastiches unc. I. ceræ lib. I. unguenti nardini aromatis inspissati libr. II. uini quantum sufficit. Palmas in uino ueteri maceratas optimè cōtere: deinde mastichen & thus unum quodq; per se optimè tritum adijce, ac rursus simul tere. Liquefactæ autem cum unguento nardino ceræ oenanthem tenuissimè trita insperge, simulq; unita & refrigerata ad reliqua in mortariū conijce, & probè remollitis utere. Aliud epithema, ad stomachi subuersiones, & circa ipsum uexationes, facit & ad particulares inflammationes. Oenantes bessem, croci, rosarum siccarum, sertulæ campanæ, mastiches, ramentorum electri, sin. dra. IIII. carnis phoenicobalanorum quadrante, uini myrtitis quantum sufficit. Arida cōtunde & per angustissimum cribrum excute, & uino myrtito diluta ad cerati crassitudinem redige: deinde palmarum carnem adijce, simulq; contunde, & cerato ex oleo rosaceo apparato excipe. Post uero lineteolo infartum ad os uentris impone. Prodest etiam oculorum inflammationi.

*De cholera seu bilis effusione.*

Cap. XII.

Cholera appellatur quum ob multas cruditates uomitus biliosus & nidorosus & acidus oboritur, ad plures horas continuè perseverans, & uenter infernè eadem excernit, sequiturq; sitis, & exudatio, & impeditus pulsus, musculorumq; manuum ac pedum, maximè uero surarum contractio & tensio. Si quis igitur mox in principio, aut coaceruatim, ea quæ efferruntur cohibere aggrediar, is maioris mali autor erit: inutilia enim quum sint, euacuatione opus habet, quare conuenit si non sponte ferantur, oportunè irritare, aqua tepida exhibita, ac egro uomere iussio: aqua enim multa mordacitatē operatur, torsionesq; auget: aqua uero oleo mixta, auget fluxiones. quare aqua tepida potata uomant, quotiescunq; quidē cibis nimium fuerint expleti, prius quam illi corrumpantur. Adiuuare etiam oportet per sedem excretionē: alium enim uelut uenenū insidens, & uentrem ac intestina rodit, & humores ex uniuerso corpore adtrahit. Per uomitus itaq; oportunā prouocationē, uomitus ipse soluitur & cessat. Quū uero humorū excretio



excretio quæ fuerit: colliquamenti autē & tabefactionis signa in excrementis ipsis appareant, ueluti si sint rasuræ similia, strigmenticiaq; & mucosa, & gracilitas per ambitum corporis fiat, & maxime si uenter confidat & adstringatur, pulsusq; imminuatur ac præter modum condensetur, tunc sanè uentrem cooperire & fouere oportet, membraq; & artus ac muscululos similiter locos, oleo multo calido impinguare, & uinculis adstringere extremas corporis partes. cataplasma quoq; uentri imponendū ex palmis & cœnanthe, quibus hypocisthis, & acacia, & rhus ruber, & malicoriū sint ammixta. In potu uero frigida aqua cyathi mēsurā præbeatur absorbenda: cauendū tamen ne nimīū frigida existat. Aceruatim enim exhibita reuomitur: & quæ ualde frigida est, aliquando innatum calorē stupore suo extremē offendit, aut inflammationem stomachi aut uisceris aliquis efficit. Inspergantur autem aliquādo aquæ sorbendæ pampini uitis, aut mali punici succus modicus instilletur. Si uero & hoc reuomat, crassa etiam sorbitio ipsa faciēda est, per micarū intritionem, & per cochleare exhibenda. Etenim si aceruatiū deuoretur, aut reuomitur, aut infrā detrahitur. Annitendū est etiam ut priore sorbitione uomitu reiecta, rursus altera exhibeatur: dandus itē mali punici succus cū mentæ succo absorbendus, micis minutissimē tritis adiectis. Sit autē acidi mali punici succus, & multa quantitate mentæ succum excedat. Quod si aciora sint ea quæ excernuntur, cucumeris semen maceratū, desquamatū & tritum ex aquæ cyathis III. præbeatur: datur etiā utiliter cum amylo. Post uero somnus procurandus, & quies omni modo. At uero ubi intolerabilis effusio existat, & pulsus emolliatur, apprehendatq; frigiditas & exudatio, aliquādo etiā singultus, ad uinum transeundū est mediocriter adstringens, neq; uiribus ualidum, & quod dulce quiddē sit, non autem odorū. Interant autē in ipsum micas, aut halicā inijciant, si fieri possit, calidū, si uero non, frigidū: atq; ita paulatim & per interualla cochleare absorbeant. Sitim uero arcet polenta tenuis sine sale uino diluto inspersa & absorpta. Vini multitudo uitanda est, ac omni arte conandū ut ipsos sopiamus, ex rosīs ac myrto domus pauimento cōstrato. Odoramenta quoq; naribus admoueantur, mala cotonea, & similia. Reliqua autem omnia eo modo adhibeantur, quo suprā in æstuatibus febribus est prædictum. Illiriones etiam soporiferæ circa frontē assuuntur. Aluo autem adhuc egerente, amyllum cum decoctione capitum papaueris per clysterem infundatur: simul enim & cohibet & refrigerat, & somnū inducit. Ad uomitus uero coercendos cōmanducare cōuenit, succumq; deuorare, mespilorum, malorū cotoneorum, pyrorum crustum minorum, & uuæ, maxime quæ uinaceis interpositis seruatur, & pensilē quoq; unā cū uinaceis expedit manducare. Ad cōtractiones autem in musculis factas, uestis detritæ panniculi oleo calido madefacti conueniunt, contraētis musculis impositi: & cerata humida aliquando castoriū accipientia, & ex sicyonio aut irino oleo facta. Quibusdā eorum etiam maxillares musculi dolent: quos quum lana operire non sit facile (est enim intucundum, & sudor quoque inde elicitur) illirionibus leniter factis molliores reddere oportet. In cibo exhibendi sunt pedes suilli cocti, pulli columbi-

ni & gallinarum, perdices, palumbi, turdi, & consemiles his existentes. Asclepiades autem cholericiis eiusmodi electum planè remedium describit, inutilibus tamē omnibus prius sufficiēter euacuatīs. Bacca rū myrti nigrarum exacnatarū Italicum sextarium unum, florū rosarum tantundē, carnis palmarū numero uiginti, aquæ potabilis sextarios sex decoque ad tertias, & expressum ac percolatū liquorē rursus per se decoque, donec ad sextarium unū redigatur: cui deinde passī myrtitæ sextarium unum affunde, rursusq; decoque donec ad mellis crassitudinem cogatur, & utere. Datur ante & post cibum cochleari mēsurā. Vtere etiam ad hos potionibus & epithematibus ad stomachi subuersiones præscriptis.

De stomachi adstrictione.

Cap. XIII.

Oboritur aliquibus post cibum acceptum, circa cōcoctionis & digestionis tempus, stomachi adstrictio itemq; alui. æstuat autē uniuersum corpus, maxime uero manuum ac pedum extremitates: & facies ipsa rubescit: pulsus autē in densitatem permutatur. Hos multi etiam febricitare existimant. Nocuentū autem omne circa digerendi alimenti difficultatem cōtingit: consistit enim ut plurimum in aridis & condensatam habentibus carnem, spiritu circa uias concluso & coarctato: utpote qui per uapores ab alimento prodeūtes inspissatur, & ob id quod non effletur immodicē concalescit. Curantur autem hi in principio quidem constrictione & colligatione extremarum corporis partium, fricationeq; brachiorū, cruriorūq; ac coxarum: sæpe etiam extremitatum compressione, ita ut præcipiamus ipsis ut desideant, & decubitus quoque formā erectiorem faciant. Quosdā & lectica gestare expedit, donec alimentū omnino subductum digeratur. Ante augmenti tempus diligentiore totius corporis curatione utēdum est, studio adhibito ut carnem mollem & humectam reddamus. Vtilis itaque eis tunc ex oleo inunctio existit parum nitri habens admixtum. Inclinate autē morbo & uigore præterito, aquæ infusio ad manus pedesq; lauandos commoda est, quo tempore aliquando & calidæ plurimum potum non improbo: nos enim remittente morbo, & paulo longioribus existentibus interuallis, plurimos ante cibum lauamus, & uehementer iuuimus. Perfectiore autem declinatione apparente, etiam uinum exhibendum est, quo tota affectio corrigatur. Cibi autem sint facile digestibiles, & quibus cōcoquendis corpus sufficit: quos diuidere etiam conuenit, maxime si bis cibum sumere sint aduersi. Quod si in uisceris inflammatione, adstrictionis stomachi accessio contingat, illam ipsam prius curatione aggredi ac demoliri oportet, per fomentum & cataplasmatum adhibitionem. Cæterum hæc ipsa adstrictionis stomachi accessio frequentius in eis apparet, qui hepar præter naturā dispositum habent.

De humoribus à capite in uentrem destillantibus,

ex Galeno.

Cap. XIII.

Capite ex intemperie affecto ut multa generat superuacanea recremēta, omnibus subiectis organis inde nocuentū infertur, recrementis uidelicet ad ipsa delatis, & promptissima quiddē ad os & ad nares delatio existit: deferuntur autē & ad thoracē, aliquibus etiā ad aures. Delationē autem ad os, stomachus excipit atq; aspera arteria. De aliorū sanè mēbrorum nocu-

mento



mento, iam prædictū est. Quū uero ad stomachū fluxus deferatur, & frigidus existat, ad frigidā intemperiem corpora perducit, calidus cōtrā in calidam: hic exulcerat quoq; tēporis progressu: in principio uero appetitui nocet & cōcoctioni. Si igitur frigidus fuerit defluxus, tardas cōcoctiones & cruditates efficit; si uero corruptus, in corruptionē adiget cibos: unde nidorosa, aut foetida, aut acidæ eructationes producuntur, aut etiā alterius cuiusdam quæ nominari non potest, aut etiā nomē habentis qualitatis. Vbi uero altius descēderit nocumentū, etiam intestinum ieiunū afficit, & ad colum usq; pertingit, atq; ad uenarū mesenterij uasa, per quæ ad hepar ipsum alimentū distributio contingit. Et quibusdam quidem deiectio appetitionis accedit: aliquibus uero appetitiones rerum præter naturā, quas appellat caninas, aut etiā ciborū uitiosorum cōcupiscētiæ. Optimū itaq; est in his uelut fontē malorum excindere: capitis uidelicet sanitati prospiciendo: aut si hoc impossibile sit facere, ob uehementiam naturalis intemperiei: omnino tamē eius saluti consulere oportet: indicatiōe ex figura eius accepta, quomodo ei subueniri possit: non em̄ quēadmodū aliqui medici, qui ad omnes diuturnas capitis affectiōes semper ex thapsia & sinapi cataplasma imponunt, sic & te facere uolo. La uacris itaq; multis calidis potabiliū & dulciū aquarum cōsolari eos oportet, discussis simul calidis in capite uaporibus, & omni tēperamēto melius permutato. Nocuius autem est eis usus aquarum natura sua calidarū: quæcūq; em̄ ex eis sulphurentæ sunt, ac bituminosæ, ob caliditatē suā capitibus natura calidis aduersantur. Quæ uero aluminosæ, coarctatione sua caput offendūt. Solis itaq; dulcibus aquis citra læsionē uti poterint. Quicūq; uero ualde calidum ac perustū habent caput, his melius est ut æstatis tempore ungantur optimo rosaceo, ex solis rosis ac oleo omphacino præparato. Aliquādo uero caput euaporationes calidas ex uentre suscipiens, dolore ac intemperie afficitur. Et propterea uētris curā habere oportet, ipsiq; robur indere, ut biliosus humor aut omnino nō cōfluat in ipsum, aut quā melerrime euacuetur, atq; hoc per absinthij, & picræ ex aloë cōpositionis porū. At uero quæ forinsecus adhibētur uētri in his ungēta, moderate sint adstringētia. Tale autē est æstate melinū, hyeme uero nardinū. Aut mulierū ungēta quæ foliata & spicata appellant. Nam & ipsa calefaciunt ac roborant uentrem. Verē aut idoneum est mastichinū. Quod si non solū caput calidos serosos humores ad uentris locos demittat, sed etiā ipse uenter propriā intemperiem calidā habeat, refrigeratibus eduljīs ac potibus & illitionibus semper uti conuenit, ita ut plus aut minus permutatio saltē in his fiat. Similiter autē etiā ubi ambæ partes, uenter uidelicet ac caput, frigidam habuerint intemperiem, calidis quidē eduljīs ac potibus et illitionibus uti oportet, uerum uires ipsorum permutare, iuxta anni tēpora temperamēto ipsorū aucto, aut remisso. Cæterū grauis mixtura est, quū aut in uentrē calidū defluerunt ex capite frigidi ac pituitosi humores, aut in frigidū calidi. Intractabilior est autē ea, in qua in calidū uentrē pituitosi ac frigidi humores deferuntur. Pessima uero ubi cū his etiā uenter supprimitur. Corrumpuntur em̄ humores in uentre morā trahētes, ut & mordeāt ipsum, & uitiosos

uapores ad caput remittāt. Etenim pituita in uentrē defluēs calefacientibus ac attenuantibus opus habet. Os autē uentris ubi natura calidum fuerit, a calefacientibus. Quare conari oportet in his, ut pituita in uentrē defluētē, per ea quæ nō ualde calefaciunt secemus. Quale est acetum mulsum simplex, cuius præparationem inter concoctoria referemus. Quū uero pituitosus humor a capite in frigidū natura uentrē defluerit, huius affectiōis medela facilis est, si mane simplex pharmacū ex tribus piperis generibus cōstans sumatur. Sed & solum piper exacte tritum, aquæ ammixtum bibere licet. At uero absinthij potus ita affectus ualde aduersatur. Pituitosum em̄ humorem ipsorum uentri infarcit. Sed neq; aloë sola per seipsam his prodest. Biliosi enim humoris attractoriam uim habet, non pituitosi. Et propterea bene inuenta est compositio picra appellata, quæ propter aliorū acrium ac calidorum ammixtionē crassos ac uiscosos humores secat. Verū fieri nō potest, ut quis hac assidue utatur, quēadmodū ea quæ ex tribus piperis generibus constat, & similiter quæ ex calamintha. Etenim si omni hora etiam his utatur, qui frigida uētris intemperie laborat, nullum amplius nocumentum experietur.

*Dieta conueniens his qui stomachum habent dissolutum, aluum autem adstrictum.* Cap. xv.

Grauis & ægre tractabilis cōplexus huiusmodi corporis apparatus ac dispositio existit, in quo dissolutū, & nauseabundū est os uentris, quod stomachi quoq; appellatione uenit: aluus uero est adstricta: quæcūq; enim ipsam ad egerendum impellunt, ea omnia stomachū subuertūt, utq; & in eo cibi innatent, & nauseabundus sit efficiunt, ad quæ necessario consequitur, cibum quoq; non probe concoqui. Si uero rursus ea quæ stomacho grata sunt edulia eis exhibeas, ad tres aut quatuor dies aluus inde adstringitur. His igitur in tempore diēta cōstituēda est, ac in principio quidem exhibenda sunt olera ex oleo & garo condita, & alia quæ uentrem emollire consueuerūt. Postquā uero sufficiens nutrimentum ingesserint, ad extremum aliquid eorum quæ stomachū corroborant, accipiant: uelut sunt poma et pyra, & aliqua mali punici genera, quæ citra acorem adstringunt. ipse autem homo affectus, omnibus his partim experimento cognitis, quodcūq; tandem minime nocuum & iucundissimum repperit, eo deinde utatur: neq; tamen multum ex singulis horū generibus acceptandum est, sed quāntū imbecillitati stomachi curandæ suffecerit. Facile enim solubilis aluus ita adstrictis fit, quando, ut dictum est, a cæteris cibis aliquid eorum quæ stomachū adstringunt comederint. His enim os stomachi corroboratum, ea quæ uentri innatant, deorsum propellit.

*De stomachi inflammatione.* Cap. xvi.

Os uentris quemadmodum & ipsum hepar, eorum quæ adstringūt complexu semper quidē opus habent, multo maxime uero ubi fuerint inflammata. Si enim per laxantē diētam ac ductū, citra eorū quæ corroborant admixtionem curentur, periculum uitæ incurrunt. Medici namque qui laxante diēta in eis utuntur, uelut est oleum dulce per se, animi delinquentes ipsi autores existunt: neque enim ullum noui stomachicum aut hepaticum, qui in eiusmodi medicum inciderit, seruatum. Oportet itaq; siue oleū sit, quo



quo inflammationem patientes fouentur, siue caplasma ipsis imponatur: semper aliquid ex adstringentibus amiscere: uelut est unguentum nardinum, aut melinum, aut ipsum malum cotoneum in oleo decoquere, mastiche simul ammixta. Ceratum autem quo assidue in stomachi inflammatione utor, hoc est. Ceræ tyrrhenicæ unciam unam, unguenti nardini tantundem, uel quantum sufficit, aloës dra. i. mastiches dra. i. Quod si maiori adstrictione indigeant, ita nimirum imbecillitate & dissolutione existente, ut neque cibos continere possint, omphacii succi sicci dra. i. aut succi absinthii tantundem est ammiscendum: aliquando etiam ambos addere oportet, & tertium quod ipsis conuenit, hypocistidis succus existit, & cœnanthes, & rhois rubri succus, iuxta eam quæ adest uide licet dispositionem. Cerati autem amplitudinem augere oportet iuxta proportionem & mensuram reliquorum pharmacorum: ueluti si quatuor drachmæ aliarum rerum congregentur, cerati nardini uncias quatuor esse conuenit, duas quidem ceræ, duas reliquas unguenti nardini. Quod si durius adhuc pharmacum ipsum appareat, apponendum est unguenti nardini quantum omnino satis erit. Aliud ceratum. Ceræ trientem, rosacei unci. x. gallarum, aluminis scissi, aloës, florū rosarum, mastiches, singulorum drach. i. Vtere in his qui uehementi adstrictione opus habent. Caplasmata autem inflammatis conuenientia, sunt ex hordeo & semine lini, melleque & unguento nardino, modicoque uino, adiecta mastiche & absinthii coma. Ad diuturnas autem inflammationes & iam induratas, magis uaria pharmaca adhibere oportet: quæ & emollientium generis & discutientiorum existunt: ueluti est quod fit ex sertula campana, seu meliloto. Compositio autem eius multorum modorum est, propterea quod omnibus iuxta præcordia inflammationis conducatur: magnaque differentia eius sub alia atque alia forma apparati existat: alius enim apparatus circa stomachi inflammationibus, alius inflammato hepatis, aut spleni utilior extat. Epithema stomachi, quod Philagrius composuit, & frequenter apparatur. Ceræ quadrantem, cœnanthes unc. i. aloës sextantem, mastiches sextantem, ammoniaci thymiamatis, bdellii, cuiusque unciam i. adipis anserini trientem, styracis unc. i. œsypi bessem, olei rosacei libras ii. uini quantum sufficit. Stomachicum contusum, Andreae Comitis. Cypheos, styracis, terebinthinæ, cuiusque quadrantem, bdellii, aloës, mastiches, cardamomi, cuiusque sextantem, comæ absinthii unciam i. propolis trientem, ammoniaci thymiamatis sexuncem, ceræ unc. x. contunde & utere. Ceratum emolliens & relaxans ad induratas inflammationes. Olei sextarium i. aque cyathum i. adipis suilli recentis sexuncem, ceræ trientem, chamæmeli quadrantem, scille quadrantem, anchuse sesquicentiam. Epithema ex meliloto, Oribasii, meliloti bessem, ammoniaci thymiamatis quadrantem, bdellii quadrantem, myrobalanorum sextantem, cœnanthes sextantem, cardamomi unc. i. croci, cyperi, tridis, myrrhæ, zingiberis, aloës, amomi, spice celicæ, casia, cuiusque unc. i. ceræ librā i. terebinthinæ unc. xvi. melini, aut nardini aut rosacei lib. i. Aliquando & succi balsami sextantem, thuris unc. i. Arida contusa & cribrata cum modico uino in pila conterito: reliqua uero in uino diluita, & liquefactis quæ liquefcere possunt, affusisque, omnia simul unito ac utitor. Aliud ex meli-

loto, ad omnem præcordiorum induratum inflammationem, & ad colicos ac dysentericos, quod & in Alexandria apparare consueuerunt, quo uti soleo, hoc est: Meliloti, cyperorum, myrrhæ, nardi celicæ, cuiusque unc. i. croci drach. viii. cardamomi drachm. viii. cypheos drach. xvi. ammoniaci thymiamatis drach. xl. terebinthinæ drach. lxxx. ceræ drachmas clx. olei cyprini drachmas cxx. uini quantum sufficit. Epithema ex mastiche. Terebinthinæ dodrantem, ceræ unc. xviii. mastiches dodrantem, adipis taurini dodrantem, mellis lib. ii. rosacei lib. ii. Epithema aliud, ad induratas stomachi inflammationes, & ad omnem duriciem, ac diuturnam in ipso affectionem: in senibus præsertim & qui uergentis sunt ætatis, experimento clarum. Colophonix pellucidæ sextantem, ceræ puræ unc. i. mastiches puræ unc. i. olei communis coctare unum tantum. Omnia depurata in ollam coniecta super carbones liquefacito, assidue agitando, donec exploratum habueris quod in frigidam aquam destillata in pastilli modum emollire ac cogere possis. Vtere, non contempta ipsius utilitate. Epithema stomachicum ualde celebre, ad stomachi inflammationes & duricias, itemque debilitatem. Micarum filiginearum quadrantem, carnis palmarum pinguium unc. i. meliloti unc. i. comæ absinthii drachm. iiii. mastiches unc. i. aloës drach. iiii. adipis anserini recentis sextantem, ceræ quincuncem, olei amari præ immaturitate acerbis sexuncem, styracis unc. i. pilularum chamæmeli unciam i. palmas, melilotum, chamæmela, ad uesperam in saram maceranda conijcito, & sequenti die lento igni decoquito, exprimito & percolato, atque in decoctio micas maceratas rursus percoquito ac conterito: styracem uero per se cum paucio oleo liquefacito, atque ita solutum micis tritis ammisceto, & ceratum affundito: post uero liquefactis quæ liquefcere possunt, aridisque inspersis simul omnia in mortarium diffundito, ac subactis & simul unitis utitor. Ante pharmaci impositionem stomachum ex oleo et modico uino irrigato, in quibus absinthium sit decoctum. Emplastrum ex micis emollientes, relaxans, ac diffundens: facit ad inflammationes in quocunque tandem loco induratas, emollientes, & discutientes, ac firmitatem addens. Radicis althæe lib. i. phoenicobalanorum lib. ii. foeni græci lib. i. seminis lini lib. i. chamæmelorum, melilotorum, singula sexuncem, uini ueteris odorati adstringentis sextarios octo, spumæ argenti, cerusæ, colophonix, cuiusque libr. ii. ceræ lib. i. terebinthinæ lib. i. olei ueteris libr. ii. aquæ lib. ii. panis filiginei aridi cotuli & cribrati libr. v. Herbarum uino præmaceratarum, deinde decoctarum exuccatur, in succo uero panis contusus & cribratus maceratur. Sequenti deinde die spuma argenti & cerusa in aqua teruntur, & adiecto eis oleo, donec non amplius manus inquinent, decoquuntur, eisque liquefacta iniunguntur: atque ab igne ablatis, fermentata panis farina emollita paulatim ammiscetur, assidue tamē omnibus cum spatula agitatis: & post in mortarium coniectis, ibique primum pistillo, post etiam manibus fortiter emollitis utitor. Epithema Nilei, ad induratas tum stomachi, tum hepatis inflammationes. Ceræ libr. i. croci drachm. quatuor. ammoniaci thymiamatis sextantem, rosacei aut nardini libr. i. Crocum & ammoniacum aceto trita diluito: ceratum autem liquefactum & refrigeratum eis affundito, ac cunctis utitor.



## De stomacho exulcerato.

Cap. xvii.

Vlcere in stomacho aut uentre existente, omnium acrim rerum comestione abstinere oportet: succo autem pisanæ, aut halicæ uti modico ammixto melle, quo per ipsum ulcera repurgentur & extergantur. In cibis enim exhibere oportet, aliquando quidē ea quæ ulcera repurgant, aliquando autē & quæ dolores mitigant, & mordacitatem obtundunt. Post repurgationem uero quæ carne explent, deinde quæ ad cicatricē perducunt: uelut sunt ea quæ adstringunt. Forinsecus autem epithemata his cōueniunt ex palmis & malis cotoneis, ac polenta. Ceratum uero imponendū ex melino aut rosaceo, ammoniaco thymiamate, & thure ammixto. Epithema autē eis conuenit Nilei. Et tempore inductionis cicatricis emplastrum ex salicibus, & quod Iceseum appellatur.

De his qui à stomacho, comitialis morbi modo conuelluntur.

Cap. xviii.

Quidam homines ubi diutius ieiunū permāserint, præsertim cum tristitia interim affecti, aut ira concitati, aut curis anxie torti fuerint, comitialis morbi accessione compræhenduntur, & concidunt cōuulsi. Plures autē eorū qui hoc modo afficiuntur, gracilis habitus sunt, & assidue bilis in stomacho ipsis efferuescit. His sanè stomachus subtiliore sensu præditus existens, & cerebrum per consensum affectū, uniuersum corpus conuulsionis modo lancinat. Commune autem consilium omnibus hominibus medicinæ quidem ignaris, ratiocinatione autē nō inexercitatis subiiciam, ne quēadmodū plerique uulgo homines rationis expertū animalium more uiuāt, eorūque modo se habeāt: uerū per experientiam iudicēt, qui cibi ac potus eis noceāt: itē quales ac quāti officiant motus. Similiter autē et circa rei ueneræ usum obseruēt, nū innocuus eis existat, an cōtrā nociuus: multos enim noui, qui ex rei ueneræ usu maximū periculū incurrerunt. Oportet itaque hos ipsos bonā & exquisitā cōcoctionē sibi puidere: & tertia aut quarta diei hora panē diligēter apparatus accipere: solū quidē, si non siticulosi existant: si uero urgēte, ex uino diluto mediocriter adstringente & albo. Hæc enim uentrem corroborāt, & caput nō percellunt, quēadmodū fortia facere cōsueuerunt. Exhibere etiā eis oportet ex aloë pharmacum, bis aut ter in anno. A superfluis enim recrementis totum uentrem repurgat, & ad propria munia obeūda efficaciter corroborat. Vidi autē & alios in ore uentris comitialis morbi modo cōuulsos, quum uehementi cruditate laborassent, aut uino multo meraciore se ingurgitassent, aut intempestiuus re uenera fuissent usi. Quosdam etiam in febribus uidi repente conuulsos: qui bilioso uomitu succedente, euestigio ab omnibus afflictionibus sunt liberati. Quidam autem ex ita affectis fusca uomuerunt: quidam uero porri succo consimilia: quidam à multitudine uitiosorum ciborum aggrauati, sensus ac motus priuari munere à sopore grauissimo sunt apprehēsi ac detensi, quousque ea quæ os uentris compresserāt, omnia euomuerunt. Multis uero, nō insomnia modò, sed & somni perturbātes, & deliria, ob uitiosum humorem in ore uentris congregatum, accesserunt. De inflatio autē & præcordiali appellato morbo, nullus est qui non uerba fecerit, quo modo uidelicet tristes, et desperātes, & mœsto adspēctu reddat, & (ut uniuersum dicam) nulla re ab ijs

qui atra bile afficiuntur differētes aut inferiores. Apparet autem & hos uehementius post cruditates prædictis accessionibus apprehēdi: plerique autem ex ipsis splenetici sunt: quæ res facit ut æstimemus, & quendam ex splene confluere in uentrē uitiosum ac serosum humorem. Curatio uero his conuenit eadē quæ ad affectos ab atræ bilis delirijs est prædicta, in eo quo de capitis affectiōibus egimus Sermone. Itē ea quæ paulò antè est descripta, de his quibus atra bile stomachus infestatur, & qui uentrem habent inflatum.

Viridis iaspidis usus, Galeni.

Cap. xix.

Viridis iaspis lapis stomacho, qui & os uentris appellatur, utilis existit pro amuleto appensus, cuius rei multum experimentum fecimus. Oportet autem fillo innexos ex collo suspendere, eo modo ut lapides os uentris contingant.

De appetitus perditione.

Cap. xx.

Ventrem natura promptuarium creauit, ueluti terrā plantis: dedit & indigētiae sensum, cuius impetu animalia ad cibum ac potum concitata, ijs se explant: & uocatur quidē eiusmodi expletionis desyderiū, Appetitus. Contingit autem ob indigētiae sensum, quum uenæ ex cibis in uentre ad se attrahunt, uelut emulgentes & exugētes: quam exuccionem quum uenter ferre non possit, sed inde ueluti diuellatur, huius angoris remedium cibum exquirat. Itaque exuccionis sensus, ipsa fames existit, & Appetitus appellatur, naturale opus, non animale existens. Huiusmodi autem appetitum euacuatio præcedit: & contingunt sanè quinque accessiones ordine mutuo se ipsas consequentes: Quarum prima, Euacuatio est: secunda, Appetitus naturalis membrorum euacuatorum: deinde per uenas ex uentre Exuccio: post, Exuccionis sensus: et quinta, Appetitus animalis, qui omnium postremus existit. Itaque appetitus perditio contingit, aut ob sensus exuccionis uenarum perditionem, aut quod exuccio non fiat, aut quod corpus non euacuetur. Contingit autem sæpe etiam ob immoderatam uentris & intestinorum fluxionem, & ob biliosi humoris in uentrem delationem, tenacisque & acris, ac porri speciem habentis: & ob pharmaci potionē: & ob sanguinis immoderatam detractionem: & in continuis ac uehementibus febribus, stomachique & uentris inflammatione, item hepatis, uesicæ & uuluae. Contingit etiam in colica & uoluuolosa affectione. Maxima autem quod quis non esuriat, causā caliditas existit, quæ solida corpora laxando exoluit, & ad attractionem imbecilliora reddit: humida autem diffundit, atque amplius extendit. A plurimis etiam alijs causis appetitus perditio cōtingit. Itaque si iuxta principium morborum accesserit, aut iuxta uigorem, quum uires adhuc sustinere possunt, nihil molestiarum infert: modico enim alimento ægri opus habent. Si uero in declinatione totius morbi appetitus perditio accedat, aut in diuturnā imbecillitate, aut uiribus debilitatis, aut ex immodica euacuatione, periculo nō uacat. Augetur autē affectio hæc & ab ætate. Incomode enim hoc malo pueri afficiuntur, utpote qui natura uoraces sunt, & assiduo fomite opus habent. Quare magnus præter naturam excessus significatur, si pueri appetitus perditione fuerint affecti. Siquidem igitur ex uitiatorum humorum præsentia, appetitus perditio contingat: antequam



antequam aliam curam adhibeamus, delatos in uentrem humores, uomitu reiiciendos præordinabimus. Quod si ægre uomant, sorbitiones exhibere oportet, quæ eiusmodi humores infernè expellere cosueuerunt. Deinde per ea quæ ad hanc rem comoda sunt, corpora ad bonum perducemus temperamentum. Si uero ex uirium imbecillitate appetitus perditio accedat, considerare oportet qualis intemperies uires exoluit: & per contraria eam ipsam corrigere. Si uero ob inflammationem, aut obturationem alicuius alterius membri, appetitus perditio concomiteretur, tum & illius habere curam conuenit. Conandum est etiam ut per odora appetitum reuocemus: per polentam uidelicet posca madafactam, aut uino odore diluto, aut malorum cotoneorum decocto, aut pyrorum, aut cucumerum uiridium maturorum cremore. Inunctione item leni & non nimium sedula idem conabimur, ac moderata corporis fricatione, atque etiam pedum ac manuum palpatione ac cōtrectione accuratiore. In fessis etiam lumbos ac pectinē amplectentes adhibendi sunt, & aquæ affusiones, ac gargarisationes: absorbtiones quoque aquæ frigide modicæ & dulcis. Ab istis enim moliminibus sæpe ad accipiendos cibos profecerunt, quin & digitorum in os immisione stomachus lancinatus sæpe ad accipiendos cibos est conuersus, quare hoc ipsum tum ante curationem, tum post eam est faciendum: uomuntur enim aliquando biliosa aut pituitosa quædam, quæ perditum appetitum in quibusdā sunt causa, atque ita ab hac accessione eos liberabis. Cibi apparentur plures & uarij ac optimo apparatu, & ultra dulcedinē etiam illicientes & appetitum iritantes: frumentacei in primis generis, ac multi alimentum: uelut est halica ex decocto palmarum, aut prunorum damascenorum lota, aut ex aqua mulla diluta præparata, oua sorbilia, panis ex calida aqua lotus, aut si ita adsueta fuerint, frigida. Diuitibus autem, gallorum testes exhibendi sunt, & ex uolucris non graucoleres, & macræ ac montanæ: pedes suilli in decoctione plurimum eliquati. Eiusmodi enim cibos si gustauerint tantum, sufficiens alimentum deinde corpori offerendum est. Omnia autem quæ exhibentur, eiusmodi esse conuenit, ut facile deuorari possint: quæ enim multa commanducatione indigent, iniucunditatem quandam afferunt, & appetitum auertunt. In his uero qui iam prompti sunt, cupidique cibum accipiedi, cōiectare oportet ne sufficientem mensuram excedamus. Considerare etiam oportet, num ob naturalem infirmitatem, an consuetorum ciborum cupiditatem simulent appetitus perditionem: quod si ita contingerit, quantum in nobis est, grauiter obiurgatos ad monebimus, ne utilibus negligant obtemperare. Quod si non obtemperent, sed præ alimentum negligentia contabescant, uicissim contemnere ac negligere eos oportet, ac cibum parum deteriore exhibere: postquam primos affectionis dies, cataplasma ex palmis, malis, œnanthe, absinthio, & aloë stomacho imponere: licebit & ceratis uti ex eadem materia apparatus.

De appetitu canino.

Cap. XXI.

Contraria appetitus perditioni affectio est, quæ caninus appetitus appellatur: plures enim cibos appetitum, atque quum appetitum cohibere nequeant, in ingerendis nimis cibis modum excedunt: deinde multitudine

eorum aggrauati, & assumptos citra nocumētum ferre non potentes, ad uomitum diuertunt: deinde rursus cibo se explentes, rursus ad uomitum reuertuntur, quæ admodum canes: ex hoc autem aliquando & ad uomendi consuetudinem delabuntur. Sæpeque etiam alijs affectionibus obnoxij fiunt, coeliacis uidelicet & dysentericis, atque aquæ inter cutem: propterea quod prius quam priores cibi sint cōcocti, alios ingerant. Quod si huius accessione causa humor quispiam uitiat & acidus existat, qui os uentris mordeat & iritet, appetitumque excitet: frigidus enim humor uitiat exuentioni consimilem mordacitatem infert, ciborumque appetitionem exuscitat, & affectionis naturalis, quæ fames appellatur, modo corpora ipsa uacua reddit, tuniculis eorum coactis & adstrictis: quapropter & egestiones multæ ex ipsorum uentribus procedunt, crudis existentibus nimirum cibis, aut semicoctis. Itaque ubi cognouerimus ab humoribus pituitosis & acidis fieri hanc affectionem, qui in ipsum os uentris impacti, ac uelut aqua in spongiam imbibiti, cogantur & iritent & ad appetitum exuscitent, picrum appellatum pharmacum conuenienter exhibebimus, quod non tantum calefacere potest, sed dissecare, ac repurgare, extrahereque ex profundo oris uentris imbibitum humorem, & per aluum inferne euacuare: quin & robur uentri addit, ut ne facile nociuum humorem susceperet. Exhibeatur autem pōdere drachmarum quatuor ex uino cum aqua calida diluto: si uero puer hac affectione laboret, & ob amaritudinem bibere nequeat, si quidem possibile fuerit, in catapota drac. duas huius pharmaci digeremus, melleque forinsecus oblinentes deuoranda dabimus cum ouis sorbilibus aut ptisanæ succo: quod si neque sic tolerare queat, ea quæ dissecare & repurgare calefacereque possunt, in cibis annectemus: ueluti sunt allia, porri, thymus, satureia, origanum, pulegium, & quæ his similia existunt. Potum autem præbebimus ante cibum multum ac acruatim bibendum, calidum sanè aut certe tepidiorem. Sorbitiones item appetitum destruentes, ueluti sunt pulles cum melle multo & oleo plurimo, aut adipe anserino, gallinaceo aut suillo: ex oleis conuenit malua, cerebella item & pinguioribus uolucrum partes, pisciumque eodem modo, & omnino quæ appetitum auertunt, ac satietatem inducunt, & quæ magno cumulo accepta, modicè alunt. Ammiscere etiam conuenit panibus dum fermentatur acriora & urinā cietia, similiter & uino quod in potu sumunt, uelut est cuminum, anisum, petroselinum, & quæ eius generis existunt: ad uinum etiam piper & mel & spica nardi ultra ea quæ dicta sunt, coniungantur. Panis uero non sit recens, neque ualde bene fermentatus. Vinum uero quod bibunt, colore fuluum, substantia tenue, odorumque, & non ualde uetustum. quod tū ieiunis, tū sumpto cibo plurimum præbeatur, quantum uidelicet bibere possint. Ventrem enim ex calfacit, & humorum destruit acorem, ut sæpe solum suffecerit cum pinguibus & oleosis cibis ad perfectam curationem. Abstineretur autem oportet ab omnibus acidis ac adstringentibus cibis ac potibus, maxime uero à fructibus. Bellaria eorum sint pistacia, amygdalæ, nuges pineæ, colymbades etiam oliuæ exhibendæ ex melle. Conandum est etiam, ut lac ipsis exhibeamus, tum per se, tū cum passo aut melle: ita tamen ut obseruemus ac uitemus in eis, quibus in stomacho acescere consuevit: in his

A enim



enim maius nocumentum quam utilitas consequetur. Probe uero concoctum non solum appetitum obtundit, sed & aluum obturatam emollit, fluxionesque eius sistit, apparandæ etiam ex ipsa lacte potiones & placentæ, ueluti sunt dulciaria & oryza. Viscera uero cataplasmate hordeaceæ farinæ contegere utilissimum existit. Lauare autem per interualla oportet, cuticulamque ipsorum large pinguefacere.

*De canino appetitu, qui ex immodica transpiratione, ac cutis exolutione contingit. Cap. XXII.*

Est & alia canini appetitus species, quum uniuersum corpus rarius existens, & per obscuram respirationem exhaustum, præter modum in assidua alimentum indigentia constituitur. Contingit autem id, aut ex facultatis retentivæ in toto corpore imbecillitate, quæ cibis dominari non potest: aut ob plurimi caloris fortitudinem, qui instar ignis cibos consumit, & cutem rarefacit, ac exhalationem efficit. His sanè uentris egestionibus longe pauciores procedunt, quam pro eorum quæ ingeruntur modo ac proportionem. Et stercora quæ egerunt, existunt sicciore. Itaque pharmacum ex aloë eis insensissimum existit, item extenuatorum generis & discindentes tum potiones, tum cibi. Cutem enim magis rarefaciunt, exhalationem mouent, ac appetitum augent. Quare eorum qui hoc modo affecti sunt, cutem condensare ac spissiorē reddere melius est, cum oleo quopiam ex immaturis oliuis expresso, in quo myrtus, aut rosæ, aut eius generis quippiam ad lentum ignem sint decocta, admixto etiam alumine scisso in aceto acerrimo prius trito, intantum ut ad strigmentitiam formam unguentum reduci possit. Abstineant autem à balneis calidis, consimilique aëre, ac uini potu, & ab omnibus quæ tum intrinsecus calefacere possunt. Ducantur ad lauacra frigida, si quidem nihil id fieri prohibeat: utpote corporis gracilitas, aut membrum aliquod refrigeratum, thorax nimirum, aut aliud quoddam. Cibi eis exhibendi sunt stabiles, & ægre corruptibiles. Eius generis cochleæ existunt, & totum ostreorum quæ testis integuntur genus, si ex duarum aquarum reiterata decoctione apparatur: & polypi eodem modo. Carnes suillæ in uigore existentes: maxime uero uentres & uulvæ. Bubulæ quoque pinguiore, & omnia simpliciter pingua, & quæ uentri innatant, tardeque concoquantur, ac digeruntur. Ex ouis, ea quæ coquendo sunt indurata, aut sartagine fricta. Et similisago absque melle ex pinguibus iusculis apparata, similiter & dulciarium panes, & oryza, & panes non fermentati. Iuxta proportionem autem quantum accessio imminuitur, tantum ex crassi humoris cibus est detrahendum, & ex adstringentibus forinsecus ad motum imminuendum. Aliquando enim sedata uehementis appetitus accessione, in aliud grauius malum transitio contingit: nimirum quum corpus ex crudis & crassis humoribus repletur.

*De uitioso appetitu, ex Galeno. Cap. XXIII.*  
Vitiosas ciborum qualitates concupiscunt, qui in uentriculis uentris superfluum uitiosum recrementum imbibitum habent: id autem maxime mulierculis uitioso humore repletis euenire solet, quum uterum ferunt, & uocatur hæc affectio pica. Concupiscunt autem in ea maxime quidam acida & acerba, aliquando etiam acris, quandoque etiam terram, aut testas, aut extinctos carbonem, aut alios quosdam absurdos cibos: atque hoc affectu plures ex ipsis infestantur usque ad secundum aut

tertium mensem completum: in quarto uero quiescere incipit malum, partim quidem uitioso humore per uomitum euacuato, partim uero concocto & per tempus consumpto, utpote quum mulier modico cibo usa sit, propter appetitus ab edulis nutrientibus auersionem: quin & foetus in utero auctus plurimum alimentum ad se trahit, adducto simul cum sanguine & uitiatum humore. Porro idem affectus uiros quoque infestat, quum & ipsis uitiatum humor quispian ad os uentris fuerit delapsus. Conueniens autem eis remedium, Amazonum pastillus potatus existit: post uero etiam ex aloë decoctio pica appellata. Euacuato autem plurimo uitioso humore, exhibendus est eis mali punici dulcis succus, metasicca inspersa, aut aliud quippiam eius generis, quod est ad stomachi subuersiones ac nauseas præscriptum. Conueniunt etiam muria condite oliuæ albæ, & quæ corymbades appellantur. Item amygdalæ amaræ à ieiuniis acceptæ, & antidoti ad letalia pharmaca aptæ. Quo modo uero à pica appellato morbo mulieres infestatas curare oporteat, in muliebribus remediis dicitur.

*De cruditate, Galeni.*

*Cap. XXIII.*

Concoctio, est iuxta qualitatem permutatio, quæ nutrire potest. Contingit autem à uentre sibi ipsi cibos assimilante: quapropter manifestum est, quod circa permutationem, offensæ concoctionis accessio continget. Si itaque cibi in totum non permulentur, cruditas ea accessio appellatur, & est perditio & perfecta priuatio actionis: si uero permulentur quidem cibi, uerum non ut oportebat, uitiatam significat concoctionem, non autem ut antea eius priuationem: aut enim tardat, & nunquam propriam transmutationem suscipit, & difficilis concoctio appellatur: aut cibos omnino non corrumpit, ac transmutat in alienam qualitatem. Atque hæc quidem concoctionis offensiones existunt. Causæ autem ipsarum sunt intemperies uentris, inflammationes, scirrhi, abscessus, & quæcunque eius generis existunt. Aliquando autem uentre nihil male affecto cibi crudi permanent, aut propter immoderatam ciborum ac potuum ingestionem, aut ob uitiosam ipsorum ciborum qualitatem, aut ex intempestiua, aut etiam inordinata sumptione, aut ob recrementum uitiosum, aut ob uigilias. Cæterum ex uitiosis ciborum qualitatibus, & recrementis quæ iuxta uentrem consistunt, cum corruptione cruditas oboritur: aliquando & ex inordinata sumptione, si quidem poma, aut mala punica, aut aliquid aliud tale primum comederint, deinde olera assumant ex oleo & garo, aut etiam alia quæ uentrem emollire consueverunt. Intempestiuam autem acceptionem appello, si prius quam prior probe subierit cibus, prædeat, aut etiam præter consuetam horam. Corruptions autem sunt, nidorosa quidem in calidioribus & biliosioribus: acidæ uero in frigidioribus natura & magis pituitosis. Eodem modo & de excrementis quæ in uentre præexistunt iudicandum erit: quæcumque enim ex eis pituitosa & frigida sunt, acidæ corruptiones efficiunt: quæ uero calida & amara bile mixta, nidorosa. Ipse quoque uentriculus aliquo modo affectus, si quidem frigidus morbus existat, acidæ permutationes facit, calidus uero nidorosa. Tardas autem concoctiones, cibi difficulter corruptibiles faciunt, & si ultra quam uires tolerant sumuntur, itemque uigiliæ. Quum uero citra corruptionem perfecta cruditas oboritur, ut quales accepti sunt cibi, tales permaneant iuxta omnem



xia omnem suam qualitatem, ex hoc cognoscere datur uictum esse uentriculum, aut ab immoderata ciborum multitudine, aut per uehementem refrigerationem insit caloris. Vt nequis igitur in cruditatem incidat, cautione in omnibus prædictis est utendum, ut neq; in multitudine, neq; in qualitate eorum quæ in cibo accipiuntur, neq; in acceptionis oportunitate, neq; in ordine delinquat: & ut quæcunq; concoquere ualeat, ea tantum ingerat, & non quæ appetitus expostulat: mensuræ enim maxime omnium diligenter respectum habere oportet, appetitūq; refrænare, & neq; plus quam uires tolerant accipere, neq; quæ natura difficulter concoquuntur, uelut sunt carnes natura duræ: natura autem dico, uelut carnes bubulæ, & consimiles: ætate uero, si mactata animalia seniores existant. Cauendum est etiam à partibus carniū multū nutrimenti existentibus, & pinguibus salisq; cōdimento seruatis, ac uetustis. Ex oleribus, quæ igneæ sunt naturæ, ualdeq; frigida: item quæ inflationē pariūt, incōmoda existunt. Ex piscibus, qui duras carnes habēt, et repositione arefacti. Abstineāt quoq; à cibis corruptis & foetidis ac graueolētibus. Virent fructus dulces aut flatus generantes & immaturos: bellaria quæ difficulter cōcoquuntur & oleaginosa, & quæ ægre diuidi possunt, uelut est sesamum, quod commanducationem ob paruitatem suam effugit. Non minus autem uitādi cibi peregrini & inconsueti ac medicamentariam uim habentes, quales frequenter placentis ac panibus immiscētur. Iuxta tempus autē accipiendū cibi neq; impetuose, neq; aceruatim, neq; solidis partibus aut absque cōmanducatione eos ingerere oportet: neq; etiā potus cibum interpellet: id enim unionem ciborū impedit, singulosq; uentri innatare facit. Ex condimentis uero oxyporon quoddam, quod cito penetrat, assumere nō incommodum neque iniucundum existit: maxime uero huiuscemodi. Caroi drachmas xvi. fœniculi drachmas sex, seminis apij drachmas octo, ligustici drachmas octo, ammi drachmas octo, piperis drachmas decem: aliqui autē & zingiberis drachm. tres, in frigidioribus temperaturis, omnia melle excipiantur, & cū carnibus ac piscibus exhibeantur. Melius autem est cum cibo & piper maxime lōgum exhibere, in his qui magis pituita abundant: uētolū enim flatus crassitudinem dissoluit: & quæ circa præcordia consistunt, inferne ad aluum propellit. cōcoctionem etiam omnium maxime piper adiuuat, quod si fortē non adsit, albo utendum erit: quod si neque hoc adsit, nigro. Utendum etiam alijs cōcoctionem iuuantibus pharmacis, quæ ad finem huius capitis sunt subiecta. Post acceptum cibum uexationes inæquales ac conturbantes uitandæ, item æstus & refrigeratio: hæc enim cōcoctioni ciborum resistunt. Adiuuant autem eandem frictio pedum, calidius cōtuberniū, & calefactio præcordiorū. Quod si grauitas adsit circa uentrem, & ex ea molestia quædam in uniuersum corpus diffundatur, expassa manu os uentris apprehendendum est, aut puerulus carnosus admouendus. Ex his enim sepe alimētum corruptio ni proximum est conseruatum. Cæterum quum rutus iniucundus proueniens manifeste corruptionē factam indicat, citra cunctationem ad uomitū ueniendum est, atq; aqua tepida ingesta, omnia corrupta ad excretionem cogenda. si enim in uentre permanse-

rint, & torsionū, & dolorū, & grauitatis capitis causa existunt: aliquando autem bilis superne ac inferne effusionem, aut profluuium uentris, aut etiam febres inducunt. Quare eos qui difficili cōcoctione apprehendi solent, longo ante tempore adsuefaciemus ut facile uomāt: cōmodissimus enim in plurimis periculis uomitus existit. Quod si quis natura difficulter uomat, aut ob aliquam aliam incommoditatem uomere impediatur, omni modo conandum est ut cibus subeat, & ex præcordijs deducatur. Ad hæc eretior decubitus appareatur, ut ea quæ capiti subiiciuntur sublimius insternantur, & reclinatio ipsa in sinistrū latus fiat: atq; si quis uigilijs infestetur, citra corporis uexationē permaneat, eademq; decubitus formā obseruet: frequentes enim agitationes cibos perturbāt, intestinaq; inflata reddunt, flatus autē cibum sursum uergere facit. Si uero quis ob nullā causam male dispositus sit ad frigidæ potum, non inconueniēs erit cyathū unum aquæ frigidæ puræ absorbere: corroboratus enim inde uenter celerrime quæ in ipso herent extrudit, & ad subiectas partes demittit. Sequenti deinde die in quiete æger assuetur, fricationeq; pedū utatur, & præcordiorū concalescentia, donec murmura & flatus circa intestinū rectum eruperint, eructationesq; cum qualitate mansuetiori recurrerint: & tunc sanè exurgere cōuenit, primūq; alius ea quæ corrupta sunt egerat: deinde ad deambulationem moderatam æger procedat, atq; otium agat, propter commotos uapores ex corruptione in caput delatos. Post hæc autē ad quotidianas actiones mens applicanda est citra perturbationem ac indignationem: deinde rursus ueter cogendus est ad eorum quæ reliqua sunt excretionem. postea quiescere iubebimus, atq; aqua calidior pedes perfundere ac fouere: frigida uero pura facie proluta, in lecto quiescere omnibus conatibus somnum illiciendo. post quæ modica deambulatio, deinde balneum suscipiatur, quod calidius solito existat: cæterum resectis prius uiribus lauetur, corporeq; nitro cōsperso exudet, atq; hoc modo in calidius solū descendat: deinde etiā in frigidū insiliens, largiore oleo uniuersum corpus pinguefaciat. Cōmodissimum est etiā aqua calida in balneo hausta uomere: uelut abluendo ea quæ in stomacho desident biliosa aut pituitosa. absinthij quoq; prælibatio à balneo quod cōuenit facit, & aliena uentri adherentia extergit. A lauacro cibum capere conuenit moderatū, & cui cōcoquendo corpus sufficit. dabimus itaq; herinaceos marinos recentes, aut caneros fluuiatiles, ita ut ab eorū acceptione, malum aut oua sorbilia, aut pisces in petrosis aquis degentes adsumant, & ex uolucris non graueolentes & macras. A reliquis autē carnibus abstineant, & à leguminibus ac cepis, salsamētisq;, & quæ eius generis existunt. A bellarijs item, & omnis generis placentis, & à fructibus dulcibus ac facile aculentibus in uentre. his enim omnibus concoquendis egre sufficit ueter, ampliusq; infantis naturæ ea ipsa existunt. Non solum autem qualitates eorum quæ in cibo exhibentur permutatas esse conuenit: sed etiā multitudinis adhibere modum. ea enim quæ facile concoquuntur, his quæ non concoquuntur paria sunt, si præter modum ingerantur. Deinde uero somnus imperturbatus, & æqualis procuretur, illito uentre ex unguento nardino. Pharmacum cōcoctio



nem adiuuans, ex malis cotoneis, Galeni. Pharmacū ex malis cotoneis conueniens est apparando appetitui in his qui eum perdidērunt, conuenit & concoctioni, in his qui non probè concoquunt cibum, & ut summarim dicam, uentrem robustiorem reddit, eisq; qui debile habent hepar, utile existit. Manifestum autē esse arbitror, quod ieiunis exhibere hoc oporteat, mystri mediocris mensura, quanquam nihil offendat, etiā si quis à cibo ipsum acceptet. Recte etiā exhibetur, si pranso atq; inde coenare uolēti præsumentū derur. Oportune uero duabus ante cibum horis datur. Apparatur autem hoc modo: Ex malis cotoneis maiora iucundioraq; & minus acerba, quę uidelicet struthia appellantur, eligito, expressiq; eorum succi sextarios Romanos duos accipito, ac mellis quā optimi parē mensurā ammisceto: aceti uero sesquiseptariū affundito, hisq; simul ad prunas ardentes moderate decoctis ac despumatis, zingiberis quadrantem, piperis sextātem adijcito: atq; hoc modo rursus ad ardentes prunas, donec ad mellis crassitudinem perueniant, decoquito. Quod si magis adstringens ipsum facere uelis, etiā ex carne malorū cotoneorū appara. His uero qui intemperie uentris calida afficiuntur, & qui quomodocunq; itādem bile sunt referti, magis cōuenit, zingibere & pipere de tractis, succū malorum cum aceto ac melle solo decoctum præscripta cōmensuratione exhibere. Quando uero medię temperaturę fuerit uenter, ut neq; biliosa neq; pituitosa in eo aggregentur recrementa, dimidium prædictę cōmensurationis tum piperis, tū zingiberis radicis inijcere expediet, ita ut piperis quidē uncia i. zingiberis uero sesquiuncia coniiciatur. Si uero frigidioris temperamenti fuerit uenter, zingiberis triēs, piperis quadrās, aut unc. ii. s. ammiscatur. Licebit etiā iuxta mediā cōmensurationē apparare, atq; ubi opus fuerit usus tempore reliquum adijcere. Pharmacū concoctionē adiuuans, Diospoliticū appellatum. Conuenientior autē diospolitici pharmaci usus erit, in his præsertim qui a si due inflātur. Duplex autem compositio eius existit: aliquando quidem æqualibus omnium partibus cōiectis, cumini uidelicet & piperis rutęq; & nitri: hoc enim modo magis aluū subducit. Aliquādo autem reliqua singula inter se pari pondere miscentur: nitri uero dimidium aut quarta pars adijcitur. Præstat cuminum cōiectum æthiopicū esse, piper autem longum aut album. Cuminū in acerrimo aceto maceretur, deinde moderate torreatur. Sint & rutę folia præarefacta. Recentia enim superfluo humore abundant. His autē omnibus tenuissimè tritis, mel despumatum sufficienti mensura ammiscetur. Aliquādo tamen sola hæc citra mellis admixtionem trita & exiccata, repositaq; adseruantur, ac pitisanæ succo insperguntur, aut alijs etiā cibarijs, quibuscunq; tandem maximè conuenire uidentur. Ammiscetur etiā ipsum mel usus tempore, exhibeturq; inde cochlearij mediocris mensura ante cibum. Porro peregrinationis tempore præstat ipsum pharmacum aceto subactum in pastillos redigere, atque usu expetente similiter cum melle exhibere. Crasso autem modo cōtundere oportet ea quę ad huiusmodi pharmacorū compositionem coniiciuntur, ea gratia, ut ita uenter melius inde subducatur: tenuissimè enim trita & in puluerē redacta, ad emolliendam aluum inepta red-

duntur. Cæterum urinam nō modicam cient. Crassiora uero iuxta uentrem persistunt, quum angusta uenarū ora penetrare non possint. Pharmacū ex tribus piperis generibus, Galeni. Hoc autem modo dispositis, frigidum uidelicet & pituitosum habirum nactis ac inflatis, ex tribus piperis generibus pharmacum conueniens existit, si quidem nō nimis medicato ac uario modo apparetur, quemadmodū multi id cōficere solent: ut satis operosum sit eis, qui hoc accipiunt, ea quę ad eius compositionem ingrediuntur concoquere, uelut est ammiū, & seseli, & ligusticum, & quę eius generis existunt. Talia itaq; ex pharmaco hoc sunt adimenda, ampliusq; & helenum, spicęq; nardi, & cassia. In promptu autem duplicem eis apparatus habere conuenit, quemadmodum nos sumus consueui. Alterum quidem simplicem, his qui nō concoquunt cōuenientē, & qui recēti circa uentrem frigore, aut pituitoso humore affliguntur. Alterum medicamentarium, quo maximè in defluxionibus à capite ad thoracē utimur. Simplex igitur quo etiā ad crudos humores, circa primas & magnas uenas cōsistentes utimur, hoc modo habet. Ad quinquaginta drachmas uniuscuiusque triū piperis specierum, sufficit ammiscere anisi, cacuminū thymi, & zingiberis, singulorum drachmas octo, atque hoc sanè simplicius existit pharmacum: quam adhuc simplicius apparari possit, si citra zingiberis admixtionem paretur. Alterum autem ex iisdem cōstat: uerum ad quinquaginta uniuscuiusq; trium piperis specierum drachmas, singulorum ex his tribus, aniso uidelicet, cacuminibus, thymi, & zingibere drachmas xvi. coniicimus. Pharmacum ex calamintha oxyporon, hoc est, citō penetrans, quod polyetes, id est, annosum, appellatur. Prædictorum quidem igitur pharmacorum caliditas circa primas uenas extinguitur, minime per uniuersum corpus se diffundens: quemadmodum id quod ex calamintha constat, solet, & ei similia. Neque enim uolumus ea quę cum cibo cōcoctionis gratia exhibemus, in uniuersum corpus diffundi, sed tantū concoctionē ciborum in uentre adiuuare, itemq; humorum crudorum in primis ac magnis uenis contentorū. Quare quemadmodū in Diospolitico pharmaco dictū est, nō nimis in puluerē redigere oportet ea quę ad concoctionē solam adiuuandā apparantur. Hoc uero pharmacū in uniuersum corpus usq; ad cutem ipsam digeritur ac distribuitur: quare ijs ipsum exhibere cōuenit, quibus crudorum humorū multitudo in solidis animalis partibus consistit. In talibus enim, omnium quę ego noui optimum, id quod ex calamintha constat, existit. Attenuat enim crassa & uiscosa: discuitq; ea similiter, urinamq; & mēses cient. Compositio autem eius talis est. Calaminthę montanę, seminis petroselinī, pulegiī, seselis, cuiusq; dra. xii. seminis apiī, cacuminum thymi, sing. drach. iiii. ligustici drach. xvi. piperis drach. xlviii. mellis despumati quātum suffecerit. Aliqui & zingiberis unciam unam adijciunt. Iucundissimū autem est quod plurimum mellis ammixtum habet. His uero qui dulcia auersantur, & à mellis usu abhorrent, parū in compositione ammiscatur. Quidam tamen mellis libras iiii. & dimidiā ammiscēt. Potest & absq; melle siccum adseruari, eodemq; ut reliqua modo salibus cōmisceri, edulsiq; ac liqua



ac liquamentis inspergi. A cibo uero nunquā, neque hoc, neque aliud quoddam pharmacum, quod uehementem penetrationem facit, accipiatur: distribuitur enim ac digeritur simul cum ipso aliquid crudorum ciborum, & obturationem operatur. Vfus eius conuenit post matutinam frictionem, duabus ante exercitium balneumque horis. Aceti mulsi apparatus ac usus, Galeni. Pituitosis in uentre humoribus etiam acetum mulsum conuenit, quod hoc modo apparare oportet, Melle optimo ad prunas decocto ac despumato, dimidia eius mensura acetum affunditur, atque ita rursus ad prunas decoquitur, quo ipsorum qualitates optime permisceantur, & ne appareat gustantibus aceti acor. Ad eos uero qui aceti multitudine auersantur, hoc modo apparato. Aceti pars una accipiatur, despumati mellis duae, & aquae partes quatuor. Quod si fortius facere uelis, tantum aceti, quantum mellis coniicies, & absque aqua apparabis. Praestat autem iuxta sensum eorum qui accepturi sunt, mixturam congruentem modum iudicare, non uero secundum quod nostri sensus perceptant. Quod enim naturae accipientis familiarissimum est, id iucundissimum existit, & ob id etiam utile & accommodatum. Nocentissimum autem contra est, quod minimè iucundum. Ceterum usus tempore aqua calida mixtum, uelut uinum exhibendum est, prout aegro iucundius uisum fuerit. Pharmacum ex malo citrio, tardè concoquentibus commodum. Carnis mali citrii lib. i. hyssopi, rutae, origani, cuiusque fasciculū exiguum, aceti heminas iiii. per quinque dies ac noctes aceto macerata ad tertias decoquito, & expressa relicto: ad acetum uero mellis sextarium i. ammisceto, rursumque ad mellis crassitudinem decoquito, deinde asari, mei, piperis, cuiusque sextantē inspergito. Mane & uespere exhibetur. Pharmacum ex uino scybelite, Archigenis. Vini scybelite sextarios iiii. succi rutae sextarium i. sisonis, piperis, cuiusque unc. i. zingiberis sextantem, petroselinum unc. i. mellis sextarium i. Liquida ad compagem crassam decoquito, aridaque inspergito, ac cochlearium unum aut alterum exhibeto. Efficax est ad tardas concoctiones, ac inflationes, itemque colicos. Vinum autem scybelites est, quod sua sponte ex passis uuis destillat, utpote uinum ultro effluentibus uuis. Sales Iamblichi. Salis ammoniaci libram unam, salis cappadocici sexuncem, piperis quadrantem, zingiberis quadrantem, seminis cnici scrupulos xviii. seminis eruae scrupulos xvi. ammi scrupulos xviii. hyssopi scrupulos xviii. silphii scrupulum i. cacuminum thymi, phylli, seminis apii, petroselini, cuiusque scrupulos xviii. origani unc. i. Contundito ac cribrato, indeque dimidium cochlearium, cum ouis forbilibus, aut cum pituita ieiunis exhibeto, potes & cum carniū aut piscium liquamento exhibere, aut quomodocumque tandem uelis. Huius medicamenti auxiliarem facultatem nemo pro dignitate laudare potest. Quare ut breuiter dicam, ad frigidiores temperaturas non reperias aliud pharmacum, quod conuenientius crudos humores concoquat: unde & colicis prodest, uentrem citra molestiam mediocriter mouens.

Sales Poletis, aluum emollientes, pituitam à capite dissoluentes, per palatum transpirantes, reliquasque distentiones attenuantes. Salis torrefacti splendidissimi drachmas cxliiii. floris chamæmeli aridi & contusi trientem, conyzæ tenuis trientem, calaminthæ

montanae trientem, radicis eryngii montani, origani, cuiusque trientem, silphii trientem, piperis trientem. Contulis & cribratis utere. Sal dodecatheos, hoc est duodecumanus, seu duodenarius. Hyssopi trientem, pulegii quadrantem, cumini sextantem, ammi unc. i. salis torrefacti uncias triginta. Contundito & cribrato, proque quotidiano sale, utcumque placet, utitor. Qui enim eo assidue utitur, nullis morbis per omne uitæ tempus infestatur. Precipue tamen caput allevat, & uisum acuit, pituitamque in thorace congregari non sinit: concoctionem bonam operatur, & melas ralcas maximè uenas ab obturatione liberat, & renes repurgat. Quidam & origani sextantem adijciunt. Ego uero semper spicæ nardi unc. i. annecto. In hyeme amplius piperis unciam i. addo. Ad eos quibus alimentum in uentre acescit, utiliter hoc remedium adhibetur. Piperis drach. iiii. seminis anethi drach. i. cumini drach. iiii. contere, ac exhibe cochlearium ante somnū ex uino diluto. Embamma optimum ad intinctus, concoctionem adiuuans. Cumini, piperis, foliorum rutæ, mentæ uiridis, anethi uiridis, cuiusque drach. iiii. pulegii sesquidrachmam, salis unc. i. gari albi cochleare i. mellis cochlearium i. Vtere, ualde enim commodum existit. Posca, concoctioni ualde commoda, Cyrilli Archiepiscopi. Pulegii, seminis feniculi, seminis apii, cuiusque scrupulos sex, caroi sesquiscrupulum, seminis coriandri sesquiscrupulum, baccam lauri unā, cyperi, folii malabathri, costi, cuiusque scrup. i. salis sexuncem, aceti sextarium i. Sicca contundito & cribrato, acetoque ammixta ad paucas horas macerato, ac utitor.

De crapula, Philumeni.

Cap. xxv.

Cruditates ex uino multo obortas, crapulas appellamus, easque consimili methodo tractamus, quali ad difficultatem concoctionis præscripta uti solemus. Itaque his qui ad frigida potum adsueuerunt, aliasque stomachum habent æstuosum ac exustum: aquae frigida puræ cyathi duo aut tres per interualla ad absorbendum exhibendi sunt post uero per somnum meridianum turbationibus depulsis, confestim eos in balneum inducemus, prolixioreque exudatione procurata, ab aquae tepida haustu ipsos uomitum facere cogemus, aut digitorum tantum immisione eundem lacestemus. Deinde prædictos cibos exhibebimus, dilutiore ac pauciore addito potu, donec caput à grauitate liberetur. Statim uero à principio caput ex olei omphacini fomento irrigetur. Sequenti autem die bonæ concoctioni consulatur. Optimum autem fuerit, si quis uinum absinthites ad plures dies à balneo præbibat, itemque post matutinas deambulationes. Prodest & acetum scillinum absorbere i. mystri mensura: deinde in quiete breui sanè tempore degere, atque ita ad reliqua facienda procedere, quemadmodum in capite De cruditate est prædictum.

Quæ cura aluo adstrictæ adhibenda, Galeni. Cap. xxvi.

Recrementorum iuxta uentrem retentio, aut propter acceptos cibos ac potus contingit, aut propter uentrem ac intestina. Et propter cibos quidem, aut ob ciborum ac potuum acceptorum tum qualitatem, tum quantitatem, aut propter ordinem, & utendi modum contingit. Ob qualitatem quidem, si acerba & austera ac sicca temperatura & commixtione contentea quæ accipiuntur. Ob quantitatem uero, si plura aut pauciora & citra conuenientem exhibeantur men-



suram. Circa ordinem autem retentio excrementorum contingit, si arida & acerbiora prius, humida uero pinguiora & dulciora postea ingerantur. Circa modum uero utendi, si bis cibum accipere conueniat, & semel omnem assumat. Quae uero circa uentrem ac intestina consistit recrementorum retentionis causa, ea & ex natura ipsorum, & ob acquisitam contingit dispositionem. Causae itaque circa naturam ipsorum, sunt uitiosae corporum constitutiones. Octo autem existunt uentris acquisitionis intemperaturae. Quatuor quidem simplices, caliditas, frigiditas, humiditas, siccitas: reliquae quatuor commixtae, caliditas simul cum humiditate, caliditas cum siccitate, frigiditas mixta humiditate, frigiditas mixta siccitate. Oportet autem unamquamque intemperiem in eam magnitudinem excedere, ut euidenter excretuam facultatem imbecilliores reddat, aut in uentre solo, aut in gracilibus intestinis, aut etiam crassius, aut simul in omnibus praedictis, quemadmodum in uoluulis fieri consuevit. Ad haec amplius & in febribus aliquando aluus adstringitur, ob acrimoniam uidelicet resiccantibus & consumentibus humores: aliquando autem materia ad alios locos diuersa, perque illos ipsos exclusa. Sudoribus enim multis per cutem exclusis aluus coarctatur, & stomacho ex fluxione affecto stercus cohiberi contingit: propter inflammationem item intestino recto uicinam, ipsumque deprimentem, uelut est uesicae, aut uulue, & propter ulcerationem aut dolorem circa eas partes oborta, excrementa recurrunt. In his uero qui a morbo uires colligunt, uenter cohibetur, propterea quod plurima digestio ciborum in corpus fiat, & ob id exiguum & aridum, & quod difficulter excerni potest, stercus relinquitur. Ad haec etiam uenter adstringitur ob flauae bilis cohibitionem, quae ad intestina delabi consuevit: ea ipsa enim in animali, quod secundum naturam habet, confluens intestina mordet & iritat, & ad excretionem excitat recrementorum. Quapropter etiam semper cibo uacuum ieiunum intestinum reperitur, in quod procedit meatus, qui ex bilis succetrice uesica bile ad intestina deducit, atque ob has sane causas uenter adstringitur. Commune autem in omnibus praecipuum est, ut causae noxam inferenti contrariam curationem opponamus. Proprium uero ut secundum singulas causas cuique quotidie contraria remedia exhibeamus. Et si quidem ex pauciorum ciborum acceptione homo aluum habeat adstrictum, plures simulque humidiores ei offerantur: si uero siccioribus sit usus, humidiores quidem dentur, non autem multi. Si uero austeri & acerbiora cibi retentionis fuerint causa, dulces & pingues exhibeantur. Si uero ob permutatum ordinem adstrictio fiat, in eum qui conuenit, reducat. Si uero semel cibum accipiendo, quum bis id facere oportuerit, uenter cohibeatur: non solum bis, sed & saepius conuenientes cibi dentur. Eodem etiam modo recentes intemperaturae per contraria curentur: ita ut exsiccata corpora humectemus, humecta uero resicemus, & calefacta quidem refrigeremus, refrigerata uero calefaciamus, atque in coniugatis siue mixtis qualitatibus eadem iuxta proportionem faciamus. Cohibita autem quae ad intestina defluere consuevit bile, aut ob crassitudinem, aut ob biliosorum meatuum obturationem, extenuatoria dieta utendum est. Similiter autem omni conatu instare & reuerti oportet, ad reliquas alui adstrictae causas tollen-

das, atque uiscerum quidem inflammationem soluemus, ubi per ipsam cohibitio contingat, materias uero ad intestina conuersas deducemus, si quidem aliò proreptent: quae autem medicinali materia id fieri possit, in simplicium pharmacorum Sermone est praedictum in principio huius tractationis, atque in eo qui hunc sequitur, De purgantibus pharmacis inscripto. Communis autem omnis quomodocumque euenierit, adstrictiois alui curatio talis est. Ex decubitus figuris erectior eis conuenit, & ad sinistram latus reclinatio. Et silentium quidem ac quies uentrem cohibet, motus autem & deambulatio impellunt. Paucus potus, & non praeporare, neque inter medios cibos potum accipere, uentrem resiccant: praeporatio uero & multa potio stercora humectant. Somnus concoquit, & recrementa fluida facit: uigiliae uero materias distrahunt, & suspensas tenent. Plurimum autem ciborum qualitates possunt, quare eas quae uentri gratae sunt exhibere oportet, quanquam omnino melius fuerit absinthii succum dare, aut ex aloë catapotia deuoranda. Quibus si nihil proficimus, durisque adhuc stercoribus insidentibus, & lumbis aggrauatis, circumtensoque & inflato uentre superiore, humectantibus immorari cibis absurdum. Saepem enim lapidis modo recrementa indurantur, & in intestino recto condensantur, quare accepti cibi stomachum quidem & uentrem humectant & effeminant, ad intestinum uero rectum peruenire non possunt: ut inde aliae quaedam molestiae consequantur. Melius igitur in istis fuerit aluo prorsus succum per clysterem infundere, ammixto oleo & melle, aut maluae aut foeni graeci uel fursorum decoctum similiter cum oleo & melle: utendum etiam gladiis ac illitionibus sedis. Alumen autem liquidum melle tritum donec indurescat decoquitur, ex eoque sedes illinitur, & facile quidem plurima stercora prolestat, quanquam inde aliquandiu dolore afficiantur. Optime autem facit & cyclamini succus cum melle illitus, & in tomento quoque appositus. Mercurialis etiam uiridis contrita, & ad glandis modum redacta, excipitur & supponitur, ualdeque comoda existit. Alia glans, purgatoria uim habens. Comae absinthii contritae ac cribratae drach. iiii. nitri drach. iiii. elaterii drach. i. melle cocto excipito, glandesque informato ac subindito: fomento tamen prius ad locum adhibito. De his autem absolutissimis in tertio huius tractationis Sermone est praedictum, ubi etiam pharmaca purgantia quae circa umbilicum illinuntur, descripsimus, eorumque etiam quae per os exhibentur ac uentrem emolliunt, tum simplicium, tum mixtorum remedium mentionem fecimus, quare superfluum existimo hic de eis producere sermonem. Absinthii emollientis utilis apparatus. Costi un. i. spicae nardi scrupulos iiii. folii scrupulos iiii. mastiches scrupulos ii. mellis sextarios duos, uini sextarios decem. Absinthium bonum, emolliens, & dulce. Sisonos unciam unam, floris iunci odorati scrupulos vi. mastiches scrupulos duodecim, folii scrupulos ii. spicae nardi scrupulos duos, mellis sextarium unum, uini sextarios quinque. Absinthium amarum pituitosis magis conueniens. Agarici, folii, amomi, spicae nardi, cassiae, cuiusque scrupulos tres, costi scrupulos ii. rosarum siccarum scrupulos ii. aloës scrupulos vii. mastiches scrupulos duodecim, mellis sextarium i. uini sextarios v. Aliud, atra bile abundantibus, & pituitosis



pituitosis similiter commodum. Folij scrupulos vi. spicæ nardi scrupulos sex, agarici scrupulos quatuor, epithymi scrupulos xii. mastiches scrupulos xii. aloës scrupulos quinque, mellis sextarium unum, uini sextarios v. Aliud optimum. Folij, spicæ nardi, cassiæ, amomi, cuiusque scrupulos iiii. costi scrupulos iiii. agarici scrupulos iiii. mastiches scrupulos ix. aloës scrupulos xii. mellis sextarium i. uini sextarios quinque.

De inflatione, Galeni.

Cap. xxvii.

Inflationis principium cibus male concoctus existit.

Cōtingit autem flatuū generatio in uētre, ex humorib. in ipso pituitosis, aut ex cibis in uapores per mediocrem caliditatem resolutis. Perfecta enim frigiditas nullum omnino uaporem efficit, propterea quod neq; omnino attenuat, neq; consumit, neq; dissoluit etiā ipsum cibum: uehemens autē caliditas cibum attenuat, si flatuosa natura existat, & tunc sanè nebulosus flatus generatur, uerum paucus, adeo ut per unū aut alterum ructum euacuetur. Mediocris uero caliditas minoris efficaciz existens, cibos quidē dissoluit, non autem perfectē consumit: unde sanè flatus generatio contingit. Vna autem eademq; ratione quemadmodum extrinsecus frigidissimæ & aquilonares in hyeme constitutiones, & calidissimæ æstatis tempore consistentes, purum aërem reddūt: quæ uero inter has mediæ existunt, nebulas gignūt: sic eodem planè modo, in animalium corporibus, neque in extrema caloris debilitate, neque quum uehementer calor inualefcit, sed quum inter hos excessus medio modo habet, flatuosum recrementum generatur, atque hoc ipsum ubi per stomachum excluditur, ructus operatur: per sedem uero aut strepenem, aut absque strepitu flatū. Quum uero neque per os, neque per sedem excernitur, inflationem appellatam producit. Archigenis. Accedit affectus stomachi grauitas & distentio, multosq; fallit tanquā in ipsum solum dolor innitatur: etenim malū ipsum aliquando quidem iuxta totum pectus, aliquando uero retro iuxta collum ac dorsum, atq; ipsa uertibula irruiat: sæpe autem & utrinq; occupatos tenet: aliquando autem & tumorem circa os uentris efficit, ructusq; inanes fiunt modicè alleuantes, inhibitiōq; flatuū qui per aluum excerni cōsueuerunt. Succumbit autē & tumor ipse iuxta uentrē, ad manuum impositiones subluxus cedens. Quibusdā eorum & dolores accidunt, & appetitus perditiones, ac capitis dolor: si uero ante perfectam restitutionem cibum accipiant, amplius membra ipsa inflantur, & cū dolore amplius distenduntur, qui sæpe ad clauiculam usque defertur ipsasq; scapulas ac uniuersam spinā, ultra hoc quod & ructus cohibentur: ut aliqui iam non dissimile quiddā suffocationi se perpeti æstimant. Leuantur autem alimento infernè subeunte, & flatibus siue per ructus, siue per intestina exclusis. Eos igitur qui nō ita diu ante cibum sumplerūt, primum uomere præcipe: deinde uero fouere oportet cum lana in fasciculum conuoluta & leuiter calido oleo madefacta. Si uero dolor urgeat, fomentū fiat per uellicam bubulam aqua & oleo calidis semiple-nam. Glandes quoque confidenter & citra dilationē supponendæ sunt, ex rebus flatus prolestantibus in formatae, uelut est rutæ semen & cuminum æquali pondere cum melle cocto, ac modico nitro coacta.

Inedia etiam affectioni necessaria existit, per unam quoque atq; alteram horam tempore iritationis, irrigationes ex oleo conueniunt, in quo absinthium, ruta, & anethum sint decocta. Lanæ uero conuolutæ cuminum tritum, aut apij semen, aut sisonis magis inspergatur. Deinde & cucurbitæ adsumantur inanes multæ, & cum multa etiam flamma admotæ. Perseuerante autem diutius affectione, cataplasmata ex semine lini, ordeacea & loliacea farina imponantur: ex cumino etiam trito, semineq; anethi, aut apij aut foeniculi, aut chamælæ, aut tragorigani, aut centaureæ coma, aut eryngij semine, uel radice: ex hydromelite etiam & oleo, in quo ruta, baccæ lauri, & melanthium sint decocta. Ammiscendū est & bitumen, oleumq; laurinum. Si uero inflamatio unā cum inflatione adest, pro calefacientibus ea quæ relaxant ammiscere oportet, uelut est anethum oleo incoctū ammixto adipe gallinaceo aut anserino. Cibus uero frumētacei generis sit & paucus: post multum etiā assumpti cibi tempus, potus tandem præbeatur: à cibo fricationes extremarū corporis partium adhibeantur. Alius uero tum per cibos, tū per aloē subducatur. Cerata etiā imponantur ex oleo appa-rata, in quo cucumeris syluestris radix sit incocta. Ad finem uero malagmatis utendum, quæ ex seminibus aut lauri baccis constant. Marciani irrigatio siue fomentum, ad eos qui ex morbo circa septū transuersum inflationē habent, & murmura circa interiora, aut quibus uiscera inflammata sunt, aut inflantur. Rutæ uiridis trientē, foeni græci sexuncē, meliloti trientem, absinthij trientē, foenum græcū in pauca aqua diem unū præmacerato: deinde reliquis ei adiectis, atq; olei sextarijs iiii. affusis, ad non fumantē ignem decoquito, percolatoq; ac in eo lanam conuolutam quā plurimū madefacito. Si uero dolor intenda-tur, in solium ex oleo apparatus eos imponemus, si tamen nihil id fieri præpediat, althææ itaque radicē, lauri folia, foenum græcum, pulegium, ruiā, in aqua decoquamus, & oleo ad decoctum affuso, eos inscen-dere faciemus: quod ubi feliciter processerit, cibum accipiant, panē ex aqua, & pisces teneras carnes habentes. Qui uero se iam recolligunt, diæta restituendis uiribus apta utantur: sinapismisq; & cucurbitulis cū multa flamma post exercitia admotis, uomāt. Si uero fixa perseuerauerit accessio ipsa, tēpore exacerbationis cataplasma ex sinapi imponendū est, & paulo post aloës drachma una propināda, aut smyr-nij semen ex uino. Aristolochia autem longa siue rotunda drachmæ pondere potata flatum dissoluit, & tarde concoquentes iuuat: quod & calaminthæ decoctum, aut etiam polium decoctum cum melle modico & paucissimo pipere tenuissimè trito, facit. Ouillus autem talus ustus & potatus torminibus ac inflationibus medetur. Aut rhamni folia uiridia trita in pastillos redige, eosq; in umbra exic-catos drachmæ pondere exhibe: non febrientibus, cum uino diluto, febrientibus uero cum hydrome-lite. Facit & ad uoluulosas affectiones, omnesq; inflatiuos dolores miro modo: per ructus enim ac flatus infernè prodeuntes discusso & resolutio ma-lo sani fiunt, inquit Dioscorides. Vtile etiam eis castorium ex posca bibitum existit, drachmæ pon-dere acceptum. Idem quoq; forinsecus cum oleo sicyonio impositum, citam si cum torminibus



& inflationibus prædictæ affectiones cōtigerint, eas sanat. Acetum uero scillinum tum ante, tum post cibum absorbeant, aut ante somnum. Apparatur autē simplicissimè hoc modo. Scillæ repurgatæ & dissolutæ libras v. aceti sextarios xlviii. sub caniculæ ardoribus ad dies quadraginta insolato, ac utitor. Oxyporion etiam quod cito penetrat eis conueniēs est huiuscemodi: foliorum rutæ drach. xxxii. cumini drach. xiii. ligustici, caroi, seminis apij, piperis, zingiberis, helenij, nitri, cuiusq; drachmas viii. exhibe cochlearium quomodocunq; uelis congruenter. Exhiberi etiam potest ad noctem ex tribus piperis generibus pharmacum, erui magnitudine: robustioribus uero, Aegyptiæ fabæ. Alio autem adstricta citra dilationem clyster infundendus: balneo uero ex interuallis utendum est tempore remissionis. Præficient autem istis tum dorsum, tum stomachum, conspergantq; nitro assato: solijs etiam calidioribus utantur, & à balneo cibis detur, minimè inflans, & post omnem cibum uinum meracius exhibendum. Cibus autem ipsorum diuidatur, ita ut in prandio tertiam, in cœna uero reliquas duas accipiant partes. Fructuum uero atq; olerum humidorum esum semper habeant suspectum. Mulrum autem potum tanquam infestissimum hostem deuitent.

De uoluulo, Archigenis.

Cap. xxviii.

Voluulus, adfectio est intestinorum, letalem dolorem inferens, causa adfectionis, continua ciborum corruptio existit, præsertim si multi accipiantur, uarij, & ad quos non adsueuimus, & maximè ex pinguibus carnibus. Oboritur etiam ex plagis quibusdā, & frigore uehementi, & ex acruata frigida potione, maximè si ab exudantibus accipiantur. Cōtingit & his quibus intestinum in scrotum unā cum stercore delapsum est: indeq; uolēter retrusum, ex eoq; inflammatum existit. Fit etiam ob ueneni potionem, & ob induratum sterces circa tenuia intestina impactum, in uno loco dolore innitente circa tenuia uidelicet intestina, ut admota manu durities tactui succubat, quam adfectionem chordapsū ueteres uocant, hoc est, intestinorum emolliationem. Et multi sanè ex dolore statim intereunt. Alijs uero inflammatio suppuratur, rursusq; intestinum ipsum denigratum ac putrefactum excidit, eoq; modo deficiunt. Familiaris autem hæc adfectio ætati puerili est, eadunt tamē naturalis beneficio humiditatis. Senibus uero nō ualde familiaris est: si tamē ipsi hanc adfectionē incidunt, ferè nunquā conualescunt. Accedit egris dolor circunvolutus, stomachi nimia humectatio, exolutio, ructus inanes nihil alleuantes, murmura intestinorū, cohibitio perfecta stercoreis & flatuum. Si uero intendatur affectio, omnia sursum feruntur, ob idq; & uomitus pituitæ ac bilis accedunt, frigiditas totius corporis, dolorq; plurimis etiā spirandi difficultas. Morituris autē amplius sudor frigidus, urinae difficultas, podex ita adstrictus, ut neq; specilli extremū suscipere possit: aliquando & sterces uomitu reijcitur. Si quidem igitur cibus crudus uentri insidere uideatur, aqua mulsā cum nitro exhibita uomere cogemus: deinde rursus aquam calidam puram dabimus, ut mordacitas obtundatur. Si uero nihil crudorū ciborum in uentre contineatur, omni conatu enitendū est, quo tum flatus tum stercorea infra trahantur: idq; per glādes illitionesq; & clysteres, magna

diligentia in singulis adhibita perficiendum. Glādes itaq; conueniunt ex semine rutæ & nitro, cuminoq; ac melle. Valent etiam quæ ex brassicæ cauliculis apparantur cū melle cocto: ex profundo enim attrahunt. Cæterum glandulas longiusculas facere oportet, quæ adstrictiorē internam ani partē sphincterē Græcis appellatam, trāsire queant. quibus appositis, podex per spongas calidas foueatur, quibus sanè cyclamini succus utilissimè excipitur, quanquā cum melle etiam ac nitro idem illitus efficaciter opitulatur. Idem facit centaurea cum melle & nitro: uerum in his conandū ut quā penitissimè illinantur. Per clysterem autē oleum infundatur, in quo cuminum, ruta, althææ radix aut folia, fœnum græcum, centaurea, cucumeris syluestris radix, sint decocta: adijciatur autē & butyrum, & resina terebinthina, ut inde crassitudo infuso ipsi accedat, per ampliorē etiam fistulam largius infundatur, iuxta corporum rationem, aliquando usq; ad duarum heminarū mesuram. Quin & clysteres ex prædictis apparentur. Probè facit & syluestris cucumeris radix contusa, & in aqua satis diu decocta absinthio adiecto: si quidē ad decoctum ipsum mel & nitrum, oleumq; ammiscantur. Si uero sterces durius intestinis insidere cōiectamus, aut inflammationis obstructio adsit, althæam ac fœnum græcum cū caricis decoquamus, butyroq; & anethino oleo plurimo ad decoctū adiecto, per clysterē inijciemus, & quamdiu quidem queāt, retinere præcipientur. Optimum autem infusum hocce est. Bituminis drach. iiii. nitri drach. i. aloës unc. i. olei rutacei dodrātem. Commodum est etiam cuminum, rutam aut absinthium cum oleo coquere, deinde percolato modicum salis inijcere, aut opopanax drach. i. aut galbani drach. iiii. Profunt & caricæ ac ruta in oleo decocta. Eiusmodi autem infusa ante cibum infundere oportet, & maximè quod ex asphalto apparatur: urgente uero malo etiā à cibo. In soliu etiam aqua & oleo refertum desiderare eos conuenit: in aqua uero althæa, ruta, & conyza decoquantur. Fomenta quoq; adhibenda sunt ex fufuribus, & per pyriateria phacota, id est, uaporatoria uasa lenticulata, & per uelicas bubulas ex oleo semiplenas. Cōueniunt etiam fomenta ex lanis oleo madefactis, in quo cuminū, anethum, ruta, conyza maximè parua, & nasturtium sint decocta. cuminum quoq; per se tritum uentri inspergendum est, deinde lana imponēda. Cōuenit enim ab irrigationibus incipere, ipsisq; etiam inter cataplasmata uti. Cataplasmata uero ex melle sint apparata, aut hydromelite meraciore: assumant autem semen lini, fœnum græcum, pollinem hordeaceum, loliaceā farinam, & fabarum. Infarciendum est etiam ipsis plurimum rutæ & cumini, anethiq; semen aut apij, aut rutæ semen siccū: inspergantur autem hæc crassa, & post impositionem calefiant, posteaq; assidue permuetur. Post hæc cucurbite affigantur, primum quidem ad remotos locos, inanes: deinde ad ipsos etiam dolore affectos, scarificationesq; profundiores fiant, saleq; impacta uulnuscula conspergantur, quibus postquam cicatrix fuerit obducta, malagmate ex seminibus utendum, aut eo quod ex lauri baccis constat. Potus eis conueniens est anethi decoctum. Est enim usitatum & accommodum. A potu panem in aquam feruentem conijce, eiusq; frusta calida confestim edenda



edenda præbe. Hoc enim modo seruabitur, etiam si iam instet ei suffocationis periculum. Oribasius autem inquit: Anethū in aqua & oleo decoquatur, atq; ita bibatur, deinde frusta panis ex aqua feruenti præbeantur. Mirum in modum enim inde iuuantur, inquit, etiam si iam stercois uomāt. Ruta etiam ac cuminum trita & potui inspersa commoda existūt, & sinapis arida trita inspersa. Commodum est etiam maluæ semen, tritum ac potui inspersum. Balsamū quoque non adulteratū, in potu utile existit. Alius potus. Bituminis drachmas quatuor, cum modico nitri contere, & ex aqua bibenda confidenter præbe.

Alius. Radicis panacis drac. ii. nitri dra. i. cumini drachmas ii. excipe melle, & nucis ponticæ magnitudine ex aqua calida præbe. Alius. Castorij, anisi, piperis, cuiusque æquales partes cōmisce, atq; inde sesquidrachmā ex aceto mulso præbe. Asclepiadæ potus, qui & recremēta multa soluit. Elateriū sufficienti terebinthina exceptum, in catapotiaq; redactum, deglutendum præbe, aquamq; insuper bibendam. Aliud ad uoluulum remedium, quod uentrem soluit: confert etiā anhelosis, splenicis, aque inter cutem, ex lapide laborantibus, urinæ difficultati, paralyticis, tremoribus, comitialibus, uulua strāgulationi, mensesq; ducit. Medullæ scillæ crudæ, ammoniaci thymiamatis, iridis, cuiusq; drach. l. galbani drac. x x v. opopanacis drachmas xii. Scillam seorsim cōtere, deinde ammoniacum cum acerrimo aceto tere: postea etiam galbanum & opopanaca, simulq; mixta omnia in catapotia redige: ex quibus drachmam unam deuorandam præbe, & uinum dilutum insuper bibendum, aut aquā mulsam, aut acetū mulsam. sit autem liquoris mensura cyathorum quatuor. Concoctionē adiuuat, si ante cibum deuoretur, ultra hoc quod aluum facillimè soluit. Feliciter usi sumus, inquit Archigenes, ad uoluulos absque inflammatione, hiera nostra ex colocynthide ponere drachmarum duarum, aliquando etiam trium in catapotia redacto. Aut enim uomitu reijcitur ipsum pharmacum cum multa bile ac pituita, aut in fra ad intestinū progressum omnes causas adfectionem operantes secum subducit. Doloribus uero per seuerantibus, & maximè quibus infusi clysteres nō infra rursus prodeunt, etiam ea quæ dolorem leuāt exhibenda, itemq; cōuenientes antidoti ante somnū. Communissima igitur & optima, ea quæ ex piperibus constat, & Andromachi ex uiperis theriaca existit, post eam uero quæ Mithridati nomen debet. Propriè autem in his colicæ antidoti faciunt, qualis est uel in primis quæ Zopyrios, & quæ Pæonia appellatur, quarū descriptiones in xiii. Sermonē cōtinētur. Si uero à uenenoſo pharmaco quis in uoluulum incidat, aquam tepidam multam bibendam dabimus uomereq; cogemus, deinde oleum calidum in potu dandum, aut pinguiā iuscula, ut rursus uomant ex moderato eorū potu, deinde ita parumper quiescāt, & statim postea theriacen accipiant cū uino dissolutam. Cibi eis exhibeantur boni succi: alius uero lacte scisso euacuanda. In eo autem uoluuli genere, quod chordapsū appellari diximus, in quo in uno loco dolor innititur, ut admota manu durities & tumor tactui succumbat, circa tenuia uidelicet intestina, subitum periculum instat, ut plurimum tertiam aut quartam horam non excedens: quando ue-

ro ad suppurationem inflammatio uergit, aut longior remoratio contingit, neq; ea ferè citra periculum existit, quāquam sint qui ex eis sunt seruati. Venæ igitur sectio ante localia remedia assumenda est, deinde cucurbita, & reliqua cura quemadmodum in inflammatione fiat. Danda uero & his assidue ex uiperis theriaca ciceris parui magnitudine ex aqua calida infusum, etiam immittendum ex his quæ inflammationibus conducunt, uelut est sceni græci & maluæ decoctum, cum oleo & butyro. In potu exhibetur rosmarini decoctum, florisq; iunci odorati, mei, foeniculi, & maximè omnium anethi. Probè etiam ad eos facit, foliorum rhamni uiridium tritorum, & in pastillos redactorū, exiccatorumq; drac. i. ex calida aqua exhibita. porro ex conuulsione aut ruptura obortos uoluulos uenæ sectione curare oportet, locosq; ubi dolor insignitur profundioribus fissuris impactis scarificare & diducere, lanisq; succidis irrigare: antidotos etiam dolorem leuantes bibendos præbere, uerum clysteres omnino deuitare. Si uero uoluulus propter intestini in scrotum delapsionē contingit, confestim tentandū est, ut decubitu sursum uersus uergēte adornato, delapsum intestinum ad inguinum partes retrudatur, atq; post leniter citra uiolentiam ac compressionē, ligamento adhibito contineatur. Si uero iam ex compressionē inflammatione oborta sit, torminaq; ac inflationes accedant, etiam hos ipsos uenæ sectione curandos censeo, in inediaq; ad tertium usq; diem seruandos. In principio uero lanis succidis ex uino & oleo madefactis irrigandos: adhibito postea etiam cataplasmate crudæ hordeaceæ farinae. Aliquando autem & inflammatae partes commodè per ambitum scarificantur, per althææ quoq; ac sceni græci decoctum & oleum utiliter irrorantur ac adsparguntur.

*De his qui ab acri humore coli dolore infestantur,*

*Galen.*

*Cap. xxix.*

Quibus in colo & intestinis acris & mordax insidet humor, hi à calidis cibis ac pharmacis itemq; infusis læduntur, & à cibis abstinētes magis iritantur. Melius autem habent ex temperamentum inducentiū & mordacitate carētiū usu. Tenuēs enim & acres humores uehementissimū inferunt dolorem, aliquādo uero & conuulsiones, maximè ubi circa os uentris fuerint aggregati. Accedunt quandoq; & animi deliquia, & humiditates sudoris frigida. Hoc itaq; modo affecti, calida potata ac uomitu reiecta biliosum humorem excernunt, quiq; etiā ærugini aliquādo in colore similis existit. hic quidē igitur humor ubi in uentre cōstitit, mordens, & animi deliquia inferens, per uomitū expurgare ipsum oportet. Vbi uero in intestinis aggregetur, per sedem infundere conuenit ea quæ humores eluere atq; citra mordacitatē repurgare possunt, cuiusmodi est ptisanæ succus. Cibi uero boni succi & qui non facile corrumpantur eis exhibendi, attenuantibus & calefacientibus uitatis. Oportet enim infestantem humorem aut euacuare, aut temperare. Exempli uero gratia mentionem faciam quorundā à nobis curatorum. Quidam etenim quadraginta annorum, qui colicus esse putabatur, à perfusionibus & fomentis, cataplasmatiscq; & acrioribus infusis non modo nō iuuabatur, uerū & magis exacerbabatur, & ubi mel cū pipere accepisset, extremū dolorem incurrit, & ubi sceni græci succum



succū cum melle sumpſiſſet, plurimum fuit iritatus. Coniectionem igitur feci, mordaces in iſſis inteſti norū tuniſis imbibitos eſſe humores: non facile cor- ruptibiles ei exhibui cibos: deinde ubi uidiſſem eū minus à dolore infeſtari, uitiari humoris purgatio- ne ei opus eſſe cognoui: cæterum pharmaco ex aloë amaro hominem acuatim purgare minimè auſus fui: nimirum ob dolorem ac indigentiam, tempo- riſq; diuturnitatem uiribus attenuatis. per interual- la itaq; mediocria paulatim purgatione per picram ex aloë facta, in paucis diebus ipſum perfecte ſana- ui, nullo altero remedio admoto. Alter quidam adoleſcens nō paululū antea à colicis doloribus ue- xatus, accepta ſcamonia purgatus eſt: quumq; pro ratione accepti ſatis multū fuiſſet euacuatus, illa ma- xime membra quæ prius habuit imbecillia morſu infeſtata ſenſit, ut inde quaſi fluidā quandā & dolo- roſam circa inteſtina haberet affectionē. Itaq; & hūc curauī, colica remedia reiſcere iuſſum, & ex halica cū aqua calida decocta nutriri, granis mali punici ſi mul incoctis. Quumq; totā noctē abſq; dolore dor- miſſet, mane exhibuimus ei rhois ſuccū dilutiore bi- bendū: ut ſi qua ulcerosa adfectio circa inteſtinū eſſet oborta, eā adſtringeret, ſiue quippiā ex ſuperioribus partibus ad affectam influeret, idipſum repelleret. In prandio etiā halica ſimiliter cū mali punici acinis & aqua decocta uti iuſſimus. In ueſperam uero panē ex uīno quopiam aſtero ac ueteri madefactū dedi- mus. Cōceſſimus etiā ut ex aſteris fructibus pro- libitu, modicè tamen, caperet. Tertia autem die quū eodem modo fuiſſet reſectus, in quarta hauſta the- riaca perfecte ſanus euasi. Alium autem quendā ſimiliter affectum æſtatis tempore quum plurimū ſiueret, eodem uictu curauimus, ampliūſque frigidū potum ei indulſimus. / Cæterum euacuato humo- re, & remanente adhuc dolore, ad ſtupeſacientium uſum conſugere oportet. In huiusmodi enim affe- ctionibus non ſolum quod ſenſum ſtupeſacit, ſed & quæ humores tenues inſpiſſant, caloremq; refrige- rant, maximè opitulantur.

*De his qui à frigidis & pituitosis humoribus coli dolore infeſtantur.*

Cap. xxx.

Quum uero craſſi & lenti fuerint humores, qui dolo- ris cauſa exiſtunt, nequaquam ſtupeſacientia erunt offerenda: etenim alleuantur quidem ex eorum uſu, ob ſenſus uidelicet ſtupeſactionē: uerū rursus peius inde habent, quod ampliūſ per ipſa humores inſpiſ- ſentur, & diſſiciliter omnino excerni poſſint. Atqui nauſeæ unā cum uomitibus magnæq; & frequen- tiores illis oboriuntur. Vomuntur autē pituitosa & corrupta, retinentur excrementa, adeo ut ne ſtatus quidem excernatur, neq; ructus etiā procedat. Sæ- pe enim ueluti ſurſum reuoluitur dolor, ac plurimū occupat locum; aliquando uero ex loco ad locum digreſſus uehementius augetur. Maniſta uero co- gnitio coli affecti eſt, quādo aliquando quidē alius dolor infeſtat, quā pro renum ſitu, aliquando au- tem longe inferius: ſi enim iuxta renū ſitum dolor in- nitatur, atq; id in uno loco cum dolore ac grauitate, renū affectionem eam eſſe cenſendum eſt. Conſide- randē autem ad hæc urinæ: aquoſæ enim & puræ in principio à nephriticis minguntur: quemadmodum in ſequenti tempore ſubſidentia habentes aſperā, de- inde exquiſitè arenosa. In colicis uero etiā ſi ege-

rat aliquando uenter, tamen ſtatuofiora excernit: sæ- peq; ſtercora aquæ inuehuntur boum ſtercoribus compage non abſimilia. Contingit etiā quando- que humorem aliquem frigidum cum iſſis excerni, quo facto conſeſtim melius habent. Per ſomenta au- tem & cataplaſmata nephritici quidem doloris mi- tigationem accipiunt, laxatis uidelicet iuxta obſtru- ctum lapidem corporibus. Colici uero parumper quidem uidētur mitiores redditi: paulo poſt uero ue- hementius intenduntur eis dolores, diſſiſis uidelicet per adhibitarum ſomentationum calorem humori- bus, generatiſq; ſtatibus, qui plurimam diſtentionē operantur. Quomodo igitur oportet dolores ex fri- gidis in inteſtinis humoribus obortos curare, ita ut neq; uehementibus irrigationibus, neq; cataplaſma- tis caleſcant. A caleſcientibus enim diſſunduntur & inſtantur omnes frigidi accraſſi humores, qui in- teſtina diſtendendo augent dolores. Conuenit itaq; ipſos diſſecare & concoquere citra uehementem ca- lorem, & per minimè inſtantiū uſum. In exacerba- tionibus igitur conſimilis colicorum cura fieri de- bet, qualis ad uoluuloſos eſt prædicta, irrigationes uidelicet ex oleo rutaceo & ſicyonio & anethino, inediaq; & ſomenta ac cataplaſmata, inſuſa irem & glandium admotiones, illitionesq; ſedis. Vomitus uero ante coenā, ſi quis facile uomat, præ omnibus auxiliatur. Vbi uero malū ipſum producit ad plu- res dies, inſeſſio in ſolium ex oleo repletum adſumē- da eſt: aut ſi hoc fieri non poteſt, ex aqua & oleo re- pleatur, in quibus althæa, pulegium, ac lauri ſolia, ſi- miliaq; ſint decocta. Fomentum uero ſiue uaporo- riū adhibeatur ex ſurfuribus & milio, & cataplaſ- mata quoque ad uoluuloſos prædicta. Poſt dies ue- ro ſeptē purgatio ex hiera Archigenis ſuſcipiatur. Licebit tamē & nō purgare, uerum ab acrium cibo- rum eſu inchoare. Quādo uero aliū ipſum omniū minimè inſtat niſi febris adſit, cōſidenter ipſum affe- remus, ſitis autem ſequitur acrium rerum comestio- nem. Præalleuetur itaque præcedente uictu eger, ubi ad acrium rerum eſum procedere uolet: aquaq; po- tu utatur. Flatu autem uentoſo infeſtante, egregium remediū cucurbita ſæpius affixa, cum largiore flam- ma exiſtit: ut incantationi ſimilem effectum præſtare uideatur, & in quacunq; corporis parte apponatur, conſeſtim à dolore liberare ac perfecte ſanare cogno- ſcatur. Quod ſi humor quoq; unā cū flatu adſuerit, eueſtigio quidem à dolore leuantur, mox uero rur- ſus redeunt dolores, maximè ubi quippiam peccati circa diætā fuerit admiſſum: aut ſi plus quā oportuit, caleſcerint ipſa membra. Maximum autem ſi- gnū & hoc tibi fuerit ad affectionis cognitionē. Ne caleſcito itaque manifeſte, ſed diætā attenuatoria utaris. Oportet autem & ante inſuſorum uſum, cu- curbitam dolētib; locis adhibere: indeq; oleo ruti- ceo, & huiusmodi cūctis inſuſis uti. Multi uero acce- pro clyſtere uehementer dolent, & uitreo humore excreto ſtatim liberantur. Febre autem ut plurimum carent, ſitiq; in totum non infeſtantur. Naſcuntur & in colo lapides, ſed raro: quare oportet eos urinam cientibus, & ſtomacho gratis uti, ſanitarisq; tēpore etiā uenam ſecare, & catapotys ex aloë gratia præſer- uandi uti. Quandoquidem autem colum ipſum in quibuſdam debilitatum ex leui occasione, & per interualla quædam dolores inferre cōſueuit: melius utique



utique fuerit exquisitiorē diēta uti, & curā quoque adfectioni conuenientē subornare. Qua de causā ubi à somno surrexerit aeger, uentrē exonerare tentet: de inde ad deambulationē procedat. Deambulet autem & hyemis tempore, nisi frigidior sit aer, aut ipsius debilitas hoc nō permittat: idēq; faciat in loco sub dīo, aēri exposito, & patenti: primum quidem lentius, post uero cōcitatus. Quiescatq; ubi crura incaluerint fuerintq; delassata. Deinde domum reuersus bibat ali- quod pharmacum adfectioni conueniens, modiceq; quiescat: & ubi quotidianae alicui ac consuetae actioni uacauerit, per horam equo uehatur, assidue ei insi- dēdo: quod si facere non possit, in curru: si autem im- becillior sit, per nauigium. Iacens enim uectari pote- rit, quum omne corpus unā cum nauigio cōmoueatur. Post uero ubi molestiam ex uectatione obortam modica deambulatione excluderit, leniter exclamet, aut concinne cum uociferatione procedendo le- gar: deinde rursus modice quiescens ad inunctionem ac frictionem exuatur. Exercitatione itaque facta, & cura admota cibum accipiat circa sextam horam, ut & ad coenam sufficiens interstitium fiat. partiatur autem cibos, maioremq; eorum partem in coena assu- mat. Vtilissima enim colicis ciborum partitio exis- tit: praeputato igitur absinthite uino, panem in cliba- no coctum recentem probe apparatus accipiat cum oliuē colymbadibus muria cōditis, aut paucis uuae pensilis acinis, aut ficis uiridibus tribus aut quatuor: deinde à potu, nisi ualde urgeatur, abstineat. Si uero siticulosus sit, modico potu uehementiae sitis medea- tur: otioq; & iucunda animi uoluptate fruatur. Dein- de per circuitum adfectione repetente, deambulet: ci- bosq; probe disposito, ad coenam accedat. In coena si siticulosus sit, modicum praebibat, & post paruum interstitiū coenat: ex uarijs quidem pauca, & commo- ditatibus abunde referta. Potus mediū cibum non di- rimat, sed post ipsum referuetur, qui sufficit etiam po- tus exhibeatur. multa enim potatio incōueniens affe- ctioni existit. Non longo deinde à coena interuallo facto, ad somnum diuertat: & si quidem noctu sitis urgeat, ei parce medeatur, aqua paulatim absorpta. Atque de quotidiana quidem diētae ordinatione ha- ctenus. Cæterum paucis subnectam etiam commo- dos adfectioni cibos, potionesq; & pharmaca. In uni- uersum igitur omnia quae colicis exhibentur, attenua- toriae sint diētae. Panis itaque neq; sit aridus, neque calidus, in clibano coctus, aut si is nō adsit, in furno. Olera autem cruda quidem nō sunt danda, cocta ue- ro conueniūt, cichorium, intubū, rarius autem caulī culī lactuca, cucurbita in calido cinere assata, cocta enim stomachum ledit: malua cocta: uerum nihil ho- rum absque pane exhibendum. Dandē etiam colym- bades oliuē cum aceto mulso ac ruta praeparatē. Ab alijs uero abstinendum. Legumina omnia per se qui- dem adfectioni incommoda sunt. Verum uarietatis gratia aliquātum adsumatur lenticula cum beta col- liquata, optimeq; contrita, aut cum pisana: aut faba cum pisana diligenter subacta. Cæterum rarum le- guminum usum probo, pisana excepta: commoda enim haec est, lapathum cum ea colliquato. Conuenit etiam falfamentum piscium petrosi locis degentiū: itemq; limaria non inueterata, nec muria condita. Pi- pere autem & ruta cum aceto mulso condita exhi- beantur. Ex carnibus conueniunt in primis uolu-

crium, secundo loco pisciū numeratur, tertium ordi- nem terrestrium carnes habent. In unoquoq; genere omnia inconsumpta reprobanda. Inter ea uero quae pro consuetudine in cibum nostrum accipimus, ui- tanda sunt dura, siue natura, siue aetate talia existant: item quae neruosam ac fibris refertam habent carnē, graueolētiaq; ac foetida, & quae alias mali sunt succi, aut grauioris qualitatis, & pinguis, atq; ea etiā quae omnino macra sunt & infirma, & quaecunq; prae hu- miditatis multitudine disfluunt. Quapropter ex pis- cibus, hi qui in fluminibus & stagnis degunt, uitan- di sunt. Ex marinis autem, qui in petris degunt, his qui intra pelagi profundum uersantur, sunt praefere- di. Qui tamen in profundo maris degunt, littoreis praestant: & littorei rursus, potiores sunt his qui in marinis paludibus nutriuntur, etiamq; his qui in ma- gnarum urbium stagnis uictum quaerunt. Eligendi autem sunt maxime lupi & aselli mediocri magni- tudine: scari autem & turdi ac gobi tenerrimi qui- dem sunt, & facillime secedunt: alimentum autē pau- cum, roburq; corpori addunt. Scaros autem hic non magnos intelligere oportet. Mulli autem & scorpij & passeris, nutrimenti quidem ac roboris gratia omniū gratissimi existunt, grauiorem autem omnē habitum reddunt, ut ob eam causam frequentiore eorum usum uitare oporteat. Murenas autem & lo- ligines, sepiasq; & polypodas, omniaq; simpliciter mollia, ut quae difficulter cōcoquantur, inflationes pariant, noxios humores generent, censeo reprobanda. Ex his uero quae testa integuntur, squilla omniū minimū noxia existit: cancer turbationem inducit: gammaro autem siue astaco pro uoluptate fruatur. Ex ostreorum porro genere, purpure, & buccina re- liquis praeferenda: deinde pelorides praestant: postea herinacei recētes: deinde quae proprie ostrea appellā- tur: reliqua uero relinquenda. Ex uolucrum genere, gallinae omnibus praestantiores. sint autē ferae, & in- mōtanis altae, deinde perdices, & palūbi, debilis nu- trimenti gratia exhibēdi, turturesq; feri ac per agros nutriti & colūbae. Fugiēda omnia uolucrum genera, quae in aquis degūt, tanquam graueolētia, & quae superfluitatibus multis abūdent. Ex quadrupedum animantium genere praestant carnes suillae, tū cōco- ctionis & alimēti roborisq;, quod inde corpori ac- cedit, gratia, tū quod facile secernatur. secundo loco hoedinae habendae: reliquae uero domesticae fugiēde. Ex syluestribus & feris paucae, uarietatis tām gra- tia dētur. Omnes autem carnes quas exhibere uells, ad duas dies promptas & paratas habere oportet, in hyeme praesertim, ut friables reddantur: ex aqua etiā omnes coquantur, quae enim in sartagine fricta sunt, quantum fieri potest uitentur. Cauendum etiam à uis- ceribus omnibus: sunt enim frigida, & turbationē mouent: difficulter concoquuntur: grauiasq; sunt, & saniosa, ac foetida: nimiasq; humectationes ac nau- seas producunt: maxime tamen omnium cerebrum. Pulmo sanē hoedinus bis assatus, ac in cibo acceptus superabundans alimentum subtrahere uidetur. Qui uero eum lacte replent, deindeq; coquunt, aut assant, uoluptatis gratia non utilitatis respectu id faciunt: multoq; magis qui eum frustatim concisum in sar- tagine torrent. Sale conditi arietis pulmo maxime uetusti, difficulter & grauiter à uentre exuperatur. Cochleae autem terrestres succulentae in cibo sum- ptae,



ptē, obluſtari & ſeſe opponere colicæ affectioni ui-  
dentur. In liquamentis & cōdimentis cōueniunt, cu-  
minum, menta, ruta, ſiſon, ſœniculum, origanū, am-  
mum, thymum, piper, zingiber, daucus, ſuccus ſil-  
phij, acetum, mel, garum, uinum. Pyrethrū uero &  
liguſticum, ac helenium, ſimiliaq; magis medicamē-  
taria uel prædita ſunt: & ob id in quotidiano uſu ac  
diætā uitāda. In uniuerſum autem, ut ſummatim di-  
cam, unius coniectionem facere oportet, ut ſcilicet  
accepti cibi optime cōcoquātur. Particulatim uero,  
ut ne ſiccitas excremēta apprehendat, neq; fatigetur  
uēter in multis cibis cōficiendis: ne uēter ciborū qua-  
litatibus obluſtetur, ueluti ſi ægre eas conficiat, &  
nimiam humectationem ei inferant, ne noxiū humo-  
res generentur, neq; in uētre, neq; in uniuerſo corpo-  
re. Omnia enim inutilia recremēta ex leui occaſione  
ad affectū ac infirmum mēbrum detruduntur. Qua-  
re uitare cōuenit omnia dulciaria & placentas: plu-  
rima etiam ex bellarijs ac fructibus: lucunditatis ta-  
mē & gratificādi ſtomacho gratia, uua alba dulcis  
præ ariditate corrugata cū pane præbeatur: ficusq;  
maturæ cuticula auulſa: uua etiā uinaceis exemptis.  
Reliqua uero omnino ſunt fugienda. Vinum ſit ſub  
adſtringēs, album, tenue, pellucidū, mediocri ætate,  
tēperatura dilutiore, modiceq; bibatur. Quod ſi ſitis  
à cibo accedat, aqua calida præbeatur. Inſenſiſſima  
enim ipſis frigida exiſtit. Dulces autem prælibatio-  
nes ex uino & melle apparatus, propomata Græcis  
appellatæ, eò quod ante cibos biberentur, omnes de  
uitandæ. Atq; hoc ſanè modo ea quæ ad colicorū diē-  
tā pertinent, diiudicantur. Colicum remedium ex  
ſtoechade, nephriticis commodum. Hoc omnes ue-  
teres interiorū membrorū affectiones curauimus.  
Datur autem ex ordine diebus xxx. & perfectē ab  
omnibus affectionibus liberat. Stœchadis drach.  
xviii. radicis panacis drach. v. agarici drach. ii. cina-  
momi, myrrhæ, ſeminis braſſicæ ſylueſtris, iridis,  
mādragoræ, hyoſcyami albi ſeminis, coſti, nardi cre-  
tici quod phu appellāt, ſpicæ nardi, piperis, opij, cu-  
ſusq; drac. xii. (accipio autē piper longū) mei drac.  
xviii. ſeminis cicutæ drac. xxi. dauci drac. viii.  
Cōtuſa excipe melle deſpumato, ac exhibe robuſtis  
ſcrup. ii. reliquis obol. iii. febre carentibus, ex uino  
mulſo: febrientibus, ex aqua. Infuſum quoq; nucis  
ponticæ magnitudine cum oleo in quo ſœnum græ-  
cum & ruta. cocta ſunt, colicorum dolores ſedat.

*Pharmaca ad colicos.*

*Cap. xxxxi.*

Conuenientiſſimum ad colicos pharmacū uinum ab-  
ſinthites exiſtit, ſi prælibatione à balneo aut exerci-  
tio opus habent: eſtq; etiam nō ſitientibus ualde cō-  
modum, ſi laxiore ac debiliore apprehendēte aluo,  
cyathi temperati menſura ante aridorum ciborum  
comeſtionem accipiatur. Apparatur autem uinū ab-  
ſinthites, & pro occaſione, uirgis recentis & pleni  
abſinthij quindēcim numero, per diem ac noctē in  
ſiſtilli uaſe uini tenuis & adſtringētis mediocriter ue-  
tuſti maceratis: menſura autem uini ſit ſextariorum  
trium. Decoctū etiā herbæ ipſius, ubi ſemel tantum  
ebullierit, pari modo ad uinum quod alias pro con-  
ſuetudine bibunt, admixtū, utiliter à balneo ac exer-  
cicio præbetur. Melius autem eſt quod ubi otij ſit  
ſic præparatur. Selibra abſinthij in amphoram uini  
optimi recētis, quod muſtū appellamus, conijcitur,  
oblinitur, in eaq; permittitur, donec muſtum ceſſauit.

rit feruere: deinde abſinthium quidem abijcitur: ui-  
num uero reponitur ac inueteraſcit. Habet autem  
omnino amphora ſextarios octo & quadraginta.  
Vinum abſinthites aluum corroborat potenter, &  
quicquid lubricum inferne in aluo ac inteſtinis hæ-  
ret, citra animaduerſionem detergit: bilis generatio-  
nem præpedir: flatuſq; alios quidem depellit, alios  
uero auertit: quodamq; modo ſpiritum diſpenſatio-  
ni præfectum defecat. Aloë etiam optima trium dra-  
chmarū pondere deuorata aptiſſima eſt, ubi nō pro-  
ratione ciborum egeſtio excrementorum fiat. Quæ  
admodum autem optima aloë etiam ſola ſanitati  
reſtituere poteſt: ita uitiola medicamētaria ſuperflui-  
tate uentrem replet. Intercidentes uero obiter infla-  
tiones ſylueſtre cuminum, quod & æthiopicum ap-  
pellant, cochlearij menſura ex aquæ calidæ cyathis  
duobus aut tribus potatum diſſoluit: aut ſiſon ſimili-  
modo: aut rutæ ramuli in aqua ipſa feruefacti. Ca-  
ſtorium etiam aſidue potatum totius affectionis ap-  
paratum demolitur, omnibuſq; medicamentis præ-  
ſtare repertum eſt: datur eiſ drachma una in tribus  
cyathis optimæ aquæ muſſæ. Lupi autē ſtercus ma-  
xime album ex aqua, aut uino albo & tenui ſumme  
colicis auxiliatur, inquit Galenus: non ſolum in ac-  
ceſſionibus & iritationibus, ſed tempore etiam in-  
terualli. Aut enim perfecte morbuſ ſedat, aut ita præ-  
parat, ut ad tempus aliquāto mitius adſigat. Melius  
autem ſtercus cenſetur, quod non in terrā delapſum  
reperimus, uerum in fruticem aut herbam excretū.  
Oſſa quoq; in ipſo ſtercore inueniuntur, quæ ipſius  
animalis concoctionem effugerunt, quæ ſi trita bibā-  
tur, magnopere colicis auxiliantur: quare mundiori-  
bus hominibus repurgatoria exhibenda ſunt cum  
ſale ac modico pipere mixta, aut alio quopiam ad  
commendationem odoris. Mirum in modum etiā  
manifeſte colicos iuuat, inſtar amuleti alligatū ilijſ  
ægroti idem lupi ſtercus: oportet autem ſilum quo  
amuletū colligatur ex oue à lupo diſcerpta ſumere,  
cum ſtercoreq; ipſo in pelle ceruina excepto, ac filo  
colligato, illa præcingere. Si uero non ſuppetet lana  
ex ouicula à lupo diſcerpta, ligamentū ex ceruina in  
dē pelle accipere oportet. Corydus itē paſſerculus,  
qui & corydalus, hoc eſt galerita, appellatur, ſim-  
plici iure coctus, aſidueq; unā cum iure acceptus,  
ſummopere colicis prodeſt. Utilitatē enim ex eo ex-  
pertus ſum, inquit Galenus. Cæterum paſſerculiſ,  
quos pyrgitas à turribus, & troglitas ab antris &  
cauernis appellant, ſimilis eſt, qui ſanè circa urbium  
muros uerſantur ac degūt: uerum hiſ maior eſt cory-  
dalus ipſe: habetq; in capite ueluti criſtam ſiue galeā  
ex pennis ſponte naturæ enatam, & circa uias reperi-  
tur hyemis præſertim tempore. Aliud. Talum  
ſuillum uſtum & tritum, totū ex aqua bibendū præ-  
be. Aliud. Thymi cacumina in aqua ad tertias de-  
coquito, & ad percolarum decoctum mel deſpuma-  
tum adijcito, bibendumq; præbeto. Aliud. Radi-  
ces uerbenacæ rectæ tenuiter conciſas in aqua ad ter-  
tias decoquito, ieiuniſq; per quinq; dies bibendum  
decoctum hoc præbeto: & colicis medeberis. Vtere,  
eſt enim experimento cognitum. Aliud. Hoc itē  
dem experimento conſtat, eoq; ipſe liberatus ſum.  
Mentam uiridē aliquandiu decoquito, decoctūq;  
bibendum ad dies tres exhibeto, & nunquam dolo-  
re adficietur. Cauendum autem ne olla in qua men-  
tam



ram decoquis, per tres dies terram contingat. Remedium uero hoc eiusmodi est, ut praesentem opem ferat: estque multo usu cognitum. Lauri etiam teneriora uirgulta arefacta comedenda praebe per tres dies, quibus mentae decoctum potant. Aliud mirabile. Marrubium in uino mulso decoctum bibendum praebe. Liberabiturque aeger a dolore, neque unquam postea incidet in affectionem. Aliud. Rhamni folia uiridia trita in pastillos informa, & exicca: drachmamque unam inde exhibe febre carentibus, cum uino: febrientibus uero cum hydromelite. Facit & ad uoluolos, omnemque dolorē flatuosum miro modo. Per ructus enim ac flatus exoluti a malo, sani fiunt. Aliud. Rhamni succum poculi mediocris mensura tantundemque passii cretici misceto: dumque in solium in balneo descendit, bibendum praebe: plurimumque tolerare id iubeto. In frigidae autem aquae solium nequaquam conscendat. Experimento cognitum est. Ex apparatus uero pharmacis hocce nobis familiare est, inquit Archigenes. Castorium & ammiū tenuissime trita duorum cochlearium mensura praebe ex aqua mulsa. Secundum uero locum hoc habet. Castorei drach. iiii. ammi, seminis apij, foeniculi, cuiusque drach. i. exhibe eo modo quo praecedēs. Aliquando autem pro apio panacis radicem adijciens praebeo, assequorque rite quod uolo. Praestabile est & hoc. Anisi, castorij, aequales partes misceto, indeque drach. i. ex uino mulso exhibeto. Aliud. Gladiolum unā cum radice exiccatam, contusam, & cribratam cum piperis granis undecim bibendā praebe, diuturno malo hoc medetur. Caeterū duo efficacissima ex multis omnino colli pharmacis usus approbatione praestantia, inquit Archigenes, unicuique comunicabo. Sagapeni, piperis, galbani, pyrethri, croci, spondylii, myrrhae, cuiusque drach. i. radices panacis drach. viii. excipe melle, & ad cerati consistutudinem redige. Vbi uero usus expetat, manipulū i. chamæleuces aut chamæpitrys in uino optimo, leui, anniculo heminarum quindecim mensura, usque ad tertias decoque. In hemina deinde decocti una, ex pharmaco ad fabae magnitudinem dissolue: idque semel primo mense bibendum praebe: secundo deinde mense bis: & tertio ter: atque hoc modo usque quo quinquies exhibueris, secundum menses auctione facta procedes: nisi alui ramenta inde succedant. ea enim leniter detrahare hoc pharmacum consuevit.

Alterum uero ad dissoluendas accessiones, ualde efficax existit. Myrrhae stactae, opopanacis, succi cyrenaidi, croci, pyrethri, galbani, sagapeni, cuiusque drach. viii. olei picini drach. i. mellis despumati quantum suffecerit, ut ad cerati spissitudinem redigatur. Ex hoc pharmaco drachma una, in tribus cyathis passii cretici diluti calidi liquefacta exhibetur. Neque uereor hęc etiā in accessionibus, nisi ex cruditate laboret aeger, praebe, atque etiam in interstitiis per aliquas dies ex his affectionē expugnare, ualdeque mihi ex sententia res procedit. Theriace porro Andromachi ex uiperis constans interualli tempore assidue accepta, prohibuit ne facile ab accessionis irritatione rursus impeterentur. Antidotus Zopyrios appellata, praesens auxilium in debilibus doloribus existit: facit ad colicos & alui inflationes, & incipientes aquae inter cutem suffusiones, maxime eam quae tympanites appellatur: ualet etiam ad iocineris affectiones:

prodestque his qui uenenum hauserunt. Myrrhae troglodyticae drach. v. spicae nardi drach. v. croci drach. iiii. floris iunci odorati drach. iiii. & dimidiā, cassiae drach. iiii. cinamomi drach. iiii. thuris dra. i. piperis albi sesquidrachmā, costi dra. i. Excipe melle despumato, ac nucis pōticae magnitudine praebe ex uini mulsi, aut passii ueteris cyathis duobus, aut ex aqua. Exhibeatur etiā in colica diuturna, habita tamen prius corporis cura, paululū ante horā cibi sumēdi, ad dies ex ordine quindecim: deinde ubi ab eius exhibitione per quinque dies quieueris, rursus exhibe ad dies decē: iterumque post multorum dierū interapedinē, parū praebe, donec ea amplius opus non habeat aeger. At qui propria sua efficacia corpus se melius repraesentaturū promittit, tū carne, tū colore, tum sensu, tū firmitate. Archigenes porro Zopyriū antidotū sic parare iubet. Spicae nardi drach. vi. floris iunci odorati dra. v. myrrhae dra. v. croci drach. iiii. cassiae dra. iiii. cinamomi drach. iiii. piperis drach. vi. costi obolum, thuris obolum. Caeterum praeter opinionē colicis conueniens antidotus est, quae pæonia appellatur. In ipsis enim uehementibus accessionum irritationibus ante somnū exhibita compescuit dolores, somnumque dulcem simul produxit, ac morbum dissoluit. Quidam etiam ipsam cum oleo insudentes scopum attigerūt. Descripta autem habetur in tertio decimo De theriacis Sermone huius uidelicet tractatus: quare ea ipsa censeo confidenter esse utendum.

Aliud ualde bonū oxyporium, cito penetrans, tū colicis, tum inflatis commodum. Cumini trientem, piperis albi, cacuminum thymi, foliorum rutae, nitri, singulorum unc. i. cōtere cū aceto, ac redige in pastillos pondere unius aut duarum drachmarum. Exhibe iuxta cuiusque uires cū aqua calida. Aliud. Sisonis, cassiae, foliorum lauri in umbra exiccatorū, singulorum drach. viii. petroselinī drachm. iiii. spumae nitri albæ drach. v. excipe melle, ac utere. Aut cochleare eius sicci ex aqua mulsa, in qua ruta decocta est, praebe. Aliud. Cumini syluestris cochlearia iiii. seminis coriandri, foeniculi, anisi, apij, seminis rutae, cuiusque cochleare i. piperis grana ix. uini sextarium i. Hęc tenuissime contrita uino permisce, & quotidie cyathum unum bibendum cū aquae cyathis tribus praebe. A potu autem eger deambulet, & probe concoctionem iuuabit. Poteris & ipsum uinum calefactū praebe. Aliud Asclepiadae, quod ab omni affectione penitus liberat. Corticis salicis uiridis drach. v. zingiberis drach. iiii. piperis drach. ii. palmas passas iiii. rutae uiridis ramulos v. aquae pluuialis sextarios iiii. Omnia simul ad tertias decoquito, atque ad horas siue dies tres pro qualibet uice cyathos duos exhibeto: & post triginta dierum spatium idem rursus facito: quo per anni spatium unius, triginta & sex portiones contingant. Hoc enim pharmacū potatū hoc modo totam affectionem aufert.

Aliud. Cornu cerui recens enati adhuc capillis obfusi, tenerimique ac uisti, cochlearia maioris modi iiii. piperis albi grana ix. myrrhae parum quid, ad commendandum odorem. Contere omnia, eisque cochlearum terrestrium magnarū unā cum testis suis tritarum, quantum uisum fuerit adijce: omniaque simul trita, & uino salerno mari mixto trium cyathorum mensura permixta, & ad mites prunas in uase fictili calefacta, ac sedulo, ne quid in fundo resideat,



agitata, præbe bibenda, ita ut nihil reliqui maneat: atq; id maxime tēpore accessionis, & ieiuno adhuc ægro fiat. Deinde uero cibū qui facile cōficitur præbe, atq; hoc ex ordine ad dies tres exhibe. His uero qui cochleas sumere nō possunt, reliqua præbe sicca cū uino. Porio ad colicos, quæ etiā inflatis, & difficulter cōcoquentibus, uoluulosisq; est accommodata.

Abſinthij, pulegij, piperis albi, cumini sylueſtris, baccarū lauri decorticatarū, omniū æquales partes exiccatas ac tritas, cochlearij mēſura præbe ex aqua calida. Vtereq; eo confidenter. Aliud colicū remediū per experiētiā receptū. Baccas lauri i. x. piperis grana vii. opopanaca magnitudine ciceris. cōſice in aquæ cyathos iiii. totūq; ſimul ſeruēfactū bibendū præbe, quieſcatq; inde æger, & perfectē ſanitati reſtituetur. Oportet autē, inquit Galenus, ad uiros maſculi, ad foeminas muliebris ſexus herinacei internā mēbranā accipere, exiccareq; ac contundere: eiusq; partes tres prædictis ammiſcere. Aliud, ad colicos præclarū. Colocynthida maximā nō ſolū ferro perforatā, ſed & ſemine electo euacuatā, ita tamē ut id quod inſtar tomēti in ea eſt relinquant, uino ueteri dulci quantum eius capere poteſt exple, eāq; per noctē integrā repone: mane uero uinum ipſum per panniculum diligenter exprime, ac percola, ut nihil ex medulla eius in ipſo potu reſiduum maneat: uinumq; ipſum calefactum bibendum præbe, quo facto æger deambulet & liberabitur.

De antidotis dolorem leuantibus, inſuſisq; colicis accommodatis, Galeni. Cap. xxxii.

Pharmacis dolorem leuantibus, medici uti conſueuerunt, ubi magnus adest dolor, aut uigilia, aut ne ob uiolentā tuſim lācinentur ægri, uelut in ſaguinis reiectione, & deſtillationibus à capite cōtingere ſolet. Verum in illis mediocria exhibere ſolemus: quales ſunt ex ſeminibus cōſtantes tuſi accommodatæ facultates, quæ & ipſe omnino aliquid ex ſopore inducētib; pharmacis admixtum habent: uerū modicū id eſt inter multa adeo ſemina, quæ & boni odoris ſunt, tenuiumq; partiū, & urinā cient: cumini dico, daucumq; & aniſum, & quæ his ſimilia exiſtūt. Cæterū quæ ad colicos apparātur pharmaca dolorē leuātia eiſdē quidē generis cū illis ſunt, uerū lōge maiori facultate prædita, atq; id ob magnitudinē in eis doloris. Opīū igitur fortiffimū eſt ſtupeſactiuū: ammiſcere autem ei oportet, ea quæ aut doloroſam affectionem cōcoquere poſſunt, aut humores ab ipſo factos diſcutere, aut ſecare & attenuare, aut ſecundum totā ipſorū ſubſtātiā permutare. Scopus enim nobis in his eſt, primū quidē ut ſenſum ſtupidū reddamus, deinde ut nihil in poſterū ex ſtupeſactiuo pharmaco relinquamus, quod mēbro nocumētum inferre poſſit. Amplius autem, ut quod maximū eſt, affectioni opitulemur. Ad hæc itaq; reſpectu habito, uidetur mihi debito modo & iuxta rationē propoſitū componere pharmacū: ex hyoſcyami quidem & opij permixtione, quicūq; altiorē ſomnū ac ſopore, ſenſitiuæq; facultatis ſtuporē inducere uelit: quo uero citius digeratur, omnēq; profunditatē affectorū corporū penetret, calefaciētia ammiſcere oportet, piper uidelicet ac euphorbium & pyrethrū, quæ nociuos humores diſcutere poſſunt, & repurgare uiſcoſos, ſecareq; craſſos, & ſtatus uentoſos attenuare, cōcoquereq; & euacuare. Neq; uero parum concocto

riæ facultatis frigidorum præſertim humorum in indica nardo exiſtit: quemadmodum autem ex aromaticis nardum cōiecit Philo, ſic & hi qui ei ſucceſſerunt, aliū aliud adiecerunt: florem iunci odorati, caſſiam, amomum, ac coſtum. Quemadmodum autem rursus crocum cōſicit Philo concoctorium pharmacum ad humorē & affectionē crudā: ita aliū myrrhāq; & caſtorij ammiſcuerunt: plurimiq; ex ipſis, neque id male, etiam familiaria nobis ſemina, apij uidelicet & cumini, aniſiq; ac dauci, & petroſelini, & quęcunq; eius generis exiſtunt, adiecerunt, quo uidelicet amarorum pharmacorum inſucunditatem lenirent, ad digeſtionemq; & urinæ expulſionē totum pharmacum impellerent atque inhortarentur. Si uero uaporum aut humorum craſſitudinem attenuare oporteat, & hoc ipſum per ea cōtingit. Prima itaq; ut apparet, ex omnibus uetuſtioribus præclara Philonis antidotus exiſtit, de qua ipſe hæc ſcribit.

Philonis antidotus. Philonis Tharſenſis medici magnum mortalibus inuentum ad multarum affectionum dolores, ſiue colum quis doleat ſemel datum, ſiue iecur, ſiue etiam urinæ difficultas, aut calcularis morbus, aut orthopnoea, aut tabes infeſtet. Sanat & conuulſionem & pleuritidem, ac ſanguinis reiectionem, aduerſusq; mortē ſe opponit, omnes uiſcerum dolores ſedat, tuſimq; & ſuffocationem, ſingultumq; & deſtillationem. Hanc etiam Andromachus in ſuos commentarios retulit, hoc modo de ea ſcribens: Colica antidotus admirabilis, qua uitor & ad uoluuloſos, & ad eos qui ſtercora per uomitū reſciunt in maximis doloribus: datur magnitudinē fabæ ex cyathis tribus aut quatuor aquæ frigidæ. Compoſitio autem hoc modo habet. Piperis albi drac. x. l. opij drac. xx. croci dra. x. ſeminis hyoſcyami albi drac. x. l. ſpicæ nardi, euphorbij, pyrethri, cuiusque drach. ii. excipe melle cocto, ac utere. Alia antidotus colica, Nicoſtrati Iſotheos appellata, duobus talentis empta, faciens ad ſtomachicos qui cibū continere non poſſunt, oculorū affectiones, & magnas uexationes, & dolores uulue, ex hydromelite in quo ruta ſit incocta. Croci ſeſquidrachmam, myrrhæ drac. ii. ſpicæ nardi drac. ii. coſti, piperis albi, piperis longi, galbani, cuiusq; drac. i. cinamomi, ſucci mandragoræ, caſtorij cuiusq; drach. ii. ſeminis dauici ſeſquidrachmam, aliū drach. iiii. & dimidiā eius cōſciunt, opobalfami drachm. iiii. ſagapeni drac. iiii. caſſiæ drachm. iiii. excipe melle deſpumato, & fabæ magnitudinē præbe.

Quæ colicis inſundantur, & per anum ſubdantur. Cap. xxxiii.

Huius generis ſunt etiam, quæ ſedi applicantur, quæq; ad leuandum dolorem per anum, tum ſubduntur, tum inſunduntur. Opium itaq; ex genere eorum eſt, quæ fortiter ſenſum ſtupidum reddunt, ac ſomnum ſoporiferum inducunt. Atq; hæc facit tum per ſe ſolū, tum cū pari caſtorio in ſapa aut oleo rutaceo imbutum, tomentoque exceptum, & ano inditum. Miſcere enim hæc pharmaca oportet quopiam uires ipſius opij mitigante, nocumētumq; quod inde mēbris inferitur impediēte, ampliusq; affectionem iuuante. Aliud, quod ſubditur colicis, ad dolorem leuandum. Caſtorij, croci, opij, myrrhæ, ſtyracis, æquales partes in collyria longa redige cum aqua, & utere. Inſuſum ad colicos mirabile. Cedriæ quadran



quadrantem, picis liquidæ semissem, castorij sesqui-  
unciam, opij sesquiunciam, piperis grana lx. unito-  
cum, digito medio, uel eo qui index appellatur, usq;  
ad primam flexuram uncto, & simul cū olei ruta-  
cei cyatho i. inquinato, ammixtaq; butyri unc. i. tere-  
binthinæ sesquiuncia, tepesactum per fistulam am-  
pliolem infundito: subsidet enim & dehiscit, ac ab  
unionē discedit. Aliud infusum, quod ante somnū  
acceptum, somnum conciliat, dolorem lenit, conco-  
ctionemq; probe iuuat: Succī absinthij drachm.  
iiii. opij drach. iiii. aloës drachm. xii. picis liquidæ  
unc. i. cedriæ unc. i. myrrhæ unciam unam, centa-  
uræ drach. iiii. castorij drach. x. costi drachm. vi. ma-  
stiches unc. i. foliorum rutæ unciam unam, styracis  
unc. i. mellis & terebinthinæ liquidæ quantum ad  
coactionem sufficit, quo ad mellis crassitudinem re-  
digatur. Vsu uero expetente ex pharmaco hoc drach-  
mas plus minus quatuor, iuxta ægri uires ac ætatē,  
in diplomate cum oleo cyprino, gleucino, anethi-  
no, telino, in quibus cuminum contusum coctū est  
dissolue, modicumque butyrum ammisce. Et ubi al-  
uum per clysterem stercoreis euctium prius eua-  
cuaueris, deindeq; laueris, & cibum exhibueris, ac  
caput ex anethino aut omphacino illeueris, ante  
somnum infunde. Vtere, experimento enim con-  
stat. Aliud, quod inferne infunditur, quo ego usus  
magnum nomē assequutus sum. Castorij drach. iiii.  
croci sextantem, allij tamen drach. ii. tantum habent,  
opij trientē, myrrhæ drachm. iiii. succi rutæ drach.  
ii. nitri rubri drach. ii. quidam uero pro nitro spicā  
nardi scribunt, excipe melle despumato cocto. Vsu  
uero tempore nudis auellanæ paruæ magnitudine,  
aut fabæ tantum accipe, ac in uini mēsurā unā dissol-  
ue, affusaq; olei rutacei mēsurā una, ut uidelicet duæ  
mensuræ sint in totum, permisce, ac praeloto ægro,  
ante somnum infunde. Cæterum præscriptas ad do-  
lorem leuandū antidotos & infusiones uitare opor-  
tet, ne in nimis assiduum usum conuertamus: sedant  
enim cōfestim dolores, causas uero intus reseruant:  
& aut paulo post animi deliquium inferunt, & mor-  
tem, aut diuturnas & indissolubiles affectiones red-  
dunt. Aliud infusum mirabile. Butyri quincun-  
cem, adipis anserini, adipis gallinacei, medullæ cerui-  
næ, terebinthinæ, cuiusq; sextantem, adipis ursini  
unc. i. cumini, foliorū rutæ, castorij, cuiusq; quadrā-  
tem, euphorbij recētis drach. vi. opobalsami septun-  
cē, nardi celticæ trientē, unguētī nardini lib. ii. olei  
rutacei sextarios iiii. Vtere hoc ipso in uehementi-  
bus doloribus: euacuatione tamen prius per clyste-  
rem facta, & post horæ spatium mensuram unam  
mediocris poculi tepesactam infunde, quiescereq; iu-  
be, ac aliquandiu pharmacum retinere: atque ita di-  
uinā eius uidebis facultatē. Aliud infusum, quod  
etiam causas euacuat, ac dolorem leuat, facit & ad  
diuturnam renū affectionem, & ad calculosos: eosq;  
qui inuoluntariē urinam eijciunt. Allij capita ma-  
gna tria, rutæ uiridis manipulares fasciculos duos,  
olei dulcis lib. iiii. Allia decorticato, & cū ruta ac o-  
leo donec torrefiat coquito, atq; id ad prunas fumū  
nō emittentes facito, ac deinde percolato, ad oleūq;  
butyri lib. i. affundito, picis liquidæ sextarij italici  
quartam partem, cedriæ tantundem: unito, ac in ui-  
treo uase recondito. Vsu autem expetente, sextantē  
inde, aut minus iuxta ægri uires accipito, oleoq; &

uino parī mensura acceptis, ita ut totū hemina una  
fiat, cōmisceto, tepesactumq; infundito. Aliud in-  
fusum. Olei cyprini lib. v. castorij sexuncem, anti-  
doti regiæ quæ etiam tetrastapharmacum appellatur,  
sexuncem, emplastri ex succis sexuncem, terebinthi-  
næ sexuncem, butyri sexuncem, baccas lauri centum  
& unam, baccas allij magnas quinquaginta unam,  
cumini lati unciam unam, rutæ manipulum unum.  
Baccas lauri & allia mundato: latum uero cuminū  
& rutam in pila tundito, & in hemina una uini uete-  
ris dulcis macerato. Sequenti uero die affuso oleo  
& butyro, in diplomate decoquito, percolato, ac re-  
liqua ammisceto, pariterq; castorium cum oleo tri-  
tum. Vritor. Vbi uero usus postulauerit, pharmaci  
huius sextantem accipito, & adipis anserini liquefa-  
cti itidem sextantem ammisceto, tepesactumq; inijci-  
to. Infusum colicum admirandum. Fœni græci  
ac lini seminis æquales partes, quantum satis uidebi-  
tur accipito, & in aqua præmacerata decoquito, atq;  
ubi succus inde prodierit, quantum ad usum satis ui-  
debitur percolato, ac in eo ipso quod percolaueris,  
lanas succidas eluito, expressisque lanis, ad aquam,  
salem & oleum moderate adijcito, simulque unito,  
ac tepesacta infundito.

*Cataplasma colicū, ex libris Seueri. Cap. xxxiiii.*  
arinæ cicerum nigrorum, seminis brassicæ, farinæ fœ-  
ni græci, singulorum æquales partes decoque cum  
melle; oleoq; cyprino, modico uino affuso. Est &  
alterum admirabile remedium, cuius efficaciam ex-  
perimētum ipsum approbavit. Accipit autem fœ-  
ni græci partes ii. baccarum lauri contusarum, ma-  
stiches chiæ, & terebinthinæ, singulorum partē unā.  
Coquitur cum uino & melle. Epithema colic-  
is, inflatis. Silphium plurimum cerato cyprino  
excipe, & impone. Ego uero, inquit Archigenes,  
etiā castorij paululū admisceo, efficaciusq; redditur  
ad stomachi præsertim inflationes. Aliud epithe-  
ma ad colicos, inflatos, coxendicum dolores, pleuri-  
ticos, ac stomachicos, & diuturnū uomitū cibitra-  
hit etiā, ac duritias emollit. Ceræ, picis, resinæ pi-  
nus, adipis taurini, baccarum lauri, singulorū quin-  
cuncem, ammoniaci thymiamatis trientem, galbani  
quadrantem, piperis sesquiunciam. Aliqui etiam cā-  
chryos quadrantem, ammiq; tantundem cōijciūt.

Aliud. Ceræ libras ii. celtici nardi, floris iunci  
odorati, cassiæ, cyperi, cuiusq; sextantem, colopho-  
niæ libras ii. terebinthinæ sesquilibram, thuris, py-  
rethri, cuiusq; sesquiunciam, euphorbij unciam i.  
costi drachm. xxx. unguenti irini quantum suffe-  
cerit. Arida in uino rigata ac exiccata cōtundito &  
cribrato, atq; ita liquefactis inspergito. Ad finē etiā  
opobalsami sextantē aut quadrantē ammisceto. Fa-  
cit quæcūq; etiā polyarchion: maxime tamē inflatis  
conducit. Vtendū quoq; ad colicos paulo mox sub-  
scripto polyarchio appellato, atq; eo quod ex baccis  
lauri constat, quod ad hydropicos describetur, & si  
qua his similia existunt. Propriè autē colicis conue-  
nit, inflamatisq; & inflatis, quod in epistolis Archi-  
genis refertur, ex seminibus constans. Ceræ drach-  
mas centum, terebinthinæ drach. l. ammoniaci thy-  
miamatis dra. l. opopanacis, iridis illyricæ, anisi, me-  
liloti, nitri, adipis taurini, fœni græci, seminis apij,  
cuiusq; drach. xxv. mellis sexuncem, acetī cyathos  
duos. Arida contundito & cribrato; ammoniacum



autem in aceto mulso per noctem unam maceratum reponito, postera die liquecibilia feruefacito, in mortarioq; cum pistillo tusa commisceto. Hoc epithema hoc modo purum citra aliarum rerum admixtionem impositum, cutem exasperat, eisque qui uitiosis humoribus amplius abundat, serpiginosum pruritum excitat: quare in his qui teneriores carnes habent, ex cerato rosaceo quantum tibi satis uidebitur pro curandi corporis ratione, ammisceto. Dropax etiam assidue super omnem uentris amplitudinem inijciatur, atq; etiam super dorsum. Componatur autem is ex pice & resina, modica cera, sulphure, bitumine, manna, nitro, adarce. Intenditur autem usus eius si calidiori & non pinguefactae cuticulae admo ueatur, atq; etiam inter exercitia incumbere sinatur. Aliquando etiam balneum suscipiatur, ex nitro assa to toto corpore large consperso. Huiusmodi enim dropacis usus uolentius adfectionem destruit, sicut & sinapismus & thapsiae usus multis q; antea exquisita digesta sunt usi, & per alium, si quidem adstricta fuerit, sunt euacuati, affectionem omnem excidit. Porro dropacum & sinapismorum apparatus in tertio Sermone sunt descripti. Aliud, Archigenis, uile quidem, uerum ob efficacem ipsius lenitatem in precio habendum. Picis liquidae libras II. ceræ sexuncem, sulphuris uiui, nitri, aluminis scissilis, cuiusq; quadrantem. Ad picem liquidam precoctam usquequo non amplius inquinet manus, ceram inijcito, qua liquefacta ab igne tollito, aridaq; tenuissime trita inspergito, unito, emollito, ac utitor. Flatus inferne educit, cutem uellendo iucunde afficit, ac per omnia colicis auxiliatur. Prodest etiam coxendiculi doloribus, & articulis refrigeratis, leniq; indurato. Epithema ex baccis lauri, ad colicos. Ceræ, colophoniae, picis siccae, spumae nitri albi, ammoniaci, cuiusq; dextantem, baccharum lauri decorticatarum sesquilibram, piperis sextantem & unciae dimidium, ammi, canchryos, iridis, cuiusque sesquiunciam, galbani sesquiunciam, unguenti irini librā unam. Quod si canchrys non adsit, pyrethri conice, & liquefacta cum siccis permisce. Hoc etiam approbat Oribasius. Polyarchion, quod in Alexandria praeparatur. Calsiae, amomi, rosarum, cyperi, cardamomi, spicae nardi, nardi celticae, folij, iridis, ananthes, compositionis hedychroi, mastiches, croci, meliloti, succi absinthij, ammoniaci, thymiamatis, aloes, bdellij, myrrhae, cuiusque unc. I. xylocinamomi, piperis communis, helenij, styracis, cypheos, thuris, cuiusq; sequiunciam. Succos cum aridis committito, ammiscetoq; xylobalsami scrup. XII. floris iunci odorati scrupulos XII. terebinthinae sexuncem, unguenti nardini bessem, rosacei lib. I. hederæ unc. XVI. opobalsami sextantem. Succulenta uino diluta terito. Polyarchion, quod dialemma, id est intermissio, appellatur: quod ipsum & in Alexandria praeparatur. Castorij unc. I. piperis longi sesquiunciam, myrrhae, opobalsami, hedychroi, foliorum malabathri, ealsie, radice panacis, spicae nardi, cuiusq; quadrantem, costi sextantem, amomi sextantem, cinamomi sesquiunciam, aut pro eo calsiae quadrantem, floris iunci odorati trientem, croci sextantem, cyperi, cardamomi, iridis, aristolochiae longae, aristolochiae rotundae cuiusq; sextantem, pyrethri trientem, ammoniaci thymiamatis quadrantem, aloes quadrantem, ceræ lib. IIII. terebinthinae lib. IIII, resinae trientem, unguenti nardini lib. III. quis

dam etiam styracis sextantem addunt, uini uero quantum omnino sufficit. Polyarchion multo experimento cognitum, quo confidenter ad omnes diuturnos frigidiores, praesertim circa uiscera morbos utaris, ego sane eius usu semper clarus euasi. Styracis pinguis dextantem, foliorum malabathri sextantem unciamque dimidiam, malorum cotoneorum repurgatorum uncias XV. masuaphij uncias duas & dimidiam, spicae nardi, croci, cuiusq; sextantem, dimidiamq; unciam, micarum purarum dextantem, cypheos dextantem, ananthes quincuncem, carpobalsami sequiunciam, comae absinthij unc. II. & dimidiam, mastiches unc. II. & dimidiam, chareophylli unc. I. scrupulos VI. ammoniaci thymiamatis unc. XX. colophoniae unc. XVI. opobalsami unc. XII. & dimidiam, olei gleucini deuncem, nardini dextantem, melini unc. XX. propolis dextantem, rosacei sextantem unciamq; dimidiam, mellis cochlearia uiginti, terebinthinae chiae unc. XX. ceræ unc. XV. uini spathite quantum sufficit ad reliqua cum eo conterenda, & ad rigandas miccas. Arida quidem omnia contundito & cribrato, mala uero cotonea concisa cum uino spathite coquito, ac per se terito, deinde ammoniacum & mastichem cum uino conterito. Styracem uero cum opobalsamo in altero mortario dissoluito, atq; omnia trita ac dissoluta simul unito, liquefactisque quae liquefieri possunt, & ab igne ablati arida infarcito, ac donec refrigerentur agitato: deindeq; ad ea quae in mortario trita sunt adijcito, ac unito, adiecto etiam simul melle, post uero emollito ac optime subacto, tanquam ualde probato utitor. Aliud epithema praeter opinionem efficax ad omnes praecordiorum uetustissimas etiam affectiones, praesertim in stomacho ac uentre. Quibusdam etiam quibus aqua inter cutem iam suffundi incepit, profuit. Duritias enim in stomacho unice dissoluit, supra hoc quod uisceribus robur & firmitatem addit. Compositio hoc modo habet. Resinae pinus libras XX. ceræ libras quinq;, terebinthinae deunces duas, olei liscini uncias XVI. gleucini uncias XVI. thuris quincuncem, ladani quadrantem, ammoniaci thymiamatis, nardi celticae, succi absinthij, mastiches, bdellij, calsiae, cuiusque quincuncem, cardamomi, floris iunci odorati, iridis, baustiorum, singulorum trientem, carpobalsami quadrantem, chareophylli quadrantem, herbe sabine quadrantem, stactae albae quadrantem, piperis sextantem, suffimentorum subscriptorum libras IIII. ananthesrij quantum sufficit. Suffimentorum uero quae ad huius epithematis compositionem conijciuntur, apparatus hic est. Liliorum alborum depuratorum lib. II. styracis pinguis libras duas & dimidiam, folij lib. I. careophylli trientem, costi trientem, spicae nardi trientem, mastiches quincuncem, amomi sexuncem, onychum aromaticorum ustorum & extinctorum, opobalsami, singulorum bessem, carpobalsami sexuncem. Apparato ac redigito in pastillos, eisque ad praescriptam compositionem utaris.

Quomodo aluum fluxione laborantem curare oporteat: ex libris Philumeni. Cap. XXXV.

Aluus tum in febribus, tum citra febres, fluxione laborat, maiori uero difficultate eorum, qui febricitant, cura perficitur, coniecturaq; exquisitior opus habet. In principio enim aliena à natura salubriter euacuare consuevit, ipsa uidelicet natura undiquaque ad superfluum



perfluum & incommodum reijciendum cogēte, quē admodum in febrilibus morbis frequenter fieri uidemus. Conuenit itaque rebus sic stantibus, aut usquequo naturā omnem curam suam impenderit expectare, aut ipsius etiam motus adiuuare. Etenim obluētari & excretionis cohibitionem moliri, maiorem morbum facit: siquidem quæ cohibentur sursum perlata dolores capitis, aut phrenitidas, aut lethargos, aut parotidas inferunt planē perniciosos. Quare in principio ea quæ in corporis commoditatem utiliter excernuntur, minime inhibere oportet. Postquam uero iam diutius perseuerauerint fluxiones, non solum superflua euacuantes, uerum habitū ueluti colliquantes, uiresq; cōsumentes: tunc sanē resistere eis oportet, tū per ea quæ per os sumuntur, tū quæ per anum infunduntur, atq; ea quæ forinsecus imponuntur. Si itaq; biliosa pura recremēta prodierint, in magis salubria permutare ipsa oportet, non tamen per cohibitionē eos curare. Biliosum enim tū in uentre, tum in ieiuno intestino aggregatum, atq; post coacervationem retentum maximopere lædet: nam & stomachum subuertit, & uisceribus inflammationes infert, & sicim accēdit, & febres instaurat, omnesq; prædictas affectiones in capite efficit, atq; in totum grauiorem affectionem reddit. Lac igitur in tali incommoditate bubulum aut caprinum tepidum, recens, mulctum ac potatum auxiliatur, aut ad ignē decoctum, assidueq; agitatū, donec ad tertias sit reductū: quod ipsum & per fluuiales filices, ferriq; laminas igni cādefactas ac in lacte extinctas fieri potest. Cæterū in decoquendo superstantē concretionē siue spumam mystro aut pinna auferre oportet. Hoc enim nullum compendiosius remedium ad fluxiones biliosas reperire possis. Quandoquidem autem febricitantibus lac ipsum in nidorē aut etiā acorē conuerti consueuit, maiusq; nocumentū quā cōmoditātē inferret: tūc sanē in præsens ipsum exhibere uitabimus: aquæ uero quarta parte ad lac ipsum affusa, decoctionē faciemus, donec dimidiū totius cōsumatur, atq; hoc modo exhibebimus. Et hæc quidem ad biliosas fluxiones sufficiant: ad alias uero ubi sufficiens iam euacuatio sit facta, fluxioq; ipsa adhuc perseueret, irrigationes adhibeantur ex oleo omphacino, aut rosaceo, aut melino cum uino: efficacius autē his myrteum est, si uehementiori indigeat adstrictione, tertia aut quarta uini parte ei admixta. Quod si robustiora corpora cōtingant, gallæ, malicoriū, cupressi pilulæ, in ipsa irrigatione incoquantur. Cum num etiā tritum lanæ cōuolutæ infarciatur, & apij similiter semen pari pondere: urinam enim iritat, fluxionesq; ad intestina eō diuertit. Cæterum & sedes ipsa ex decocto quopiam prædictorum adstringentium foueatur. Perseuerante autem adhuc fluxione, etiam cataplasmatibus ex palmis & acacia & alumine erit utendum: ceratis itē ex oleo myrteo apparatus. Conueniunt quoque emplastra ex eadem materia apparatus. Parabile uero & efficax hocce est. Mora præ immaturitate adhuc acerbiora, & albicantia, septeem accipe, probeq; cōtere: deinde ceratum ex oleo omphacino apparatus, ita ut ceræ in eo uncia sit, olei uero sextans, adijce, uni, & utere. Idem faciunt cruda mora exiccata cum ouo trita ac illita. Porro in ueterata iam affectioni epithema ex œnanthe conuenit, & ex micis emplastrum in stomachicis descri-

ptum, quod spumam argenti & cerusam admixtam habet: item reliqua quæ in sermone de coeliaca affectione describuntur. In potu uero accepta uentris fluxus, post sufficiētem inutilium euacuationē, sanant: capilli ueneris decoctum, paliuri folia, uinacei uuæ triti, spica nardi, spinæ albæ radix, quin & coeliacis & stomachicis eadem opitulantur. Mora etiam immatura & adhuc acerba ad solem pluribus diebus desiccata, deinde trita & reposita, usq; expetente bibita, magnum pharmacum alui restrictiuum fiunt, ut ad diurnas etiam coeliacas affectiones commode exhibeantur, aliasq; omnes quæ fluidæ existunt, atq; etiam dysenterias. Contunduntur quoq; & obsonijs ammiscuntur, quemadmodum rhus culinariis consueuit. Magis tamen aluum cohibent rubi mora immatura & acerba eodē modo exiccata, & in potu exhibita. Illitione autem optima ad fluidam aluum eiusmodi utaris. Acaciæ, mastiches, œnāthes, cuiusq; æquales partes accipe, ac unumquodq; per se cōtere, deindeq; permisce, ac sicca adserua. Necessitate uero exigente ouo subacta aluo illinito, fasciculumq; lanæ purpureæ imposito & obligato. Malo uero adhuc perdurante, etiam dorsum inde illinito.

*Cura eorum qui ex debilitate alui fluxione laborant: ex libris Galeni. Cap. xxxvi.*

Vnumquodq; membrum propria actione perfungitur, quum temperamentum suum iuxta naturam adseruat. Seruabitur autem temperamentum, si refrigeremus, ubi ad caliditatem fuerit diuersum: contraq; calefaciamus refrigeratum: humectemus uero exiccatum, & rursus desicemus humectum. Iuxtaq; eandem proportionem etiam tractemus eos, qui ex harum intemperierum complexu & coningatione afficiuntur. Oportet enim semper excessui contrarium opponere, usquequo ad moderationē, & in id quod iuxta naturam habet, membrum ipsum reducatur. Ratione igitur edoctus sum etiam octo differentias curationis imbecilli uentris esse. Calidæ intemperiei cura. Vidisti namq; & tu ipse aliquos quidem per diem unam, quosdam autem ampliori spatio, frigidæ potu curatos: quorum aliquibus nō solum recentem frigidam fontanam exhibui, sed etiam coctā & postea niue adobrutam & refrigeratam. Edulia etiam hoc modo refrigerata eos accipere, uidisti me concedentem: maxime si à plurima caliditate uexarentur. Dedi autem & lactis spumam similiter refrigeratam, & frigida iuxta ipsorum uires poma eodē modo refrigerata: pisanam quoq; citra salis aut alterius rei admixtionem probe coctā, aliāq; eius generis infinita: unicum scopum refrigerandi propositū habens. Prohibui autē ne absinthium aut aliqua adstringentia contringerent. Frigidæ intemperiei cura. Alios autem ex frigida intemperie laborantes, similiter ab adstringentium usu prohibui, omnibus uero modis calefecit: uino ueteri facultatis plurimū calidæ exhibito: itemq; cibis calefacientibus cum pipere. Humidæ intemperiei curatio. Quibusdam uero humidam uentris intemperiem habentibus, medicationis scopū in exiccando feci, dedi q; eis edulia ex natura sicca: carnes probe assatas, & paucū potum: omniumq; adstringentiū usus his cōuenientissimus existit: in quibus enim humiditas multa ac ueluti mador circa affectum membrum adest, citra tamē humorum uitiationem, ita ut quantitatis tantum ex-



cessu adfligant, ac ueluti perstillantem ipsum uentrē reddant: in his commodissimus existit ciborum ac potuum, itemque pharmacorum adstringentium usus: exoluto nimirum ac languido tunc facto ægroto membro. Cura uentris ob siccitatē immodice fluidi. Alium autem siccissimum iam factum, ut tabidis simillimam figuram haberet, in cōtrarium omnino habitum deductum curauit. Huic quum in principio exigua intemperie uexaretur, à siccitate uidelicet humectatione indigente, medici qui eum curandum suscepserant, absinthium bibendum dederunt: malaque cotonea, ac similia in cibo, extrinsecusque similiter adstringentia adhibuerunt, atque hoc modo totum aridum hominem reddiderunt. Hunc ipsum nos curauimus uniuerso corpore eius omnibus modis humectato. Qualis autem est senectus in sanis, talis est sicca intemperies in ægris: ut etiam incurabilis existat, ubi perfecte compleatur. Perfectum autem complementum in hoc est, si solida substantia similarium corporum aridior fiat. Est autem & altera quædam siccitas eorum corporum, quæ ex substantia humore compacta constant, uelut est caro & pinguedo. Alia etiā tertia siccitas est, quum humiditas ex qua membra connutriuntur est deperdita. Circumsunditur autem ea ipsa humiditas circa omnes animantis partes, instar roris in ipsis dispersa, quam impossibile est ipsis membris apponere citra nutrimentum: quare difficilima omnium huius affectionis cura existit. Alia autem siccitas est, quæ circa paruas arterias ac uenas cuique membro proprias consistit: hæc ipsa ob sanguinis penuriam contingit. Omnes uero has siccitatis species extreme offendunt austerorum ciborum ac potuum pharmacorumque exhibitiones. Consumunt enim etiam si quid in ipsis innati ac insiti humoris relinquatur, partim quidem exhaurientes, partim uero exprimentes per meatus in interiorē latitudinem alui, partim etiam ad alia membra depellentes. Curare igitur has siccitates conuenit, tum conclusos meatus laxando, tum quod ad circumiacentes partes depulsum est attrahendo, per humectantemque cibum unumquodque simile membrum propria humiditate replendo: quemadmodum nos arefactum penitus à medicis hominem curauimus. Balneum itaque temperatissimum his conuenit: ita ut æger aliquandiu in temperata aqua moretur. Præstat autem prope exteriores balnei fores calidè solium locari: neque enim aëre omnino ad ipsos indigemus. Oportet etiam gestando ipsum in balneum inducere, atque inde educere. Deinde ex oleo antequam induatur inungere. A balneo uero statim lac asininum recens mulctum exhibendum, asina in domum in qua decumbit æger deducta: paucissimo enim tempore in ambiente aëre lac ipsum morari oportet. Parum etiam mellis optimi tepidi lacti ammiscendum, atque ita usque ad secundum balneum quiescendum. Postea uero mediocriter & accurate fricatum, secundo lauabimus diligenter confectione, tum ex ructibus, tum ex uentris tumore facta, an exhibitus cibus sit rite confectus: modicum uero tempus à primo balneo usque ad secundum intercedat, horarum IIII. aut V. puto, maxime si tertio etiā ipsum lauare uelis: id si non uelis, non refert etiam plurimum. Lauabis autem tertio, si aduetus sit balneis plurimis uti: & hoc sanè minime negligamus, quo à singulis balneis priusquam induatur, oleo eū

inungamus. Cæterum si lactis usu delectetur, etiam à secundo balneo ipsum propinabimus: si uero non, prisanam probe decoctam, aut halicam instar prisanæ decoctam dabimus, indeque statim rursus quiescere iussim, postea ad tertium balneum ducemus: aut contra, ad coenam, si lauare non uelit. Panis ei præparetur clibanites, purus, recēs, probe assatus, fermentum & salem mediocriter admixta habens. Pro obsonio sit piscium quispiā petrosi aquis degentium, aut asellus ex iure albo. Atqui & alæ & testiculi gallinaceorum lacte nutritorum conueniunt: perdices item ac auiculæ montanæ ac molles carnes habentes. Verum quæ in palustribus ac fluminibus degunt uitanda: omniaque duras habentia carnes, & graueolentia, pinguiasque & fibris referta: & ut summatim dicā, caput cibi sit ut bene nutriat, & facile concoquatur, minimeque uiscosus sit, neque superfluitatibus abundet. In potu sumat uinum album colore, tenuemque substantiam, & modice omnino adstringens, purumque & parum aquæ ferens, quo nomine accipi uolo, id quod quum temperatur modicā omnino aquæ admixtionē perferre potest. Scopus autē quantitatis potus in hoc sit propositus, ut nunquam uentriculo innatet, neque fluctuationis aliquæ sensus faciat. In cibis uero spectetur, ut quantum possibile sit, uentrem non grauent, celeriter concoquantur, & inflationem non pariant. Atque hoc sanè modo maxima corporis siccitas curatur. Quum uero mediocris siccitas existit, utpote quum uires non extreme sunt collapsæ, pleniorē diætā sufficere expedit. Proponatur autē siccitas similis quidem prædictæ, cum qua tamen frigiditas sit coniugata: in tantum igitur prædictis ex calefacientium sylua miscebimus, quantum membra fuerint refrigerata. Ponatur autem primum mediocriter ipsa esse refrigerata: apponemus itaque paulo ante dictis, in lactis quidē usu plus mellis: in uini uero usu, idē quidē genere dabimus, minus autē priore aquosum, & plurimum annorum. Cæterum & edulia omnia calidiora exhibenda, non solum ex naturali temperata, sed à recenti etiā qualitate. Ex unguento etiā nardino assidue uentrem inungemus, ut nunquam aridus fiat: si uero nardinum non adsit, mastichino erit utendum. Sed & ipsam mastichen cum nardino unguento terere licebit, lanamque purpureā ex eis imbutā uentri adhibere. Si uero frigiditas multa intemperiei sicce copuletur, ut coget ferè ad uberius calefaciendum, primum quidē affectionē grauissimā esse scito, & quæ difficulter corrigi potest, multaque diligentia opus habet. Vbi uero ipsdē usi fuerimus, quæ ad mediocrē frigiditatē sunt descripta, speramus sanè quanquā longiori temporis tractu nos affectionē sanatos: ita tamē ut à uehementer calefacientibus abstinemus. Demus autē amplius quiddā ex melle depumato unā cum lacte, atque etiā ipsum per se ampliori modo: itemque decoctum ac in pastillos redactum. Vinum uero uetustius eis eligendum. Optimum autē pharmacum in omnibus his quo frequenter picatores utuntur, existit. Eo itaque uniuersum uentrē illinire oportet, atque mox prius quam refrigescat auellere: uerum hoc non sæpe in die, quorundam more, facere oportet. Discutit enim hoc modo, non uero bono sanguine membrum ipsum replet: nos autem non discutiendi gratia, sed ob sanguinem bonum ex uicinis partibus attrahendum, eius usum approbamus. Auxiliatur etiā omnibus his puellus carnosus dormientibus



mientibus acclīnatus, ita ut superiorem uentrem semper contingat. Quod si ex ordine multae siccitati calidas non ualde multa misceatur: in hac primam uictus rationē seruabimus: ita ut mel prorsum non gustent: uinum uero minime uetus accipiant, quod sit album & tenue, & ætare annum nō excedat. Edulia etiā tepida exhibebimus quæ lactosa, hoc est lactei reporis appellantur, si hyems adsit: in æstate uero, uelut aquæ fontanæ cōueniunt edulia, quæ nō summè frigidæ sunt. Ventrē quoq; omphacino aut melino oleo illinemus. Si uero maior caliditas adsit, etiā dilutiorē uini temperaturā faciemus, frigidumq; dabimus, quemadmodum fontana aqua in medio uere esse solet. Nosse tamen operæ pretium est febrilium similem hanc affectionem esse, atq; si quis contentio sius eos refrigeret, periculo non uacare.

De coeliaca affectione, Archigenis. Cap. xxxvii.

Non omnis uentris fluxus coeliaca affectio proprie appellatur: neq; enim si cibi crudi & incocti infernè prodeunt, neque si corrupti ac in peregrinum habitum mutati sunt, coeliaca affectio uocatur: uerū tunc solum quum leuia & humecta excrementa egeruntur: uentre præ imbecillitate ea digerere nequeūte. Sequitur autem ipsos assidua egestio, aliquando foetida cum animi deliquij sensu, aliquando uero etiam sanguis flauus ac tenuis unā cum his quæ egeruntur destillat: & ob eam causam cibū auersantur, decoloresq; & uehementer graciles fiūt, corrugata insuper eorum uniuersa cute: & uenæ sanè quæ in uentrem deferuntur, liuescunt: & ad magnam omnino desperationem res deuenit, si morbus diutius duret, ægris ad cōuenientem diætā pigrescēdibus. Si itaq; morbus autumnō incipiens ad hyemem usq; se extēdat, difficilīus omnino curatur. Causæ autem affectionis sunt, assidua cibi corruptiones, & peregrinorū eduliorum ingestiones: amplius autem si frigiditas aut uehemens ardor insistat, similiter etiam plagæ uentrem lædunt: & in morbis quoq; longis, uenter male affectus adfectioni huic obnoxius fit. A medicinæ quoq; purgantis potione quidā coeliacam affectionem inciderunt. Nosse tamen oportet, quod aliquando quidem per circuitus malum hoc adfligit, tēporibus quibusdam aluo restitante, quibusdam uero ordinate per certas horas fluente: aliquando uero incessanter apparet. Quin & hoc nosse oportet, quod sæpe non solum permanet appetitus, uerum etiam amplius augetur: & ob id corruptionibus aceruatim perq; uices factis, omnia mala augetur. Recente igitur morbo, diligenter inuestigandæ sunt ipsius causæ, ut ab eis maxime nos adseruamus. siue igitur corruptiones præcesserint, cauendum ne amplius fiant, simulq; uitiosi humores ex eis generati euacuandi: siue peregrinorum eduliorum ingestio causa existat, ea ipsa auferre oportet: siue labor, aut fatigatio, aut aliud quippiam ex prædictis, ab eis similiter abstinendum est, ægriq; in quiete adseruandi, atq; si ferre queant, in inedia: aut certe omnino modico cibi usu. Aliquando autem etiam larga portione utendum, ægerq; ad reuomendum cogendus, maxime si humores in uētre collectos perceptemus. Deinde attente exquisitæ diætæ insistendum, donec affectio in totum tollatur. Consistit autem exquisita diætā in electione qualitatis ciborum. Quod si tamen in principio difficilis appareat morbus, etiam

reliquis præsidij utendum. Primum igitur media inspicienda sunt, atq; si inflammatio, aut similis inflammationi dispositio circa uentrem reperiatur, cataplasmaris utēdum est, quæ ex professo inflammatio nem soluunt, ac fluxus retrahunt: qua in re, palmæ cōmode semini lini ammiscuntur. Cæterum cataplasmata ipsa minime calida apponere oportet: sed tepida saltem: atq; si intendere eorum uim uelis, acaciæ quippiam & hypocisthidis, aut malorum cotoneorum, aut aluminis recte ammiscueris. Magnifice autem profunt lentiscus & rubus simul cocta: acetum quoq; mulsum apposite in cataplasmatum cocturā assumitur. Summe uero commodam utriq; affectioni nouimus loliaceam farinam simul cum eis incoctam. Inflatione autem plurima infestante, cum inū aceto mulso inspergimus, rutamq; & anethum. Manifestum est autem quod ad cataplasmatum retentionem, quo contentius inhereant, etiam rosaceum adhibemus, ac parum uini: ampliusq; lentiscinum, aut oenanthinum, aut myrsininum. Oportet autem lana excepta ipsa imponere. Cæterum optimum ad ipsos tale cataplasma existit: Malis maxime cotoneis & palmis, absinthijq; coma in uino decoctis, uinum ipsum percolatur, ac sapæ creticæ tertia pars ei affunditur: deinde simul calefactis polenta tenuis inspergitur, & absq; oleo decoquitur. Oleum uero quo uenter illinitur sit melinum. Post cataplasmata conuenient cerata ex myrsinino aut lentiscino oleo apparatus: quæ tamen ex adstringentibus quædam habeant admixta, ex acacia dico, & quæ eius generis existunt. Aprissimum etiam his ceratum est ex oleo myrsinino apparatus, quod mora immatura ac acerba trita, parumq; sanguinariæ habet admixta. Porro ubi diuturnum fuerit malum, etiam ad mala gmata transeundum est: summopere uero concinnū eis uidetur, quod ex seminibus constat, & ad colicos est præscriptum: itemq; quod ex lauri baccis, quod ad aquam inter cutem describetur. Postea etiā adhibenda ea quæ uehementer rubefaciunt cutem. Quod si adfectio adhuc intendatur, etiam dropaces adhibēdi medicamētaria uel præcellentes, bitumenq; habentes & adarcen: post dropacem uero, morsum balneo secundum caliditatem mordaciore curare oportet: duabusq; post dropacis amotionem horis sinapismi adhibendi ex sinapi & caricis: ita ut modico tempore impositos sinamus, oleoq; inde ad locū circumfuso, ad balneum ducamus. Atq; id semel facere non sufficit, sed bis ac ter: neq; enim hoc ipso aliud efficacius remedium in prædicta corporis constitutione apparari potest: & ob hoc non multo tempore inhærere id oportet, ne loco nimium exusto, secunda & tertia huius præsidij admotio prohibeatur. Mirabiliter etiam uomitus efficaces sunt, tum à coena, tum ieiunio facti, nimirum quæ corrupta sunt euacuantes, & quæ ad intestina dilapsa sunt attrahentes & conuerrentes, ac proprias uentris actiones reuocantes. Si uero liceret ab his ad eos qui à raphanis fiunt transire, maiore compendio affectio ipsa expugnaretur. Quidam etiam ueratri albi purgatione usi sunt: & si subiectæ uires eius auxiliij sint capaces, præ omnib. huius usus eligatur. Ego uero ad coeliacos prius quàm uires extreme deficient, purgatione humori conuenienti utor. Aliquando autem medicati quidam &



acres, aut etiam serosi humores tuniculis uentris aut magis intestinorum infarti aut imbibiti rodunt & iritant, atq; ex omni corpore humores ad locos circa uentrē & intestina aduocant, diuturnarūq; fluxionū causa fiunt. Cæterum ex egestis recrementis & ex cōsequentibus accessionibus, affligentis humoris speciē coniectare oportet, atq; ita cōuenientē exhibere purgationē. Præstabilius tamen est pícræ ex aloë cōpositioni scammoniae scrupulum i. aut amplius, si uires tolerant, ammiscere, & cum aqua mulsā præbere. Quod si ex atra bile sit humor infestans, epithymū adijcere oportet, & post affligentis humoris euacuationem, eis uti, quæ affectis mēbris firmitatē addere possunt: cuius generis sunt ex malo punico eclegmata, ad stomachi subuersiones descripta. Illud etiā notatu dignū, quod aliquib. fluxiones ex adstringētium usu oboriuntur: uētre nimirū ab ipsis lēso propter imbecillitatem aut mollitiē sensus. Vtūtur autē, inquit Archigenes, ad alui fluxiones hiera mea, drac. ii. ex ea exhibitis, ad eorū quæ in uentre ac intestinis insident deterfionem, ut nullū enim aliud hæc ipsa quā rectissime emēdat & corrigit, deinde theriaca utor. Vt etiam, inquit, zopyrio mea ad colicos descripta, ad fabæ magnitudinē ex ea præbens cū duobus cyathis passis ueteris, aut acetī mullī boni paulo ante horā cibi sumendi, ad dies ex ordine xv. deinde ubi ab eius exhibitione per v. dies quieuerō, rursus exhibeo ad dies x. atq; hoc tādū facio donec nō amplius opus habeat æger. Præstat etiā exhibere quæ ex duob. piperis generibus constat cōpositiōnē. Omnino igitur simplicia pharmaca & facile digestibiles cibos exhibere oportet debili existente aluo. Si uero febricitent etiā, eo magis adstringētium sylua erit uitāda. Quod si tamē prædicta remedia circa affectionis solutionem nihil efficiāt, ustio adsumatur. Perurere autē superiorē uentrē oportet, interualis duorum digitorū mēsu aut ampliorib. etiā factis, ulcerationesq; seruare ad multum tempus ad fluxionū in uētre transitū ac deriuationē. Licet autē & per pharmacū crustas infligere, si quis ignis admotionē formidet. Postremū quidem igitur locū inter prædicta remedia ustio habet, propter nimiam seueritatē: si quis tamen uirili animo præditus sit, prius quā cōcidant uires, post præsidiorū firmitatem addentiū usum, quodam modō ustione uti potest, quæ sola se affectionis difficultati opponere consuevit. Atq; huiusmodi quidē est quæ forinsecus cœliacis adhibetur cura. Operæ precium est autē & per adstringentes potius auxiliū ferre, ubi humiditas imbecillitatis causa existat ac fluxionū. Plantaginis itaq; semen siccū tritum ac potatū præclare facit, tum per se, tum alijs etiam admixtis. Quidam etiam gallinarum uentriculis utūtur exiccatis ac tritis potui inspersis. Eandē efficaciam & struthocamelorū uentriculi habere creduntur. Proderit & lapathi semen tritum, maxime uero oxylapathi. Cornu item cerui tenerimū ustū cum modica galla præbe bibendum: aut nucum iuglandium corticem quo tinctores utūtur, siccum tritum cochlearij mensura ex aqua præbe: aut quercinam glandē contusam ac cribratā cochlearij mēsurā instar farinæ uino austero insperge, ac exhibe: aut cæcri marini uel fluuiatilis testam ustā cochlearij mēsurā præbe cum aqua: aut thuris granū fabæ magnitudine in uini nigri cyathō uno dissolutum, sanguina-

riæ succo pari mensura ammixto præbe, aut gūmis albi uermiculati unciam unam tritam ex uini nigri cyathis tribus præbe: aut uuarum passerum uinaeos, siue etiam uuarum torrefactos: exhibe cum polenta aut canis stercus siccum, cum quodam odorato: aut plantaginē siccā contusā & cribratā dato: aut bituminis quātū satis esse existimas, deglutendum præbeto. Bonum est etiam corticis quercinæ glandis decoctum: itemq; pelliculæ decoctum, quæ sub cortice quercus reperitur. Castanę corticis decoctum, aspalathi decoctum, radicis pæoniæ decoctum, atque ipsa etiam radix sicca, trita, potui inspersa. Corticis loti arboris decoctum. Calicum item papaueris torrefactorum drachma una ante somnum cum uino diluto potata: quin & semen capitum papaueris tritum exhibitum egregie auxiliatur. Mirabiliter autē acerba & immatura mora profunt sicca trita in potu exhibita, quemadmodum de alui fluxione est prædictum, eodem modo & rubi mora immatura & acerba exhibenda. Utendum & simplicioribus ad dysentericos descriptis medicamentis, maxime his quæ ex pomis sunt adparata. Commoda sunt quoq; ea quæ urinam cient, fluxionem sæpe transferentia: uelut est, apium, fœniculum, anisum, adiathum, acorus, damasonij foliorum dra. i. & quæ his potestate assimilantur. Ex cōpositis prodest pastillus Thrasandri, & qui ex seminibus constat, ad dysentericos scripti. Pastillus item ex spina, & ex electro, ad sanguinem per sputū reiicientes descripti. Omnium uero maxime antidotus theriace ex uiperis cōstans prodest: multoq; adhuc magis quæ Esdre inscribitur, efficaciter enim auxiliatur. Mirifice quoq; cœliacis cōducit antidotus desposynos appellata: cuius cōpositiō hæc est. Spicę nardi, cinamomi, piperis, costi, hyoscyami, croci, seminis papaueris, opij, omnia æquali pondere accipito, cōtundito & cribrato, ac cū melle unito. Datur ex ea duorū scrupulorū pondus ex uino. Orisafij, ad cœliacos. Baccarū myrti nigrarum cochleare unū & dimidiū, rosarum siccarū, œnanthes, singulorum cochleariū dimidium, palmarū carne sufficienti excipe, & pastillos informa, ac exhibe drac. i. cū aqua, aut uino dilutus temperato his qui febris carēt. Aliud, ad cœliacos. Lauri uirgulta iii. piperis grana xxxiii. cumini grana quinquaginta unū, contere, ac præbe febre carentibus cum uino, febricitantibus cum aqua: pro una autem uice hæc in potu sumuntur. Cæterum simplicia & antidoti oportune ante cibum exhibentur: pastillus autē dolorem leuans, ante somnum. Magmate uero cōcoctorio in alui fluore per omnia huiusmodi utaris. Bdellij, ammoniaci thymiamatis, cāchryos, cuiusq; sesquiunciam, opopanax drach. vi. styracis drac. vi. myrrhæ sesquidrachmā, piperis grana centum & triginta, galbanī drach. vii. terebinthinæ drach. vii. ceræ drach. tredecim & dimidiā, adipis suilli drach. xvi. Siccissima conterito & cribrato: molliora uero in pila tundito, ac sicca inspergito: pila itemq; pistillo ex unguento irino illitis, ut molle ad tactum & glutinosum reddatur. Vermes autem terreni in testa ad cinerem exusti, & ieiunis cum uino exhibiti, uentris fluxiones sistunt: eorum itaq; tres aut quinque exhibeto. Porro cognitu dignissimum & hoc est: infinita scilicet remedia hoc nomine prædicata esse, quod aluum sistere possint: uerum



uerum feri profectus est omninū meminisse: & cauē dum etiam ne nimium largus fiat eorum usus: quam plurimi omnino morbi ab acervata phar macorū uiciissitudine delentur, qui aliās non facile ho minem relinquunt, si diēta solum exquisita utatur. Vna autem tutissima & compendiosissima uia ad affectionis extirpationem diēta existit. Diēta coe liacorū. Coeliacū oportet mox ubi à somno surre xerit, faciēq; proluerit, ad deambulationē prodire, ita ut pro uiribus progrediatur. Deinde frictionē sim pliciorē adhibere, parce uidelicet & minime cōtente fricando maxime uentrē, oleo uero quo cōfricatur, canchry & pyretrum incoquātur, quo postea deter so, corpus ex oleo dulci impinguetur. Balneo autē ut plurimum renunciamus, aliquando tamē ad las si tudinis uel alicuius alterius rei medelā ipso utimur. In balneo uero smegmate quopiā utatur, quod cutē lancinare ac pertundere potest, uelut est nitrū assa tum, sex uini uista, & quæ eius generis existunt. Ab inunctionibus & balneo prandendū est: perspicien dum uero, si quicquam aliud ut cibum diuidamus. Duas itaq; tertias partes cibi in coenam referuet, atq; ipsum etiā qui in prandio exhibetur panē dimidia tum per se sumat: reliquū uero cum obsonio simpli ci. Frumentaceum enim alimentum naturæ homini maxime cōuenientis existit. Oleribus autē raro ue scatur: inflationes enim pariunt, minime apti sunt etiam omnes arborum fructus, insuauibus humori bus uentrem & stomachum replentes. Cæterum à prandio deambulationibus indulgendum, & animi aliqua laxamenta adhibenda: somni enim diurni no centissimi sunt, nisi lassationis sensus adsit, aut nox uigilata præcessit: uesperī autem à coena dormiat. Ex frumentaceis igitur conueniunt panis clibanites, ha lica, oryza: uerum sorbitiones ex milio non probo, quum concoctu difficiles & uiciosos humores miliū producat. Ex leguminibus non inepta est lenticula assata, & cum plantagine cocta, utile est & palmas sorbitionibus incoquere, malāque cotonea, eis que simili ui prædita. Ex oleribus bralsica eligatur dua bus aquis decocta, cum oleo ac modico garo: pau cissimōque aceto: intubus itē coctus & cichorium, pastinacaque ualde ex cocta cum simplici liquamen to. Varietatis autem gratia eis etiam carnes exhiben dæ, ex gallinis, columbis, aut auiculis montanis, ex pedestribus etiam tenerime & friabiliores coctæ omnes, concoctis simul quibusdam fructibus, aut pomis, aut myrti baccis. Bellaria modice præbenda, uelut sunt amygdalæ, palmæ, nuces, atq; ea uolupta tis gratia tantum ac dulcoris degustanda. Fructus sint minime inflantes: uua modica pensilis: in pomis ac piris similibusq; mediocritas seruanda, atq; hi ipsi cum pane exhibendi. Vinum conuenit subad stringens. Omnis autem liquor qui in potu exhibe tur paucus sit, & post omnem cibū præbeatur. Mul tus enim potus uētris fluxionibus insensibilis existit. Nosse tamen oportet, quod in his qui cum mor dacitate fluxionibus infestantur, optime facit lactis potus: ita ut in principio calidum ac recēs multum detur: postea uero ad medietatem decoctum aut etiā ad tertias, quemadmodum in alui profluuiū est præ dictum. Hoc enim modo exhibitum simul sistit ac temperat fluxiones. Cæterum in quibus lac ipsum in nidorofam aut acidam qualitatem permutatur,

quarā partem aquæ affundito, prædictōque mo do decoquito, ac exhibeto.

De colliquatione.

Cap. xxxviii.

Quum uero per uentrem quiddam excernitur, quod non ab accepto cibo aut potu prodit, sed ab humori bus ex corpore in uentrem defluentibus, assimila turq; ei quæ tum per uomitum reijcitur, tum infer ne procedit, flauē bilis: differt autem ab ea tum gra ueolentia, tum quod flauius quodam modo excre mentum apparet, strigmentitiāq; crassitudinem habet, aliquādo uero & oleosum aut adiposum exi stit. Colliquatio morbus is & syntexis uocatur. Re cens enim compacta substantia pinguedinis ac car nis ab ardenti febre resoluitur & colliquatur. Diu tius uero perseverāte malo, ex ipsis etiā solidis parti bus aliquid colliquescit. In qua pessima febricula fri gidæ purissimæ frequēs potus remedio existit: eius dem etiam qualitatis cataplasmata & epithemata ad pectus & præcordia adhibere oportet: cibi quoque refrigerantes exhibendi: reliquaq; quemadmodum in estuantibus, ac in habitū conuersis febribus dictū est, faciēda. Quod si in uiscerum inflammatione hoc contingat, ualde periculosa adfectio est, & cum præ dictiōe remedijs prædictis uti oportet. Porro si acre sit ac mordax quod excernitur, intestinaq; inde igne scant, mordacitatem lenire oportet per infusiones, ubi urgeat malum, nullo exacerbationum respectu habito, præter quā circa initium accessionis. Infun datur autē succus oryzæ ad tactum tepidioris, itēq; lac tepens. Si uero mordacitas cum tormine contin gat, ptisanæ succus infundendus est cum ouis crudis ac conquassatis, admixto rosaceo, aliquando uero bituminis etiam dra. i. ammiscenda. Quod si dolor adhuc perseveret, bis ac ter etiam prædicta infundā tur. Conuenit quoq; his lac potatum, ad quod quar ta aquæ pars est affusa, quemadmodum dictum est, decoctione ad tertias facta.

De lumbricis, ex Herodoto.

Cap. xxxix.

Lumbrici & in febribus, & citra febres nascuntur, tū multitudinē, tum magnitudinē, tum colorem, tum rē poribus etiam differētes. Circa initia enim morbo rum generati, substantiam suam ex subiacēte corru ptione capiunt: circa uigorem uero ex malitia mor bi: circa declinationem autem ex permutatione o mnium in melius, qui sanē citius separantur: natura enim ipsos, reliquorum recrementorum instar, so ras propellit. Censentur autem peiores ex ipsis, ma ioris minoribus, paucis multæ, & albis rubri. Viuen tes etiā mortuis deteriores. In infantibus autem & pueris, atque his qui ad pubertatem accedunt, maxi me abundant. Cæterum hoc malo affectos incredibi lis morsus stomachi ac uentris cōcomitatur, tulsicu læq; tenuissimæ ac frequenter iritantes, quū tamen nihil reijciatur. In somno tremūt, & præter rationē exurgunt. Quidā uero & linguā foras protrudunt, oculosq; claudūt, ac tacturni sunt, excitātesq; mole stē ferunt, ob imbecillitatē uigilare nequeunt. Qui dam autem oculos sanguine suffusos habent, & pulsum inæqualem, obscurum, deficientem & recur rentem. Quibusdam etiam appetitus perditio ac cedit. Pueris insuper dum dormiunt manducatio lingue, cum exertione, cui accedit conformatio oris in modum lactentium aut accipientium cibum: uerum hæc paucō tempore & per interualla fiunt.

Aliqui

*Verminū significatio*

*Immoderata in uentris*  
*et in uentre*



Aliqui uero infantes cum clamore præter rationem exurgunt, citoq; rursus collabuntur. Aliqui etiam dentibus frædent; quod contingere uerisimile est, an malculis attrahentibus cibum, mordentibusq; uentrem ac intestina. Iam uero & ad stomachum quosdam processisse constat, nausæarumq; & morsuum fuisse causas. Sæpe etiam per se sursum reiectantur; aliquando uero cum pituitoso quopiam humore. Quidā etiā infantes neglecti motu pulsus destituuntur, ac refrigerantur, atq; eorum instar qui animo linquuntur, tenuē quendā ac frigidum sudorē exudāt, & ut plurimū liuescunt. Contingit autē aliquādo faciem fieri rubicundā, maxime circa malas; uerū color hic rursus in pallorē solito maiorem trāsit. Alij autē instar delirantiū peregrina in somnis loquuntur. Alij decubitū transmutant cōtinue dormientes, angoreq; uexantur, ex locoq; ad locum sese uicissim proiectant. Verū paucos omnino ex ipsis morsum confiteri constat. Pleriq; enim in mentis inopia ac taciturnitate degunt. Porro qui à rotundis lumbricis infestantur, etiā cibū auersantur, & si quid acceperint reuomunt, aut nausæabundī uix deglutire possunt; febres in eos cum uehementi extremarum partium refrigeratione irruūt. Quibusdā autē ueter ad tympani modū inflatur. Ex Hippocrate. Lūbrici circa aluū his signis deprehenduntur: si somnolenti sint non permittente morbo, & extremæ partes frigidae, & cordis siue oris uentriculī dolor, urinae conturbatae, & lingua humectatur. Item qui animalculis in uentriculo abundant, sputo replentur: & si tenuis quispiā prodierit lumbriculus, amplius non spuunt. Quicunq; igitur in ore uentriculī lūbricos habent, ferē in totū ipsos uomitu reiectant. Quibus uero in intestinis insunt, ipsos infernē excernunt. Omnes autē nausæabundī sunt, uomuntq; quaecūq; acceperunt. His qui punguntur similes sunt: totoq; corpore cōtrahuntur, & repente acruatimq; mouentur, ac tormina accusant, interaneorūq; dolores. Eua porationes quoq; ad caput delatæ, uertigines inducūt. Quin & diæta quæ præcessit, ostendet tibi lūbricorum generationē: ex crassioribus nimirū & quæ difficulter cōficiuntur, & largius ingestis, & maxime frumētaceis, contingente: quos itē balneis à cibo ufos fuisse cōperies. Cæterū cura ipsorū, alia cōmunis est, & cum ea quæ febricitantibus cōuenit coincide. Alia uero eis proprie cōducit. Quū igitur ambigua adhuc affectio existit, & rationalis quidem suspicio adest, incerta tamen, neq; planē cōperta, minoribus sanē remedijs uti oportet. Ab acrioribus enim febres magis exacuuntur, si adfectionem falsō habuerimus suspectam; ubi uero cōstans ac euidentis cognitio contigerit, ad tēpora morbi animū intēdere oportet. Ad eos enim qui circa primas horas nascūtur, acrioribus remedijs est utēdū; & magis utiq; si iuxta declinationē totius morbi adparuerint: eos uero qui uigēte morbo apparēt, mitius curabimus: atq; id eo magis, si inflammationes & tensiones uiscerum cōcomitentur. His igitur cataplasmata adhibeantur ex semine lini crassiore lupini farina, parimētura admixta. In potu pueris ante cibū myxarū decoctum amixta menta præbeat. Eis autem qui ad integram etatem peruenerunt, absinthij aut abrotoni cremor. Vtriusq; uero etiam si febricitent, etsi trimestres tantum infantes existāt: uermes terreni cum

cum sapa confidenter exhibeantur: si uero sapa nō admittant, cum hydromelite, aut ut libet, præbeto nihil ueritus, neq; uilitate contempta septem numero dato. Quod si nō nuda sit suspicio, sed certa deprehensio lumbricorum, cataplasma ex lupinorum farina, in hydromelite decocta imponendum, cui aliquando etiam bryoniae radix adijciatur. Umbilicus autem felle taurino expleatur, aut melathio cum lacte muliebri trito, aut absinthio, aut abrotono, aut bryonia, pinguibus ficibus admixtis. Spina uero uniuersa ex medulla ceruina inūgatur. In potu etiā his uermes terreni septē cocti ac triti cū sapa præbeantur, aut ut libet aliās tenuissimè triti. Efficax est & abrotonum, & santonicum, & absinthium decoctū, unumquodq; aut cū ficibus aut palmis exhibitum. Aliquando autē hæc confusa & cribrata, & cū melle in catapotia redacta, deglutienda præbemus. Dari potest etiam chamæmelorum decoctum cum modico rosaceo, uehementer enim efficax existit. Egregie quoq; facit cretica sapa cū rosaceo potata. Aliud. Nuces pineas in aqua calida macerato, teritoq;, ac rosacei cyathum unum affundito, & cum uino optime temperato tribus horis bibendas præbeto. Inde enim enecatī, tum uomitu, tum secessu eijciuntur. Commode quoq; in cibo sumitur senetio uiridis, ac barba hircina. Eisdem etiam auriculæ muris succus, & calaminthæ ac mentæ decoctum, citra molestiam educit, quod & brassicæ semen ac petroselinū facere perhibentur. Superior autē uenter cerato integatur ex absinthio oleoq; cyprino adparato: aluo autē adstrictæ glans immittēda, præsertim pueris, quæ si nihil profecerit, clyster adhibendus morbi uigore remittēte: ex absinthij, aut abrotoni, aut cetauræ decocto, cum melle ac nitro. Cæterum lumbricos, qui circa uigores febriles nascuntur, quosq; malignos appellamus, per simpliciora remedia subducere conabimur. In cataplasmata igitur absinthium, abrotonū, ac santonicū miscebimus, aliquādo etiā lupinū. Olei autē omphacini propinabimus eis, qui facile id ferunt, cyathum unum. In sorbitiones uero mellis plurimum coniiciendum: & ptisanæ quoque oleū plurimum omphacinum incoquendum, halicam itē in myxarum decocto præbebimus tum per se, tum cum aqua mulla: præbibitiones uero ex oleo semper augebimus; multæ enim cōmoditates existunt. In uniuersum enim omnia quæ lumbricos educunt aut per acredinem occidendo, aut per amaritiē subducendo, aut ad excretionem irritando, aut per consequentē ad ea quæ exhibentur lubricitatem, efficaciam cognoscuntur. Extrahuntur enim simul, ut uerisimile est, per sorbitiones lubricas uias reddētes, aut etiā per innominatam aliquam efficacem qualitatē. Viuentes equidem uicinas intestinorū partes adprehēdunt; mortuæ uero unā cum stercore euacuantur. Prodeunt autē quēdā adhuc uiuæ, uerum uertigine affectæ, & si ita dicere libeat, seminecatæ. Profunt autem & his uermes terreni. Porro per pharmacorum potiones enecatōs lumbricos, citra dilationē per glādulas extrahere oportet: uitiosa enim ex ipsis exhalatio procedit, quæ & appetitū & digestionē lædit. Atqui ad nausæas ex lūbricis obortas, lācinationesq; stomachi, salis granū in ore detineant, deglutiantq; liquefactum. Acredo enim, ut apparet, eos statim infra subsidere cogit. Oboriuntur autem & in alui fluxione

*signa lumbricorum  
febris, et sine*



xione lumbrici: eos fluorem inspissando, & concoctione tum per cibos, tum per cataplasmata, in melius permutando, curare oportet. In quantum enim fluxiones inualescunt, tantum etiam lumbricorum generatio augetur: uicissimque fluxu cessante, lubrici interquiescunt: quare diligenter conabimur ut alium adstringamus, firmitatemque ei adiciamus. Coniicienda itaque in cataplasmata, alias ad fluxiones sistendas cocinnaea, ea quae ad lumbricos sunt praedicta, & quae fluores non exacerbant: uelut est absinthium, abrotanum, santonicum: iamque etiam malicorium, acacia, & balauftia, eisque similia, cum cruda hordeacea farina. Cerata quoque imponenda ex his apparata. Vtendum & praepotationibus, inter quas reliquis omnibus plantaginis succus est preferendus. Ad utramque enim affectionem, ueluti dixi, efficax existit. Licebit autem & in hoc casu uermibus terrenis, quemadmodum antea dictum est, uti. Ceratum ad lumbricos. Farinae lupinorum, absinthii, farinae hordeaceae tenuissimae, cuiusque drach. vii. fellis taurini unc. i. scobis cornu ceruini drach. iiii. ceræ quadrantem unciaeque dimidium, olei secundarii sexuncem.

*De lato lumbrico.*

*Cap. xli.*

Lumbricus qui latus appellatur, in his qui febre caret abundat, & in longis ac diuturnis enascitur morbis. Est autem latus lumbricus, si ita dicere libeat, permutatio pelliculae intrinsecus tenuia intestina ambiens, in corpus quoddam uiuum, quod continuos stomachi morsus infert, & ad cibos incorrigibile appetitum: ceterum ea quae accipiuntur non succenturiata digeruntur, sed cito excernuntur. Consequitur affectos corporis gracilitas, & imbecillitas cum tarditate, assiduusque famis sensus. Quod enim uiuificatum est in intestinis, ubi reces exhibitum cibum consumpsit, postea ipsa solida corpora arrodit. Minime uero fallax signum erit, si cum recrementis quaedam cucurbitae semini similia excernantur. Porro cura penitus cum precedenti concordat: praepotationes enim conueniunt amarae & acres, alij item comestiones. Aut enim integre excernuntur, ut incredibilem magnitudinis de se praebeant adspectum: aut etiam prodeunt in partes concisae. Et semel sanè exolutae non amplius secundoario congregantur. In potu igitur etiam his uermes terrenos, ut dictum est, exhibebimus. Proprie autem ad ipsas auriculae muris succus facit, duorum cyathorum mensura, cum uno zythi cyatho potatus: celerrime namque ipsos educit. Aliud, ad latos lubricos, quos carias, hoc est institas, uernacula uoce appellant. Nitri, cardamomi seminis, piperis, singulorum aequales partes commisceto, & cochlearij mensuram inde prebeto: confestim enim educit. Aliud. Corticis radicis mali punicae acidae in suprema parte delibrati, piperis, cuiusque drach. quatuor, cardamomi drach. sex, marrubij drach. duas, mellis despumati quantum sufficit, praebe ex eo cochlearium post alij comestione.

*De ascaridibus.*

*Cap. xlii.*

Ascarides etiam lumbricorum species sunt, circa extremas intestini recti, ac primam internam adstrictiore ani partem, sphincterem Graecis appellatam, consistentes, uehementemque pruritus his locis inferentes. Et pueri quidem assidue ad egerendum iritantur, a contraria uero instantia, & aduersus eas contentione, ac ut plurimum ab excretionem melius habent. Qui uero ad integram aetatem peruenerunt, causarum mo-

lestiam inferentium animaduersionem habentes, digitos in anum immittunt, ac procidentes educunt: quin & ignitis lapidibus, aut littoreis calculis a sole perustis fouendo, mordaces pruritus leniunt. Ceterum quum quidam praepuillanimitate nihil horum auxiliorum admittant, minime malum ipsum negligere oportet, sed citra dilationem curare, atque his qui falsi diuersum sentiunt causas indicare, ac curandi uiam demonstrare. Porro causae huius accessorij mali, cibi sunt, & frigiditates, alimentique corruptiones, quas praestat prius uitare. Huius uero signa potissimum ex recrementorum graueolentia sumuntur. Postea pueri quidem acri muria infusa sunt euacuandi, aut absinthii decocto oleo ammixto. Calidiores quoque sublutionem esse conuenit, a qua ubi prodierint recrementa, affecti loci illinendi, ex simplicibus quidem acacia & hypocistidis succo, rhoisque succo cum alumine liquido. Compositis uero Andronij pastillo, & sphragide polyidae inscripta, & lanæ succidæ pastillo, ac quae his similia existunt. Coacta enim ab adstringentibus caro corroboratur, aptitudinemque ad animalculorum generationem amittit, atque ascaridas ipsas excludit. Perfectiores etiam aetate similiter euacuandi acrioribus ac calidioribus infusis, uelut est muria & centaureae decoctum: deinde cedria eis infundenda: ad quam rem corneam fistulam undiquaque perforatam apparare oportet, circa fundum amplam, ac magnitudine locis conuenientem, quam ultra adstrictiorem ani partem inditam cedria explemus, ita ut cedriae immissio palam tum per amplitudinem, tum per transversa, undiquaque contingat: post uero quiescere iubemus, saepe eundem curationis modum repetentes. Aliud, quod & pueris & qui perfectae sunt aetatis conuenientissimum & efficacissimum existit. Carnem ueterem saltam, pinguedine derafa, sublongam & rotundam formabimus, atque ita adaptatam podici atque adstrictiori ani parti intrudemus, ligamentoque adhibito, quam diu sustinere possint, inditam sinemus: deinde soluemus, praedictaque infundemus atque illinemus: idem etiam remedium saepe repetemus. Cibi uero frumētacei generis, boni succi, ac qui facile concoquuntur, praebeantur.

*De abscessu in intestinis.*

*Cap. xliii.*

Oboritur aliquando abscessus in intestinis, ad cuius eruptionem eliquationes aquosi puris consequuntur: quare ignari ac inexperti hoc uiso decipiuntur, dysenteriam hanc affectionem esse putantes: & sanè ut uerum fatear, si post eruptionem diuturna sit exulceratio & perseueret, eo modo quo dysenteria curatur, uerum in principio nequaquam consimili curatione subducitur. Vnde etiam quosdam aegros periclitatos esse constat, male ab indoctis medicis tractatos, qui statim in principio dysentericas infusiones adhibuerunt. Pro uiribus itaque affectiones haec inter se distinguantur. Iudicatu enim faciles existunt. In abscessu enim semper dolor pulsantis praecedit iuxta affectum locum innitens: neque morsus, neque decursus adsunt, quales in dysentericis praecedere consueuerunt. Deinde mutatione in suppurationem incipiente, rigores inaequales consequuntur, febresque circa uesperam maxime irruentes: postea ubi perfecta humidi mutatio fuerit facta, omnes molestiae minores fiunt, uehementesque dolores remittunt: deinceps



deinceps eruptionis tempore accedente, rursus dolores intenduntur, aliquando autem perfecta uentris adstrictio adest. Post eruptionem uero humor, qualem praediximus, excernitur, quum nihil tale in dysentericis oboritur. Cataplasmatibus igitur ad eos uti oportet, ex semine lini, adstringentibus aliquod simul ammixtis: ueluti sunt palmae, mala cotonea, & similia. Atque ne fluxus augetur infusis utendum erit, ex ptisanæ succo aut halicæ cum quodam mediocriter adstringente. Vehementem enim adstrictionem in his facere ueremur. A cataplasmatibus uero ac praedictis infusis inflammationem mitigamus. Et si quidem eruptionem suspectam habeamus, epithematis utimur quae eam adiuuant, altheam nimirum ac caricas, simumque columbinum admiscentes: si uero discuti posse ac euanescere inflammationem speramus, ea quae discutere ac digerere praedicantur epithemata adhibemus. Qua in re egregie facit emplastrum anicetum, hoc est insuperabile appellatum. Si uero eruptio obuia ueniat, infusis utendum, primum quidem ptisanæ succo: cui deinde modicum mellis, ad ulcerum repurgationem, est ammiscendum. Quod si sordidioracrementa appareant, etiam lentiscalae decoctum ac malicorium, ad ptisanæ succum & mel affundatur. Repurgatis deinde ulceribus à melle abstinendum, parum uero quiddam ex pastillo de halicacabo ad infusum consueciendum, quo ulcera ad cicatricem perducantur. Post haec autem prospiciendum, ut corpora instauratione suscepta, subsidant ac molliora reddantur: saepe enim identidem humoris collectiones fieri consueuerunt. Quod si uero sinus quispiam relinquatur, rursus ea de quae praedicta sunt adhibeantur: si uero ea quae ex ulceribus promanant serpendo depascent, ad ea quae ad dysentericos in principio conueniunt, traieciendum.

De dysenteria, hoc est, torminibus intestinorum,  
ex Archigene. Cap. XLIII.

Dysenteria proprie, exulceratio est intestinorum serpendo depascens, ab externis causis producta, ueluti frigidityte, ardore, uenenatorum pharmacorum potu, & quae his similia existunt. Iam uero & à cruditatibus, peregrinorumque & acrum ciborum acceptio: ne ab aliqua item acrum humorum impressione, ei consimili quae circa externam cutis superficiem contingit, à qua paupulae quaedam feruida ac exulcerationes perficiuntur. Primum uero egestio malum auspicatur cum rugitibus subpinguibus ac biliosis, pingui nimirum quod intrinsecus intestinis adheret paulatim circumliquefacto, & quibusdam quidem cum torminibus, quibusdam absque his excretiones contingunt. Quum uero superficies intestinorum perfecte fuerit denudata, exulceratioque supernè consistit, feculentas ac cruenta biliosaeque excernuntur. Vbi autem altius penetrarit ulceratio, etiam sordes pelliculas admixtas habentes expelluntur, & si non celeriter cohibeatur, compendio uicinos locos depascitur: saniosa uero quaedam excernuntur, qualia ab occisorum corporibus defluere consueuerunt. Atque haec sane est quodammodo acuta dysenteria. Si igitur ab acris cibis, aut à flaua bile dysenteria oboritur, ferè in totum ipsam curamus. Si uero ab atra bile initium summat, si quidem ratione iudicationis febrilium morborum atra bilis excernatur, transituque suo intestinum distendat, etiam hanc curare non desperamus. Si uero sua sponte, nullo praecedente febrili morbo,

neque concoctione bona apparente, atra bilis excernatur, immedicabilis dysenteria ex ea oborta existit, nihilque à cancro exulcerato differt: estque omnino letalis. Consueuerunt etiam exulcerationes aliquae diutius perseverare, serpendo nequaquam depascentes, uerum cauis ulceribus forinsecus consistentibus similes, quibus cicatrix tarde inducitur, labris nimirum ulceris in callum induratis, in huiusmodi etiam infusa infelicitè adhibentur. Atqui in plerisque dysentericis tenemus praecedere uidetur. Est autem tenemus egerendi promptitudo quae differri ac deuitari non potest. Nosse tamen oportet, quod aliquando quidem aliqua sui parte intestinum rectum in dysentericis exulceratur: aliquando uero totum, & cum ipso etiam superiora. Si quidem igitur circa colum, hoc est, circa intestina crassa ulceratio contingat, stercore quae egeruntur multa sunt, & coaceruata, & cum flatibus prodeunt, aliquando etiam spumosa. Pinguis quoque & cruentacrementis ammixta adparent, inexplibilisque edendi appetitus oboritur. Tenuibus autem intestinis exulceratis, dolores circa umbilicum consistunt, biliosaeque & porri colorem habentia, atque omnino uariiegata, stercorei commixta plurimum excernuntur, citra tamen ramentorum complexum, cum torminibus & mordacitate, desperationeque ac exolutione, ut non procul ab animi deliquio aegri absint, à siti infestatur, & febricitat, stercore quoque crudius ab eis prodit. Exulceratur autem, uerum raro, & ieiunum intestinum. quod si contingat, egestionem crudiores apparent, sanguinem nigriorem uehementer implicatum habentes, bilemque abunde flauam, sitis multa itemque nausae affligunt: uomunt etiam aliquando, ac cibos auersantur, dolor quoque uehemens supra umbilicum confidet, quandoque & febres malignae oboriuntur. Atque ita adfecti decolores fiunt, & ad animi deliquium usque exudant: uires etiam ipsorum cito deficient, neque procul ab interitu absunt. Antylus autem scribit. Tunc equidem ieiunum intestinum exulceratum esse putamus, quum sanguis qui cumcrementis egeritur, niger ac uetus apparet: necesse est enim huiusmodi, in omnibus infra ieiunum sitis intestinis decoctum excerni. Pituitosa etiam ac subpinguis simul excernuntur: pituita enim, inquit, in ieiuno abundat, ipsumque etiam adiposum existit: biliosa item abundanter in his excernuntur, sitisque infestat, utpote uentriculo ob uicinitatem ex affectione intestini ieiuni concalescente: quapropter & februnt & dolent. Caeterum tenui intestino exulcerato, egestionem minus quidem biliosae ac pituitosae sunt: neque enim pituita, nec pinguedo in hoc uelut in ieiuno abundat, subcrusta autem magis & rasurae similia excernunt. Quae enim defuerunt, pelliculas intestini in superficie radunt, quare obrè sanguis etiam in eis minus niger adparet. Si uero circa colum exulceratio fiat,crementa multa erunt, & flatu comitante coaceruata, & aliquando spumosa: quod uero cruentum in ipsis prodit, flauum erit: cibum plurimum expetent, crudioraque egerent: minus etiam à siti infestabuntur, & non multum februnt, nisi magnum sit ulcus, aut malignum, & si febricitare eos contingat, difficilius alijs febrem mouent & excludunt. Magnam autem causam subesse oportet, si febris ex colo accendatur. Quod si rectum intestinum sit exulceratum, concocta eruntcrementa



menta & sanguis floridus, & sordes plurimæ excrementis ammixtæ: tenesmi etiam aderunt uiolenti, sepiusq; ad excretionem incitantur, quum tamen nihil excernant: neq; ualde esuriunt, neq; sitiunt, neq; febriunt, nisi ulcus sit cancerosum. Porro primum periculum ex ulcere serpente ac depascente dysentericis impendit: secundum uero ex sanguinis eruptione, tertium autem ex fluxu à locis ab imbecillitate affectis cōsequenti. Ceterum ab ulcere serpente ac depascente pueros magis opprimi adparet, usq; ad ætatis uigore calidum, namq; & humidum huic ætati corpus est, quare ad putrescentes morbos perferendos magis sunt parati. A sanguinis autē eruptione, magis hi qui in ætatis uigore cōsistunt, infestantur, & qui à natura multo sanguine abundant. A fluxionibus autē seniores amplius læduntur, & qui malo corporis habitu sunt præditi. At uero ubi ulcus proserptum est, dolor concomitatur. Acris enim & liquida cū torminibus recrementa egeruntur: deinde & odoribus & coloribus uariata unā cum mordacitate. Febres uero quoq; prauæ accedunt, inediasq; ac corporis lactationes cōsequuntur: æstus itē cōtinuus ac sitis. Iam uero ulcere serpente ac depascente in pelus procedente, ramēta excernuntur: seculentaq; multa ac nigra efferuntur, & sordes magnæ intestina ambientium pellicularum, si in crassis intestinis ex ulceratio cōsistat. Quum autem sanguinis eruptio futura est, exolutio totius corporis, animi deliquio similis præcedit, ac grauitas loci. Ea uero quæ egeruntur, lenta sunt ac uiscosa, deinde cruenta. Postremum etiam grumi multi excernuntur, primum quidem flauis, ad finem uero nigri & graueolentes. Manifestum autem est, quod uires quoq; eorum subuertentur, sudoresq; effundentur: aliquando autem & conuulsiones ad plurimam euacuationem consequuntur. Atqui fluxione laborantes, curationis tempore compacta stercora excernunt, deinde non longè post ulceris rectorium splendidum unā cū stercore effertur. Modicè namq; ab infusis fluxus sistitur, deinde paulo post ulceratio excoriatur. Ceterum si alicubi certe in intestino recto ac colo cōsistens dysenteria facile curabilis existit: quæ uero in tenuibus intestinis hæret, difficulter curatur, maximè uero in ieiuno. Iam uero & hæ quæ post abscessuum eruptiones fiunt dysentericæ, graues sunt, propterea quod uires deiectione ita sint per coincidentes inflammationibus febres ac dolores. Graues sunt quoq; quæ cum uehementi inflammatione oboriuntur, quæq; cum febre ac perditione appetitus. Pessimæ uero dysentericæ sunt, in quibus quæ excernuntur porri ad spectum habent, suntq; nigra, plurima, uaria, graueolentia, & quæ unā cū excrementis sordes pelliculis magnis cōmixtis excernunt. Veruntamen & mulieres, quam uiri, senes & pueri, quam iuuenes & in ætatis uigore cōsistentes, difficiliter curā accipiunt. His prædefinitis à tenesmi affectione curā dysentericæ incipiemus, quum plerisque inde dysenteria initium sumat.

De tenesmi cura.

Cap. XLIII.

Quemadmodum iam prædictum est, in plerisque dysentericis tenesmus præcedit. Est autem adfectio hæc ad excernendum promptitudo, quæ differri ac deuari non potest, nihil tamen præter quam pauca cruentum ad spectum habentia propellens, & post ea quædam mucosa. Vbi uero stercus fuerit excretum, ægri alleuantur. Iam uero & inflammationem cum laxo

tumore, ex continuis distentionibus circa locum obortam esse constat, quæ stercoris insidentis suspicionem præbet, quod exitum quærat. Cæterum recrementa in ipsis concocta & compacta fere in totum excernuntur, paucio sanguine post recrementa destillante, stercore minimè admixto. In principio igitur si grauis distentionis sensus circa imum uentrem fiat, & maximè circa dextram partem, cōlecta re oportet stercoreum multitudinem in cæco intestino insitam esse, quam fursurum ac fœni græci decocto infuso eluere oportet, melle oleoq; ac modico nitro ammixto. Quod si huiusmodi nihil apparuerit, statim in principio ex oleo myrsinino aut rosaceo, cum uino & cumino, pectinem, inguinatq; ac inter anum & scrotum intercapedinem, perinæon Græcis appellatū, fouere ac irrigare oportet. Deinde lac caprinum recens multum heminæ mensura, & nequaquam minus præbendum: uerum non aceruatim, sed sigillatim partitum. Sequenti deinde die lac ipsum ad dimidium decoquatur, ablato eo quod in decoctione concretum superstat, atque ita exhibeatur. Si uero pituita sit quæ ægrum infestet, aut præcesserit frigus, rutam in uino albo decoquito, atq; uinum ipsum calidum meracum bibendum dato, ac assidue bitumen, picem siccam, coriandri semen & cyperum suffito: undiquaq; autem ægro contexto suffimentum supponatur. Est autē & pastillus suffumigabilis ad tenesmos ac intestinorum dolores approbatus, hic. Picis sicce sextarē, bituminis unc. i. sulphuris uiui un. i. bitumē ac picem cum modico aceto liquato, sulphur autē uiuum tenuissimè tritū adiungito, hisq; simul unitis pastillos informato. Vsu uero expetente in calidū cinerem coniectos suffito. Bitumē autem in refrigeratis, etiam cum ptisanæ succo infundito. Glande quoq; suppositicia in eis huiusce modi utendum est. Oleo raphanino si adsit, aut communi, si nō illud haberi queat, alia decoquito ac conformato: deinde ladanum & ceram paulatim adiungito, quibus liquefactis & ab igne ablatis, modicum lycij addito, unito, ac tomēto excipito, sediq; quam penitissimè indito. Ad imum uero uentrem ac lumbos hoc adhibeto. Ladanum & styracem unguento nardino, oleoq; suffumigabili appellato dissoluito, ac lana exceptum imponito, ac colligato. Efficacissima autē sunt in tenesmi affectione fomenta sedī admota. Gallas igitur in aceto decoctas cum spongia adhibeto, aut glomis texturæ gynæciorum per successionem foueto. Efficax est & malicorium similiter decoctum, myrticq; baccae, ac rubus, quæq; his similia existunt. Furfures quoq; in aceto decocti, ac feruenti ligamēto excepti, commodè sedī adhibentur. Infectiones etiam ex prædictis utiliter suscipiuntur. Verum cui per nostram experientiam cognito testimonium merito præbemus, tale est. Later perquam uetustus & à fumo denigratus unā cum contentis in eo paleis tunditur: deinde feruenti aceto subactus, linteoq; illigatus sedī subditur. Hæc autem statim ab excretionem admoueantur, & maximè si dolor infestet. Iuuantur etiam per spōgitidem herbam sede extersa. Si uero exulcerationis principium oboriatur, inflammatioq; adsit, ptisanæ succus infundatur, paucis rosas simul cum eo decoctis. Quod si acris sint quæ efferuntur, lac tepidum infundatur. Vehementiori autem inflammatione infestante, oleum ro-

C laceum



faceum leniter calidum infusum ac pluribus horis detentum, doloris uexationem dissoluit. Si uero laxius intestinum rectum fiat, lentum ac malicorij decoctum infundatur. Similiter autem & si exulcerationis principium adsit. Si uero uigiliae una cum dolore consequantur, sed collirium soporiferum subdetur, quod ad dysenterias est descriptum. In eis autem quibus iam ulcus serpens depascitur, subiecta ad dysentericos cura utemur. Epithema dysentericis. Croci, myrrhae troglodyticae, cyphi, mastiches, succi absinthij, aloës, palmarum, acaciae, masuchae, ladani, malorum cotoneorum, cumini torrefacti, candidi ouorum assati, panis usti & in uino macerati, olei melini aut rosacei.

*Cura dysentericorum.*

*Cap. XLV.*

Principium curationis dysentericorum a quiete & modico cibo fiat, undecumque tandem fluor procedat, & mediae corporis partes lana oleo modico dulci imbuta cōtegantur. Vehementi autem mordacitate infestante, rutaceum sit oleum, & cuminum tritum lanæ conuolutæ inspergatur, maximè ubi inflationes & tormina affligant. Quod si hæc augescant & intendantur, ad cataplasmata confugiendum erit, & hoc maximè si inflammationis sensus percipiatur. Multis enim non dolorum tantum, uerum etiam totius mali obliteratione cataplasmatum comoditas induxit. Adparentur autem hæc ex polline in posca usquequo cogatur decocto: quem deinde linteolo complicato illigatum totis illis impones: fluor enim ipsum cocoquit, quandoque autem & palmas, malaque cotonea, ac malicorium cum aceto cocta ammiscemus: quod si ardor adsit, symphyti radicem tritam, aut solanum, aut perdicium, aut plantaginem adijcimus. Stomacho uero imbecilli & exoluto, polentam cum oenanthæ, aloëque & omphacii annectemus: inflatione autem simul infestante, anisi, foeniculi, apij, ac irionis semen addimus: & si lumbrici simul cum recrementis excernantur, melanthium, aut cornu ceruini ramenta, aut adeps ceruinus, aut coriandri semen non incommode admiscantur: quod si dolor uehemens adsit, prædicta cum lini semine commisceantur, & aceto mulso decoquantur. Si uero sanguis multus effertur, acacia, hypocisthis, & alumen cum palmis ac malicorio decoctis & tritis aptè concinnantur: si autem liquida & cruda prodeat, quod eis qui uires debilitatas habent euenire solet, mel coctum per se, aut polenta ammixta, pelle exceptum imponitur. Aliquando autem & opij parum, aut hyoscyami semine, hypocisthidemque & acaciam ac myrrham, apijque semen satis largum, itemque foeniculi & anisi inspergitur. Quod si frigoris sensus adsit, pellem agninam leuè liquida pice imbuito, calefactamque aluo imponito. Ego uero, inquit Archigenes, superioribus quidem intestinis adfectis, pastillum aliquem ex eorum genere qui supernè per os exhibentur dissoluo ac melle probè cocto, aut palmarum pinguium carne exceptum impono. Neque enim impensè parcendum est in his qui de uita periclitantur. Inferioribus autem intestinis adfectis, ac mucosis multis infernè prodeuntibus, & eiusmodi etiam occupante madore: ex pastillis qui infernè per anum infunduntur, tres aut quatuor palmarum carne exceptos impono, semperque mihi iuxta uotum res acta succedit. Mirificè etiam emplastra quæ cruentis uulneribus adaptata sunt, cōducunt, postquam quiescerint inflammationes, uen-

tri ac lumbis totis usque ad dorsum imposita: qualia sunt Barbara appellata, & quæ ad fracturas apparentur, uelut est quod Isis uocatur. Atque de his quidem quæ forinsecus imponuntur hætenus. Dicendum autem deinceps de his quæ intra corpus assumuntur. In principio igitur post tertiam diem permittentibus febribus, lacte recens multo adhuc calido utendum est, melle tepido ei ammixto, atque in eius usu ad tres dies perseverandum, quantum nutriendo corpori suffecerit exhibendo: sequentibus deinde diebus melle adempto, & modica aqua (quartæ nimirum lactis partis mensura) affusa, paulum decoquimus ac exhibemus. Deinde post alias tres dies ad dimidium decoquimus, & post alias tres, ad tertias, similiter per tres dies, atque ita eis præbemus. Primum enim lac depurgat, simul ea quæ in corpore sunt cōtemperando: postremum uero aluum sistit. Non scio enim an aliunde grauior molestia dysentericis oboritur, quam ex eorum quæ egeruntur acredine contingit. Oportet autem insuper & panem madefactum à lactis acceptione offerre. Pulces etiam ex lacte apparatus, cum pharmacum, tum nutrimentum optimum præbent: uelut est oryza cum lacte, dulciarij panes, amyllum, & oua lacti commista. Quod si adhuc fluxus perseverat, inde ad eorum quæ aluum sistunt sylvam trāseundum est. Ex quorum genere, alia quidem influentes humores obducunt & inspissant: alia uero, corpora plus iusto rarefacta & laxata adstringunt, alia autem resiccant. Pulces igitur ex halica apparentur: nam hæc & probè nutriunt, & aliquo modo obducunt. Cōdiantur autem paucissimo sale, ac modico oleo & anetho, aut pro oleo magis adipe gallinaceo, aut anserino recenti. Quæ uero ex oryza eodem planè modo parantur, præcedentibus magis resiccant. His autem adhuc amplius quæ ex milio fiunt. Quæ autem ex rhoë apparantur pulces, magis adstringunt. Ego uero, inquit Archigenes, eas hoc modo adorno. Rhoem culinarium in aqua pluvia per noctem macero, deinde diligenter expressum aquæ cōmitto. Farris apparatus: ex Archigene. Quod uero Latine in regionibus Romæ uicinis far appellant, hoc modo apparatus. Frumentum modico tempore aqua madefactum, indeque extractum ac in pilam coniectum, ueluti ptisanam à cortice repurgato. Vbi uero corticem exuerit, tollito atque in sole siccato: deinde manibus tritum donec penitus à cortice fuerit mundatum, crassissimè molito, ita ut granum unum in quatuor aut quinque partes redigatur, & siccum adseruato. Vfus autem tempore halicæ modo coquitur, & à sanis in cibo sumitur. Pro egris uero uariè apparatus, & epithematis quoque ammiscetur. Quidam spicas frumenti adhuc uirides tollunt, ex ipsisque far concinnant, quo modo & suauius & iucundius redditur. Far quod clusinum appellatur. Porro frumentum ipsum rursus madefactum, manibus sedulo confrico, atque ita percolatum ipsius succum coquo, anethi ramulis assidue agitando: coit autem celerrimè uelut glutinum quo ad librorum compactionem utimur: quo facto ipsum sale, ac paucissimo oleo siue adipe condio, sique hoc modo non solum commodum, sed etiam iucundum. Apparatur autem puls ex siccis item panibus, quos aliquando quidem posca, aliquando uero palmarum, aut malorum cotoneorum, aut pirorum, aut filii-



aut siliquarum, aut rhois, ut dixi, cremore contulos coquo, eisq; aliquādo ex fauo albo ac optimi mellis pleno aliquid admisceo. Ex adstringentiū numero lenticula quoq; proditur, quæ probè assata cū plantagine aut malis punicis cōtusis decoquatur, acetoq; ac modico oleo cōdiatur. Vtiliter etiā lenticulæ far durum ammiscetur. Olera quidem non ualde probo, decentē tamē eorū degustationē nō prohibeo, uelut seridis coctæ, plantaginis, brassicæ bis coctæ, ad quā post primam atq; item secundam decoctionē aqua diffusa, poscam feruentem affundimus, rursusq; donec liqueat decoquimus. Intubum quoq; ac lissarū cum liquamēto simplici exhibemus. Damus & ouorum assatorum lutea tantum cum modico aceto ac rhoē, paucissimo oleo ammixto. Carnes autem dysentericis non ualde commodæ existunt, dandæ tamen eis qui diuturno malo uexantur. Ex his uolucrum eligendæ, deinde syluestrium ferarum: uerū ex his omnibus faciliē solubiles & non graueolentes, teneramq; carnē habentes ac adstringentē, reliquis præferendæ, uelut est inter uolucres perdix, palumbes, & similes. Ex pedestrib. uero carnes dorcadis, capreg, ac leporis. Ex marinis, aselli, perca, loliginis ac mulli: singulæ uero in posca ebulliant, myrti baccis cum eis incoctis, deinde assatæ cum familiaribus edulhis præbeantur. Fructibus quoq; parce utantur: si tamen stomachus langueat, pirum coctum, aut cotoneum malum concedemus, aut uuam quæ in cado, siue olla, aut etiā interpositis uinaceis adseruatur: me spila item ac punicum malum. In potu à principio quidē aqua pluuiā, quæ nō sit ex domibus plumbo infectis delapsa, utendum est. Talis enim aqua potata etiam sanis dysenteria propinat. quod si pluuiā optima non adsit, fontana utemur: puteorum aqua semper deuītata, utpote quæ subsalsa est, ac uentrē perturbat. Cum aqua autem fructus adstringentes coque-re oportet, maximē uero acinos. Post uero ubi uires fuerint delectæ, etiam uinum præbendū, quo stomachi sanitas firmetur: sit autem uinum adstringens, & non ualde uetustum. Ante cibum uero corpus inunctionibus, & faciei prolutione, similibusq; curetur, quæ in febriū tractatu sunt relata. Atq; hætenus quidē de diætā. Iam uero ad remedia quæ infernē adhibentur transeundum. Magnis igitur intestinis affectis etiam infusa adhibeantur: & si quidem tenesmus infestet, prisanæ succus infundatur, adipe caprino aut hircino admixto. Vbi uero corpora excoarctationem incurrant, halicæ aut oryzæ succus magis appositus erit: triticea etiam prisa ad tenesmos ac excoarctationes accommodata cēsetur. Aliquando in uehementi tenesmi ad egerendum promptitudine, muriæ usu ægrum ab omni dolore liberauimus. sufficiunt autem ex ea drachmæ sex, heminae uni calidæ aquæ illiquatæ: si uero succo alicui eam ammiscueris drachm. viii. inijcito. Præstantius tamen oliuarum albarum muria conditarum liquamē censeatur, tepidum heminae mensura infusum, & sanè per assiduum eius in tenesmi cura usum optimē successit. Si uero ex ueteri chirurgiæ perpessione, aut aliā subtiliore sensu prædita existant circa sedem egroti loca, anus assidue & maximē ante acrium aut adstringentium pharmacorum infusionem, adipe anserino aut suillo perungatur, & fistula quoq; clysteris crassius illita immittatur. Cæterum post distentionum exolutionem, aspe-

ritates quæ circa intestinum sunt, quæ quidem mediocriores, per muriam resiccantur: quæ uero relinquantur succis magis adstringentibus curantur: ueluti gallæ in uino decoctæ, aut tritæ & uino insper-sæ, malicorij item ac corticis pinus, & baccarū myrti nigrarum. Quod si ardor consequatur, oua cruda duo cum uino modico, ac largo rosaceo conuassata infunduntur. Qui uero caput, quod facile adfici-tur habet, in his seminis lini succū recusamus, utpote caput replētum. Portulacam autem cum prisa (si possibile est) decoctam, aut cum aqua: si id fieri non queat, succo eius cū rosaceo & ouis crudis permix-to infundimus, in his præsertim q; ardoris adfectio-nē circa intestina habent, aut qui aliās à calidorum in-fusorū ardore sunt lēsi: ex rosaceo uero quarta ipsius succi pars sumatur. Mirificè etiā seminis lini succus facit, cum candidis ouorum, & lacte asinino sesqui-cochlearij mensura permixtus: pro quo si non adsit, bubulum accipere non incōmodum erit. Porro in-flammationibus erysipelatis, ciborum ac potuum ci-tra mordacitatem adstringentium usu conueniens existit. Infusa uero eis cōueniunt, plantaginis succus, malicorij, perdicij, portulacæ, semperuiui: uerum sin-gulis acaciæ aut hypocisthidis succum admiscere oportet. Efficacius autem in erysipelatis glauciū in-funditur cū aliquo ex prædictis succis, aut Andro-nis pastillus, aut Musæ inscriptus. Quod si sanguis destillet, sanguinariæ succo utēdū aut plantaginis cū acaciā, hypocistide, aut balauftio. Si uero sanguinis impetus uehementer urgeat, quemadmodum etiam si maxima inflammatio subest, præsertim in his qui plurimo sanguine abundant, uena incidenda, si uires non resistant, & maximē in quibus consueta sangui-nis excretio cohibetur. Auferre autem oportet neq; multū neq; coaceruatum, ab utroq; enim uenter con-turbatur. Omnium uero maximē cauebimus ne ani-mi deliquiū fiat, quare desidenti etiā dysenterico ue-nā secabimus: hac enim desidentes forma dū secatur uena, minus reliquis animo linqūitur. Secare autē oportet in dextro cubito uenam humeralem appel-latam: neq; enim similiter hac uena incisa, uires labe-factantur, & insensibiliter quodammodo furtimq; sanguis aufertur. Quod si hæc non appareat, necessa-riō mediā secamus. Inferiorē autem incidere ob sub-iacentem arteriā uitandum: ceterum fissurā omnino tenuissimam infligemus: nō enim ob multitudinem sanguinis euacuandā sectionem facimus, sed ut mate-riam quasi per riuos transferamus. Paucus autē san-guis etiā multo tempore emissus, inflammationem mitigat, & sanguinis ad intestina delationē reuellit, innatūq; calorē sensim refrigerans, somnum magis quā animi deliquiū inducit. Est autem optimū dy-sentericis remedium somnus. Si uero quid uenę inci-sionē fieri prohibeat, ex eorū quæ sanguinē sistūt am-mixtione infusionē facio. Qua in re lanarū succida-rū cinis optimē facit, aut ex spongia noua uisa. Spō-giam autē ipsam liquida pice imbuere oportet, aut sanguine taurino, cineremq; eius in olla exustæ in aliquē ex prædictis succis inspergere, atq; hoc modo infundere. Succī aut in his ad infusiones apti sunt, ex-plātagine, sanguinaria, ac similibus. Quin & linteo-lū alumine liquido imbutum, deinde uisū, præclare sanguinis eruptiones sistit, Sūmē autē conducentē cognouimus asinini stercoreis succū, maximē si à pa-



stura prodeat animal mōtana & adstringente: quod si non sufficit ipse succus, stercus plantaginis succo madefacito, exprimito ac infundito. Adhibeātur autē simul & epithemata, & quę per os accepta sanguinem sistunt, & qui sanguinem spuentibus commodi sunt pastilli. Præter opinionem uero eis prosunt, maceris cortex, & mali punici flores, æquali pondere contusa & cribrata, si inde scrupuli duo cum uino adstringente propinentur. In his etiam frigida, citra offensionem tamen, infusa apparentur. In reliquis uero dysentericis tepidiora, aut leniter calida. Ulceribus enim frigidum infestum est, nisi sanguinis eruptio simul adsit. Si uero exulceratio absque fluxione relinquatur, plura ne infundatur, quàm lac bubulum, aut caprinū, cui lycij drachmæ tres sint ammixtæ: optimè faciunt & terræ samiae drachmæ IIII. aut amyli drach. IIII. cum plumbi usti drachmīs II. triticæ pisanæ ammixtæ ac infusæ. Aut cerusæ drach. II. cū succo inijcito, egerq̃ sanatur, ubi uero fluxione adficiatur, & nimium humecta sit exulceratio, charta usta, aut lentiscus usta, aut cinis pōpholygis, aut aridum ex charta cōstans pharmacum, similiaq̃ cum succo plantaginis infusa, aut etiam cum altero consimili succo ægrum, à malo adseruāt. Quod si uehementior sit fluxus & humectatio exulcerationis, ea quæ à callis indurata corpora leuigare ac à callis liberare possunt adsumantur: itemq̃ ea quę humecta resiccare & exurere, exolutaq̃ adstringere possunt: uelut est sabinae herbæ decoctum, item saluiæ, polij, ac pilularum cupressi, ex pastillis uero Musæ inscriptus, & qui ex lanis succidis ustis constat, & cōsimiles. In potu uero Thrasyandri pastillus, & qui croceus appellatur, consimilesq̃ qui supernè per os sumuntur, præbeantur. Cibi etiā magis resiccantes eis exhibendi. Si uero serpendo depascant ulcera ipsa, si qui dē in intestino ieiuno consistant, paruam omnino salutis spem promittunt. Si uero circa tenuia intestina fiant, minus graue malum est, attamen periculo non uacat. Si autem in colo fiant, ut plurimum sanabilia existunt. Verum quemadmodū in externis ulceribus depascētibz: ita & in his statim in principio, ubi depastio apparuerit, crustas inducēda & exurere ualentia adhibere oportet: si enim ad magnitudinē peruenit exulceratio, inutilis horū usus fuerit, cæterū ulcera circa ieiunū ac tenuia intestina, per portiones curantur, ea uero quę crustas inducūt in potu accipi non possunt: quare sorbitiones & eiegmata ex tergere ac repurgare potētia, his sunt exhibēda: estq̃ pisanæ succus cum melle absorptus his aptus, atq̃ ipsum adeo mel per se induratum, & in decoquēdo in pastillū coactum, quod comestū ulcera potēter repurgat. Sorbitiones item ex eruo apparatus, cōueniētissimæ sunt eis qui in superioribus partibus ulcus depascens habent. Apparantur autem hoc modo. Eruum in aqua calida sepe permutata ad horas octo madescere sinitur, deinde donec testam omnem abiecerit, manibus in aqua confricatur: post uero coquitur, & prima itemq̃ secūda, tertiāq̃ & quarta aqua diffusa, semper ubi prius decoctum diffunditur, rursus alia aqua feruens affunditur, quæ ubi post quartam tandem decoctionem fuerit diffusa: acetum mulsum ad ipsum sufficienter infundatur, & cum quintæ aquæ affusione ad compagem succi pisanæ decoquendo reducatur, atq̃ hoc modo absorbeatur. Hali

ca etiam cum lacte bubulo decocta non incommoda efficitur. Maximè uero omnium prodest eis lac bubulum recens mulctum ac potatum. Quicquid uero tādē eis datur, ualde modicum sit. Hi enim præ alijs dysentericis pauco cibo indigent, sicutq̃ uexantur. Pharmaci autem loco exhibeantur quęcunq̃ aristolochia rotūda participāt, radiceq̃ panacis, ac iridis, alumine scissili, moris, & mali punici flore. A uino uero abstineāt, depastionem enim dilatat. Quod si circa intestina crassa ulcus serpendo depascens consistat, ea quæ per sedem infusa crustas inducunt, adhibeantur: cuius generis sunt pastilli Faustini, & consimiles, & maximè qui Nymphodoro est inscriptus, quo etiam nos utimur: itē qui ex thallia, id est, oleæ ramulis constat, quorum omnium compositiones paulo post dicemus. Cæterum cum attentione crustam inducentibus uti oportet, excellentem ipsorum facultatem reuerendo. Porro cancerosa & maligna, quę cacoethe Græci appellant, intestinorum ulcera ferè in totum incurabilia existunt, neque tamē citra auxilium relinquere oportet, sed uehementes dolores mitigare: optimum autem & his est asininum lac recens mulctum potatum: si quis enim eius usum sustinere possit, nullumq̃ aliud nutrimentum accipiat, plurimam salutis recuperandæ spem habebit. bonum est & bubulum ac caprinum recens mulctum, si illud non adsit, bonum est & scissile lac cum amylo. Præbeantur autem eis & oua cruda, ac iuscula gallinarum & perdicum. Succus etiam præbeantur omnes qui facultate obtundendi dolores præstant: infusa quoque eiusdem generis sint: pharmaca item his cōueniunt omnia, quæ ad dysentericos à uenentorum acceptione factos, conducunt. Cæterum irrigationibus & cataplasmatibus neque curantur cæcero-sa & maligna ulcera, neq̃ mitiora sunt. Vtere autē & ad eos infusis ad cancerosam uulnam describendis, & pharmaco ad caneros mammarum, ex uino adriano & rhoē qua coria tinguntur, apparato. Porro si à uenenati pharmaci portione, ubi mortis periculum fuerit deuitatum, dysenteria oboriretur, his quæ à uenenorum potu conueniunt, erit utendū. Triplicis autem modi remedijs in his qui uenenum biberunt utimur, uomitorijs uidelicet, & obtundentibus atq̃ extinguentibus in quorum numero etiā acria comprehenduntur. Vomitoria itaq̃ remedia mox à ueneni potu sunt accepta. Extinguentia uero quæ acria sunt, tanquam ulceribus minime conuenientia, recusamus. Alterum igitur tantum genus extinguentium, hoc est, aromatica adsumemus: itemq̃ ea quæ obtundendi uim habent. Ex cibis itaq̃ conueniunt pisanæ succus, aut halicæ succus cum anetho decoctus, aut palmis aut mali punici acinis. Itē radicis dulcis succus: cum his etiam tum gallinæ, tum perdices decoqui possunt donec eliquescant: cerebella itē ac pedes eliquata præbeantur, & sorbitiones ex amylo & lacte, quibus anserinus aut gallinaceus adeps est ammixtus. Ex pharmacis autē eis cōducunt quę de uenenis referētur in tertiodécimo Sermōe. In potu uinū non inconueniens est tenue & album, nisi febris aut inflamatio adsit. Cæterū cataplasmata & somenta in eis quibus ex bilis acredine dysenteria oborta est, uitabimus. Quod enim leue & bene succulentū in intestinis est, id distrahit ac diripiūt: quod uero nulli usui est, & mordax, in ipsis relinquunt.



*Cura eorum qui aurum, aut æs, aut tale quippiã deglutiuerunt.*

Cap. XLVI.

Si quis auro, aut ære, aut ferro, aut aliquo alio huius generis deglutito, sanguinem per uentrẽ egerat, malug aut seminis lini succo multo, in potu exhibito, lapsum facies deglutiti, supra hoc quod & in intestinis obortã lenies asperitatẽ. Ego uerò, inquit Antyllus, quum quidã per iocũ anulum aureum deuorasset, & ramentosa ac cruenta infernẽ egereret, ob sculpturã uidelicet asperitatẽ: in ipso enim auro capitulum inerat asperẽ concinnatum: non sum immoratus his quã lubricas uias reddunt, sed cõfidenti animo ad ea quã fortiter purgant pharmaca sum progressus: quare contigit unã cum recrementis anulum excidere: quo facto, homo ipse ex pitisanã succo, ac forbilibus ouis nutritus, tertiã die sanus euasit.

*Communia remedia dysentericorum quã supernẽ exhibentur.*

Cap. XLVII.

Porro ubi memor fueris remediorũ iam antẽ in unaquãq; dysentericã specie dictorum, expedite inuenies, iuxta eundẽ planẽ modũ, quomodo & cõmunibus remedijs, quã nunc dicenda supersunt, utaris. Cõmixta enim reperies hic remedia omnia simpliciter scripta quã dysentericis cõueniunt: nimirũ adstringentia, obtundentia & resiccantia. Et simplicia quidẽ quã tum dysentericis, tum coeliacis in potu dantur: alia quidẽ adstringẽdo, & firmitatẽ addẽdo, humoresq; inspissando, uẽtrem cohibet; alia autem obtundendo, alia etiam urinam ciendo, ac fluxionẽ transferendo. Quẽ itaq; urinã ciunt, omnibus sunt manifesta, & sæpe in hoc opere descripta, quibus etiã hic uti oportet. Quã uerò adstringunt cõmoda eis hæc sunt: lapathi syluestris maximẽ semen, alterius autẽ lapathi tum semen, tũ radix, trita aquã inspersa ac potata, filiquã aridã comestã, rhus cultanarius, gallã, spinã Aegyptiã semẽ, malicoriũ aridum tritũ, rubi radix, unumquodq; eorũ cum aqua ad tertias decoctum, aut tritum potui inspersum, ladanum cũ uino austero, acaciã succus, hypocisthidis succus, lysimachia, balauistiũ, sideritidis heracleã folia & radix, salicis folia, symphyti radix & folia & semen, rheon ponticum, althear radix, gnaphalium cum uino austero, hippuridis succus cum passo, loti arboris bacca, & ligni lotini scobs, potui inspersa & potata præclarẽ faciunt, cortex thuris tritus potatus, lemnia terra quã sphragis appellatur, minium sinopicum, œnanthe polentã modo potata, holoschoeni iunci fructus torrefactus, uerbasci radicis drachm. ii. mora acerba in sole desiccata, ac trita liquori potando atq; obsonijs inspersa, mora rubi acerba similiter exhibita, acini uuã, ac uuarum passarum tum aridi triti, tum in cinerem exusti, plantaginis semen aridum tritum, similiter folia & radix, maceris cortex. Ex eorum autem numero quã aliquo modo adstringunt, uerum magis obtundunt, est aster samius, & amyllum. Obtundit autem tragacanthus & gummi. Resiccant coagulum leporis ex aqua, cornu ceruinum ustum, herinaceorum testã ustã, itemq; ostreorum, & cancrorum maximẽ fluuialium, atq; etiam marinorum testã ustã ac tritã; egregiẽ facit & saluã decoctum.

*Composita pharmaca quã supernẽ exhibentur.*

Cap. XLVIII.

Vinũ uetus adstringens ad tertias decoquito, mellisq;

optimi equale pondus adiũcto, rursusq; donec in cõpagem cogatur coquito, & ante cibum mystri mensura exhibeto. Aliud Asclepiadã. Ouum recens in uas quoddam euacuamus, putaminẽq; eius mel optimum ac uinũ uetus adstringens, malicoriumq; tenuissimẽ tritũ demetimur, piperisq; granis x. adiectis, hæc simul in sartagine torremus, atq; tertiã inde partẽ ielunis cũ pane præbemus. Sũmẽ etiã prodesse quod sequitur scimus. corticis thuris, seminis plantaginis, & quales partes tritas, uino diluto ad trium cochleariorũ mẽsurã insperge, ac ante cibũ exhibe. Caninũ etiã stercus album, tritũ, lacti scissili & per filices decocto inspersum, summẽ dysentericis auxiliatur, si lac ipsum in cibo sumatur. Cãterũ canẽ ipsum per præcedens triduũ, nullo alio cibo quã ossium comestione nutrire oportet. Aliud ualdẽ approbatũ, cuius usu scimus multos à morbo liberatos. Gal-larum tenuissimẽ tritarũ, piperis, rhois culinarij, malicoriũ tenuissimẽ triti, singulorum æquales partes misce, ac cũ uitellis oui subige, & in mali punici uacuam testã cõijce, ex eodemq; sumpto putamine os testã contege: deinde totã mali testã fermento forinsecus oblini, & ad prunas assa: post uerò ex hac ipsa mali punici testã repurgata cochleariũ ante cibũ edẽdũ præbe. Aliud quod & coeliacis prodest. Baccarũ myrti nigrarũ cochlearia iii. anisi, rosarũ siccarum, œnanthes, acaciã, singulorũ cochleare unũ. Palmarũ carne subige, ac drachmã unã præbe. Si œnanthe haberi nõ potest, uuas immaturas siccatas cõijce.

Aliud Marciani, ad eos qui neque potum, neq; cibũ accipiunt, sed pro desperatis habetũ. Baccarum myrti albarũ quincuncẽ, malorũ cotoneorũ medio-crium ac pulchrorum numero duo, aquã sextarios iii. scobis corticis arboris loti sextantem & uncie dimidiũ. Decoquito simul donec sextarij duo reliqui supersint, ac quantum possint bibendũ præbe, idẽq; etiam per clysterem infundito. Eiusdem facultatis est loti scobes potatus, atque amplius adhuc eo præstat eius decoctum. Quod si lotus non adsit, cortice pini utaris. Aliud Marciani. Aloẽs ad carbonum formam exustã unciam i. malicoriũ usti unciam i. seminis lini usti unciam i. contẽre & præbe cochlearia duo, his qui febre carent cum uino antiquo. Ego uerò, inquit Marcianus, quotiescunque hoc exhibeo, duorum terrestrium herinaceorum membranam internam, quã cibum complectitur, desquamata adiũcio. Quare hanc membranam illotã accipito, siccatõ, ac adseruato. Per se enim huiusmodi pelliculẽ potatã uentris fluxiones sistunt. Aliud Marciani, cuius uilitatẽ ne cõtemnas: seminis anethi, apij, scœniculi mōtani, piperis, sing. un. i. in testacẽ pilã cõijcito, atq; ubi probẽ cõtriuieris, herinaceorum terrestriũ internã membranam illotã, ac per se cõtusam & cribratã unc. i. pondere immisceto. Deinde uinũ purum uetus quantũ satis uidebitur, in nouũ uasculum infundito, & laminã ignitã ex ferro quod stomoma uocant, nõ minorẽ libra in uino extinguito, & adiectis aridorũ drachmis duabus bibẽdum præbeto. Tantũ enim ad summũ datur, atq; hoc medicamine multos ille desperatos seruauit. Aliud multa experiẽtia cognitũ. Cochlearũ terrestriũ maximẽ montanarũ, uistarum, carnẽ trium drachmarũ pōdere accipito, piperis scrupulos viii. simul cum æreo pistillo in puluerem redigito, & uini ueteris sexun-



cem, tantundemq̃ gari affundito, ac simul unia omnia in tres partes diuidito, & per tres horas exhibeto. Oribasius autem sic cochlearū unā cum testis exustarū unc. i. alij trientem habēt, gallē sextantem, piperis unc. i. in puluillū redige, ac obsonijs insperge, aut cum aqua, aut uino albo tenui præbe. Præclare auxiliatur hoc dysentericis, quibus ulcus nōdum est putrefactum. Aliud Marciani, quod Phemus appellatur. Myrrhæ, opij, balauſtj, rhois rubri, cuiusque unciam unā, anisi sesquunciam, spinæ Aegyptiæ quadrantem, lentisci quadrantem. Cum decocto corticis lotini ligni subigito, & nucis pōticę magnitudine præbeto, cū lotini corticis decocto: quod si lotinus non adsit, mespilino pro eo utaris. Catapotium dysentericum ualdē pulchrum, Asclepiadæ.

Radiciſ symphyti, seminis ericæ, malicorij, gallarum æquales partes subige, & in catapotia digere, ex quibus obolos tres cum uino, aut aqua deuorādos præbe. Aliud eiusdem. Gallarum drachmas quatuor, opij asiani drachmas duas, petroselini drachmam unam, aqua subigito, & catapotia formato, exq̃ eis ad ciceris magnitudinem præbeto, aut quācum uires tolerare possunt. Aliud. Thuris, acaciæ, opij, gallæ, æquale pōdus singularem cum succo intyborum subige: indeq̃ ad ciceris magnitudinē aut pro uirium tolerantia præbe. Aliud. Florum rosarū, opij, acaciæ, gummi, succi hypocisthidis, cuiusq̃ trientem, seminis & succi plantaginis, cuiusque sextantē, succi rosarū unc. i. In catapotia redigito, ex quibus obolos tres dato. Pastillus ex seminibus, qui in Alexandria præparatur. Anisi unc. i. foeniculi unc. i. seminis hyoscyami quadrantem, seminis apij quadrantem, alij tantum drach. iiii. habent, opij unc. i. dauci unc. i. aqua subigito. Oribasius autem hoc modo: Anisi, ammi, foeniculi seminis, apij seminis cuiusque drachmas tres, petroselini drach. ii. opij drachmas duas. Valet cœliacis, dysentericis, cholericis, & tussientibus. Pastillus trigonus, hoc est, triangularis appellatus. Seminis apij sextantem, seminis hyoscyami unc. i. opij unc. i. unā, anisi unc. i. aqua subigito. Aliud Andromachi, ad cœliacos & dysentericos. Rhois culinarij drach. iiii. piperis drach. iiii. myrrhæ, croci, acaciæ, scobis corticis loti, ammi, cuiusq̃ drach. ii. spicæ nardi, lycij, gallarum, succi hypocisthidis, opij, aloës, anisi, cuiusque drach. i. cum rubi succo subigito, & ante somnū iiii. obolorū pondus ex aqua præbeto: non febrientibus ex uino frigido. Pastillus Philippi, ad diuturnas dysentericorum affectiones leuās dolorem, & bibitur & infunditur, & forinsecus quoq̃ imponitur, melle cocto aut palmis pāsis subactus. Acaciæ, balauſtiorum, hypocisthidis, rhois rubri, opij, thuris, myrrhæ, croci, gallarū, lycij, aloës, rhei pōtici, baccharū myrti nigrarū, malicorij, singulorum drach. iiii. uino ueteri adstringente subacta in pastillos digere, & nō febrientibus obolos iiii. ex uino præbe, febricitantibus uerò ex hydromelite. Ego autem hoc pastillo utor, & feliciter mihi succedit, omnibus quidem prædictis ad eius compositionem adiectis, præter thus & rhoēm. Ad hæc autem omphacij, floris mali punici, cassiæ, castorij, aluminis scissilis, rosarum repurgatarum & siccarum, singulorum æquale pondus addo. Catapotium bonum. Abrotoni sextantem, sarcocollæ unc. i. gummi parum, ut ex eo cogit

ac formari possint. Catapotia ciceris magnitudine formato, & ieiunis unum deuorādam præbeto, similiter unum ante somnum. Aliud Oribasij, ad dysentericos & hæmoptoicos, fluxumq̃ muliebrē. Succo hypocisthidis, terræ samii, gallē omphacij, acaciæ ruffæ, cuiusq̃ drach. viii. cum aqua pluuiali subige, & pastillos forma, ac utere. Ad dysentericos quidem in potu exhibitis, ac per clysterem cum succo oryzae, aut lentis, aut aliquo cōsimili, infusis. Ad hæmoptoicos uerò, cum aquæ frigidae sesquicyatho eius drach. i. Ad fluxum autem muliebrem, cum succo solani, aut sanguinariæ, aut plantaginis lana exceptos subde. Aliud parabile. Alumē liquidum tritum cum ouo absorbendum præbe, & rursus aqua calida dilutum bibendum exhibe, & admiraberis. Sedat diuturnas dysenterias, & in quibus cruenta excernuntur. Aliud. Pumicem in tenuissimum puluerem redactum, cum ouis sorbilibus, cochlearij mensura præbe, & miraberis. Aliud exquisitum. Fici folia arida contusa cochlearij mensura cum uino austero dato. Aliud. Macer, mali punici florem, æquali pondere contunde, & ex eis scrupulos duos cum uino adstringente præbe. Valde commodum hoc est in his qui cruenta egerunt.

Pastillus ad dysentericos & cœliacos. Anisi, seminis apij, ammi, balauſtiorum, succi hypocisthidis, seminis hyoscyami albi, singulorum drach. viii. opij drach. iiii. Exhibe his qui integræ sunt ætatis drachm. i. cum aquæ calida cyathis tribus. Polyidæ Sphragis, cœliacis, dysentericis, quartanarijs, & oculorum fluxionibus conducens: dolorem enim adimit & resiccat. Hyoscyami albi seminis drach. iiii. seminis apij drach. quatuor, anisi drach. ii. opij drach. i. contere cum aqua, & informa pastillos obolares: ex quibus unum cum aqua frigida præbeto.

Quæ infernè dysentericis infundantur. Cap. xlix. Pastillus Nymphodori, ad dysentericos, & ulcera depascendo serpentina omnibus præstantior, quemadmodum experti sumus, inquit Archigenes: composuit quidem ut Faustinus, dissonans autem in auripigmēti appōderatione: opere uerò longē efficacior eo cognitus. Cuius compositio hæc est. Chartæ ustæ drach. xxx. auripigmēti drach. viii. calcis uiuæ drachmas x. sandarachæ drachmas vi. uini austeri sextarios iiii. Vinum ipsum per se coquitur, donec tertia pars reliqua fiat, cum qua arida in mortario teruntur, donec in compagem terēdo redigantur, ex quibus deinde pastilli drach. iiii. aut trium siue duarum etiam formantur, quorum usus iuxta ægri uires adhibetur: cum uino autem & aqua infunduntur, ita ut cum aqua lenticula, rosæ siccæ, ac cortex lori decoquantur: cum uino uerò baccae myrti, ut ex utrisq̃ hemina mensura supersit. In uniuersum autem, non solum in huius pastilli, uerum omnium qui crustas inducunt usu, stomachum hora una ante eorum exhibitionem, ex oleo myrteo ac uino ueteri irrigare oportet, itemq̃ caput ex oleo largo. Quæ enim crustas inducunt, si infundantur, & stomachum & caput offendere consueuerunt. Ante infusionem autem frusta panis duo aut tria ægro exhibenda, ex aqua frigida aut lactei teporis, si uehemens adsit febris: aut uino diluto, si parua fuerit febris & nullius pēsi, pane madefacto. Quod si ab infusione stomachus exuratur aut subuertatur, aquæ frigida cyathi tres



hi tres confidenter in potu præbeantur: exhibendus & lactucæ caulis cum pane & aceto: oliuæ item albæ ex aceto. Cæterū his qui statim ubi infunditur pharmacū, rursus reſciunt, imò penitus infusum retinere nequeunt, muriam præinfundere oportet: aliquādo etiam salis ammoniaci cochleare i. aut amplius tritum, pharmaco est ammiscendum, nullo habito mordacitatis respectu. Virilitas enim omnem dolorem exuperans inde procedet. Viimur autem frequenter oliuarum albarum muria cōditarum liquamine, hemina nimirū una ex eo infusa, semihoræq; interstitio facto, aut paulo diutiore, pastillū ipsum consequenter infundentes, quo modo facile ipsum continent. Et pharmacum sanè magis efficax sit, ubi nuda ulcera contigerit. Si uerò neq; sic continuerit, iterū atq; iterum infundito: munitum est enim pharmacum ne crustas inurat. Porro ubi efficax fuerit pharmacū, & uicerit affectionem, multa cū ipso mucosa ramenta prodibunt, & à multis molestiis, egerendiq; promptitudine, distentionibusq; liberabit. Infusum autem ipsum non ultra duas horas retinendum est, neq; infra unius horæ spatium. Atq; hic canon uniuersalis tibi in omni crustas inducente infuso proponatur, unā cum hoc quod & stomachus & caput sit præmunitum. Ante infusionem etiam anus ex oleo dulci illinatur, maxime uerò adipe quopiā ipsa fistula crassius perlinatur. Post infusionem cum spongijs aut glomis decocto quopiam adstringenti imbutis, sedes foueatur: adiuuat enim hoc ipsum infusi retentionem. Mirabiliter etiam prodest Andronis pastillus duarū aut unius drachmæ pondere infusus. Pastillus ad dysentericos, cuius multam experientiam habemus, admirabilis enim in ulceribus serpendo depascentibus existit, nō solum dysentericis, sed oris etiam gingiuarum, & ad omnem nomen serpentem. Calcis, auripigmenti, chartæ ustæ, squamæ æris, æquales omnium partes ramulorum oleæ decocto seu succo subigito, ac uitor cum oryzæ succo. Exuccatur autem olea hoc modo. Ramulos oleæ contundito, eisq; congruentis mēsuræ aquam affundito, atque donec quater efferbuerit decoquito, expressoq; succo uitor. Faustini insignes pastilli: quorum alter constat ex chartæ ustæ drachmis x x x. calcis drach. x v. auripigmenti dra. x ii. sandarachæ dra. vi. Infunditur duarum drachmarum pondere cum rhois & baccarum myrti decocto. Si uerò diuturna sit affectio, salis etiam drac. ii. adhiuntur. Alter uerò constat ex calcis drachmis decem, sandarachæ drach. vi. auripigmenti drachmis octo, chartæ ustæ drachmis triginta, hæc in pastillos redigito, ac uitor, quemadmodum in Nymphodoti pastillo est prædictum. Alter adhuc pastillus Faustinus, qui in Alexandria præparatur. Auripigmenti trientem, sandarachæ trientem, calcis uncias duodecim, acaciæ uncias x ii. subige cū uino. Pastillus Philadelphus, ad dysenterias, & sanguinis eruptiones, & omnes nomas.

Sandarachæ, auripigmenti, cuiusque quadrantem, calcis sexuncem, acaciæ sexuncem. Excipe plātaginis succo, aut uino austero, & pastillos drachmarum quatuor, aut trium, aut duarum informa, atque pro ægri uiribus infunde cum uino myrrite.

Eras autē hoc modo ipsum præparat. Auripigmēti bessēm, acaciæ trientem, calcis trientem. Pastillus alius, dysentericis commodus, qui euestigiō aluum

sistit, quod multo experimento constat. Bituminis, auripigmenti, sandarachæ, aluminis scissilis, squamæ æris, cuiusque drachmas quatuor, chartæ ustæ drach. x. calcis drach. viii. succi hypocisthidis drach. iiii. balaustiorum drachm. iiii. opij drachm. ii. Cum uino myrrite subige, ac utere uelut in Nymphodoti pastillo prædixi. Pastillus ex subere appellatus, quo uelut præter opinionē admirando utor. Galatæ ustæ, chartæ ustæ, suberis ex uase uini ueteri accipit ac usti, panis aridi usti, singulorum drachm. x v. auripigmenti drachm. x x. sandarachæ drach. x. calcis uiuæ drachm. x. acaciæ drach. v. cerusæ drach. v. spumæ argenti drachm. iiii. omphacij drachm. iiii. fecis uini ustæ drachm. v. Cum uino adstringente subige, & informa pastillos drachmarum iiii. & iiii. & ii. In principio autem hos cum plantaginis aut sanguinaris, aut perdicij succo infundito: aut cum aqua tepida, si hæc non adsint: si uerò morbus fortis sit, & in uigore consistat, cum fœni græci aut lini seminis decocto infundito: in declinatione autem cum myrti & rubi decocto ex uino. Et in pueris quidē cyathorum duorum mensura: in fœminis, trium: in uiris uerò qui ad perfectam ætatem accesserunt, quatuor infundatur. Pastillus Asclepiadæ, dolorem sum mouens, somnumq; inducens. Diuturnis dysentericis adfectionibus euestigiō auxiliatur, si absit febris. Chartæ ustæ drachm. iiii. auripigmenti, sandarachæ, squamæ æris, aluminis scissi, omphacij, lycij, acaciæ, succi hypocisthidis, calcis uiuæ, cuiusque drachm. v. opij drachm. ii. croci drachm. ii. Vino myrrite excipe, & in pastillos redige, quatuor & trium & duarum etiam drachmarum. Iuxta ægri uires cum paksi cretici cyathis vi. his qui integræ sunt ætatis infundito. Pastillus alius dysentericus.

Auripigmenti sextantem, sandarachæ quadrantem, squamæ æris unciam i. calcis trientem, aluminis scissilis sextantem, chartæ ustæ quincuncem, omphacij sextantem, acaciæ sextantem, succi hypocisthidis sextantem, thuris unciam i. opij quadrantem. Vino myrrite aut aliquo alio austero excepta subigito. Quod si quis infusum non contineat, sed statim ipsum reiectet, omnino morti propinquum iudicaro, quemadmodum sæpe iam sum expertus. Infundito autem ex eo uelut ex præcedente drach. i. tantū. Pastillus, thronus Marcellius appellatus. Auripigmenti quadrantem, sandarachæ trientem, lentisci trientem, balaustiorum quadrantem, alij dextātem, habent, opij sextantem, calcis bessēm, omphacij sextantem, succi hypocisthidis quadrantem. Vino austero subige, & utere ut pastillo Nymphodoti. Pastillus Lycos appellatus, ad dysenterias eos. Sandarachæ drachmas sex, auripigmenti drach. x ii. calcis uiuæ drac. x. æris usti dra. x x. acaciæ drac. vi. cadmiæ drach. x ii. chalcitidis crudæ drach. x ii. rhois culinarij aut quo coriarij utuntur, drach. iiii. succi hypocisthidis drach. iiii. baccarum myrti nigrarum recentium drach. vi. foreos drach. i. misyos crudi drach. i. gallæ drachmas viii. omphacij drac. i. lycij drach. viii. Vino myrrite subigito, affuso etiam plātaginis succo, & pastillos drachmarū iiii. & iiii. & ii. formato: cum uino uerò adstringenti infundito, ægri habita cura, uelut in Nymphodoti pastillo est prædictum. Pastillus magnus, dysentericos præclare & feliciter iuuas, etiā si extreme sint affecti



ac desperati, utpote in quibus carnosæ & seculenæ prodeunt egestionēs. Infunditur autem cum succo oryzae, ita ut adeps hircinus & myrtus cū ipso decoquatur. Cæterū in his qui retinere non possunt, muria oliuarū albarum præmittenda, & post horæ interstitium pastillus infundendus, stomacho & capite præmunitis, uelut in Nymphodoti pastillo est prædictum, anus itē ab infusione fomentis integatur. Prodest etiā ad caua ac profunda crustosāq; ulcera, itēq; nomas pudendorū. Verum in dysentericis præstat, ut cū reliquis prædictis remedijs, manus ægri latis & longioribus fascijs constringantur, supernè ex humeris exordio facto, & in summos usq; digitos ligamento protenso; nō parū enim hoc ipsum ad fluxus repressiōē facit. Porro ipsius pastilli cōpositio hoc modo habet. Balauftiorum recentium, malicorij, rhois quo coria tinguntur, phyllorum, singulorum drach. iiii, isatidis tinctoriæ drach. iiii, alij dra. vi, habent, spinæ Aegyptiæ drachmas iiii, seminis hyoscyami drach. iiii, farinæ lentium drach. v, suberis ex uase uini ueteri accepti ac usti drachm. iiii, gallæ omphacinae à teredinibus nō corrosæ drach. iiii, rosarum siccarū drach. vi, floris recentis rosarū drachmas sex, croci drach. iiii, myrrhæ drachm. viii, lycij drach. viii, bituminis drachmas sex, picis sicce drachmas sex, acaciæ drachmas octo, hypocisthidis drachmas octo, gummi drac. x x x ii, thuris masculi drac. viii, omphacij succi sicci drach. iiii, opij drachm. ii, amyli drach. ii, solearum ueterum ustarū drachmas quatuor, cornu cerui usti drach. iiii, ossiculorū oliuarum ustorum, ossiculorum palmarum ustorū, fecis uini ustæ, spongiarum nouarū liquida pice & cedria imbutarum ac ustarū, ostreorum ustorum, æris usti, squamæ æris, sing. drac. iiii, lapidis gagatæ, coralli, rubiginis ferri, aut scorix, cuiusq; dra. iiii, aluminis scissilis in testa exusti drach. ii, aluminis quo tinctorum coriorum utuntur drac. ii, auripigmenti drac. iiii, chalcididis crudæ drac. iiii, sandarachæ drac. iiii, gypsi loti drach. iiii, calcis uiuæ drach. iiii, minij sino pici sesquidrachmā, atramenti communis drach. ii, diphrygis dra. ii, & dimidiā, spumæ argenti drach. ii, & dimidiā, ochræ drach. ii, & dimidiā, atramenti Indici drac. ii, & dimidiā, plumbi drac. iiii, cerusæ sesquidrachmā, terræ samia drach. iiii, terræ cimolix drac. ii, pompholygis drachmas duas, succi mandragoræ & plantaginis quantum ad hæc suffecerit. Compositio quidē igitur pastilli hæc est, in qua totus ille simplicium pharmacorū cumulus, ex quin quaginta quinque rebus constat, præter herbarū ex aqua decoctionem, quæ ad huius pastilli subactiōnem accommodatur. Cæterum apparandi modus huiusmodi est. In pilam thebaleam primum æs, & æris squamam, & spumam argenti, calcem, lapidem gagaten, corallium, rubiginem ferri coniecto; ostrea etiam contusa & cribrata probè & contentè teratur, donec in piluillū redigantur; deinde adiecta chalcitide, sandaracha, auripigmento, cornu ceruino, oliuarumq; ac palmarum ossiculis, spongiæq; & alumine, rursus terito, affusis etiam spissamentis, quæ stymmata Græci appellant. Alumen autem hoc modo uritur. Alumen in ollulam nouam coniectū super prunas posito, & ubi diffunditur ac liquefcit tollito, & frigeferi finito, & hoc modo tritum adiecto. His deinde tritis, minium, diphryges, atramentum indi-

cum & cōmune, ochran, plumbum, terram samia, cimoliam, cerusam, pompholygem, reliquaq; omnia metallica addito, & contentissimè sub caniculæ æstu conterito, donec ex spissamentis quarram aut quintam addideris partem. Postquam uerò quodam modo ad collyrij formam fuerit redactum, arida contusa & arctissimo cribro excussa adiecto, ueteribus soleis simul cum aridis contusis; deinde adiectis spissamentis rursus similiter ut priora terito, sæpe instillatis spissamentis. Vbi autem trita inauerint, in altero mortario primum crocum cum duobus succis, mandragoræ uidelicet & plantaginis, terito; atque ubi tritum fuerit, reliqua adiecto, myrrhā scilicet & thus, omphacium, acaciā, hypocisthidem, gummi, lycium, opium, picem, bitumen, & lentium farinam, quodlibet eorum prius per se aridum in tenuissimū puluerem redactum. Cæterum ubi optimè in mortario fuerint trita, duobus succis largè affusis, quo etiam ad aliorum exceptionem sufficiant; de cætero iam antè trita metallica sic arida terito ac admisceto: omnibusq; probè permixtis ac subactis, pastillos ad duarum magnarum fabarum magnitudinem formato, & utitor aliquando quidem cum oryzae succo, aliquando uerò cum uino, aut aliquo conueniente liquore. Ego uerò ob mandragoræ uiridis succi inopiam, aridi succi drachmas quatuor addo. Porro spissamenta cum quibus pastillum conteris, hoc modo apparato. Rubi, myrti, florum mali punici, radicis symphyti, radicis capparis, foliorum salicis, comæ cupressi, omnium æquales partes cum aqua coquito, & utitor. In his ipsis uerò spissamentis, aut etiam alijs, spongiā aut glomos rigato, cumq; eis sedem foueto, assidue quidem, maximè uerò à pastilli infusione. Siccum dysentericum. Terræ lemnix quæ sphragis appellatur, terræ asteris, amyli, gummi, thuris, æquales partes omnium in puluillū redactas, cochlearij mensura infundito, spissamentis etiam quibusdam adiectis. Indus autem Medicus hoc utitur. Terræ lemnix quæ sphragis, buccinorum ustorum, thuris, singulorum æquales partes commisce, indeq; cochlearia duo cum lotini corticis decocto, aut pinus, aut mespili, infundito. Quæ dysentericis subdantur. Glans quæ dysentericis subditur, Theosebij. Opij drachmas x i, myrrhæ, castorij, croci, thuris, hypocisthidis, cuiusque drachmas sex, styracis drachmas tres, uino excipito. Alia glans, siue collyrium. Opij, croci, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum æquale pondus cū uino ueteri subige, & collyria drachmæ unius pondere informa, ex quorum usu & subditiōe diuinam efficaciam admiraberis. Optimè facit & ad dysentericos opobalsamum tomento exceptum & subditum. Spissamenta, quæ dysentericis cataplasmatibus uice imponuntur. Florum mali punici, gallarum, malicorij, myrti sicca, leuisci, mannae, acaciæ sicca, æquales omnium partes in puluerem redigito; quem siccum adseruato ac utitor, ita ut usu expetente cū uino decoctum imponas; magis uerò mitigatorium fiet, si sapa pro uino accipiatur. Illitio, ad coeliacos & dysentericos.

Acaciæ quadrantem, gallæ, ænanthes, malicorij, balauftiorum, aloës, succi hypocisthidis, mastiches, aluminis rotundi, omphacij, singulorum unciam unam, cum uino subigito, ac formato pastillos: quibus cum uino aut succo aliquo conuenienti utaris.

Epith



*Epithemata dysenterica.*

Cap. L.

Epithema dysentericis commodum, Marciani. Mala cotonea repurgata decem, in uino decoquito, diligenter terito, ac tritis aloës unciam unam, manne sextantē, myrrhæ siccae trite quadrantē infarcito, de inde cerę sexuncē, unguētī nardīni librā unā addito. Ceratum ipsum liquefacito, & refrigerato, tritisq; adhūc cito, ac utitor. Epithema ex cœnāthe, Philumeni, stomachicis, & cœliacis dysentericisq; in principis cōmodū. Oenāthę siccę drachmas x x viii. gallę, acacię, rosarū siccarū, omphaci, singulorū uncia unā, aluminis rotūdi sextantē, aloës sextantē, rhois syriaci trientē, olei myrtei librā unā, cerę librā i. picis li. i. Quidā uero singulorū libras duas accipiūt. Arida uino ueteri adstringēte rigato, deinde liqueficientia adhūc cito, ac simul emollita excipito. Efficaciter auxiliatur ad interaneorū fluxiones, & stomachi fastidia ac exolutiones, & ardores. Aliud, per multā experientia. Rosarū, cœnāthes, acacię, gallę, aluminis scissilis, singulorū quadratē, aloës sexuncē, rhois culinarij librā unā, cerę, picis, olei myrtei, cuiusque librā unā, uini quantū sufficit. Epithema ex lixiuio.

Ammoniaci thymiamatis, nardi celtici, croci, cardamomi, bdeli, cyperorū, singulorū uncia i. lixiuij ex cinere lignorū uitis sesqui uncia, cerę quadrantē, unguētī nardīni sexuncē, uini quantū suffecerit. Apparatur autē & hoc modo. Croci uncia i. aloës quadrantē, styracis quadrantē, cerę sextantē, lixiuij ex cinere lignorū uitis, unguētī nardīni, cuiusque uncias xii. uini quod satis est. Illud superius appaui, & prae cœnāthes inopia, folia uitis conieci, in estate quidē uiridia, in hyeme uero eiusdem uirgulta, reliquis siccis, cōtusis & cribratis. Epithema, Clidiō appellatū: Cyrilli. Acacię, gallarū, thuris, aluminis scissilis, aloës, rhois culinarij, hypocisthidis, myrrhæ, balaustiorū, cœnanthes, rosarū siccarū, singulorū uncia unā, cerę dodrantem, picis, olei myrtei, cuiusq; dodrantē, uini spathitæ quantū satis est. Ex libris Philumeni, epithema Mnaseę, clidiō appellatū, ad cœliacos & dysentericos. Gallę omphacię, succi hypocisthidis, aluminis rotundi, acacię, rhois rubri, mali corij aridi, seminis apij, singulorū uncia i. uisci quercini drachmas quatuor, ammoniaci thymiamatis drach. iiii. picis siccę drachmas xx. cerę drachmas viii. olei myrtei aut lentiscini drac. xx. gallas & malicorij cōtusa ac cribrata in uini cyathis nouē decoquito, assidue agitando, donec tertia pars relinquatur: deinde in mortarium cōfecta terito, ac reliqua similiter in puluere redacta inspergito: ammoniacum uero aceto diluito, & uiscum cū modico oleo emollito, picis uero ac cerę liquefactis cū residuo oleo, & ab igne ablatis, uiscū adhūc cito, ac unito, & simul tritis affundito, fortiterq; contundito, ac utitor. Andromachi epithema, ad dysentericos & cœliacos.

Seminis hyoscyami albi, seminis apij, cuiusque drach. iiii. anisi, floris rosarum, succi hypocisthidis, balaustij, rhois rubri, cuiusq; drach. ii. opij drachmā unā, croci drachmam i. contere, ac uino myrtite excipe, informa q; pastillos, quos in umbra sicabis: usus uero tēpore, ex eis quantū suffecerit contundes ac cribrabis, & subiges, linteo loq; infartū uentri impones. Dropaces. Dropax ex tertio libro placitorum Sorani. Resinę librā i. picis siccę lib. i. nitri, biruminis, sulphuris uiui, cuiusq; libras ii. pyretri li

bras ii. ueratri sextantē, olei heminam unam. Si uero efficacius reddere uelis, adhūc & piperis trientē, adarcę sextantē, staphidis syluestris sextantē.

Alius dropax. Picis sexuncem, resinę pinus torrefactę sexuncem, myrrhæ, sulphuris uiui, nitri, cuiusque unciam unam, pyretri quadrantē, adarcę unciam unam, euphorbij sextantē, aliq; drachmas duas tantum habent, adipis taurini sexuncem. Vtendum autem & ad hęc rubefacientib. cutem, phœnigmis à Græcis appellatis, itemq; sinapismis, in tertio Sermonē descriptis, in declinatione præsertim dysenterię, quo totum malum penitus destruat.

*De lienteria, seu intestinorum leuore.* Cap. LI.

Lienteria, quemadmodū ipsum nomen indicat, leuor quispian intestinorum est, qualis etiam forinsecus in corporis cuticula, & ex cicatrice contingere solet. Oboritur autem frequenter, dysenteria magna præcedente, & ex profunda ulceratione, cicatrice densa & leui succedente, quæ deinde ob densitatem quidem suam, ciborū per corpus digestionem fieri non permittit, quum sanę uenarum ora sint ueluti obturata: uenarum inquam, quæ alimentum ex intestinis ad se auellunt. Ob leuorem uero, cibū statim prius quā permutationem & perfectam cōcoctionem admittat, dilabi sinit. Cæterū lienteria ipsa proprie ex permutantis cibos ac digerentis facultatis debilitate contingit, cuius signum est, quod cibi crudi & nihil immutati excernuntur, quæ ratio & ex hoc amplius corroboratur, quod non solum à dysenteria hęc affectio oboritur, sed & post frequentia uol uulosa tormina, & post longum profluuium uentris: aliquando etiam aqua inter cutem per uentrem euacuata, lienteria consequi solet. Ex quacūq; igitur causa lienteria orta sit, ægrī cibum nō sentiūt, & malum corporis habitū acquirunt, quod utrunque malum incorrigibile existit. Succedit enim ægris assidua excretio cruda, colore subalbida, inæqualis, & aquosissima, citra sanguinis ac bilis complexum. Adest autem simul & ardor per tota præcordia se dilatans, quem cibi fastidium concomitatur. Videtur autem bonum & amicum signum in eis ructus acidus esse. Indicat enim iucundi quippiam factum esse, & uentrem ac intestina nō uelut inanima cibum finire pertransire. Itaq; quum eiusmodi sit affectio, facile est intelligere, quod uim retentiuam, ac concoctoriam facultatem tum uentris, tum intestinorum, omni modo refocillare oportet, quod sanę per ciborum conuenientium exhibitionem fieri potest, perq; diætā restituendis ac refocillandis uiribus aptam, & ut simpliciter loquar, eodem medicationis ductu utendum est, quem ad cœliacos & dysentericos habes præscriptum. Cæterū quod dignum indicatione hic uisum est nobis: acrium rerum comestiones frequentiores eis aptæ existunt, & maxime quibus cicatricem factam esse coniectamus: acrium enim rerū comestio uelut refrigerationē quandam cicatricum operatur: quin & insitum calorem reuiuificat, & concoquendi facultatem quodāmodo refocillat. Porro uomitus à cœna uentrē etiā in melius transmutant, & actionis suę cōmonefaciunt: frequentes quoque dropacū admotiones ad manus ac crura, thoracemq; & uentrem, itemq; rubefaciētia ex malagmaris & ex sinapi eis commodæ existunt.

Potiones



Potiones etiam quasdam ad dysenteriacos & cœliacos præscriptas lintericis præpotandas exhibere cōuenit, quale & hoc catapotium existit. Catapotium dysentericum, maxime uero lintericis conueniens. Malicorij, myrrhæ, cuiusq; drachmas octo, alumi

nis scissilis drachmas quatuor, succi hypocisthi = dis drachmas quatuor, cum aqua catapotia ad erui magnitudinem ex his formato, indeq; quinq; aut septem iuxta ægri uires exhibeto.

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN

DECIMO SERMONE AETII  
CONTINENTVR.

|                                                                                      |                                                                                        |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b> E debilitate iocinoris, & his quibus sanguis per uentrem defertur. caput I. | Cura eorum in quibus splen, frigida, uenter uero calida affectione laborat. cap. XIII. | cap. XXIII.                                                                   |
| De oppilatione hepatis. cap. II.                                                     | Cura splenicorum quos tuſis inſestat. cap. XV.                                         | Epithemata quæ post euacuatos humores adhibita, pro glutino sunt. cap. XXIII. |
| De hepatis inflammatione. cap. III.                                                  | Cura eorum quibus splen in magnitudinem excreuit, simulq; durus est. cap. XVI.         | Aquam ducentia remedia, hydropicis ualde commoda. cap. XXV.                   |
| De hepatis abscessu. cap. IIII.                                                      | De ictero seu morbo arquato. cap. XVII.                                                | Quæ ad ciendam urinam hydropicis bibuntur. cap. XXVI.                         |
| Cura hepatis exulcerati. cap. V.                                                     | Cura arquati. cap. XVIII.                                                              | Cura post euacuationes. cap. XXVII.                                           |
| De hepate in scirrhum indurato. cap. VI.                                             | De malo corporis habitu. cap. XIX.                                                     | Cura hydropis qui proprie subtercus appellatur. cap. XXVIII.                  |
| De lienis affectionibus cognoscendis: ex libris Philagrii. cap. VII.                 | De hydropse siue aqua inter cutem. cap. XX.                                            | Cataplasmata ex lib. Asclep. cap. XXIX.                                       |
| Intemperiei splenis cura. cap. VIII.                                                 | Ascite ac tympanite hydropis cura. cap. XXI.                                           | Chirurgia hydropis subter cutem. cap. XXX.                                    |
| De inflatione splenis. cap. IX.                                                      | Epithemata hydropica. cap. XXII.                                                       | Reliqua prædictorum cura. cap. XXXI.                                          |
| De splenis inflammatione. cap. X.                                                    | Malagmata quæ euacuant humorem. cap. XXIII.                                            | Communis dieta omnium hydropicorum. cap. XXXII.                               |
| Cura splenis in scirrhum indurati. cap. XI.                                          |                                                                                        |                                                                               |
| De splenicorum uſtione. cap. XII.                                                    |                                                                                        |                                                                               |
| Splenicorum dieta. cap. XIII.                                                        |                                                                                        |                                                                               |

## AETII MEDICI GRAECI CONTRACTAE EX VETERIBVS MEDICINAE TETRABIBLI SIVE QUATERNIONIS

TERTII SERMO SECVNDVS ET EX ORDINE DECIMVS.

De dispositionibus iocinoris ac lienis, eorūdemq; affectionibus.

De debilitate iocinoris, & his quibus sanguis per uentrem defertur: Galeni. Cap. I.



**I**N TEMPERIES quidē causæ sunt, ex quibus iocinoris debilitas producit, dispositio nes autē diuersas in ipso faciūt: quū enim citra inflammationem aut scirrhum circa hepar, propter solā debilitatem, sanguinis effluxio cōtingit: tūc sanē propriē hepaticos ipsos egros appellāt, quemadmodū cœliacos & stomachicos uocare cōsueuerūt, eos qui neque inflammationē, neque aliquē aliū præter naturā tumorem in uisceribus habēt. Calidē itaque intēperies, tū eos qui prius adsunt humores, tū etiam hos qui per uenas mesenterij ad ipsum hepar deferūtur, adalsant ac cōburūt. Frigidē uero intēperies, humorē, qui iā in ipso continetur, crassum & lētū egreq; mobilē reddūt: eū uero qui defertur, pituitosum ac crudū & semicoctū. Ceterū sicca intēperies, sicciore & dēsiore humores facit. Humida autē tenuiores & magis aquosos. Itaq; ubi calida intēperies circa hepar cōstiterit, colliquationes fiūt, primū quidē humorū, deinde etiā carnosē ipsius hepatis substantiæ, bilisq; per uētrē euacuatur foetens ac crassa, abundeq; colorata, uelut in pestilētibus febribus fieri solet. Vbi uero frigida intēperies affue-

rit, neq; assiduę excretiones, neq; multę fiūt. Diuturnū autem sit malū, & per dies aliquot aceruatim eis profluet uēter: ceterū egesta nō similē putorē habent his quæ per calorē sunt colliquata, neq; colorē etiā, neq; cōpagē, sed speciē præ se ferūt sanguinis putrefacti & in grumos congelati: & si quis diligēter inspiciat, uelut limus & fex sunt sanguinis crassioris: cōsimilia enim atræ bili colore apparēt, quā & plures & iudicatu difficiles colores iuxta eandē dispositiōnē in excrementis apparēt. In sicciore aut intēperie, recrementa adhuc sicciore uidebuntur, egriq; magis sitiēt. In humida uero, humidiora, & plura erūt recrementa, siusq; minus inſestat. Quādoq; igitur egesta uideris loturę carnis recēs mactari animalis similia, uelut si quis cum aqua sanguinem confudisset, crassissimum signum debilitatis ipsius hepatis habebis: eodem modo, si uelut fecem sanguinis conspexeris per sedem excretam, hepaticum & hocce signum esse scito. Si igitur sanguis tenuis & serosus destillat, ægri uisceris signum iudicato: sin uero uelut fex fuerit, supercalefacti & sanguinem superassantis: incipit enim aliquando etiam citra febrem in frigida scilicet intemperie ipsa adfectio, quo tempore tenue sanguinis serum primum excernitur: temporis autem progressu, corrupto circa uiscus sanguine, leues febres accedunt, quarum



quarum quum in experti medici negligentes sint, atq; ægrum omnino febris carere putant, quum nihil per uentrem excretum sit, ipsum ægrum lauant, conceduntq; negligentiori diæta uti, atq; ita uenter rursus corruptum sanguinem ex cernit. In huiusmodi igitur affectionibus primus curationis scopus sit, ut intemperiem ad contrarium deducamus. Calidam enim dispositionem semper refrigerare oportet, frigidam uero calefacere, similiterq; humidam resiccare, & siccam humectare. Cæterum omnibus hepaticis remedijs, tum quæ per os sumuntur, tum quæ foris imponuntur, aliquid ex adstringentibus ammiscere oportet, quo firmitas uiscerum cõseruetur. Atq; in stomachicis idem facere non similiter cõducit, quum in ipsis adstrictoria qualitas aliàs dominetur. Fomenta igitur in hepatis debilitate cõuenientia ex oleo fiunt, in calida quidẽ affectione, ex chamemellino, rosaceo, & lentiscino, absinthio, aut palmis, aut aliquo alio consimili in oleo decoctis. In frigida uero dispositione, ex ungueto nardino, cui thus & samucus sint infarta. In humida autẽ intemperie, isdem oleis magis discutienda ac resiccantia incoquenda: uelut est iris, cuminum, ac ruta. In sicca demum intemperie, balnea sufficiunt dulcium aquarum, & humectans diæta cõmoda erit, cerata etiam atq; epithemata fomentis similia sint, ex palmis scilicet, malis cotoneis, styrace, mastiche, ac aloẽ: in frigidioribus etiã polyarchia conducunt, similiterq; in humidioribus. Porro in potu uti conueniet plerisque eorum quæ in hepatis inflammatione sunt relata, si quidẽ calida intemperies fuerit: uelut est seridis ac intybi succus, senecionis succus aut decoctum, perdicij succus, mel rosarum, & quæ his similia existunt: quin & Philonis antidotus semel tantum exhibita, omnẽ aliquando calidam hepatis intemperiem mirabiliter sanauit, quod etiam Philo de ea testatum reliquit. Vbi uero frigida in hepate intemperis fuerit, calefacientibus ac firmitatem addentibus utendum est, uelut est nardi spica, capnium, quæ & chelidonia herba circa sepes enata, semen pelecini, & quæ his similia existunt. Vtilissimum & his nardium unguentum, quotidie mane cochlearij mensura ieiunis potatum, & à coena ante somnum eodẽ modo. In humida autẽ intemperie, simpliciora ex eis quæ ab oppilatione liberant, exhibenda, & quæ à proprietate totius substantiæ efficacia existunt, uelut est, lupi nũ hepar, quod sanè diligenter tritum drachmæ unius pondere cum uino dulci aqua calida diluto præbetur. Hoc enim multiplici experimento cognitum omnibus hepatis intemperiebus cõmodum existit: utpote proprietate totius substantiæ hanc efficaciam habens, non calefaciendo, aut refrigerando.

De oppilatione hepatis, in quibus plurima remedia.

Cap. II.

A flatibus nebulosis & cõcoctu difficilibus: aliquando autem & à crassis humoribus uiscosisq; in finibus uenarum ex lima hepatis parte enatarum, per quas ex uentre ac intestinis alimenti digestio ad hepar cõtingit, oppilationes fiunt. Cõsequitur autẽ ad ipsas, grauitatis circa dextrum ilium cum dolore sensus, aliquando quidem obtusæ, aliquando uero uehementis, & quandoq; quidem absq; febre, quandoq; cum febre. Crassa enim & uiscosa ac multa, omnino amplius reliquis oppilat, & maxime si ægri à cibo uehementiori motu utantur; si uero acria sint & multa quæ

in cibo sumuntur, dolor ex oppilatione uehementior fit, quum obturata corpora simul & tensionẽ perferant, simulq; pũgatur. Cæterum quum uaporosi & crassi flatus multitudo coaceruetur, quæ exitum non habet, non grauitatis solum, sed & distensionis sensus oboritur. Quare attenuantiũ & oppilationem dissoluentium quamcelerrimus requiritur usus: oppilatio enim inueterata non tantum in hepate, sed in omni membro putrefactione operatur, febreq; accendit. Præclare autẽ & citra molestiam ab oppilatione liberat, simulq; firmitatem tum hepatis, tum stomacho addit, pelecini qui in frumẽtis nascitur semẽ, tritum cochlearij mensura, cum uino aut aqua mulsa in potu acceptum. capniũ item, quod & chelidonia nomen inuenit, succo eius expresso & desiccato: reponitur autẽ is in pastillos reductus, & semel quidem exhibitus dolorem omnẽ admittit autẽ præbitus, in totum ab affectione liberat, ultra hoc quod & firmitatem uisceribus addit: decoctum quoq; huius herbarum potatum similem efficaciam habet, etiã si ualde febricitent ægri: aliquando autem herba ipsa exiccatur, cõtusaq; & cribrata cochlearij mensura exhibetur. Aliud. Lupi hepar siccum drachmæ pondere, cum piperis granis 18. ac myrrhæ magnitudine fabæ, in passo calido datum, confestim auxiliatur. Aestatis autẽ tempore, alternis diebus, ter potandum præbeto. Liberat ab oppilatione etiam eupatorium, simulq; firmitatem addit, similiter quoq; stœchas, tum cocta, tum sicca tritaq; data: plantaginis itẽ radix, & semen, foliaq; sicca trita, siue per se unum quodq; siue simul exhibeantur. Lauri cortex tritus potatus, spica nardi, fructus pistacij, amygdalæ amaræ, anthemis siue chamæmelum, anagallidis quæ ceruleum florẽ habet, succus, radicis acori, eryngij, radicis dulcis decoctum urinam ciet, & aluum emollit. Radix dracunculi uiscera omnia repurgat, crassosq; & instar uisci tenaces attenuat humores. Filicis succus cochlearij mensura ex aqua mulsa potatus, hepar repurgat, oraq; meatuum ac uenarum aperit, citra manifestam calefactionẽ. Præscriptum autem istud antea est de his quæ tum simas, tum gibbosas hepatis partes ab oppilatione uendicant, in tertio nimirum Sermonem.

Catapodium hepatis oppilationem remouens.

Radicis chamæpityos drachmas 1111. radicis cichorii dra. 1111. contundito, ac melle cocto excipito, nucisq; ponticæ magnitudine præbeto: aquæ etiam calidæ cyathos tres ab eius exhibitione absorbendos dato. Cæterum non modo radices horum hepaticis optulantur, sed & succus & decoctum. Pastillus hepaticus, ex amygdalis amaris. Seminis anisi, apij, asari, amygdalarum amararum decorricatarum, comæ absinthij, singulorum drach. 1111. apparato, & cum aqua pastillos formato, ex quibus drach. 1. febre carentibus cum uini diluti cyathis 111. præbeto: febricitantibus autem, cum aqua mulsa. Urinam ciet, & placidè calefacit. Aliud hepaticum ualde commodum. Seminis pelecini, capnij, costi, cuiusq; drac. v. cõtundito ac cribrato, & cochleare 1. ex aqua mulsa dato. Præclare enim summouet oppilationem. Aliud hepaticum pulchrum, cuius uilitatem ne contempnas.

Lenticulam torrefactam ac probe tritam cochlearij mensura ex uino bibendam præbe. Commodum est hoc & leni, ex posca, aut aceto mulso. Aliud, experimento constans. Comæ absinthij, piperis, costi, calsiæ, radicis gentianæ, amygdalarum amararum, singulorum



singulorum unc. i. fœni græci sextantem, seminis pelecini sextantem. Exhibeto cochlearium quomodo-  
cunque uelis. Aliud, ad hepatis oppilationem.

Cacani scrupulos duos, alij octo habet, costi scrupulos sex, spicæ nardi, iridis, phylli, lupinorū siccorum, baccarum lauri, fœni græci, rhei pontici, singulorum scrupulos sex, piperis, phu, asari, cuiusq; drachmas quatuor. quod si picis siccae scrupulos tres ammiscueris, efficacius operatur. Aliud simplicius, quo assidue utimur, ualde admirandum. Cacani sextantem, fœni græci sesquunciam, piperis unciam unam, cyperi unciam unam, costi unciam unam: contundito & cribrato, ac cochlearium unum cum condito præbeto, decumbat autem æger super affectam partem. Aliud. Potamogetonis sicci drach. ii. comæ ablinthij drachm. i. croci, costi, spicæ nardi, cuiusque drachmas duas, amomi drachmam i. datur cochlearij mensura aridum. Aliud. Piperis drach. iiii. dorcadiadis herbæ, quæ & muscij appellacionem habet unc. i. costi trientem, alij drach. iiii. contundito, cribrato, & cochlearium in potu exhibeto.

Aliud Philagrii. Rhei pontici unc. i. castorij scrupulos tres, farinæ lupini scrupulos iiii. piperis grana vii. contundito, cribrato, & mane cochleariū unum præbeto ex condito.

De hepatis inflammatione, & cognoscendo utrū hepar, an musculi eius sint inflammati. Cap. iiii.

Galenus. Hepar consimiliter ut splen & inflammatur & abscessu suppuratur, uerum raro scirrhus, hoc est, abscessu duro afficitur. Inflammato itaq; hepate, dextri illij tumor consequitur, & maxime si gibbosa parte inflammata fuerit, facilius per tactū cognoscitur tumor, grauitasq; coincidit illum totum distrahens, & dolor in dextram usq; clauiculam ac scapulam pertingit, ut conuelli penitus æger uideatur: linguæ color in principio quidem rubicundior fit, postea uero denigrescit: appetitus deiectio, fastidiumq; cibi uehemens, & implacabilis sitis: uomitus quibusdā contingit bilis puræ atq; etiā uisellinæ, post autē & æruginosæ: aluus autē ipsis est adstricta, nisi sanè cum uisceris debilitate inflammatio est oborta, febris adest acuta, inæqualis, quæ plerumq; ad uesperam & noctē exacerbatur: sequitur & spirandi difficultas, tussiculaq; parua, ut plurimū siccae, per quas nihil omnino reieciatur. Aliquando autē per uomitus biliosa pauca quædā reieciuntur, quæ res plerosq; decepit, qui ex pleuritide hanc educationem fieri putauerunt. Cæterū & costæ nothæ ut plurimum cōdunt, & color corporis subuertitur in arquati morbi specie permutatus: singultus quoque consequuntur. Accessionis autem tempore quidam delirio apprehenduntur, & acre lotiū excernūt: & sanè inflammationes quæ iuxta simā hepatis partē cōtingunt, plus fastidij, & nausæ, & uomitus biliosos, ac uehementē suum inducunt: quæ uero in gibba parte fiunt, dolores circa respirationem intendunt, tussiculasq; irritat, clauiculamq; magis cum dolore conuellant. Quandoquidem autem musculis hepatis incumben-  
tibus inflammatis, quidā decepti hepatis eam inflammationē esse suspicantur, necessarium fuerit distinguere inter se has affectiones. Hepate etenim inflammato, tumor secundū lineamenta rotundus, figura uidelicet ipsius hepatis, succumbit, quiq; ad corporis decubitus simul conformatur: maior enim apparet corpore ad

sinistrum latus reclinato: minor autem rursus ad dextrum deuoluto: nimirum hepate sub nothas costas cedente, neq; uisui, neq; tactui similiter succumbente. amplius autem in hepatis inflammatione, incumbens cuticula, naturali modo habere conspicitur, musculis autem inflammatis, cutis circuntenditur, ut si quis digitis apprehensam attrahere uelit, ea minime sequatur. Propriissime autē tactus discernet siue in alto, siue in superficie inflammatio ipsa cōsistat. Porro hepate inflammato, sanguinis detractionem experiri oportet à cubito, si nihil id fieri præpediat. Incidenda autem in dextro cubito uena interna, ita ut substratam arteriam obseruemus, quæ si non appareat, media: si uero neq; ipsa appareat, superior. Multitudinem autem extrahendi sanguinis, ex corporis reperies qualitate, ætateq; & natura, horaq; temporis, ac regione, ampliusq; ex uiribus ægri: quæ si id ferre queant, semel quantum satis est, detrahendum, si uero nō, per uices partitum. Cæterum incisio ipsa oportunè in prima & secunda die contingit: si uero urgeant dolores, & adsint uires: etiā septima uenę incisionem facimus, qua facta post modicum interval-  
lum, simplici clystere euacuamus, maxime si non sponte egerat aluus. Sequenti à uenę sectione die, cucurbitæ cum scarificatione affigende, rursumq; post unam diem cucurbita apponenda: non pauci enim à secunda earum adhibicione opem senserunt magis quàm à priore. At uero ante uenę incisionē & post eam, fomentis utendum est ex lanis succidis oleo imbutis & impositis: cōuenit & ex passo cretico fomentū cum rosaceo aut lentiscino aut melino aut oenanthino. Optimū autē fomentū hocce est. Chamemeli, anethi humidi, si adest, rutę uiridis, seminis lini, cuiusq; unc. i. calicū papaueris numero x. olei sextariū i. semen lini contusum in linteolo colligato, & cum alijs in cacabum coniectū ad prunas decoquito donec uires suas distribuat, deinde olla in feruētī cinere collocata, ex ea multo tēpore cōfidenter foueto, post fomentorū irrigationes cataplasmatibus uti oportet, ex semine lini & fœni græci, farinæq; hordeacea aut triticea, his uel omnibus uel uno aliquo ex eis, aut quibusdā in aqua mulla decoctis, ammiscēdū etiā ablinthiū & mastiche ac melilotū. Quod si uehementior sit ardor, etiā ea quæ astringunt sunt ammiscēda, uelut sunt mala cotonea. Oleum uero quod additur rosaceū sit, aut melinū, aut lentiscinū. Si uero feruor adhuc perseveret, cotonea mala cum polēta imponēda. Remittente autē uehementi calore ficus optimas & althææ radicē decoquito, & decocto eorum semen lini, farinasq; hordei, fœni græci, ac lolij infarcito: quod si durior inflammatio succumbat, etiā chamæleonem aut chamæpityn, aut polium, aut asarū, aut daucum, eryngijq; tū semē, tum radicē ammiscere oportet, aliquando autem & ficus cum althæa decoctæ ac tritæ cataplasmati cōnectuntur. Cæterum calidius & magis emolliens reddideris cataplasma, si terebinthinæ, aut resinæ pinus, aut picis quadrantem addas. Brassicæ autem crudæ folia cum melle trita ac imposita, omnes induratas inflammationes dissoluūt. Hinc ad cerata trāseundū ex oleo cyprino aut glaucino apparata, althææ radicibus simul admixtis. Utendum etiam ex palmis cerato, hepatis inflammationibus summè accommodato, maxime si stomachus per consensum simul sit affectus, & costæ coafflicte.



coafflietæ. Habet autem hoc modo. Palmas interiore medulla exempta, diligenter contundito, ac cum pari cerato rosaceo in mortario probè cōmittito, ac unito, affusoq; modico oleo rosaceo imposito. Aut myrrhā in uino ueteri adstringente maceratam, palmis ammisceto, & panniculo uestis deritæ excepta imposito. A ceratis ad epithemata ex styrace, & ex meliloro, & ea quæ polyarchia appellantur, & iam antè ad colicos & stomachicos descripta sunt, transeundū. Compositio autem epithematis ex styrace, hæc est. Styracis pinguis, carnis palmarum, costi, mastiches, calsiæ, singulorum trientem, samplici sextātem, croci semunciam, uuæ passæ semunciā, ceræ sexuncem, unguenti nardini bessem. Porro in inflammatione hepatis ubi magni circumstant dolores, etiam pharmaca dolorem leuantia in potu eis exhibere cōuenit, ita tamen ut asiduum eorum usum deuitemus: simplicibus autem portionibus frequentius utēdum: senecionis itaque decoctum tāquam maximè commodum, aut succi radicis dulcis obolos duos cum aqua calida exhibeto. Aliud. Picridis seridis, aut intybi succi cyathum unum cum aquæ calidæ cyathis tribus præbeto, mellis etiā cochlearijs duobus affusis. Ad hoc enim quod refrigerat, ac firmitatem uisceri addit, etiam ora uenarum hepatis repurgat, neq; tamen frigidas intemperies magnopere lædit. Potest autem seridum ac intyborum substantia hepatis commodare, tum si sine humorum, aut serosi ac uiciati sanguinis complexu, intemperies in ipso fiat, tum si humiditatis culuscunq; tandem adsit cū intemperie cōplexus: mellis uero ammixtio humiditatem per urinā excludit. Quapropter etiam exiccata ac contusa utiliter potui insperguntur, eorum quoq; decoctum potatum magnam commoditatē præbet. Quod si nō infestet calida aliqua intemperies, sed obturatione tantum uiscus ipsum uexetur, ex uino albo, tenui, ac uetusto, cum aliquo urinas ciente pharmaco, potata magnificè auxiliantur. Magni etiam pretij in hepatis inflammatione capnij herbæ, quæ etiam chelidonia appellatur, succus habetur aut eius decoctū. Auxiliatur & præscriptus ex amygdalis amaris pastillus, nisi penitus magna caliditas adsit. Aliud. Cochlearum terrestrium carnem optimè conterito, & uini nigri cyathos tres affundito, calefacito, ac bibendum præbeto. Cæterum hæc iuxta omnem suam substantiam efficacia existunt, quale est hepar lupinū, cuius rei magnum periculum fecimus, inquit Galenus, usus autem eius idem qui cochlearum existit: optimè enim conteritur, & drach. i. cum uino aliquo dulci præbetur. Hæc enim pharmaca omnibus hepatis intemperiebus conuenire uidentur, quum neq; calidas neque frigidas intemperies lædant: febrientibus tamen lupi hepar melius ex aqua, aut seridis succo, aut aliquo consimili exhibetur. Epithema ex styrace. Costi unc. i. croci, thuris, aloës, ammoniaci thymiamatis, mastiches, styracis flauis, spicæ nardi, cuiusq; drach. iiii. terebinthine unc. i. opobalsami drach. iiii. ceræ trientem. Vtere.

De hepatis abscessu: Archigenis.

Cap. iiii.

Quod si inflammatio ad permutationem apertè se habeat, hoc est, principium permutationis ad suppurationē iam suscepit, omnes prædictæ de inflammatio ne accessiones augebuntur: dolores (inquam) & febres, & delirium, anxietas, desperatio, cibi fastidiū,

& displicentia maximè ab eius acceptione. A rigoribus autem ferè in totum febriles accessiones initiū sumunt, præsertim si ad uesperam exacerbationes fiāt. Adiuuare igitur permutationē ac puris eruptionem oportet, ut quàm celerrime fiat, ne maiora inde corpora corrūpantur, per usum uidelicet cataplasmatū ex semine lini, aut hordeacea & fœni græci farina apparatorū, admixtis etiā resina, manna, pice, althææ radice, stercore colūbino, stercore caprino, caricis, & quæ his similia existūt: fomentis autē utendū ex cruda hordeacea farina, & spongijs decocto absinthij, abrotoni, cætaurej, similibusq; imbutis ac expressis: neq; uero incōueniēter emplastra quæ puris permutationē iuuare queunt, adhibētur. Quum autē perfecta suppuratio fuerit, dolores remittēt, omnesq; accessiones mitiores apparebunt: cæterū rupturæ tēpore dolor rursus magis augefcet, quare etiā tunc rupturam adiuuare oportet, per cataplasmatum ad superficiem attrahentium ac subadstringētiū usum, & per portiones calorificas: quales sunt quæ ex pipere & zingibere ac myrrha apparantur. Porro post eruptionē, aliquando quidē per aluū, aliquando per urinas, puris transumptio contingit. Quidam etiam per os, puris educationem factam tradiderunt: uerum periculosior alijs per os transmissio existit: id uero quod excernitur nigrū est, quāquam & album repariatur, quod sanè salutare iudicatur. Aliquando autē humor qui ex abscessu promanat, inter pelliculā uentrē ac intestina amplectentē, peritonæon Græcis dictam, atq; ipsa intestina colligitur: & facile sanè curatur, si quis diducta citissime cuticula humorem ipsum excludat, ea maximè parte qua tumor attollitur: aliquando autē rursus post factā isthæ collectiōnē, transumptio per intestina cōtingit. Cæterū in his quibus tumor foras prominet, sectionem obliquam supra inguē infligere oportet, ac per eā ipsam humore euacuare, atq; etiā ulcus ipsum eluere, & pharmaca liquefacta inijcere, donec perfecte curetur. Neq; uero negligendū, quo & hepatis post factā abscessus rupturā, remedia auxiliaria adhibeantur. Primum quidē igitur emplastra emolliētia imponantur, deinde etiam resiccantia, quale est quod Icesium appellatur, quodq; ex salicibus cōstat, & quæ his similia existūt. Si itaq; per urinas puris transumptio fiat, cōsimilibus epithematibus utēdū est circa totū ile, & iuxta pubē, & tū per cibos tū p pharmaca urinā ciente, repurgari eius adiuuanda. Pepones igitur in cibo eis conueniunt, & cucumeres cocti, pastinacæ & sion. Ex pharmacis uero, meon & asarum, spica, calsia, cinamomum. Sunt & composita quæ huc pertinet, quorum compositiones paulo post dicemus. Per interualla autem etiā humores ipsos dulcorare oportet, uini scybelite, therei, ac protropi, similitumq; potu. Commoda est etiam ipsis potatio lactis. Si uero per sedem humoris transmissio contingat, epithemata quidem eiusdē materiæ approbamus: uerum prospiciendum est, ne alius cohibeatur, neq; etiam amplius humectetur: nam hoc ipsum tum per cibos, tū per pharmaca, ac epithemata fieri potest. Vtimur autem & ad hos infusus per clysteres, quo intestina illæsa conseruemus: ad quam rem prisanæ, ac tragi, & oryzæ succi appositi existunt. Quod si tamen per os puris educiō fiat, maximam ad hoc curam adhibere oportet, ut humores prius euacuentur: deinde

D      cibus



cibus præbendus adstringens & stomacho gratus.

Vtendum & uino tenui & odoro. Venti uero epithemata ex palmis apparatus, atq; ex œnanthe, ac eis similia imponenda, de quibus in stomachicorum ac dysentericorum tractatu est prædictum. Ad hepaticos. Folij malabathri, careophylli, spicæ nardi, costi, piperis, lupinorum siccorum, singulorum uncia i. contundito, cribrato, ac scrupulos iiii. præbeto cū uino. Aliud Philosophi: hepatis, inquit, abscessus discutit. Radicis graminis decoctum bis in die potatū, similiter & fœniculi radicū decoctū, & dauci. Myrrhā itē & picē siccā contundito ac cribrato, pillitoq; hepati ex oleo cyprino inspergito & lanam puram oleo cyprino calido imbutā superposito, uehementer prodest hoc: utere confidenter.

*Cura hepatis exulcerati, Archigenis. Cap. v.*

Si exulceratio ex abscessu circa hepar relinquatur, aut illic ex acribus humoribus ac erodentibus fiat, colliquatio hæc adfectio appellata est. In his sanè uenter cruenta, & putrefacta, ac saniosa excernit: atq; omnino consimilia ex hepatis ulceribus promanare solent, his quæ à mortuorum corporibus destillant: quare quidam inexperti decepti, dysenteriam hanc affectionem esse putauerunt. Ruetus autē foetidi consequuntur, & à ciborū acceptione grauitas præcordiorum: & pulsus eis est depressus ac densus, fiuntq; ægri amarulenti & iracundi: dolor circa locum fit ulcerosus, usq; ad clauiculam ipsam pertingens: multis autē una cū uentris recrementis etiā lotiū excernitur saniosum sandarachæ colore: non parū uero frequenter ea quæ in urinis continentur aquæ inter cutē significationem portendunt. Cæterum omnium periculosissima est hæc affectio, & modica omnino ægris est spes salutis: & tamen nihilominus aggredienda est eorū cura, cōsimilibus remedijs, eis quæ paulo antè dicta sunt, etiam his adhibitis, epithematibusq; ex materia leniter adstringente, similibusq; fomentis. Liqueoribus autē tum qui ad fomēta, tum qui in cataplasmata adsumuntur, cortex pinus, palmēq; ac cyperi similiaq; sunt incoquenda, proprie autē ulcera repurgat lac scissile sepe acceptum: cui aliquando parum mellis addere non ab re est. Post repurgationē citissime ad ea quæ carne replent festinandum, præstant autē id cibi moderati et boni succi, ac gestationes: quod si molestiæ id fieri pmittant, etiā exercitamenta conueniunt & uinum. Post cataplasmata uero, cerata et emplastra apta erunt, quorū sæpe in præcedentibus fecimus mentionem. Plurima præterea pharmaca quæ ulceribus cōueniunt, in potu sumuntur. Quale & hoc est, Andromachi ad hepaticos cōpositio, cyphoides appellata: quæ etiā ad omnia thoracis uitia cōducit. Uuarū passarū carnis dra. x. x. v. croci dr. i. calami indic. dr. ii. bdellij dra. ii. et dimidiā, cinamomi dra. x. cassiæ dra. x. floris iunci odorati dra. ii. & dimidiā, myrrhæ dra. iiii. terebinthinæ dra. iiii. scobis aspalathi dra. ii. spicæ nardi drac. iiii. mellis dra. x. vi. uini dulcis quātū sufficit. Adstringit mediocriter & resiccat ac discutit serosos ac uitiatos humores, inquit Galenus, corrigit malitiam humorum & putrefactioni se opponit, intemperies sanat, extergit ac mundos facit, aperitq; meatus, cit urīnam, atq; ea propter internas ulcerationes curare consueuit, & eos qui hepatici appellantur. Sunt autē hepatici proprie, qui ob hepatis

debilitatem per sedem cruenta liquidiora excernūt, quales sunt loturæ carniū animalium recens maturationum, quos ipsos ignarum uulgus dysentericos esse putat. Alia cyphoides Andromachi: facit & ad tusses, & ad liquidorū per os refectiones. Croci, cinamomi, mirrhæ, cuiusq; dra. i. bdellij dra. iiii. aspalathi obolos iiii. floris iunci odorati dra. iiii. calami indic. dra. ii. cassiæ dra. i. spicæ nardi dra. i. terebinthinæ dra. x. vi. mellis heminā dimidiā, uuarū passarū pinguiū numero c. lx. carne earū optime mundata, uini ueteris adstringentis, quātū ad uuas passas, bdellium ac mirrhā maceranda ac conterēda satis est. Mel autē prius despumato, in eoq; resinam liquefacito: & cum reliquis committito ac uitor, aliquando quidem instar eclegmatis ad nucis ponticæ magnitudinem aut amplius exhibeto: aliquando uero aqua mulsa dilutū bibendum præbeto. Inuenies & inter arteriaca remedia ad tussientes item & phthisicos pharmaca plurima his similia, quibus ipsis & ad ulceratum hepar uti oportet: proderunt etiam ea quæ ad renum ac uesicæ ulcera sunt descripta. Alia cyphoides, qua usus est comes Andreas, & Menas chirurgus. Croci dra. iiii. calami drach. vi. bdellij drach. ii. & dimidiā, cassiæ scrupulos iiii. spicæ nardi sesquidrachmam, floris iunci odorati scrupulos ii. & dimidiū, mirrhæ dra. iiii. terebinthinæ drach. iiii. aspalathi scrupulum unum, mellis sextantem, carnis uuarum passarum quadrātem, uini quantum ad hæc satis erit.

*De hepate in scirrhum indurato, Galeni. Cap. vi.*

Non solum autē à prædictis affectionibus apprehenditur hepar, sed & in scirrhum induratur, inflammatione uidelicet præcedente. Manifestiorem autē cognitionem hepar induratū ex hoc habet, quod tumor circa ipsum scirrhum multo durior quàm in inflammatione existit, multo etiam minore dolore uexatur. In huiusmodi quoq; dispositiōibus corporis cula hepatis insita attenuantur. Cæterum temporis progressu, maiore tumore circa scirrhum facto, difficulter eius cognitio per tactum cognoscitur, propterea quod iam aquæ inter cutem suffusio sit consequuta: unde his qui negligentius notas perscrutantur, tumor ad tactum latus succumbit: color autē uniuersi corporis in nigredinē pallore permixtam cōmutatur, uenter & pedes intumescunt, supernæ corporis partes gracilescent, & corpus ipsum tepescit: aliquando autē alius multa & tenuia excernit: urinae uero à principio quidē multæ, uerū ubi iam ad aquam inter cutem dilapsi sunt omnino paucae. Porro incipientem hepatis scirrhum sæpe curauimus ipsi: tum uero qui tēporis diuturnitate est extensus, neq; ipse curauim, neq; alium quempiam qui curare eū posset uidit: in totum enim sic affectis aqua inter cutem accedit, & in longiori tempore corrumpuntur. Itaq; ad prædicta de inflammatione cataplasmata & fomenta, fortiora quædam (inquit Archigenes) sunt annectenda. Cōstant autē ea quæ inflammatis adhibentur ex absinthij coma, nardoq; tum indica, tum celtica, croco, œnanthe, unguento nardino, lentiscino, & mastichino. His igitur alihææ radicem ammiscere oportet, & stercus caprinum, ammoniacum thymiana, bdellium, medullasq; & adipēs. hæc enim incipientem in hepate scirrhum, conuenienti simul adhibita diæta, sæpe curauerunt. Post fomenta



menta autem & cataplasmata, cucurbitæ hepatis affigendæ cum scarificatione, & emplastra adhibenda: primum quidem simpliciora, uelut est Mnaseæ, & quod ex succis constat, deinde etiam fortiora, uelut est melinū Serapionis, & quæ huic similia existunt. Post emplastra malagmaris utendum, ex baccis lauri, aut eo quod polyarchiō appellatur, & similibus, quorum aliqua in colicis præscripta sunt: aliqua uero in splenicis & arthriticis referuntur. Quod si neque sic proficias, hirudines admovent: plurimum enim momenti habet ad curationem, sanguis earum suctu extractus. Commodus est eis & dropax & sinapismus: si uero neque hoc modo res succedat, ustio per frequentia interualla adhibeatur: ita ut aut per ferrum, aut per pharmacū crustæ infligantur, & post earum casum, ulcera multo tempore fluere sinamus. conferunt etiam portiones conuenientium pharmacorum, uelut est Zopyros ad colicos præscripta, & quæ eupatorium habet admixtum. Complectuntur & urinam cientes antidoti aliquam in se commoditatem: uelut est quæ Bestiana uocatur. Scirrhus enim indurata particula ob crassos & uiscosos humores in solidis corporibus imbibitos, necessario frigida habet dispositionem: quare & calefacientibus simul & tenuium partium pharmacis opus habent: uerum his, quemadmodum dictum est, emollientia sunt præmittenda. Si enim uehementer calida, antequam scirrhus indurata corpora præmollescant, exhibeantur, statim quidem manifestam diminutionem fecisse apparent, uerum immedicabile fit quod relinquitur, utpote nimium resiccatum. Quapropter facile est coniectare in hepatis scirrhus necessariam esse emollientium admixtionem. Simplicia igitur quæ ad hepar induratum bibuntur sunt: anagallidis quæ cæruleum florē habet succus exiccatus, itēque liquidus ex aqua mulsa: in moderatis autem febribus, ex aceto mulso: & scillæ assatæ medullæ oboli .i. seminis uiticis torrefacti dra. i. radix eupatori, radix dracunculi, cortex radicis lauri. Aliud, quo Aegyptius curatus est, quum iam aquam inter cutem incidere promptus esset: Herbæ sabinae, picis siccae, quæ in fundo doliorum uini reperitur, eorum præsertim in quibus uinum dulce uetustatē est adeptum, utriusque æquales partes singulatim contundito & cribrato, atque ex ambobus pariter cochlearij mensuram cum uino diluto præbeto. Aliud. Croci, spicæ nardi, calsiæ, cuiusque drach. ii. costi, floris iunci odorati, cinamomi, myrrhæ, stactes cuiusque dra. i. mellis despumati dra. x x v. Ex hoc drach. i. cum uino mulso præbe. Optimum est hoc pharmacū in incipientibus, duris scirrhi dispositionibus, cuius rei plurimum periculum feci. Aliud, ad omnes inueteratas hepatis affectiones, atque ipsum etiam scirrhum. Picis siccae, costi, piperis, æquales partes contundito & cribrato, & ex eis cochlearium præbeto. Aliud. Myrrhā troglodyticen optimā, & piper, parī pondere tundito: indeque scrupulū unū cum uino meraco ueteri calefacto, ad dies tres aut quinque exhibeto. Oribasij ad hepaticos. Glaucij drach. iiii. aloës dra. ii. hæc arida cōterito, & cochlearij mensura statim à balineo exhibeto: febre carētibz cum uino diluto, febrientibus autē cum aqua mulsa. Aliud Oribasij, ad diuturnas hepatis affectiones, & circa sima ipsius dispositiones, in quibus tum stomachus, tum uenter simul affecti sunt. Come pinus uiridis de

coctū ad tertias redactum, cyathorū trium aut quatuor mensura præbe. Quin & siccae comæ dra. i. in potu exhibita, simili efficacia præstat. Verū ad multos hæc exhibenda sunt dies. Aliud, Oribasij. Chamæpitios, petroselinī, cuiusque dra. viii. baccarum lauri, piperis, costi, singulorum drach. iiii. cyperi, foeni græci, cuiusque drach. ii. præbe cochlearium ex aqua mulsa.

Aliud. Anisi, gentianæ, amygdalarū amararū, absinthij, æquas portiones permisce: indeque cochleariū ex calida præbe. Aliud. Thuris unciam unā, ammi, acori, cuiusque drachmas quatuor, præbe cochleariū ex aqua mulsa. Oribasij antidotus hepatica. Calsiæ drachmas octo, aloës, costi, corticis pinus, cuiusque drachmas quatuor, glycyrrhizes siccae drachmas octo, spicæ nardi, croci, anisi, hyssopi, rhei pontici, cuiusque drachmas duas, mellis sesquilibra. Mel decoque ac reliqua eo excipe, & nucis auellanae magnitudine præbe. Aliud Oribasij, ad hepaticos, istericos, splenicos, & præcordia eleuata. Croci drachmas decem, floris iunci odorati drachmas quatuor, calsiæ drachmas duas, spicæ nardi drachmas octo, myrrhæ, cinamomi, costi, cuiusque drachmam unam, mellis cocti quantum his excipiendis sufficit. Præbe ad fabæ ægyptiæ magnitudinem cum uini mulsi cyathis tribus. Facit & ad thoracis dolores, atque eos qui plumbeum colorem habent. Aliud hepaticum pulchrum. Seminis pelecini, capni herbe, costi, æquale pondus contundito ac cribrato, & drachmam unam ex aqua mulsa præbeto. Aliud. Foeni græci unciam unā, trixaginis sextantē & unciam dimidiam, costi albi quincuncē, petroselinī quincuncem, eupatori quincuncem, mellis despumati quantum satis est. Datur sesquidrachmæ pondere. Eius utilitas experimento constat. Aliud. Castorij, costi, cyperi, amomi, cuiusque drachmas octo, piperis drachmas quatuor, petroselinī drachmas quatuor. Datur cochlearij mensura. Aliud, ad diuturnā uexationē & duriciem. Costi, foeni græci, piperis, foliorū rutæ uiridis, picis siccae, æquales partes cōmisce, indeque cochlearium cum aqua mulsa aut uino præbe. Aliud. Ammoniaci thymiamatis drachmas triginta duas, croci drachmas quatuor. Crocum tundito, cribrato, & cum aqua diluito: deinde ammoniacum adijcito, simulque terito, ac in pastillos redigito, ex quibus alijs drachmam unam, alijs duas præbeto. Aliud. Ammoniaci thymiamatis, costi, polij, foeni græci, æquale pondus misceto: indeque cochlearium siccum cum aqua mulsa dato. Aliud. Ammoniaci in tenuissimum puluerem redacti cochlearium unum, mastiches grana decem, præbe ex aqua mulsa, & admiraberis. Efficax est ad hepaticos iam desperatos. Aliud, Asclepiadæ: quo utimur, inquit Philagrius: quod ad hepar scirrhus induratum, atque etiam oppilatione obturatum, prospero successu accommodatur, ad aquæ inter cutem quoque suffusiones incipientes, & ad alias internas affectiones, citra tussim contingentes, optime facit. Habet autem hoc modo. Radicis gentianæ, chamæpitios, marrubij, petroselinī, radicis scolopendriæ, radicis panacis, terræ lemnia quæ sphragis appellatur, sissonis, rubiæ, seminis brassicæ, radicis eringij, baccarum iuniperi, seminis fraxini, trixaginis, seminis dauci, dictamni, cestri siue betonicæ, singulorum drachmas octo, fellis ursi sicci, sinapis, seminis cu-



cumeris, aristolochie, piperis, spicæ nardi, costi, seminis eruce, singulorum drachmas octo, hoc est omnium æquale pondus, echin, eupatorii, polii, cuiusque similiter drachmas octo. Quidam etiam lupini hepatis, ac helenii tantundem adiecerunt, quod & nos facere solemus. Oribasius autem neque fraxini semen, neque betonicam, neque trixaginem, neque dictamnium, neque daucum adscripsit. Mellis quantum his omnibus excipiendis sufficit. Datur ad nucis auellanae magnitudinem cum passis cyathis duobus. Pharmacum hoc experimento cognitum est. Semen autem fraxini, arboris est ex qua fraxinea ligna quocunque in opere apta ac operæ obediētissima caduntur. Epithema ex melilotis ad hepaticos. Meliloti sextantem, croci unciam unam, ammoniaci thymiamatis libram I. ceræ lib. I. terebinthinæ trientem, cyprini, aut nardini, aut gleucini unguenti plus minus quindecim. Ammoniacum & crocū in aceto dissolue. Porro in diæta totum situm esse existimandum est, siquidem omnis diuturnus morbus maiorē ex diæta opem sentit. Quare cibi qui facile concoquuntur, eis exhibendi sunt, quiq; & incisoriā uim & repurgantem complectuntur. Neque uero ineptæ eis acrim rerum comestiones sunt, si per interualla, & post exercitia ac gestationes sumuntur. Cæterum pro ratione motuum & exercitiorum, tum quantitatē, tum qualitatem ciborum augere oportet. Vinum eis conuenit tenue, odorum, moderata quantitate acceptum. Dulcia enim omnia nocentissima sunt hepati affecto. Vitandum & uinum mulsum, fructusq; ac bellaria omnia, præter amygdalas & pistacia: ex his enim moderate à reliquis cibis accipiendum. Vitanda etiam crassa & uiscosa edulia, atq; ea quæ difficulter concoquuntur.

*De lienis affectionibus cognoscendis, ex libris*

*Philagrii.*

*Cap. VII.*

Quibuscunque sub sinistro ilio dolor, aut distensio, aut tumor subiacet, & dum conuertuntur, uelut aliquid ex illis locis conuellatur, imaginatio contingit, his lien affectus est. Quemadmodum autem reliqua corporis membra iuxta octo intemperierum genera affliguntur, ita & splen afficitur: uerum frequentissime frigidam & humidam sustinet intemperiem, ex cōsimili maxime diæta, atque ex his quæ uoluptatis gratia accipiuntur, uelut sunt crassi succi placenta, itemq; potiones. In his igitur omnibus calor tempore debilitatur. Substantia enim splenis laxa & rara est, promptissimaq; ad suscipiendum crassiorem humorem: etenim fecem ac uelut limum sanguinis ex hepate ad sese trahit, hoc modo sanguinem repurgans, ex qua fece confecta & attenuata per maximas in ipso arterias seipsum nutrit. Signum autē certum & compendiosum intemperiei in splene, ea quæ eduntur ac bibuntur exhibent, & quæ forinsecus cuticulæ iuxta sinistram ilium accedunt. Si enim frigida intemperies iuxta ipsum fuerit oborta, omnis cibus & potus qui efficaciter refrigerare potest, facile & manifeste splenem lædit: pallium item frigidum extrinsecus ad mortuū, maxime si in frigida aëris constitutione amictantur, uentus etiam & aqua frigida tum in lauando, tum aliis quoque adhibita, frigidā arguit splenis intemperiem. Eam uero ipsam intemperiem omnia calida consolantur. Quod si calida fuerit splenis intemperies, à nullis quæ in cibo

aut potu exhibentur, aut etiam forinsecus accedunt, dolorem perfert: & si quidem caliditas augetur, non solum nihil tumori apponitur, sed & contractionē amplius sustinet, præsertim si exurens simul adsit febris. Cæterum & cibi & potus calefacientes, & quæ extrinsecus corpori calorem addunt, calidas etiam intemperies augent & exacerbant. Solutio autem sunt eis omnia refrigerantia. Si enim hi qui calidam habent dispositionem per interualla frigide potu utantur, statim splen corroboratur, & minuitur, ægrumq; melius spirantem reddit: & uenter aliquādo ex frigida potu flauam bilem profundit. Atqui tristitia adfectis, aut ira concitatis splen dolet, si calidam habeant intemperiem. Similiter etiam sicca intemperiei in splene signa colligere oportet, maxime quum pro magnitudine propriæ naturæ non eminet. Ea item quæ forinsecus corpori adueniunt, atque intra ipsum deuorantur, si arefaciendi facultate prædita sunt, splenem exiccant, quemadmodum etiam reliqua animalis mēbra desiccare consueuerunt. Qui enim laboriosam uitam degit, assidueq; circa marinas aquas uersatur, aut bituminosas, aut aluminosas, aut sulphurulentas, quiq; pharmaca assumit hanc habentia naturam, facillime exiccatur. Porro ubi humida affectione splen fuerit detentus, atq; ea amplius inualuerit, in tantum eius incrementum facit, ut etiā uentrem pertingat ac hepar. Consueuit autem humida dispositio circa ipsum consistere ab immodice humectantibus, diæta, & exercitio, aëreq; & locis. Oboriri solet & his qui circa palustres regiones frequenter uersantur. Amplius autem & humidus morbus præcedens, hanc adfectionem producit: aquæ item largior potus, & holera humectandi ui prædita. Species quoque doloris unā cum prædictis signis instantem intemperiem demonstrabit. In calida enim & frigida intemperie dolent. Minus uero, aut nihil omnino, in humida: minimum uero in sicca. At uero ex prædictis coniecturam facere licet compositarum in ipso splene intemperierum. Ferè enim in totum ubi calida intemperies fuerit intensa, sicca eam consequitur: & ad frigidam inueteratam humida comitatur. Quandoquidem autem & humores in splenem confluentes, tumores producant: eorū quoque diligentem considerationem facere oportet, quales nam sint tandem, atque id non solum ex prædictis iam dispositionibus est faciendū, sed ex his quæ iam dicuntur. Bilioso enim fluore existente, uniuersum corpus calidius apparebit, etiam si non adsit febris, oculiq; & urinæ per bilem colorata: siccitatem semper accusabit æger, & de siti conqueretur ac biliosus infestante, cibum fastidit, & uigiliis infestatur, & frigidam desiderat unā cum hoc quod linguam subflauā habet: exacerbationes tertianæ fient: suntq; ipsi ægri moribus iracundi, & qui præcipitanter excandescant. Si uero atræ bilis sit fluor, materiæ ipsius atræ bilis scilicet, color tum in lingua, tum in reliquo toto corpore apparebit: & appetentia aderit ciborum: moestiq; ac subtristes ægri sunt, reliquaq; atræ bilis signa eis adsunt: exacerbationes uero quarto quoque die affligent. At uero ubi pituitosus humor in splenem deferatur, consimilis pituitosis aderit color, ægriq; minime sicient, & cibum appetent, nisi falsa fuerit pituita: tunc enim cibū fastidiunt ægri, poculorumq; magis sunt appetentes: quin & coloris

cutis



cutis nitentis species demonstrabit tibi pituitosum esse humorē: & quod singulis diebus exacerbatur, urinæ quoque pituitosæ sunt: ipsi uero ægri secundū mores pigri sunt & segnes. Quidam uero ex eis qui frigidam affectionem habent, magnum & durum splenem acquirunt, atque ubi parum saltem consuetā edendi horam fuerint transgressi, & impasti manserint, dolore afficiuntur, propterea quod neque plenum, neque firmantem, neque sustentantem ipsum habeant uentrem, quique amplius ob inēdīam refrigeratur, & concalescentia opus habet. Quod si sanguineus existat in splenem confluens humor, possibile est ipsum colorem tum iuxta linguam, tum circa cutem permutari: inter appetentiam autem ciborum & fastidium medio quodam modo habent ægri: reliquisque magis languent, etiam si non parem uisceris tumorem habeant. Venæ autem uniuersi corporis, sanguine plenæ apparent, & urinæ subfuluæ.

*Intemperierum splenis cura. Cap. VIII.*

In uniuersum quidem igitur splenis intemperies ferè circa tumorem sunt: eas autē tū per cibos ac potus, tum per simplicissima pharmaca ac fomentorū irrigationes quæ intemperiei contrariæ sunt corrigere oportet. Calidæ intemperiei cura. Calidam itaque intemperiem curabis per irrigationis usum ex rosaceo, aut melino, & per simplicia ex his composita cerata. Amplius autē & per uuæ acerbæ immaturæ succū & portulacam & pampinos uitis, ac cōsimilia. Cibis uero & potibus utendum, quibus calida intemperies castigatior reddatur, lauacris etiā temperatarum aquarum. Quod si pharmacorū usu opus sit, rumicis acuti semen in potu exhibeatur, aut radicum, aut foliorum eius decoctum: aut plantaginis, similiterque limonij, quod cynoglossum appellatur decoctum. Sunt autem hæc in posca diluta coquenda. Frigidæ intemperiei cura. Frigidæ in splene intemperies sanant irrigationes, & unguenta, ac cerata, itemque epithemata, quæ moderata calefaciendi facultate prædita existunt: uelut est unguentū nardinū & cyprinum ac gleucinum, & cerata ex eis cōflata. Poteris & epithema pentamœron appellatum, cum modica cera liquefactum adhibere. A balineis in principio abstinendum, nisi quid obster: cibi & potus moderate calefacientes exhibendi. Quod si medicamentis opus sit, conuenit eis calaminthæ, pulegij, scordij, trifolij, uiticis, ac similiū decoctū. Exhibenda etiā rumicis acuti radix, aut semen. Humidæ intemperiei medela. In humida splenis intemperie optimum pharmacum habebis salis florem, siue per se solum, siue cum aliquo simplici cerato imponere uelis. Solus enim calefactus & aliqua uesica exceptus, spleni adhibetur. In epithemata quoque ammiscetur, quemadmodū est prædictum. Quin & fassugo & spuma salis, cum cerato aliquo ac modico aceto permixta, commodū pharmacum erunt ad humedum splenis affectionem. Proderit & quinquefolij radix, & plantago sicca, & alumen scissile in testa exustum. Poteris etiā ex plantaginis folijs, radicibusque quinquefolij, & spuma ac flore salis, parī uel impari modo permixtis, sufficienti affuso aceto, & pice sicca in posca liquefacta, exceptis, cera itē alba, ammoniacoque thymiamate, ac modico rosaceo ammixtis, pharmacum usui referuare. Melius autem compositionem facies, si & salicis succum addas, hic enim cū

uno aut altero ex prædictis permixtus, efficacius pharmacum reddet. Eius autem collectio facile contingit. Lacrymam enim arbor incisa emitit. Conuenientissimæ autem his sunt fricationes, quæ discutiendi facultatem habent. Siccæ intemperiei remedia. Siccam splenis intemperiem balineum dulcium & calidarum aquarum curat: inunctio item ex oleo dulci. Cibi citra refrigerationem humectantes, uelut est prisanæ succus, & post eum qui ex halica est acceptus. Irrigationes forinsecus profunt ex rosaceo, & cerata itidem ex eo apparata.

*De splenis inflatione.*

*Cap. IX.*

Quum inflatio circa splenem est, tumor loci consequitur, qui imposita manu ad tactum cedit, & distensionem loci infert. Verum inflatio ipsa aut in uentre oborta ad splenem transfertur, aut in ipso adeo splene generatur. Ventosa igitur flatus generatio ex frigidityte membrorum ipsum producentium contingit. Quare tum uentrem, tum splenem concalescere oportet, præsertim his quibus utrumque membrum est affectum: atque id tum his quæ forinsecus imponuntur, tum cibis ac pharmacis quæ intra corpus deorantur, perficiendū est. Vētri itaque auxiliabimur, si quidem per consensum sit affectus, diospoliticā confectionem exhibēdo, atque etiā alias quæ huic similes existunt. Panis uero ac edulia, uinumque quod in potu sumit, ex petroselino, aniso, cumino, ac fassone, similibusque cōspargenda sunt. Foris autem epithema ex seminibus quod paulo post referetur, imponendum. Hæc enim pariter utriusque uisceri auxiliatur. Proprie autē inflationes splenis dissolvere solent, tum ea quæ iam dicta sunt, tum uiticis semē torrefactum, & melanthium, serpillumque & thymus, pulegium, origanū, rutæ semen. Pelecini autem semen & stomacho gratissimū, & omnibus uisceribus aptissimum est: similiter & rheon ponticum, & scordium. Hæc enim unā cum hoc quod stomachum repurgant, etiam hepar profunt, neque stomacho molestiam inferunt, cæterum unumquodque horum & per se, & alijs commixtum exhiberi potest, in posca decoctum, aliquādo autem & mel eis adiciendum. Porro quæ his fortiora sunt, ea uitare oportet in his, in quibus uenter per consensum cum splene est affectus, maxime si inflatio sola infestet: quæ enim his præstantiora sunt, spleni in scirrhum indurato conueniunt, ubi uero solus splen inflatur præter uentris læsionem, epithema ex seminibus in principio est imponendū. Postquam autem flatus crassities fuerit attenuata, ammiscenda sunt ei ea quæ noxam depellere possunt, qualia sunt epithemata ex alumine & sulphure apparata, quorum compositiones paulo post dicentur, ubi de spleni in scirrhum indurati tractabimus cura. Epithema ex seminibus: Asclepiadæ. Epithema quod Asclepiades ex seminibus composuit, hoc est, quod ad aquam inter cutem prosperè accommodatum pharmacum existit, & ad omnē inflationem conducit. Cardamomi, meliloti, herbæ sabinae, baccharum lauri, nardi celici, fassucij, iridis, radicis panacis, radicis cyperi, nitri, cassiæ, foeni greci, seminis apij, anisi, thuris, singulorum drachmas xxv. styracis quadrantem, myrrhæ quadrantem, terebinthinæ libras ii. ceræ libras ii. ammoniaci thymiamatis lib. i. mellis optimi lib. i. olei cyprini lib. i. uini quantum satis est. Facit & ad stomachi & splenis inflatio-



nes, itemq; hepatis: estq; omnino pharmacum magni faciendum.

De splenis inflammatione.

Cap. x.

In splenis inflammatione uenae incisio adhibeatur, si nihil id fieri ueter: uenter etiam per clysterem assidue eluatur, & maxime si uenae incidendae medela relinquatur. Quocumq; autem tempore siue per uenam incisam, siue per clysterem euacuamus, semper aliquid ad stringendi facultate praeditum spleni imponemus, in principio praesertim, quum differimus euacuationem: quo id quod influit reprimatur, & quod influxione sua preuenit, a loco depellatur: atqui & ad splenis firmitatem conseruandam utilis adstringentium sylua existit: quae quidem robusta sint, ubi fluoris impetus foris contingit: moderata uero, ubi mediocris. Cognosces autem irruentis humoris magnitudinem, ex magnitudine & uelocitate generationis ipsius inflammationis. Itaq; si moderata fuerit inflammatio splenis, uinum uetus ac austerum tenuiumq; partium oleo dulci permixtum & lana succida exceptum imponemus. Si uero maior sit caliditas, rosaceum sit oleum, aut lentiscinum: quae si non adsint, oliuae folia, aut rubi, aut mali arboris in oleo decoquantur, atq; ipsa etiam mala, in decoctione etiam quaedam tenuium partium addantur, uelut est absinthium & pulegium. Quod si forti impetu fluxus feratur, acetum pro uino affundendum est. Post irrigationes ad cataplasmata transeundum. In quorum compositione hordeacea & loliacea farina assumantur, cum posca & mellis ac olei paucissima omnino mensura, in quibus absinthium ac pulegium sint decocta: aliquando & myrobalani infarciendi. Optimum & hoc est. Hordeaceam farinam & salicis folia cum aceto imposito, adipe caprino in aceto colliquato: uerum melius redditur cataplasma, si caricę adijciantur. Optimum autem est & ex lini semine cataplasma, maxime ubi affuerit dolor. Accipitur autem seminis lini pars una, farinae loliaceae pars una, adipis taurini in aceto & sapa liquefacti, cuiq; deinde oleum cyprinum sit affusum, quantum his subigendis satis est. Ceterum cauendum ne locus post irrigationes & cataplasmata denudetur, sed ubi haec fuerint ablata, mox ceratum ex cyprino aut nardino unguento imponatur. Commodum est autem feruentibus inflammationibus Nilei aut Nilii epithema, cum cerato chamaemelino & aceto emollitum: idoneum est etiam Philagrii stomachici epithema: sunt autem ea integra ad stomachicos descripta, utimur autem aliquando, ob cataplasmatum penuriam, ad splenem inflammatum, fursuribus in uino, aut posca & oleo decoctis: quibus etiam absinthium, & pulegium, aut thymum, aut origanum, aut lauri folia, aut artemisiam, & reliqua incidendi ac attenuandi ui praedita adijcimus: non feruente uidelicet inflammatione, & corpore praeuacuato. Si enim corpore non euacuato, quis calidioribus utatur, ipse sibi scirrhi autor fiet. Quod si ad permutationem in suppurationem ipsa splenis inflammatio repat, quod tamen raro contingit, adiuuare eam oportet, ne plura corpora putrescant, per cataplasmata uidelicet quae pus producant: de quibus in hepatis abscessu manifeste est praedictum: hepar enim frequentissime abscessum perfert ac exulceratur. Quare ex his quae de hepate diximus, ad splenis curationem exempla transsumes,

Cura splenis in scirrhum indurati, Galeni. Cap. xi.  
Iam antea praedictum est, splenem quam celerrime sole re in scirrhum indurari, sanguine circa splenitides in ipso uenas obturato, ut neq; excerni, neque digeri ob crassitatem facile possit. Quare attenuantium pharmacorum usu opus habet, citra tamen manifestam caliditatem: ne uehementius inspissetur crassus humor in eo obturatus. Ammiscendum est autem eis quippiam ex adstringentibus & austeris, quo ipsius actio & robur conseruetur. Si enim praedebilitate feculentum & atrae bilis humor, ex hepate, quemadmodum consuevit, non attraxerit, uisiosum humorem uniuerso corpori affricabit. Immedicabilia enim ulcera hoc modo affecti habebunt, & maxime circa crura, & colorem corporis uitiatum ad nigredinem uergentem. Diutius autem durante malo etiam aquam inter cutem incurrunt. Ob id igitur in ipso splene naturalem firmitatem custodire oportet, quo conueniens sibi alimentum attrahat, & sanguinem repurget, superfluaq; in ipso generata retrimenta ad uentrem demittere queat, quae postea cum ciborum recrementis excernuntur. Ad hanc itaq; rem amara ipsi spleni offerimus, quibus aliquando ex austeris quippiam ammiscemus. Amara quidem ut humoris crassitatem secent ac repurgent: austera autem ut robur & firmitatem eius conseruent. Quale uero pharmacum hepatis est absinthium, tale existit spleni capparidis cortex. Et quale est hepatis eupatorium, tale spleni est scolopendrium. Similibus enim secundum genus pharmacis utraq; uiscera opus habent. Verum splenem tanto fortioribus indiget, quanto crassiore uitur alimento. Ceterum a ueteribus plurima potabilia pharmaca ad induratum lienem sunt descripta. In curando autem animaduersionem habere oportet, num curandi aegri uniuersum corpus frigidius sit, an calidius, num humidius, an siccus. Eis igitur qui corpora natura habent calidiora, citra molestiam myricae folia dantur, uirgultaq; & radix: scolopendrium item, & rumicis syluestris, maxime uero acuti semen, foliaq; & radix: optime autem facit radicis uiridis contusae succus cyathi unius mensura potatus. Probe facit & lycapnos, quae & anchusa appellatur: danda autem radicis eius drachma una, aut cacumina hederæ tria, aut folia eius, uel etiam radix: item polytrichon, & capni, quod chelidonium uocatur, decoctum ad tertias redactum, folia salicis & cortex, itemq; radix limoni, quod & cynoglossum uocatur: folia & radix, & semen quoque peledni. Haec enim neq; uehementem in se habent caliditatem, neque si calidior temperatura adsit, ei molestiam inferre solent: quapropter his tum ad praedictos, tum ad reliquos utendum in principio adfectionis: a mitioribus enim auspicari oportet. His autem efficaciora sunt, quae in ueteratis scirrhis conducunt, & corporibus agrestioribus. & qui omnem corporis habitum habent frigidiores: trixago, gentianae radix, calamintha, pulegium, & cyclamini radix, scordiū, trifolij bitumen olentis semen, hyperici coma, acori, asari & eryngij radix, uiridis semen torrefactum, centaureae maxime minoris succus, etiam si sit exiccatus, chamaepitys, polium, lonchitidis radix, anagallidis quae caeruleum habet florem succus, glycyfides aut paeoniae, itemq; dracunculi radix tum uiridis, tum sicca. Aliud. Carol ex terra suscepti, radicis rubig, bryoniae, ammoniaci thymiamatis, cuiusq; drachmam



chmam unā. horum unumquodq; aliquando tritū ex posca datur, aliquando autem decoctum eorum præbetur: quod si sicca dare uelis, sufficit drach. plus minus unam exhibere. Conducit item hoc. Ammoniā thymiamatis sextantem, castorij unciam i. conterito, & drachmā i. ex posca aut aceto mulso præbeto. Aliud. Scillæ assatæ drach. i. corticis radicis capparis drach. i. præbe ex posca, uel aceto mulso. Mouet enim crassos & uiscosos humores, inquit Archigenes: aliquando & cruenta non per urinas tantum, sed & per uentrem educit. Aliud. Thuris obolos duos, seminis foeniculi cochlearium unum, præbe ex uino. Aliud Marciani, præsens remediū: quod etiam si sit induratus, citra dolorem ipsum laxiorem reddit, ut neq; significationē, neq; etiam suspensionem suffusionis aquæ inter cutem relinquat. Seminis uiticis cōtusi & cribrati per angustissimū cribellum dra. v. his qui perfectæ sunt ætatis ex posca bibēdas præbe. Aliud eiusdem, ad splenem & hepar indurata, & principium aque inter cutem, & ad alui, & intestinorum, ac stomachi inflationem, simplex & periculo uacans. Bryoniæ radicem conusam & cribratam, repositam, ab aëre & uento intactam, ne quid inde transpiret, adserua, & pro uiribus ægri præbe. Perfecta mēsurā exhibitionis est cochlearium unum, hydropicis quidem & splenicis ex posca: hepaticis ex hydromelite aut uini dulcis cyathis tribus. Pastillus ad splenicos, Asclepiadæ: liquefacit splenem, ut multo experimēto cōstat. Seminis ericæ drach. viii. piperis albi drach. iiii. spicæ nardi drach. iiii. ammoniaci thymiamatis drach. iiii. scolopendrij drach. ii. costi drach. ii. cum aceto scillitico subigito, & drach. i. cum aceto mulso aut posca præbeto. Conuenientissimum autē spleni in scirrhu indurato remediū existit ferrum aqua, aut uino, aut posca extinctum. Ea ipsa enim aqua, aut uinū, aut posca in principio exhibita iucūda & utilissima existunt, & per plures ex ordine dies dantur. Itaque febrientibus aquam, aut poscam dilutā præbeto: eis uero qui teneram carnem habent ac febre carent, uinum. Sit autem ferrum quod in ipsis extinguitur stomoma. Ipsi autem stomomatis ferri squama, (quam in fabrilibus officinis ferrum dum ignitur & malleo tunditur, abijcit) postea agrestioribus hominibus utiliter exhibetur. Præclare enim hæc splenem liquefacit, utpote quæ consumendi facultatem præstat, quare aliarum rerū complexu opus habet, ne inde stomachus male afficiatur. In calidioribus igitur tēperaturis, pelecini semen ei ammiscere conuenit: aut si id non adsit, scolopendrium: aut si neq; hoc haberi possit, absinthij comam, aut rumicis acuti radicem aut semen. In frigidioribus autem temperaturis, ad squamam ipsam, cassiam, aut amomum, costum, anisum, aut serpillum mōranum, & similia addere oportet. Quanquā tum in his, tum in omnibus pelecini semen maxime cōueniat. Omnia autem nūc dicta, itemq; ea quæ paulo antè sunt relata simplicia pharmaca, in principio cum posca diluta coquantur, postea uero etiam meraciore. Progressu uero temporis etiam ipsa contusa & cribrata cum aceto aut aceto mulso exhibentur. Verum certam uniuscuiusq; horū mēsurā definire difficile & periculosum est, quū diuersæ eorū qui ea accipiunt sint naturæ: quare in principio parū quid ex uno-

quoq; exhibendum, & pro ratione deinde exhibitionis mēsurā augenda, iuxta ipsius pharmaci, atq; etiam ægri uires. Omnia igitur prædicta quomodocunq; tandem potata, aut semel saltem deglutita permanere solent: uerum glans unguentariorū, quā myrobalanon appellant, nisi cū posca bibatur, facile uomitu reijcitur. Licet igitur singulis prædictis simplicibus pharmacis per se uti, & duo item uel tria aut quatuor, permixta æqualiter uel inæqualiter præbere. Ex compositis autem ferè pulcherrimū est, id quod ex ossibus constat, ad podagricos descriptum Philagrii pharmacum. Efficax enim reperies ipsum, inquit Philagrius, & conuenientissimum ad omnia splenis uitia, præsertim cum tumore magno & duritia oborta. Sensibiliter enim huiusmodi affectionibus auxiliatur: utpote quod ui sua emollit & concoquit, ampliusq; diffundit & purgat, ultra hoc quod paulatim discutit & resiccat. Est autē tum gustui, tum odorati suauissimū, maxime si plurimo despumato melle mixtum, delingendum præbeatur. Secūdo autē loco inter ea quæ ego noui est & hoc, inquit Philagrius, ipso sanè usu probatum. Corticis radicis capparis drach. vi. foliorum myricæ drachm. vi. squamæ stomomatis ferri drach. vi. myrobalani drach. x. aut vi. ammoniaci thymiamatis drachmas viii. seminis pelecini drach. v. stocheadis drach. iiii. comæ absinthij drach. iiii. scolopendrij drach. x. Excipe aceto & informa pastillos, ac exhibe drach. i. ex posca aut aceto mulso aut uino. Hoc itaq; robustū est pharmacum, ut etiā ad duriora corpora quadret. Aliud eo imbecillius tale est. Pulegij drach. xii. radicis rumicis acuti dra. vi. seminis eiusdem drach. vi. capnij iuxta sepes nascentis sicci drach. vi. pelecini drach. iiii. scolopendrij drach. iiii. spicæ nardi drach. ii. rhei pontici drach. i. corticis capparis drach. ii. Excipe aceto ac redige in pastillos, exhibe q; drach. i. quæadmodum in præcedenti dictum est. Pastillus ad splenicos, splenē liquefaciēs: Asclepiadæ. Seminis ericæ drach. iiii. piperis, ammoniaci thymiamatis, spicæ nardi, cuiusq; drachm. ii. Quidam etiā costi drach. ii. & scolopendrij drach. ii. Arida contundito & cribrato, ammoniacū in aceto dissoluito, ac simul in pastillos digerito: ex quibus drachmā unā cum aceti mulsi cyathis iiii. propinato. Qui huius pharmaci compositionem docuit, per tridū hoc suis catulo se exhibuisse dixit: postea ubi catulū dissēcuisset, ipsum sine splene reperiū. Aliud, ad spleneticos & hydropicos, quod optime urinam ciēt, & uentrē emollit: Archigenis. Scillam magnā luto oblita assato, deinde repurgatē internæ libras ii. accipito, dauci unc. i. anisi, fœselis, radicis panacis, iridis, cuiusq; unc. i. seminis urticæ sextantē, cedridum, hoc est, fructuū cedri sextantē, myrrhæ dra. iiii. farinæ erui unc. xvi. cū uino informa pastillos, & præbe dra. i. cū aceti mulsi cyathis iiii. Aliud, Radicis panacis, ammoniaci thymiamatis, corticis radicis capparis, radiculæ, scillæ assatæ internæ, æquales omniū partes cōmitte, & obolos tres aut quatuor præbe: cōducit anhelosis & hydropicis. Pastillus summæ utilitatis. Cacuminū hederæ nigre drach. ix. spicæ nardi drach. v. seminis rutæ syluestris dra. iiii. castorij dra. i. iridis dra. vi. Cū succo uerbenacæ recte pastillos iformato, & p qnq; dies mane dra. i. ieiunis ex uino ueteri præbeto. Mouet urinas cruētas.



Atque haec haec quidem de pharmacis potabilibus. Ceterum ad splenem in scirrhum induratum etiam sanguinis detractionem commodam esse scimus, quae inter paruum sinistrae manus digitum, & eum qui medio proximus est, sit facta. Quidam autem uenam retro sinistram auriculam sitam diducunt, inquit Archigenes, & ex profluente inde sanguine splenem illinunt, ac magnum commodum sentiunt. Idem etiam hepate affecto faciunt, incidentes retro auriculam dextram uenam. Quare neque absurdum fuerit etiam his auxiliis uti: animaduersione tamen habita, ne arteriam pro uena dissecemus. Nos autem in his qui multo sanguine abundat, inferiorem in sinistro cubito uenam secare consueuimus, uerum & hic cauendum ne subiacentem arteriam simul dissecemus. A uenae incisione, etiam cucurbitulae spleni affigendae saepe & cum scarificatione, extrahendusque per ipsas plurimus sanguis: quin & hirudines summa commoditate in ipsum splenis locum affiguntur. Loci etiam amplius per spongiam acida muria imbutam fouendi, furfuribus quoque in aceto decoctis, absinthii coma, ac pulegio, & lauri folijs, similibusque adiectis. Quidam autem lapidem molarem aut gagatē longitudine octo digitorum, & latitudine sex digitorum, secundum crassitudinem leuem, igniunt & aceto adspargunt, panniculoque in aceto calido madefacto circumposito, locis imponunt, & quam diu calidus sit, incumbere sinunt, atque huic fomento testimonium praebent, inquit Archigenes, tanquam quod insensibiliter deprimat tumorem. Post fomenta ad cataplasmata transeundum, ex farina ordeii ac lolij, absinthii coma, myrobalano & althaeae radice, cum aceto mulso. Aut panem aridum cum capparis cortice, & myrobalano contusum, cribratum, & cum aceto mulso decoctum imposito. Optime facit & stercus caprinum cum farina ordeacea ex posca cataplasmate impositum. Lupinorum item farina ex posca, & fabarum eodem modo. Cinis quoque ex officina fabrili, & bryoniae radix cum caricis, aceto, & cyclamino, eodem modo. Brassica etiam syluestris cum melle imposita auxiliatur. Similiter & folia isatidis, & marrubium cum ordeacea farina ex posca. Cardamomum cum caricis. Cyclaminus cum caricis ex aceto decoctus. Cataplasma optimum. Foeni graeci trientem, farinae ordeaceae quadrantem, cardamomi unc. i. caricarum pinguium lib. i. uerbenacae herbae unc. i. ficus in aceto acerrimo macerato, fortiterque in mortario contundito, reliquisque adiectis ac si mul unitis utitur. Optimum cataplasma & hoc est. Seminis raphani partes ii. foliorum salicis partem i. farinae araci partes ii. seminis pastinacae partes ii. in aceto cum pari sapae mensura decoquantur. Aliud, ad inueteratum malum, & corpora dura. Corticis radicis capparis, radicis struthii, sinapis recens, omnium aequales partes, farinae tritici duplum ad omnium trium mensuram. Vtere ueluti praedictis. Aliud praeclarum ad duritias. Stercus gallinarum album, siccum, contusum, ac cribratum cum aceto mulso decoquito, confidenterque imposito. Vnguentum optimum. Ammoniaci thymiamatis, thuris, foliorum rutae uiridium, sing. aequales partes cum aceto contere, & quam crassissime illita exiccare permittite. Aliud, quod antea quam medeatur non abscedit. Ammoniaci staterem i. thuris staterem i. piperis staterem i.

Ammoniacum cum aceto contere, eodemque etiam reliqua modo. Aliud. Ammoniaci staterem i. acaciae stateres ii. aloes staterem i. thuris stateres ii. Apparatur autem hoc modo. Ammoniacum & aloen ac thus in aceto macerato, acaciam autem contundito, cribrato ac praedicta contrita omnia ammisceto. Croco magma etiam utiliter cum aceto illinitur: saepe enim non abscedit priusquam medeatur. Ceterum epithematum medelae magis fidendum. Pleraque enim eorum quae in medicamentarijs libris referuntur ex alumine & sulphure composita, praedominantem habent adstrictoria facultatem. Quare in eis animaduersionem habere oportet, non modo simpliciter facultatis eorum pharmacorum quae ammiscentur: uerum etiam quantitatibus ipsius mixturae. Etenim in plagis quae flatuosum habent tumorem, & maxime in quibus tumor latus est, nihil peccaris, etiam si plurimum ex aluminosis adieceris. In tumoribus uero in scirrhum induratis emollientem & diffusoria facultatem praecellere oportet, quibus parum quiddam ex adstringente sit admixtum. Vnde igitur ex simplicibus & naturalibus ac nulla arte apparatis, diffusoriae & adstringentis simul est facultatis, ipse uidelicet salis flos, qui splenem in scirrhum induratum sanat, inquit Galenus, calidus in uesica bubulam coniectus, & forinsecus impositus. Oportet igitur medicum ad affectionem respicere, & pro eius ratione tum addere, tum adimere ex eis quae in epithematum compositionem coniunguntur, ueluti exempli gratia, si duriciem emolli re uelit, ammoniacum & bdellium pingue, ac styracem optimum equaliter uniuscuiusque drac. iiii. ammiscere debet. Si uero crassos humores dissecare uelit, opopanax & costi tantundem addet. Quum autem humores diffunduntur, etiam diffusoria ac digerentia sunt ammiscenda: aut stercus caprinum in aceto dilutum addendum. Hoc enim & crassitudinem dissecat, & simul discutendi uim habet. Quod si discutere tantum uelit, humoribus uidelicet antea sufficienter attenuatis, nitrum pro stercore caprino ammiscet. Capparis autem cortex ammixtus ultra hoc quod dissecat & repurgat, etiam splenem corroborat. Habito igitur ad ea quae ubilibet accidunt respectu, aut emollientia augebis, aut attenuantia, aut etiam ea quae discutiunt & robur addunt. Optimum autem epithema emolliens & diffusorium hocce est. Ceræ quadrantem, propolis sextantem, galbani dra. iiii. opopanax dra. iiii. Vtere: contunditur hoc pharmacum, & strumas recentes, omnemque duriciem recens oborta dissoluit. Aliud malagma Asclepiadae, quod articulos incuruatos relaxat. Bdellii pinguis, adipis uitulini, ammoniaci thymiamatis, iridis, cuiusque drac. xvi. opopanax, galbani, thuris, canchryos, styracis, cuiusque dra. viii. piperis grana clx. ceræ dra. xlviii. fecis olei irini sextantem ac unciae dimidium, uini quantum satis est. Arida contundito, & cribrato. Ammoniacum, opopanax, thus, bdellium in uino dissoluit, liquecibilibus autem liquefactis, adfusis, ac simul emolliis utitur. Extreme emolliendi facultate praestat hoc, inquit Galenus, neque enim aliud magis eo emolliens repereris: quod si irini olei inopia sit, cyprino aut sicyonio eius loco utor. Aliud malagma Amythaonis, ad praecordiorum distensiones: conducit & articulis qui difficulter mouentur, omnemque duriciem dissoluit, & priore quidem minus emollit, magis autem digerit ac discutit. Compositio sic habet. Ammoniaci thymiamatis drac.



drach. x x x v i . ceræ dra. x x x v i . terebinthinæ drach. v i i i . bdellij dra. v i i i . myrrhæ dra. i i i i . thuris drac. i i i i . galbani drach. v i i i . olei cyprini sexuncem. Myrrham, bdellium, thus, uino præmacerata conterito: ammoniacum in aceto dissoluto: liquefabilia autem liquefacito, affundito, ac utitor. Aliud prædicto longe efficacius, & fortius, inquit Philagrius: discindit enim & attenuat inspissatos humores, & uiscosos repurgat. Habet autem hoc modo. Malagma Asclepiadæ. Ammoniaci thymiamatis sexuncem, galbani, myrrhæ, cuiusq; sextantem, ceræ sesquilibram, thuris quadrantem, opopanax quadrantem, radicis panacis sexuncem, propolis quadrantem, acetis sextarios ii. stercoris capræ quadrantem. Ammoniacum cum aceto terito, deinde etiam thus, galbanum, opopanax, & myrrhā. Propolin autem cum modica cera in mortario tundito: ceram uero cum olei triente liquefacito paulatim donec cogatur decoquendo, & deinde propoli adiecta, ab igne tollito, percolato, ac frigesieri finito, perpolitaq; tritis adiecto, unito, ac utitor. Cæterum epithema quod ego composui, inquit Philagrius, optimū ad diuturnas & frigidiore affectiones existit. Myrobalani drac. x l v i i i . ammoniaci thymiamatis dra. x l v i i i . bdellij drac. x l v i i i . scythicum uero bdellium maxime probo, corticis radicis capparis dra. x l v i i i . mannæ dra. x x i i i i . opopanax dra. v i i i . styracis drac. i i i i . uisci drach. x i i . ceræ drach. x x i i i i . floris salis drach. x l v i i i . Ammoniacum cū salis flore dissolue: capparin uero, myrobalanum ac mannā cum aceto: reliqua autem iuxta ignē emollito & in mortario tūdito, & trita eis adiecto, unito, ac utitor. Hoc pharvacum splenem consumit. Aliud. Verbenacam uiridem cum manna terito, atq; axungia suilla ueteri excepta imposito. Dura enim corpora & diuturno malo affecta quam maxime inde iuuantur: reliqua uero integre sanat. Prodest etiam uerbenaca per se imposita, itemq; trixago. Aliud epithema Asclepiadæ, ad splenicos, consumit tumores. Foliorum sambuci tenerorum lib. i i i . aloës pinguis lib. i . cum aceto terito ac lenito, linteoloq; excepta imposito. Verum si malum recens est, uniuscuiusq; par pondus coniuncto. Aliud. Seminis ericæ libram i . galbani lib. i . Semen contusum & cribro excussum galbano excipito, rursusq; tundito olei irini fece addita, quo malaginis formam acquirat, & linteolo inditū imposito. Vniuerso autē uiscere, recrementisq; eius, atq; meatib. oportunis, per emollientia, repurgantia, dissecantia, attenuantiaq; & diffundentia humores, ampliusq; etiā per ea quæ uias dilatant, tum in potu accepta, tum foris imposita preparatis, efficacius euacuare potestibus est utendū, ac primū quidē simplicioribus, postea uero etiam fortioribus, ueluti exempli gratia: primum quidem epithymi drachmas i i i i . cū feri lactis heminis v. præbeto. Dato autem eis epithymi drachmas i i i i . tenuissime tritas cū modico sero, atq; ubi uenter operari inceperit, serū per se paulatim absorbendū exhibeto. Cæterū post aliquot dierū interstitiū, ubi uires recollegerint, hieram Archigenis ex colocynthide præbeto, aut quæ Iusti appellatur. Post horum autem omnium usum, farinæ tenuissimæ radicis cyclamini siccae drac. i i i . aut i i i i . ex aqua mulsa dato, atque quo sudorum exclusionē iuues, egrū uelamentis cōtegito, & in lecto

cōcalefacito. Epithemata discussoria & resiccantia. Postquam corpus fuerit repurgatum, epithematis quæ digerere siue discutere & resiccare possunt, utē dum, qualia sunt quæ ex auripigmento & alumine componuntur: ex quorum numero est etiam id quo ego, inquit Philagrius, utor. Ceræ tyrrhenicæ drach. x c i i i . resinæ pinus siccae drach. x c v i . resinæ pinus liquidæ drachmas x c v i . auripigmenti drac. x v i . aluminis scissilis drach. x i i . Metallica terito, & liquefabilia cum modico oleo liquefacito, ac refrigeratis sicca adiecto, unito, & utitor. Aliud aurei coloris. Asclepiadæ, ualde pulchrum. Ceræ libras duas, resinæ pinus siccae libras duas, auripigmenti sextantem, aluminis scissilis sextantem, calcis uiuæ unciam unā, olei cyprini uncias sedecim, acetis uncias sedecim. Aliud, ad splenicos & hepaticos. Aluminis liquidī, sulphuris uiui, nitri, ammoniaci thymiamatis, mannæ, radicis capparis corticis, singulorum sexuncem, picis libram unam, resinæ pinus siccae libram unam, olei cyprini sexuncem, acetis quantum sufficit. Aliud epithema hepaticum, Ipoteritū appellatum. Resinæ pinus siccae libram unam, ceræ libras duas, picis libras duas, aluminis liquidī, nitri, sulphuris uiui, mannæ, cuiusq; libram unā, aloës sexuncē, pyretri, aristolochiæ longæ, bdellij, ammoniaci thymiamatis, amomi, uisci, cardamomi, olei, cuiusque quadrātem, acetis sesquiseptarium. Ammoniacum, alumē, sulphur, nitrum, cum aceto diluta terito: reliqua uero arida quidem contundito, ac tritis admisceto: liquefabilia autē liquefacito, atq; reliqua cum eis excipito. Optime faciunt & ex caprino stercore apparatus: item plurima eorum quæ ad hydropicos sunt descripta: & Machæionis emplastrū, & emplastrum ex rumice, quæ in decimo quinto Sermone referuntur. Phœnigmi, cutem rubefaciētes. Efficaciter autem in ipsis phœnigmi auxiliantur, tū qui ex sinapi apparantur, tum qui eis cōsimiles existunt. Cæterum corpore prius à superfluis humoribus euacuato, eos adhibere oportet. Pulcherrimus autē phœnigmus talis est. Phœnigmus Asclepiadæ authemeros, quasi eodē die auxilians inscriptus: qui sanē ab uniuerſa affectione liberat. Pyretri dra. o c t o , myrobalani, cardamomi, seminis urticæ, piperis, cuiusq; drac. o c t o , sinapis trientem. Omnia conterito, & aceto subigito, & tepesacta ex intervallo per horas tres imposito, si saltem tamdiu sustinere possit: deinde ablato pharmaco lauari præcipito, in feruentioris solij defessu. A balineo autem cerato ex rosaceo apparato utēdum. Alius. Lepidij folia trita cataplasmatīs modo imposito, atque ubi morsum sentiūt, in balneum inducito, & ablato pharmaco, in feruentem aquā immittito & perfundito. Difficulus enim ferunt nimīā mordacitatem. Sani autem exeunt, inquit Archigenes. Idem remedium & ad coxendicum dolores efficacissimum reperitur. Summe etiā auxiliantur myrobalani cortices & nitrum. Nitrum per se terito, & parum acetis ammisceto, deinde resinam ac ceram cum pauco oleo liquefacito, affundito, emollito, ac utitor. Cæterum quod operæpretium est cognosse, fortia pharmaca non nisi corpore prius à superfluis humoribus repurgato, & probe cōcoquēte, adhibere oportet. Smegmata, siue repurgatoria. Oportet autem locum ipsum sensim ad phœnigmorum rubefacientium toleran



tolerantiam irritare: quod per repurgatoria smegmata commodè fieri potest. Componantur autem smegmata ex staphide sylvestri, piretro, pipere, ac alcyonio, pari uel impari modo prout uidebitur coniectis. Quod si teneram carnem habeat æger, iridis, & cyperi, & herbæ sabinae aliquid his ammisceris: aut farinam aliquam, ueluti erui, aut fabarum, aut cicerum. Quod si etiam odoratum reddere uelis pharmacum, calsiæ quippiam & philli ac amomi adde. Si uero durius contingat curandum corpus, ex pumice addes, atque adarce. Postremum autem phoenigmis ex sinapi cõsimilibusque uteris: corpore prius uniuerso à superfluis humoribus repurgato: ne uide licet uehementia caloris alia adtrahat recrementa, duriores reddat ipsum locum.

*De splenicorum uisione.*

Cap. XII.

Quod si prædicta auxilia irrita sint, ineffaciterque adhibeantur, ad uisionis patrociniũ cõfugere oportet: ita ut uel per cauteria, uel pharmaca crustas inuramus, & multo tempore saniem effluere sinamus: corpore tamen prius per uenæ incisionem, & purgationem euacuato. Etenim quum ferè in totum uitiatas humoribus splenici sint repleti, & non præeuacuetur uniuersum corpus, maligna ulcera ex crustis fieri cõsueuerunt.

*Diæta splenicorum.*

Cap. XIII.

Porro diæta ipsorum splenicorum tempore inflammationis simplex sit, & quæ facile concoquatur: uelut est halica lora, & ptisanæ succus, panis madefactus. Si uero inflammatio diutius remoretur, etiam auicularum carnes eis concedendæ, & pisces petrosi aquis degentes. Vbi uero schirrhus sit perfectus, diæta attenuatoria exhibeatur, & acrum rerum comestiones per interualla. Proprie autem splenicis cõuenit caparis comesta ex aceto mulso. Vinum sit non ualde uetus, quod aqua permisceatur, in qua ferrum sæpe ignitum sit extinctum. Plurimum autem fiducia in exercitamentis ponendum, quibus ante cibum uti cõuenit, corpore superfluitatibus non abundante. Ex eorum autem genere ex superabundanti faciunt deambulationes et cursus: & noui sanè aliquos, qui ex his solis ab omni affectione sint liberati: gestationes etiã omnes conueniunt, proprie autem quæ sit in equo. Manifestum autem est quod uociferationes quoque oportune & in tempore assumptæ eis summe opitulantur.

*Cura eorum in quibus splen frigida, uenter uero calida affectione laborat.*

Cap. XIII.

Cognitum uero necessarium est, quod in aliquibus splen frigidam intemperiem habet, & ob id calefacientibus opus habet: uenter autem bile agitur, et cõtrariam spleni sustinet intemperiem: aut etiam citra priuatam affectionem, ex meatu qui bilem susceperat, flauam bilem assumit: & absque hoc etiã, sæpe ob ægram concoctionem & ciborum in uentre corruptionem splen afficitur: etenim aliquando quum frigiditatis sensus cum grauitate circa splenem percipitur, uenter biliosum uomitum reiecit: tunc equidem difficilis cura nobis instat, & quæ difficulter procedit: nimirum splene caloris forum expetere: uentre autem atque etiam uniuerso corpore refrigeratione indigente, atque id uno & eodẽ tempore. Quo igitur quantum possibile est utriusque mēbri affecti effugiāt lētionē, pro uiribus conabimur ut eos à tristitia & cura, iracundia & uehementibus motibus, multa item inedia ac cibi auersatione

auocemus, simulque per ea quæ citra molestiã purgant pharmaca, biliosum humorem euacuemus. Os uero uentris firmemus ac corroboremus, ne quid eorum quæ ex reliquo corpore ad ipsum influunt, susceperit. Cæterum corroboratio ipsius per ea quæ difficulter corrumpuntur, contingit, de quibus in secundo mentionem fecimus Sermone. Suffecerit autem ipsis exhibitio modici panis cum oliuis albis aut colymbadibus appellatis, citra potum, si balneum & prandium differant, ne bilis efferatur. Melius autem est si prius quam bilis efferatur, ieiuni lauent. In prædio cibi eis præbeantur tum quantitatis tum qualitatis moderatè: uerum ut splen illæsus permaneat, conuenit primum boni succi & actu calidos præbere, ac deinde postremum tum actu tum potentia frigida porrigere, ueluti lactucam & frigidum potum, ac similia: non frigida enim frigidis præsubstrata splenem illæsum ab his quæ postea ingeruntur frigidis, conseruant, ex quibus os uentris corroboratur, & calida ipsius intemperies corrigitur. Optimum igitur fuerit postremum omnium mala punica, aut etiam alia, aut pira, aut quædã quæ stomacho grata sunt acceptare: atque eodem omnino modo etiam coenam instituere. Conuenit etiam per ea quæ forinsecus imponuntur hoc modo affectis opitulari. Refrigerant autem uentrem citra nocumentum forinsecus imposita, oleum melinum & rosaceum: cerata item ex ipsa apparata, modica mastiche ammixta, aliquando etiã oleo addito omphacino. Calidus itaque uenter per prædicta lenitur. Ad splenem autem calefacientia adhibenda sunt, qualia sunt epithemata poliarchia appellata.

*Cura Splenicorum quos tussis infestat.*

Cap. XV.

Quod si tussicula splenicum infestat, sintque eiusdem generis adfectiones circa utraque uiscera, ueluti si contingat & splenem & pulmonem eodẽ tempore crassiss ac uiscosis humoribus aut aliquo alio frigido morbo detineri, tunc sanè podagricum pharmacum ex ossibus cõstans, uehementer utile tum spleni, tum eodem modo tussientibus existit, & antidoti quæ eis similes habentur. Si quidem igitur similes contigerint adfectiones, similia remedia adhibere oportet: ubi uero diuersæ erunt adfectiones, diuersis pharmacis utendum est: utpote si splen à crassiss & uiscosis humoribus, & frigidis liquoribus adficiatur: tussis autem à tenui & acri destillatione contingat, si modo possibile fuerit, & destillatio non urgeat uehementè, à pharmacis fluxum cõdensantibus abstinere cõducit, ueluti est quod ex papaueris calicibus constat, itemque ex seminibus pastillus, & quæ his similia existunt. Vehementiore autem & acriore existente destillatione, & quæ periculum exulcerationis pulmonis minetur, utendum quidem ex papaueris calicibus confectio, uerum spleni epithemata attenuatoria imponantur, atqui nisi magna impendat necessitas, ea quæ stupefaciunt uitanda, capiti autem aliquis ex seminibus pastillus cum aceto rosaceo ad strigmenticiam crassitudinem reductus imponatur: præstat autem ex ipsis in hoc præsertim usu, hi qui crocei appellantur. Cum aceto enim & rosaceo oleo triti, & ad strigmenti spissitudinem reducti, lanaque conuoluta excepti, ac sincipiti impositi, tenuitatem destillationis inspissant, simulque exurentem & acrem in capite qualitatem refrigerant, tussis sedant, & somnum suum inducunt. Post hæc autem theriace per opium recens apparata



apparata in potu accepta, tussientibus quibus simul splen affectus est, auxiliatur.

*Cura eorum quibus splen in magnitudinem excreuit, simulq; durus existit.* Cap. XVI.

Quidam ex splenicis immodice auctū splenem habēt, ut non solum hepar & inguina contingat, sed & ob soliditatem attollatur, vitalesq; cordis vires maximopere lædat, ac imbecillitatem inducat, utq; ex eo uniuersum refrigeretur corpus, ipsumq; adeo hepar tenuissimum & aquosissimū in ipsis fiat, & eiusmodi quoq; sanguis. Horum sanē qui hoc modo sunt affecti curā recusare oportet: quod si cogamur tamē, à dubijs & hebetibus remedijs auspicabimur, periculo eis incumbente prædicto. Verū neq; intra corpus sumendum, neq; forinsecus adhibendum, ullum ali- quod uehemēs pharmacum offeremus: neq; euacuationem etiā coaceruatim faciemus, sed paulatim & per simpliciorum medicaminum usum. Cæterum tum per os exhibitis, tum foris admotis, & quantū possibile fuerit conuenienti diæta, uirium imbecillitate refocillata, si in melius proficere ipsos uideamus, fortioribus omnino remedijs utemur, ita tamē ut sensim aucta ipsa apponamus.

*De ictero seu morbo arquato: ex libris Ruffi & Galeni.* Cap. XVII.

Icterus à similitudine ad animalculum, quod ictis, id est, uiuerra appellatur, nominatus est: est autem mustela syluestris, quæ auricolores oculos habet. Verum icterus morbus biliosi humoris circū corpus effusio est, ob secermentis eum facultatis debilitatē, quæ eum segregare & ad proprios excretionis locos demittere nō ualet. Errare autem eos credendum est qui hepatis affectionem in omnibus ictericis adesse putauerunt. Conspicitur enim sæpe, quum hepar nihil male est affectum, flauæ bilis ad cutem effusio facta in iudicationibus morborum. Cōspicitur etiā circa febrem aliquando sanguis in bilem exagitatus per corruptionem uidelicet aliquam peregrinā: qualis quoq; à uenenatarū bestiarum moribus contingere consuevit: etenim quū quispiam à uisera morbus esset, uniuersum corpus prasini siue porracei coloris habuit, & quū assidue theriacē bibisset, celerissime sanatus est: quare nihil mirum est, talem aliquando contingere humorū in corpore permutationē, ut uniuersum corpus ictericum colorem assumat. Quin & fieri potest ut propter naturalis temperiei ipsius hepatis mutationem, eiusmodi humorū corruptio contingat, ut aliquando herbis pallore albican- tibus totum corpus manifeste assimiletur, aliquādo etiam plumbi colorem induat. Quemadmodum etiam eiusmodi colores nigricantiores fiunt, si ob splenē quā si ob hepar affectum contingat. Splene scilicet ad attrahendum ad se ex hepate atræ bilis humorem, & ad repurgandum sanguinem pro more suo debilitato. Fit autem aliquando icterus ob imbecillitatē uesicæ bilis susceptricis, quæ biliosum humorem, ueluti cōsueuit, in sese ex hepate non attrahit, & ob id impurum sanguinem relinquit. Possibile est etiam eam nimis repleti, aut repletam propter repletionis multitudinem non posse euacuari: Aliquādo autem & propter obturationem aut debilitatem uenarum, quarum ora ex ipsa ad hepar deferuntur, biliosum humorem non adtrahit. Quare in ictericis affectionibus recrementorum figura necessario con-

sideratur, quum in aliquibus multum colorata per flauam bilē appareant recrementa, quemadmodum etiam in alijs urinæ. In quibus enim ratione iudicationis bonæ in febribus, biliosus humor ad cutem prorumpit, his & recremēta & urinæ naturali modo se habere uidebuntur. Quibuscunq; uero citra febrē, unā cū grauitatis alicuius aut doloris sensu circa dextrum iliū, arquatus cōtingit, in his uesicæ bilis susceptricis obturationem factam esse putandum est. Quibus autem neq; grauitatis neq; doloris sensus circa iliū adest, in his splenem uiciatū humoris causam esse iudicabimus. Si autē neq; dolor neq; grauitas circa ilia infestet, neq; febris præcessit, & tamen sanguis in uniuerso corpore in bilem mutetur, atq; ita arquatus contingat, his pruriginosior cutis fiet, & magis etiam arefcet. In quibus uero atræ bilis humor unā cum sanguine ad cutē est delatus, hi omnino grauius afficiuntur. Consequitur enim ipsos tristitia præter rationem, & mordacitas eorum quæ circa uentrē sunt, difficultasq; spirandi, & cibos auersantur, & nigra lotia excernunt. Aliquando autē & per interualla quædam corpora ipsorum tepescunt: stercora uero chalcanti colorem referunt, & aluus magis his resiccatur. Cæterum eos qui ex pallida bile arquatum contrahunt: nulla mordacitas eorum quæ circa uentrē sunt cōsequitur, neq; etiam in tantū auersantur cibos: sed obtusior tamen aliquando fit in eis ciborum appetitus. & stercora quidem albida egeruntur, urinæ autē crocei coloris, turbatæ tamen & tenebras referentes permanent. Communiter autē omnibus ictericis pigrities & tumor grauians ad motum corporis contingit, & ad dulces cibos animum habent alienatum: amaros uero non admodū auersantur, & uarijs imaginationibus uexantur. Pruritus etiam uniuersi corporis comitatur, & difficulter exudant. Porro alba oculorum & partes faciei tēporib. propinquæ, itemq; malæ pallorem ostendūt: uenæ etiam sub lingua repletæ reperiuntur, & abundantem humorem significant.

*Cura arquati.*

Cap. XVIII.

Arquati igitur qui ratione bonæ iudicationis febribus perfecte solutis fiunt, facillime sedantur: si ægri laua- cris aquarū dulcium utantur, ac olei discussorij per frictione, omnibusq; quæ rarefaciunt cutem: qualia sunt oleum chamæmelinum, anethinum, irinum, gleucinum, amaracinum & rosmarinus herba oleo incocta ipsum plurimum discussorium facit. Diætā quoq; uniuersam humectiorem in his constituere oportet, & ut mediocriter humorum crassitudinem attenuare possit. In reliquis autē ictericis duo maxima remedia principatū obtinent, sectio uenæ, & purgatio. In quib. igitur multitudo sanguinis unā cū bile in toto corpore abundat, & quos circa hepar aut splenē dolor aut distensio infestat, nihil uenæ incisione cōmodius fieri potest, si nulla alia re id facere præpediaris: particulatim autē & per uices sanguis est detrahendus, ne per coaceruatam euacuationē uires ægri prosternantur: neq; uero inepte clyster adhibetur, si uenæ sectio impediatur. A uenæ autē incisione etiam commode clyster assumitur, qui propter stercorum euacuationem spirandi facilitatem inducit, in testinatq; irritando ac mordendo, humores ad cutis superficiem delatos, ad ipsa retrahit & reuellit. Purgatiōes aut magis propriæ & familiares huic morbo existunt,

*Arquati nigri signa*



existunt, inquit Rufus. Cæterum edulīs ac potionibus itemq; pharmacis, humores prius attenuare oportet, obturationesq; deoppilare, atq; deinde pharmacum exhibere quod flauam aut nigrā bilem ducit. Sint aut purgatiōes icterici exhibendę fortiores: ob uentris enim siccitatē, imbecilliores, inefficaces in ipsis cognoscuntur; quare in principio purgare non oportet, priusquā per deoppilantiā bilis attenuetur, & quodam modo ad intestina reducatur, maximi namq; malī causam, purgationes in principio datę prębuerunt. Itaque conuenit primum deoppilantibus mox dicendis uti, atque ubi attenuatio humorum ac deoppillatio fuerit facta, tum demū conueniens, & forte (ut dixi) pharmacum purgatiuum est exhibendum. Quod si primo purgatiuo pharmaco nihil proficiat, rursus forte aliquod deoppilatoriū pharmacum bibendū prebē, & post triduum rursus uolentius pro secunda uice purgato, inquit Rufus, ut etiam ad finem purgatiōis unā cum uehementissima mordacitate bilis excernatur, quę cærulea magis sit quā flaua. Ego itaque euphorbium epithymum, aloē, petroselinum, & dauci semen misceo, ac ictericos purgo. Optime etiam ipsos purgat hoc. Piperis longi scrupulos nouem, piperis nigri scrupulos quinque, scammonię scrupulos sex, ammi scrupulos quatuor, seminis foeniculi sesquiscrupulū, seminis apii scrup. II. & dimidiū, caroi scrup. IIII. anisi scrup. III. mellis quantum satis est, quo ad strigmentitiā crassitudinem redigatur. Datur, nucis ponticę magnitudine cum cochleari aceti albi & aquę calidę tantundem. In melancholicis autem ad prædictum dimensum farinę epithymi scrup. III. addere oportet. Vehementer commodum & hoc est. Colocynthidem magnam superne perforato, electoq; semine id quod instar tomenti in ea est finito, ac uinum uetus dulce infundito, & pernoctare in ea permittito: mane uero per panniculum detritę uestis diligenter percolato, & uinum calefactum his qui flaua bile abundant bibendum præbeto. Ad melancholicos autem epithymi scrupuli sex in uino dulci præcoquātur, id ipsumq; uinum colocynthidi infundatur, ac ut dictum est, bibendum præbeatur. Cyclamini quoq; radix trita potata, post deoppilantiā remedia, aptissima est ad uiscera repurganda, & ad bilem in uniuersa cute excludendā per sudorem: quare post eius potionē, sudorum exclusionem per uelamenta ac concalescentionem in lecto iuuare oportet. Dantur autem ad summum ex ea drachmę quatuor ex aqua mulla. Quod si inflammatio circa partem aliquam uiscerū subiaceat, primum irrigationibus & cataplasmatibus utendum est, & post ea ceratis & epithematis ad uiscerum inflammationem præscriptis. Præstat autem farinę ammiscere rosmarinum herbam, florem iunci odorati, absinthium, artemisiā, abrotonum, rutam, cardamomum, chamępityn, scordium, poliū, ac chamędryn. Hęc enim singula ammixta urinam cient, quod morbo maxime cōducit, & uisceribus inflammatis prodest. Cucurbitulis etiam utendum, hepate quidem affecto inanibus, & aliquando cum scarificatione: splene autem adfecto omnino cū scarificatione: inanes enim splenē nihil iuuāt. Pharmaca autē quę in potu accepta ab obturatione ictericos liberāt, maxima ex parte urinā cient, uelut est apii deco-

coctum, & adianti, ac similia: Vtilis est & absinthij cremor per se, & cum nardo indica, ac iunci rotundi odorati flore. Item pulegij decoctum, & calaminthes et uerbenacę rectę ac oxallidis. Est autem oxallis rumex acris sapore, fuluis ramulis & folijs, caule quadrangulāri eoq; semine referto, pallida radice: hęc sane per se comesta, & radicis decoctum ad tertias redactum ac potatum celerrime auxiliatur. Prodest etiam rumex satiuus, & anchusę radix, rubię radix, chamępityos, rosmarini, & aristolochię. Mirificę etiā prodest, serpillum, hypericō & eius generis plurima alia. Singula hęc in aqua ad tertias decocta cū uino dulci bibenda præbeto, aut cōtundito & cribrato, ac singulorum drach. I. dato. Præclare quoq; facit corticis raphani succus, uino meraco dulci permixtus aut uino mulso: ita ut succi cyathi duo, uini cyatho contemperentur. Datur item ualde comode cichorij & seridis succus, febrientib. quidem per se, febre carentibus cum uino, brassicę item succus eodē modo, & cornu ceruini ramētā cochlearij mensura, petroselinum, anisum, asarum, rheon: cōmodissimum autem est chamęmelon, quę & leucā themos adpellatur, itemq; bupthalmum. Aliud multū experimenti. Spumę nitri albę drachm. duas, in uino ueteri dulci macerato trium cyathorum mensura, & per totam noctem sub diuoposito, & ad triduum aut quatrimum bibendum præbeto.

Aliud præter opinionem. Vermes terrenos coctos ac cum myrrha troglodytica tritos, in fabę magnitudinem ex passo aut uino mulso dato, & postera die ieterum per lotium eijcient. Idem faciūt & absq; myrrha dati. Exhibeto hoc ad triduum, ac utere cōfidenter. Pastillus ietericus, qui ietericis, & hepaticis mirabiliter cōducit. Amygdalarū amararū repurgatarum drac. IIII. anisi, comę absinthij, cuiusq; dra. II. spicę nardi dra. I. asari dra. I. cōtundito & cribrato reliqua, amygdalas autē cū aqua terito, & pastillos informato: ex quibus dra. I. febre carentibus ex uini mulsi cyathis III. præbeto. Ceterū pharmaca quę in potu accipiuntur, omnia si fieri potest, in balneo exhibeātur, ubi ægri in calidū lauacrum cōscendere parant. Plurimum autem diarę uisum refocillatrici intētum esse oportet, per quam uis discretiua reparatur, & si quod membrum læsum sit corroboratur, ac præsens coloris corruptio repurgatur: quæ propter conueniunt exercitamentā, & gestationes, & inunctiones ac exudationes, ita ut ad pyriateria, hoc est, uaporatoria sicca, & ad solē, & in balneis quoq; corpus nitri puluere uesti, ac uini fece arida uestaq; ac tenuissime trita defricemus. Optimū autē & serpyllū & thus parī modo cū oleo illita. Rosmarinus itē herba in oleodecocta, si oleum illinatur, prodest. Cibi autem omnes incisorij sint & attenuatorij, & quicūq; inter attenuatoria edulia prædicti sunt in secundo Sermone: ex uolucrum quidem genere, mōtanę: ex piscibus uero, q petrosi aquis degūt: ex ostreis, herinacę recētes. Olera uero sint quę magis urinam ciēt, præsertim seris, intyba, asparagi palustres, smyrnium, carduus, eryngium: ex satiuis autem conuenit brassica & asparagus eius, raphani, allia cruda & cocta. Carnes autē ferinę mansuetis magis sunt aptę: pro liquamine seu embamate, ualet acetum in quo, scilla & aristolochia sint macerata. A fructibus abstinentium. Bellaria sint amygdalę, sed modice sumantur, &



tur, & cicer modicū torrefactum. Ex leguminibus cicer assatum, & maxime decoctum ipsorum assidue potatum. Ieiunū autem citrū comedāt repurgatum. Vinum conuenit album & subadstringens, neq; ualde uetustum: ubiq; autem mediocritas optima censetur. Quod si quippiā ex scitro circa faciem & oculos relinquatur, urinæ autem appareant puræ, aliusq; cōsuetō more egerat, & appetitus in nulla re obstat, neq; infestet sitis: & ut compendio dicā, quum omnes prædictæ accessiones fuerint sedatæ, & tamen circa oculos uitiatus color relinquatur, narium infusis utendum: fortissimū autem omnium est elaterium cum lacte muliebri infusum, facit & cyclamini succus, & melanthium cum aceto: debiliior his est anagallidis succus, & succus radicis betæ. Depurgat autem cyclaminus crassissimū mucum: elaterium autem pituitam & bilem. Omnium autem efficacissimum ad eos reperi atramentum sutorium lacte muliebri dissolutū ac naribus infusum: inde enim bilem large ex naribus destillantem uidebis. Oportet autē poscam probe dilutam in ore detinere, dum infunditur hocce pharmacum. Præstat tamen primū cyclaminū infundi, quo crassa per eam euacuetur, & postea ipsum sutoriū atramentū.

*De malo corporis habitu, Archigenis. Cap. x i x.*

Quum corporis habitus in aquositate diffunditur, cachexia, id est, malus habitus à Græcis appellatur, in quo uniuersa corporis miscella laxior fit ac emollescit, quod maxime ex somno inæqualiter contingente fit manifestum: corpusq; ipsum totum cum uirore albicans redditur ac inualidum, ita ut crura inter eundem uacillent, & in principio quidē concoctiones impediuntur manente etiamdum appetitu: postea uero & fastidium accedit, & respiratio ipsis fit rara ac debilis, quæ moribus & actionibus condensatur. Alius etiam inæqualia recrementa excernit. Hæc affectio ut plurimū ex longo morbo congregatur: iam uero & ex uiscere quopiam in scirrhum indurato cōsequitur, maxime hepate & splene: neque raro in dysenteria diuturna & affectionibus coeliacis contingit, ob consuetam item aliquam cohibitam excretionem. Capiuntur autem hac adfectione maxime senes, qui etiam maxime liberantur: imo & pueri, qui facile pereunt, propter uitalis firmitatis debilitatem, & quod ob cutis raritatem succi in eis facile transpirant. At uero qui in uigore sunt, raro incidunt, & facile se inde extricant. Quod si diutius adsit malum, in aquam inter cutem transsit. Quod uero ad curam attinet, si quidem ex consuetæ excretionis cohibitione affectio cōtingat, admonere ac irritare eam ipsam excretionem oportet: aut uenā incidere in cubito, si nihil sit quod id fieri præpediat, paulatim ac partitis uicibus per triduum sanguinem detrahendo. Si uero uenæ incisio impediat, conuenienti medicina depurgante ipsos purgare oportet, & maxime ex hiera Archigenis ex colocynthide apparata. Quod si hepar sit adfectū aut aliquod aliud ex uisceribus, medelam adhibere his ipsis conuenit, per auxilia ad singula ipsorum supra præscripta. A localibus autem remedijs, ad diætā uiribus reparandis aptam transeundum, per quam spes est eos qui huic malo sunt impliciti ad restitutionem in integrum peruenturos. Diætā autem qua uires refocillantur in moderatis deambulationibus

consistit, gestationibus, uociferationibus, & defricationibus siccis per lintheola ex lino crudo, deinde per inunctionē ex oleo, cui quædam quæ humorem resiccant sint infarta, ueluti sunt nitrum & sales. Postea uero & exercitamenta moderata conducunt. Ad lassitudinis autē curationem balneum per interualla quædam adhibeatur: quod si quis ad frigidæ lauacrū adsuefieri possit, compedio ad omnē malī curationē peruenerit. Aquæ item quædam naturales calidæ robori ac uiribus reparandis conducunt, quales sunt aluminosæ, sulphurulentæ, ac nitrosæ. Mirabiliter autem ipsos iuuat assidua absinthij præparatio, & adhibiti dropaces. Cibi eorū sint simplices, & qui facile cōcoqui possint, parum conditi olerū uidelicet gratia: si quidē opus sit per ipsa urinam ciere, & aluū submollire. Vinū conuenit eis album, tenue, odorum. Bellaria omnia uitent, omnia item nidorosa, & graueolentia: humoris crassi, & uiscosa, & quæ difficulter concoquuntur, à cibis eorum sint aliena.

*De hydropē, siue aqua inter cutem. Cap. x x.*

Hydropis differentiæ tres sunt: alius enim ascites, ab utre appellatur: alius tympanites, à tympano: & tertius sarcites, aut iuxta carnē, hoc est, subtercus, à Græcis etiā leucophlegmatias nominatus. Ascites igitur fit, quū inter pelliculam peritonæū appellatam, & intestina plurima aquosi humoris collectio cōtingit, ut uere utris modo pellicula ipsa repleta esse uideatur: aliquādo uero ubi peius habet ægrī usq; ad fœmora tumor producit, quando sanè ascitæ & sarcitæ hydropis cōplexus factus appareret: unde aliquando quidem pedes inflantur, aliquādo naturalī modo habent. Tympanites uero flatus aëre repleti ac superflui plurimā collectionē in iisdem uetri incumbētibus locis facit, ut in principio sola inflatio esse uideatur: postea tamen flatus inspissatur, & ueluti nubilus redditur, atq; ita unā cū flatu, quasi nebulosus humor consistit ac congregatur. Infert autē tympanites multā circumtensionē, atq; in ipso etiā usque ad fœmora & pedes tumor procedit. Porro sarcites per omnē corporis coagmētationem ac miscellam humorē disseminat, ut instar spongiarū aut papyri uniuersa caro permadefacta appareat: atque ob id totum corpus similiter ut illa intumescit, ac mortuo simile euadit. Cōmuniter autē omnis hydrops spirandi difficultatē, & tumorem, & grauitatem, & uitiatū colorem inducit, ex uirore nimirum albicantibus ægris: fastidiunt etiam cibum, potum autē largiorē plurimū appetūt, maxime qui ex ascite laborāt. Etenim humor qui in locis detinetur, falsus est, & putrefactus, quare & sitis & febris auge-scit: ferē enim in totū plurimū ex hydropicis febrīūt. Cōsequitur autē aqua intercus omnes morbos qui habitū corrumpūt: una est enim ad hydropē aptitudo, coagmentatæ corporis miscellæ demollitio & ruina. Contingit autē hæc aut ob superexcellētē hepatis frigiditatē, aut ob aliqua alia mēbra uehementer refrigerata, quæ hepar in eandē dispositionē deducere ualent: citra enim hepatis refrigerationē impossibile est aquā congelari, et aliquem in hydropē incidere. Coafficitur autē hepar spleni refrigerato, alioq; & intestinis, maxime his quæ iuxta ieiunū intestinū sunt, pulmoniq; & renibus, ac septo transuerso. Cōgregatur etiā ex immodica hæmorrhoidū

E euacua



euacuatione, aut ex fluxu muliebri, aut ob menstruum retentionem, aut ob aliam quādam magnam uuluae affectionē. In his enim omnibus nullum praeter naturā tumorem hepar habere conspiciatur, & tamē aquae inter cutem morbo corpus apprehenditur, ex sola refrigeratione hepate in his in principio affecto: post uero aliquādo & durum fit, quod palam in illis uidere est, qui ex intempestiua frigidae aquae potione hepar acruatim refrigeratū habent, ut statim aquae suffusionem operetur, priusquam ipsum in scirrhum tumore eleuetur. His autē qui ex frigidae potu aquā inter cutem incurrerunt, uehementes ciborum appetitiones fiunt, propter oris ipsius uētris frigiditatē. Multi autē & apodagra & coxēdicum dolore uexati, aquā inter cutem inciderūt. Frequentissime autem eos qui cibum nō sentiunt, & malo corporis habitu praediti sunt, itemq; ab arquato infestatos, hydrops consequitur, coeliacā item affectionē & dysenteria. Nouimus etiā quosdam qui ex recta spiratione quā orthopnoeam uocāt, in aquā inter cutem sunt deducti. Ceterū huic affectioni nō minus foeminā quam uirū fiūt obnoxii: pueri uero ut plurimū ab hydrope sarcite apprehenduntur. Est autem tympanites omnino periculosus, minus eo ascites: adhibetur enim in eo pertusio siue punctio, quam paracetesin Graeci appellāt, & reliquis quoq; remedijs promptius quā ille obedit. Sarcites quoq; aliquādo curabilis fit per ea quae cuti adhibentur humore detrahentia ac resiccantia pharmaca. Omnes autē inueterati hydropes & qui iam habitū corrumpunt, sunt periculosi. Fiunt etiā aliquando bullae inter peritoneum pelliculam & intestina, figura uesicae similes, & serosum humorem continentes; hae ipsae sanē per fluctuationes quasdam inaequales depræhenduntur: nimirum proprium locum secundum lineamenta quaedam distributum ac uelut circumscriptum, in ipso humore tenente.

*Ascite ac tympanite hydropis cura. Cap. xxi.*  
Quum itaq; difficilis sit, quēadmodum praedictū est, aquosae affectionis cura, plurimo artis auxilio opus habet; in his igitur qui febricitant hydropicis febre intermittente curā faciemus: itaq; cataplasmata ex farina ordeacea, altheaque ac caricis ipsis adhibebimus, ita ut in tympanite quidē magis ex seminibus flatus discutiēibus cōmiscemus: in ascite uero magis ea quae euacuāt humore. Caeterum post principū efficaciora sunt cataplasmata quae pro ordeacea, fabacea farina suscipiūt, itemq; eruinā, cuiusq; parē mensurā, coquuntur autē cū muria, aut aceto mulso. Praestat etiā loliacea farina cū caricis, & absinthio, hyssopoq; & origano ex aceto mulso: itē bulbi cū melle: aut armentariae bouis stercus ex posca siue aceto mulso: habeat autē quartā partē sulphuris uiui inspersam, admirandum hoc est, ac minime praetereundū. Valet & caprinū stercus in pueri incorrupti, & uenerē nondum experti urina impositum: humore enim per uentrem euacuat. Valet & lupini farina, aut hederē folia trita & uino decocta: aut ficuū partes duae cū cupressi coma, & nitro: aut lens palustris in figulino uase desiccata, trita & imposita, aut cochleae crudae cū carne sua tritae impositae: non enim priusquam humor desiccetur discendū: aut alumen plurimū seu caprino exceptū im-

ponere: aut caricas, nitrū, castorium, marrubiū, aut filicem in pila contundito, & raphanos donec collescant coquito, deinde simul terito, & farina ordeacea adiecta, cataplasmaris modo imposito. Cataplasma optimū ad asciten. Lathyridū partes iiii, squame aeris partē i. radices chamaeleonis partes iiii, coquantur in aceto mulso in quo adeps taurinus sit praeliquatus. Aliud optimū ad asciten. Stercoris columbini partē i. stercoreis caprini tantundem, buphthami herbae tantundē aut leucanthemi, haec tusa in acerrimo aceto ac melle coquatur. Aliud. Salis fossilis partē i. salis cappadocici partem unā, lathyridum contusarū partes tres, coquantur simul aqua marina aut sulphurulenta. Optimū est hoc pharmacum. Sensibiliter enim uidebis materiā euacuatam, & tumore discussum. Aliud. Rhōis quo tinctores coriorū utuntur sextariū i. pollinis frumentacei aut loliacei aut farinae fabaceae sextarium i. thuris quadrantē, aluminis scissi quadrantē, imposito cū aceto mulso hydropicis, splenicis, dysentericis, ac coeliacis. Aliud. Radicis cucumeris agrestis unc. xvi. ficuū pinguium unc. xvi. radices altheae unc. xvi. Radicem unāquamq; per se tundito ac cribrato: ficus uero cū uino coquito, ac probe terito, siccaq; trita inspergito. Vtitor, per aluum enim humorem educit. Aliud. Elaterij, staphidis syluestris, succi hyssopi, fellis taurini, ficuū. Omnia in mortario tundito, subigito, ac utitor. Poteris & praedicta in secundo Sermone cura uti, de diuersis uidelicet terrae differētijs. Cataplasmata, quae magis ad tympaniten faciūt. Farinae foenigræci, farinae ordeaceae, uirgultorū rubi, comae absinthij, foliorum rutae, seminis apij, cumini, sisonis aut ligustici, mellis, & uini, & olei. Aliud, ad hydropicos inflatos. Panis cōtusi sextariū unum, cumini sextarij quartam partem, samisuci quadratē, pyretri sextantē, euphorbij unciam unam. Cū uino mulso uniuersam spinā & aluum usq; ad mamillas & pudēda cōtegito, alterisq; diebus soluto, atq; id quinquies aut sexies facito. Ego pro euphorbio struthion conieci. Vnguentū Apollonij. Stercus accipitris cū syluestris brassicae succo assidue illinito, mirifice facit: uerum melius fuerit si aquilae stercus ammiscueris. Aliud. Laterem diligentissime instar uasis figulini assatum cū hyoscyami aut plantaginis succo terito, & quā crassissime ad solem frequenter illinito. Vnguentum ad hydropicos. Radicis cucumeris syluestris, radices bryoniae, utriusq; libras duas, staphidis syluestris sexuncē, nitrī sexuncem, olei libram unam, aquae marinae sextarium unum. Quod si non adsit aqua marina, pro ea muriam conijcito, resinae a nauibus unā cum cera derae, apochyma Graeci appellant, libras tres. Radices tenuiter cōtundito, nitrū & staphidem terito, & per triduū madefacito, deinde usq; ad aquae consumptionem coquito, percolato, & apochyma adijcito, quo liquefacto utitor, ex eo saepe illinens tumorem.

*Epithemata hydropica. Cap. xxii.*  
Asclepiade. Epithema hydropicis ualde commodum, quod adiacētē humore absorbet: quo etiā priuatim, inquit Archigenes, utor. Farris clusini appellati mola triti sextarios duos, floris lapidis alij sextarium unū, alij autē duos habet, mannæ sextariū unum, diligēter terito, & adipe suillo ueteri probe subacto, & per



& per noctem in uino macerato excipito. Eius autem quantitas tanta sit, quanta ad hoc ut ad tactum molle reddatur, pharmacū suffecerit. Aliud. Seminis rutæ syluestris, quod besafa & harmala quidam appellat, contusū & cribratū sextariū unum, mannæ sextarij dimidiū, adipis suilli ueteris quantū sufficit, ut prædictū est apparato. Aliud, cui testimonium præbet Oribasius. Fœni græci trientē, farinæ ordaeæ quadrātem, stercoris columbini trientē, resinæ pinus siccae lib. i. picis librā unā, ceræ lib. i. axungie ueteris libras duas: quæ eliquari possunt eliquato, & ad alia in mortario cōtusa & cū aceto trita adfundito. Aliud ex farinis epithema. Picis siccae libras duas, resinæ pinus libras quatuor, ceræ libras tres, olei ueteris librā i. farinæ tritici, ordeī, fœni græci, baccarum lauri, anisi, salis, farinæ radicis chamæleonis nigræ, singulorū bessem, uini austeri sextarium unum, apparato ut prædictum est, ac utitor. Facit & ad hepaticas dispositiones. Ego autē, inquit Asclepiades, & chamelææ quadrantem adieci, & pro triticea farina, irinam admiscui. Pharmacū, quod omnem tumorem generose resiccat. Cimoliæ quadrantem, ceræ quadrantē, olei quadrantem, salis unciam i. resinæ à nauibus cū cera derafæ drach. centū & sexaginta, farinæ fœni græci drachmas uiginti, foliorū brassicæ uiridium quincuncem. Liquefacta reliquis tritis in mortario adfunde. Aliud epithema ualde pulchrum. Stercoris caprini sextantē, stercoris bubuli sextātem, stercoris columbini sextantē, farinæ fabaceæ sexuncem, calaminthæ, salis nitri, seminis apij, seminis daucis, seminis fœniculi, cumini, cuiusq; unc. i. panis aridi quadrantē, mellis sexuncē, terebinthinae quadrantē. Utitor. Epithema ex stercore caprino ad hydropicos, qui hepar induratū habent apparatū. Olei cyprini, aut si hoc non adsit uetustissimi lib. i. i. ceræ lib. ii. & dimidiam, stercoris caprini bessem, baccarū lauri decorticatarū bessem, iridis besse, terebinthinae lib. i. sinapis, nitri, cyperi, pyretri, seminis raphani, corticis radicis capparis, cuiusq; quadrantem, medullę colocynthidis uncia unā, fœni græci uncia unā. Aliquādo quidē arida liquefactis insperguntur: aliquādo uero aceto prius subiguntur. Ego autem, inquit Asclepiades, colocynthidis sextantem adiicio. Quod si alius fluat, omnino colocynthidem amoueto: stercus autē caprinum si quidem aridū sit, tunditur & cribratur: molle autē & recens aceto dilutum teritur. Malagma, quo Erasusus est; quod imponendum est: neq; prius amouendum, quā sua sponte decidat. Visci lib. i. lapidis asij sexuncem, calcis uiuæ quadrantem, olei cedrini lib. i. Viscum & oleum ad calidum ac feruentem cinerem coquito, inspersisq; aridis tritis, remollito ac utitor. Aliud. Caricarum pinguiū lib. vi. aut. iiii. spumæ nitri lib. i. origani lib. i. sulphuris uiui quadrantem, cochlearū aphricanarum libram unam. Arida contundito & cribrato, ac ficis cū carne cochlearum contulis excipito, & melle cocto sufficienti adiecto utitor in linteolum infartis. Aliud. Radicum brassicæ tenuissime tritarū libram unam, calcis uiuæ lotæ librā i. elaterij quadrātem, axungie ueteris libras tres. Ad formam malagmatis reducto, & in linteolum infartito, ac per omnem aluum imponito, alternisq; diebus soluito. Vrinam prolicit. Malagma ipoterium inscriptum: pharmacum accom-

modatum, ac prosperi successus, cuius periculū feci, inquit Philagrius, in hydropicis, splenicis, & affectionibus inueteratis: deprimat enim tumorem. Resinæ pinus torrefactæ lib. i. i. i. ceræ lib. ii. picis lib. ii. aluminis liquidi, nitri rubri, sulphuris uiui, mannæ, cuiusq; librā unam, aloës sexuncem, pyretri, aristolochiæ, ammoniaci, bdellij, amomi, cardamomi, uisci, probe subacti, myrrhæ, radicis cucumeris syluestris, succi sycomororū, cuiusq; quadrantē, olei libras tres, aceti sexquiseptariū. Quēadmodū moris est apparato. Arida aceto diluuntur. Malagma ex baccis lauri aridis, ad hydropicos & splenicos, omnem duritiā dissoluit, abscessus in profundo sitos absorbet. Ceræ, resinæ pinus, picis bruti siccae, nitri rubri, baccarum lauri aridarū, ammoniaci thymiamatis, adipis uitulini probe subacti, singulorū lib. unā. Arida cōtundito, ac per tenuissimū cribrū excutito: quæ uero eliquari possunt liquefacito, eisq; arida inspergito ac unito, deindeq; ammoniaco cū aceto dissoluto affūdito. Ego etiā nitrū cū aceto dissoluo. Emplastrum Tonforis appellatū, ad splenicos & hydropicos. Hoc tonfor ex Bythinia usus, multos à coxendicū dolore in totū liberauit. Picis siccae lib. i. i. i. ceræ lib. ii. resinæ pinus lib. i. farinæ fœni græci, polinis radicis herbæ chamæleonis nigræ, cuiusq; bessem, cumini tenuissime triti trientē. Apparato, & ut dictū est, utitor. Emplastrū pardalis appellatū: Andreæ. Pharmacū inueteratis hydropicis prospere accommodatum. Grani cnidij depurati, rhois rubri, spumæ nitri, salis ammoniaci, aristolochiæ tenuis maxime corticis, radicis cucumeris syluestris, terebinthinae, cuiusq; drac. i. i. i. piperis cōmunis, piperis longi, ammoniaci thymiamatis, iridis, bdellij, thuris, cardamomi, xylobalsami, calsiæ, myrrhæ, amomi, adipis taurini, adipis caprini, resinæ pinus siccae, cuiusq; drac. x. ceræ sesquilibrā. Visci probe subacti sextantē, unguētū irini aut potius fecis sexuncē, succi sycomororū sextātem, si haberi possit. Cerā, resinā, adipem caprinum, liquefacito, refrigerato, & cerati modo leuigata ac cōtecta asseruato. Bdelliū autem & ammoniacū & succi sycomororū sextātem, præcedenti die in uini quincunce macerato, sequentiq; in sole terito, & cōiecto in mortariū cerato bdelliū & reliqua cū eo adiicito, & diligēter tundito, deinde arida trita paulatim addito, & per biduum tusa in densam pellē recōdito, ne quid inde transpiret. Quiddam autē hyssopi drac. i. i. i. addunt, & irinū largius affundunt, quo modo usus est Eras Cappadox & Asclepiades. Facit ad multas & uarias affectiones, facit ad hepaticos, splenicos, suppuratos, & arthriticos, podagricos qui à calefactorijs iuuantur, è coxendicum dolore laborātes, pleuriticos, præcordiorum affectiones, & omnia quæ concalefactione opus habent. Vtere & ad strumosos, emplastro ad strumæ magnitudinem facto & imposito: suppurat enim, perforat, rumpit, eademq; attrahit, & cicatricē inducit. Cōducit & ad ossa contrita, educit spinas, & omnia in profundo fixa: facit & ad suppuratos præclare, & ad omnes duritiās internas. Inflammationes autē internas eadē die soluit. Utitor & ad tubercula, dissoluit & cancerata & panos. prodest cōuulsis & à scorpio percussis: summe autē hydropicis confert. Quod si & ad lassitudinē neruorū adq; dolorē leniendū uti uelis, ad unā emplastri partē, irinum, nardium,



num, cyprinū, suſinum, butyrum, lentiscinū, adipē, oſypum, mel, ſingulorum æquales partes miſceto, & ad ſolidi ſtrigmētī craſſitudinem redigito, ac utitor. Epithema hydropicis, ſplenicis: abſceſſus & furunculos ſanat: humores in profundo & in articulis reſiccat: hydrocephalis, hoc eſt quibus aquoſus humor in capite cōſiſtit, itemq; herniæ quæ hydrocele appellatur, pro glutino exiſtit. prodeſt & hemicraniiæ. tubercula quoq; atheromata ac ſteatomata Græcis à ſpicarū, ſiue ut aliq; uolunt, pulciculę, itemq; pinguitudinis in ſe complexu appellata, curat. Nitri, chalcanti, ſalis, ſpumæ nitri, cuiuſq; quadrantē, ceruſæ ſeptuncem, ceræ ſeptuncē, olei lib. i. in eſtate autem dextantem. Oleum cum ceruſa donec non inquinet, amplius coquito, ceramq; eis adiſcito: quæ liquefacta, reliqua in mortario terito, ac ad mellis cōpagem redigito: eisq; cocta infundito, ac utitor. Eſt enim experimento cognitum.

*Malagmata quæ euacuant humorem: ex libris*

*Aſclepiadæ.*

*Cap. xxiir.*

Grani cnidij repurgati drac. x. medullæ colocynthidis drac. viii. ſucci cyclamini ſicci dra. xvi. ſcāmōniæ, elaterij, piperis albi, myrrhæ, cuiuſq; drac. iiii. polypodij drach. viii. abſinthij drach. xvi. amurcæ drach. xvi. fellis taurini drach. xvi. ſagapeni drach. viii. cerati cyprini quantū his excipiendis ſatis eſt. Sufficiūt autē cerę dextās, olei cyprini uncia xvi. hæc linteolo infarta peſtini ac lumbis imponito, ita ut os uētris cuſtodias illæſum. Summe prodeſt, inquit Archigenes, adeo ut quidā hoc ſolo ſe hydropicos ſanatuſcos cōfidant. Aliud, quod largē cit urinā, totiſq; affectioni opitulatur. Radicis cucumeris ſylueſtris, radicis chamæleonis, ariſtolochiæ lōgæ, corticis radicis rubi ſicci, ſingulorum librā unam, æruginis uermiculatæ, recrementi plūbi, aluminis ſciſſi, ſeminis apij, ſulphuris, acori, aſari, petroſelinij, nardi celticæ, cardamomi, ſingulorum trientē, ceræ libras duas, terebinthinæ liquidæ, picis brutiæ, adipis taurini, cuiuſq; librā unam apparato, & imponito, ut prædictum eſt. Aliud. Veratri nigri, nitri, piperis, fellis taurini, ſingulorum æquale pondus melle cocto excipe, & utere ut dictum eſt.

*Epithemati, quæ poſt euacuatos humores adhibita pro glutino ſunt.*

*Cap. xxiii.*

Mellis libras duas, myrrhæ ſextantē, thuris uncia unā. Mel uſq; quod uiſcoſum fiat decoquito: eiſq; myrrhā ac thus tenuiſſime trita adiſcito, ſimulq; ſubigito, & ſpongiæ nouæ infarta per omnē aluum imponito, colligatoq; cute quodammodo conſtricta, & tertio die ſoluſto. Aliud. Thuris drac. viii. gummi dra. octo, roſmarini herbæ exiccatae drac. decē, mellis libras duas, apparato, ut dictum eſt: ſimiliterq; utitor poſt euacuatos humores. Aliud epithema, quod poſt humorum euacuationem, totiſq; affectioni ſe opponit. Lapidis aſij ſextiātem, farris mola tritij uncia unam, thuris trientē, chamæleæ contuſæ & cribrate drach. iiii. adipis ſuilli ueteris quantū ſufficit. Vtere ut dictū eſt. Emplaſtrū Magus appellatū: quod quidam etiā Hepheſtiadis nomine inſignitū: facit ad ſinus, & fiſtulas cōglutinat ac reſiccat præter opinionem. Egregiū cenſetur & ad hydropicos & ad herniā hydrocelen appellatā. Spumæ argēti ſexuncē, lateris furno aſſati ſeſquilibrā, ſcoriæ argēti, quæ helcyſma Græcis appellatur librā unā, olei libras tres,

ceræ ſeſquilibrā, ſucci coriandri ſeſquifextarium, aliq; ſextarij dimidiū accipiunt. Oleum, ſpumā argēti, helcyſma & laterē tenuiſſime tritū, itemq; ſuccum, donec amplius non inquinet decoquito, deinde cerā liquefacito, & percolatam adiſcito, ac unitis utitor. Quæ difficulter aliās ſanantur ad cicatricē perducit. Præſtat autē arida prius cōtundi, & cū ſucco in mortario teri, ac deinde decoqui. Quidā autem pro cera, pentatheton pharmacū coniecerunt, & ad hydropicos uſi humorē reſiccarunt. Epithematis igitur perſeuerātius & propius utimur, ſi abſit febris: quod ſi febres ſint cōiunctæ, per interualla quædā aſſumuntur. Cæterū ad tumores cruriū hydropicorum, panem madefacere oportet, terereq; ac ſale tenuiſſime trito ammixto, illinire, ac quatuor horis ſinere. Quod ſi aquoſus humor deſſuat, ſpongia mundare, ac panniculo ueſtis detritæ extergere, oleoq; myrteo, aut melino, aut lentifcino inungere.

*Aquam ducentia remedia, hydropicis ualde comoda.*

*Cap. xxv.*

Smilacis quæ iuxta aquas in ſepibus reperitur, ac ſiliquas producit quæadmodum horticis ſmilax, quæ lobia appellatur, huius foliorū ſuccū ſextarij unius mēſura accipe, & ad tertias decoque, indeq; cyathū unum bibēdum præbe. Aliud. Smilacem accipe & donec flacceſcat in aqua decoque, deinde unā cū decocto ſolia ipſa tere uſquequo ſuccus inde exprimitur: & ex eo cyathum quotidie bibēdum præbe donec ſanetur: in his autem qui perfectæ ſunt ætatis plus omnino exhibēdum eſt. Aliud, quod aquam ducit. Seminis cnici drachm. iiii. aloës unciam unam, grani cnidij ſcrupulos v. ſcammonii ſcrup. tres, cum ſucco ſcorpiori cæreleū colorē habentis catapotia informato, & ex eis his qui iam primū inciderunt ſcrupulos iiii. exhibeto: quibus autē in tumorem malum proceſſit, ſcrupulos vi. ieiunis.

*Quæ ad ciendam urinam hydropicis bibuntur.*

*Cap. xxvi.*

Porrò toto curationis tempore, aliquo iſtorum potuum utendū erit. Cancrī fluuiialis decorticari interioris exiccari, manibus ac pedibus, auulſis libr. i. aſari lib. i. In aqua permiſce ex ipſo flumine unde cācri ſunt extracti, ac bibendum præbe: aliquādo pro aſaro, opobalfami par pondus cōiſcitur. Aliud. Corallij drachmā unam, aluminis ſciſſi drachmam unam, cum calaminthæ ſucco aut decocto in paſtillos digerito, & ex ipſis obolū unum, cum calaminthæ decocto bibēdum præbeto. Summe (inquit Archigenes) & nephriticis cōducit. Laueris item decoctum exhibeto, idemq; lauer edēdum dato, aut trifolij bitumen olentis drachmam unam, ex uino, aut iunci odorati, aut nardi, aut aſari, aut phu, aut mei dococtum, aut corticis radicis ari, aut ipſius radicis drachmam unam, ex uino, aut ſeminis uitiſcis drachmam unam, ex uino, aut radicis bryoniæ concife decoctum, aut anagallidis cæreleæ ſuccum per ſe, aut arnogloſſum ab aridorum ciborum comestione quotidie paucum comedendum præbe, ita ut inde reliquo cibo utatur: aut ſeminis hyperici drachmam unam, ex uino, aut cicerum decoctum, aut ſcillinum acetum aſidue ſorbeant. Etenim ex eorū numero quæ citra grauitatem urinam cient, eſt ſcilla aſſata delincta ex melle: aut ſcillam aſſatā terito, eiſq; ſarinx erui albi par pondus ammiſceto, ſiccato, ac drac



ac drachm. i. ex uino dato: aut polium, aut samfuchum ex uino decocta bibēda præbe. Egregie etiam commodam myurum herbam perhibent, quæ folia alimo similia habet, uerum per terrā strata est, ac uelut corymbos in summo oblongos habet: hanc itaq; decoctam assidue bibendam præbeto, experimento constat. Aut herinacium terrestrem excocto, eiusq; carnem in sole exiccato, ac drachmam unam ex uino tritam præbeto. Præter opinionem etiam faciūt uermes terreni cocti triti ex uino potati. Est & compositum pharmacum quod urinam ciet ipsis conuenientissimum, hocce: Carpobalsami, spicæ nardi, cassiæ, cumini, radicis dulcis, hyperici, floris iunci odorati, asari, amomi, dauci, smyrnii, petroselinii, calami aromatici, piperis, seselis, spondylii, omnium æquale pondus. Conducit etiam unumquodque per se. Orybasi pharmacū aquam ducens. Salis ammoniaci drachmam unam, mastiches drachmas duas, euphorbiæ drachmam unam. Hæc pro una uice dantur: est autem ex fortissimis remedijs. Potiones aquam ducentes, ex Asclepiade. Cæterum per interualla longiora uti cōuenit pharmacis aquam ducentibus, nam incōmodus est assiduus eorum usus, utpote qui uires ipsas dissoluit. Similiter autem & his quæ urinam ciet per modica interstitia utendū est. Ducunt autem aquam, quæadmodum conuenit inter Eran, Dioscoridem, Asclepiadem, & Archigenem hæc. Radicis struthii decoctum, polypodii decoctum, corticem radicis tithymalli charactæ appellati contusum & cribratum scrupulorum quatuor pondere in uino per integram noctem macerato, ac mane uinum ipsum bibendum præbeto: euestigio enim aquam educit. Aliud. Radicis cucumeris syluestris contusæ & cribratæ obolos duos in uino adstringente per triduum macerato, ac per dies tres ex ordine præbeto, factoque interstitio rursus eodem modo, dato quousq; tumor demittatur. Inde enim aquositas leniter secedit: neque stomachum hoc lædit, & uires conseruat. Aliud, quod multam aquam per aluum ducit. Ex solano hortensi succum exprimito, & quotidie donec perfecte curētur, cyathū unum bibendum præbeto. Aliud. Salis fossilis melle subacti & assati drachmas duas, piperis longi drachmas ii. conterito, & cum succo ptisanæ totum præbeto. Hæc enim est perfectum dimensum. Aliud. Radicis umbilici ueneris drachmam unam, scillæ repurgatæ drachmam unam, contere, & cum uini mulsi cyathis duobus per horam pro una uice ieiunis bibendum præbe. Aliud. Euphorbiæ drachmam unam, salis communis drachmas tres, castorei drachmas quatuor, alij drachmam unam habent, contundito & cribrato, dimidiumq; ex aqua calida exhibeto. Aliud. Chamelææ, petroselinii, piperis, æquales partes omnium contundito, & cochlearium ex aqua calida dato. Eclegma ad hydropicos. Seminis ricini ex herba quæ cici appellatur depurati numero grana triginta quinque, spumæ nitri cochlearia duo, probe contrita melle excipito, atque id totum delingendū præbeto, & aquæ mulsæ calidæ cyathos tres, ab eius sumptione bibendos porrigito. Euacuat adhærentem humorem, citra læsionem: & purgat aliquādo usq; ad dies aliquot. Oportet autē ante eius sumptionem commoda diæta uri.

Aliud inexuperabile. Grani cnidii repurgati drachm. quatuor, lathyridū mundatarū drac. quatuor, euphorbiæ drac. duas, aloës drach. ii. gūmi drac. tres, aqua subigito, & catapotia erui magnitudine formato, ac perfectis ætate septē præbeto, & uini meri immixti cyathos quatuor inde bibendos dato. Reliquis autē iuxta uirium tolerantiam exhibendum. Aliud Xistici, siue Spiculitoris, ex cuius solius usu sanabatur. Grani cnidii repurgati drachmas octo, probe conterito, squamæ æris drachmas sex, lapidis magnetis drachmas sex, seminis ricini drach. quatuor, succi scillæ mundatæ cyathos duos, mellis cyathos duos. Succum & mel usquequo cogatur coquito, ac reliquis adiectis catapotia ciceris magnitudine formato, eaq; pro uiribus exhibeto: ita ut aqua mulsa ab eorum sumptione bibatur. Pueris autē unicum tantum præbitum sufficit. Aliud. Aeris uisti drachmā unam, foliorum rutæ drachmā unam, stercoris columbini drachmam unam, salis communis parum. Hoc totū cum dimidia hemina uini tenuis præbeto. Aliud potabile, lagenium appellatum, cōmodum his quibus uenter plurimū tumet, & reliquum corpus molle est & laxum. Radicis bryoniæ repurgatæ drac. xx. myrrhæ drach. octo, cumini æthiopici drac. vi. anisi drac. vi. seminis caparis drachmas sex, uini adstringentis sextarios ii. passii cretici sextarios iiii. Radicem bryoniæ cū reliquis in mortarium cōiūcto, atq; citra myrrhæ admixtionem tundito, omniaq; in uas uitreum recondita affusis liquoribus macerato, & post septimum diē percolato, ac myrrhā simul dissoluito: indeq; cyathos quatuor ante cibū exhibeto, & rursū interiecta diē cyathos quinque præbeto: ac rursus interposita diē, cyathos sex offerito, atq; deinde rursus carnē ferinā assatam edēdam dato, & uinum austerū meracius in potu. Aliud pharmacū, quod prospere accommodatur, & aquā multam per sedem educit, optime etiā cit urinam: Grani cnidii depurati drac. iiii. radicis bryoniæ drac. iiii. scillæ crudæ mundatæ drac. x. cumini æthiopici drac. iii. lathyridū drac. ii. myrrhæ drac. iiii. uini adstringentis sextarios iii. Arida tusa per dies septē macerato, ita ut quotidie bene circumagites: deinde percolato, ac dissoluta myrrha, prima diē cyathos tres præbeto, secunda duos, tertia unū. Facta autem purgatione, uirium refocillatrice diæta utitor. Aliud, urinā ciens, aromaticum, Crunion à torrentis similitudine appellatum, quo usus est Eras & Asclepiades. Oportet autē purgatiuo quod ei præscriptum est præpurgare, atque ita ipsum quod urinā ciet pharmacum exhibere. Purgatiuum autē quod præexhibetur hoc est. Succi tithymalli recentis cyathos ii. aloës drachm. iiii. Aloēm in succo dissoluito, & in catapotia magnitudine ciceris redigito, indeq; duo, aut pro uiribus dato. Porro ubi probe purgaris, ipsam urinā ciens pharmacū propinabis, cibo bis aut ter per diem exhibito. Cū animaduersione autē utaris, & ubi urinā profluam uideris, ne amplius dederis: quod si nō feceris, urinā cohibere nequibis. Cōpositio ipsa hæc est. Seminis apij drach. xi. myrrhæ dra. vii. dauci drac. vii. croci dra. vii. mei dra. vii. phu drac. vii. acori drac. iiii. floris iunci odorati drac. iiii. seminis fœniculi drac. iiii. aut vi. asari dra. vi. spicæ nardi, cassiæ, cinamomi,



mi, fefelis, fabinae, singulorū sesquidrachmam. Excipe uino odorato, & pastillos, quosdā triobolares, quosdam diobolares, alios etiā unius oboli pōdere formato, eosq̃ pro uiribus praebeo. Facit & ad calculo laborantes cū uini diluti cyathis tribus. Aliud, urinam ciēs. Seminis foeniculi, cardamomi, radicis eryngij, corticis radicis capparis, cuiusq̃ drachmam unā, stercoris colūbini cochlearia duo, contere, & cū aqua catapotia ciceris magnitudine informa, & v. ex eis quotidie praebe. Potus hydropicis cōmodus experimēto constans, qui tū per urinas, tum per uētreu euacuat. Caroi scrupulos uiginti septē, foeniculi uncias tredecim & dimidiā, anisi scrupulos xiii. & dimidiū, cumini lati scrupulos v. mei sesquiscrupulum, iridis siliquas tres, mellis sesquilibrā, uini libras sex, exhibe mensurā mediocrem ieiunis in infessu solij balnei praecalefactam: est & suaue gustui.

Alius potus ciens urinā, ex cuius usu insignem uirum tympanite detentum, seruātū uidimus, etiā si à multis medicis iam esset detritus. Ammoniaci thymiamatis sextātem, radicis herbae lonchitidis sextātem, petroselinī sesquiunciā, calami indicī, costi, cinamomi, spicae nardi, piperis lōgi, myrrhē, stactes singulorum uncia unam, seminis rutae quadrātem, phudrachmas quatuor, styracis drachm. quatuor, phylli quadrātem, mellis despumati quātum sufficit. Excipe melle, & fabae aegyptiae magnitudine praebe, cū calidae aquae cyathis tribus. Aliud ualde cōmodum, ducit urinam multam, & ad lumborum dolores facit, itemq̃ eos quibus pituita in uniuerso corpore abūdat, ad pleuriticos, peripneumonicos, quartanarios, articulorū morbum, ac tetanicos, quibusdā cum uino, aliquibus cū aceto mulso, alijs uero cum aqua mulsa. Habet autem hoc modo. Aristolochiae, myrrhē, absinthij, abrotoni maxime seminis, iridis, canchryos, singulorū drach. iiii. anisi, cedridum, radicis panacis, pyretri, ammoniaci thymiamatis, cardamomi, singulorum drac. i. cumini drach. ii. & obolum i. Digerito in pastillos, quorum aliqui tres, aliqui duos, aliqui unum obolū habeāt: eosq̃ pro uiribus exhibeto. Oribasij ad hydropicos. Amara ex aceto mulso cōfectio, paulatim euacuat, nihil ex uiribus subuertens: est autem in stomachicis relata. Aliud urinam ciens, Oribasij. Aluminis liquidū ad fabae magnitudinem in aqua dissolue, & per linteum excolatum bibendum praebe. Aliud. Opobalsami, spicae nardi, carpobalsami, calsiae, cumini, radicis dulcis, hyperici, floris iunci odorati, asari, amomi, dauci, seminis smyrnij, petroselinī, calami aromatici, piperis, fefelis, spodylij aut umbilici ueneris, omnium aequale pondus, praebe cochleariū cum uino mulso. Conducit etiā unumquodq̃ per se. Pessus siue talus ad hydropicas mulieres. Anisi, cumini, cardamomi, nitri, aristolochiae, pulegij, foenigræci, medullae ficus, omnium aequales partes cum uino subige, ac utere.

*Cura post euacuationes.*

*Cap. xxvii.*

Post auxilia quae humores euacuant, ligamenti aegri amplecti & constringere oportet, ab extremis autem partibus incipiamus, ac ligamentorum distributionem ad supernas partes faciamus: ita ut saepe super ipsa ligamenta spongas posca imbutas imponamus iuxta tumefactas maxime partes. Venti uero uniuerso quaedā ex praescriptis epithematis im-

ponantur, quae post euacuatū humorem adhibetur. Reliquum diætæ concedendum: quae sanè in moderatis deambulationibus sita est, exercitationibusq̃, ac fricationibus. Adhibeantur autē & inunctiones & exercitamenta: si sol adsit, in sole, capite tamen uelato: si frigus sit, in domibus per subiectū ignem cōcalefactis; aut iuxta ignem: obuoluendi etiā aegri in pellibus sole ustitis, aut in arenā defodiēdi. Post exercitia extergantur, aliquando etiā lauentur propter fatigationē: in balneo autē siue insersione, siue confricatione huiusmodi utantur. Samsuci, nitri, cumini, melanthij, seminis rutae syluestris, singulorū unciam i. foliorū rhododaphnes siccorum, sextantem. Utendum quoq̃ in sole luti oblitione, quemadmodum praedictum est in secundo De terrarum differentijs Sermone. Porro quum res feliciter processerit, & tumor fuerit imminutus, & uires aliquantulum in integrū restituae, pra omnibus ex frigida lauatō fiat. Neq̃ uero balneae sponte naturae calidae inepte hoc tempore ipsis exhibentur: ab extersione autem cibi offerēdi: qui sanè cōmunes sint cum his qui post hydropis subter cutem curam describentur.

*Cura hydropis qui proprie subtercus appellatur.*

*Cap. xxviii.*

Hydrops subtercus, qui aliquibus etiā leucophlegmatias appellatur, maximā curadi rationem in insolationibus habet: itaq̃ tumefactae partes ad solem exponantur, capite saltem uelato, cauendo etiam ne tumor uehementius supercalefiat. Si enim corpus supercalefcat, febres accedunt, unaq̃ cum ipsarū febriū generatione tumores duplicantur, atq̃ id multo magis quum febres remittant, ac tumor refrigerationē capiat. Utendum igitur fricatione prima quidē die per modicum oleum moderate ac molliter facta: in progressu autem & sicca & multa & cum intensione magis appressa: deinde etiam per lintea asperiora. Oleum autem quod ad inunctionem apparatus, scillam mediocri magnitudine ad tres olei sextarios habeat incoctam, aut canchryos uncia una ad heminam olei addatur, & facta percolatione uitior. Ab inunctione autem exercitijs utantur, ac pro uiribus currant: indeq̃ sudorem per lintea asperiora extergant, & post hoc oleo dulci ungantur. Ceterum post dies aliquot nitro tenuissime trito per uniuersum corpus largē cōspargantur, sustineātq̃ ex eius morsu exudationem, deinde rursum sudorem extergāt, ac oleo dulci ungantur. Optime autem facit & fricatio ex sale in aqua aut oleo trito donec uiscosum reddatur, si cum eo in sole aut iuxta ignē fricentur. Valde enim celeriter & sudores elicit plurimos, & carnē cogit, siue in sole, siue iuxta ignem defricetur, modo caput habeāt probe contectū. Utendum & in puluere uolutionibus, si aut cimolia tenuissime trita substernatur, aut super asium lapidē deuoluatur. Aliquādo autē & arena probe à sole ignita, aut pellibus similiter à sole feruefactis aegrum occulere oportet, capite tantum uelato, & facie cum spongia assidue extersa. Post haec autem aqua marina, aut etiam aluminosa aut sulphurulenta lauetur. Aliquibus enim qui ad huiusmodi lauacra adsueuerunt, ea ipsa tum ad deterendum morbum, tum ad habitum ualentiores reddendum suffecerūt. Adhibenda etiā his oblitiō ex luto, ueluti praedictum est in secundo De terrarum differentijs Sermone.

*Cura*



*Cataplasmata ex libris Asclepiade. Cap. xxi.*  
Optime conuenit & his cataplasmatum admolitio, eo-  
rum præsertim quæ resiccare simul & uisceribus fir-  
mitatem addere possunt, pueris maxime ac alijs qui  
mollem carnem habent: qualia sunt ex malis coto-  
neis, myrti baccis, pampinis uitis, malicorio, ac lenti-  
cula decocta, aliquando quidem per se, aliquando in-  
uicem permixtis. Efficacissima sunt etiam corna exa-  
cinata tenuiter trita: item rhus culinarius cum polen-  
tæ flore, & quæ eis similia existunt, & alumen sanè  
cum duabus adipis caprini partibus subactum. Neq;  
uero incoueniens ruta ipsa censetur, si per interualla  
adhibeatur, neq; bulbi cum melle triti. Plurimum etiã co-  
hibent ac adstringunt tumore origanus, aut thyma,  
aut absinthium, aut hyssopum, aut nitrum cum caricis dili-  
genter trita: aliquando hæc ipsa liliaceæ farinæ in po-  
sca decoctæ permixta adhibentur. Stercus item bubu-  
lum conuenienter resiccatum, non inepte cum posca  
aut aceto mulso imponitur, infarcta sulphuris quar-  
ta parte. Cæsius quoq; recens multum coaguli habes,  
optime ad omnes tumentes partes impositus facit.  
Similiter & cochleæ crudæ tritæ & impositæ adglu-  
tinantur enim neq; discedunt priusquam uniuersus hu-  
mor resiccetur: fermentum etiam sale multo permixtum  
cōmode locis adhibetur, aut panis cum puluere hyssopi:  
aut fabacea farina aqua marina & melle cocta,  
pari absinthij modo adiecto: aut farinam halicæ fer-  
mentato, & cum raphani emollito cortice imponi-  
to: aut lentem palustrem in figulino uase siccato, ac-  
terito, & cum prædictis cataplasmatibus uice imponi-  
to. Porro ex eorum quæ tumores cohibent numero,  
est & id quod byne appellatur: est autē ordeum mada-  
factum, quod germen emisit, & deinde unum cum ena-  
tis ligulis costum est: si tritum pro cataplasmate im-  
ponatur. In principio igitur adstringentibus cata-  
plasmatis utendum est, deinde paulatim ad resiccantia  
transeundum, postremum etiam ea quæ firmitatem  
addunt adhienda. Cæterum omnia impinguantia &  
resinosa, cerata, ac malagmata, similiaque uitanda  
sunt, uelut quæ inflent & tumores distendant. Assi-  
due autem & crura, & manus, aliæq; tumefactæ  
partes in sole aut iuxta ignem, ex his inungantur.  
Sulphuris uiui, thuris, aluminis scissi, æquales sin-  
gulorum partes aceto contere, ac utere. Experiri etiã  
Herodoti remedium conuenit, neque enim minus  
quam ipsa fricatio auxiliari potest: uescis itaque bu-  
bulis aut etiam alijs magnis omnino, ac probe infla-  
tis, & uacuis, tumentes locos pulsato, atque id auto-  
ritate tū Archigenis, tū Herodoti facito: inde enim  
citra molestiam caro condensatur, neque dolore,  
neque percussione duriore resultante.

*Chirurgia hydropis subter cutem. Cap. xxx.*  
Omnibus prædictis efficacius auxilium in hac hydro-  
pis specie chirurgia præstat, Asclepiade autore. Fissu-  
ras aut circa internum talum infligere oportet in loco  
quatuor digitorum spatio supra talum eminente, ea pro-  
funditate, qua quis in uenæ sectione utatur. Pauco  
enim sanguine in principio euacuato, per reliquum tem-  
pus indefinenter aquositate excretio procedit, citra  
omnem inflammationem, ut neq; claudat fissura possit,  
nisi humore omni ante expenso, & homine gracili  
relieto, atq; id citò contingit, nulla inflammatione scissu-  
râ occupate, sed ipsa in quadam cōgruenti temperie  
permanente, quo omne alienum per ipsam excoletur,

& ut nullo opus sit extrinseco pharmaco. Præterea  
periculum hic nullum uerendum est, uelut in hydropis  
ascitæ pertusione: non enim coaceruatim quæ admo-  
dum illi euacuatur: at uero si quis uelit, excretionem plu-  
rima facta, eam cohibere, nihil ueruerit ipsas in talis  
fissuras linamentis obturare, ligamentisq; cōstringe-  
re, atq; ubi rursus prodire quid uelimus, laxatis li-  
gamentis, & ablati linamentis, gestatoq; ac moto  
ægro, excretionem irritare. Leonides autem inquit,  
Quod si excretio fissuræ supra talos tardius prodeat  
necesse est etiã alias corporis partes findendo diduce-  
re: ueluti scrotum tumefactum, fœmora, pudenda,  
locus supra manuum iuncturas. Quidam enim uulnusa-  
culis pluribus ac altioribus incussis, plurimam aquo-  
sam substantiam exhauserunt. Et Hippocrates sanè non  
supra talos adhibet chirurgiã, sed iuxta scrotum &  
fœmora uulnusaacula infligere iubet, eaq; sale maxi-  
mè cōfricare: hic enim modus paulatim & incessan-  
ter humorem educit, & ualde celerem compressionem tu-  
mores ipsos recipere, ipse tradit. Porro si aliquibus  
excretionem amplius mouere uelimus, post impacta  
uulnusaacula, & talorum laniationes, eos ipsos pro-  
deambulatione, ferculo gestamus, aut lectica sub-  
limes circumuectamus. Ceterum Archigenes ita pro-  
dit, Non sunt audiendi, inquit, q per huiusmodi lani-  
ationes nihil externi dicunt, quin potius cum fidu-  
cia hæc ipsæ incutiendæ: nam & nos, inquit, his cutis  
fissuris sumus usi, & per ipsas quàm plurimum ex-  
clusimus humorem, ut & fœmora, & suræ, & supe-  
rior uenter euidenter sint demissa ac compressa.

*Reliqua prædictorum cura. Cap. xxxi.*  
Maximum hydropis subter cutem auxilium uomitus  
præstat, quod ipsum difficile est in etate puerili adhi-  
bere, propterea quod non facile, ut id admittant per-  
suaderi possunt: quare uarias excogitauimus artes,  
quibus uomitum concitemus: tonsillas uidelicet pin-  
nulis aut digitis oleo illitis irritando: aut ficus assata  
oleo imbuta & piperis puluere cōspersa, post deambu-  
lationes à somno exhibeatur. Butyrum etiã cum melle  
gustandum præbeatur: aut raphanus coctus adipose  
cōditus detur, aut balsamum pingue cum oleo mul-  
to offeratur, aliquando etiã aceto ammixto. Sunt &  
alia plurima quæ uomitum mouent, relata in tertio  
Sermonem. Amplius autem tum uentrem, tum intestina  
ligamentis adstringant, itidemq; omnem cutis coër-  
ceant tumorem. Fiant autem ligationes ab extremis parti-  
bus incipiendo, & ad supernas procedendo. Vincenda  
etiã partes, manus uidelicet & pedes, oleo cyprino  
prius illinantur: spongiæ ite imponantur late ab acida  
muria optime expressæ: potest & iuncus odoratus,  
aut rosmarinus, aut pulegiū, aut calaminthe, & ma-  
xime omnium absinthium in ipso aceto decoqui. Post  
uerò ligamenta ipsis spongijs circumdantur. A uomi-  
tu prospiciendum ut inferior aluus inclinationem ad  
uomendum permutter: ueteri balsamento crudo ante ci-  
bum reliquum accepto. Mercurialis ite cocta saleq; ac  
oleo cōdita in uino tincta sumatur: aut decocti  
ipsius sesquicyathum cum sale dato: quædam etiã in ascite  
dicta his exhibeto. Præbenda & quæ urinam cient, uelut  
est daucus, seseli, cardamomum, radicem asparagi deco-  
ctum, trixaginis, radicis trifolij decoctum, aut ipsius ra-  
dicis dra. i. ex uini cyathis iiii. radix eryngij sicca cum  
uino, ite decoctum eius in potu acceptum, seminis uiticis  
drachma una. Cōmode etiã seminis hyacinthi bulbi

E 4 drachma

*Gal. ix. de sp. med. sm' locos  
cap. 3. talos scarificat in tamen,  
ut ne incidant in gangrenam*



drachma una cum uini cyathis tribus potatur:urinā enim ducit. Quidam autem hyacinthi flore coria tingunt. Inter omnia autem pharmaca quæ omnibus hydropicis, maxime tamen eis qui subtercutaneo dicto laborant, exhibentur: præstantissimi sales theriaci censentur tum cibus ammixti, tum in liquamenta additi eorum qui ad perfectā ætatem peruenerunt. Eorum autem apparatus in XIII. reperies Sermone.

*Communis diæta omnium hydropicorum: Archigenis.* Cap. XXXII.

Post quotidiana exercitia communis omnibus hydropicis diæta hæc sit. Ab aridarum rerum comestione initium faciemus: quod si tamen intensa sitis instet, parum quid delibandum dabimus solati tantum gratia, & leniendę sitis. Sit autem uniuersus cibus facilis concoctu & sufficienter coactus: exolutus enim aptus est ut in aquositate commutetur: sit itaq; panis optimus clibanites, qui salem, ammiū, & fœniculum habeat admixtum, conueniunt etiam cochleę assatę, oua assata, & auiculę sicciore, uelut perdices, coturnices, turtures. Ex terrestribus, lepus, capra syluestris, dorcades. Ex mansuetis extremæ suum partes: ex aquatilibus, cancri, locustę, herinacei recētes, squillę. Olerum rarus sit usus: quæ uero ex eis exhibentur acriora sint, & magis syluestria, uelut est co-

ronopus, eryngium, pastinaca, porri capitati, allia cocta. A leguminibus uero abstineant in totum. Pro liquamine urantur aceto cum pipere & lasere, aut quibusdam ex oxyporis cito penetrantibus ad colicos descriptis. Sales sint ex rosmarino, fœniculo, hyssopo, silphio, ligustico, & apij semine compositi. In potu tantū præbendum quantū ad infringendā aliquo modo sitim sufficit: incōmodus est enim eis plurimus potus. Porro maximā ciborum partem in cœna accipiant: omnes autem placentas ex simagine & passo apparatus uident, plurimos iidem fructus & secundas mensas. Concedendę tamē palmulę, nuces, amygdalę, uua pensilis, mala punica, piræ cocta, ac caricę, omnia moderate, neq; omnia quotidie. Vinū autē sit tenue, & quod ciet urinā. Dulcia uero uina & uinum mulsum uitanda. Lectus nō ualde mollis sit, præsertim his qui hydrope subtercutē laborant: substernantur autem arundinum folia, & herbę resiccantes, uelut est uitex, pulegium, calaminthe, & similia. Mirum est enim quātum huiusmodi per somnum resiccent, ut constet iam quosdā frumētū aceruis obuolutos & absconditos a somno surrexisse firmos ac resiccatos. Opercula etiam ipsa quibus reguntur, apparentur duriora. Moderata autem sit & probe temperata ipsa domus secundum anni tēpus.

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN

VNDECIMO SERMONE AETII  
CONTINENTVR.

**D**E diabete, hoc est profluuiū urinae. cap. I.  
De renū cruentam urinam excernentium debilitate. cap. II.  
De his qui per circuitum quendam sanguinem mingunt. cap. III.  
De calculosis renibus. cap. IIII.  
Cura renū calculosorum. cap. V.  
Diæta præseruans ne lapides renascantur. cap. VI.  
Vnguentū renale, Oribasij. cap. VII.  
Diæta eorum quibus renes è lapide laborant, reliqui uero totius corporis habitus gracilis est. cap. VIII.  
De calculosa uesica. cap. IX.  
Pharmaca lapides uesicæ atterētia & urinam ducentia. cap. X.  
Communia remedia uesicæ & renū calculosorum. cap. XI.  
De hircino sanguine. cap. XII.  
Antidoti uarię ad calculosos. caput XIII.

Cura eorum in quibus lapis atteri non potest, neq; item per lotium excerni. cap. XIII.  
Diæta post exactos lapides, adseruans ne alij renascantur: & de affligētis humoris cognitione ex lapidis colore. cap. XV.  
De renū inflammatione. cap. XVI.  
De duritie renū. cap. XVII.  
De suppuratis renibus. cap. XVIII.  
De disuria, id est, emittendi urinā difficultate: & stranguria, id est, stillicidio urinæ. cap. XIX.  
De difficultate emittendi urinam in se bribus. cap. XX.  
De ischuria, id est, urinæ suppressione. cap. XXI.  
De scabiosa uesica. cap. XXII.  
Simplicia remedia ad suppressam ac ægre prodeuntem urinam, si aut eius multitudo, aut crassities in causa sit. caput XXIII.

De resoluta per paralysim uesica. caput XXIIII.  
Ad eos qui se in somno permingunt. cap. XXV.  
De inflammatione uesicæ. cap. XXVI.  
De sanguinis ex uesica eruptione, & de grumis eiusdem. cap. XXVII.  
Quæ tubercula in uesica concoctione indigent. cap. XXVIII.  
De uesicæ ulceribus. cap. XXIX.  
Diæta ex libris Archigenis. ca. XXX.  
De uesicæ fluxione, & his quæ capillorum forma exeunt cum urina caput XXXI.  
De priapismo & satyriasi: Galeni. caput XXXII.  
De seminis profluuiū: Galeni. caput XXXIII.  
De seminis in somnis profluuiū. caput XXXIIII.  
De his qui re uenerea uti non possunt. caput XXXV.



## CI CONTRACTAE EX VE-

TERIBVS MEDICINAE TETRA-

BIBLI SIVE QVATERNIONIS

TERTII SERMO TERTIVS ET EX

ORDINE VNDECIMVS.

*De Renum & uesicae affectionibus: Et de priapismo, ac seminis profluvio, rebusq; uenereis.**De diabete, hoc est profluvio urinae.*

Cap. I.



**DIABETES** diuturna est affectio circa renes consistens, multum potum inducens una cum hoc quod quicquid bibitur, simul ut acceptum est per urinam rejicitur. Quidam autem affectionem hanc hydrope, siue hyderum, & siphonem a fusorij instrumenti similitudine appellant, alij urinam leuitatem uocant, alij displacem ab inexplebili siti appellare. Comitatur aegros pertinax sitis, neque ulla satietas ex alicuius liquoris exhibitione contingit. Aliquando & sitis supra sitim inexplebiliter aegros urget, hoc est, ut assidue potum assumere cogantur, neque tamen satiatur, propterea quod citissime per lotium expellitur potum. Ceterum proprius renum affectus diabetes existit, qui uidelicet immoderate humorem appetit, ipsumque propter debilitatem retentivam in eis facultatis continere non possunt. Quodadmodum enim in appetitionibus caninis, & in quibusdam lienterijs uehementissime quidam appetitum oboriuntur, quae multos cibos, eosque assatim accipere cogunt, uerum nihil ferè ex acceptis retinetur: sed in caninis quidam appetitionibus ob grauitatem reuomuntur: in lienterijs uero tum ob grauitatem, tum ob praesentem retentivam facultatis infirmitatem, inferne cruda excernuntur. Eodem modo etiam in renibus uehementissima serosi humoris appetitum contingit, propter debilitatem autem retentivam in eis potum, eum ipsum humorem acruatim in uesicam excernunt. Aretaeus etiam haec addit, Viscera ipsis uris uidentur, anxij sunt ac animo dubij, & non longe post moriuntur: igne amplius ardere se putant, acceditque sitis & mictio festina: sed quauis aliquando parumper urinam retineant, intumescunt lumbi, testes, & coxae: quod si adhuc amplius mordens caliditas in uisceribus augeatur, superior uenter corrugatur, & uenae in ipso eleuantur, uniuersum habitum gracile habet, & tabes totius corporis grauis accedit. Porro alij sunt qui non mingant, neque ex eis alias potatum transpirat. Quare ob potus insatietatem, & humoris inundationem, & uesicae circumtensionem, acruatim uentre rupuntur. Caeterum humores uiciosi in ipso renum corpore imbibiti, affectionem ipsam inducunt. Scopus igitur in curationibus nobis sit, ut humorum acredinem deleamus, sanguinemque ac cum eo permixtum serosum humorem ad motum tardiores reddamus, & renum intemperiem reuocemus. Archigenis. Itaque mox ubi acceperit malum, nondum ad perfectionem progressum, optimum est cubiti secare uenam, & moderate sanguinem auferre. Utendum etiam medio critere urinam cietibus, quae uisum in renes imbibitum humorem repurgare possunt. Quod si uero inueteratum sit malum, neque uenae sectio assumatur, neque quicquam quod urinam cit exhibeatur. Coccidunt enim in inueteratis uires, & ex uenae incisione totum corpus acrius redditur, & urinam cietia in ipsis multiplicant malum. Maximum autem remedium huic affectioni, ut statim potum reuomatur. Sit autem perquam frigidus ipse potus,

reliqua ite dicta conuenit uti frigidiores: quare olera refrigerantia minimeque urinam cietia in cibo profunt, pro sorbitione autem ptisanæ succus frigidus probatur. Materia etiam ipsa ad exudationem diuertenda. Optima uero, inquit Aretaeus, est in dolio facta euaporatio, ad exudandum, eo modo ut caput extra dolum promineat: frigidumque aerem attrahat, reliquum uero corpus omne cale fiat. De cetero uelut estuante febre, caupon Graeci appellant, curare oportet, quo celerrime sitis extinguatur: polenta itaque flore aceto & rosaceo subactum cataplasma matris modo praecordijs imposito, uitis item folia tenera trita, aut umbilici ueneris, aut portulacae, aut seridis, & quaecumque alia consimilia: praebibendum etiam sanguinarum succum ex uino nigro assidue praebere. Symphytum item & palmarum cremorem, baccarumque myrti & pirorum. Vermes quoque terrenos coctos ex aliquo praedictorum succorum. Cibi exhibeantur boni succi, mordacitate carentes, & qui acredinem obtundere possunt, uelut sunt oua sorbilia, & similago, & halica ad sorbitionis formam apparata, carnes porcing macre probe coctae. Vinum sit rufum, crassius, frigida amplius dilutum, ad falguginosorum humorum proluitionem, qui sitim inducunt. Vinum enim corporis miscellam ad dulcorem permutat: neque uero incommode exhibetur eis caseus recens compactus citra sale, & lac persilices aut ferrum ignitum scissum, seroso humore adempto. Porro si praedicta auxilia frustra adhibeantur, affectioque ipsa augeat, non absurdum fuerit etiam stuporem inducentibus uti, ita ut soporiferum antidotum ex papauerum capitibus apparatum exhibeamus, aut aliquem ex dolores leuantibus pastillis, infuso etiam soporifero utendum, uelut est opium erui magnitudine cum pari modo castorij, aut etiam maiore: haec in passo cretico dissoluantur: non ut in colicis fieri solet, cum oleo rutaeco: refrigerare enim in his praesumimus. Infunditur etiam utiliter oleum in quo uermes terreni sunt decocti. Forinsecus autem retro ad lumbos & ad pectinem illitiones & cataplasmata refrigerantia adhibenda, qualia sunt quae ex lactuca, umbilico ueneris, lenticula palustris, perdicio, & similibus apparantur. Cerata etiam his locis ex rosaceo adornata imponenda, aut ex chamaemelino quibusdam ex praedictis succis ammixtis. In quibus autem uehementer stupefacere sensum intendimus, etiam mandragorae succum in cerata ammiscemus, foliorum ite papaueris succum, & similia. Per interualla autem quaedam, etiam antidoti ad lethalia uenena destinata exhibeantur, & maxime theriace ex uulperis costas, Andromachi inueto, recens apparata, & ea quae Esdre inscribitur.

*De renum cruentam urinam excernentium debilitate: ex libris Rufi.*

Cap. II.

Renum porro & alia affectio est, in qua tenue sanguinis serum mingitur, quod ipsum itidem propter renum debilitatem contingit, quemadmodum in hepate fieri solere diximus, atque propter amplitudinem osculorum ex uena caua urinam ad renes excolantium. Quum enim ampliores meatus sint, quiddam etiam ex sanguine uenae laxatum emittitur: aliaque itidem crassa: adeo



sa: adeo ut postquam ea quæ mixta sunt cōstituerint, subsidentiā quēdā in uase reperiātur, & superne quēdam concreta, marinum maxime pulmonē similitudine referentia. Concocto igitur cibo & in uenas distributo, qualia dicta sunt minguntur: recens autē ingesto & crudo adhuc cibo, pura & aquosa, quæ nihil subsidens habent, per lotium efficiuntur. Nihil uero dolitant, aut omnino parū, & electo lotio leuati melius habent. Extenuantur autē & emaciantur tēporis progressu omnes, & magis adhuc hi qui plus sanguinis mixtu excernunt. A principio itaq; cōuenit his quies, & cibi adstringentes, & uinum nigrū in potu. Ab his quæ urīnā cient, & à coitu omnino abstinendum. In potu autem hæmoptoica pharmaca exhibenda, maxime uero sanguinariæ succus, & radicis symphyti decoctum: & tragacanthus in uino nigro macerata. Sistit uero sanguinis ex renibus eruptiones stratiotæ aquis innatātis succus potatus, & radicis magnæ crocodiliadis iuxta aquas nascentis, quam Syri orophen appellāt, decoctum, pēoniæ siue glycyfides grana fulua xii. ex uino. Cornu ceruini usti drachma una ex uino, folia salicis trita cum uino, lysimachij succus, lapidis hæmatitæ drachma una, ramentorum loti arboris cremor, radicis spinę albæ decoctū, & similia, quæ in sermone de hæmoptoicis sunt prædicta. Forinsecus autē renibus & lūbis imponuntur ea quæ ad muliebre fluxū describentur epithemata, item ea quæ ad sanguinis per sputum relectiones sunt descripta: & quæcunque unā cum eo, quod adstringunt & resiccant, etiam robur addere possunt: qualia sunt rubi folia, & glandes, & myrti ac quercus folia, itemq; myrti bacca, malicorij & balauſtia, & perdicij folia, & similia palmis palsis excepta, & imposita. Post hæc habitus cibarij, lacte ac aulcularū carnibus, suillis etiā ac macris reficiendus est, quo uniuersum corpus ad pristinas uires reducat, & renes corroborati propriū obeant munus. Est autem proprium renum munus, serosum humorem à sanguine secernere & excolare.

De his qui per circuitum quendam sanguinē mingunt: Archigenis.

Cap. III.

Quidam per circuitus quosdam sanguinem ex renibus excernunt, simili modo ut ex hæmorrhoidibus in se de fieri consuevit: & in principio quidem propterea quod citra ullum aliquem dolorē excernitur, nihil in totum mali formidant ægri: ubi uero diuturnior fuerit affectio, & aliquando cohibeatur quod pro more excerni consuevit, grauitatē inducit, aliorūq; pessimorum morborum causa existit, sanguine nimis ad alias particulas dilabente. articulares enim affectiones in aliquibus ex cohibitione accidunt, aut uertigines, aut deliria ex atra bile, & insaniam, aut oculorum cæcitates, qualia etiam mala hæmorrhoidibus cohibitis contingunt: ut plurimum uero in malum habitum corporis & hydropem delabendi aptitudo inde oboritur. Manifestum autem fit sanguinem ex renibus excerni, quod ipsi ægri excreti sanguinis transitum iuxta renum locum sæpe sensu percipiunt, & maxime quum urīnæ ammixtus sanguis reperitur. Contingit affectio hæc magis in ætate uigoris, præsertim iuuenibus qui licētius rebus ueneris utuntur. Quidam autem sanguinem ex renibus excernunt, propter uenę rupturam in renibus factā. Quemadmodum contingit his qui graue onus leua-

runt, aut ualde saltarunt, aut ex alto ceciderunt, aut aliud quippiam tale uiolentum pertulerunt. Aliquando autem & ob acres ex supernis defluentes humores erosio uenarum contingit. Conandum igitur statim in principio, ut sanguinis impetus cohibeatur, præsertim in his qui eum secundum circuitum excernunt. Si enim ab exercitatione, ut dictum est, excretio contingit, non tuto cohibetur: itaq; uenę sectio in cubito commoda fuerit his qui per circuitum sanguinem excernunt, paulo ante circuitum adhibita, eis uero quibus ob ruptam uenam promanat, statim in principio. Cæterum sanguinis detractio nem partiri melius erit, ut paulatim eius reuulsio ac diuersio fiat. Loci autem circa renes spongij postea imbutis cooperiantur, aut lanis succidis cum rosaceo & aceto. Post hæc & emplastra imponenda cruentis uulneribus glutinandis apta. Commode etiam cucurbita adhibetur, præsertim si suspicio sit inflammationem adesse in his, qui ob uenę rupturam sanguinem mingunt. Cōueniunt item potiones hæmoptoicis aptæ. Porro ubi sanguinis excretio cessauerit, diæta utendum est, unde non multus sanguis gignatur, maxime in his qui per circuitum excreuerunt, & supernæ corporis partes assidue exercendæ. In his uero qui ob uenam ruptam sanguinem mingunt, si exulceratio in locis relinquatur, ipsam post sanguinis suppressionem curabimus per ea quæ in loco de exulceratione dicuntur. Emplastrum renale. Cerae sesquiunciam, croci staterem unum, uittellorum ouorum numero duo, palmarum numero decem, aceti & rosacei quantum satis est.

De calculosis renibus: Archigenis & Philagrii.

Cap. IIII.

Renū calculis homines prouectæ ætatis magis quam pueri apprehenduntur: quemadmodum uesicæ calculis pueri frequentius quam ætate prouecti. Causæ autem generationis horum calculorum assiduæ existunt cruditates, unde materiæ incoctæ ac crudæ multitudo congregatur, & ardor circa renes & uescicam exoritur, qui humores ad assans eos cogit, & in lapidem indurat, ad modum toforum qui in aquis reperiuntur, quæ in æreis præsertim balnearum uasis coquuntur. Consistunt autem lapides in renibus iuxta uentriculos ipsorum aut parui, aut maiores: & aliquando quidem pauciores, aliquando autem plures: & magnitudine, & forma, & colore, & asperitate, & multitudine inter se differentes: nigri enim & subalbi & pallidi reperiuntur. Ex eorū numero rotundi & leues facile excernuntur, nō itē qui alia quacūq; forma præditi sunt, maxime tamē oblongi & asperi difficulter excernuntur. Accedit egris loci dolor, tumore nusquā foris apparente, nisi inflammatio per lapillos producat: spina egre flecti potest, & totū corpus ad motū pigrū est: crura torpēt, & maxime crus reni affecto propinquū. Urīnæ circa obturationis principium paucæ, aquosæ minguntur: postea uero perfecta earum suppressio cōtingit, aliusq; nihil excernit, uerū propriūduces multas ad egerendū facit. Excernitur autē aliquādo sanguis propter uiolentiā calculorū, præsertim asperiorū. Cæterū ubi lapis ex renibus fuerit emotus, & ad uescicam delatus, urīnæ multæ prodeunt arenosam subsidentiā habentes, & aluus similiter large egerit. Sensum autem æger percipit, ueluti calculo à renibus ad uescicam transeunte.

Cura



## Cura renum calculosorum.

## Cap. v.

Quum lapis in renibus fuerit obturatus, & uehementissimos intulerit dolores, sanguinis etiam multitudine periculum minitantis materias ad tensionem affectam partem aduocat, ob acutos uidelicet dolores. Vena igitur cubiti propinquæ manus in corpore ex repletione affecto secanda est: uerum multo minus euacuandum est quàm ipsa repletionis copia expostulat: neque enim futurum speramus, ut omnino cito è renibus excidat lapis, præsertim si magnus existat: quare seruire oportet sanguinè in eam quæ cum tempore futura est in corpore expensam. Itaque qui sanguinis multitudinem congregarunt, eis uenæ sectio commoda existit: qui uero uicioso humore abundant, eis purgatio apta est, quæ abundanti humori conueniens erit, neque omittenda hæc est, nisi aliud quidpiam id fieri prohibeat. Post sanguinem euacuatū aut expurgatum humorem, cōmunis ad omnes calculosos curatio quam infra subiecimus adhibenda. Doloribus igitur repente aut paulatim irruentibus, & per arenularum cū urinis excretionem aut etis: deindeque aquosis urinis excretis, & prædictis signis consequentibus ægri aluo per clysterem infundere oportet fursurum decoctum, caricarumque ac fœni græci & aristolochiæ: & si quidem decenter euacuentur, sinere: si uero non, etiam bis aut tertium infundere, atque id maxime si uenæ sectæ aut purgationis auxilium sit relictum. Cæterum ubi sufficienter excreuerit uenter, quædā infundere oportet, quæ corpusculorum circum lapidem sitorum inflammaciones lenire & laxare possunt: id ipsum uero oleū anethinū facere poterit, adipe gallinaceo recenti in eo eliquato, & maxime anserino, & phasiani, aut etiam butyro: quæ si non adsint, etiam fœnum græcum & altheæ radicē oleo decocta infundemus. Infectiones item in balneis assumendæ, ex decocto fœni græci, altheæ, anethi, artemisiæ, caricarum, & oleo. Maxime uero assumendæ sunt infectiones in balneis, & post hoc statim ægri in solium tepidius demittendi, atque id assidue facere non ab re est. Fomenta quoque locis admotā commodant ex fursuribus, præsertim in prædictis decoctionibus incoctis. Post fomenta conueniunt cataplasmata ex farina tritici, cum semine lini & fœni græci, melleque & oleo anethino aut gleuicino, ita ut in decoquendo etiam altheæ radicem cōtusam & cribratam cataplasmati inferciamus: in fine autem cocturæ terebinthina quoque inijciatur. Optimum etiam cataplasma fit ex lupinorum farina in passo cocta, peucedani radice quàm tenuissime trita, & chamæmelo in puluerem redacto ad farinam lupinorum ammixtis. Bonum est & panem passo decoctum circa lumbos & uentrem imponere, neque tamē absurdum foret eadem cataplasmata uesicæ ac peccini adhibere. Oportet autem coaceruatim alia super alia cataplasmata adferre, priusquàm primum frigescat: aut si id non libeat, calefactorio alio extrā contegere ne refrigerentur: id quod commode fieri potest per saccellos, aut alia uaporatoria cataplasmati imposita. Multis enim ad lapidis per urinam ejectionem hæc sola suffecerunt: uerum tu etiam ea quæ urinam cient præbibenda dato. Urinam autē multam ducit, mei athamantici, phu pontici, acori, graminis, & nardi decoctum, calami aromatici, ammi, dauci, oreoselini, hyperici, rosamarinii, asari, radi-

cis asphodeli, radice bryoniæ decoctum, coccus ite tinctorius. Ex his singula eisque similia tum per se, tum inuicem permixta data, urinam manifeste mouent. Crassa autem lotia ducit, radice cardui decoctum, radice rubiæ farina potata, radice capparis cortex, & similia. Exuscitat autem facultates ad excretionem irritando, alliū, chamædaphne, asparagi uitis albæ, asparagus, tertium scillæ decoctum, primo ac secundo diffuso. Deducunt autem ad renes ea quæ calculos cōfringunt, peucedani radix, bryonia, apiū, radícula. Cæterum lapides ipsos in renibus cōfringunt, ac atterunt, siō, aditāhū, bdelliū, uiticis semen, oxymyrsmes radix, radice lauri cortex, paliuri semen, tribuli decoctum, sarxiphagi, betonicæ, radice graminis, damasonii radice, ciceris iusculū, radix cyperi, lithospermō, te colithō à liquefaciendo lapidē dictum, lappæ, quæ philanthropos & xanthium dicitur, semen quod in spinosis pilulis reperitur, & lithospermō assimilatur: asparagi palustris radices, uitrum combustum tritum, altheæ semen & radix, rumicis domestici radice, pruni arboris gummi, ex spōgiis marinis lapilli, uermes terreni cocti: horum singula partim decocta, partim tenuissime trita, præbeto bibenda. Sunt & composita plurima lapidem frangentia, ex quorum numero utiliora in cura calculosæ uesicæ subiungam. Porro ea quæ urinam cient ac lapidē frangunt, tunc exhibere conuenit, quum uehementes dolores remittunt. Transmoto enim lapide & ex sede agitato dolores quiescunt. Quod si obfirmati sint lapides, plurimus potus uitandus, itemque ea quæ urinam ducunt. fomentis autem & cataplasmatibus ac infectionibus membra relaxanda, & uenter per infusa ac infusiones euacuandus, ne ureteres meatus urinam ex renibus ad uesicam transmittentes comprimantur. Post hæc autem doloribus aliquantulum lenitis, etiā cucurbitæ utiliter ipsis adhibentur & præsertim pressius affixæ, inflammatione uidelicet id non impediēte. Adeo enim coaceruatim transmouent sæpe cucurbitæ ipsos lapides, ut repente dolores suppriment, lapide nimirum in uesicæ amplitudinem transuecto: quapropter in principio superne à rene cucurbitæ sunt affigendæ, & ad inguina adtrahendæ oblique secundum meatuum qui ureteres appellantur situm. Cæterum si calidius sit ægri corpus, sitisque uehementer infestet: sit autem uniuersum corpus iā per uenæ sectionem, aut purgationem, & efficacissimos clysteres præuacuatum, ac nulla superfluitate abundet, si quidem consueti fuerint ad frigidæ potum, & nullum ex uisceribus debile existat, frigidam aquā frequenter & aceruatim ægro bibendam exhibuimus, & confestim corroboratis renibus, obturatum in ipsis lapidem expulerunt. In repletis autem corporibus & abundantibus superfluitatibus, & in his qui uiscera debilia habent, uitare oportet frigidæ potum. Sæpe autem delati ex renibus in uesicam lapides, & præ magnitudine circa collam uesicæ detenti, in extremum periculum ægrum deducunt, tum propter dolorum acumen, tum quod urinam excernere non permittunt. Decubitus igitur formam in talibus moliri oportet, ita ut supini sintuentur, & longe altiores coxarum uertebras habeant: deinde multiformiter eos commouere, quo omnibus machinamentis adhibitis lapidem ex ipso uesicæ meatu excidere faciamus: post uero ægros iubere



iubere ut alacriter urinam efficiant, & electo lotio si-  
neret at uero ubi lapis non fuerit euacuatus, rursus  
mouere, atq; hoc ipsum saepe repetere. Quod si non  
euacuetur, catheter instrumentum prolectandae uri-  
nae aptum immittatur, quod pro aegri aetate con-  
gruenter sit moderatum: eoq; humor educatur:  
post uero per potiones lapidem in amplitudine uesi-  
cae existentem confringere ualentes, lapis ipse attera-  
tur. Si uero ex uesica quidem excidat calculus, iuxta  
medium autem meatuum ipsius pudendi obfirme-  
tur, & uulnerando exulcerationis periculum indu-  
cat, decoctum quoddam ex praedictis urinam ducenti-  
bus plurimum exhibendum est, iubendusq; aeger ut  
multam urinam congreget, eamq; postea emingat  
ac diligentius expellat: ita enim detractus lapis cele-  
riter excidere consuevit. Noui autem, inquit Phila-  
grius, quendam in quo quidem alias lapis fuit pro-  
gressus, non penitus autem quam in summo puden-  
do fortiter obturatus, & parum absuit quin homo  
periret, propter urinae suppressionem, & maximam do-  
lorem. Angusta igitur uolsella ipsum lapidem ex-  
trahere non potuimus, quare sensim & quiete agita-  
uimus perquam tenui auriculario specillo. quum ue-  
ro neq; hoc modo eum extrahere possemus, secare  
statuimus, uulnuscule supernè iuxta glandis magni-  
tudinem incusso. Inferne enim secare non expedit,  
quandoquidè ferè semper in fistulam proficit, ac po-  
stea per ipsam fissuram urina excernitur. Porro ubi  
per urinam prodierit lapis, lac asininum melle mo-  
dico mixtum praebetur, & reliqua etiam diæta cō-  
modior, ueluti ad ulcera fieri consuevit, cōstituatur,  
ob uexationem uidelicet in locis ex lapide factam.  
Inde uero praeseruare hominem oportet, ne rursus  
renes lapide infestentur. Smegma Archigenis, ad  
uesicam & renes affectos, ut arenam per lotiū excer-  
nant, quo in balneis sudans utaris. Piperis, calcis  
uiuæ, sinapis, fecis uini uisæ, staphidis syluestris, ni-  
tri, adarces, pumicis, aluminis scissi, sulphuris uiui,  
æqualibus partibus utere. Ex oleo præillitis locis.

*Diæta praeseruans ne lapides renascantur. Cap. vi.*  
Maximi ad lapidis generationem praecauendam mo-  
menti, moderatus cibus & bonæ concoctiones exi-  
stunt: satietates enim & cruditates nō solum exaspe-  
rant morbum, sed etiam quum nō sit, generant. qua-  
re ægros admonere oportet, ut à coena saepe uomāt,  
& absinthium assidue bibant, & per tempus certum  
conuenienti temperaturæ ipsorum purgatio phar-  
maco se per uentrē purgent. Cibus autem deligant ē  
quibus neq; satietates neq; cruditates contingant: uri-  
nam etiam cientibus utatur: pastinacam in dies eden-  
tes ualde percoctam, & fœniculū, sion, carduū, pule-  
gium, calaminthen. Et ex marinis herinacios recen-  
tes, strombos, locustas, gammaros, & cæcros fluuiā-  
riles; atq; hæc quidem quotidiana sint, per plures au-  
tem dies radicis eryngij decoctū bibant, similiterq;  
trixaginis, & dictamni, ac radicis tribuli, reliquaq;  
pharmaca lapidem atterentia partim iam prædicta,  
partim dicenda. Oportet autem ipsam etiam aquam  
per omnem uictum purissimam esse & percolatam:  
uinum item tenue, album, urinam ciens: exercitame-  
ris uero utendum est mediocribus, & fricationibus  
in balneis ex nitro assato, & fece uini uisæ, ac pumi-  
ce: pilothris item assidue utantur, ac reliqua adseruā-  
te diæta, quæ in calculosæ uesicæ loco diceretur.

*Unguentum renale, Oribasij.*

*Cap. vii.*

Cyprini lib. iiii. ceræ lib. ii. terebinthinæ lib. i. unguen-  
ti amaracini & laurini cuiusq; lib. i. centaureæ, casto-  
rij, satyrj, myrrhæ, piperis, euphorbij, cuiusq; qua-  
drantē: cyperi, pyretri, pulegij, cuiusq; unciam i. sub-  
ige, & in fine etiam opobalsami trientem ammi-  
sce. Quidam euphorbij sesquunciam tantū adiungunt.

Aliud malagma: hoc exquisitū est ad eos quibus  
renes aut uesica lapide laborant, inquit Archigenes:  
neq; reperias aliud his affectionibus conuenientius.

Picis liquide, italicas heminas duas & dimidiam,  
ceræ, resinæ pinus, sulphuris uiui, cuiusque sesquili-  
bram, nitri sesquilibram, pyretri sexuncem, fecis uini  
uisæ lib. ii. nasturij, italicum sextarium i. staphidis  
syluestris sextarium unum, galbani sexuncem. Lique-  
scibilibus liquefactis arida trita infarcito. Empla-  
strū renale: facti ad colicos & coxendices: est autem  
Asclepiade. Ceræ trientē, styracis sesquunciam, aloës  
sesquunciam, croci, pyretri, opopanacis, galbani, thu-  
ris, cuiusq; unc. i. ammoniaci thymiamatis sextantē,  
olei ueteris trientē. Apparitū ac pro more subactū  
confidenter usurpato, & miraberis, inquit Asclepia-  
des. Aliquādo uero olei tantum sextantē cōijcimus.

*Diæta eorum quibus renes è lapide laborant, reliqui  
uero totius corporis habitus gracilis est: Phila-  
lagrij.*

*Cap. viii.*

Maligna corporis constitutio est in qua renes quidem  
lapidē generant, uniuersi uero corporis natura gra-  
cilis existit. Etenim quum lapide laborantes phar-  
macis & uictu indigeant attenuatorij, hæc ipsa gra-  
cilibus corporibus maxime contraria existunt. No-  
ui enim quendam qui ob renum ex lapide affectio-  
nem huiusmodi diæta usus, proprios digitos ægre  
mobiles, obtusiq; sensus, & ueluti strepentes ac exa-  
refactos sensit: Medici autem ipsi familiares refrige-  
ratos digitos ipsius rati, & resolutionē, quā paraly-  
sin Græci uocant, meditati, pharmaca ex euphorbio  
& adarce adhibuerunt: quorū usu affectio multo pe-  
ior reddita est, & accessiones semper ad superiores  
partes progressæ sunt: unaq; uehementissimos dolo-  
res intulerūt. Post uero ubi eger me accessisset, inquit  
Philagrius, & quæ contigerant circa ipsum decla-  
rasset, auxilium meū implorabat. quare diætā ei in-  
ueni, per quam citra omnē renum læsionem uniuersam  
corporis siccitatem sanauit. Pisanæ igitur succū  
excogitauit, & ex piscibus in petrosis aquis degētes,  
itemq; maritimos, & quæcunq; alia nihil uiscosum  
habentia. Simili modo & ex uolucrum genere quæ-  
cunq; cōsimilem habēt carnem, ueluti sunt perdices  
montanæ, attagenes, sturni, turdi, & merulæ, & de-  
inceps colūbæ in turribus habitantes, & passeruli iu-  
dem in turribus nidos struentes ac habitantes, dein-  
de etiam gallinæ in altioribus locis connutritæ. A  
lacte autem reliquorum quidem animalium abstinere  
iussimus, solo uero asinino uri indulimus, & ut  
compendio dicam, media inter ea quæ impinguant  
& attenuant esse oportet, quæ his ciborum loco ex-  
hibentur.

*De calculosa uesica.*

*Cap. ix.*

Generantur etiam in uesica lapides, pueris frequentius  
quàm ætate prouectis. uoraces enim pueri sunt, &  
perpetui motus, & cibus utcunq; oblati & nociui  
utuntur, & neq; horam cibū capiendi seruant ordina-  
tam: quinetiam prius quàm prior assumptus cibus  
concoqua



concoquatur, alium ingerunt: & quum uehementius à cibo moueatur, crudus & incoctus in uenas cibus distribuitur. Mollia autem sunt ipsorum corpora, & quæ facile cedant, eiusque rei gratia obturationem circa renes non perferunt. quum uero crassissima lotia in uesicæ amplitudinem perferantur, ibidem ueluti uini fex, & limus aquæ subsistunt, ac postea ex loci caliditate desiccata lapidescunt. Cæterum aquæ impuræ, & multo limo refertæ, itemque duriores & uehementer frigida, lapidum generatione adiuuât. Lapidem igitur in uesica obortos in principio subiectis pharmacis subducere conabimur.

*Pharmaca, lapides uesicæ attrérentia, itemque urinam ducentia.*

Cap. x.

Sunt & pharmaca quæ lapides in uesica atterunt: porri semē, fœniculi syluestris radix, artemisia, chamæmelum, amaracus, althææ radix & semē, carpobalsamum, sion quod circa aquas nascitur, graminis radix, adiantum, philetærii radix, smyrni semē, oxymyrsinæ radix & semē, rumicis radix, pæoniæ grana fulua comesta, umbilici ueneris radix, leucanthemum, lapides spongiarum, amomum, ticolithon, lithospermon, scolopendra herba, lapis qui ab ægris per lotium electus est tritus ac potatus, lappæ herbe, quæ xanthium & philanthropos dicitur, semē: uermes terreni recentes cocti triti cum uino, aut cōdito, aut alio quopiā potu, ex uino & melle, propomatis nomine Græcis appellato, paliuri semen, amomum, quod ipsum & aquas lapidē gignētes depurgat, si cum ipso amygdalæ amaræ gummi coquatur: uitis lacryma, pruni arboris lacryma, hoc est gummi, radiculæ radix cum panacis radice & capparidis cortice similiter lapidē per urinā efficere facit: thuris granum cum uino mulso, abrotini semē cum piperis pari modo ex uino. Horum unumquodque cum uino albo datur decoctum, aut siccum in spersum, aut cum melle, aut cum quopiā ex uino & melle potu. Danda etiam in potu ea quæ urinā cient: eis quidē qui calidiore habitu præditi sunt, cucumeris semen, apij, petroselinum, hyacinthi bulbi semē, uio læ albæ semē, croci radix, & similia quæ ad calculosos renes sunt prædicta. eis uero qui temperiæ corporis frigidiorē habent, his calidiora præbeto: quale est meon, phu, acorus, carpobalsamum, iris, & similia in renū affectionibus prædicta. Oribasij, ad calculosos renes & uesicā. Herba prosoyidis quā scordiam appellat, & Romana lingua personatā, est aut folio lato, similis symphyto, huius unc. i. piperis dra. i. iridis unc. i. trita in uitro reponito. Datur inde cochlearij plenā mensura cum hydromelite: datur autem quarto quoque die. Aliud Oribasij. Corticis radicis uerbasci decoctum large per dies quinque bibendum ex ordine præbe, & interiectis decem diebus, rursus per quinque præbe.

*Communia remedia uesicæ & renum calculosorum.*

Cap. xi.

Acetum mulsum aqua temperatum omnibus à calculo siue renum siue uesicæ laborantibus exhibendum est, qualicunque tandem temperiæ præditi sunt, & qualicunque sanguinē gignant: acetum itē scillinum. Carduus etiā frequenter exhibendus est. Oportet autem radices eius recēs à terra extractas, si tempus ita ferat, aut aridas iuxta aliud anni tēpus, in uino albo substantia tenui decoquere, & largius eā portionē offerre. Crasse enim urinæ copiosam multitudinē ducit, tum ex

omnibus uenis, tum ex calculosis partibus detractā. Carduus igitur secundum totius substantiæ suæ proprietatem, & pro priuati temperamenti facultate, uim crassos humores detrahendi habet. Oribasij. Comodæ sunt etiam calculosis, cicadæ aridæ tritæ, potu inspersæ tum per se, tum cum nardi spica. congruenter autem miscetur ad cicadas duas & dimidiam, nardi drac. i. Dato ex eis per dies nouem: primum, cochlearium unum, deinde ii. postea iii. deinde rursum ii. & post i. hoc modo progrediendo, donec nouem ex ordine portiones fiant, i. ii. iii. ii. i. ii. iii. ii. i. De passerulo. Sunt & alia quæ aliam naturam habent, & per hanc ipsam prædicta efficacia prædita sunt: quali sanè præstat passer troglodytes appellatus: est autem passerulus minimus iuxta sepes & muros uictum quæritans, estque hoc animalculum omnium auicularum minimum, ea excepta quæ regulus appellatur: similis est autem regulus in multis, præterquam quod in fronte auricolares pennas non habet. est etiam troglodytes passer regulus paulo maior & nigrior, caudamque semper sub rectam & albo colore retro interpunctam habet: magis itē garrulus quam regulus est, & sanè iuxta summum alæ lineamētum cinerei amplius coloris. breues itē uolatus facit: naturalem autem uim omnino admiratione dignam habet. Itaque sale conditus & crudus in cibo acceptus, morbum perfecte sanat: & noui adeo quosdam ob eius usum nunquam amplius ab affectione uexatos. Conditur autem optime pen nis euulsis, atque inde largo sale adobrutus, & postquam fuerit arefactus comeditur, & affectionē perfecte sedat. Melius autem est etiam aliter ipsos edere si plures contigerint, coctos nimirum, eius præsertim generis quod per hyemem ubique apparet. Exhibetur autē & alio modo. Passerulus non deplumis in ollulam conijcitur, ac deinde operculo addito uritur, animaduersione assidua habita, ne fallaris quum in cinerem sit reductus, & in aërē exhalans per exustionem totus consumatur: consuevit enim hoc contingere tum ipsi, tum alijs quæ uruntur: quapropter præstat ollæ operculum non oblinire, ut per intervalia quædam operculo adempto uisionis modum intueamur. Exhibendus est autem semel omnis unius passeruli usti cinis per se, aut modico phyllo & pipere ammixto, quo saporis iucunditate ori commendetur. Vt ut itaque passerulus peregre proficiscentibus commodus est, licetque melle cocto exceptum in promptu habere. Mellior autē mihi uidetur condiedi modus, atque adhuc dictis præstantior, si quis præeuulsis pennis uiuum passerulum sale adobruat. quod & ego facio, inquit Philagrius. Arbitror enim & sanguinis naturam quiddam in se completi, quod minime uulgariter prodest: cui amplius stercoreis efficacia accedit, quam exustione debiliorem reddi planè credo. Proderit etiam eis qui abundant assatos edere integros, ita ut nihil ex eis præter pēnas abijciant. Atque hæc quidem sunt quæ secundum proprietatem totius substantiæ efficacia existunt. Cæterum non minus generose etiam compositæ facultates calculi affectionem in renibus & uesica deterunt: prius autem quam ad eas progrediar, unius simplicis pharmaci mentionē faciam ualde celeberrimam, quod perfectam affectionis destructionem promittit, & quodam modo ad ea quæ ex proprietate totius sub

F      stantia



stantiæ operationem faciunt accedere uidetur. Habet autem hoc modo. Pharmacum simplex ad calculosos, cui Marcianus testimonium præbet, medicus Apher. Leporis pellem in ollulam conijce, & in furnum demitte, atq; ubi uista fuerit, ut probe conteri possit, acceptam tere, & ex ipsa cochlearium unum cum uino ieiunis in solij calidæ aquæ incensu præbe. Si uero uelis experimentum pharmaci ipsius accipere, ex eo in uinum conijce, & in uinum item lapidem ex flumine acceptum inijce, & cōtectum per paucas horas sine, & in grumos lapis dissoluetur. Presbyteri Indi pharmacum ad calculosos, quod item externum lapidem in grumos resolueri posse quidam aiunt, quemadmodum id quod præcedit.

Acori, phu, hyperici, cuiusq; drachmas sex, seminis porri drachmas xii. spicæ nardi drachmas decē, cassiæ, lithospermi, cyperī, cuiusq; drachmas xxv. excipe melle. Datur magnitudine fabæ. Aliud, quod lapidem celerrime per urinam expellit. Alliorum unguiculus siue nucleos septem, piperis granouem, contere simul quàm tenuissime, & cum uino albo ueteri adstringente, pro una uice in balneo bibendum præbe, ubi ad calidum eius locum fuerit ingressus. A dolore quidem hoc ægrum liberat: aliquando autē & lapidē post unicā portionem exigit.

Oribasij nephriticis. Acori, mei, phu, asari, sarxiphagi, piperis nigri, seminis rutæ, betonice, spicæ, nardi, piperis albi, singulorum æquales partes accipe: & ex eis siccis cochlearium cum uino adstringente aut aqua præbe. Aliud, Oribasij ad affectionē renū, quod & somnū inducit. Anisi, apij, petroselinī, spicæ nardi, piperis albi, nigri, & longi, singulorum drachmas decem, cinamomi drachmas octo, myrrhæ drachmas quatuor, opij drachmas quatuor, castorij, sisonis, dauci, cuiusq; drachmas duas, seminis hyoscyami sesquidrachmam, sarxiphagi, rhei, betonice, cassiæ, cumini, seminis cucumeris decorticati, cuiusque drachmam i. excipe melle, & nucis ponticæ magnitudine præbe ex aqua calida. Facit & ad ulcera. Aliud eiusdem celebre. Piperis nigri, albi, longi, sarxiphagi, betonice, petroselinī, asari, nardi celticæ, spicæ nardi, omnium æquales partes misce. Dato drach. i. cum condito calido temperatam.

De hircino sanguine.

Cap. xii.

Sanguis hircinus tum ad nephriticōs, tum ad calculosos præsens remediū: nam & præexistentes lapides soluit, atq; ita per lotium excerni eos facit, ut etiam alij amplius non gignantur; præterea & dolorem sedat. Colligitur autem hircinus sanguis hoc modo. Quum uua maturescere cœperit, ollam nouam accipito, & infusa in ipsam aqua, donec terreum deposuerit olla coquito: & accepto ē grege hirco ætate matura, plus minus quatuor annorum, eū mactato, eiusq; sanguinē medium olla excipito, ita ut eū qui primū effluxit, itemq; postremū penitus relinquant: medium autem inspissari finito, & in olla situm per acutam arundinem in multa frustra dissecto; indeq; reticulo denso, aut linteolo raro, aut cribro arctiore cōtectum sub dio exponito ut insoleatur & roscidus fiat, cauendo ne hymbre cōmadescat: porro ubi exiccatus fuerit, eum diligenter terito, & in pyxide adseruato, & remittente malo cochlearium plenum cum passo cretico exhibeto. Cognominatur autem pharmacum hoc Theu chir, hoc est manus dei. Huius &

nos, inquit Philagrius, in breui tempore non aspernandum periculum fecimus. Aliquādo autem odoris commendandi gratia parum solij, aut amomi, aut similitum ammiscemus. Ego, inquit, hoc pharmacum cum troglodyte passerulo permixtum, cuiusdam penitus nihil lotij efficiēti post magnos dolores exhibui, & permagnum lapidē attritum ab eo expuli. Antidotus Iuliani diaconi, cuius frequens periculum meo tempore fecit: calculos enim & in renibus & in uesica confringit, & paulatim per lotiū expellit: facit ad comitiales probe: ducit menses obdensitatem aut frigiditatem restrictos. Olsium ceruinorum ustorum quadrantem, castorij, piperis albi, agarici, acori, ammi, cassiæ, amomi, sarxiphagi, corticis capparis, radicis panacis, calaminthæ, coaguli leporini, serpilli, petroselinī, singulorum unc. i. mellis quātum sufficit. Datur nucis ponticæ magnitudine: ad renum affectionem & menstrua purgamenta, cum uino mulso: ad comitiales, cum frigida aqua: ad bestias uirus eiectantes, cum uino. Antidotus ex hircino sanguine. Componitur ex hircino sanguine antidotus huiusmodi. Sisonis scrupulos xii. spicæ nardi scrupul. xii. piperis communis scrup. xii. piperis longi scrupulos xii. cumini ethiopici scrupulos vi. petroselinī, dauci, rhei pontici, croci, caroi, ligustici, myrrhæ, acori, cuiusque scrup. xii. sanguinis hircini exiccati, ueluti prædictum est, scrupulos xxxvi. mellis despumati quātum satis est. Datur auellanæ nucis magnitudine condito calido temperata: datur autem in balneo in calidi solij incensu. Alia, Archigenis: celebre & clarum est, inquit, ad calculosos & hoc quo uitor: hac antidoto inquit, usus est etiam Philotimus & Iustinus. Spicæ nardi drachmas decem, croci drachmas octo, myrrhæ drachmas quinque, castorij drachmas quatuor & obolos totidem, cassiæ, floris iunci odorati, cinamomi, cuiusque drachmas quatuor, alij drachmā unā tantum habent, costi drachmas duas, scordij, polij, cuiusque drachmas tres, asari drachmam unā & obolos quatuor, mei drachmam unam, piperis albi & longi, dauci, petroselinī, opobalsami, rosarum siccarum, singulorum drachmam unam, carpobalsami obolos quatuor. quidam etiam sanguinis anaris feminæ drachmas duas, & succi radicis dulcis drachmas duas addunt. Excipe melle despumato, & fabæ magnitudine præbe cum uini mulsi diluti cyathis duobus, aut aqua calida, hanc etiam Oribasius commendat.

Antidoti uariæ ad calculosos.

Cap. xiii.

Archigenis. Spicæ nardi, seminis apij, dauci, cuiusque drachm. quatuor, aluminis scissi drachmam unam, cinamomi, cassiæ, floris iunci odorati, cuiusque drachmam unam, croci obolos tres, myrrhæ tantundē. Trita cum uino cœnanthite subige, & cum uino mulso obolum unum præbe. Præclarum, inquit, huius pharmaci experimentum feci, neque præstantius aliud reperias, neque ad huiusmodi affectionem destruendam, neque ad lapidis coactionem prohibendam, neque ad iam compacti attritionem, neque ad defecationem, neque ad educationem & repurgationem limosæ in urinis secis: coadiuuante præsertim diæta, quæ potissima præseruatix facultatis pars est existimanda. Philagrii pharmacum ex damasonio constans, quod secūdi ordinis esse dicit.

Dama



Damasonij drachmas decem, seminis dauci drach. sex, radicis dauci drachm. sex, radicis herbæ lanarię, corticis radicis capparis, cinamomi, cuiusque drachmas sex, cassiæ drachmas octo, betonicæ, piperis, cuiusque drachmas octo, nardi celticę, iridis, acori, asari, seminis foeniculi, petroselini, cardamomi, spicæ nardi, cyperi, costi, sarxiphagi, seminis apij, myrrhę, fœlis, radicis panacis, zingiberis, piperis albi, cuiusque drachmas quatuor, lapidis syriaci masculi drachmas sedecim, lapidis fœminæ drachmas sedecim, seminis smyrnij, lincurij quod succinum itemque electrum appellant, cuiusque drachm. xvi. seminis erucae drachm. xvi. mellis quantum sufficit. datur nucis ponticæ magnitudine cum radicis asparagi palustris decocto, aut floris iunci odorati, aut radicis dulcis. Datur à balneo. Aliud Philagrj, ex damasonio pharmacum, quod tertij ordinis esse ait in lapide atterendo. Facit & ad renum affectiones. Damasonij drachm. x. seminis dauci, radicis herbæ lanarię, corticis radicis capparis, cassiæ, nardi celticæ, cuiusque drachm. vi. alij drachmas xvi. habent, iridis, mei, asari, foeniculi, cardamomi, cyperi, petroselini, costi, seminis apij, myrrhæ, croci, cuiusque drachmas ii. fœlis drachmas iiii. radicis panacis drach. iiii. quidam & zingiberis drach. iiii. & piperis ite drachm. iiii. addunt, mellis atticij quantum satis est, excipe, & utere quemadmodum predictum est.

Oribasij, ex libris ad Eustathium, antidotus Xenophili. Facit ad uesicæ & renes calculosos & exulceratos. Atterit enim lapillos, & ulcera sanat. Cassiæ unciam unam, sarxiphagi trientem, betonicæ, cyperi, petroselini, costi, tribuli, seminis uiticis, lithospermi torrefacti, cuiusque sextantem, seminis apij sesquiunciam, phylli, spicæ nardi, asari, dictamni, baccarum lauri, seminis ocymij, singulorum unciam unam, zingiberis drachm. iiii. nucum pinearum quas strobilos Græci uocant sex uncem, mellis lib. ii. in balneo exhibeto, aut ante balneum ex uino mulso aut passo chrysatice magnitudine fabæ.

Andromachi antidotus ad calculosos, quæ paulatim confringit & extrudit lapides, donec uesicam perpurget, & pellucidum lotium procedat: & quod maximum est, ita per sanat, ut nec in posterum gignatur. Habet autem hoc modo. Seminis dauci, anisi, seminis cucumeris decorticati, seminis apij, petroselini, myrrhæ, cuiusque sesquidrachmam, cassiæ, cinamomi, nardi celticę, cuiusque drachm. i. trita aqua subigito, & ad paruorum lupinorum formam redigito, ieiunis aut quotidie per dies triginta cum aquę cyathis tribus exhibeto. Ceterum ad huius pharmaci apparatus religiosè, inquit, accedendum est: in lignea enim pila, & pistillo ite ligneo hæc contundenda sunt: oportetque amplius eum qui hæc contundat neque annulum ferreum gestare, neque calciamenta clauis ferreis transfixa, atque id ut mysterium habe. Asclepiadæ ad calculosos compositio. Carpobalsami, lapidis qui in spogij reperitur, pulegij sicci, seminis maluæ sylvestris sicci, singulorum equales partes contusas & cribratas reponito, indeque cochlearium unum cum uini diluti cyathis tribus præbeto. Alia compositio celebris. Electri siue succini unc. i. lapidum qui in spogij reperuntur unciam unam, sarxiphagi unc. i. Dantur ex ea scrupuli duo quomodocumque uelis. Pharmacum ex cardamino ligno ualde celebre.

Spicæ nardi, piperis, hyssopi, tectoliti, cuiusque unc. i. piperis albi scrupulos xviii. cassiæ scrupul. ix. helenij siue inulæ scrupulos v. scobis eboris scrupulos xii. ligni cardamini scrupulos xii. mellis quantum sufficit. datur ex eo oboli tres cum condito, aut aqua mulsa. Aliud laudatum. Seminis brassicæ drachmas vi. cyperorum, petroselini, electri, piperis singulorum unciam unam, mellis quantum satis est. datur nucis ponticæ magnitudine cum condito febre carentibus, aut cum aqua mulsa. Aliud. Cucurbitam aridam exure, & cineris cochlearium unum, ut uelis bibendum præbe: aut catapotia ex cinere formato ac exhibeto, & celerrime per lotium calculum extrudet. Aliud, quod calidioribus præcipue conducit. Ex portulaca succum exprimito, eumque resiccatum in catapotia redigito, & drachmam i. exhibeto, ad miraculum usque lapidem per urinam expellit. Aliud. Cancros iiii. aut v. aut vii. impari solum numero sub testa uiuos exure, & contriti eorum cineris cochlearium i. cum condito præbe: eoque calculosos renes sanabis. Aliud. Phu aqua feruefactum bibendum præbe, omnesque lapides educet: quod si Mithridatis compositione abudes, eam quæ scincos admixtos habet, unam cum decocto præbe. Experimento constat: utere. Conditum Oribasij. Vini sextarios duodecim, mellis sextarios duos, piperis sesquiunciam, sarxiphagi, betonicæ, mei, phu, spicæ nardi, petroselini, cassiæ, cuiusque sextantem. Aliud conditum, ad uesicæ lapides accommodatum. Sarxiphagi, spicæ nardi, cuiusque drach. iiii. piperis unciam i. carpesiæ, zingiberis, mei, asari, cassiæ, fisonis, petroselini, acori, dauci, singulorum drach. iiii. mellis sextarium unum, uini sextarios iiii. aut v.

Aliud renale. Spicæ nardi, phu, sarxiphagi, betonicæ, asari, lithospermi, petroselini, cuiusque unciam unam, costi unciam dimidium. Ex hoc arido cochlearium unum in conditum mitte, idque æger hora ante prædictum bibat. lapides atterit, & per urinam expellit, neque amplius cogi lapidem permittit. Aliud Oribasij conditum renale: facit enim ad inueteratos renum dolores, & ad difficultatem emittendi urinam ex uesica, ad strangulationem item ac urine suppressionem, ad eorundem etiam membrorum frigiditatem: callosas durities extrudit, lapides confringit, & ad alias affectiones eodem modo probè facit. Sarxiphagi drachmas duas, betonicæ drachmam unam, petroselini scrupul. vi. spicæ nardi scrupul. iiii. phylli scrupul. iiii. rhei scrupulos iiii. irionis scrupul. vi. piperis scrupulos xii. mellis sextarium unum, uini boni sextar. iiii. Aliud pharmacum renale. Zador, id est, zeduaræ, galangie, ligustici, fœlis, cardamomi, piperis longi, piperis albi, cinamomi, zingiberis, seminis smyrnij, careophylli, phylli, stachyos, myrobalani, phu, costi, scordij, silphij siue laserpitij, rhei barbarici, pæoniæ: alij etiam arboris nucis uiscum & paliuri semen, itemque sarxiphagum ac cassiam addunt. Ex his singulis stateres duos commisceo. Datur cum condito aut uino uetere ad balneum iturij, & sine balneo, uesperis similiterque mane. Absinthion renale, ualde bonum. Petroselini unc. i. sarxiphagi scrupul. xii. betonicæ scrupulos xii. seminis irionis sesquiunciam, spicæ uardi scrupul. vi. phylli scrupul. vi. rhei pontici scrupulos vi. calami aromatici scrupulos quinq; dictamni scrupulos iiii. mellis



sextarium unū, uini sextarios quinq. præbe medio cris proculi mensura ieiunis. Pharmacum lapides in renibus atterens, adeo ut in una die commoditatē suam ostendat. Abrotoni drachm. viii. croci dra. viii. herbæ anthyllidis drachm. xvi. foliorum rutæ uiridium drachmas xxxii. Probe contrita in pastillos digerito, & ex eis drach. i. cum aceto mulso præbeto. Vtere ipso, inquit, assidue: mirum enim quantā utilitate præstet.

*Cura eorum in quibus lapis atteri non potest, neq. itē per lotium excerni.* Cap. xiiii.

Quod si uesicæ lapides per lotium excerni nō queant, sed in meatu sint obturati, & urinæ suppressionem inducant: ægrum supinum decumbere, ueluti dictū est, oportet, ita ut coxarum partes magis sursum uergant: indeq. huc atq. illuc multiformiter cōmouere, quo ex meatu excidat, post uero ita adhuc supinum & positum sursum uergentem mingere iubere. si uero neq. sic excernere possit, per catheterem instrumentum urinam prolektare. Quod si ob lapidis asperitatem uesica incidatur, & ex hoc subcruenta mingant, aliquādo uero purulenta, & submucida, illis ipsis si ue mingant, siue non mingant, plus quā alijs dolorum adest. cæterum in potu exhibenda sunt his pharmaca quæ lapidem atterere prædicantur, & ulcera ipsa sanāt, quibus uero ulcera nondum sunt oborta, lapides autem in uesica detinentur, hi pellucida & tenuia ac aquosa mingunt: quin & arenā subsidentē urinæ habent, & in lotij eiectione dolores augescunt. Quod si neq. per hæc adhibita pharmaca lapis in uesica atteri possit, ad sectionem trāseundum, quæ pro more infernè fiat, atq. ita lapis subtrahatur & fissura quā diligentissime carne repleatur, cicatrixq. inducatur, ne fistula per successum oboriatur.

*Dieta post exactos lapides, adseruans ne alij renascantur: & de affligentis humoris cognitione ex lapidis colore.* Cap. xv.

Post exactum lapidem, & cicatricem ulceri obductam diæta constituenda est, ne eos renasci cōingat. Coniectura etiam faciendā tum ex alijs, tum ex exacti lapidis colore, cuius humoris materia in corpore abūdet, ex qua adeo lapides cogantur. alij namq. subalbidii apparent, atq. hi pituitiosorem humorem ostēdunt: alij uero pallidi sunt, & bilem abundare demōstrant: alij autem coloris testacei sunt, ob superassātam uidelicet à plurimo calore bilem: alij nigri, qui atræ bilis humorem exuperantem declarant. Omnes igitur quomodocunque calculosi à cœna assidue uomant, neq. quicquam feruens in cibo sumant, quod renes & uesicam excalfacere possit. Cauere autem conuenit cibaria substantiæ duræ, & quæ ægre masticatione atteruntur: itemq. ea quæ multam substantiam habent, plurimumq. similiter nutriunt, & quæ acuatim digeruntur antequā perfectè concoquantur: grauis item qualitatis, & quæ difficulter cōmutantur, ac supernatant, & egrè per aluum subeunt, ac inflant: item quæ meatus obstruunt, aut aliās diutius in corporibus insident: ex huiusmodi enim cibis uenter labore fatigatus, ipsos aut crudos aut semicoctos ad hepar & renes digerit, atq. ita quod crudum cumulatim allatum est, ineptè præterq. naturam excolatur, & cum tumultu ad renes progressum, statim coactum inspissatur ac restitat. Quare omne lac præter asinum eis incommodum existit: hoc enim in-

quit Archigenes, & substantia tenuissimum est, & facultatis facilimè dissoluētis. igitur mirabiliter articularum tumores & nodos (quos & callosæ duriciei modum ex uitiosi lactis usu pueri sustinere cōguntur) leuigat & delet. unde admonendum duxi, ut ipsum calculosis assidue heminae mēsurā exhibeatur, post matutinas deambulationes, atque id adseruandi à lapidis generatione gratia præ omnibus alijs fiat. Potus aliās sit aqua calida, fontana, pura, defecata, leuis. Vinum autē tenue, urinam ciens, nō ualde uetus. Dulcia enim uina calculosis sunt nociua. Porro ut compendiō dicam, omnis diæta in frigidio re temperatura præditis, exquisitè attenuatoria sit: in calidioribus uero, inter attenuatoria & impinguantia media, satietatem uero præ omnibus alijs uitare oportet, dulcium præsertim & ex caseo cōflatorum ciborum: unde & cruditatem infestissimam eis censere oportet: in quam si quando incidant, impastos & absq. cibo manere decet. Frigora quidē magis quā æstus cauenda. In temperatis uero locis degant in quibus anni tempora & horæ nimio seruore non infestent. Assumantur etiā ociosæ deambulationes, & exercitia moderata, segnitie enim & ocii eis nocēt. Cæterū uentrem semper probè laxū habere oportet: hic enim si bene subierit, puriora lotia prodibunt. Vnguentis utantur quæ locos defendere queant, ne facilè grauius oblædantur: epithemata etiā cutem rubefacientia, itemq. lancinantia, dropacesq. & sinapismi adhibeantur. Malagma autem exquisitum hoc est, neq. facilè reperias aliud, inquit Archigenes, ad huiusmodi affectiones magis accommodatū. Picis liquidæ heminas ii. & dimidiā, ceræ sesquilibram, resinæ pinus sesquilibram, sulphuris uiui sesquilibram, staphidis agrestis bessem, galbani sexuncē. Liquefabilia eliquantur, & inspersis aridistritis, simul optimè subacta & unita imponuntur. Varosa asperitas ex hoc inducta mucū plurimū ducit, & pruritum non malum facit, adeo etiam ut uolupte sit, si per resolutionem refrigeretur. Quod si aliquādo leuis molestia inde oboriatur, cerato eam lenire oportet per unā diē, ac deinde rursus eadem imponere. Cōuenientissimū etiam renibus est, si super uētris locum idem malagma imponatur. Sinapismi item calculosis apti sunt, & naturalium aquarū usus: lauent autem non sæpe, ungantur autē frequenter. Curiose etiā temporis oportunitas dispicienda est, ut uenam secemus, si quidem sanguis abundare uideatur, aut ut purgationibus conuenientibus utamur in eis quibus uitiosi humores coaceruantur. Bibant autem & ea quæ urinam ciunt per interualla quædam tum simplicia, tum composita præscripta: in huiusmodi enim omnibus quicquid modicè relictum est, facilè ad debitam commutationem deuenit. Aiunt autem quidam terram ex latere ueteri tritam cum uermibus terrenis, & pectini crassius illitam, præparare ut lapis in uesica aut renibus per lotium eiciatur.

*De renum inflammatione Ruffi.* Cap. xvi.  
Ob plurimas causas renes inflammantur, nā & humores corrupti, & plagæ, & attritiones, & pharmacorum portiones inflammationē generant, & præsertim equitationes continuæ & uehementes. Accedit ægris dolor pulsatis retro iuxta primum dorsi uerticulum, paululum supra spurias costas, distendit autem dolor



tem dolor sursum usque ad hepar, præsertim dextro rene affecto, deorsum uero usque ad uesicam & pudendum, lumbosque & coxendices, pectinem item ac femora, consequitur etiam stupor propinqui cruris, & neque recta erigi possunt, neque pedibus ingredi, & siue sternutatio, siue aliqua alia concussio irruat, uehementi dolore lancinantur. frigent eorum extrema, & magis suræ ac pedes: adest urinæ emittendæ difficultas, minguntque assidue ac laboriose, in principio quidem tenuia & aquosa, in quibus nihil subsidet, inflammatione uero in peius proficiēte, rubicundiora, deinde etiā crassa & mucosa, adsuntque febres uehementes. Quod si adhuc amplius inflammatio augetur, hæc omnia itidem fiunt uehementiora. His accedit nausea, & stomachi morsus, & uomitus bilis. Quidam autē ipsorum usque ad animi deliquium anguntur & exudant. Sistitur ipsis uenter adeo ut inflentur, & assidue ructus emittant. Sequitur fastidium uehementius, & quibusdam continuè fiunt exacerbationes: quibusdā uero per interualla, in uniuersum autem uentris egestio, & urinæ multa excretio dolores ipsos præcedunt. Noui autem ego quædam, qui post uehementem uexationem animo linquebatur multumque exudabat: ubi autem restitutus sibi animum receperat, simul ab omnibus molestiis liber euasit. Renes igitur inflammatos hoc modo curare oportet. Aegrum in lecto mollissimo decumbere oportet, ac primo die à cibo abstinere, non tamen in multos dies inediam extendere. Urinæ enim puriores & aciores per inediam redditæ, uehementissimos morsus infligunt: itaque in principio sorbitionibus tenuibus morsus leniētibz connutrire oportet, & aquæ calidæ potu. Aquā uero mulsam in principio non laudo, priusquam concoctæ & consumptæ fuerint inflammationes: neque item eorum quæ urinam cient usum: obledunt enim mordaces humores inflammatis partibus inducendo. neque etiam purgatiuum pharmacum exhibendum, ueluti quidam cōsueuerunt. Per clysterem autem maluæ decoctum, aut seminis lini, & fœni græci, cum oleo infundendum, ammixto etiā melle, aut prisanæ succus cum oleo & melle. Cæterum copia non multa infundatur, ne repleta intestina comprimant renes: ubi uero stercora prodierint, & intestinum fuerit euacuatum, oleum iniiciatur anethinum aut gleucinum cum butyro, eliquatis in his adipibus quibusdā, anserino uide licet aut gallinaceo, aut medulla ceruina. Subeunte autē uentre, incumbente lanam ex oleo calido assidue irrigare oportet: melius tamen fuerit si anethum, ruta, althea, & artemisia, oleo sint incocta. Porro si adhuc maiori acumine renes affligantur, & uehementior exurgat dolor, uenam cubiti secare cōuenit, sanguinis detractioe repetita, & si post id auxiliū aliquid ex inflammatione relinquatur, ad cataplasmata procedendum, primum quidem ex farina in aqua mulla cocta, aut ex semine lini, postea etiam ex chamæpity, polio, abrotano, trixagine, asaro, iunci odorati flore ammiscendum, atque tum non amplius in aqua mulla cataplasmata coquenda sunt, sed in passo. Mixturæ autē modus sit, ut ad farinæ partes IIII. quorūdam ex prædictis pharmacis partes II. cōmiscantur. Bonum est & hoc cataplasma. Galbani, terebinthinæ, farinæ erui, cuiusque drachmas quinquaginta, iris drachmas IIII. cerati ex gleucino, aut amaraci-

no, aut irino, aut cyprino, aut aliquo consimili oleo apparati libram unam, farinæ triticeæ sextantem passi cretici quātū satis est. Apparato, ac supra ilia ac lumbos imposito. Facit idem ad uesicam inflammata, si pectini imponatur. Quod si per cataplasmata dolor non leniretur, cucurbita lumbis ac ilijis est adhibenda, & fissuris impactis plurimus sanguis attrahendus, deinde spongiarum fotu utendum, & in calidam aquam desidendum, in qua calamus aromaticus, chamæmelum, flos iunci odorati, semen lini, anethum, maluæ syluestris radices sint incocta. Prius autem & uesica ingens aqua & oleo semiplena ipsis locis imponatur, fomentis etiam pinguioribus admotis, postque etiam ceratis: quin & malagmata amplius imponenda. cerata quidem conueniunt ex cyprino aut irino apparata: malagmata autem odoratissima sint, qualia sunt hepatica ex styrace conflata. Cæterum dolore affligente bibenda sunt pharmaca quæ dolorem leuant: eiusmodi sanè. Calicis papaueris tosti oboli dimidium, styracis tantundem, thuris obolum unum, seminis cucumeris grana uiginti, seminis apij quantum tribus digitis comprehendere potest, opij ad erui magnitudinē. Hæc omnia quā tenuissimè terito, ac cum aqua dulci permixta pro uice una exhibeto. Statim enim quiescet dolor, & obdormiet æger. Conferunt item consimiles pastilli dolorem leuantes. At uero ubi perfecte concoctæ fuerint inflammationes, & quiesuerint dolores, tunc etiam per urinam cientia purgandum: ueluti sunt acorum, meon, phu, petroselinum, gramen, casia, chamæpitys, polium. Horū unumquodque ex aqua coquendum est, & cum uino & melle bibendum. Cibi autem post concoctas & consumptas inflammationes exhibendi, sunt panis optimus, maximè clibanites: ex uolucris, montanæ: ex marinis, herina rei recentes: ex oleribus, fœniculum, apium, daucus, & syluestria omnia, & cucumis coctus. Hæc enim optimè urinam prolestant: maximè uero id præstant pastinacæ probè percoctæ, & crithma, & scandix, & gingidia. A concoctis inflammationibus urinæ his prodeunt multæ & crassæ, & in quibus bonum est quod subsidet, atque hæ ipsæ maximè iudicant ac secernunt morbum: aquosæ autem mictiones & puræ ac pelluentes, ægrè morbum secerni indicant.

## De duritie renum.

Cap. xvii.

Quæcūque durities circa renes oboriantur, dolores quidem non amplius inferunt: egris autem ex uacuo uentris loco ueluti quippiam pēdere uidetur, & stupor adest coxendicū, & impotētia crurium, minguntque pauca, & reliquo corporis habitu aqua inter cutem laborantibus maximè similes existunt. Quidam etiam temporis progressu manifestè hydropem incurrunt, ueluti etiam ab alijs uisceribus induratis contingit. Hos itaque ceratis & malagmatis, itemque frictionibus ac pinguibz fomentis remollire oportet, & urinam ducentia eis exhibere. Ventrem item ex altheæ, fœni græci, & caricarum decocto subluere, melle & nitro ac oleo iisdem adiectis. Ad noctem item infusa per clysterem conueniunt, oleum anethinum cum butyro & adipe anserino.

## De suppuratis renibus, Ruffi.

Cap. xviii.

Quibuscūque renum inflammationes ad puris permutationē uertuntur, his omnes in renibus inflammatis prædictæ accessiones extenduntur, & febres cum



horrore irruent, atque id maximè circa uesperam. Iam uero & tumor quodammodo circa illa apparet, & uehementis caloris sensus ipsos circa renes affligit: minguntque ruffa & pura. Vbi uero suppuratio fuerit perfecta, tunc & februm & dolorum accessiones minores contingunt, & grauitatis sensus magis circa affectum renem infestat: tempore rupturæ magis exacerbatur, ad quam etiam humorum excretio cum ipsis urinis consequitur, inuehuntur & sordes quædam ex substantia renum eloræ. ut plurimum enim ad uesicam ex renibus erumpens pus defertur, quod sanè conducibile putandū est. Aliquando autem & ad intestina eruptio deuoluitur, & per sedem pus euacuatur. Quibusdā uero neque in totū suppuratione erumpunt, sed circa renes per multū tempus consistunt, donec cautere adhibito aut alio modo forinsecus apertione & educatione moliaris. Igitur postquā abscessus signa apparuerint, quā celerrimè adiuuare oportet tū suppurationē, tum puris eruptionē. Quā in re spongiæ aqua & oleo, itemque fursuribus imbutæ assidue proderūt foci gratia admotæ. eundem usum etiā cataplasmata præbent, ex farina ordeacea cum ficum & altheæ ex aqua mulla decocto, aut ex cretico passo. Bonū est & ipsas ficus ammiscere tritas, & ablinthij contusam, aut chamelæam, aut irin, & bryoniam: addatur & terebinthina, pix, māna thuris, thus ipsum, columbæ stercus, polium, & quæ similia his existunt, & simpliciter omnia adhibeantur quæ in hepatis abscessu supra approbauimus. In malignis & putrescentibus humoribus, quos ex februm acrimonia cognoscas, etiā rosæ in cataplasmata cōmiscendæ, & myrti baccae, eruique ac lentis farinæ. Hæc enim eisque similia humorū putrefactionē sistunt. Post hæc emplastris utendū quæ pus permutare possunt, quemadmodū in hepaticis est prædictū. Quod si ruptura moretur, acriori infuso aluus est subluenda, ueluti ueratri nigri cremore, raphani ite & alliorū ac cucumeris syluestris radicis cremore. Macerare autē hæc in aqua maris aut fassugine uel muria oportet, parumque olei ammiscere, quo infusa lubrica reddantur. Hæc sanè per clysterem infundenda. iubendique ægri quo plurimo tēpore apud se detineant: consueuerunt enim sæpe ipsam suppurationē dirumpere, unā cū hoc quod uentrē emollire solent. Si uero uehementiores sunt dolores, ptisanæ succus infundatur & lac recens multum: infusus quoque in aquam & oleum appareatur. In potu leniora urinam ducentia exhibeantur, ueluti cucumeris semen decoritatum ex aqua mulla, palmulis in ipsa incoctis. Dāda etiā iris cum melle despumato delingenda, aut ipsum mel in decoquendo in pastillum redactū. Remorātem item rupturam iuuat cuminum cū passo, ruta cum uino mulso. Si uero ex habitu corporis & doloribus languidioribus coniecturam facias, ob crassitatem pus ipsum non excerni, foeniculi decoctū in potu dato, & chamæpityos, pulegijque & origani. Post rupturam autem carunculæ paruæ oblongæ cū urina excernuntur: & si quidem maligna fuerint ulcera, humores foetidi, liuidi & mucosi: si uero benigna fuerint, etiam pus ipsum album, & æquale, & leue, absque odore graui, & paucū reperietur. Lac itaque cum melle post puris eruptionem eis præbendum: & primum quidem asininum aut equinum, ad ulcera enim repurganda conducit. quum uero re

purgatione amplius opus non habent, & morsus fiunt obtusiores, indigeretque æger nutrimento, tunc etiam bubulum lac eis exhibendum II. & III. heminarum mensura. Amplius autem omne lac recens multum calidum præbendum est, animalī in domum ubi æger decumbit deducto, hoc & aliorum internorum ulcerum optimum est pharmacum, & graui puri maximè amicū, & corpus probè nutrit. Porro ad uires refocillandas ac restituendas, ægrum decumbentem molliter fricare singulis diebus mane conuenit, & primū bubulo lacte nutrire: postquā uero concoxerit lac, sorbitionem ex ptisana apparam præbere, aut amyllum, aut similaginem lotam cum lacte coctam. dandum & lac ouis permixtum, & iusculum gallinæ pingue. Ex oleribus conueniunt, malua, seris, rumex, portulaca, asparagus palustris, cucumis, lactuca, omnia cocta, neque quicquam crudum uorent. Hæc sanè morsus obtundunt. Ceterum succedentes repletiones uomitu euacuare oportet. Ut uero facile uomant, cucumeris semen tritum ex passo eis præbeatur: aut ptisanæ succus cum passo. Oleo autem cyprino præsertim illinantur pennæ, quibus item ad uomitum iritentur. Non solum autem ad repletiones uomitus laudo, uerum si quis omni mense audenter uomat, forte & renum ulcus, & quicquid inde mali accedere possit, dissoluat. Reliqua diæta eadē sit cum ea quæ postea ad uesicæ ulcera dicitur. Ex his uero quæ urinam ducunt simpliciora iam sæpe dicta itemque dicenda, ad repurganda renum ulcera bibantur. Quum uero munda fuerint ulcera (quod inde tibi palam fiet, si neque tectoriū etiā ulceri obductum cum urinis excretū appareat, neque etiam pus excretum sit seculētum, sed subalbū, & leue, & æquale, & paucum) tunc sanè pro emplastris malagmata assumenda sunt: id quod ex semini bus constat: item quod ex baccis lauri: & quod Apollonianum inscribitur: & omnia quæ cutem rubescere possunt, quale est id quod ad calculi affectionē est præscriptum. Pro his uero quæ urinam cient resiccantia adhibeantur: quare cibus ipse adstringens sit, & pharmaca quæ corpora cogant. Conferunt etiā dropaces, & sinapismi, & naturalium aquarum calidarum & frigidarum usus. Porro ad inueterata renum ulcera, pharmaca sunt assumenda, quæ ad exulceratam uesicam describentur. Atqui nosse oportet omnem exulcerationem, & uesicæ, & renum, ægre curabilem esse, præsertim quæ ex erosionē sit oborta, adeoque paucos nouimus qui ab ea perfecte sint liberati: si uero extrā suppuratio uertatur, inflammatio magis tumescit, & ad manum & ad oculum magis euidenter exposita est. His merito medici manū admoliuntur ubi maxime tumor attollitur, curamque adhibent quæ ad communia & caua ulcera requiruntur: non ignorandum tamen ea in fistulam abire solere, quare diligentiori omnino indiget tractatione.

*De disuria, id est, emittendi urinā difficultate: &*

*stranguria, hoc est, stillicidio urinæ. Cap. XIX.*

Disuria dicitur, quum meiere æger cupit, & cum uiurinæ excernuntur. Stranguria autem appellatur, quum paulatim & guttatim urinæ destillant, & assiduam ad mingendum iritationem faciunt. Hæc autem contingunt aut ob acrimoniam urinæ, aut ob exulcerationem uesicæ, aut ob uesicæ debilitatē: aliquando autem & affectis renibus aut hepate, quum



quū abscessus rūpitur, & pus per uesicā excernitur, assiduam iritationem ad mictionem propter acrimoniam suam inducit. ex intemperie etiā quadam ægra uesica in propria lædiur actione. necessarium igitur est scire causas quæ stranguriam & diſuriam præcesserunt, atq; ad ipsas remedia adornare. Si igitur frigiditas has affectiones præcessit, oleo rutaceo calido pectinem fouere oportet, ægrumq; in ſamſuci aut rutæ decoctū delidere, ac imum uentrem contegere ac calfacere: aliquando & per sedem oleum rutaceū calidum infundere, & cibis urinam cientibus uti quæ concalfacere possint: aromatum etiā decoctiones in potu exhibere, potest etiā præberi in potu theriace cum passo aut uino mulso. Sin uero biliosiores sint urinæ, & mordacitas circa uesicam contingat, ac urinæ stillicidium inducat, tum sanè exuperantem uisiosum humorem quàm celerime purgare oportet, & cibis temperamentum inducētib; uti, ita ut ab omnibus acris ac falsis abstineamus: in potu autem plurima aqua calida dulcis exhibenda, ægerq; assidue ad mictionem cogenendus: si enim acré recrementum diutius in uesica moretur, partes ipsas corrodit & exulcerat. Conueniet igitur continuis fomentis uti, & amyllum cum lacte decoctum, itemq; cum palmarū decocto absorbendum præbere. Vinum autem dulcius præbeatur. Optimū est & ipsum lac calidum potatum. Quod si acrimonia adhuc augeatur, etiā per colem lac ipsum cum amylo in uesicā inijciatur, & pastillus ex physalide cōstans in potu sumatur. Porro si aliud membrum sit affectum, & id ipsum per uesicā expurgetur, manifestum est illi priorem curam deberi, ita tamen, ut neque uesicam negligamus.

De difficultate emittendi urinam in febribus. Cap. xx.  
Philumeni: Fit & in febrium malignarum principio urinæ emittendæ difficultas, ut & inde uesica affligatur, & paulatim cum dolore urinam emittat: neq; uero sola molestia hæc est, sed & signum totius neruosa partis affectæ. Ad imum uentrem igitur & pectinem, inguināq; & coxendices, lana pura oleo dulci imbuta, in quo ruta, anethum, aut oleum sicyonium sint decocta, imponatur, lanæq; amplius cum minum quàm tenuissimè tritum infarciatur, & si alius eis sit adstricta foeni græci & maluæ decoctiones infundantur. Inſersiones etiā assumantur usq; ad umbilicum & lumbos totos, ex artemisiæ, foeni græci, rutæ, pulegij, & maximè ſamſuci decocto, oleo itidem ammixto. Quod si accessiones urgeant, etiā uenæ sectio adhibenda est, & diæta exquisita, quæ maxima parte ex sorbitionibus cōstet. Uimur itaq; halica lota cum anetho in aqua mulla despumata cocta, aut pane loto, aut sorbilibus ouis. Post hæc & malua cōuenit, friabilis cocta, & porrum capitatum in tribus aquis decoctum, & tenerrimi pisces. Post fomenta uero, cataplasinata adhibeantur ex eadem materia apparata. Vrgentibus autē doloribus, cucurbitæ cum scarificatione ad imum uentrem affigantur. Ceratum uero ad has affectiones conuenientissimum hoc est: Maluæ syluestris radices in oleo sicyonio cum modica aqua coquuntur, donec aridæ fiant, & ipsæ quidem abiiciuntur, oleū autem cum rutæ succo permiscetur, ut quarta olei pars de succo rutæ addatur: hisq; amplius cera sufficiens & parum castorij adijcitur. Cæterum potus ita affe-

ctis cōmodus est cucumeris satiui semen, quod præmaceratum decorticatur, deinde tritū cochlearium II. mensura ex aquæ cyathis III. præbetur. Lotium enim citra molestiam ducit, & dolores circum locos infestantes euestigio dissoluit. A reliquis autem quæ urinā cient, quamdiu febres perstiterint, in totū abstinendum est. Moti enim ex febrili calore totius corporis humores, per ea quæ efficacius urinā cient, ad uesicam prius afflictam deducuntur.

De ischuria, hoc est, urinæ suppressione. Cap. xxi.  
Ischuria, hoc est, urinæ suppressæ affectionem, etiā ipsum nomen declarat: ægris enim in totum urinā supprimitur ac cohibetur. Atq; id aliquando ob imbecillitatem cōtingit, uesica ea quæ in ipsa continentur arctè cōplecti ac exprimere nō potente, aliquando autem & inferiore meatu à crassis humoribus obturato, aut lapide obstrueto, quandoque autem ob inflammationem aut talem quempiam tumorem meatum angustum reddentem, & perfectè obturantem. Sanguis etiā in grumos concretus in uesica, suppressæ urinæ causa existit: pus item crassum per ipsam uesicam à renibus, aut hepate, aut alio quopiam inferiore membro excretum, urinæ suppressionem operatur. Accidit & sanis sæpe urinam ipsorum cohiberi, aut ob negotiorum importunitatem, aut in concionibus, aut foro iudiciario, aut somnis, si diutius continuerint mictionem. Afficitur enim in his comprehensiuæ & urinam obuoluens uesicæ uis, ex immodica uidelicet repletionē & rēſione: imò quantum amplitudo ipsius uesicæ expleta circumtenditur, tãto angustior seipso fit meatus. Urinam igitur ob inflammationem suppressam uenæ sectione curabimus, fomentis item ac cataplasmatibus alijsq; remedijs adhibitis, quæ iam sæpe ad inflāmata sunt prædicta, & in sequentibus describentur. Si uero sanguinis eruptio præcesserit, coniectare oportet sanguinis grumos suppressæ urinæ causam esse: hi itaq; dissoluendi sunt eo modo, qui de eruptione sanguinis ex uesica dicitur. Quod si lapis sit qui urinā supprimit, & hunc ex loco excutere ac dimouere oportet, quemadmodum de calculosis est prædictum. Si uero crassi humores in causa sint, fomentis & inſersionibus ac cataplasmatibus cura concredenda est: ab his uero quæ urinam cient in totum abstinendum, ueluti in loco de difficultate emittendi urinam in febribus est relatam. Quibus uero citra inflammationem & eruptionem sanguinis, aut aliam quandam ex prædictis causam, urinæ excretio supprimitur, propter ægrum uesicæ sensum contingit id scilicet, quapropter iritando submonere, ac excitare eius actionem oportet, & per inſessus auxiliari, nitroq; ad meatū admoto, aut nitri spuma, aut cimicibus cōtritīs. Quod si ita nō procedat, ad catheterum usum confugiendū, perq; hoc ipsum instrumentū immisissum urinæ prolectandæ. Urinā ducentia nequaquā bibant, ne multitudine eius uesica distendatur. In sanis autem, quū ut dictum est ob negotiorum importunitatem lotiū diutius retentū uesicam debilem reddat, auxiliari oportet ipsi, ambabus manibus supra imum uentrē admotis, ac urina lentè expressa. Ad urinam ægrè prodeuntē, Cucurbitæ semē præmūdatum aqua macerato, quū uero emollitum fuerit, sufficienter aqua affusa terito, percolato, ac succum bibendum præbeto. Vtere, experimento constat.



## De scabiosa uesica.

Cap. xxii.

Quibus uesica scabit, his pruritus tum imi uentris, tum pectinis succedit, inque urinis asperæ & furfuraceæ subsidentiae deferuntur: progrediente uero morbo, uesica exulceratur, accessionesque ad ulcera præscriptæ inducuntur. Nosse igitur operepretiū est, quod non penitus curabile sit malum, conandum tamen ut pro uiribus leniatur. A mordacibus igitur & quæ humores acriores ac falsiores reddunt abstinendum. Exhibenda autē uina dulcia & lac & gallinæ aut hœdorū aut agnellorum carniū iuscula, palmarumque cremor, similago item & amyllum, ac sorbitiones ex his apparatus, pisces molles carne & omnes coctos: & ex oleribus quæcunque urinam quidem subducunt, nihil uero mordax in se habent, uelut est pastinaca probe cocta, crithma, fœniculū, apium, hipposelinum, asparagus, cucumis, & quæcunque eius generis existūt: nam & urinā agentibus mirioribus tamē, uesicam subpurgare oportet: periculum enim est ne fortioribus exulceretur, quod omnino pelus extat. Urinam itaque commodè cient canceri, & pinæ, conchæ, & herinacei marini recentes, & herinacei terrestres caro exiccata, & drachmæ pondere potu accepta. Neque minus comodæ cicadæ censendæ, & uermes terreni tres ex passo potati. Non inconueniens item fœni græci succum cum melle sorbere: id ipsum enim & intestini morsus obtundit, & si ad uesicam procedat, scabiem eius mitigat. idem etiam tragacanthus facit. iucundus est item baccarum myrti cremor cum uino potatus, aut mali cotonei cremor, aut cuiuscunque alterius adstringentis fructus. Hæc autem adstringentia, inquam, pruritus quidem mitigant, affectionem uero nō sanant. Diæta porro optimi succi sit, & per aliquot dies uomant. Sero autem lactis aluus subducatur. Mediocribus etiam exercitijs moderatè utantur. Aliud, quod confestim auxiliatur. Serpillum cum cicere satis diu coquito, percolatumque decoctū bibendum præbero. Oribasij, ad ægrè meiētes. Amomi, cardamomi, floris iunci odorati, cuiusque drach, vi. costi, castorij, myrrhæ, cuiusque drach. iiii. cassiæ drach. i. mellis quantum satis est, datur fabæ Aegyptiæ magnitudine cum uino tēperatum. Aliud eiusdē. Petroselini, baccarum myrti nigrarū, singulorū drac. xvi. seminis apij drac. xxii. ammij drac. viii. nardi celtici dra. iiii. myrrhæ drac. ii. mellis quantum sufficit, datur drac. i. ex aqua mulla, aut uino diluto cyathorū iii. mensura.

*Simplicia remedia ad suppressam ac ægre prodeūtem urinam, si aut eius multitudo, aut crassities in causa sit.*

Cap. xxiii.

Urinam difficulter prodeūtem & suppressam, uiscera herinacei terrestres sanāt exiccata ac suffita ægro undiquaque probe cōfecto. Oportet autem ipsa sale condire ac exiccare. Quin & in potu accepta sicca trita quantum tribus digitis apprehēdi potest ex uino multas urinas cient: carnis item herinacei in sole exiccati drac. i. ex uino datur, & urinā multā citra molestiā educit. Aliud. Aselli qui & millepedæ sub aquario stabulantes uase, egregiè difficultatē emittēdi urinam soluunt, si duo aut tres in modico garo coquantur, ipsumque garum cum aquæ cyathis duobus bibatur.

Aliud. Vermes terrenos tres aut quinque tritos ex uino mulso aut aqua mulla præbero: citò enim urinam ducūt. Forinsecus autē artemisiæ folia cū myr-

rha trita pectini illini, itemque imo uentri, & lotium prodibit. Aliud. Perdicium herbā terito, & affuso oleo feruefacto, atque ita uesicæ imposito. Eandē item herbā cum oleo coquito, ipsaque proiecta lanam oleo imbuīto ac imposito. Aut peponis pulcherri-  
mi pelliculā cum modica ipsius carne imo uentri imposito & colligato, & prodibit urina. Si uero arida sit pellicula, ipsam in aqua macerato, & imposito, ac colligato. Infessus etiam eis ex samfuci maxime decocto apparentur, aut si id non adsit, ex decocto rutæ artemisiæ & althææ.

De dissoluta per paralysem uesica. Cap. xxiiii.

Ex his qui paralyti exolutā uesicam habent, alij quidē præter uoluntatē urinam emittunt, & quanto plus id eis cōtingit, eo minus periculo sunt obnoxij: alij autem lotiū non excernunt, sed eo suppresso uesica & lumbi eis distenduntur similiterque pecten: femora autem tumefacta habēt, & quum nō enīciant lotium subiecta mēbra mortificātur, neque ita longē possunt uiuere. Quum igitur lædi cōtigerit neruos qui ex spinali medulla ad musculum uesicæ collū claudentem deferuntur, exoluto musculo, inuolūtaria urinae excretio contingit. Si uero proprii uesicæ nerui fuerint affecti, nerui aut musculi qui ceruicem uesicæ cōplectuntur, uires suas conseruantes in actione sua ualidi sunt, urina ipsa cohibetur. Cæterū quum cuidā ob casum spina in anteriore partem esset luxata, & inflammatio successisset, tertia die urinae suppressio ei accessit: curauimus autē ipsum, inquit Galenus, ueluti contra inflammationem renitētes. Alius autem quū cecidisset, uertebri retro inuersis & luxatis, præter uoluntatē urina ab eo prodijt, citra tamen uesicæ dolorē, ex quo coniecturam fecimus neruū esse læsum musculi eius qui uesicam claudit, & propterea medellā spinali medullæ adhibuimus, affectis inquam, uertebri. His igitur quibus citra casum urina suppressitur, hoc modo auxiliari oportet. Incessus assidui in fœni græci, seminis lini, althææ, rutæ, ac artemisiæ decoctū cū oleo eis apparētur, & loci ex oleo calido rutaceo, aut sicyonio aut gleucino sæpe per diē & noctē, & maxime post infessus irrigentur & perfundantur: cucurbitæ etiā locis affigendæ, & cataplasmata imponēda ex cruda ordeacea farina, ex uinoque dulci & uino mulso. In aluū autē per clysterē infundatur centaureæ, & radicis cucumeris agrestis decoctū, addito oleo rutaceo & melle. Post sublūtā uero aluum oleum rutaceum sicyonio ammixto infundendum, adiecto aliquando etiam modico castorio. Vnguenta item & medicamēta illitu lassos neruos reficientia, acopa Græci uocant, & supra resolutiones sunt descripta, tum spinæ, tum imo uentri adhibenda. Castorium itemque theriace in potu propinanda. Modicus autem eis cōuenit potus. & uomitus qui pituitam educunt. Post euacuationes sinapismi, tum pectini, tum lumbis cōmodi sunt. A quibus cerata quæ partes mitigent, & malagmata odorata imponantur. Porro urinae suppressionem quæ ob sauciatam spinam, aut casum, aut uertebrae luxationem, aut ob lethales accessionum concursus, suborta est, impossibile est curare, quare cautè remedia adhibere oportet. Cæterū eos qui præter uoluntatē urinā emittunt, curare conuenit roborando per mordacia cataplasmata, & malagmata, & per rubefaciētia ex sinapi apparatus, & arenæ à sole feruefactæ iniectione,



infectione, aquisq; naturalibus, primum quidem calidis, postea etiam frigidis & maxime sulphurelens & bituminosis. Exercendæ etiam ac perfricandæ partes, ueluti in loco de resolutione est prædictum. Urinam autem ducentia nequaquam exhibeantur. Diæta uero calidior & siccior sit, nisi acriores ac mordaciores appareant urinæ.

*Ad eos qui se in somno permingunt. Cap. xxv.*

Affectio hæc pueris maxime contingit: ad eam Archigenes hæc descripsit. Pulmo hœdi moderate assatus, & citra panem largè ad triduum in cibo acceptus, eos qui lectos commingunt, corrigit. Aliud. Leporis cerebellum siccum potatum ex uino lectos permingentes sanat. Aliud. Testiculum leporis siccum in uinum radito, & bibendum dato. Quidam autem leporis cerebrum in uesicam porcina coniectum & assatum, unà cum uesica edendum præbent. Etenim ipsa porcina uesica per se uisita, & in potu exhibitæ, iuuat. Simili modo & ouilla uesica facit: cinerem itaque eius ex posca præbeto. Aliud. Adipem anserinum drachmæ pondere, cum coagulo leporino oboli pondere, & cum polenta subigit, & reclinatis in lectum præbeto. Aliud. Linguae anserinæ coctæ per triduum exhibitæ affectionem sanant. Quidam assatas præbent. Aliud item Archigenis. Myrrhæ, calaminthæ, cuiusq; obolum i. terito, & cum uino odore ante coenam bibenda præbeto. Aliud eiusdem. Raphanidem marinam cotusam urito, eiusq; cinerem totum bibendum præbeto. Aliud. Rutæ præsertim syluestris semen torrefactum duarum drachmarum pondere bibendum præbe. Aliud. Castorij drachm. i. in potu præbe. Quod si acriores & mordaciores sint urine, lactucæ seminis drachm. i. bibendam dato. Aliud. Galli guttur uisum ac tritum cum aqua tepida ieiunis bibendum porrige. Aliud. Gnaphalium aut anthyllin herbas quibus pro tomēto & strato usus est eger, easq; perminxit, siccato, urito, & cum potu exhibeto. Cæterum in somno pudendum illinant ex cimolia cum perdicij succo. Circumlignent etiam femora infra inguina, quatuor digitorum distantia, atque hoc per uiscis uirgas. Porro ubi sitierint, omnino amplius dormiant: multus enim potus affectioni incommodus existit. Atqui si diuturnum & inueteratum sit malum, uelut eos qui præter uoluntatem ob resolutionem uesicæ urinam emittunt, curato. Differunt autem hi ab illis, in eo, quod his per somnum saltem hæc accessio cōtingit: illi uero quibus ob musculi colli uesicæ resolutionem hoc accidit, etiam dum uigilant, eodem modo afficiuntur.

*De inflammatione uesicæ: Ruffi. Cap. xxvi.*

Morborum qui circa uesicam oboriuntur, grauissimus & maxime mortalis inflammatio existit. Consequuntur autem ægros communia inflammationis signa. Febri acuta infestantur, & uigilant, & delirantes aliena loquuntur, & uomunt biliosa pura, & lotium eicere non possunt: durus fit pecten & pubes cum uehementi dolore, & egerendi appetentiæ uelut in tenesmo fieri solent: quod uero egeritur tenue est, & subsidentiā non habet. aliquando & inflationes sequuntur, & aluus adstricta est, intestino recto ab inflammatione uesicæ compresso. His itaque si nihil aliud prohibeat, uenam citra cunctationem in principio morbi secato, & pauco cibo adseruato,

& aquæ potu. locos uero oleo in quo anethum, semen lini, aliquando etiam ruta & althea incocta sint irrigato. In decoctum item seminis lini & fœni græci insidere facito, odorato aliquo semine, ueluti petroselino, dauco, aniso, simul incocto. Admoneaturq; æger quo in aqua decocti desidens mingat: uesica enim non satis robusta est ad amplectendam & expellendam urinam, igitur ipsum ægrum aut aliquem ex adstantibus scite ac placide pectinē premere oportet, neque id ultra modum ne dolor inde intendatur. Est autem inuentum hoc Philumeni, qui hominem hoc modo à se tractatum urinam eiecisse testatur. Cæterum primum omnium aluus leni infuso subluatur, & post stercoreum educationem, oleum quo supra ad irrigationem usus es, in intestinum solatij & leniendi doloris gratia injiciatur. Præstat autem & papaueris calicem simul cum oleo incoquere, & adipem anserinum aut gallinaceum. recētem in ipso oleo eliquatum simul infundere. Ego uero, inquit Rufus, uehementioribus existentibus doloribus opium magnitudinē erui cū modica myrrha & croco lanæ illitum, in podicem indidi, & statim dolores quieuerunt, confestimq; æger obdormiit. Post clysterem & infusa, in seculisq; & irrigationes, etiam cataplasmatibus utendum ex cruda ordeacea farina, capitibus papaueris, & hyoscyami folijs, ac modico mandragoræ succo adiectis. Fomenta autē fiant per aquam & oleum in uesicis bubulis semiplenis admodum, aut polentam calidam in sacculis aut detritæ uestis paniculis ligato, & pro fotu admovento. Post cataplasmata, etiam cerata imponantur, ex œsypo, & cera, & sicyonio, aut gleucino oleo cum castorio apparata. Quod si neq; sic mali tumultus cesset, cucurbitam affigemus locis unà cum scarificatione. Ceterum ubi euidentis declinatio apparuerit, ad emplastra & malagmata transeundum est. Porro catheteris immisionem ad inflamatam uesicam in uiro quidem nō probo: etenim quum laboriose immitti queat, dolores exacuit, & inflammationem auget. uerum mulieri ipsum adhibere nihil absurdum: breuis enim in ipsis urinæ meatus existit, & recta situs, ut citra dolorem hoc molimen admittat. Si uero urinæ suppressæ periculum urgeat, necessario ad catheteris usum confugimus, non quod affectionis molestiam tollat, sed ut urgentem urinæ suppressionem corrigat, & à præcipiti periculo liberet. Post urinæ profectionem rursus ad eadem mitigatiua auxilia accedendum, usquequo inflammatio soluatur, aut suppuretur. Solent autem sæpe repente inflammatio solui, erysipelate iuxta cutis superficiem oborto, & permanente, neque rursus intro recurrente: imò & lotio multo eiecto, sæpe id eadem iudicatione liberum hominem reliquit. nihilo minus tamen etiam si hæc appareant, iisdem remedijs insistere oportet, quandoquidem ut plurimum tensione aliqua facta ac oborta, continuæ exacerbationes fiunt, & mali constitutio diuturna. At uero ubi periculosa accessiones cessarint, & morbi constitutio iam fuerit inueterata, ad unguenta quæ humores ex profundo euocant ac transferunt, metasyncritica Græci appellant, & ad malagmata transeundum est, quæ cutem rubefacere possunt.

*De sanguinis ex uesica eruptione, & de grumis eiusdem.*

*Cap. xxvii.*

Est



Est alius acutus uesicæ morbus, rumpitur autem uena in ipsa, & partim quidem sanguinem foras mittit, partim uero intus cōdensatur. Sanguine autem cōdensato, & grumis coactis, eger animo linquitur & pallefcit, pulsusq; paruos, obscuros, & dēfos habet, mœrore angitur, refrigeratur, ac uiribus destituitur. quum uero grumus aliquando in urinarū meatum inciderit, is etiā lotij excretionem supprimit. uerum omnino difficilioris curæ cēsenda est eruptio ex erosione facta. Quare quā celerrimē uelut etiā in alijs sanguinis eruptionibus auxiliū ferre oportet, extremas partes constringēdo, & pectinē ex spongijs posca imbutis irrigando. Quod si inflātionē suspectam habes, lanas succidas uino & rosaceo madidas imposito, Cæterū ob prædictum periculū, compendiarīam curā facere conuenit, & nequaquā rem differre: & siquidē nihil prohibeat, uenā secare partita sanguinis detractio, ut eo modo sepe & paulatim sanguis detractus reuellatur: ægri uero in decumbēdo sursum uersus collocētur, & coxendicibus ipsorum leuandis & simul refrigerandis spongiæ posca imbutæ subdantur, aut pelles substernantur: summē autē profunt urgente malo cucurbitulæ ilijs ac lumbis affixæ. Post irrigationes autē cataplasmatibus utendum sanguinariis, rubo, plantagine, perdicio, malipunci floribus, lentisci & myrti folijs: horū unumquodq; cum polentæ flore pro cataplasmate imponendū est, & frequenter priusquām tepescat, altero imposito, auferendū. Optimē etiā faciunt ex palmis acacia & hypocisthide ac alumine apparata cataplasmata, & quæ his similia existunt. Summē autē cinis linteoli usti auxiliatur, si palmis ammisceatur, aut alicui ex epithematis infarciatur. Spongia item pice liquida imbuta, usta & epithematis ammixta mirificē sanguinis eruptiones sistit. Ceterū detritæ uestis panniculus ustus, & spongia usta, non solū forinsecus locis apposita, sed & cū plantaginis, aut sanguinariæ, aut herbæ sideritidis succo uesicæ infusa, maximopere auxiliantur. Oportet autē infusi fistulam aliās catheteri similem esse, uerū ex summo utriculū aut uesicam adaptatā habere. Quandoq; & sedī hæc infusa profunt. Inseffus autē conueniunt ex consimili materia constructi: nam & posca & lentisci decoctum, itemq; rubi & similitum eis conuenit. Danda autē & in potu pharmaca educationi sanguinis apta simplicia, tum composita, uelut sunt rheon pōticum tenuissimē tritum, & loti arboris scobes & ramenta, præsertim corticis eiusdem, & glycyldes aut pæoniæ grana rubra xii. terra samia, & lemnia, sphragis appellata, hippuris, centaureæ magnæ radix, thuris cortex, & similia. Optimum uero & hoc est, quo Archigenes usus est. Ad sanguinem mingentes, Archigeni. Aluminis scissilis drachm. i. gummi obolum i. tragacanthæ drach. ii. in passo diluito, & in pastillos redigito, & ex eis obol. ii. cū passo præbeto. Ad sanguinis uesica eruptionem Asclepiadæ. Balaustrij, acaciæ, succi hypocisthidis, cuiusq; drac. iiii. aluminis scissi drac. ii. in pastillos cum aqua digerito, & obolos iii. cū uini myrticæ cyathis iii. exhibeto. Porrò quibus sanguis in uesica in grumos cogitur, primum tentandū est ut pharmacis diffundatur: artemisia igitur in potu præbenda est, & elichrysum, & cyrenaicus succus, aut laser purū, aut conyza præsertim parua, absinthiū, rapha-

ni semen, rubi succus, betæ succus, leporis coagulū, aut hœdi, unumquodq; cū aceto mulso. Ego autem, inquit Galenus, pharmacum eis præbui bibendum quod lapidē confringit ex aceto mulso: imò ipsum per se acetū mulsum exhibui, & quibusdā ipsorum grumi dissoluti paulatim per lorium prodierunt. Quod si hoc modo nihil proficias, sed urina supprimitur, necessitatē inducet catheteris adhibendi, per quē ubi urinas eduxerimus, rursus prædicta in potu exhibemus præstātia ad grumorum coactorū dissolutionē, si uero neq; sic grumi dissoluātur, intercape dinem inter anū & pudendū perinæon Græcis dictā infernē dissecare oportet, quēadmodū in calculosa uesica est prædictum, & eductis grumis de cætero uelut ad sanguinis eruptionē uesicæ opitulabimur. ubi uero sanguinis eruptio cessarit, uelut alia ulcera curato. At uero sanguinis ex cole eruptiones, epithemata colē refrigeratā, & quoddam ex prædictis infusum sanant.

*Quæ tubercula in uesica maturescere oportet.*

Cap. xxviii.

Optimum quidē est in principio conari quo tubercula dissoluantur, ut ne in pus permutentur: si uero id citō fieri nō possit, auxiliorū usu ea matura facere oportet, quæ suprā renibus cataplasmatibus modo dixi imponēda, atq; amplius adhuc nasturtio cū erui farina & melle, & colūbino stercore cū caricis imposito. Fomētis autē & alijs remedijs utendū, quemadmodū istic est prædictum. Vt plurimum uero circa uesicæ collū suppurantur, quapropter etiā urinae stitilicidium amplius inducūt, suppuratur & in uicinis sedi locis, & magis recremēti egestionē impediunt. Suppuratur etiā circa pectinē utrinq;: uerum non difficile est ea cōiectare, tum loci dolore, tū grauitate, atque ipso adeo tactu: duriora enim & calidiora sunt corpora quæ suppurationē incurrent. Ex tuberculis etiā quædam foras uertuntur ad sedē, quædam quocūq; cōtigerit defluxus. Periculosa igitur & hæc sunt ac omnino letalia, periculosiora autem sunt quæ intus rumpuntur.

*De uesica ulceribus, Rufi.*

Cap. xxi.

Si uesica sit exulcerata, aut propter abscessū, aut ob tuberculum quod præcessit, aut ex ruptura, aut ob fluxionis erosionē, aut ob aliā quamcūq; causam: ægros dolor acutus uesicæ omni quidē tempore comitatur, maximē uero tempore mictionis & excretionis puris, & si quidē sordida fuerint ulcera, feculenta simul excernuntur, & mucosa, & quæ crassam subsidentiā ad modū farinæ habent: aliquādo autē & pelliculæ tenues ad modū foliorū & lamiarum cū urina excernuntur. Si uero serpendo depascāt ulcera, subcructa excernuntur & saniosa ac foetētia. Ad hæc accedūt urinae emittendæ difficultas, & pudendi arrectio ac petulātia, & dolor non solū quū urinæ meatus fuerit affectus, sed & quum tale quippiā in profundo existit. Cognoscetur autē num in profundo, siue iuxta urinæ meatū sit affectio, ex eo quod si in amplitudine sua uesica sit affecta, dolor circa pubem cōsequatur: Si uero iuxta collū uesicæ ulcera constant, tēpore mictionis tantū & maximē ubi mingere inceperint ac cessauerint, dolor sentitur, atq; id amplius cōtingit, si urinæ sint acriores. Omnes quidē igitur assidue decubunt & neq; erecti stare possunt, neq; reclinati quiescunt. ab indefinente dolore, febribus, uigilijs



uigilijs, & colliquatione perimuntur: alij quidē citius, alij tardius. Dolores enim acuti sunt & ulcera iniucunda, partim quod urina assidue ea contingat, partim quod urina natura acris existat, neque quauis plurima excernatur, uniuersa uesica euacuari possit: sed semper ex urina quippiam in ipsa relinquitur, quod continuē ulcera contingit: semperque uesica lortio plena existit. etenim quā multitudo eius euacuatur, uesica contrahitur, & quod in ea relictū est quātumuis modicū, id ipsum omnes eius partes contingit, & quantū rursus repletur, paulatim simul extenditur. Propter hoc ipsum itaque, & quod neruosa est, insanabilia ut plurimū eius ulcera existūt: periculosa autē sunt quæ ex erosione orta sunt, & modica spes est ea restaurādi. Attamen quum sæpe etiam præter expectationem quædā eueniant, cura est agrediēda, per quam si nihil aliud, certe accessorij dolores minuentur. Primum igitur persuadendus est æger ut decumbat, & in lecto quietem toleret, idque maximē si febres simul adsint: deinde remedia febribus intermittentibus adhibēda. maximum uero hic fuerit lactis potus, neque scio an post ullum aliud remedium secundo saltem loco id sit habendum: nam & asperitates lenit, & ulcerationes eluit, aliasque affectiones extergit: reliqua uero diæta frugi sit & comoda, ut ne urina acris fies, mordeat ac iritet ulcera. Per pharmaca etiā consolari ægrū oportet, quæ supernē pectinem amplectantur, & si quidem cū inflammatione ex ulceratio consistat, cataplasmata ex lini semine, & foeno græco apta erūt, & reliqua quæ inflammationē soluere possunt: infusiones itē & fomēta ex oleo & per spōgias. quin & cerata imponēda ex œsypo, butyro, adipe anserino, & styrace apparatus, & ceratum myrteum, quod pro cerusa, samiam terram, aut lemniam, sphragidem appellatam, aut minium sinopicum, aut diphryges habet ammixtū. Quod si loci uolētius coarctentur, nardinum quidem sit ceratum. maluæ autē radices probē in aqua mulsa coctæ, deinde tritæ, in ceratum infarciantur, aut cerata ex meliloto & foeno græco similiter adhibeantur, aut quod tetrapharmacum, itemque quod enneapharmacum inscribitur. laxationem enim mali faciunt, uerum his omnibus aliquid satis amplum de styrace addendum. Porro si exulceratio pascendo serpat, epithematis subadstringentibus utendum est, atque his quidem calidis, ut ob calorem quidem partes circumdolitantes leniendo iuuent, ob potestatem autem ipsorum nomen uicinos locos appræhendere prohibeant. Sylua horum sæpe iam relata est, utpote in palmis, uuis pasis, gallis, malicorio, alumine, acacia, hypocisthide, & similibus sita. ex his singula aut palmis excipiūtur, aut cataplasmatibus ex loliacea farina. decoctio autem sit in posca. Utendum etiam pharmaci per catheterem infusione, ita ut in inflammatis & exasperatis lac recēs multum infundatur, aut rosaceū optimum recēs tepefactum. Si uero nihil horum adsit, aqua dulcissima tepida assidue infundenda, mordacitatis tempore instante: in intestinum quoque per sedem ptisanæ succus infundendus est, & seminis lini succus, & cucumeris semē decorticatum tritum cum lacte, rosaceo oleo ad singula instillato. Cæterum ubi clysterem adhibere uelis ei qui uesicam habeat affectam, non supinum ipsum decumbere oportet: non enim permittunt ue-

sicæ infusum intrā transire, utpote induratae & graues factæ, & intestino incumbētes, uerum in genua pronum reclinare hominem oportet, atque ita infusum adhibere. In hac enim situs figura uesicæ secēdunt & intestinum laxant, quo infusum assumere possit. Frequenter autem & in aquam calidam desideant ægri, & in decoctiones relaxantes: nam hæc mitigant dolores. At uero ubi ulcera iam pascendo proserpant, per catheterem injicienda sunt quæ depurationem sistere possunt. Multa autem eius generis sunt, sed plurimis itemque nobis familiare est, ex charta siccum pharmacum, quod cum rosaceo infundere oportet. Facit & Musæ pastillus, cum passo credico tepidus infusus. Quod si uero sordida sint ulcera, pharmaca infundenda sunt, quæ repurgandi uim habent: uelut est Epigoni chlora, siue uiridis compositio: item quæ Iſis appellatur, multo rosaceo diluta, aut ea quæ ex herbis constat, aut huiusmodi quæpiam alia. Si uero acrimonia consequatur & mordacitas, lac recens multum cum optimo amylo infundatur, aut pompholyx pluribus aquis elota & exiccata, atque deinde cum lacte diluta, aut collyrium Aster inscriptū, aut quod Cynariū appellatur: aut pastillus ex physalide, aut panchrestus, à comoditate dictus, qui somnū inducit. Quum uero repurgata fuerint ulcera, adiuuare oportet quo ad cicatricem perducatur, atque id per infusus adstringētes & eiusdem facultatis epithemata. Emplastrū igitur ex ouis comodē superponitur, & ex hordeo usto, & ex cadmia, tripla eorum parte cum cerato myrteo, aut rosaceo cōtemperata. Si uero magis fluxione affectio infestetur, post repurgationē ulcerum, emplastro ex salicibus, aut icestij, aut ex lolio utendū est, donec in totum ad cicatricem perducantur. Atqui nosse oportet repretium est, quod in quibusdam ob solidam cicatricem inductam, seminis meatus excæcantur, & uis generandi perditur: ita ut appetentiam quidem habeant ad coeundum, nihil autem in totum seminis emittant, atque hæc affectio penitus incurabilis existit. Cæterum si ad multum tempus exulceratio dureret, quēadmodum in plerisque fieri consuevit, tunc sanē & exacerbationes & interualla siue remissiones ægros appræhendunt: quare in exacerbationibus quidem cataplasmata, & fomenta & irrigamenta leniendi uim habentia adhibeantur. remissionis uero tempore ductu ad destruendum malum apto utendum est. Pecten igitur iuxta membranæ peritonæi appellatæ, locum per malagmatum ad hanc rem destinatorum impositionem rubefiat: sunt autem huius facultatis, id quod ex lauri baccis constat, & epithema uiride appellatum, & similia, maximē uero quæ ad calculosos renes sunt præscripta, quin & sinapismo utēdum, & diæta uiribus reparandis apta est constituēda. Quod si non mansuescant, & diutius durent affectionis dispositiones, crustas circa pectinem & peritonæum membranam infligere oportet, aut per pharmaca, aut per ferrū, sinereque ut per multum tempus ulcera se per effluxionem repurgent. Neque uero ineptē pharmaca dolorem leuantia in potu exhibueris, si uehementes insistent dolores. Et sanē quidam iam papaueris succum erui magnitudine cum croco & myrrha lacte dissolutis in podicem indiderūt, aut cerato ex adipe anserino apparatus permixtum & lana exceptum eodem modo intru-



intruserunt, scimusque eos non uulgarem commoditatem inde consequutos. Assumantur etiam quae per os exhibentur, si quidem urgeat urinae emittendae difficultas: ueluti est papaueris albi tosti semen, quod drachmae pondere tritum in tres cyathos decocti floris iunci odorati, aut calami indicii, aut radices dulcis inspergitur & exhibetur: his fortiora sunt meon, phu, acorum, daucus. Plurimum autem exulcerationis dolorē mitigat hoc semen cucumeris granorum triginta, nuces pineas duodecim, amygdalas amaras decorticas quinque, croci quantum ad colorandum satis est, quotidie ieiunus accipiat cum lacte recens mulcto, aut passo protropo, aut uino, aut sapa, quod si lenius reddere uelis, pro nucibus pineis maluae semen pari modo recte conieceris. minore item molestia ab egro procedet urina, si tragacanthus praedictis commisceatur. Probè autem exulcerationē iuuat uerbenacae rectae folia cum passo potata, in duobus cyathis dissoluta, quo facillè potu accipi possint. Ad urinae difficultatē quidem & ad ipsam exulcerationem pariter cōueniunt, papaueris albi semen, amyllum, myrti baccae nigrae, singulorum drachmae quatuor, croci oui assati dimidiū, uncto, & drach. i. ex passo dato. Quod si multum pus efferatur, ferulae ustae drach. i. ex passo diluto exhibita, ipsum repurgat. Deinde autem singulis diebus cucumeris semē decortatum, & crocum, obolorum ii. pōdere, & nuces pineas pityidas appellatas desquamatas v. & anisi obolos iii. simul trita cum uino mulso ex calida aqua temperato, exhibeto. Cyphi item & cyphoides ad hepatis ulcerationes praescripta, in paucis ad eō diebus uesicę ulcera per sanare possunt. Ego autem, inquit Archigenes, ad uetera ulcera hoc usus sum, neque opus fuit mihi pharmaco magis uariiegato. Trixaginis, chamaepityos, cuiusque drach. xxi. asari dra. vii. piperis albi drach. vii. cinamomi drach. i. quam tenuissimè terito, & unita simul reponito. Ego, inquit, ex eo cochlearia ii. cum passo diluto praebeto. Quum uero morsus contingit ulcerosus, amyli cochlearijs duobus, & seminis cucumeris granis xv. adiectis, quod uolui sum assequutus. Suffecerint quidem igitur uolentibus bona methodo remedijs uti, haec à Rufo & Archigene praescripta pharmaca. Apponā tamen & alia cōsimilia itidem à ueteribus tradita. Sint autem praescripta eorum quae describentur quod ad usum pertinet exēpla. Andromachi, ad ulcera renum & uesicae. Seminis lini, seminis papaueris albi, seminis cucumeris repurgati, tragacanthi, singulorum drach. ii. amyli drach. iii. cum aqua conterito, & in pastillos nucis ponticae magnitudine redigito: ex eisq; drach. i. cū passo diluto dato. Asclepiades autem & Eras hoc modo apparant ad assiduos morsus, & sanguinis ex uesica eruptiones. Seminis lini torrefacti, seminis cucumeris repurgati, seminis papaueris albi, tragacanthi, cuiusq; drach. vi. passī quantū satis est, apparato, & ponticę nucis magnitudine cum passī diluti cyathis ii. praebeto. Ad sanguinis eruptiones, cum aqua dato. Oribasij, ad uesicę ulcera. Profunt & his quidē quae ad renes affectos sunt descripta, propriè autem in potu accepta, portulacae succus cum passo, graminis decoctū, lac, uinum dulce, cupressi coma cum myrrha, erui magnitudine. Ad uesicę dolores, Seminis lini cochlearium i. ex passo, sesamum, seminis hormini drach. i.

oxychoeni semen, loti arboris bacca, seminis papaueris drach. i. cum aqua mulsa, floris cotoneorum decoctum. Eiusdem, ad renū & uesicę exulcerationem. Nucum pinearum heminā italicam, physalidas numero x. nuces iuglandes octo, alij x. habent, croci drachmas viii. seminis rumicis drachm. viii. opij drach. iii. seminis cucumeris decorticati drach. iii. seminis apij drach. iii. mellis cocti quantum satis est. Datur obolorum iii. pondere. Aliud, Andromachi, ad uesicam exulceratam & urinae emittendae difficultatem. Nuces pineas xxx. amygdalas premundatas uistas viii. carnes palmarū xxxv. tragacanthi drachmas quatuor, succi radices dulcis drachm. ii. croci obolum i. myrrhae tantundem. Excipe passo, ac utere ut dictum est. Aliud, ad uesicę ulcera & inflammationes. Nuces pineas xx. seminis cucumeris grana xx. amyli obolos iii. spicae nardi drach. i. seminis apij drach. ii. Spica & apij in sextario aque uno coquuntur, deinde ad decoctū praedicta miscetur. dantur cyathi ii. ad uehementes morsus calesacti. Aliud. Amyli drach. viii. baccarū myrti nigrarū maturarū carunculæ dra. viii. seminis papaueris dra. xvi. passī protropi quantū satis est, apparato, & nucis ponticae magnitudine ex passo dato. Pastillus ex physalidibus, ut tradit Eras. ualeat ad renū & uesicę affectiones, etiā si pus aut sanguis, aut corpuscula mucosa, aut fibris similia, aut crassa, per urinā exeāt. Facit & ad scabiosas affectiones, & stilitidū urinae, & ulcerationes aegrę cicatricē recipiētes: idem & bibitur, & in uesicā inijcitur. Granorū herbe physalidis numero xxv. sunt autem halicacabo similia, paulo tamē maiora: amygdalarum thasiarū decorticarum, croci, nucum pinearum tostarum, seminis rumicis hortensis desquamati, singulorum drachm. iii. seminis cicutae, opij, seminis foeniculi cuiusq; drach. iii. seminis hyoscyami albi, seminis apij, cuiusq; drach. vi. seminis cucumeris satiuī desquamati drach. x. Excipe passo, & drach. i. praebe febre carentibus, cum passī diluti cyathis iii. febricitantibus cum aqua. Caeterum si uehementes fuerint dolores, etiam ante somnum praebe. Per catheterē item inijce. Vtere autem ut efficacissimo. Quidam etiā nucis ponticae tostae drach. iii. addunt. Aliud, ad omnem renum & uesicę exulcerationem, omnemq; emittendi urinā difficultatē, & calculi affectionem. Portulacam exuccato, succumq; resiccato, & in pastillos redigito, drachmamq; i. cum aqua calida potandam praebeto. Pastillus ex tragematis siue bellarijs, ad renum & uesicę exulcerationes. Vuarum passarum albarū mundatarum bessem, nucū pinearum sextantem, seminis cucumeris decorticati, baccarū myrti exacinarū, amygdalarum amararum delibratarū, aut dulcium, amyli, palmarū pinguiū, seminis apij, singulorum sextantem, seminis papaueris albi drach. iii. tragacanthi, croci, radices dulcis, cuiusq; drach. iii. myrrhae drach. ii. Redige in pastillos cū cretico passo. Exhibe drach. i. cum passī cyathis ii. Aliud, experimento constans, Olympij sophistae, ad exulceratam uesicam. Rhei pontici drachm. iii. seminis cucumeris decorticati drachm. iii. seminis hyoscyami drachm. ii. seminis maluae drachmas quinque, nucum pinearum tostarum drach. vi. seminis apij drachm. i. amygdalas amaras delibratas lxx. cum sapa subige, & ponticae nucis magnitudine



gnitudine præbe, cum passî diluti cyathis tribus.

Aſclepiadæ pharmacum accommodatum, ex cuius usu multos renum affectione apprehensos in totum liberatos ſcimus. Oportet autem ad multos dies pharmaco hoc uti. Sanat etiam ueſicæ affectiones: datur & calculoſis, remedio eſt & colicis. Habet autem hoc modo. Nucum ponticarum repurgatarum, amygdalarum amararum mundatarum, ſeminis cucumeris depurati, ſeminis caroi, ſingulorū drach. III. ſeminis papaueris albi, aut ſi non adſit, cicutæ drachm. VI. croci, ſeminis maluæ, opij, cuiuſq; drachm. VI. ſeminis hyoſcyami albi drach. XII. ſeminis apij drachm. XII. excipe melle cocto & informa paſtillos, datoq; obolos III. cum aquæ muſcæ cyathis tribus. Aliud, ad exulcerationes renum & ueſicæ. Damafoni drachmas duas, palmarum drach. X. nucum pinearum drach. VIII. ſeminis cucumeris drach. IIII. aniſi drach. II. amygdalarum amararum drachmas II. croci drachmā unam, dato obolos VII. ieiunis cum paſſo diluto. Quod ſi damafonium nō adſit, eryngium conijce. Vtere etiam Xenophili antidoto ad calculoſos capite XIII. præſcripta, & ſimilibus quæ ad exulceratam ueſicam itemq; renes ualent, unā cum hoc quod arenulæ minguntur.

*Dieta ex libris Archigenis.*

Cap. XXX.

Vitet æger omnem deſaſſationem, & lōgiorem ac efferuentem geſtationem, maximè uero quæ fit in equo, uigiliisq; & omnem uehementem concitationem, & ecōuerſo perpetuum ocium, & balneorum aſſiduitatem: amplius autem & cruditates, & ſupra quā conuenit repletiones, & ne quid crudum in cibo accipiat, & neque quod ægrè concoquitur, aut facile corrumpitur, aut inflationes parit, ſumat: maximè tamen uitet quæ facile aceſcunt, & quæ craſſi humoris ſunt, quæ urinam cient, quæ ægrè ſecernuntur, quæ difficulter infernè excernuntur, & quæ amplius uentrem perturbant. item omnia acria & feruentia, & quæ accepta amplius adſtringunt, & magis reſiccant, & non nutriunt, & quæ ſtomacho inimica ſunt, & quæcunq; bilem aut pituitam præcipuè gignere poſſunt, quare & multus potus, & meracior potus, ac ieiunus potus, omnes incommodi exiſtunt, & uice uerſa longa ſitis, & inedia, & eduliorum uarietates, & ſuperflua condimenta. omne item nidoſum & graueolens & putridum & crudum præſertim olus incommodum. Hæc enim omnia tum renū, tum ueſicæ ulceribus inimica ſunt, atqui ſi quando appetitui gratificari uelimus, lactuæ cauliculos, aut ſerin, cruda & cocta minore offeſione ſumere poſſunt. A placentis uero & alijs pinguibus abſtinere oportet, & à pleriq; bellarijs. Vua paſſa enim non incommoda eſt, & nuce pineæ recentes duabus aquis maceratæ, & amygdalæ uirides quidem, maturæ tamen & probè mūdātæ, ſiccæ uero non uetustæ, ſed præmaceratæ & decorticatæ, licet & piſtacium ſumere, melius quidem uiride, aut ſi id nō adſit, madefactum, minimè uero uetuſtum. Thebaica autem palma caryotus qui os non habet, ſiue id à natura, ſiue arte ei contigit, acerbior eſt, & ſtomachi & renū & ueſicæ debilitati conuenit. Cæterū genera quidem reliquorū tandem deſcribātur: ſpeciatim autem panis ſic recens clibanites decenter apparatus. Ex uolucris montanæ & teneræ carnē habentes & nō antiquæ. Ex pedestribus conuenien-

tiores ſunt hœdorū extremitates. Ex aquatilibus ad renum & ueſicæ ulcera magis congruunt, apua marina minima aſſiduè comēſta, non inepti ſunt etiam aſelli parui, & qui gobij appellātur: extergunt item ulcera gāmarus, locuſta, & aliquantulū etiam ſquilla, cancer autē fluuialis uelut remediū præbeat, & herinacius recens familiariter permittatur: ex cōchis uero & peloridibus parū quiddā uarietatis gratia detur. Pro liquamine autē intinctus ac uoluptatis gratia acetū modicum, & quā minimū gari albi & boni concedendū. Parcè autem utendū eſt pipere & laſeris ſucco, naſturtioq; & ſinapi, ab eruca uero in totum abſtinendū, nam & uenerē excitat: coitus autē omnibus renum & ueſicæ affectionibus inſenſiſſimus eſt, & maximè ſenibus ac natura imbecillioribus. Omnia porrò quæ in cibo ſumuntur, mediocris multitudinis ſint, etiam ſi utilia eſſe ferātur. Aqua pluuiā nō corrupta omnino melior eſt: ex alijs uero quæ nullam omnino guſtanti qualitatē exhibet, exquiratur. A frigida potu in totū abſtinendum: frigidum enim ulceribus inimicū. Balinei uero rarus ſit uſus: quo uero aliquādo appetentiæ gratificemur, & laſitudinē reſoueamus, permittatur. Cæterū naturales aquas experiri non inutile fuerit: aluminofas uidelicet, ſulphurulentas, & conſimiles, quales ſunt albulæ, & lactei temperamētū atq; teporis. Frigida etiā lauare ac iritare cōmodiſſimum eſt: ſupra naturam enim ulcerationes ægrè ſanabiles, tū externas, tum internas deſtruit. De albularū aquarum potu. Conferent itaq; aquæ albulæ ſi adſint, & cōſimiles poſt matutinā deambulationem, trium heminarum meſura prima die potatæ, deinde uſq; ad quinq; & ſex heminas perueniendū. Ad hoc enim quod inteſtinum eluunt, aër etiā ipſarum fuliginofus ueſicam ad doloris ſenſum percipiendū hebetat, & humoribus ſegregatis puriorem ac lucidiorē ſanguinis uaporē reddit. quin & ipſæ aquæ ulcera utiliter repurgant, & cum uoluptate infra ſubeūt, atq; adeo nihil ægro ſanando efficacius depræhendere poſſis: hora autem calidior ad eas accipiendas apta eſt. Quod ſi nō adſit huiusmodi aquarum qualitas, adſint autē aliæ nullam guſtui qualitatem exhibentes, ſed latè ſe ad guſtum diſfundentes, hæ ipſæ reliquis meliores ſunt cenſendæ, & proximo ab eis loco bituminofæ. Nitroſarum etiā ſi adſint & ſalſarū experimentum ſumere prodeſt: maiorē enim quā credi poteſt ſæpe ex his ſuccedentem uidi effectum. Intercapedine autē & diſtantiā à balneo facta, aridarum rerum comēſtio primum utilis eſt, niſi ſitis ſimul adſit: tūc enim aqua calida modica ſitis extingueda eſt, aut aliquo uino dulciore. Adſit autem & cœnanthites & myrtites uinum: nam ea poſt balnea & exercitia utiliter ad ulcera delabuntur.

*De ueſicæ fluxione, & his quæ capillorum forma*

*exiunt cum urina, Archigenis.*

Cap. XXXI.

Fit aliquando & fluxio circa ueſicā, ut aliquando quidā de mucoſa, & folijs ac laminis ſimilia, itemq; craſſa excernantur, & aut crebro, aut poſt temporis morā lotia reddantur: aliquando autem aquoſa & tenuia. Nouimus autem quosdā etiam pilos per lotium eiſſe, modo inuicem perplexos, modo ſimplices, & aliquando ualde longos, aliquando breues, atq; eos omnes à fluxione productos. Hæc ſanè Archigenes. Galenus autem de hoc ita inquit: Capillis ſimilia

G

etiam



etiam Hippocrates cum urina prodixisse uidit, & nos sanè uidimus quandoque palmi longitudine, quandoque etiam longiora aut breuiora: ex colore autem & compage persuasus sum, ex crasso & uiscoso humore calefacto & resiccato in uenis eos coactos esse: quare quum primum uidissem, per urinam scientia pharmaca medelam futuram speraui, atque ita ferè omnibus contigit. Cæterum quibus hæc affectio accidit, nulla renalis mali accessione, neque antea neque postea sunt uexati, postquam uidelicet per urinam ducenda pharmaca sunt curati. Archigenes autem ad hæc inquit, fluxiones ex locis remouere oportet, uniuersique corporis habitum, maximè uero circa renes & uesicam locos uendicare atque corroborare.

*De priapismo & satyriasi: Galeni. Cap. xxxii.*

Priapismus, tentigo est membri pudendi, & auctio in longum & spissum citra rei ueneræ appetentiam ex caliditate quadam acquisiuita cum inflammatione quadam & dolore locorum consistens. Appellationem autè accepit priapismus à Priapo uidelicet Satyro: tale enim à natura habentem pudendum homines fingunt & pingunt. Fit autem affectio aut ob dilatata uenarum ac arteriarum in pudendo ora, aut flatu uaporoso iuxta antrosum neruū, ipsum inquam pudendum, oborto. Mihi autè, inquit Galenus, propter utrumque fieri uidetur, sæpius tamen ad dilatata uenarum ora consequi. Aliquando autem propter abstinentiam à rebus ueneris: quidam hac affectione apprehenduntur, atque hoc ipsum eis qui multo semine abundant, simulque præter consuetudinem se abstinere, euenit, quum non per frequens & multum exercitium sanguinis abundantiam discusserint. maximè uero hoc illis contingit, qui rebus quidem ueneris opus habent, in imaginationem autem ipsarum perueniunt per uisiones quæ ipsos in rerum uenerarum recordationem impellere possunt. Cæterum dolores eis contingunt, quales tetanici habent, & hi qui reliquis membris distenduntur: inflatum enim & distentum pudendum conuulsionis modo afficitur, & ex præcipiti hoc modo affecti pereunt, nisi confestim eis auxilium feratur, quum uero moriuntur, uentre inflantur, & frigidum exudant, id quod & eis euenit qui alijs conuulsionis modis perimuntur. Propter dolores igitur & inflammationes uenam secare statim à principio conuenit ab affectione prehensos, & in inedia adseruare usque ad dies tres, irrigareque pectinem & coxendices unà cum pudendo ex lanis succidis uino & oleo imbutis: sicut itè premere, & aluum obturatam euacuare non acrimium clysteri, ne inflammationes exacerbentur. Cibum autem exhibere frumentaceum paucum atque omnino nihil inflantem, & in aquæ potu continere. Quod si diutius duret affectio, etiam cucurbitæ cum scarificatione affigendæ sunt: & si amplius sanguinis multitudo adiacere uideatur, hirudines adhibendæ in ipsum locum: cataplasmata uero imponenda sunt ex cruda ordeacea farina. Optimum etiā fuerit aluum submollire per betæ & maluæ decoctum pauco mercurialis succo admixto. Concharum item decoctum in potu exhibendum: ab efficiatioribus autem purgantibus pharmacis in totum abstinendum. Cauenda etiam quæ urinæ ciendæ facultatem habent. Utendum autem cibis frumentacei generis, qui leniter attenuare ualent, citra man-

festam calefactionem. Lumbis uero quæ euidenter refrigerant imponenda, uelut est solanum, portulaca, hyoscyamus, & semperuiuum. Necessariò etiam coles & intercapedo inter anum & pudendum ex aliquo leniter refrigerante illinitur, uelut est argenti spuma, cimolia, & cerusa, si aceto, aut posca, aut aqua sint diluta. Optimè autem facit in ipsis ceratum ex rosaceo optimo apparatus, & frigida aqua sæpe elutum, si tum pudendis, tum lumbis imponatur. Porro in latus decumbere ipsos ex re est, & substernere ea quæ ad seminis profluium dicuntur: in potu amplius præbere quæ ad illos describentur. A spectaculis uero & narrationibus, ac commemoratione eorum quæ ad uenerem excitare queant, penitus sunt arcendi.

*De seminis profluuio: Galeni.*

*Cap. xxxiii.*

Profluium seminis excretio est eius præter uoluntatem, citra pudendi tentiginem. Nomen autem habet ex eo quod inuitis profluit semen. Fit autem affectio ipsa ob retentiæ in uasis seminarijs facultatis imbecillitatem. Quemadmodum enim in his qui secundum naturam integris uiribus præstant, ea quæ in nutrimentum cedunt retinentur, & excrementa excernuntur: sic in his qui præter naturam habent, recrementa aliquando ob expulsiue facultatis infirmitatem retinentur, & ob retentiue debilitatem excernuntur, aut etiam ob aliquam aliam affectionem, quæ seminariarum uasorum partes eodem modo quo expulsiua secundum naturam facultas mouet: ueluti in comitialibus, & alijs uiolentioribus conuulsionibus contingit, aliquando etiam in his qui ex conuulsione moriuntur, ut uidelicet semen eis excernatur. Profluium igitur seminis uasorum seminariarum affectio est, non pudendi, quæ dolorem quidem non ita ualde inferre solet, molestiâ autem non uulgarem & pollutionem exhibet ob assiduum & inuitis contingentem seminis fluxum. Oboritur autem aliquando etiam ex seminariarum uasorum fluxione: quandoque etiam satyriasi præcedente profluium seminis succedit. contingit autem affectio maximè pubertatem transgressis citra decimum quartum annum, imò alijs item ætatibus. Est autem semen quod profluit aquosum, tenue, citra appetentiam coeundi, & ut plurimum quidem citra sensum, quandoque uero cum uoluptate quadam promanans. Corruptitur affectis sensum uniuersum corpus ac gracilescit præsertim circa lumbos. Consequitur & debilitas multa non ob multitudinem seminis profluentis, sed ob locorum proprietatem. Non solum autem uiris, sed & mulierculis hoc accidit, & in foeminis sanè ægre tollitur. Cæterum cura communis est cum ea quæ in omni fluxione adhibetur. Primum igitur in quiete, & pauco cibo, ac aque potu affectos adseruare oportet: deinde etiam lumbos & pubem contegere lanis uino & rosaceo, aut cœnanthino, aut melino madefactis. neque uero ineptæ sunt spongiæ posca imbutæ. Sequentibus uero diebus cataplasmatibus ex palmis, malis, acacia, hypocisthide, cœnanthe, rhoë rubro, & similibus, insensibus item adstringentibus utendum est, ex lentiscai, rubi, myrti, & similium in uino austero siue mero siue diluto decocto. Cibis autem utendum qui ægre corrumpuntur, & difficulter permutantur, & resiccandi uim habent. Dandum etiā cum potu ac cibis uiticis ac cannabis semine præsertim rostrum,



rutæ item semen ac folia, lactucæ semen, & cauliculi, ac nymphææ radix. In potu uero quotidie pro communi aqua, aqua in qua ferrum sæpe extinctum est, præbeatur. Quidam uero corticem radicis halicacabæ ex aqua eis bibendum præbuerunt, neque ineptum fuerit huius aliquando periculum facere. An tidorus etiam hæc magnæ celebritatis, tum ad hoc modo semen profundentes, tum ad assidua in somnis profluvia, commodè exhibetur. Seminis salicis drach. vii. calaminthæ drach. vi. seminis uiticis albæ drach. v. rutæ drachm. iiii. seminis cicutæ drachm. ii. cum aqua in pastillos digerito, & ex eis ad ponticæ nucis magnitudinem cum poscæ cyathis tribus præbeato. Omnem uero acrum rerum esum, & multi uini potum, & olerum exhibitionem uitare oportet: diætam uero uniuersam resiccatoriā & adstringentem constituere. Post prima autem mox tempora ad unctiones & exercitricem diætam transeundum, per quam totum corpus & præsertim affecta ad sanitatem perducantur, & plurimo quidem tempore circa unctiones immorandum: paucies uero lauandū, si aut lassitudini aut cruditati mederi uelimus. Bonum fuerit etiam, si nihil prohibuerit, ad frigidæ lauationem defugere, quæ omnem morbum ex fluxione abortum depellere consuevit, maxime si medicamentaria qualitate aqua prædita sit, uelut sunt in albulis aquæ, quæ etiam in potu acceptæ eis summe profunt. sunt autem sapore subsalfo, & tactu lactei teporis. Conuenit item per interualla quædam, illitionibus & epithematis & malagmatis uti, quæ rubefacere & emollire possint, atq; ea quæ in profundo hærent ad superficiem transferre. Decubitus porro frequenter in latus fiat, calaminthæ folijs, & rutæ ac uiticis substratis. Epithema autem in eis usuuenit hocce: Capillum ueneris multum, contundito & terito cum aceto, aut apij succo, aut seridis, aut psyllij, eoq; cochlearum carnes coctas excipito, & simul in linteolum infarta coxendicibus imposito. Utendum uero & præscripto ad priapismū cerato, & his quæ paulo mox ad seminis in somno profluvia dicuntur. Omnem autem de rebus ueneris cogitationem excludere oportet.

De seminis in somnis profluuio, Philagrii.

Cap. xxxiiii.

Semen in somnis profundere dicuntur, quicunq; dum dormiunt naturæ genitale semen emittunt: quod ipsum eis ut plurimū ob uitati humoris materiam, aut materiæ multitudinē, aut ob partium seminaliū robur cōtingit. Iam uero quidam & ob animi moestitiam, aut inedia, per somnos præter consuetudinem semen excreuerunt: atq; id materiæ acrimonia irritati, non ob partium seminaliū robur pertulerūt. Huiusmodi sanè, qui uidelicet animo moesti fuerūt, aut inediā diutius pertulerunt, in totū ferè nulla imaginatione præcedente, citra sensum etiam, in somnis profluit semen. Reliquis autē non solum cum pudendi intensione, sed etiam cum quadam propo sita imaginatione, quæ in somnis occurrit, inordinate semen profunditur. Cæterum pessimus corporis habitus hic est, quum semen multum & calidū aliqui generant, quod eos ad excretionem urget, atq; postquam per coitum elegerint, exolutionem oris uentris patiuntur, & toto corpore exoluuntur, debilesq; fiunt & sicci, & tenues, & pallidi, oculos etiam cauos

habent hoc modo affecti. Quod si à coitu uenero abstineant, propterea quod ita afficiantur, capite discruciantur itemq; stomacho, & æstu fastidioq; anguntur, nihilq; magnopere ex cōtinentia iuuantur: contingit enim eis per somnum semen profundentibus consimilia perpeti offendicula, qualia coeundo perpessi fuissent. Quidam uero ipsorum mordax, & calidum semen percipiunt in excernendo, ueluti ipsi consentunt. His igitur, inquit Galenus, consulere oportet, quo à cibis semen gignentibus abstineant: accipiant autem non solum cibos, sed & pharmaca quæ semen extinguant: ueluti est uiticis semen tostū & perfrictum: folia item & flores uenerem cohibere creduntur, non comesta tantū, sed & in potu sumpta & substrata. Lentium uero decoctum etiā membræ tentiginem remittere ac sedare aiunt. Portulaca comesta, & lactucæ semen potatum, & nymphææ radix & semen in cibo accepta, semen refrigerando extinguunt. Ruta uero comesta calore suo semen coagulat & corrumpit. Calaminthem autē assidue edentes generandi potētia priuari dicuntur, id quod similiter & uiolæ albæ semē, & hederæ cacumina nigra tria faciunt. Cæterū aqua fabrorum ferrariorum in qua ferrū sæpe extinctū est, assidue potata, citra molestiā imminuit semen. Horū autē omniū sylua uniuersa in secūdo huius tractationis præscripta est Ser mone. Compositis porro ad ipsos utor, tū his quæ ad seminis profluiū sunt præscripta, tum hoc ipso. Ammij grana vi. foeniculi tantundem, foliorum rutæ parum quiddam cum caricis pinguibus tribus, per mensem semel edito, aut quotiescunq; uelis. At qui assiduum eorum quæ uehementer refrigerant usum, tum in his quæ per os exhibentur, tum in eis quæ forinsecus apponuntur, uitare oportet: ueluti sunt ea quæ ex papauere & mandragora apparantur unguenta. Illitiones autem à balneo adhibeantur ex mediocriter refrigerantibus. Sunt autem hæc: oleum ex crudis oliuis expressum quod omphacinū appellatur: rosaceum maxime quod ex omphacino est apparatus, & melinum. Componenda autem sunt aliquando unguenta compage crassiora, ne uidelicet facile defluat. Compositio uero ipsorum est ex cera, & succo aliquo adstringente aut refrigerante commixtis, hoc modo. Cerae partem unā cum quaduplici oleo liquefacito, deinde in mortario cū manibus sufficienter emollito, & paulatim ex succo refrigerante quantum expedit instillato, unito, ac utor. Succu uero ad hanc rem apti sunt, succus semperuiui, solani, umbilici ueneris, psyllij & sanguinariæ, tribuli, perdicii, nymphææ & portulacæ: uerum hæc succum non emittit, nisi ad eam contusam in pila, aliquis alius tenuis succus affundatur, uuæ præsertim immaturæ, & rosarum, qui sanè in æstate facile parabiles sunt. Alij uero multi etiam alijs temporibus haberi possunt, ueluti lactucæ, seridis, stratiotæq; & lentium quæ in aquis nascuntur: semen lini etiam in aqua coctum, succum moderatè refrigerantē reddit: rhamni item foliorum succus, & quæ his similes existunt. Optimum etiam censetur laminā plumbeam lumbis supponere, tum eorum qui in somno, tum qui alias semen profundunt: multum enim refrigerare consuevit. In his uero qui plūbi duritiem ferre non possunt, consulere oportet, ut ex prædictis herbis quædā arefactæ substernantur, quibus etiam

G 2 uiticis

hanc ex aceto uitat quæ  
celsius lib. 4. cap. 7.



uiticis folia & modica ruta ac calaminthe commiſceantur, maximè uero ipſæ roſæ. Proſunt enim hæc citra renum læſionem. Vehementes namque refrigerationes eorum quæ lumbis ſubduntur, renes iniuriâ afficiunt. Ipſum etiam ſtratum pelliceum ſit, & non ualde molle. Decubitus porro ut plurimum in latus fiat, uitata forma decubitus ſupina, ne lumborum arteriæ inde ſupercalſiant. Atque hæc quidem communis eſt omniū quibus ſemen in ſomnis profluat cura. Cæterum eos qui prædictum uitioſum corporis habitum & conſtitutionem habent, de illis dico, quibus ex coitus uſu ſtomachus iniuriâ afficitur: illos, inquam, obſeruare oportet, quando maximè ſeminis multitudo, quæ excretionem expetat, cōgregata appareat: & tunc ſanè in die quadam moderato ac boni ſucci cibo uſi, à cœna quum ad ſomnum uertuntur, coitu utantur: ſequenti uero die quum ſufficienter dormierint, & à ſomno ſurrexerint, linteolo corpus perfricent, donec cutis quendā attrahat ruborem: deindeq; olei cōfricatione, & intritu moderatè utantur, & aliquātulo temporis ſpatio interiecto, panem bene ſermētatum, clibanitem, purum, modicum ex uino diluto accipiant, atq; hoc modo ad conſueta munia obeunda perueniant. Eo uero tempore quod inter olei intritum & panis exhibitionē intercedit, ſi locus adſit in uicinia aprus, in eo pauliſper deambulent: ſi uero hyemis tempus inſtet, melius fuerit tamdiu intus deambulare. Abſtineant autem à ſpectaculis & lectionibus quæ ueneræ rei uſum in memoriâ reuocare poſſunt. Et quotidie ſanè hoc modo affecti exerceantur his exercitiorum generibus, quæ per ſupernas partes fiunt. At uero corroboratiōē ſtomachi ex eſu panis cōmunem designamus in omni homine, cui bilis efferueſcit, & qui ſtomachū exolutum habet. Quare & hi circa horam tertiam diei modicū panem ex uino cum calida aqua diluto madefactum accipiant, atq; ita ad conſuetas operas prōdeant.

De his qui re uenerea uti non poſſunt. Cap. xxxv. Qui re uenerea uti cupiunt, ignaua autem & impotentia mēbra habent, infernas coporis partes exerceant, inguināq; & femora his confricent, pipere uidelicet, nitro, & euphorbio cum oleo, unguentisq; ex huiusmodi rerum ammixtione apparatus: exempla autem componendi paulo poſt dicemus. Dormiant in mollibus lectis, legantq; quæ ad coitum cohortantur, lectionibus itē ac ſpectaculis eiſmodi aſideāt. Cæterum edulia & pharmaca ipſis conueniunt caleſcientia & inſtantia, ueluti ſunt, cicer, fabæ, halica, porri, bulbi, paſtinacę radix & ſemen moderatè, nuce pineę, ari radix cocta, colocasi radix cocta, itēq; dracunculi, urticę ſemen, rapī ſemen, erucę tum folia, tum ſemē, maximè agreſtis, coſtus & piper cum uino mulſo, ſatyrium, ſeſamum, horminū, amygdalę moderatè, aniſum, polypodes & concharum genera omnia: perdicis item oua ad coitum excitant, & teſticulus galli. Seminis uero multitudinem augent omnia bono ſucco prædita: teſtes uulpis ſicci triti cochlearij meſura potati innocuam & minimè uanam membri tentiginem faciunt: partes etiam renes ſcinci amplectentes ad tentiginē pudendorum excitandam bibuntur. Orchis, herba eſt quæ teſticuli appellationem habet, eiſ maior bulbus cū lacte potatus tentiginē ciet: minor uero cū aqua potatus,

tentiginem remittit. Compoſitū tentiginem ciēs, & faciēs ad languorem membrorū, ac reſolutionē. Sinapis, radicis panacis, ſeminis erucę cuiuſq; drach. viii. ſeminis cardamomi drach. iiii. piperis grana xx. redigito in paſtillos cū erucę ſucco, & dato dra. i. ieiunis cum uino ueteri adſtringente. Aliud. Seminis hederę nigrę, floris chamemelli, ſeminis oxyſchoeni, cuiuſq; drach. iiii. ſeminis erucę, piperis albi, ſinapis, cuiuſq; drach. i. pyretri drach. iiii. excipe melle, & ad ſtrigmentorū ſpiſſitudinem redige, præbe à balneo nucis pōricę magnitudine. Aliud. Pudendum cerui aridum urito, & drachmā unam cum uino meraciore præbe. Experimento conſtat. Aliud, quo & ego utor. Seminis hormini, ſeſami, piperis, ſeminis erucę, ſinapis, nucum pinearum, caudæ ſcinci, ſatyrij, floris iunci odorati, ſtyracis, ſeminis porri, uuæ paſſæ, ſingulorū æquales partes, mellis quantum ſatis eſt: præbe drachm. i. Aliud, quo etiam ipſe utor. Salis cōmunis torrefacti ſeſquiſextarium Italicū, hoc eſt, uncias xxxvi. ſeminis hormini ſcrupulos duodecim, ſpicę nardi unciam unam, ſalis ſcinci uncia i. caudæ ſcinci drachmas quatuor, ammiſi ſcrupulos duodecim, ſatyrij ſextantē, piperis unciam unam, ſeminis cardamomi uncia unam, ſeminis ſoeniculi unciam unam, myrrhæ unciam i. ſeminis erucę drachmas ſex, ſeminis uerbenacę ſupinæ aridi drachm. tres, ſeminis ſanguinarię ſicci dra. ii. nucum pinearum uncia unam, phyſſalidum drachmas iiii. ſeminis hyperici drach. iiii. contundito, cribrato, & ad ueſperam cochleariū quomodocūq; uelis exhibeto. Aliud uehemēter efficax. Myrrhę, piperis, ſpicę nardi, tragacanthi, cuiuſq; drachmā i. thuris ſeſquidrachmā, croci drach. i. ſtyracis, galbani, dauci, ſeminis hormini, cuiuſq; dra. ii. cāchryos, ſeminis ſoeniculi, ſeminis lini, ſeminis urticę, ſeſelis, cumini Aethiopici, aniſi, ſeminis erucę, cuiuſq; drachmas vi. erui albi toſti drach. vi. ſeminis apij drach. iiii. ſeſami non loti drach. x. amygdalas amaras delibratas quindecim, amygdalas dulces triginta, nuce pineas centum, bulbos crudos magnos ſex, mellis quantum ſufficit, ut ad cerati craſſitiem redigatur, præbe drachmā i. ante cœnam, cum uino mulſo maximè, aut uino aſtero. Facit ad tēiginē, & ſuperabundantem rei ueneræ uſum ciendum, in ſenibus præſertim & debilitatis. Facit & ad liberorum procreationem. Unguentū efficaciffimū. Olei uetiſſimi librā i. erucas in tithymallis repertas nonaginta ſex: erucas in æſtate, dum in uigore eſt herba, accipe, & in oleū coniectas ad ſolem per dies ſeptem expone, & poſtea oleo utere: ani & pudendi interca pedine, itemq; lumbis ex eo confricatis. Idem etiam pinus erucę faciunt, & tentiginē uehementer ciet.

Oribasij ſatyrica. Zingiberis, radicis ſatyrij ſuperioris, cuiuſq; drach. viii. caudę ſcinci, mei, aſari, petroſelinii, cardamomi, ſeſelis, cuiuſq; drach. iiii. ſeminis erucę drach. iiii. cinamomi drach. iiii. hormini, piperis, ſeminis urticę, cuiuſq; drachm. ii. floris iunci odorati drach. i. ſpicę nardi drach. i. ſanguinis hircini ſicci cochleariū plenum, datur drachma i. cum uino, imbecillioribus uero cum lacte. Oribasij, ad pudendi lāguorem ac reſolutionem, præſertim ſenum. Seminis erucę drachm. ii. cumini unc. i. portulacę unc. i. excipe melle, & mane ac ueſperi cochlearium præbe. Porro ad coitum concitat paſſer troglodytes



dytes appellatus, in cibo acceptus. Verum his, qui frequentius & supra quam conuenit inde coeunt, urinam caprae bibendam praebere. Oribasij, tentiginem ciens. Piperis, petroselinum, nucum pinearum, scobis pudendi ceruini aridi, terebinthinae, aequales omnium partes melle excipe, & cum uino bibedas praebere. Aliud, Oribasij. Stellionem ustum quam tenuissimè conterito, deinde oleum affundito, atque ex eo magnum dextri pedis digitum inungito, & coito: ubi uero à coitu cessare uelis digitum ipsum abluito. Aliud eiusdem. Leporis coagulum, aut leonis adipem pudendo illinito: deinde tria piperis genera cum tragacanthi succo testiculis intercapedini inter anum & pudendum, ac lumbis oblitito. Ex Rufi libris unguentum efficax tentiginem ciens. Myrrhae drachmam unam, sulphuris uiui drachmam unam, cnicus interioris drachmam unam, pyretri obolos duos, melanthij drachm. ii. piperis grana xxx. grana cnidia depurata uiginti, cōtundito, & cū drachma una succi scillae terito, ceræq; unciam unam, cum olei cicini besse colliquato: mellis item quadrantem adijcito. Vtitor. Post coitum uero cum linteolo loci diligenter extergantur. quidam uero hoc unguento sedem illi-

nunt. Porro Rufus etiam hæc addit. Facile est, inquit, & hic remedium reperire, his qui uenere uri non possunt. Adolescens enim quispiam nos accessit, & se uehementer coitum appetere confessus est, uerum ubi commisceretur, semen emittere non posse, sed flatus plurimos sibi per sedem erumpere. In hoc itaque cōiecturam feci, uasorum seminariorum siccitatem adesse: quod ipsum etiam adepta sanitas demonstra-uit. nam postquam humida & boni succi diæta esset usus, semen emisit. Alius item adolescens domesticus minister, confessus est se, quando cum muliere rem haberet, semen effundere non posse: quum uero dormiret, plurimum ei semen prodire. Visum itaque mihi est, uasa eius seminaria propter multam unam cum frigidityte humiditatem, cal fieri non posse: propterea quod caliditas in coeundo ad corporis superficiem diffunderetur. In somnis uero amplius calefieret, propterea quod somni interna calefaciunt, & refrigerant exteriora. Quare hunc ipsum infernas partes exercere iussi, atque id maxime per equitationem. Castorium etiam bibendum praebui, & diætā omnem calidam & siccam constitui.

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN

DVODECIMO SERMONE AETII

CONTINENTVR.

**D**E ischiadicis siue coxendicum dolore. cap. i.  
De herba iberide, quæ & cardamine appellatur, eiusq; sinapismo. cap. ii.  
De uisione. cap. iii.  
Cura affectionis exacerbata. cap. iiii.  
Epithemata & malagmata ad ischiadicis. cap. v.  
De podagra & arthritide siue articularum morbo. cap. vi.  
Cause uniuersales. cap. vii.  
Quare in quibusdam magnus sit morbus, in alijs uero paruus. cap. viii.  
Quare multo tempore aut pauco morbus duret. cap. ix.  
Quæ sit incuruatorum articularum causa. cap. x.  
Quæ causa generationis toforum in artubus. cap. xi.  
Quæ causa sit cur inflammationes in podagricis non facile suppurentur. cap. xii.  
Quomodo ex inflammationibus & consequentibus accessionibus, siue symptomatis, adfligens humor cognoscatur. cap. xiii.  
Sanguinei humoris influentis signa. cap. xiiii.  
Biliosi humoris signa. cap. xv.  
Pituitose fluxionis signa. cap. xvi.  
Bilis atrae influentis signa. cap. xvii.  
Serosarum fluxionum signa. cap. xviii.  
De his qui ex humorum complexu fluo-

re infestantur. cap. xix.  
Diæta & cura podagricos praeseruans. cap. xx.  
De olei & salis affricu in podagricis. cap. xxi.  
Vniuersalis methodus curationis podagricorum. cap. xxii.  
Cura eorum qui ex sanguinis copia ægrotant. cap. xxiii.  
Quod eleuatas & incuruas uenas ex membris fluxione infestatis, uelut in uaricibus, auferre oporteat. caput xiiii.  
De perustione in morbo articulari. caput xv.  
Cura in fluxibus sanguineis post sanguinem euacuatum. cap. xvi.  
Cura eorum qui neq; uenæ sectione, neq; purgationem sustinere possunt. caput xvii.  
De his qui ob bilis influxum ægrotant. cap. xviii.  
Parabilia remedia ad inflammationes non ualde feruentes. cap. xix.  
De stupefacientibus medicamentis caput xxx.  
Vnguenta recalsfactoria quæ post stupefactiuorum usum adhibentur. caput xxxi.  
Pharmaca & edulia eorum qui flauæ bilis influxu infestantur. cap. xxii.  
Cura eorum qui ob pituitæ influxum ægrotant. cap. xxiii.

Cura eorum qui ex atrae bilis influxu ægrotant. cap. xxiiii.  
De his qui ob tenuem & serosum influxum ægrotant. cap. xxv.  
De fluxionum inter se complexu. caput xxxvi.  
Cura affectionum ex sanguinis & bilis complexu. cap. xxvii.  
Cura bilis ad pituitam permixta. caput xxxviii.  
Cura humorum atrae bilis alijs permixtorum. cap. xxxix.  
Cura durorum humorum qui post inflammationes relinquuntur. caput xl.  
De tumorum crudorum & incoctilium cura. cap. xli.  
Malagmata diuersa, in quibus etiā Lucij malagma est, ad articularum distortionem destinatum. cap. xlii.  
Cerata podagrica. cap. xliii.  
Vnguenta & acopa diuersa ad podagricos, articularum dolores, ischiadicis, membris exolutos, & trementes. cap. xliiii.  
Ad durities in artubus instar toforum. caput xlv.  
De medicamentis purgatiuis articulari morbo accommodatis. caput xlvi.  
Antidoti podagrica. cap. xlvii.  
Qui podagrici lauandi sint, & quomodo. cap. xlviii.



# AETII MEDICI GRAE CI CONTRACTAE EXVE-

TERIBVS MEDICINAE TETRA-

BIBLI SIVE QUATERNIONIS

TERTII SERMO QUARTVS ET EX

ORDINE DVODECIMVS.

*De ischiadicis siue coxendicum dolore, deq; podagra & articulari morbo, quem Graeci arthritidem appellant.*

*De Ischiadis siue coxendicum dolore. Cap. I.*



**A**RCHIGENIS, Ischiadici, hoc est ex coxendicum dolore affecti, proprie dicuntur quibus dolor circa iuncturam quandam uertebrae innititur. Antecedit autem & quasi auspiciatur hoc malum aliquando quidem uicinarum musculorum dolor, & maxime lumborum: aliquando uero ab ipsa iunctura initium fit affectionis. Iam uero quandoque etiam contingit ut uertebrae dolore fere sublato, circa popliteum solum afflictio haereat; alijs autem iuxta talum: quibusdam uero totum crus equaliter dolore affligitur. multis item circa inguina dolor figitur, & tunc sane uesica ipsa molestia transsumens, urinae difficultatem inducit: & tunc maxime totum crus a coxendicibus usque ad calcaneum dolore perfert, & non solum si ipsum crus moueatur conuulsiones infert, uerum si etiam aliqua alia corporis pars agitetur. Generant autem hanc affectionem assidue cruditates, & immodicus rei ueneris usus: aliquando etiam deambulationes concitatiores, & haemorrhoides suppressae, & uomendi consuetudo intermissa, & purgationes menses, aut etiam aliae familiares excretiones impeditae, & exercitorum contemptus. Communis quidem igitur ischiadicis, podagrae, & articulari morbo existit ualida alicuius humoris ubertas, quae affectum articularum nexum occupat: quo impleto exporrecta neruosa corpuscula tensione affliguntur, atque ex his oboritur dolor. Caeterum ad affligentis humoris cognitionem conferet dieta quae praecessit, & anni tempus, & aeris nos ambiens status, aetasque & habitus, itemque color corporis: amplius autem & doloris specimen, siue feruens & pungens, siue stupidum. Initium igitur curationis fiat ab affligentis humoris euacuatione, & si quidem humoribus ex aequo redundarit corpus, praeter omnibus uenae sectio adsumatur: deinde etiam purgatio: postea uero ea quae dicuntur pharmaca oportune & ordinate adhibeantur: ita ut in manibus quidem & pedibus pharmacis fluxum repellentibus utamur, circa coxendicum uero iuncturam id facere uitemus: quum enim hic connexus in alto situs sit, sanguis ex uicinis & ambientibus uenis ac musculis ad ipsum impellitur: quare lenitius in principio opus est pharmacis ad coxendicum dolorem, atque ea neque omnino refrigerent, neque fortiter calfaciant. Etenim quae refrigerant, ad connexum materias impellunt: quae uero uehementer calefaciunt, aliam amplius materiam ex adiacentibus partibus adtrahunt. A multitudine itaque sanguinis coxendicum dolorem obortum uenae sectio curat, si primum cubiti uenam secemus: deinde etiam eam quae iuxta talos est, aut popliteam. In principio enim omnium inflammationum diuulsoriam uenae se-

ctionem facere oportet, ueluti si pes sit inflammatus, ex uena est directo loci affecti sita sanguinem extrahemus. In affectionibus uero iam inueteratis, maxime quidem ex ipsis locis affectis extrahemus: aut si id fieri non possit, ex uicinis. Post sanguinis uero est cubito detractionem, a talo repetita sectione auferre oportet, secunda est autem interna uena iuxta talos sita: uiriliter enim imbecillis auxiliatur. Et scio, inquit Galenus, coxendicum dolores in una die curatos per hanc ex cruribus euacuationem, maxime si non a frigida e sint oborti, sed ex uasorum sanguinis circa coxendicem repletionem. In omni equidem coxendicum affectione, praecipue tamen ea quae humoribus ex aequo redundantibus oboritur, si quis prius quam corpus euacuet, acris pharmacis ad affectam particulam utatur, egerrime sanabilem affectionem reddit, utpote multitudine ibidem insolubiliter condensata: supra reliqua enim inspissatur & uiscosa redditur, & ob acrum pharmacorum caliditatem & siccitatem non dissimile quippiam assationi perpetitur. Ab euacuatione igitur totius corporis, ut quae maxima facultate ad huius affectionis curam praestet, curandi initium faciemus: & non solum a cruribus, sed & a cubito primum sanguinem extrahemus. Sunt & uomitus ischiadicis commodi, atque adhuc amplius quam per uentrem euacuationes, nimirum retrahentes humores infra repentes. Eos igitur in principio affectionis facere a cibo expedit. Inueterato uero malo etiam a pharmacorum uomitu cienti accceptione, ita ut a mediocribus incipiamus. Porro quibus iam indissolubilis humorum coactio in ipso articulo a medicis per immodicum acrum pharmacorum usum facta est, his cucurbita quam maxima cum scarificatione locis affixa auxiliatur, & purgatio per infusa efficaciora. Qui igitur iam dicta praeter oculis habuerint, etiam praescriptis a ueteribus medicis pharmacis iuxta methodum poterint uti. Itaque post uenae in cubito sectionem, & a talo item sanguinis detractionem, aut per purgatiuum euacuationem, ubi uidelicet aluus leniori clysteri injecto excreuerit obturata, irrigare locos oportet, primum quidem ex oleo rutaceo, postea uero etiam efficacior irrigatio adhibenda quae sensim calfacet, & materias ex alto ad superficiem attrahere possit, qualis est quae ex cyprino, aceto, nitro, & cacheris constat: ita ut octo quidem cyathi olei cyprini, quatuor uero acris aceti, duo autem nitri, & unus cacheris conijciantur, & donec ter aut quater efferueant, coquantur: post uero expressus & in lanis succidis exceptus succus super affectos locos imponatur, uerum quotidie renouare hanc irrigationem oportet, & tribus uicibus hoc solum admoto perfectus animaduersionem habeto. Multos enim, inquit Archigenes, uidi qui nullo alio praesidio operam habuerunt. ego uero, inquit, post praedicta etiam simpliciore



simpliciore clysterē infundo, & sequenti die aciorē, atq; haud scio an ullus tam degener coxendicum dolor reperitur, qui huic praesidio non cedat: aut si aliquando ad primam adhibitionem non cessat, post alterum eius usum penitus excisus est. Apparet autem acrior clyster hoc modo. Mellis sesquicyathū, olei tantūdem, aquae cyathos II. nitrī drach. VIII. terebinthinā drach. III. haec unita & calefacta infundito, & podici fomentum apponito, quo diutius infusum cōtineatur. nam sic magis operatur, ut plurimū uero mucosam humiditatem extrahere cōsuevit, aliquando autem & sanguinem, quando etiā maior commoditas resultat. Quod si adhuc affectio ipsa persistat, paucis diebus interpositis, non tamen ut prioris praesidii utilitatem demoliamur, rursus clysteri utemur pro simplici aqua, cētaureę decocto ad praedicta affuso, quo robustius pharmacum reddatur. Supra opinionem autē ipsis commodat cucumeris syluestris radix in tenues partes concisa, dein de paulū cocta, atq; decocto eius cum solo melle infuso, citra omnem mordacitatem euacuat affligentē humorē. Optime etiam facit lupinorum amarorum decoctū cum pari oleo infusum. Saepe enim, inquit Archigenes, haec praedicta cura ad omnes ischiadicōs mihi sufficit. Quod si tamē affectio adhuc remoretur, cucurbita quā maxima cum plurima flamma locis affigatur, uulnuskulis etiam altioribus per scarificationem impactis. Cæterum & reliquam curam referre operae pretiū existimo, ut nota sit, si quādo usus eius necessario exspectatur. In omni enim tempore plurima curationis principia cōstituenda: hoc enim modo facilius affectio destruetur, si assidue praesidiorū permutationes fiant. Itaq; ubi rursus mederi coeperis, uomitib. uteris siue à coena, siue à raphani acceptione cōcitus: deinde loci affecti & totū corpus in balneo per nitrū extergatur, post balneū autē loci ex unguento per adarcē & euphorbiū cōposito illinantur. Deinde rursus aliud medendi initiū à purgatiōe facies. Solitus autē fui, inquit, purgatiuū ad ischiadicōs assumere huiusmodi. Colocynthidas quotquot uelis accipito, & derafa ac proiecta medulla ipsas oleo optimo expleto, & totam noctem finito, deinde oleo per se effuso, cum uacuo colocynthidis calice aquā una & dimidia olei mensura commesurato, ac in ollam fundito, atque cum ea ipsa communi aqua colocynthidas ipsas donec flaccescant, coquito: & expressas ipsas quidem abijcito, liquorem autem excolato, & affuso ad ipsum oleo feruefacto, ac panis siliginē contuli & cribrati quantū satis erit inspergito, manibusq; satis diu emolito, ac pilulas ad nucis ponticæ magnitudinē formato, ex eisq; XXXIII. pilulas à balneo exhibero. Si uero fortius reddere pharmacū uelis, ad hāc dosim ueratri nigri corticis tenuissime triti obolos tres, & scammoniae scrupulum unum adijcito. Possum autem idem de hoc praesidio quod supra de clysteri dixi referre, quod uidelicet solū aliquando sufficit etiā eam quae per multū tempus indurata est coxendicum affectio nem extirpare: licet itaq; eo saepe uti, multitudinē tamē eius imminuta, & sanē moderatam eius multitudinē obseruauimus numerū XVIII. pilularū. Eis uero qui pilulas deuorare non possunt, colocynthidis cremorē exhibero hoc modo. Colocynthidē quā maximā perforato, & eiecto semine, relicto autē eo

quod instar comēti inest in totū, colocynthidē ex uino dulci ueteri expleto, & per totā noctē finito, & cū defecto ex ea operculo cooperito. Mane uero excolato per panniculū uinū, & tepefactum bibēdū praebeto. Si uero parua fuerit colocynthis, duas pro una uino expleto & exhibero. Quod si efficaciorē reddere uelis hūc cremorē, ueratri nigri obolos tres adijcito, & scammoniae sesquiobolum. Cæterū per intervallo quādam praedicto clysteri ex cucumeris uidelicet syluestris radice apparato, etiam ad ipsos utaris.

De herba iberide, quae & cardamine appellatur,

eiusq; sinapismo.

Cap. II.

Quod si uestigium quoddā affectionis relinquatur, herbae iberidis quae & cardamine appellatur, radix assumenda est: etenim odorem & saporem ac figurā cardami, hoc est, nasturtij, habet. Multa autē ubiq; nascitur, maxime tamen circa uetera monumenta murosq; & circa uias in incultis locis. folia autem habet nasturtij uere quidē uirētia, & nasturtio multo maiora: lōgitudo uero caulis cubiti parui est aut paulo amplior: aestate florē lacteū promit, & tūc sanē efficacissima cēsetur: semē fert quā minimū, atq; idipsum per totū caulē enascitur. Radix uero acerrimū habet odorē, & maxime omnium nasturtio similem. Hāc aestate maxime recentē effodito (arida enim uires amittit) & diligenter tundito: tunditur autē difficulter, & axūgia ueteri modica excipito, ac iūcturae coxae & uniuerso cruri imposito, adalligato, ac incubere finito, mulieribus quidem non infra duas horas, uiris autē per quatuor horarū spatiū, si possibile sit id perferre, excitat tumores cū ardore & rubore, ueluti sinapismus facere solet: post uero in balneū inducito, nullo unguento aut sinegmate eis illito. ubi uero modicū exudauerint, in solū ob feruorē mordacius desidere iubeto, idq; fortiter perferre cogito. morsum enim cū ardore in principio inferre cōsuevit: deinde educito. Ferme enim semper, quamuis ab alijs fuerint importati, sua sponte pedibus ingredientes, exhibūt. Verū à balneo ad oleū multū paucū admodum uinum ammisceto, & conuassata illinito, ac humore cum aspero panno deterfo, crus ipsum cū leuissimis lanis cooperito. Et sanē cōsuevit hoc ipsum praesidiū nullo alio inde auxilio opus habere, quod si tamē aliquando uestigiū affectionis relinquatur, uicenis horis siue diebus interpositis, rursus eodē praesidio utaris. Atq; hic quidē sinapismi est modus. Ceterū pharmacum ipsum plures quā sperare possis in se cōplectitur comoditates, & cū minori acrimonia eius usus perficitur. Hoc autē utendi modo etiā ad inueteratos capitis dolores, omnesq; alios diuturnos dolores, quacūq; tādē corporis parte cōstituerint: ad affectiones itē ægre solubiles, & resolutiones persanādas uti licebit. Ceratū ad ischiadicōs: Archigenis. Porro interiectis diebus quibus ab exhibitione remediorū quiescis, ceratū locis imponatur huiusmodi. Opopanacis drach. VII. in aceti cyathis II. dissoluito, deinde cere trientē, cū befe olei cyprini liquefacto, refrigeratoq; ac leuigato, & ad dissolutū opopanaca cōijcito, unito, ac utitor.

De uisione.

Cap. III.

Veteres, inquit Archigenes, etiam uisione in ischiadicis usi sunt, tū per cauterēs ferreos igni candefactos, tum per struthij & aristolochiae radices coxae iūctura in



stura in altum perusta, itemq; crure per intervalla quædā, circa dolentes maxime locos cauterē admo- to. Quidam uero alij ad propinquē cruri affecto ma- nus locum inter magnum digitum & indicem me- dium, circa infernum magni digiti siue pollicis arti- culum, caprinum sterus feruēs per forcipem impo- nunt, stercoraq; uariant ac permutant, donec sensus ustionis ad locū affectum perferatur: tunc enim suffi- cientem ustionem esse dicunt. Dioscorides autē hanc rem ita tradit, Caprinum, inquit, sterus feruefacto, & extenso magno manus digito, cauum locum cir- ca inferni articuli eiusdem digiti finem notato: dein de locū ipsum ex oleo prælinito, & lana conuoluta oleo imbuta ad cauum locū substrata, sigillatim ca- prinum feruefactum imposito, quousq; sensus per brachiū ad affectam coxā procedat. Antylus autē, nos, inquit, etiā huiusmodi urēdi modo utimur: ster- cus caprinum siccum feruefacimus, eoq; uētre m- magni digiti affecti pedis perurimus paulo infra un- guē usque ad os ipsum ustione penetrante. Hæc ipsa ustio extremas coxendicū affectiones, & quæ nul- li alij præsidio cedunt, dissoluit. Ceterum post ustio- nes porri folia cū sale trita, aut oliuas nigras cū sēsa- mo illoto tritas, aut nucum interiora trita, ad locum crustosum imposito. Eis uero qui molles carnes ha- bent, lac cū melle adhibeto. Tertio autē die ab ustio- ne, lenticulam coctam cū melle donec cruste penitus excidant, cataplasmatibus modo imposito: atq; dein- de suppuratorio ductu utitor, ulceribus ad plures dies adseruatis, ne cicatrix eis obducatur. Nouimus, inquit Archigenes, plurimos qui ex prædictis ustio- nibus opem senserunt: uerum nobis, inquit, ad coxa- rum affectionis demolitionē prædicta remedia suffe- cerunt, itemq; malagmata quæ paulo post dicentur: apposuiimus autē De ustione, ne uidelicet eius usus ignoraretur.

*Cura affectionis exacerbata. Cap. IIII.*

Archigenis. Tempore porrò exacerbationis reliquæ partes fasciis circumligandæ sunt, & diligenti frica- tione contrectandæ: irrigationes item locos impin- guantes, & per uices mutatæ, ex oleo sicyonio cali- do adhibeantur, & cum lana conuoluta contegan- tur. Cataplasmata autem ex semine lini ac foenigreci affectis partibus imponantur. Maxime uero quæ ex loliacea farina apparantur, ac quædam calefacientia assumunt, & altheæ radicem. Mitigant etiā uehe- mentes dolores ex oleo fomenta, & ex milio fricta, itemq; sale in sacculis calfacto. Portiones ad ischia- dicos. Succus cyrenaicus exacerbationes diffundit, erui magnitudine potatus, aut deuoratus. Sūme fa- cit & castorij dra. i. cum opopanaxis obolis tribus. Alia potio ad ischiadicos. Farinæ erui, anisi, foenicu- li, singulorū parem mensuram conijcito, tundito & cribrato, obolosq; nouē in dimidia uini hemina da- to. Multa crassa per urinam ducit. Vbi uero purum prodire uideris lotiū, ne amplius præbeto. Alia.

Centaureæ minoris ramulos cōtundito & cribra- to, ac ieiunis cochleariū ex aqua calida ad horas tres aut plures dato. Alia. Radicem rubiæ contundi- to, & cribrato, similiterq; præbeto, sanguinem per urinam educit, quotidie autē bibetē lauato. Auxi- liatur item irionis semen cum uino, & smyrnij semē eodē modo. Seminis nasturtij dra. i. cū uino: radicis capparis cortidis drac. i. cum uino: radicis iridis tritæ

drach. i. cū passo: ruta syluestris, & domestica, cum anisi decocto: symphyton in petris nascens, cum ui- no mulso decoctū: radicis altheæ decoctum, aut cen- taureæ minoris: ammoniaci thymiamatis dra. i. ex aqua mulsa: seminis hyperici drac. i. quod ipsum & stercora educit, itemq; pituita: Baccæ iuniperi ex ui- no: Bitumen pro cataportio deuoratū: carpobalsamū ex aqua mulsa. Ceterū & portiones dolorē lenientes, itemq; soporiferæ, ubi dolores restiterint, cōmode assumi possunt: maxime tamē omniū antidotus quæ pæonia appellatur, in tertio decimo Sermonē descri- pta. Ego autē, inquit Archigenes, etiā in exacerbatio- nibus prædicto clysteri usus sum, eo uidelicet qui ex terebinthina & nitro constat, & euidentem permuta- tionem feci. Poteris autem & cucumeris syluestris decocto in exacerbationibus uti. De reliqua diætā, Archigenis. Subiungemus autē ex ordine & paucis reliquā curam. Præ omnibus igitur adhortor ut con- tentiones, & exquisitæ negociorū incommoditates eis exhibeantur, nō solum à cibo accepto, sed etiā su- mēdi cibi tēpore, diætā unctoria & impinguatē cō- stituta, quo similiter carnis incremento sit consultiū. Nam si hanc ueluti neruorū operculū, acquisierint, tutum simul ad omnē externam causam inuentū ha- bebimus, simulq; commodā exercitationem omni unctoria diætā potiorē apponemus. Vngantur au- tem ab expertis & gymnasijs exerceantur. Minime enim molesti labores fient cū perito præexercitatio- re: & manus sanè exercitijs tritæ cōmodiores sunt mollibus ad curationem. At uero significandum est etiā quod ischiadici ab assiduis flexibus & deambu- lationibus, & moderato cursu quā cōmodissime opē ferre possint. Præcedat itaq; gestatio in equo, deinde naturalium aquarum usus, primum quidem calidarū, deinde etiā frigidarū, si enim ad frigida la- uationem adsuescant, sola suffecerit ad incolumitatē acquirendam. Cæterū diætā tempore quidē exacer- bationis forbilis sit & modica, per intervalla uero solidior & reparandis uiribus magis accommoda- ta, habeatq; acriū eduliorū comestiones quasdam per aliquot dies adiunctas. Eorum autē syluam sæpe iā apposuiimus, utpote quæ nihil uiscosum, aut crassi succi, aut ægre concoctile, aut quod difficulter dige- ritur, cōplectitur. Bonæ uero concoctioni in primis consulant, non solum damni quod ex cruditatibus prouenit ratione habita, sed & incrementi carnis, qua præ omnibus ischiadici opus habent. Quin & quali- tates eorum quæ ægre concoquuntur fugiendæ sunt, præsertim eorū quæ urinā ducunt. Aluum autē pro- be solutū habere expedit: premuntur enim & aggra- uantur articuli, ubi ipsa sit adstricta. Neque uero assidue profluat uenter. Nam id imbecilles reddit, & quod cum purgationis impetu à toto corpore attra- ctū est, id ipsum uicinas partes replet. Contingit ta- men etiā aliquando à periculosa dysenteria oborta omnem coxarum molliciem ac aptitudinem ad affe- ctionem corrigi & emendari. Præstat etiā uomitus per intervalla siue à cibo accepto, siue à raphanis. Neque latet nos quosdam ueratro ad ischiadicos usos esse. Scimus item ueratrum efficaciter auxiliari: Ve- rum non suspicamur eius usu opus esse ad hanc affe- ctionē, utpote quæ ab antè tradita cura extirpabi- tur. Cataplasma ischiadicum. Farinam lupino- rum amarorum in aceto mulso aut posca deco- ctam



etiam imposito. Aliud. Calaminthen præsertim uiridem, aut si haberi nequeat, cum posca locis imposito, est enim præsidium præclarum. Aliud, facit ad uehementes dolores. Papaueris calices in aqua multa decoquito, ipsosque proiectis farinam ordeacea aequè multè incoquito ac imposito. Aliud.

Calices papaueris uirides terito, & adpersa polentæ farina, in pastillos redigito, eosque in umbra resecato. Vsu uero expetente in sufficienti aceto dissolutos ac calefactos imposito. Aliud Asclepiadæ, ischiadicis, podagricis, & articulorum morbis euestigio auxiliatur. Fœnum græcū in fictile uas confectū & posca sufficere affusa per integrā noctem macerato: mane uero ad ignem appositum donec soluitur coquito: deinde in mortario tritum, & sufficiens melle affuso calefactum, & linteolo exceptū ad affectos locos apponito, & fasciola adalligatum finito, idque per dies duos aut tres facito. Aliud. Radicis symphyti sexuncæ rasam & in tenues partes concisam in pilam testaceam conficito & enixe terito, atque ubi contrita fuerit, manne quadrantem, & ouorum recentium crudorum candida tria unā cum luteis adjecto, rursumque enixe terito, & contritis lib. i. adipis suilli ueteris probe subacti addito, unito, ac linteolo excepta imposito. Euestigio dolores mitigat, & præsertim cum fluxione articulorum obortos. Aliud Asclepiadæ. Fœni græci mola triti, corticis radicis mandragoræ, mannae, cuiusque quadrantem, oua cruda recentia x. radicis malua lib. i. radicis symphyti lib. i. carnis cochleæ terrestres sexuncem. Vt prædictum est apparato diligenter, & sublaturum reponito. Vsu uero tempore pharmaci partem unam, adipis suilli ueteris partes duas accipito.

*Epithemata & malagmata ad ischiadicis. Cap. v.*

Malagma, inquit Archigenes, quod ualde multo experimento nobis constat, est subscriptum, uerum cucurbitam prius ad dolentes locos affigere oportet: ipsum autem malagma aliquandiu inhærere consueuit, quare expectabis eius utilitatem. Colophonias lib. i. baccarum lauri bessem, seminis raphani trientem, corticis capparis libram unam, picis aride librā unam, pyretri libram i. ceræ libras duas & dimidiā, fœnigræci bessem, iridis libram i. sinapis bessem, nitri libras duas. Nitrum cum aceti libris duabus terito: deinde reliqua arida inspergito, simulque terito, affusisque liquefactis, emollito, ac utitor. Hoc quidē igitur malagma eiusmodi est, quod malum penitus extirpat, cutē rubefacit, & materias ex alto ad superficiem educit, quo sanè in principio nō oportet uti. Verū quod sequitur leuissimum est & multæ commoditatis, quoque citra formidinē conuenit uti. Ceræ trientem, styracis sesquunciam, satyrj sesquunciam, aloës primariæ sesquunciam, ammoniaci thymiamatis sextantem, croci unciam unam, pyretri unciam i. opopanax unciam unā, galbani unciam i. thuris unciam unam, olei ueteris libras quatuor, aliquando autem sextantem solum in æstate: Apparato, & utitor. Præter opinionem etiam facit ad ischiadicis emplastrū pardalis appellatū, quod ad hydropicos inuenies descriptū. Leena emplastrum, malū penitus extirpans. Olei ueteris libras duas, plumbaginis, salis communis, terebinthinæ, singulorum libram unam, squamæ æris quadrantem, æruginis, herbæ lanariæ radicis, chamæleonis nigri radicis,

aristolochiæ, sinapis, singulorum sextantē, aliquando etiā cāchryos unciam unam, aut pro eo pyretri tantundem. Auxiliatur etiā capiti ad hemicraniam impositum. Hierē, ad ischiadicis, hoc, inquit, usus sum ad Frōtinū statim ab exacerbationibus imposito. Ceræ drachmas centū, uisci drachmas sedecim, terebinthinæ drachmas uiginti quinque, galbani, myrrhæ, iridis, cuiusque drachmas sex, cedriæ hemina dimidiū, olei cyprini hemina dimidiū. Ceram, cedriam, cū cyprino oleo liquefacto: deinde resinā & galbanum adjecto, & ablatis ab igne statim uiscum addito: & ubi dissolutum fuerit, irim inspergito & unito, & ad myrrhā in mortario cū aceto tritā affundito. Quidam etiam nitri drachmas duas adiecerunt. Asclepiades autē ita inquit, Malagma quod ischiadicis statim post exacerbationum remissionem imponitur, facit ad ossa contrita ac omnem neruorum per consensum affectionem, omnemque duritiem dissoluit: facit item ad alias inflammationes, comprimit & committit malignas cicatrices. Prodest luxatis & collisis, & ad omnes malignas mamillarum dispositiones. Est enim ualde generosum. Ceræ, terebinthinæ, uisci, galbani, myrrhæ, iridis siccae, singulorum drachmas quadraginta octo, olei cyprini quantum sufficit. Galbanum cum cera in mortario confusum & emollitū cum cyprino liquefacimus, deinde ablatis ab igne uiscū inijcimus, & ubi dissolutū fuerit, irim inspergimus, & ad myrrham cum aceto in mortario tritam affundimus. Commodant etiā ipsis emplastra ex sale: quale & hoc est. Salis drachmas centum, picis sexuncem, olei libras quatuor, cerusæ libras duas. Salem per se quā tenuissime terito, similiter & cerusam, deinde oleum ad ipsa in mortarium affundito, & postquā sufficienter traueris, excepta usquequo manus non inquinent coquito ad lentum ualde ignem, deinde picem liquefactam & percolatam inijcito, ac rursus ad cōpagem quæ manibus nō adhæreat reducito, & utitor. Malagma ex silphio, ischiadicis ualde præclarum. Ammij drachmas duodecim, silphij, seminis rutæ syluestris, baccarum lauri repurgatarum, singulorum unc. i. medullæ colocynthidis drach. ii. nitri, abrotoni, cardamomi, cuiusque drachmas quatuor, ceræ, adipis uitulini, ammoniaci thymiamatis, cuiusque sesquunciam. Arida liquefactis ab igne ablatis insperguntur, simulque in mortarium ad ammoniacum cū aceto tritū infunduntur. Quidam uero ammoniacum cum cera liquefaciunt, & ad cōpagem manus nō inquinantem redigunt. Aliud malagma, quo Theodorus proprium patrem curauit, quū ob dolorem suspicere non posset. Ceræ, picis liquidæ, aluminis liquidī, æquales partes accipe: liquecibilia liquefacito, & ad alumē cum aceto tritū affundito, emollito, ac utitor. Asclepiadæ, ad ischiadicis: facit & ad colicos: secureque in exacerbationibus exhibetur: scabiē etiam quam psozam Græci appellant, citra exulcerationē sanat. Ceræ, picis liquidæ, picis aridæ, cuiusque lib. i. sulphuris uiui, aluminis scissilis, nitri rubri, cuiusque sexuncē. Quæ eliquari possunt, eliquato, aridaque quā tenuissime trita paulatim adspergito, simulque in mortario posca madefacto cōmisceto, emollito, ac utitor. Quidā picē aridā & resinam pinus, ac cerā, per singulos dextantes sumunt, oleique sextantem addunt, ac reliqua, ueluti prædictū est. Ischiadicum mirabile.



mirabile. Thuris, euphorbii, ammoniaci thymiamatis, pyretri, picis, cere, singulorum quadrantem, resinæ pinus aridæ, sexuncem, olei cyprini sexuncem, fellis taurini quadrantem. Thus, euphorbium, ammoniacum, unumquodque per se quam tenuissimas in partes unâ cum felle terito: liquefabilia uero liquefacito, & pyretrum inspergito, eaque ad trita fundito, unitoque, ac utitor confidenter. Experimento constat. Melius autem apparatur, si ammoniacum quam tenuissime tritum liquefactis inspergatur, atque eo eliquato thus tritum adijciatur: euphorbium uero cum felle teratur. Unguenta & acopa, quæ neruorum lassitudinem in ischiadicis reficiunt. Ad coxendicum dolorem pæoniæ radicem in oleo ad triduum contusam accipito, & quarta die paululum coctam illinito. Ceterum præpurgandos eos scito, ex succi tithymalli guttis quinque tantum cum caricis acceptis, aut ex corticis tithymalli cremore. Corticem autem ipsum contusum & cribratum quatuor scrupulorum pondere in uino per integrâ noctem macerato: mane uero excolatum uinum præbeto. Aliud. Nycteri dæ herbam, quam unguentum Helenes appellant, oleo decoquito, & per diem unam in oleo manere sinito, percolatoque & illinito. Aliud, multo experimentero constans. Herinaceum terrestrem uinum in oleum confectum donec flaccescat coquito: deinde eo extracto, farinæ adarces sextantem oleo inijcito, & olei cyprini unciam, i. Vitor autem illito ex eo loco. Ceterum oleum ipsum in quo herinaceus coquitur librarum duarum pondus esto. Aliud ischiadicum, quod isotheon appellatur. Facit & ad resolutiones, & ad omnem neruorum per consensum affectionem. Castorii, opopanacis, euphorbii, cæsypii liquidii, ammoniaci thymiamatis, galbani, terebinthinæ, singulorum sextantem, medullæ ceruinæ trientem, styracis unc. i. olei styracini trientem, olei irini sexuncem, piperis unciam unam, ceræ libram unam, olei sicyonii lib. i. olei ueteris librâ unam, Ammoniacum, galbanum, opopanax cum uino terito: liquefabilia uero eliquato, & ab igne ablata reliquis affundito, ac probe unito: styracem uero in pila tridito, ac paulatim ex pharmaco ei addito: ubi uero dissolutus fuerit, cum reliquis unito, ac utitor. Acopon, ad ischiadicos efficacissimum est, quod inter communia acopa post articularia remedia refertur, & Orchestæ inscribitur: eo itaque confidenter utitor. Vtere, & similibus acopis ac unguentis quæ istis describentur. Inspergimur ad ischiadicos in balneo. Inspergimen ischiadicum efficax. Farinam lupinorum in balneo inspergito, & in exudatoria tabella prostratum sudare facito.

Aliud, facit & ad inueteratas affectiones. Costi, piperis albi, pyretri, cuiusque quadrantem, nitri unc. i. fecis uini ustæ lib. i. contusa in balneo inspergito.

Aliud. Costi quadrantem, pyretri quadrantem, nitri unciam unam, piperis albi, adarces, euphorbii, cuiusque unciam unam, fecis uini ustæ libram unam, samfuci sexuncem, contundito, cribrato, ac in balneo utitor. Hieræ, ad ischiadicos inspergimen lenitiuum doloris. Picis aridæ partes octo, sulphuris partem unâ, terito ac miscero, & præloto ægro dum corpus adhuc calet inspergito, & cum charta contegito, atque donec sua sponte decidat, sinito: nihil autem uetat ægrum lauare charta adhuc inhærente. Alia inspersio. Adarces, staphidis agrestis, canchryos, sinapis,

cardamomi, piperis, euphorbii, sulphuris uiui, cuiusque unciam unam, contundito, & cribrato: ægro uero inducto, & in secunda balnei domo reclinato, pallio prius ad tabellam substrato, ad dolentem locum inspergito, & contente adfricato: deinde in calidam desidere facito, & prolatum educito ac extergito, rursumque inspergimen inijcito & adfricato: postea uero dum adhuc calidum corpus habet, eiusmodi malagma imposito. Cineris caulium brassicæ ustorum quadrantem & unciam dimidium, cineris lignorum ficulnorum agrestium ustorum tantundem, picis aridæ libram unam, cineris lignorum uitis ustorum quadrantem & unciam dimidium, sulphuris uiui quadrantem, axungiae libram unam. Liberabitur enim æger, atque id breui ab omni dolore, ut incantationi similis facultas uideri possit.

De podagra, & arthritide, siue articulorum morbo.

Cap. VI.

Podagrica & arthritica affectio eiusdem speciei inter se existunt. Differt autem podagra ab arthritide non toto genere, sed affectis locis. In omnibus enim debilitas est articulorum diuturna cum fluxione. Quæ quidem si in pedibus perficitur, Podagra appellatur, si uero in aliquo coxarum uertebro, Ischias, hoc est coxendicum morbus nominatur. Si uero in multis corporis articulis innititur, Arthritis, siue morbus articularis uocatur. Contingit autem aliquando ut repente irruat malum æqualiter per omnes articulos dispersum: quod ipsum euenire consuevit, his qui consuetudine exercitia coaceruatim relinquunt, & licentiore diæta utuntur: ut plurimum uero clanculum & paulatim fluxus irruere solet, alteri enim cuiusdam magni digiti pedis articulum dolor inuasit, alijs uero calcanei extremum, rursusque alijs cauum pedis, aut ex calciamenti, aut ex consimilis rei affricu. Ceterum initio à pedibus sumpto, paulatim ad genua malum procedit, ad coxendicum item ac femorum iuncturas, deinde ad manus, singulis articulis particulatim affectis, quando sane proprie, ueluti prædictum est, arthritis & articularis affectio appellatur. Qui uero extreme ab hac affectione apprehenduntur, his & spinæ, uerteræ & costarum iuncturæ, & genæ dolent, aliquibus autem & iris siue corona pupillam oculi ambiens, neque est aliqua ossium conexio, quæ ab hac affectione sit immunis.

Causæ uniuersales.

Cap. VII.

Generant autem affectionem cruditates coaceruatæ, & ebrietates, atque his adhuc amplius immoderatus rei ueneræ usus: iam uero & deambulationes concitiores quam pro more, & stationes diutius productæ, & familiares excretiones suppressæ, & consuetorum exercitiorum intermissiones. Ut plurimum uero aptitudines à parentibus in filios ac posteros transferuntur. In uniuersum uero amplius omnium crudorum humorum multitudo affectionis causa existit, quod humorum multitudo affectionem inducit. Quando quidem igitur humorum multitudo in corpus digeritur, hiique ipsi ad pedes deferuntur, & in ipsis partes omnes distendunt, inflammationesque & dolores inferunt, manifestissimum sane id existit. Nam & tumore attolluntur affectæ partes, & uenæ sanguinis in ipsis apparent repletæ, & euacuatis ipsis in naturalē habitum æger reducitur. Verum multitudo influens non in omni



in omnibus æqualis existit. Etenim alij ex caliditate ægrotant, alij ex frigiditate, atq; exinde etiam refrigerando, aut calefaciendo, aut resiccando opem sentiunt. Quã ob causam membra fluore infestentur.

Posteaquam igitur humorum multitudo in corpore cõgesta, hominẽ molestia afficit, unumquodq; quidem membrum quod primum affectionem percepit, assilientem humorem à se repellit: eum ipsum uero suscipit aliquod ex uicinis membris ac subiectis. Itaq; quũ fortiora mēbra eum depellant, & imbecilliora suscipiant, id adeo citra intermissionem cõtingit, donec id quod propellitur ad omnium debilissimum membrum peruenerit, & in ipso permãserit. Vna quidem igitur fluidarum affectionum generatio hæc est, membris uidelicet fortioribus superfluum demittentibus, suscipientibus autem imbecillioribus. Cæterum articuli ipsi ex assiduo motu debiliores redduntur.

*Quare in quibusdam magnus sit morbus, in alijs uero paruus.*

Cap. VIII.

Magnitudo morborum ex fluxionibus obortorũ ad humorum influentium multitudinem consequitur. Si enim plures humores fuerint, maior etiã affectio contingit: si pauciores, minor. Cæterum multorum recrementorum influxus ob multas causas accidit. Etenim & copiam humorum multam esse oportet, & uias latas per quas feruntur, & partem quæ à fluxu infestatur raram, & facultatem in ipsa debilem: & membrorũ eum delegantiũ uires fortes, quo magna affectio fiat. Verum si paruus futurus est morbus, prædictis contraria omnia cõcurrere oportet.

*Quare multo tempore aut pauco morbus duret.*

Cap. IX.

Porro ut multo tempore aut pauco morbus duret, etiã prædictis sunt causæ, tenacitasq; insuper & crassitudo humorũ. Etenim sanguis multus & crassus, densa pellicula conclusus, & à utribus debilibus segniter correctus, tempus auget & producit. Qui uero cõtrario modo habet, minuit & breuius facit. Ceterũ & in alijs corporis affectionibus, siue in superficie sint, uelut erysipelates: siue sub cuticula, ut herpes: siue in carnosissimis partibus, uelut inflammationes, recrementa ut plurimum feruntur. In podagricis autem & arthriticis appellatis, usq; ad iuncturas per alũ repletio ex fluxione cõtingit, unã cum hoc quod nerui permadescunt & distenduntur, itemq; ligamenta & pelliculæ, omniaq; circum circa sita: atq; ob id sæpe usq; ad quadragesimum diem morbus extenditur. Etenim quum etiam cessauerit fluxus, neq; amplius ex supernis feratur, repletæ adhuc multo humore existētes iuncturæ, eũ ad circumfusa mēbra delegāt. At uero si tenuior sit fluxus, celerrime ægri sanantur, nisi male omnino curentur. Quod si uero quis ex medicis ueram methodũ ignorātib; per resoluentia semper omnes inflammationes curet, non in quadraginta tantũ dies, sed & in quadringentos, & in omnem reliquam ægri uitam inflammationes extēdet. A mala enim curatione podagricis pleraq; mala accidunt, maxime uero calli & artuũ duricies, & articularũ curuitates ac cõtractiones, propter medicorũ ignorantiam fiunt, qui neq; per uenæ sectionem, aut purgationem euacuant, neq; redundantem in uniuerso corpore humorẽ, quiq; ad iuncturas deferretur, & proinde articularũ morbos producit, per

ea quæ moderate adstringāt repellunt. Quidã enim ex ipsis inflammationes immodice resoluunt, tũ per aquæ & olei mixtionem, tum per cataplasmata ex cruda ordeacea farina apparata, attrahuntq; per cataplasmatum caliditatẽ humorũ copiam ex subiectis locis. Quin & ob hanc ipsam inductam laxitatem, affectas partes debiliores, & ad recrementorum susceptionem aptiores reddunt.

*Quæ sit incuruatorum articularum causa.* Cap. X.

At uero alij medici immodice refrigerant, alij autẽ uehementer discutiunt. Ex quo sanẽ neruosas partes in spissari contingit, incuruariq; & distorqueri, ob redundantium uidelicet humorũ susceptionem. Contingit item callosas & calculosas coactiones in ipsis emergere, & neruos spontaneo motu se mouentes congelari, ligamenta item & neruos qui tendines appellantur, qui sanẽ aptissimi ad hoc perferendum censentur, propterea quod substantia ipsorum densa & solida existat.

*Quæ causa generationis toforũ in artubus.* Cap. XI.

Generatio quidem igitur toforum siue callorum in artubus induratorum, materiam quidem habet crassos humores, causam autem efficientem, qualitatem calidam & siccam. Quemadmodum uidere est & in tofis: qui in æreis uasis ex limosæ aquæ incoctione generantur. At uero pharmaca quæ ualde refrigerant, si assidue adhibeantur, nō solum crassos humores congelant, sed & tenues. Quemadmodum uehementissimum frigus cõgelat aquam. Quæ uero acuatim & immodice discutiunt, id quidem quod tenuis in ipso fluxu est, euanescere faciunt: quod uero reliquum est, inspissant & conglutinant: atq; id eo amplius, si ad hoc quod discutiūt, etiam immoderate calefactoriam habeant facultatem.

*Quæ causa sit cur inflammationes in podagricis*

*non facile suppurentur.*

Cap. XII.

Causa cur podagricæ inflammationes nō facile suppurentur, primũ quidem est affectarũ partiũ substantia, tũ natura, tũ pro more egre permutabilis existens. Ad hoc enim quod natura duræ sunt neruosæ partes, etiã tolerandi cura angũtur ea quæ molestiã inferre possunt, præsertim tamen pedum & manuũ extrema, quin & carne nudatæ magis hæc sunt partes minusq; calidæ & humectæ, & ob id etiã reliquis partibus frigidiores: imò & influentes in podagricis inflammationibus humores corruptioni minus sunt obnoxij, & pharmaca similiter adhibita inepta sunt ad putrefactionẽ ac suppurationẽ. Etenim alia ex eis refrigerant & repellunt, alia uero discutiunt, alia autem resiccant. Contingit tamen aliquando in quibusdam inflammationẽ aut suppurari, aut erodi. Quum enim crassus humor uehemẽter fuerit cõdensatus, & deinde non ita uehemẽter, sed moderate calefactus, necesse est ipsum suppurari. Acri uero & erosiuo humore influente, erosio contingit, quemadmodum & marcor in quibusdam succedit, irruente uidelicet in membrum humore qui putrefacere potest: quamquam raro hæc in podagricis contingant.

*Quomodo ex inflammationibus & consequentibus accessionibus, siue symptomatibus, affligens humor cognoscatur.* Cap. XIII.

Quomodo quidem uniuersi corporis intemperiem cognoscere & curare oporteat, iam antè in quarto Sermone est præscriptum, huius uidelicet tractationis;



tionis. Quomodo uero quis inflammationes in partibus inflammatis consistentes cognoscere possit, necessarium & hic paucis referre. Apparet autem id ex eis quæ accidunt & consequuntur: quæ si quidem frigida fuerint, frigefaciunt: calida uero calefaciunt: mixta autem mixtas etiam signorum species inducunt. Quo uero manifestior fiat hic sermo, quæ iam dixi, reperam, singulatimque retractabo.

*Sanguinei humoris influentis signa. Cap. XIII.*

Humor sanguineus si multus fuerit, & circa summam caliditatem moderatus, repletionem efficit, & tumorem ingentem: non uenarum modo, sed totius membri affecti circa cutem: eumque calidum quidem moderate, uehementer autem rubentem, pulsus autem adest in alto inflammationis mediocris. Qui hoc modo sunt adfecti, neque refrigerantia neque calfactoria ualde præsidia adhiberi sustinent, & assidue ac continue exacerbantur, quando quidem assidue & æqualiter sanguinis allatio contingit, quanquam & per circuitum quidam irritatione uexentur, quum non continue sanguis defertur, & exacerbationum accessiones omnino quotidie fiunt, uerum non ita durant ueluti hæ quæ ex pituita oboriuntur. Urinæ uero eorum qui sanguine redundant, fuluæ sunt, & mediocri crassitudine præditæ: aliquando etiam subsidentia albâ, aut nubem, aut tale quiddam in medio pædens quasi suspensum habentes. Quod si magis ad pituitam declinet sanguis, albiores & crassiores: aliquando uero & conturbatæ reperiuntur urinæ, & multum est quod in eis subsidet. Venæ autem in his ampliore sanguine suscepto replentur, & in tumorem attolluntur. Aetas uero ab adolescentia usque ad ætatem uigoris apta fiet ad multitudinem sanguinis producendam. Edulia ite boni succi & quæ maxime alunt: & exercitia moderata. Ex temporibus uero, uer, & regio temperata.

*Biliofi fluxus signa.*

*Cap. XV.*

Quod si uero biliosus sit fluxus, color cutis inflammati loci, aliquando quidem flauior quam secundum naturam apparebit: aliquando uero rubore cum flauo permixto, quando uidelicet flaua bilis sanguini est permixta. Caliditas autem uehementissima & feruentissima adest, quæ amplius refrigerantibus pharmacis gaudet. Qui enim ita habent, uehementer a refrigerantibus iuuantur medicamentis siue actu siue potentia talia existant. Exacerbationes uero his per tertium quenque diem mouentur, & præcípites quidem irruunt, citius uero uigorem remittunt: per uentrem enim & per urinam recrementa superflua his euacuantur: per cutem etiam transpirant, utpote quæ tenuium partium existant. Lotia eorum subflua sunt, & subflaua: quandoque etiam acria, ut in mictione urinarium arrodant meatum. Curæ autem ingentes, & iræ, & uigiliæ, & illuuiæ multæ, & fatigationes, & diæta omnis bilem gignens & attenuatoria, ex acribus uidelicet & salis edulij, huius humoris influxum præcedunt. Aetas uero & temperies corporis calida & sicca ad eum apta est. Hora autem siue anni tempus æstiuum: consimilis item regio,

*Pituitosa fluxionis signa.*

*Cap. XVI.*

At uero si pituitosa sit fluxio, ad digitorum appressiorem cauus sit tumor sublaxus existens & moderatus, & color dolentis membri albus. Dolores uero aliquando quidem fortes, aliquando uero mediocres, & exacerbationes quotidie paulatim irruunt & au-

gentur, & per plures horas durant, & breuem intercapedinem habent: imò neque unquam integre remittunt. Aetas autem hoc modo amplius afficitur senilis, & temperamentum humidum & frigidum, & consimilis ambientis nos aeris status, & tempus hybernum. Aliquando autem & frigoris sensum in alto locorum affectorum ægri perceptant. Vita uero ociosa & socordia ad pituitosi humoris generationem plurimum conferunt. Edulia item refrigerantis & humectantis ac inspissantis facultatis, & balnea à cibo, unde & urinæ crassissimæ ab eis prodeunt, & sæpe conturbatæ reperiuntur. Atque hæc quidem signa sunt pituitæ natura frigida prædominantis. Nam & hæc ipsa proprie pituita appellatur.

*Salsæ pituitæ signa.* Cæterum si salsæ pituitæ fuerit influxus: color membri affecti & tumor eodem modo habent, ueluti de pituita est prædictum. Pruritus autem maximus & mordacitas infestat locos. Urinæ uero tum his tum prædictis, aliquando quidem tenues & aquosæ, aliquando uero crassum in eis est quod subsidet, suntque conturbatæ.

*Bilis atræ influentis signa.*

*Cap. XVII.*

Quod si ex atra bile sit fluxus, qui sane potentia frigidus est & siccus, quod raro tamē contingit, frigoris sensus quandoque affectis adest, & corpora in profundo uelut atterantur aut scalpantur afficiuntur. Colores uero tumorum nigriores sunt, & circuitus exacerbationum per quartum quemque diem redeunt. Sunt autem exacerbationes tum magnitudine, tum impetu mediocres. Aetas uero quæ magis hunc fluxum generat, est uigore inclinata, & uergente: temperies autem frigida & sicca, & natura quidem superfluitates pituitosas generat, non autem atræ bilis. Quæ uero ex degenerante & mutata caliditate fit, flaua bile superassata & nigram generante oboritur. Præcedit porro hunc fluxum diæta ex edulij atræ bilem gigneribus, & lassitudines immodicæ. Regio autem ei apta est frigida & sicca. Tempus autumnii, & consimilis aeris status. Urinæ uero ut plurimum in principio tenues eis sunt & aquosæ propter obturationes: postea uero quam secundum naturam atriores, & modicè crassæ, & quod subsidet in eis aliquando fuscum est, aliquando uero mixtum, subcruentum uidelicet & fuscum reperitur.

*Serosarum fluxionum signa.*

*Cap. XVIII.*

Si uero serosa recrementa influant, dolores non ita magnos inferunt, quemadmodum etiam neque fluxu infestatas partes in tumorem ualde excitant. Secundum speciem uero consimilia perficiunt, qualia humores solent, qui cum eis eiusdem generis existunt. Pituitoso enim sanguine demanante, serosa in ipsa pituita recrementa, consimiles quidem secundum speciem dolores inferunt, secundum magnitudinem uero multo minores. Vbi uero alij humores defluerint, consimiles etiam illis serosæ ipsorum superfluitates inferunt dolores.

*De his qui ex humorum complexu fluore infestantur.*

*Cap. XIX.*

Nosse perro operæ precium est, quod aliquando fluxus fluxui commiscetur, aut calidus frigidus, aut uicissim frigidus calidus, & secundum utriusque horum qualitatem exacerbationes fiunt, & contingeret quandoque ægrum bis in die exacerbationum accessiorem sentire.

*Diæta*



*Dieta & cura podagricos præseruans. Cap. xx.*  
Qualis quidem igitur diæta unicuique prædictarum temperierum cōueniens sit, iam antè prædictum est in quarto huius tractationis Sermone: superfluum uero est eadem bis scribere. Cæterū ad ea quæ istic relata sunt, uomitus in uniuersum ferè omnibus qui podagricam affectionem defugere uolunt, commo- di sunt, præterquàm eis qui thoracem & caput, quæ facile læduntur, habent. Quibuscunque igitur ex exercitijs, aut alijs quibuscunque motibus, recremen- ta in uērem cōfluunt, his uomitus ante cibum pro- dest. Qui uero sanguinis copiam aggregarunt aut humores pituitosos, post acceptum cibum uomant per aliquot dies. Venus uero omnes podagricos ex- treme lædit, & præsertim si assidue aut intempesti- ue ea utantur. Etenim uoluptas per se neruorum corporum robur & firmitatem dissoluit, multo ue- ro magis si cum uehementi motu perficiatur, & ob id mēbra affecta longe imbecilliora fiunt, & prom- pte ac expedite confluentia recrementa suscipiunt. Adhibetur tamen eius usus aliquando, propter con- suetudinē uitiosam semine plurimum iritātē: quum uidelicet multi & noxi fuerit humoris. Generatur autem tale in naturis proprie muli seminis appella- tis, & oportet sanè, quo molestiā eius uitemus, pro- hibere ne eius copia in seminarijs uasis generetur. Quomodo uero seminis generationem prohibere oporteat, iam prædictum est in eo qui hunc præces- sit Sermone.

*De olei & salis affricatu in podagricis. Cap. xxi.*  
Operæpretium porro est nosse, quod omnes qui se, ne in podagricam affectionem incidant, adseruare uo- lunt, & præsertim eos, qui humecta & frigida na- tura sunt, magnifice iuuant sales cum oleo quàm te- nuissime triti & affricati, nō quidem tempore inflā- mationis & doloribus instātibz, sed quum hæc re- mittunt: nisi uehementē sicca temperiē ægri sint præ- dicti. Omnibus enim qui hoc modo fricātur, insitus calor augetur, & quod præter naturā est discutitur, recrementaꝑ consumūtur, & affecta membra fiunt robustiora, ac aduersus affectionem firmantur, mi- nimeꝑ ei obnoxia redduntur, maxime si diligenter singulis diebus mane & uespere, ubi dolores, quæ- admodum dictū est, remiserint, per omnem uitā hoc præsidio utantur. De quo sanè ausim confidenter pronunciare, inquit Philagrius, quod etiam solum sufficiat his, qui uel maxime circa diætā delinquūt, aut immodice refrigerātur, aut ægrotant ex labore, aut re uenerea nimis sunt usi, aut quæcunque aliū for- tem excessum admiserūt: quare omnino postquam inflāmationes quieuerint & dolores, eo utēdum est.

*Vniuersalis methodus curationis podagri-  
corum. Cap. xxii.*

Itaq; prius dictis rursus in memoriā reuocatis, pronū- ciamus & membrorū debilitatem, & humorū co- piam, primas causas omniū fluidarum affectionum esse, præcipue tamen podagræ & articularis morbi. Quare duplex etiā sanationis scopus nobis præfige- tur. Euacuatio redūdātis humoris & corroboratio partiū debilitatarū. Euacuatio itaq; fiet aut per uenę sectionē, aut purgationē. Post uniuersalem autē eua- cuationē, calidi quidem fluxus refrigerationē amāt, frigidi uero calefactionē: humidi resiccari, sicci hu- mectari gaudent. Et tenaces quidē ac uiscosos discin-

dentibus & extergentibus curare conuenit, crassos uero tū eisdem, tum quæ amplius attenuatoriā uim habēt, acres uero per ea quæ mordacitatē obrundere possunt. Amplius autē ea quæ assidue influunt, per repellentia prohibēda sunt, itemꝑ per ea quæ resic- cant. Quæ uero per circuitum iritāt, quum quidē in- fluunt impedienda, quū uero nō deferuntur, tum sa- nē ea quæ iam illata sunt, euacuationē requirunt, ad quā iudē debilitatarū partiū corroboratio accedat.

*Cura eorū qui ex sanguinis copia ægrotāt. Cap. xxiii.*  
Quū igitur sanguinei humoris fuerit influxus, & do- lor mediocris, qui neq; calore suo neq; frigore mani- feste infestet, locus inflammatus pharmaco quidem fortiter adstringente, modice autem resiccātē illina- tur, eiꝑmodi autem est id quod ex acaciā & utroꝑ ueratro apparatur. Abstineat autē æger ab omni ci- bo & motu, & uini etiā potu. Et si fluxionis impe- tus non ualde magnus fuerit, & pharmacum adhi- bitum cōmoditatem suā ostenderit, rursus cū passo tenuis substātiæ aut posca large dilutū quo strigmē- tosum reddatur, illinatur. Cæterū neq; aqua neq; oleū pedibus adhibeatur, sed & si illiū abluere oporteat, quo uidelicet aliud illinatur, posca mediocriter tepe- facta abluatur, aut cum plātæ alicuius austerę deco- cto, usq; quo id quod influxit sedetur. Cataplasma ob id etiam imponendum ex malis maxime coto- neis, aut mespilis, sorbis, cornis, hippuri, sangui- naria, aut folijs quercus tenerioribus, singulis pane permixtis & uino ueteri maceratis. Idē uero ipsum & per alia quædam eiusdem materiæ existentia con- fieri potest. De quibus rursus postea sermonē repe- temus. Porro si sanguinis motus in uniuerso corpo- re uehementē inualuerit, utendū nihilominus prædi- ctis pharmacis, ne uidelicet particula repleatur, & dolores fortes ac diuturnos inducat. Euacuatur autē id quod ex sanguine redūdat, quārum sanè id uires & affectio permittunt, & maxime si qui continetur sanguis bene sit temperatus, & homo ipse ad sangui- neas euacuationes sit aduēfactus. Cognosces uero sanguinis imperiū, tum ex tumore præter naturā, tū ex doloris magnitudine & uelocitate. proportiona- biliter enim tū ad copiā sanguinis, tum ad allationis eius modum, imperus ipse cōtingit. De sectione ue- næ. Eos igitur qui multo sanguine abundāt necessa- rio secta uena fortiter euacuabis, non solū semel, sed iterū atq; iterū & pluries detractiōe paulatim repe- tita. Si enim uenæ sectione omissa, repulsorij phar- macis fueris cōfusus, magni mali autor eris. Ex igno- bilibus enim mēbris ad principalia & uitæ necessa- ria sanguis repulsus, deinde in aliquod horū irruēs, uelut in hepar, aut septū transuersum, aut thoracem, aut pulmonem, aut in ipsum denique cor, pro mor- bo mortem inducit. Quapropter maxime necessa- ria est sanguinis ac reliquorum humorum in san- guineis influxionibus euacuatio, præsertim in his qui sanguine redundant, itemꝑ reliquis humorum recrementis, ac lautiore diætā utuntur. In his enim antequam dolores oboriantur, uenam secare opor- tet, bis in anno sanguinem large detrahendo, & pur- gare quoque eosdē, si licet modo per singulos men- ses. Cæterum in omnibus diei horis uenam secare cōuenit his qui uehementibus doloribus sunt appræ- henſi, adeo ut etiam si quis pransus sit, nihil ueritus tamē uenā secare possit, atq; id maxime si ex uētris

H locis

a grandio



locis cibus ad intestina fuerit dilapsus. Vbi uero in uentre adhuc cibus detineatur, euacuatione prius per uomitum facta, ita paulatim sanguinem detrahes. Secunda est autem è directo cruris fluxione infestati uena praesertim in brachio inferna, ita tamen ut obseruemus in eius sectione subiectam ipsi arteriam. Si uero haec non appareat, media, ita ut & in hac obseruemus subiacentem neruum. Quod si uero manus dextra dolore infestetur, uenā in dextro crure secamus, iuxta talos aut poplitem, aut plātam pedis: post sectam uero uenam si dolores adhuc perferuerent, & fortis tensio sit in affecto membro, saepe in ipso inflammato crure uena incisa, & multo sanguine detracto, hominem ab omni dolore liberaui. Memini itaq; inquit Philagrius, cuidam in quo humores aequaliter omnes & multus in primis sanguis redundabat, bis sanguinem ex secta uena detractum, in quo manifeste cognoui quantam uim habeat uena è directo membri affecti secta. Quū enim dexter pes ei fluxione infestaretur, uena dextre manus iucisa, confestim à molestijs est liberatus: quūq; tribus interpositis diebus alterum item crus fluxus infestaret, uena sinistrae manus secta, similiter à dolore liber euasit. & quum inde pharmaco ex croco curaretur, perfectam sanitatem recepit. Verum hic quemadmodum praedictum est, multo sanguine redundabat, & uniuersum corporis habitum eiusmodi habebat, qui non facile posset exolui. In his uero qui contrariam huic corporis dispositionem habet, parcè sanguinem detrahare oportet.

*Quod eleuatas & incuruas uenas ex mēbris fluxione infestatis, ueluti in uaricibus, auferre oportet.* Cap. xxiiii.

Operæpretium est, inquit Rufus, etiam alios auxiliorum modos excogitare: Ego quidem igitur articulis pedum fluxu infestatis, laudo si quis uenas quæ ex supernis in pedes deferuntur excindat, ueluti uaricosa in suris excindi solent. Etenim partes hæ tempore praesertim inflammationum apparent in tumore eleuatae, & uenæ circū circa rubent, & sanguine repletæ cōspiciuntur, atq; qui ita affecti sunt, magis à dolore uruntur, & frigidis gaudēt. Si igitur quis uenas ueluti in uaricibus excindat, multitudo sanguinis non amplius influere & inflammationem facere, quemadmodū antea consueuit, potest, atq; id praesertim in sanguinea podagra conducet. In alijs uero articulis, utpote coxendicibus ac cubitibus & similibus fluxu infestatis uenæ non ualde apparēt. Quod si contra contingat, etiam in his eas quæ altius eleuatae sunt, excidere oportet.

*De perustione in morbo articulari.* Cap. xxv.

Crustas igitur inurere oportet, aliquas quidem paulo altius loco fluore infestato, aliquas uero propius, atque id cauterijs facere praestat, aut si id aeger ferre recuset, cum medicamentis. Longe autem praestantior est cauteriorum usus: nam & citius & siccius perurunt. In uniuersum uero pedibus ex fluxu infestatis, loci circa utrumq; talum forinsecus & intrinsecus inurendi sunt, cauterijs iuxta magnas ibidem sitas uenas admotis, paulo altius supra talorum locum. Inurendus item locus inter magnum pedis digitum & eum qui ei proximus est, medius, ubi sane uenæ magis tumefactæ cōspiciuntur, praesertim ex eis maximæ. Quibusdam autē & articulos ipsos

perurere expedit, quū submucidi ualde cōspiciuntur, priusquam durities ad modum toforum in eis generetur. Sciendum tamē, inquit Rufus, quod in articulo submucidorum perustione, ulcera ægre curabilia oboriuntur, uerum ubi cicatrices coaluerint, maximum robur ipsis articulis praebent, ut nō amplius ad suscipiendum influentia recrementa sint apti. Et de his quidem haecenus. Oportunum autem & iam reliquam curam post sanguinis euacuationem aptam describere.

*Cura in fluxibus sanguineis post sanguinem euacuatam.* Cap. xxvi.

Post sanguinem euacuatū affectam partem aceto ueteri tenuium partium cum rosaceo rigare oportet, & praesertim si in alto herere dolorum causa uideatur. Etenim acetum propria sua tenuitate usq; in altum progressum, expeditam rosaceo uia exhibet, quod natura sua dolores lenire potest. Cæterum si in superficie dolor consistat, per uini & olei usum magnopere iuueris, æstate quidem tepidorum, hyeme uero calidorū. Deinde etiā cataplasmatibus utendum quæ inflammationes lenire possunt, citra hoc quod prouocent & proleclēt fluxiones. Talia autem sunt, farinae fœni græci & hordei, fabarumq; & cicerum tritæ uino coctæ, potest etiam aqua modica affundi, ubi uinum nimis forte extet. Quin & passo ac modico rosaceo unaquæque ex praedictis farinis cocta dolorē mitigare cōsueuit. Oportet autē cataplasmata omnino semper calida esse: quod cōmode fieri potest, si assidue permutentur, & lana forinsecus contingantur. De pharmaco ex croco. Quum itaq; praedictis praesidijs adhibitis uehementes compescuerimus dolores, parū quiddam de pharmaco ex croco ammiscibimus & praesertim ad cataplasma ex fabis apparatus, ne uidelicet coaceruatim trāsitus fiat: Deinde etiā amplius quid de pharmaco ammiscendū est. postremum uero pharmacū ipsum cum rosaceo dissolutum, & ad bonam compagem redactū imponeamus: diffluit enim celerrime, si liquidius fiat. Hoc itaq; pharmaco sepe post euacuatū sanguinem, dolorib; ualde imminutis statim usus sum, loco prius ex aceto rosaceo perfuso: multam enim utilitatē & breuī ostendit: quare ipso assidue ad podagricos utimur, utpote quod laude dignum experimētum nobis exhibuit, inquit Philagrius. In pluribus enim solum hoc suffecit ad perfectam curationem semper quidem cū rosaceo dissolutum, aliquando uero uino tenui & fuluo ammixto, quantum sanè eius conquaassando & excipiēdo pharmaco satis fuit. Cæterum hoc ipsum in his faciendum est, quibus adhuc aliquid ex fluxione ad inflammatū locum defertur. Quandoq; autem pro uino acetum addimus, maxime ubi tum quod infertur repellere uolumus, tum discutere iam in loco cōtentum. Passum etiā aliquando pro uino additū mollibus corporibus profuit. Verū enim uero & ad pastillū ex acacijs & ueratri apparatus, adiectū hoc pharmacum saepe quod influit prohibendo, & quod adest euacuādo, & membrum confortando, non parum iuuat. Solum item post sedatos dolores durius impositum robur paribus addit, ut adstricta & recrementorū influxui minime obnoxia, ac breuī fortia reddantur. Hoc quidē igitur medicamento uarie & multiformiter usi sumus, multosq; iuimus, tum instante dolore, tum etiam



etiam eo sedato. Habet enim repulsoſiam uim, pau-  
cam quidem illam, propter acetum & crocum. Ha-  
bet & concoſtoriā & diſcuſſoriā ac moderate re-  
ſiccantem, rurfus ob crocum & galbani thurisq; &  
ammoniaci thymiatris ammiſtionē. Diſcuſſoria au-  
tem tum in his ipſis ſita eſt facultas, tum in pice & a-  
ceto. Merito itaq; podagricis inſlāmationibus con-  
uenientiſſimum cenſetur. Nam & fluxū moderate  
repellit, & calfaciendo ſenſim concoquit, & conten-  
tum diſcutit, & debilitatis membrīs firmitatem in-  
ducit. Cōpoſitio autem hoc modo habet. Galbani  
drachmas x x x i i, thuris drachm. x x x i i, croci dra-  
chmas ſedecim, ammoniaci thymiamatis drachmas  
quadraginta octo, ceræ drachmas nonaginta octo,  
piciſ aride drachmas c c c c c l x x v. olei roſacei dra-  
chmas quadraginta octo, aceti albi acerrimi heminā  
unā. Ceram, picem, roſaceum lento igne liquefacta  
excolato: galbanum autem & crocum, ammonia-  
cum, thus, cum aceto terito, & ad liquefacta & ab i-  
gne ablata in cacabum adiſcito: unitaq; in mortariū  
quod modicam aquam frigidam habet, diſfundito,  
& ſufficienter emollita extrahito, ac quēadmodum  
prædictum eſt utitor. Hoc quidē modo Philagrius  
apparare pharmacū ipſum præcipit. Quidam uero  
poſt eum etiam opij uncia unam, ad hanc cōpoſitio-  
nem adiecerunt, eoq; ad uehementes dolores ſedan-  
dos uſi ſunt. Alij autē uſus tempore inſtante parum  
quiddā opij addunt ad maximos cruciatus compe-  
ſcēdos. Paſtillus ex acacijs & ueratriſ. Porro ex aca-  
cia & ueratriſ pharmacū hocce eſt. Paſtillus poda-  
gricus admirabilis ad podagricos & morbu articu-  
larē, inſlāmationeſq; & omnia pruriginofa: in prin-  
cipio enim illitus manifeſtā utilitatē exhibet, ut ea-  
dem etiā die lotus æger deambulet. Vbi uero dolor  
in uigore eſt, incōmode adhibetur. Quidā enim in  
uigore affectionis eo uſus, cōſeſtim quidem ſibi in-  
de iuuari uiſus eſt: paulo uero poſt concalefacto &  
reſiccato loco, à maximis doloribus æger apprehen-  
ſus nos accerſiuit, quare quum acceſſiſſemus & didi-  
ciſſemus factum, cognouiſmus quod membra in ſu-  
perficie poſita contuſionis modo affecta eſſent, tum  
ob inſlāmationem, tum ob exortam ex pharmaco  
adſtrictionem & diſtentionem. Diſtentionē autē erant  
& in profundo ſitæ partes ex cuticulæ exterioris ad  
interna impulſu. Abluto igitur prius cum aqua ca-  
lida illito paſtillo, cataplaſma ei imponi iuſſi ex a-  
qua mulſa dilutiore apparatus, & ex oleo modico  
dulciſſimo, farinisq; ſœni græci & fabarū, atq; hoc  
ipſum feci propter eam quæ ex ipſo pharmaco ei cō-  
tigit oppilationemq; & conſtrictionem: quum ue-  
ro dolores eueſtigio eſſent ſedati, à reſoluētibus diſſi-  
ceſſi: etenim cataplaſmata & irrigationes in fluidis  
diſpoſitionibus adhibita incurabilem reddunt mor-  
bum. Verum paſtilli ipſius cōpoſitio hoc modo  
habet. Acaciæ nigræ drachmas triginta duas, acaciæ  
flauæ ſatundem, glutinis fabrilis pellucidi, aut quod  
magis expedit, glutinis piſcium drachmas triginta  
duas, ammoniaci thymiamatis drachmas ſedecim,  
glauci drachmas ſedecim, aloës drachmas ſedecim,  
thuris maſculi drachmas octo, ueratri albi & nigri  
cuiuſque drachm. viii. Aceto ſcillitico trita cogito  
in paſtillos. Uſus uero tempore eoſdem in aceto eo-  
dem liquefactos illinito, & exicare permittito, æ-  
grumq; in balneum demittito, & ubi inde redierit,

ſimiliter utitor. Totū paſtilli pondus drachmarum  
cētum & ſexaginta octo eſt, hoc eſt unciarum x x i.  
Hoc pharmacum podagricis inſlāmationibus in-  
choantibus cōuenit, & ſolū ſufficit, ſi nō multitudo  
fluxus redundet: & multo amplius, ſi per plumbi  
ſuccum fuerit diſſolutum & liquefactum. Fit autem  
plumbi ſuccus hoc modo. In mortariū plumbeū  
ſuccum aliquem refrigerantem ſimul & adſtringen-  
tem inſcico, & cum piſtillo plumbeo in ſole, donec  
craſſior reddatur terito, atq; ita inſectum paſtillum  
& contritum illinito. Sit autem ſuccus ipſe planta-  
ginis, aut oxylapathi, aut ſanguinariæ, aut uuæ acer-  
bæ immaturæ, aut ſemperuiui, aut aliquarum con-  
ſimilium herbarum, quæ & ipſæ commodæ ſunt  
in principijs inſlāmationum. Hoc ipſum itaque  
pharmacum ex plumbi ſucco, non ſolum in princi-  
pijs & progreſſu, ſed & in uigore malī aliquando  
commodum exiſtit. Et Philagrius quidem hoc mo-  
do de paſtilli uſu ſcripſit. Quidam uero paſtilli ex  
croco ad dyſenteriam deſcripti, atque huius ipſius  
pares partes aceto aut plumbi ſucco terunt, & dua-  
bus ante balneum horis illinunt, atque ubi lauerint,  
à balneo rurfus ſimiliter illinunt, & egregium teſti-  
monium huic uſui præbent. Diæta eorum qui ob  
ſanguineum fluxum ægrotant. Inſlāmationes ex  
ſanguinis influxu obortas, quēadmodum dictum  
eſt, curare oportet. Cæterū cibos eis exhibere opor-  
tet qui minus nutriunt. Quales ſunt holera, & ſpi-  
noſæ plantæ: & ex uolucris, montanæ: ex piſci-  
bus uero, qui in petroſis aquis degunt. Aluum uero  
facile ſubeuntem habere oportet, & ſi quidem offi-  
cio ſuo non ſua ſponte fungatur, ſimpliciori aliquo  
clyſteri ſeu inſuſo eluatur.

*Cura eorum qui neq; uenæ ſectionem, neq; purga-  
tionem ſuſtinere poſſunt.* Cap. x x vii.

Quandoquidem uero quidam adeo formidoloſi ſunt  
& mollicie fracti, ut neq; nomen uenæ ſectionis aut  
purgationis audire ſuſtineant, non melius tantū, ſed  
& fortunatius eſt nullū talem contingere. Et tamen  
ſi ad curandos eos cogamur, prædicere oportet diu-  
turnos dolores eis affuturos, & uigilias, articulo-  
rumq; torturas & claudicationes, præſertim ſi craſ-  
ſus & multus ſit ſanguinis influxus. Abſtinentia qui-  
dem igitur ciborū illis conſtituenda eſt, & clyſteres  
moderate fortes inſcicendi, & pharmaca umbilica-  
ria imponenda, epomphalia Græcis appellata, quæ  
ſanè umbilico impoſita aluū ducunt. Vtendū etiam  
his quæ ſedi apponuntur, glādulis uidelicet, uelut eſt  
cyclamini ſuccus, & elateriū, & ſimilia, quorum in  
tertio Sermone feci mentionē. Vtendū & poſt aluū  
exolutā, unguētis diſcuſſorijs, & fricationibus eiuf-  
dem generis, & omnibus quæ ſuperfluum euacuare  
poſſunt ex locis fluxu inſeſtatis. Etenim repulſoria,  
ſi nō prius uniuerso corpore euacuato aſſumantur,  
periculū inducunt. Cataplaſmata igitur eis impone-  
re oportet ex pane, fabacea, & ſœnigræci, ac cicerū  
farina, cū aqua mulſa aut adipe ſuillo non ualde ue-  
teri. Scarificationibus itē iuxta affectū locum uten-  
dum. Irrigare autē aſidue oportet ex aqua & oleo,  
& aliquādo cataplaſmata ex lixiuio apparare, quo  
per eroſam cutē, ueluti per riuos malū euehatur. Hu-  
iuſmodi hominibus cōueniūt item ceratorū formā  
habentia medicamēta, ex oleo ſicyonio, nitroq; &  
cera apparata, quæ humorē ad locū delatū diſcutere  
poſſunt,



possunt. Pharmacum ex lixiuio & spuma nitri digere ac exhaustis inspissatos humores, est autē pharmacum ipsis cōmodissimum, & facile parabile: excitat bullas, & cutē erodit. Spumæ nitri albæ quam achelesiam appellant, drachmas uiginti quinque, terebinthinæ drach. triginta sex, olei drac. cccc lxxx. lixiuij ficulnei, hoc est, exustis lignis & aqua extinctis, loturæ eorum percolatæ drachmas octoginta quatuor, ceræ drachmas cccxl. Oleū, ceram, terebinthinam, & lixiuiū, hoc est aquam ipsam, ut prædicti, coquito, & quum pars maxima aquæ fuerit consumpta, spumā nitri prius tenuissime tritam adijcitur, uncto, ac utitor. Huiusmodi sanè sunt inflammationum podagricarum ex sanguine curationes.

*De his qui ob bilis influxum egro-*

*tant.*

*Cap. xxviii.*

Quod si uero inflammationes ob biliosum influxū fiāt, tum & in his cōmunis scopus euacuationis adstringētis humoris existit. Fiant autē euacuationes in principio, tum per uomitū, tum per uentrē. Danda itaq; pharmaca bilem educētia, ex quorū numero aliqua per utramq; uia bilem exigunt, uelut est rhlaspi: hoc enim acerabuli mensura potatū & superne & inferne purgat, atq; tantū sanè de eo semine ad summum datur. Constat autē quod & purgatoria medicamēta ex scammonia apparata flauam exagitant & euacuant bilem: horū uero compositiones iam antè retulimus in tertio Sermone. Faciemus tamen & in hoc Sermone quorundā mentionem, sed paucorum & paulo post. Purgare igitur eos oportet confidenter, & secundaria uice, si res ita postularit: confestim enim in euacuationibus subsistunt & sedantur. Quod si tamen neq; hi purgari uelint, neque sustineant, ob quamcunq; tandem causam, tum sanè & his, quemadmodū dictum est, mederi conuenit per umbilicariorum purgatiuorū impositionem, & per ea quæ sedā subduntur. Per infusum item alui ipsorū eluatur. Et cataplasmata adhibeantur ex fabacea & hordeacea farina, adipe suillo recenti & insulso, tenuiq; chamæmeli farina ac aqua. At uero hæc ipsa postea imponenda sunt: in principio autē usq; ad uigorem ea quæ ex semperuio apparantur, & rosas uiridibus, perdicij herba, anchusa, sanguinaria, helxine, sideritide, portulaca, rumice acuto, atriplice, solano, plantagine, hyoscyamo, lenticula, & stratiote palustribus, blitico, lactuca, seride, malua satiuā, ramentis cucurbitæ, umbilico ueneris, flore uolarū, mali punici corio. Horum unūquodq; cum pane ex farina polentæ impositum dolorē tollit, & maxime psyllij semen aqua feruenti maceratū, & postquam succulentum factū fuerit, pro cataplasmate impositum. Vnguentum itē ex plūbi succo ad sanguineas influxiones præscriptum his cōmodissimum existit. Cōmoda sunt & mala cum pane trita imposita, & quæ his sunt similia. Et cerata Hippiones & Ambrosiæ nomine insignita, & quæcunq; ex cera, chamæmelo, & rosaceo apparantur: adijcitur autē succus quispiæ ex prædictis refrigerantibus, & ouorum cōdidum, & aqua cum modico aceto, quorū compositiones paulo post subnectemus. Optimū autem pharmacū pro eis est ceratum ex rosaceo betæ succo quantū satis est adiecto. Vidi etiam quendam hac affectione occupatum, qui immixtis in frigidam aquā pedibus & aliquandiu in ea detētis præclaram opem tulit. Alium

item uidi qui ostreorum carnibus cum argenti spuma & uiridibus hyoscyami folijs ac oleo ueteri diligenter tritis utebatur, & tum illinēdo eas, tum imponendo probe restitutus est. Licebit autem per ostreorum penuriam, carnibus concharū fluuiialium uti. Atque hæc quidem conueniunt, si mediocris inflammatio & ardor adsit. Nam si magna fuerit, ad erysipelatorum modum curationē instituemus. Cicuta nimirum folijs & papaueris ac mandragoræ & hyoscyami adhibitis, quibusdamq; medicamentis compositis stuporem inducentibus, quæ ex papaueris succo & similibus constant. In horum tamen medicamentorum usu immodici caloris deletionem pro scopo habere oportet, quæ sæpe in una contingit hora: post quam statim stupefactiuo ablato, cataplasma ex fabacea farina, adipeq; & aqua imponatur. Etenim ubi ea quæ uehementer refrigerant, diutius adhæserint, stuporem ægrumq; ac languidum sensum corpori inducunt. Quapropter quū in feruentibus doloribus fuerimus ad stupefacientium usum coacti, postea refouebimus partes per ea quæ calefacere possunt.

*Parabilia remedia ad inflammationes non ualde feruentes.*

*Cap. xxix.*

Reliqua ex eorum numero quæ facile parantur, quæq; doloribus non ualde magnis profunt. Palmularum glandulæ sunt, & mali medicæ ramuli, citrium autem ipsam appellant & aureum malum. Quin & fructus ipsius medulla sapore acris, panis aut pollinis ammixta in cataplasmatibus cōmodissima est. Quemadmodum etiam si oleo coquatur & cera sufficienti ad oleum adiecta pedibus imponatur. Cōmodum est & symphytum per se pro cataplasmate impositum, & cum pane aut cerato permixtum. Et malicorium aceto incoctum, aut aridum tritum cum pane subactum. His ergo utaris. Optimum autem cataplasma podagricum & hoc est. Cupressi uirgultu teneriora & pilulas in ollam coniecta cum aqua marina, donec flaccescant, coquito. Deinde in mortariū culinarium transsumpta, ad cerati formam terendo redigito: & linetolo excepta, dolentibus locis imposito. Hoc cataplasmate quotidie ante somnum utitor: etiam si non adsit dolor, per integrum annum. Nam perfecte ægrum sanat. Mirifice etiam facit cupressi decoctum, si ex eo æger sæpe perfundatur.

Aliud. Cypri, hoc est ligustri folia uiridia trita in pastillos digerito, usus uero tempore aceto dilutos illinito. Barbari autem Indi arida ipsa folia confusa & cribrata reponunt, usu uero expatente aqua feruenti subigunt, modico etiam aceto adperso, aut rhois culinarij decocto, atque hoc modo inflammato loco imponunt, folijs ricini aut carpasi superstratis, aut si hæc haberi nequeant, brasiæ. Reperies autem mane cataplasma aqua plenum. Sensibilis enim discussio & exhaustio contingit, adeo ut æger exustionem sensu perceperit, & maxime iuxta ungues. Vitiat tamen colorem, eum ad fuscedinem corrumpens, quapropter aliqui cerato liquido ungues prelinunt. Aliud cataplasma, quod eadem hora dolores sedat. Cerebrum porci cum amylo & rosaceo tritum, & panniculo infartum imposito, & confestim liberabitur æger, ut deambulare possit. Optime faciunt item maluæ aqua coctæ & tritæ impositæ, celerrime enim dolores sedant.

*De stupe*



*De stupefacientibus medicamentis.* Cap. xxx.  
Composuerunt medici, quemadmodū pædictum est, ob excellentes dolores, aut etiam ob ægrorū molli-  
ciem quos curare cogimur, & neque minimum do-  
lorem tolerare possunt, medicamenta stupefacientia  
appellata. Hæc enim nequaquam affectiones ipsas in  
quibus dolores fiunt, curant: uerum stuporem & sen-  
sus hebetationē membrīs inducendo, quietem quan-  
dam doloribus obducunt, quapropter si ad huiusmo-  
di pharmacorū usum, aut ob excellentem dolorum  
magnitudinem, aut ob immodicam caliditatem ery-  
sipelatis cōsimilem, cogamur, utemur quidem mo-  
dice, quo feruor immodicus refrigeretur, aut sensus  
oblæsiō deleatur. Ad hoc etiam animaduersione ha-  
bita diligenti, ne quid post uehementis caloris & do-  
loris extīnctiōne, ex stupefactiuo pharmaco in mē-  
bro permaneat. Sunt autem medicamenta stupefa-  
ctiua huiuscemodi. Asclepiadæ epithema dolorem  
leuās, podagricis & articulari morbo commodum:  
usus eius est in ipsis exacerbationibus & excellenti-  
bus feruoribus inflammationum. Opī drach. iiii.  
croci drachm. i. panis siliginē quantum satis est: u-  
numquodq; per se lacte bubulo maceratū terito, &  
unita imposito. Aut hæc ipsa cū lacte trita cerato ro-  
faceo excipimus & utimur. Aliud, quod confe-  
ctum à doloribus liberat: oportet autē ante pharma-  
ci impositionē ægrum lauare, atq; ita exteris locis  
statim adhibere. Succī absinthij trientem, croci trien-  
tem, ceræ tantundē, opī unc. i. irinī sexuncem. Opīū  
& crocum in passo diluito, & affuso cerato unito ac-  
utitor. Asclepiadæ pastillus podagricus, dolorem  
leuans. Vsus eius competit tempore exacerbationū.  
Aloës lib. i. centaureæ sextantem, thuris trientem,  
myrrhæ trientem, lapidis asij, opī, succi mandrago-  
ræ, styracis, aluminis scissi, cuiusq; sextantem: exci-  
pe, ac subige passo, & ad pastillorum formam redu-  
cito. Vsu uero expetente lacte dissolutos cum pin-  
nulis illinito, supra illitum locum linoleo imposi-  
to passo imbuto.

*Unguenta recalsfactoria quæ post stupefactiuorum  
usum adhibentur.* Cap. xxxi.

Quum itaq; stupefactiuus usq; ad feruoris inflāmati-  
onem deletionem fuerimus usi, post calefacere mem-  
bra cōuenit cataplasmatibus ex castorio & thapsia cō-  
positis: si enim hoc non fecerimus, debilia & intem-  
perata reddita mēbra perpetuo fluori obnoxia red-  
demus, & quæ in actionibus facile offenduntur: qua-  
propter unam atq; alteram unguentorū recalsfacto-  
riorum compositionē apponam. Ex quorum nume-  
ro & hæc est. Succī thapsiæ drac. viii. piperis drach.  
x xiiii. adarces, cāchryos, euphorbij recētis, cuiusq;  
dra. x x xii. Si uero recens euphorbiū desit, duplum  
eius sume: staphidis syluestris drac. xii. pyretri dra.  
xii. terebinthinæ drach. xvi. ceræ drachm. x xiiii.  
olei cyprini libras vi. Altera, eiusdem usus. Pyre-  
tri, castorij, helenij, adarces, piperis, euphorbij, zin-  
giberis, nitri, ceræ, singulorum drachmas viii. iri-  
nī quantum sufficit. Pro pauperibus autem satis fa-  
ciunt, allia, thymus, origanum, satureia, sinapi, & si-  
milia.

*Pharmaca & edulia eorum qui flauæ bilis influ-  
xu infestantur.* Cap. xxxii.

Exhibenda est autem & cyclaminus à flauæ bilis influ-  
xu infestatis. Huius enim radix quàm tenuissime

trita cum aqua mulsa aut passo pota, biliosum hu-  
morem per sudores excludit. Dandæ autē ex ea dra-  
chmæ quatuor corporibus magnis & robustis, reli-  
quis uero pro uiriū tolerantia. Adiuuare uerō opor-  
tet sudorum exclusionem corpus calefaciendo & fri-  
cando, ita tamen ne affectos locos cōtingamus. Præ-  
benda quoq; in potu ea quæ urinā cient, talia enim  
bilem per lotium euacuare consueuerunt: pastillus  
itē ex seminibus soporifer, & qui à triangulari for-  
ma Trigonus appellatur, & cōsimiles, doloribus  
infestantibus commode à flaua bile affectis exhiben-  
tur. Nam & somnus alii soporis inde oboritur, &  
fluxiones ab ipsis resiccantur, atq; id maxime si post  
corporis per purgatiuū euacuationem exhibeantur.  
Eduilia autē eis apta quæ refrigerant, non tamen hu-  
meant: humiditas enim auget fluxiones. Dandum  
item eis lactucæ semen ob somnum conciliandū, &  
papaueris semē tum in cibo, tum in potu. Mala etiā  
& sorba & mespila præbenda, & quæcunq; ad hoc  
quod refrigerant, fluxus cohibent allationem. Cæ-  
terum à uino omnino exacerbationis tempore absti-  
nendū est. Intercapedine autem pura reddita parum  
ex eo cōcedendum. Porro inedia ab amara bile infe-  
statos extreme lædit: nam bilem acriorem reddit.

*Cura eorum qui ob pituitæ influxum æ-  
grotant.*

Cap. xxxiii.

Horum item curationem à pituitæ euacuatione princi-  
pium sumere oportet. Euacuatur autem humor pi-  
uitosus per uomitus quidem, nihilominus tamē &  
inferne per uentrē. Vtilis est autem in hac affectione  
per inferna purgatio, siue iuxta manus, siue iuxta pe-  
des hæreat morbus, & multo adhuc magis si iuxta  
omnes corporis articulos fluxus fuerit dispersus, fa-  
miliarior enim pituitæ uia & minus periculosa per  
intestina existit. Si enim in superiorem uentrem uio-  
lenter adtracta non euacuetur, periculum inducit.  
Quapropter tutius est ut ad infernam excretionem  
ducatur. Euacuata enim in una die morbi utcunque  
inueterati robur contundit, quare in podagra inna-  
tum ex pituitoso humore fluxum, & mediocriter af-  
fligentem, & qui tum potentia tum actu calidis re-  
medijs delectatur, purgare oportet. Ante purgatio-  
nem uero modice adstringentibus utendum, atq; id  
magis adeo circa initium fluxionum. Atqui si eua-  
cuatio per purgationes fieri non possit, quæ sanè uel  
sola sæpe sufficit ad affectionum fluidarum curatio-  
nem: tum inedia & fame utendum est ad plures dies.  
natura enim pituitosi eam bene tolerare possunt. U-  
tendum etiā cōfricationibus discussorijis ampliusq;  
efficacioribus infusis, & pharmacis cientibus urinā.  
Cæterum quæ ratione nutrimenti præbentur edu-  
lia, natura sicciora sint, & minus nutriant, ueluti est  
oryzæ succus & bromi, qui inter frumentacea refer-  
tur. Nuces iuglādes paucae, pistaciaq; & nux thasia,  
& uuæ passæ, & capparīs ex aceto mulso. Quādoq;  
etiā parui pisciculi in petrosi aquis coacti, & auia-  
culæ mōranæ assatæ præbeantur. Vinum autē præ-  
beat quàm minimū interualli tempore, tenue, ful-  
uum & uetus. Cataplasmata autem quæ frigidis flu-  
xionibus cōueniunt imponenda. In principio qui-  
dem terebinthi folia uiridia & tenera cū adipe suil-  
lo recētis, & rosaceo, modica cera adiecta. Aptæ sunt  
ipsis & cupressi folia & pilulæ uino coctæ. Et cyperi  
radices, & rhamni folia. Post principium uero pi-  
uitosis



cuitosis conuenit ex eruo & lolio ac fœnogræco cataplasma. Quemadmodū etiam ea quæ ex ciceribus constant, aristolochiæ radice trita ammixta, centaurea & gentiana, & pœonia, & bryoniæ radice ac fructu. Ex amaraci item coma, & artemisia, abrotanici folijs & adianto, uitice, lauro, pulegio, samfuco, menta, bralsica, sisymbrio, serpillio, filice, fœniculo, eruca, & reliquis quæ saporis acris, aut salsi, aut amari sunt, & maxime si dolores citra ardorem ex refrigerationis sensu sint oborti. Singula uero ex his cum pane & adipe recentia pro cataplasmate imponito, quanquam nihil ueret unūquodq; per se adhibere. Optimum est etiam somētum ex passomari mixto apparatus. At uero quinquæfolij radicū & malicorij æqualibus partibus decoctis perfudi ac foui, inquit Archigenes, circundolētes partes. Imò & tritis ipsis magis inflammata loca cataplasmatibus modo contexi, atque hoc ipsum multis uelut obluētans & resistēs remedium dolores expulit, aliquibus autem ut pharmacum nulli inferius ipsos mitigauit, rarissime uero citra commoditatem apparuit. Mansuetissimum uero & hoc est. Althææ folia cocta trita tum per se, tum cum polline, aut ordeacea farina imponantur. Ceratum item ex radice eius, quæ hibiscum appellatur, cocta in aqua mulsā trita, constet autem ceratum ex gleucino aut irino. Imponatur uero his qui tum uehementer calida, tum ualde frigida auersantur, mediocribus autē delectantur. Pharmacum porro conueniens noui, inquit Philagrius, podagricis qui unā cū doloribus frigoris sensu percelluntur, id quod ex laurino componitur. Quum enim & alia eiusdem generis sint cum ipso, tantam tamen cōmoditatem à nullo exhibitam scio. Compositio autem hoc modo habet. Pharmacū ex oleo laurino. Cerae, adipis suilli ueteris, resinæ pinus siccae, terebinthinæ liquidæ, cuiusq; drach. xvi. cypri ni, laurini, œsypi, butyri, cuiusq; drach. xlviii. galbani, medullæ ceruinæ, cuiusq; drach. xvi. Hoc quidem igitur medicamentum confestim à dolore liberat eos qui in dolore frigoris sensum perceptāt. Admirandum etiam in his pharmacum est, quod ex croco constat & galbano, supraq; ad sanguineum influxum præscriptum est, & in omni tempore adhibetur. Sunt autem & alia pharmaca his apta. Quemadmodum ea quæ Myracopa appellantur, & quæ ex ipsis cōponuntur cerata, fiunt autem hæc commēsurata & proportionata cera ad unguenta ipsa ammixta. Pharmacum ex metallicis. Optimum uero & ipsis pharmacū est ex metallicis ad sauciatos neruos à Galeno apparatus, cuius & nos admirabile periculum fecimus, inquit Philagrius. Quum enim partium quā tenuissimarum sit, ad profundū corpusculorū progreditur, & attenuat, & discutit. Comodum igitur existit in prædicta dispositione post sedatos dolores admotum, aut quū mediocres existūt, non solū enim discutit, ut dictū est, sed & repellit. Cōpositio uero hæc est. Chalcitidis drach. viii. misyos drachmas xvi. Squamæ æris drac. xxiii. thuris drac. xxi. galbani drach. xii. colophonias drac. xvi. ceræ drach. xvi. olei drach. cxxviii. aceti acerrimi quantum satis est. Metallica cum aceto in sole æstiuo terito ad plures omnino horas: Deinde thus adijcto, rursusq; diu terito, & liqueficientibus liquefactis, refrigeratis, & erasis admixtis uni-

to, ac utitor. Pharmacum ex uino & oleo, Galeni.

Aliud pharmacū ex oleo & uino Galenicū, conueniens in declinationibus inflammationum, & post easdem omnibus podagricis. Spumæ argenti, drachmas xcvi. olei ueteris drachmas cxcii. ad podagricos uero sufficit, si anniculum sit oleum, uini ueteris fului pellucidi atque leniter dulcis drachmas cxcii. Coquito simul ad compagem manus non inquinantem. hic enim est optimus eius apparatus. Nam qui triplum olei accipit, diutius coquitur, & magis resiccans redditur. Porro in his qui post dolores uehemens frigus percipiunt, aliud Galenicum pharmacum ex euphorbio ad sauciatos neruos descriptum conducit. At uero adhuc pharmacum podagricis commodum, tum in inflammationum remissione, tū post easdem existit, quod Aegyptium appellatur, & quod ex lanis succidis uitis apparatus. Habetur autem inter multæ commoditatis emplastra in xv. Sermone huius tractationis.

Cura eorum, qui ex atra bilis influxu agrotant.

Cap. xxxiii.

Dicatur autem ex ordine & de atræ bilis influxionibus, quæ & ipsæ omnino uniuersali euacuatione præcedente opus habent, hoc est uenæ sectione, aut purgatione. Quando quidem igitur ad atram uerunt bilē, euacuatione per ea quæ ipsam repurgant: quādo uero ad sanguinem atra bile infectum declinant, per uenæ sectionem. Si uero ambo hæc simul per totum hominem redundarint, non unū aliquod ex prædictis adhibere suffecerit, sed præsecta uena, deinde depurgare cogimur, quod ipsum & in alijs affectionibus duplici euacuatione indigentibus erit faciendum. Priusquā igitur totum corpus euacuamus, atque in ipso etiam euacuationis tempore, dico sanè in principijs, repulsorij & sensim simul calefacientibus utendum est. Post euacuationem uero his quæ sensim calefacere, & attenuare, & discutere possunt, utemur. Sunt autem repulsoria quidem simulq; leniter calefacientia, terebinthi folia & cupressi, cyperi radices, & similia. Calefactoria autem simulq; attenuatoria & discussoria, bryoniæ radix & cydamini, syluestrisq; cucumeris, & raphani, lauri item folia mollia, & pastinacæ, & caucalidis, sinapis, nasturtij, conyzæ, bralsicæ, iridisq; & ocymij & aliorum innumerorum folia. Ammiscenda autem sunt hæc panī aut cuiuspiam ex prædictis iam sæpe farinis, & adipi anserino aut gallinaceo, butyroq; & œsypo, atque id maxime in humectis & mollibus corporibus, quo leniora reddatur. Quin & post huiusmodi pharmacorum impositionem, præscripto ex croco pharmaco, & eo quod ex metallicis constat, uti conuenit, ampliusque quod Machæroni inscribitur, & quod Isis appellatur, similibusq;, quorum compositiones in xv. Sermone traditas reperies. Etenim huiusmodi pharmaca relictum in membris humorē concoquunt, eundemq; attenuat & discutit, ampliusq; membra debilitata corroborant. Cōmodissimum autem pharmacum per interualla exacerbationum dolore non infestante, ad atræ bilis fluxiones est Corax, quemadmodum etiā pastilli, Andronius inquā, & Musæ, & qui ex centaurea, itemq; qui ex lanis succidis apparatus, & consimiles in xiiii. Sermone descripti. Illinuntur autem cū uino dulci. Miscentur etiā ad præscriptum in ex cro



ex croco pharmacum, & ad id quod ex metallicis constat, ita tamen ut parum quid ex pastillis ad multā pharmaci partem commisceamus, ut uidelicet pastilli XII. pars ad unam pharmaci partē addatur, hoc est ad pharmaci lib. I. pastilli uncia una. Aliquando autem minus. Quum enim euacuare & discutere uoluerimus, minus de pastillo adiicimus, corroborare autem & firmitatem addere, plus. Quod si neque perfecta, neque absque dolore sint exacerbationū interualla, panem uino maceratum & sufficienter emollitū ad prædicta medicamenta per interualla ammiscere expedit. Præstans autem est & in his discussoria frictionum species uniuersi corporis, præter affectas partes, tum per interualla, tum tempore exacerbationum uehementius & diutius facta, & maxime si non fuerint præeuacuatæ.

*De his qui ob tenuem fluxum ægrotant. Cap. xxxv.*  
Si serosi sint humores qui ad articulos influunt, non paruum signum tenuitatis ipsorum est, quod neque tumorem magnum habeant inflammationes, neque diutius durent, imò neque molestiam aliquam in motibus perpetuantur ægri, postquam quiesuerint inflammationes. Eorum igitur qui ob tenuem fluxum ægrotant, remedium quod eadem die opem eis fert, purgatio est per ea quæ serosos humores euacuare possunt facta. Fluxiones autem quæ non ita ualidum dolorem inferunt, sæpe in solo irrigationū sortu substituerunt, ex oleo uidelicet rosaceo & uino dulci suppressæ, modica cera ammixta, ipsarumque lanis succidis exceptis, additur etiam aliquando nitri spuma. Quin & quod ex cote naxia & ferri affricu dederitur, & in ea cōgregatur, illitum iuuat. Et selinusia terra, & cretica, & samius aster, & lemnia, sphragis appellata, uino & posca, & aceto ac passo diluta, illita eodem modo profuerunt. At uero & caseus recēs coactus impositus mediocres inflammationes etiā solus iuuat, & cū polēta, aut farina præsertim ordea cea. Habet enim in se non modo quid repulsorium, sed & discussorium, per quod & tenues fluxiones repellit, & humores in articulis euacuat. Lentisci etiā ramuli teneri & fructus, similiterque myrti & terebinthi, & pīrorum, ac quercus, oleæ, punicæ, mespilorum, cerasi, pruni, rubi canini, & rubi, cuius etiam fructus & uirgulta idem operantur, & ut simpliciter dicam, quæcunque res in fructibus, & folijs, & succis, & radicibus aliquid amari, aut acris, aut salis, aut nitrosi habet, simulque cum amaritudinis, & acoris, omniumque prædictorum moderata qualitate non adeo excellēt, adstringēti hæc mediocres dolores ex fluxione obortos iuant. Sufficit autem unā cū his ad perfectam sæpe curam fames ipsa: Quemadmodum etiā clyster omnibus fere podagricis conuenire uidetur, & maxime in quibus uenter assidue cohibetur. Ruta etiam uiridis & pastinaca uiridis utiliter ipsis pro cataplasmate imponuntur, maxime quibus uenter cohibetur, ampliusque quibus pungitiui sunt dolores & inflates. Ammiscere autem omnibus his expedit adipēs, quandoque & polentas, & farinas quasdam, quæ haberi possunt: mel item ac passum, & rosaceum, quo humecta & liquida conseruemus. At uero si & fermentum modicū hoc tēpore ammiscas, nihil peccaris. Hoc igitur modo etiam plurima ex hortensibus tibi commoda fuerint, si ipsa iuxta prædictas qualitates iudicaris, amaram nimirum & sal-

sam, acidamque & adstringentem atque acrem, quæ omnes sint mediocres. Inuenies autem aliquādo & dulcem qualitatem unā cum his permixtā in eadem etiam planta. Ea quoque quæ in mari nascuntur, plerunque talia sunt, utpote quæ Lactucæ appellantur. Sunt autem germina lata & oblonga ac uiridiora, tenuia & subrugosa, ac ueluti conduplicata ad littora maris per fluctus eiecta. præstantiores autem sunt cum posca decoctæ. Viridia item quæ in fūco siue alga tinctoria ad radices fixa sunt. Et ad hæc quæ in petris maris reperiuntur similitudine fungorum, reliquaque germina mollia commodant eodem modo. Omnia enim huiusmodi apte commiscuntur adipsibus ac farinis. Quin & torpedo tum marina, tū fluuiialis, iuxta alium quendam modum, non in paruis solum, sed in magnis quoque inflammationibus congruit. Naturali enim facultate quadam stuporem inducit, & dolores e corporibus tollit. Quapropter ipsam uiuentem assidue ad mouere inflammatis locis oportet. Cocta item adhuc uiua in oleo, deindeque extracta, ac modica cera cum oleo eliquata, commodissimum pharmacum omnibus dolore afflictis podagricis redditur. Consimili efficacia uermes terreni appellati præstant, si in oleo coquantur, & cera postea in oleo liquecat.

*De fluxionum inter se complexu. Cap. xxxvi.*  
Quā itaque iam simplicium & immixtarum inter se fluxionum curatio sit relata, nulla difficultas amplius est, etiam mixtarum curam inuenire. Satis enim manifestum est, quod ad humorum complexum, consequenter etiam curationes oporteat mixtas esse. Cognitiones autem mixtarum fluxionum ex prædictis simplicibus affectionibus sunt sumendæ.

*Cura affectionum ex sanguinis & bilis complexu. Cap. xxxvii.*

Si igitur sanguineæ & biliosæ affectiones concurrant, & propterea tumor magnus & ruber, & quodam modo flauus ac feruidus, membrum fluxione infestatum apprehendat, & dolores nunquam remittentes incumbant, & exacerbatio uehementer quidem alternis & tertio quoque die fiat, benignior autem singulis diebus: omnino sanè manifestum puto, quod medicationis initium à uenæ sectione primum fiet, consequente exinde biliosi humoris purgatione. Satis constat autem quod & euacuationū tempore repulsorij uremur, quæ uidelicet frigidæ & adstringentis sunt facultatis: Et deinde primū mitigatorijs & refrigerantibus quidem utendum, nō autem amplius adstringentibus. Adstrictio enim tumorem inspissat ac cogit, ut egre discuti & resolui possit, si diutius ea utamur. postremum uero etiam his quæ concoquere & discutere tumorem possint, ut edum est. In principio igitur iuxta euacuationum, inquam, tēpus, utile pharmacum eiusmodi affectionibus est ex acacia & ueratri pastillus in mortario plumbeo cū semperuiui, aut plantaginis, aut sanguinarie, aut sectionis, aut umbilici ueneris, aut rumicis acuti, aut solani, aut uuæ acerbæ, aut hyoscyami, aut lactucæ succo dilutus. Atqui iuxta augmenta & uigores affectionum, etiam ea quæ ad sanguineas affectiones dicta sunt, in cataplasmata ammiscere expedit, succosque item iam relatarum herbarum, & ipsas adeo herbas tritas. Postquam uero feruor inflammationis cessarit, concoquentibus cataplasmaris &



medicamentis utemur: parte etiā affecta uulnusculis impactis scarificata, præsertim si appareat tumefacta.

*Cura bilis ad pituitam permixta. Cap. xxxviii.*

At uero si pituitosi humores biliosis fluxionibus amisceantur, si quidem unio & permixtio ipsorum eodem tempore hominem infestet, miscere etiam remedia oportet, eorumque multitudinem purgare per ea quæ bilē simul & pituitā educere possunt: forinsecus aut cataplasmata imponēda pari aut impari modo permixtis his quæ pituitosum & biliosum euacuant fluxū. Et pari quidē modo utraq; coniciemus, quū affligentiū humorū mixtura equalis fuerit. Impari uero, si alter humorum redundarit. Neque uero obliuioni tradendum, quod aliqua ipsorum in principio recte adhibentur: aliqua uero iuxta mali progressum & uigorem. Quædam uero eo remittente & circa declinationem.

*Cura humorum atræ bilis alijs permixtorum.*

*Cap. xxxix.*

Eadē etiā methodo uteris, si atræ bilis fluxiones reliquis fuerint ammixte, tum iuxta exacerbationum circuitus, tum iuxta continuitatem. Neque enim solum ad affectionum cōplexus est respiciendum, sed & num assidue & citra remissionem, an iuxta circuitum infestēt. Primū quidē igitur & in illis euacuationibus cōuenientibus utendū est: Deinde ubi quidē assidue infestant, cataplasmatibus dolores sedantibus uī expediri. Vbi uero per circuitū moueantur, instatibus quidē doloribus mitigatoria cura, per interualla uero corroboratoria membrorum utemur. Manifestum autē quod quæ magis feruēt, maiori refrigeratione opus habet: quæ minus, minori. Omnia tamē feruentia refrigerare oportet. Quæcunque autem fluxiones pruriginosæ fuerint, obtundentibus & discussorijs curabuntur. Quæcunque uero mordaces, obtundentibus solis. Et quæ in alto sitæ sunt, per ea quæ tenuium partium existunt: quæ uero in superficie, per simpliciora. Omnium autem horum syluam in fine secūdi huius tractationis Sermonis præscriptam habes.

*Cura durorum humorū qui post inflammationes relinquuntur. Cap. xl.*

Duri & reluctantes aliquando tumores post inflammationes relinquuntur, qui ex crassis humoribus generationem habent, in corporibus præsertim durioribus, & quæ ægre per discussoria exoluuntur, & male curatis. Huiusmodi enim non curati statim se ipsis peiores fiunt ad uitæ actiones obeundas. Cæterum huiusmodi tumores sedant, pharmacum Machæronis, & Piscatoris, & Aegyptium, & consimilia, de quibus dicitur xv. Sermonem in pharmacorū multæ commoditatis relatione. Dicitur autem & hic, ubi ex ordine de tumoribus qui egre concoquuntur tractabimus. Sunt etiam parabilia pharmaca ad hanc affectionem si ruri uiuantur, satiuæ fici, & syluestris quoque grossi cocti, tritici & impositi, tum soli, tum cum quadam ex prædictis farina & adipe. Cyclamini item & cucumeris syluestris radix, & althea bis cocta, & caricæ pingues, adianton, auena, urtica, bryoniæ radix, bulbi anethi, abrotoni, buphtalmi, iridis folia, itemque marrubij, ita ut singula prædicta cum uisco, pice, & sulphure uiuo permisceantur.

*De tumorum crudorum & inconcoctilium*

*cura.*

*Cap. xli.*

Crudi tumores ex materia albidiorē ac lentiorē con-

gregantur, diuque durāt, neque concoquuntur, neque discuti possunt. Quandoque uero primis quidem discussis loci statim fluxione infestantur: & inæquali magnitudine semper permanent tumores. & in quibusdam sanè penitus absque dolore fiunt, in alijs uero dolore quodam comitante. Quandoquidem igitur diuturnos uideris tumores citra dolorē, per discussoria curato, diligenti animaduersione habita ne quid relinquatur induratum, quod incurabile aut ægre ualde curabile reddatur, & maxime ubi callosarum duriclerum generationem uideris in articulis futuram. Si igitur citra dolorē uideris crudos tumores, emollientibus ad discussoria ammixtis curato, ne quid penitus induratum relinquatur. Si uero cum dolore contingant tumores, non modo discussorijs, sed etiam quæ unā cum hoc quod discutiunt, lenire possunt, expedit uti. Manifestum autem est, quod si fluxus tenuis & modicus cum doloribus quibusdā deferatur, inde tumores post inflammationum remissiones oboriantur & infestent, atque id maxime in his euenit qui delicatius uiuunt, aut frequenter lauantur, aut plus quam oporteat inambulant, uel etiā rebus ueneris utuntur. Oportet igitur in his ad tumefacta imponere pharmacum ex salicibus, ita ut adglutinari possit apparatus: aut ex aspidibus constat ad strumosos destinatum, aut aliquod consimile: præsertim quum sensus ægris adest iuxta coxendicem aut femur, tanquam aliquid ad inferiora deferatur: quumque dicunt se affici uelut formicas repentes sentiant, dolereque, & iam refrigeratur, iam calescit membrum. Quin & lauantes per smegmā ex adarce, alcyonio, & pipere defricare oportet. Adstringentia igitur sunt simulque discussoria pharmaca, quibus necessario utimur ad crudos & dolētes tumores, uelut symphytum petræum, terebinthi uirgula, scolopendrium uiride, cyperos, & similia, de quibus sæpe dictum est, cum pane multo & rosaceo permixta, præsertim in his qui humido & albo corporis habitu sunt præditi. Ex compositis autem conuenit eis pharmacum ex succis quod cum uino flauo & subadstringente est emollitum, & Galeni phœnicinum cum multo rosaceo liquefactum, & locis liquidius impositum. Cæterum in tumoribus citra dolorem conueniunt adiantum uiride, folia urticæ, altheæ, chamæmelum, uua passa pinguis, fertula campana, melissophillon, lauer, citri exterior cortex, & similia: Ad quæ singula cicerum & lupinorum farinæ, & panis, & olei ueteris ac sicyonii, & adipis suilli ueteris, tantum ammiscendum est, ut mollis ad tactū compositio reddatur, & morsum nullum ad membrum accedere permittat. Ex compositis autem pharmacis conueniunt his, id quod ex croco & galbano constat, & quod ex liquecibilibus apparatus, ac mox referetur: Et Machæronis, & Piscatoris, cū cerato ex oleo sicyonio aut aliquo consimili liquefacta. Atque hæc quidem in mollioribus corporibus adhibentur. In durioribus autem & quibus tumores non dolitant, conueniunt uiridis folia, præsertim arida, & amaracū, amarantum, ari & arisari radix, smyrnium, altheæ radix, elaphobosum, ericæ folia, scœniculi folia, filix, sisymbrium, scandix: erucæ folia & sinapis uiridis. Composita autem conueniunt tum prædicta citra cerati ammixtionem, tum Isis, & Aphrodite appellatæ, & alia infinita huiusmodi.



dem uiribus prædita. Huiusmodi autem pharmaca una cum hoc quod tumores exolunt, etiam fluxiones naturæ suæ aptitudine repellunt: Quod ipsum etiam probe faciunt cupressi pilulæ uirides cum uino coctæ, prædictorum leguminum farinis & suillo adipe ammixtis, quandoque uero & lauri ramuli, & rubi folia, & similia ammiscuntur. Efficaciora autem prædictis sunt, & agrestioribus corporibus ac tumoribus qui ægerime cōcoquuntur conuenientissima, abrotonum, ammoniacum thymiana, anemonarum radices & hastulæ regiae, bryoniae radix, pulegiū, dracunculi radix, bdellium, bupthalmū, gentianæ radix, & myrobalanus. His autem adhuc fortiora sunt capparidis folia, glastum, betonica, cyclamini radix, brassicæ ustæ cinis, ruta, panaces uirides, peucedani radix, scilla, fici syluestris fructus, trifoliū asphaltites, trixago, sulphur, pix. Addatur autem singulis prædictis panis & adeps, aut prædictorum leguminū farine, quandoque etiam caricæ. In quibus omnibus scopum tibi propositum habeas, ut citra partis affectæ combustionem & afflictionem curam facias: quapropter etiam necessaria est prædictarum farinarum, itemque adipum admixtio. Tantum autem commiscere ex eis oportet, quantum uehementem uniuscuiusque uim obrudere uolumus. Ammiscendus autem est non solum adeps suillus, sed & caprinus, & uitulinus, & taurinus, ceruinus & anserinus: Medullæ item omnes ammiscendæ habito naturæ curâ di corporis respectu. Et cochleæ una cum testis trite, & sine alterius rei admixtione, aut caprino stercore cum aceto trito ammixto impositæ, tumores laxos & molles destruunt, & adstringunt, qui sanè ex lenis & crassis humoribus oboriuntur. Porro operæ præcium duxi admonere, diligenti animaduersione opus esse, ne clām te indurata aliqua tumoris pars relinquatur, quod sanè ubi uideris factum, his quæ fortiter emollire possunt, uteris, respectu simul ad habitū corporis habito. Ex malagmatibus autem fortissimū est Lucio inscriptum ad articulos distortos.

*Malagmata diuersa, in quibus etiā Lucij malagma est, ad articulorū distortionem destinatū. Cap. xxi.*

Malagma Lucij ad articulos distortos inscriptum, facit ad thoracis affectiones & abscessus in profundo, ad nervos contractos, & articulos stupore occupatos. Latini distortionem, & Græce ancylas appellamus. facit opisthotonicis, & ad omnem nervorum per cōsensum affectionem: Ad nervorum item lassitudinem acopon egregium est irino aut cyprino dissolutum. Bdelliū, adipis uitulinū, ammoniaci thymiamatis, iridis, cuiusque sextantem, opopanax, galbani, canchryos, thuris, styracis, cuiusque drach. viii. piperris grana c. l. x. ceræ sexuncem, terebinthinæ sexuncem, fecis unguētū irini aut cyprini sextantem & uncia dimidium, uini quantum sufficit. Ammoniacū, opopanax, thus, trito cum aceto, liquefabilia uero liquefacito, & ab igne ablatis sicca inspergito: deinde etiam trita ipsis adhuc, & unita in mortarium diffundito, ac fortiter emollito, extractisque utitur. Optimum est etiam eis ex pice brutia Galenicum pharmacū ad rabidi canis morsum descriptum. Habet autem hoc modo. Picis brutiæ libram i. opopanax cis quadrantē, aceti acerrimi drach. i. apparatus quē ad modū de rabidi canis morsu prædictū est, Sermone sexto. Aliud pharmacū ex liquefibilibus, Gale-

nicum, quod cōcoquit simul, & attenuat tumores. Quo sanè in mollibus corporibus uel solo utendū. In durioribus uero ammiscendum est ei id quod ex metallicis constat ad sauciatos nervos destinatū, ita ut mixtura ubilibet iuxta corporum & affectionū naturā fiat. Habet autem hoc modo. Opopanax unc. i. terebinthinæ chiæ unc. i. propolis teneræ quadrantem. Si uero propolis tenera non sit, admiscebis terebinthinæ trientem: quod si neque in totum propolis haberi possit, conijcito picis brutiæ sexuncem. Opopanax in aceto albo cōtere. Hoc pharmacum prædictos tumores cōcoquit, & humores in alto sitos adtrahit, dissecat, & repurgat. Cæterū quod ex metallicis constat, item Galenicum, ad sauciatos nervos destinatum, hoc modo habet. Chalcitidis, misyos, æruginis ustæ, cuiusque drach. viii. colophonis bellem, squamæ æris drach. x. xiii. ceræ drachm. x. c. vi. olei drach. c. x. xiii. resinæ drach. x. vi. galbani drach. x. ii. aceti quantum sufficit. Chalcitidis, misyos, æruginē, æris squamā cum aceto in sole æstiuo contere ad plures horas, & liquefibilibus liquefactis & affusis, uni, emolli, acutere. Aliud Galenicum. Ad eos qui tenerū corpus habent & nervis sauci sunt descriptū. Chalcitidis ustæ, misyos ustæ, cuiusque drachm. viii. Squamæ æris drach. x. xiii. thuris drachm. x. x. ii. ceræ drach. x. c. vi. olei drach. c. x. xiii. resinæ drach. x. vi. galbani drach. x. ii. aceti quod satis est: Apparatus ut dictum est. His itaque pharmacis utemur per se, ubi dolores ex profundo dissoluere uelimus. Miscebimus autem pharmacū ex liquefibilibus cōstans, ubi tumores fuerint obdurati. Malagma ad podagricos & articulorū morbos ualde generosum. Liberat à tota affectione, usus eius est per exacerbationum interualla. Ceræ lib. i. terebinthinæ lib. i. spumæ nitri sexuncem, floris lapidis asij sexuncem. Thuris sexuncem, olei cyprini lib. i. lixiuū coactiliariorum, siue pileariorum, quantum sufficit. Arida contundito, cribrato, & cum lixiuio ad liquidum cerati crassitudinē terito, & liquefabilia liquefacta tritis affundito, unito ac utitur. Aliud. Calcis uiuæ, thuris, cuiusque drach. i. iii. terebinthinæ drach. i. iii. ammoniaci thymiamatis drach. i. iii. spumæ nitri drach. i. iii. adipis taurini drach. viii. floris lapidis asij drach. ii. ceræ trientē, olei trientē. liquefabilia liquefacito, & cū siccis unito ac utitur. Valde præclarum est Resorbet collectiones circa articulos congregatas, & à doloribus uindicat. Aliud, quod in totum ab omni affectione liberat. Seminis cicutæ, comæ cetauræ, iridis illyricæ, agarici, cardamomi, foeni græci, corticis radicis mādregoræ, singulorū sextantē, terebinthinæ lib. i. olei ueteris sexuncē, unguētū syriaci, aut salca appellati, sexuncē. Terebinthinā cū oleo ueteri modice coquito, deinde unguētum addito, & ablatis ab igne arida trita inspergito & unito, emollitaque in uas æreum aut stanneum reponito, uase tamen prius ex unguento malabathrino siue foliato illito. Hoc pharmacum crassos & mucosos humores trahit per obscuros meatus. Aliud ad eos qui à natiuitate articulare morbum cōtraxerunt. Vipote quibus genua, humeri, cubiti, & reliqui articuli dolent. Ceræ, colophonis, resinæ pinus, cuiusque sexuncem, terebinthinæ unc. i. foeni græci sicci contusi & cribrati trientē. Cyprini trientem aut quantum satis est. Eliquatis liquefibilibus foenum græcū insperge, & utere.



& utere. Aliud Ceratum ad articulare morbum pulchrum. Cere, adipis porcini, colophoniae, resinae pinus, cuiusque lib. II. butyri lib. I. terebinthinae lib. I. galbani trientem, adipis taurini lib. II. oesypi lib. I. Liquefac, percola & adserua. Vfus uero tempore unguento nardino dissolue aut etiam gleucino, & linteolo exceptum impone. Aliud ad articulorum morbum & podagricos, ut praeparatione consterneris. Cerae drach. c. rosacei drach. c. c. foliorum sideritidis tenerorum drach. c. styracis drach. xx. thuris drach. VIII. nitri drach. VIII. manae drach. x. Liquefacta cum reliquis tritis unito, ac utitor. Sunt autem & alia quam plurima pharmaca quae tumores tollere possunt post inflammationes adhibita: Maxime uero omnium quod ex aspidibus constat ad strumas descriptum: facit ad eos quibus laxi tumores magnitudinem detrahare uolumus: Subuertit enim quam plurimum tumores laxos, itemque duos, eosque simul diffundit. Cōstringit autem & cōdensat articulos praeparare omnino si quod ex salicibus constat ei ammiscetur. Ego autem, inquit Philagrius, penuria pharmacorum ex metallicis praescriptorum, id quod ex salicibus apparatur ammiscui & maximopere profeci articulis inde constrictis, densatisque ac corroboratis, obfirmato uidelicet fluxionum humore prius euacuato. Licebit autem si quis ruri uiuat, & praedictis pharmacis careat, ex adipe qui ad manum sit, & arida pice cum resina pinus, aut etiam alia resina quae haberi possit, pharmacum in cerati formam apparare, ipsique chalcanti quantum uililiber recte habere uidebitur ammiscere: Salem item ac mysi, auripigmentum, & similia: Quin & uiscum & irin, aristolochias, paeoniam, peucedanum, gentianam, centauream, artemisiam, thymum, origanum, nitrum, nitri spumam, thus, myrrham, styracem, propolin, mastichen, ac alia innumera his consimilia licebit reperire, indeque pharmaca tumores constringentia componere, quemadmodum nos fecimus non paucis communibus ad podagricos & articulorum morbos pharmacis inde apparatis. Philagrii pharmacum ex nitro & oleo.

Nitrum accipito friabile & nihil calculosum in se habens, idque ipsum quam tenuissime terito, olei tantum ad ipsum in mortarium affundens quo trita simul ad mellis crassitudinem redigatur; atque ubi satis diu contriueris cacabo excepta, ad lentum ignem non fumantem coquito, assidue agitando donec ad bonam compagem reducantur, animaduersione habita ne liquidius pharmacum relinquatur, quod ubi contrigerit, pharmacum penitus liquidum euadit, & neque in posterum inspissatur, nisi multam aliam sustineat coctionem, quae uim eius sicciorem, & ob id affectis dolore membrum inutilem reddit. Probare autem eius compagem tempore coctionis oportet, ad testam aridam ipsum destillando, testa non prius humectata, quemadmodum in alijs pharmacis facere solemus. Resoluitur enim nitrum per aquae contactum. Sit autem oleum quod nitro affunditur dulcissimum, tenuium partium aut rosaceum, aut chamamelinum, aut anethinum, aut uetus, aut cicinum, aut sicyonium. Quandoque etiam chamameli humidae siue aridae, aut iridis tenuissime tritae, aut aristolochiae, aut alicuius consimilis partem ammiscere prodest. Si quidem autem repellere simul ac discutere uelimus, aut etiam calidos dolores curare, cum rosaceo ipsum pharmacum coquemus, aceto quandoque in co-

ctione aut modico passo affuso. Si uero amplius discutere uelimus cum aliquo alio oleo coquemus, amixtis etiam quibusdam praescriptorum aridorum, iuxta habitum uidelicet curandi corporis & compagem ipsius tumoris. Hoc sane pharmacum dolores in alto obortos quam celerrime sanat, atque id eo magis si non biliosum sit, neque multum calidum quod influit. Neque uero solum podagricos dolores ex professo iuuat, uerum etiam eos qui tales non sunt, sed ex fluxionibus congregati & discussioni aliam resistentes. Vtimur itaque ipso si post sedatas inflammationes dolores in alto permanent. Pharmacum ex urina Bordonis, hoc est, muli apparatus. Attrahit quidem hoc priore praestantius. Conuenit autem magis crassis & crudis fluxionibus, praesertim si cum chamamelum uiridi uel sola, uel cum adipe porcino reciti, fuerint prius cataplasmaris modo coactae: cum arida uero itidem eodem adipe ammixto, ampliusque farina fabacea, aqua & oleo ac modico passo adiectis. Quin & ipsa anthemis, quae & chamamelon dicitur, ualde calidos dolores & inflammationes maximopere ex natura sua iuuat, statim post uigorem adhibita. Etenim cutem rarefacit & attenuat moderate, & biliosos humores transpirare facit, adeo ut huiusmodi inflammationes etiam sola, nihil ex attenuatoribus & incisoribus, ueluti est artemisia, & aristolochia, & calaminthe, & alia infinita, admixtum habens, curret. Hoc itaque pharmacum ex argenti spuma & urina apparatus, de quo sane sermonem institui, scio quosdam circa totius affectionis uigorem, non modo iuxta particulares exacerbationes, aliquando uero & augmenti tempore, ad dolentes locos pro cataplasmate impositum fuisse, humoresque forinsecus extraxisse, & tumores quidem maiores reddidisse, dolores tamen omnino sedasse ac extirpasse. Ceterum odor ipsius intolerabilis est eis qui teneo olfactus sensu praediti sunt. Compositio uero talis est. Vrinę muli masculi non castrati, sextarios Italicos IIII. spumę argenti lib. II. Spumam argenti tenuissimam tritam in mortario habeto, eique urinam affundito, ad solē uidelicet aestiuū exposite paulatim urinam instillato, & postquam ad mellis spissitudinem peruenerit, urina scilicet consumpta, olei unc. x. x. IIII. addito, adipis porcini ueteris unc. x. VI. & usque quo non amplius inquinari manus, coquito. Vfus uero tempore linteolo exceptum imposito. Oribasius autem axungiae lib. I. coiecit, & medullae ceruinę non salis bessem, & mellis lib. III. reliqua uero eodem modo. Scribunt porro quidam proprii muli urinam accipiendam esse. Resistit enim & obluatur morbo ex natura sua hoc animal. Efficacius autem, aiunt, reddetur, si quis dum coquitur ipsa semel in cacabo expuat, & semel in terram. Atque haec cum quibusdam barbaris nominibus inuenire licet adscripta, quae sane curiosam penitus habent scripturam, atque ob id superfluum & indecorum mihi uisum est, inquit Philagrius, ea adscribere. Etenim citra eorum nominum incentionem ac nomenclaturam, ipsum pharmacum apparatus, eodem modo efficax est, sicut id quod cum nominibus praeparatur. Hippione Philagrii. Hippione uero hoc modo apparatus. Anethi uiridis unc. x. VI. scillę recitis sexuncem, olei omphacini septuncem ac uncie dimidium, aquę sextarios III. Anethum & scillam in aqua & oleo ad triiduum macerato, deinde donec aqua consumatur coquito, & percolato oleo cerae nouae lib. II. adiecto medullae ceruinę libram I. aut si haec non adsit, adipis



adipis ceruini libram unam, adparato & utitor.

*Cerata podagrica.*

Cap. XLIII.

Ceratum ex succo senecionis ualde pulchrum. Ceræ libram unam, olei chamæmelini dodrantem, adipis porcini recētis sexuncem, croci drachmas quatuor. Crocum cum succo senecionis terito, liquefabilia autem liquefacito, percolato, & succi quantum expedit paulatim instillato, fortiterque agitato, atque ubi refrixerint, ad crocum tritum adijcito, & subacta unito, ac utitor. Ceratum dolorem leuans, ad inflammationes in uigore constitutas. Appellatur autem Manus Asclepiadæ. Facit ad excellenter inflammata, eadem hora liberans citra dilationē. Succus hastulæ regiæ cyathos IIII. succi solani cyath. IIII. succi bupthalmi cyath. IIII. succi perdicij cyat. IIII. ceræ, butyri recentis, axungiae, medullæ uitulinæ, calcis uiuæ, cuiusq; quadrantem, terræ cimoliæ drach. XII. terræ samiae drach. XII. sandarachæ drach. XII. nitri bernicarij, spumæ nitri, cuiusq; drach. XII. fecis uini ustæ drach. XII. glutinis chartarum, hoc est polinis cocti, drach. XII. olei boni lib. III. appara & utere. Aliud ad præscripta item efficax. Ceræ, colophonæ, adipis anserini, cerusæ, cuiusque drach. XVI. picis drach. IIII. succi brasiæ, cyathi dimidium, succi foeni græci cyathi dimidium, succi seminis lini cyathi dimidium, succi stratiotæ cyathi dimidium, succi fertulæ campanæ cyathi dimidiū, lactis bubuli cyathi dimidium, oua gallinarum numero IIII. olei libras II. Ex his cerata duo facto, eaq; unā cum eis quæ Aegyptia inscribuntur, in promptu habeto, quæ pauci adeo homines habent, apparato confidenter, nulliq; reuelato, & plus quam hominis nomen assequeris. Podagricum aliud ceratum approbatissimum. Facit ad inflammationes & dolores, etiam in principijs impositum celerrime sanat, & neruos arefactos emollit, adeo ut quidam ei hanc facultatem inesse non credant, dissoluit & pedum nodosos tumores condylomata Græcis appellata. Olei cicini lib. II. succi mandragoræ, drach. XXXII. succi artemisiæ, drach. XXIII. succi rumicis, drach. XXIII. resinæ pinus, drachmas XLVIII. terebinthinæ, drach. XLVIII. adipis anserini, drach. XLVIII. succi rubi, drach. XVI. butyri recentis drach. XLVIII. lycij indici drach. XXIII. sanguinis hircini sicci drach. XVI. lacrymæ hederæ drachmas XXXII. galbani drachmas XLVIII. opopanacis drachmas XXXII. Lycium & sanguinē hircinum & panacis succum cum modico uino terito, & affusis succis, si quidē liquidi affuerint, aut siccis, si illi haberi nequeant, unito. liquefabilia autem liquefacito, eisq; trita adijcito, & ad lentū ignem coquito, spathula assidue agitando donec cogatur. Cæterum ligna quæ ad coctionem eorum suburuntur, arida uicis sarmēta esse oportet. Ceratū podagricum ex bryonia. Egregie facit ad omnes inflammationes & dolores articulorū. Hucus & in uigore & in remissione successum & gloriam reperi. Reperies enim inflammatas partes corrugatas & citra dolorem. Frequenti experimento nobis cognitum est: nam multos eo seruauimus. Radicis cucumeris syluestris drachmas CCCCXLVI. scillæ mundæ drachmas CCCCXXX. radicis hastulæ regiæ drachmas CXLIII. olei raphanini drachmas CCCCXCXVII. ceræ drachmas CXLIII. galbani drachmas XLVIII. Herbas omnes in aqua sufficienti per triduum ma-

defacito, singulis diebus bis ipsas sensim agitando. Deinde affuso oleo, coquito, donec oleum solum relinquitur ad lentum omnino ignem, percolato deinde, & ceram ac galbanum in mortario diligenter trita & emollita addito. Quibus omnibus postremū liquefactis, & ab igne ablati utitor ad omnes doloris affectiones. Hoc etiam ad uiscerū diuturnas inflammationes sum usus. Ceratum in multis approbatum, ad inflammationes pedum, discutens citra dolorem. Vtere eo in uigoribus, & magis in declinationibus. Olei anethini quincuncem, chamæmelini quincuncē, butyri quincuncē, adipis anserini quadrantē, farinæ lupinorū sextantē & dimidiū unciae. Liquefacito & agitando refrigerato, in mortariūq; infundito, terito, & ouorum quinq; crocea singulatim inijcito. Deinde & lupinorum farinam inspergito, unito, utitor. Ceratū Iacobi Psychristæ, ad feruētes pedū inflammationes. Ceræ albæ sexuncē, rosæcei recētis unc. XV. ouorum quinq; candida, aquæ septuncem & unciae dimidiū. Ceratum ad prunas liquefacito, & diligenter agitando refrigerato, deinde in mortarium fundito, & adiectis singulatim ouorum candidis terito, postremū instillata sensim aqua omnia rite unito, & noua olla sufficienter prælota excipito, & infusa aqua pura finito, quotidie aquā permutando.

*Vnguenta ex acopa diuersa ad podagricos, articulorum dolores, ischiadicos, membris exolutos, & trementes.*

Cap. XLIII.

Vnguentum Asclepiadæ. Facit podagricis, articulorum doloribus, & ad omnem neruorum per consensum affectionem. Vini ueteris sextarios duos, lanarum succidarum ex locis sub alis libram unam, spumæ nitri libram unā. Lanas succidas in uino per triduum madefacito, deinde expresso liquore spumam nitri tenuissime tritam inijcito, dissoluitque, ac olei libras duas addito, & coquassata in uitreum uas reponito, & utitor, quotidie agitans & ex eo illi niens locos affectos a somno, & ante balneum, & post balneum, & a cena. Aliud unguentum ex sale podagricos a tota affectione liberat. Salis sordidi, hoc est ipsius terræ libram unam, aluminis scissi libram unam, fecis uini ueteris sextarium unum, floris lapidis asij trientem. Arida sigillatim unumquodque per se diligenter terito, deinde etiā fecē adijcito, simulq; terito, & ad trita demū olei ueteris sextarios duos affundito, coquassato, reponito, ac utitor. Quidā etiā mellis librā unam addunt. Aliud itidē Asclepiadæ. Thuris quadratē, ammoniaci thymiamatis, zingiberis, piperis, salis sordidi, floris lapidis asij, aluminis scissi, cuiusque uncia unā, galbani unciam unā, opopanacis sesquunciam, terebinthinæ quadrantē, olei cyprini, laurini, samfucini, & ceræ, singulorū sexuncē, aceti quantum satis est ad ea quæ dissoluere oportet. Vtere in frigidioribus. Aliud optimum.

Spumā nitri albā cum oleo ueteri terito, eoque locos affricato, & miraberis. Aliud, Asclepiadæ. Vini ueteris sextarios tres, olei ueteris sextarios duos, uirgultorum lauri libram unam, foliorum tenerorū aut pilularū cupressi teneriorum libram unam, ceræ libram unam, galbani unciam unam, sanguinis testudinis terrestriis satis largam copiam. Herbas in aceto macerato, deinde coquito, & ad decoctum liquefacta reliqua addito ac unito, & sanguinem testu



testudinis recentis affuso coquassato, & utitor. Olei gleucini præparatio. Oleum gleucinum dolores & lassitudines nervorum quam maxime sedans. Habet enim ulm calefactoriam relaxantem: facit ad affectiones uulvæ, & ad omnem nervorum per consensum affectionem. Facit ad rigores per circuitum repetentes, quodidiane præsertim & quartanæ febris. Omni enim acopo præstantius est. Maxime autem facit ad eos qui tum retro, tum ante distenduntur, opisthotonicos & emprosthotonicos Græcis appellatos, si calidum puris lanis exceptum locis imponatur. Compositio eius hoc modo habet. Olei omphacini primarij libras ccl. vini falerni veteris odorati sextarios quinquaginta italicos: musti ex uva aminæa, hoc est adstringente alba sextarios italicos centum quinquaginta, olei libras duodecim, aspalathi libras quinque, spathæ unguentariæ quam palmam elaten appellant, libras quinque, hedyari hoc est seminis pelecini sesquilibram, artemisiæ libras duas & semissem, cyperi libras duas & semissem, piperis sesquilibram, musci qui splanchnon & hypnō & bryō Græcis appellatur, libras duas & semissem, xylobalsami libras duas & semissem, asari libras duas & semissem, calsiæ nigræ libras duas & semissem, carpobalsami, foenigræci, cutusq; lib. ii. & semissem, foliorū myrti aridorū dextantem, rosmarini siccæ lib. v. calami aromatici libras quinque, iunci odorati floris libras quinque, thuris libras quinque, crocomagmatis primarij libras, quinque, nardi celtici libras quinque, zingiberis libras tres, quidam uero libram unam & quadrantem, aristolochiæ longæ libram unam & quadrantem, styracis pinguis libram unam & quadrantem, calsiæ fuluæ libram unā & quadrantem, ladani, seminis cardamomi, amomi, radicis panacis, melilothi, samfuci, cutusque libram unam & quadrantem, bdellij sesquilibram, croci libram i. & bessem, costi libram unam & bessem, rosarum siccarum libram unam & quadrantem, opobalsami uascula parua quinque, hoc est bessem, hoc est hemine tertias partes duas, unguenti malabathrini libram unam. Arida contundito, & rariore cribro excutito, omniaq; uino ueteri macerato. Bdellium autem & ladanum præmacerata in pila terito, & ad arida prius macerata adijcito. Sit autem uas unguentarium stāneum, quod diligenter opertum ad dies & noctes duas finito. Deinde uam flaccidam, ita ut nihil roris ei adhæreat accipito, ac pure exprimito, & ex acinis excolato, inq; aliud uas stāno illustratum ipsum mustum infundito. Sit autem magnum uas & capax: quo etiam ad ebullitionem musti locus amplius supersit. Deinde omnia in ueteri uino macerata, itēque oleum ipsum in mustum inijcito, & spatha unguentaria bis per diem agitato, uerum spatham diligenter detergere oportet, ne quod adheret ei acidū factum pharmacum corrumpat. Cæterum uas ipsum operculo & pallijs pluribus superne contegatur, & diligenter obligetur, supponaturq; uasi circulus ex quacuncq; materia qui ipsum sustentet. Quum uero dies quindecim præterierint, amomū cotusum inijciatur, rusumq; ut dictū est agitetur. Trigesima autem die in diplomate coquito, atq; ubi ter uel quater efferbuerint ab igne ablatis statim opobalsamū indito, agitataq; & probe cōrecta tepescerit finito. Deinde totū oleū testa excipito: secem autem,

hoc est calida per sportulas primū manibus, postea etiā prelo exprimito, & abiectis rebus instar fœni exiccat, unguentum per se curato: malabathrinum uidelicet unguenti in diplomate in aqua calida prætepefactū ei adijcito, & cū spatha agitato, & probe unito, & per biduum cōsistere finito, ac mūdīs testulis excipito: indeq; in uasa uitrea transferens reponito. Quidā etiā ammoniaci thymiamatis lib. i. & quadrantē adijciunt. Acopon ex abiete apparatus.

Abietis semē maxime maturū circa Septembrem est mensē. Verū quocuncq; anni tempore libuerit, ipsum semen oleo inijcere oportet: præstat tamen si prius contusum inijcias, & per dies quadraginta sinas. Nos autem, inquit Galenus, etiā ad tres & quatuor menses permisimus macerari: deinde liquore seminis expresso, ipsum quidē semen abiecimus, oleū uero per linteolum excolauimus. Sit autem oleum dulcissimū, & ad libras olei uiginti quinque, seminis modius italicus unus inijciatur. Itaq; ubi oleum, ut dictū est, excolaueris, ac semen segregaueris, ceræ libras iiii. terebinthinæ chiæ bessem ei adijcito, & modice quo uniatur calefacito, excipito ac utitor. Hoc pharmacum cōuenientissimum est ad omnes spontaneas lassitudines, itēq; nō spontaneas, & ad nervorum per consensum affectiones. Eo uti conuenit ad eos qui iuxta carnem atq; omnem corporis molem crudos humores congregarunt, siue concoctione, siue discussione opus habeant. Acopon ex populo nigra. Bonum est etiam acopum, quod ex populi nigrae floribus componitur. Est que huiusmodi. Ad florum populi nigrae iam iam prodeuntū modium unum, olei dulcissimi librae uiginti inijciuntur. Melius tamen fuerit, si flos moderate contusus oleo inijciatur. Exponatur autem ad solē, & singulis diebus agitetur, & in domum calidā deponatur. Post menses autem tres florem exprimito, ipsumq; abiectito. Oleum uero ut acrimoniam arcens, & lenissimū, & discussorium adseruato: ueluti id quod ex abietis semine est apparatus. At uero & terebinthinæ sexuncem inijcere licet, aut minus, aliquando item parum ceræ. quidam enim maxime liquidorum medicaminum usu gaudent, quidam uero crassiorum. Hæc autem pharmaca crudos iuxta carnē & cutem humores discutere possunt, præsertim non ualde crassos, neq; uiscosos. Quod si quis confestim & necessitate moram omnem excludente apparare cogatur, semē ipsum in oleum conijcere oportet, & in diplomate coquere. Infundere autē ad oleū in decoquēdo tantū aquæ aut uini, quācū cōsumi potest, ut tamē quadruplū aut quintuplū oleum extet. Oleū samfucinū Sāfucinū etiam oleum eodē modo apparatus. Cōuenit autē tēpore hyberno, & in regione frigida, & cōstitutione aëris frigida. Potest & ad hoc ceræ & resinæ quippiā addi, si corporibus ex eo illius, diutius ipsum adhærere uelis. Acopon unguentum Marciaton. Unguentū Marciaton præclarū ad articulorū morbos & corporis lāguores ac resolutiones. Styracis primarij flauī trientē: medullæ ceruinæ sextantem, ceræ albiſsimæ quadrantē, mastiches puræ quadrantem, terebinthinæ chiæ unc. i. œsypii unciam i. opobalsami unc. i. olei omphacini, unguenti nardini cuiusque sexuncem, Styracem in pila cōtunde, opobalsamo paulatim instillato. deinde liqueſcibilia liquefacito & percolato, eisq; styracē inijcito: quo lique



quo liquefacto in mortarium omnia transfero, & pistillo donec quam albidissimū fiat terito, ac utitor.

Vnguentum Orchestæ, siue Saltatoris, dolores remittens ac relaxans, ischiadicis ac arthriticis commodum, multo experimento cognitum. Hoc Saltator quum gymnasiarum consuetudinem reliquisset, & in articulare morbum incidisset, usus sanatus est. Cuius item periculum in multis alijs factum est.

Habet autem hoc modo. Altheæ, seminis lini, fœnigræci, rutæ, fabæ, singulorum libr. II. Hæc in aqua madefacta, & terito die post cocta, ut quam crassissimus eorū liquor fiat, percolato: & succi quidam excolati lib. III. cōiuncto, olei uero ueteris, medullæ ceruinæ, opobalsami, adipis anserini, unguenti nardini, singulorum libras duas, ceræ colophonæ, & resinæ pinus, singulorum libras III. euphorbii, opopanacis, terebinthinæ, singulorum libr. I. castorei sexuncem, addito, ac utitor confidenter. Penamœron, hoc est quinquimembre unguentum.

Syracis unciam unam, mastiches sextantem, ceræ albæ quadrantem, opobalsami trientem, unguenti nardini quincuncem. Ceram cū nardino super prunas liquefacito, styracem uero cum opobalsamo terito, & ad ceratum unā cum mastiche iniuncto. Liquefacta percolato, ac in mortario diligenter terito, donec quam albidissima fiant. Utitor. Decamœron, hoc est decumanum, Oribasii. Spicæ nardi, folij, euphorbii, piperis, costi, adarces, singulorum unciam unam, mastiches sesquunciam, opobalsami quadrantem, ceræ sexuncem, unguenti nardini libram unā.

Alia uaria unguenta. Vnguentum ad morbum articulare, & omnem neruorum per consensum affectionem, approbatum. Syracis pinguis unciam unam, ladani pinguis unciam unam, mastiches unciam unam, ceræ sextantem, olei sicyonii quadrantem, adipis anserini libram unam, utitor. Aliud mirabile. Asphodeli radicem in superficie derasam accipito, & cōtusam cum oleo sufficiente coquito, percolato, & ad oleū modicū styracis cōiuncto, quo eliquato sycomori succum addito, & unitis utitor. pedes autē si inde illeueris, confestim dolorē sedabis. Aliud, per multā experientiam cōstans, celerime dolores mitigans. Adipis hircini recētis lib. II. heliotropii tria grana habētis foliorum uiridium lib. I. ouorū assatorū lutea quinque, rosacei optimi trientē. Vtere. Aliud. Olei dulcis sextarios V. fœnigræci sextarios IIII. radicem altheæ, maxime uiridiū, uerbenacæ foliorum, singulorū fasciculū manipularē, galbani dra. IIII. fœnū græcū mundatū & lotum cū uerbenaca & althea ad biduum in aqua madefacito. tertia uero die infusum oleū ad lentū ignē coquito, assidue agitato, ne fœnum græcum adhærescat cacabo. postquam uero herbę omnem liquorē emisierint, eas extrahito, ac oleum percolato, seorsim uero cū modica olei parte galbanum præmollitum liquefacito, percolato, & ad reliquum oleum adiuncto. Utitor sensim & quam plurimum inungendo. facit ad omnem neruorum per cōsensum affectionem, & dolores à frigore obortos. Aliud ad idē. Medullæ e medio scillæ quadrantem, seminis cucumeris syluestris quadrantem, fœnigræci repurgati sextarium italicum I. anethi uiridis sexuncem, samfuci sextarium italicum I. baccarum lauri sextarium I. fertulæ campanæ lib. I. ceræ lib. I. bulborum ciba-

riorum quadrantem, adipis porcini recentis libr. X. uini ueteris odorati sextarios VI. Omnia in uino ad triduum præmacerato, & deinde adipe liquefacto ad macerata infuso, omnia ad uini consumptionem coquito, exprimito, ac percolato: & reliquis abietis, ceram ad adipem liquefacito ac ammisceto: atq; hoc ipso, ut præter opinionē præstati utitor. Smegma podagricum. Ceræ sexuncē, colophonæ sexuncem, succi seminis lini trientem, adipis anserini sextantem, terebinthinæ quadrantem & uncia dimidium, olei omphacini dextantem, ammoniaci thymiamatis unciam unam, thuris quadrantem, lactis bubuli quadrantem & uncia dimidium, candida ouorum nouem, Ammoniacum, & thus, cum lacte & succo seminis lini terito, deinde candida ouorum adiuncto: liquefabilia autem liquefacito & refrigerato, atq; ad trita ammisceto, & pyxide lignea excipiat. Utitor autē tum pro emplastro, tum pro unguento. Vnguentum Castini, ad podagricos & arthriticos, eo sanauit quendam uniuerso corpore languefactum & exolutum, unice tamen articularū morbo prodest. Adipis leonini unc. I. adipis ursini lib. I. adipis equini lib. I. adipis uulpis lib. I. castorei sextantē, medullæ taurinæ sexuncē, medullæ ceruinæ quadrantem, adipis struthocameli quadrantem, adipis phasiani saginati quadrantem, euphorbii sexuncē, opopanacis trientē, mastiches lib. I. styracis trientem, myrrhæ trientem, thuris sexuncem, ammoniaci thymiamatis sexuncem, heliotropii tria grana habentis unc. I. pæoniæ sextantē, artemisiæ unc. I. phylli sextantē, nardi celticæ sextantē, radicis altheæ cōtusæ & cribratæ unc. I. rutæ uiridis dra. IIII. radicis cucumeris syluestris unciam unam, hippuris herbę unciam unā, aristolochiæ dra. IIII. aloës lib. I. sanguinis draconculi libram unam, ceræ sexuncē, colophonæ sexuncem, unguenti nardini libras octo, olei suffumigabilis libram unam, opobalsami septuncem. Arida quam tenuissime trita in mortarium ad styracem cū opobalsamo & ruta tritum indito, unito, ac utitor sedulo. Vnguentum ex hedera, ad arthriticos, ac omnem musculorum aut neruorum per consensum affectionem. Mirabiliter etiam ischiadicis prodest.

Fœni græci lib. I. baccarum lauri numero centū, pilularum cupressi numero XX. sabinæ lib. I. rosmarini lib. I. olei dulcis aut ueteris lib. I. ceræ lib. I. resinæ pinus lib. I. terebinthinæ sexuncem, succi hederæ trientem, aquæ sextar. III. Herbas in crassiores partes contusas ad triduum in aqua macerato, deinde adiecto oleo sufficienter coquito, & percolato, liquefabilia per liquefacta adfundito. Hederae autem succū cum aceto diluito. Refrigeratis deinde liquefactis omnia in mortarium diffundito, & quam plurimū diligenter terito, reponito, ac utitor. Acopon ad molestias ex laboribus & fatigationibus obortas, facit & ad neruorum per consensum affectiones, uehementer cōmodum est. Hoc utitor, inquit Asclepiades ad fatigatos. Samfucini sextarium I. rosmarini cōtusi sextarium I. fœnigræci sextarium I. cardamomi sextarii dimidium, sabinæ sextarii dimidiū, uini dulcis sextarios VI. olei optimi sextarios III. ceræ lib. II. Arida in uinum coniecta per triduum macerato, deinde affuso oleo ad prunas assidue agitando coquito, & quum sæpe ebullierint percolato, cerāq; in eis eliquato, refrigerato, reponito ac utitor, quan-



doq; quidem immixtio, aliquādo uero cū quodam unguēto diluto & liquefacto. Aliud arthriticum, Asclepiadē; pharmacum prosperi successus, Basso in scribitur, quo usus quū antea multo tēpore paralyticus fuisset, ab illa affectiōe liberatus cōualuit. Olei melini, olei cyprini, olei myrtē, cuiusq; trientē, olei ueteris sesquiliāram, cerę libram i. terebinthinę sex uncē, galbani quadrantē, mannę trientē, opopanax sextantē, castorij sextantem, radicis bryonię trientem, æruginis sextantē, spumę nitri albę trientē, piperis sextantē, pyretri sextantē, euphorbij sextantē, adipis hœdini sexuncem, aceti quantū satis est. Bryoniā & pyretrū cum aceto coquito & percolato, eoq; de cocto arida terito, & reliqua liquefacta eis infundito, ac unito. Vitor aliquando immixto, aliquādo liquefacto cum quopiā unguēto. Anthi uiride acopon, ad podagricos & arthriticos multo experimēto cognitū, utere & ad ischiadicos cōfidenter. Phu sesquiunciā, mannę sesquiūciā, cæsypī sesquiūciā, ammoniaci thymiamatis sextantem, aluminis scissi drachm. v. æruginis dra. v. terebinthinę quincuncē, spumę nitri albę trientem, opopanax drach. v. galbani drach. ii. medullę ceruinę drach. v. olei cyprini trientem, olei melini trientē, cerę quincuncē, mellis quincuncem, olei ueteris lib. i. Aeruginē, ammoniacū, alumen, mannā, opopanax, cum modico aceto tere, eisq; liquefacta affunde, ac utere ad omnes cū oleo melino eliquato: in inueteratis uero affectiōnibus etiā ad arces & euphorbij, cuiusq; unc. i. adde.

Aliud eiusdem. Opopanax quadrantem & drach. iiii. terebinthinę drach. iiii. ammoniaci thymiamatis scrupulos x v. cæsypī scrupul. x viii. æruginis scrup. x vi. propolis scrup. x v. aluminis scissi, ladanī, aristolochię rotundę, lacrymę hederę, singulorū scrup. vi. spumę argenti scrup. iiii. salis ammoniaci scrup. ii. camphorę unc. i. colophonię quadrantem, cerę quadrantem, olei quadrantem, utere cum unguento quopiā dissoluto. Aliud acopō unguentum ad paralyticos in principio. Olei gleucini, cyprini, irini, laurini, singulorum libram unā, cerę trientem, terebinthinę sextantem, cæsypī sextantem, castorij unc. i. euphorbij drachm. iiii. ex hoc tū affectę partes, tum eę quę facili affectiōni obnoxie fiunt, illinuntur. Aliud acopon ad coxendicum morbum inueteratum, distortiōnes & resolutiones paralyticas. Est autem, inquit Asclepiades, ualde efficax. Olei ueteris libras ii. irini sexuncem, styracini sexuncem, baccarum lauri sexuncem, terebinthinę, euphorbij, ammoniaci thymiamatis, castorij, piperis, opopanax, galbani, cuiusq; sextantē, medullę ceruinę trientē, & drach. iiii. Liquefabilia liquefacto, & ad arida affundito, unito, ac utitor. Aliquādo quidē immixto, quādoq; uero cum rosaceo aut alio quopiā unguēto liquefacto. Arida uero uīno teruntur. Vnguentū ad opisthotonicos, & quibus canino more os distorquetur, ex melle apparatū. Olei irini, rosacel, gleucini, cyprini, cuiusq; sexuncem, cerę quadrantem, mellis unciam unam. Aliud, ad eadem. Cerę drachmas quinquaginta, terebinthinę drachmas x x v. cæsypī, medullę ceruinę, galbani, ammoniaci thymiamatis, spumę nitri albę, baccarum lauri aridarum, singulorum drachmas vi. olei ueteris sextarios sex, uīni heminam unam. Vitor. Vnguentum ad resolutiones, ualde pulchrum,

Sphæritidis, hoc est, cupressi pilulas ferentis sextantem, marrubij sextantem, herbę caucalidis quę bulborum figuram habet sextantem, stercorum cameli unciam unam, ampeloprasii unciam unam, eryngij unciam unam, cyclamini unciam unam, bituminis unciam unam, peucedani drachmas quatuor, terrę ampelitis unciam unam, seminis apij, cyperi, lapidis gagatę, dictamni, cuiusque unciam unam, sulphuris drach. iiii. lactis asinini sextantem, unguenti fusini quadrantem, medullę cameli quadrantem, adipis asinini unciam unam, pilorū ex cauda simię drach. iiii. olei ueteris sextantem, aceti dodrantem. Apparatum reposito: usus uero tempore cum unguento aliquo diluto utitor. Acopon Erę Cappadocię, ad resolutos, & in uniuersum ad omnem dolorem musculorum & neruorum. Rutę uiridis, pulegij, cyperi, scenigręci, mercurialis, marrubij, rosamarinī, aristolochię, amygdalarum amararum repurgatarum, singulorum libram unam, nitri sextantem, iridis terebinthinę, baccarum lauri, radicis cucumeris syluestris, ammoniaci thymiamatis, sabinę cuiusque libras duas, myrti uiridis libras tres, foliorum lauri aridorū libras tres, ueratri albi sexuncē, cerę libras duas, bdellij libras quatuor, uīni cōgios quatuor, olei cōgios tres. Quę contusione opus habent, crassas in partes contundito, ac modicam aquā, qua cōtusa tantum humectentur, affundito, deinde uīnum & oleum adiuncto, & per diem unum finito. Sequenti uero frequenter agitando coquito ac percolato. Postremum ceram & terebinthinam addito, itemq; bdellium in modico uīno prius tritū. Acopon ex rubetis quod omnem affectiōnem tollit. Radicis cucumeris agrestis uiridis libras sex, olei dulcis libras sex, medullę ceruinę, terebinthinę, cerę, cuiusq; sexuncem, ranas rubetas appellatas uiuas numero sex, rubetas trajecto per pedis plātam filo in oleū demissas donec flaccescāt coquimus: deinde extractis per plantas filo trajectis ranis, syluestris cucumeris radicē uiridē cōcisam iniicimus, atq; donec uires suas in oleum transmittat, coquimus & excolamus: postremum liquefacta, iidem percolata, ad oleum addimus, & in uitro reponimus. Vtere mane & uespere ad podagricos, arthriticos, ischiadicos & resolutos. Per huius usum nouimus homines a podagra & chiragra toto corpore distortos post lauacrum in tantum conualuisse, ut citra omnem offensionem obambulant. Quandoq; apparauimus, inquit Asclepiades, hoc pharmacum additis ad hanc descriptionem samsci libra una, unguenti crocini libra una, opobalsami quadrante, sanguine testudinū numero decem. Aliud, ad podagram & articularem morbum mirabile. Facit & ad diuturnum capitis dolorem, materiā ad superficiem ducens, & ad frontem ac sinciput. Caniculam paruam probē saginatam uiuam, & mustelam uiuā in olei sextarios nouem, ac butyrī libras tres, coniuncto, atq; donec uieta fiant animalia coquito: deinde in percolatum oleum calidum pedes aut manus per totam diem imposito. Galenus autem ait. Quidam uulpeculas & hyenas oleo incoquunt, eoq; articularum morbos curant, atque alij quidē ipsas uiuas in maximum lebetem iniiciunt; alij uero mortuas, ac deinde unā cū oleo quā diutissimē coquunt. Solia deinde ac urnas ex oleo calido explent, atque deinde arthriticos



ricos inscendere, ac multo tempore in eo morari iu-  
bent. Porro oleum hoc maximè discussorium reddi-  
tur, adeo ut etiam ad superficiem extrahat ea quæ in  
profundo corporum continentur, qua ex re magna  
commoditas consequitur. Quin & herinacei terre-  
stres uiui oleo incocti ipsum discussorium reddunt.  
Etenim oleum hoc dolores sedat, tum affectis articu-  
lis in ipsum demissis, tum etiam in eodem ex eo illitis.

Alia unguenta podagrica. Terram nigram, quæ  
præsertim in lenticula reperitur, aut etiam aliam ni-  
grā cū aceto terito, ac illinito. Sedat dolores & inflā-  
mationes etiam in his qui multa prius experti nihil  
profecerunt. Aliud. Cypri folia uiridia trita in  
pastillos redigito, eosq; usu expetente cum aceto te-  
rito ac illinito. Aliud. Croci unciam unam, salis  
usti unciam unam, spumas nitri numero decem, oui  
luteum unius in spinæ decocto ad tertias redacto, te-  
rito. Aliud. Vitrum in aceto probè tritū confidē-  
ter illinito. Aliud. Alumen aceto tritum illini-  
to. Aliud, quod ad genuum fluxionē solum pro-  
fuit, multis antea frustra admotis. Marmor, hoc est,  
crustulam non ustam, contusam, & cum rosaceo tri-  
tam illinito. Ego autem scobem & ramenta marmo-  
ris lota & resiccata in promptu habui. Vsu uero ex-  
petente cū rosaceo trita adhibui. Aliud, ualde bo-  
num. Tecolthi, glauci, myrrhæ, cuiusque unciam  
i. aloës drachm. iiii. Terito, ac siccum adseruato.  
Vsu uero exigente, luteum oui & uinum austerum  
ammisceto ac illinito, & si circumtendat cum so-  
lo uino adhibeto. Aliud. Aëthen lapidem cum  
ouo ac modico rosaceo illinito. Aliud. Vrticæ  
semen & hirundinis nidum cum sapa terito ac illi-  
nito. Aliud mirabile, pro diuitibus. Mameram  
aqua macerato, deinde tritam illinito, & miraberis.

Aliud, multa experientia cognitum, inueteratæ  
etiam affectioni accommodatum. Stercoris dico-  
niæ quadrantem, cum pari axungia tritam illinito.  
Vtere, inquit, neq; cuiquam patefacito. Multos enim  
seruauit. Aliud. Caninū stercus albū cum aqua  
calida tritū, atq; ita tepefactū quā crassissimè illini-  
to, & folia oleris alicuius supra illitionē imponito.

*Ad durities in artubus instar toforum. Cap. XLV.*

Est & hoc optimum pharmacum ad durities artuum  
in tofos coactas. Sunt præterea & alia quædam, ma-  
ximè uero Galenicum, quod ex caseo componitur.  
Ac nostrum itidē ex huiusmodi rebus apparatus,  
inquit Philagrius. Radicis peucedani drachmas ii.  
ammoniaci thymiamatis drachmas ii. myrrhæ dra-  
chmas xiiii. aristolochiæ drachmas vi. pumicis dra-  
chmas vi. castorij drachmas iiii. lanarum succidarum  
ustarum drachmas viii. floris lapidis asij drachmas  
sex, si uero non adsit, salis ammoniaci usti drachmas  
sex, propolis teneræ drachmas sedecim, stercoris ca-  
nini sicci drachmas sex, uisci drachmas sedecim, æru-  
ginis drachmas sedecim, squamæ eris drachmas xvi.  
atramenti sutorij drachmas sex, misyos drachmas  
sex, ceræ drachmas centum, resinæ pinus drachmas  
c. l. picis drachmas c. l. olei ueteris quantum sufficit,  
aceti quod satis est. Hoc quidem igitur nostrum  
pharmacum spissitudine auctum, & imminutum ac  
liquefactum prout probè habere uidebitur, iuxta  
curandorum corporum differentias, extrahit ac ei-  
cit tofos in artubus coactos. Aliud Galenicum,  
quod omnibus ferè corporibus adhibutum cōgruit.

Est autem tale: Caseus bubulus uetustissimus,  
adeo ut ob acrimoniā edī non possit, cū porcinae car-  
nis inueteratæ ac falsæ decocto teritur, & probè emol-  
litus ad durities artuum imponitur. Est & aliud ab  
eodem cōpositum. Pinguedinis pernae porcinae ue-  
teris libram unā, casei caprini uetustissimi librā i. adi-  
pis taurini libram unā, apochymatis, hoc est, resinæ  
cū cera ex nauigijs derafæ liquefactæ libram unam,  
medullæ ceruinæ bessem, hyssopi quadrantem, cypri-  
ni sex uncem, uini Aegyptij hemina dimidiū. Lique-  
scibilia liquefacito, & reliqua ammisceto. Aliter  
apparatus emplastrum ex perna. Iusculi pernae ue-  
teris porcinae libram unam, cæsypii trientem, ammo-  
niaci thymiamatis librā unam, medullæ ceruinæ ses-  
ptuncem, adipis taurini libram unam, ceræ sex un-  
cem, apochymatis è nauibus derafi sesquilibram, cy-  
prini libram unam, casei caprini ueteris libram unā,  
opopanacis unc. i. Aliud, ad tofos artuum. Gra-  
num cnidium desquamatum internum, cū myrrha  
& aceto terito ac illinito, usque ad excessum mirabi-  
le est. Aliud, ad durities artuum muliebrium, &  
eorum qui teneras carnes habent, experimēto cogni-  
tum. Cadmiā quam tenuissimè tritam ac myr-  
teo cerato exceptam imponito. Aliud. Spumā  
nitri cum oleo ueteri & modico croco ac aceto tri-  
tam illinito. Præstat tamen si nitri spuma cum croco  
& aceto teratur, & cum cerato liquido illinatur.

Aliud, ad tofos pedum, quod contentum perrum-  
pit & euacuat eadē ferme hora, sanaturq; idem ut ne ci-  
catrrix quidem relinquatur. Mala mandragoræ ac-  
cipito, semēq; euacuato, ac tenuissimā squamam eis  
obductam detrahito, atq; carnem ipsam probè teri-  
to. Et ceratū ex adipe suillo & cera factū adfundito,  
unito, ac utitor. Hec tria pari pondere sumuntur, aut  
adipis plus additur. Vtere, experimento constat.

Aliud. Calcem uiuam, & nitrum, pari pondere  
axungia excipito ac imponito. Aliud. Dioscori-  
dis. Ammoniacum cum pice arida ad ignē emolli-  
tum imponito. Aliud. Styracem cum ieiuni ho-  
minis salua emollitum imponito; hoc est, mandu-  
cando attritum adhibeto. Facit & sesamum non lo-  
tum tritum impositum.

*De medicamentis purgatiuis ad articulare mor-  
bum accommodatis. Cap. XLVI.*

Quum plurima sint & uaria medicamenta purgantia  
a nobis in tertio huius tractationis Sermonē tradi-  
ta: inde sanè repetere oportet quod cuiq; sit accom-  
modatum. Propriè tamen in podagricis & morbo  
articulari hæc exhibetur. Vniuersale ex hermoda-  
ctylis, quo assidue utor. Hermodactyli sicci recens-  
tis unciam i. anisi, cumini, pipēris cōmunis, croci, pi-  
peris lōgi, seminis cnici interni cuiusq; scrup. ii. myr-  
rhæ dra. i. euphorbij recentis scrup. iiii. mastiches  
scrup. vi. cassiæ scrup. i. moschi siliquam unam. Dan-  
tur ex eo scrupul. iiii. cum aqua mulsa, confestim  
minuit dolores. Quandoquidē autem huiusmodi  
medicamenta fortem euacuationem facere non pos-  
sunt: & quod ex ipsis intus relinquitur, condensari  
& resiccari tofos in artubus generare consuevit: cō-  
uenit usus tēpore ad singulos exhibitionis modos  
scammoniæ siliquas tres addere. In pituitosis uero la-  
thyridas numero v. & agarici scrupul. i. Si uero hu-  
moribus redūdet eger, post dolores sublato eū rur-  
sus cū hiera aut alio forti purgatiuo, temperamneto



corporis apto, purgato. Aliud purgatiuū podagricum, ad dolore affectos præclarū. Calsiæ scrup. i. euphorbiæ sesquiscrupulū, isij, hoc est, chamæleonis nigri scrup. iiii. radicis alypiadis, hoc est, chamælaeæ scrup. iiii. radicis pæoniæ scrupulos iiii. anisi, zingiberis, cumini, mastiches, floris cnici, piperis, cuiusq; scrup. viii. hermodactyli sextāte. Datur ex eo scrup. iiii. cū uino mulso. Antidotus purgatoria ex betonica finiēns febrē. Facit summē ad podagricos, ter in mēse data; facit ad elephāticos & hydropicos, maxime aqua subter cutem laborantes. Est ex ualde laudatis, Comæ absinthij drach. xxi. betonicae drachmas xxi. seminis rutæ syluestris drac. xvi. centaureæ minoris drach. xvi. calsiæ drach. xxi. corticis ueratri nigri drachmas viii. contundito, cribrato, ac cochlearis unius mensura dato ex aqua calida, animaduersione habita ne pharmacum ultra modū purget: est enim inexuperabile. Apud alios etiā laudatum reperi, si gentianæ & chamæpityos, ac aristolochiæ longæ, cuiusq; drachmæ viii. addantur, chamædryos item drachmæ xxi. Omnia, inquit, hæc melle excipio, indeq; ad summum cochlearium unū exhibeo.

*Antidoti podagricæ.*

Cap. XLVII.

Pharmaca quæ podagricis & morbo articulari correptis per os exhibentur, plurima quidem sunt & uaria ac diuersa. Cognita itaq; à me ipsorum multitudine, tum eo quod tetrapharmacū, à quatuor rebus ipsum constituentibus appellatur, tum quod ex hyperico cōstat, itemq; quod ex gentiana paratur, & similibus, quibus pro consuetudine Medici ad simpliciter podagricos utuntur: ipse sanè propriū pharmacū composui, inquit Philagrius, quale iudicaui sufficienter exalfacere posse, non tamen expers facultatis moderatè humectandi, & attenuandi crassos ac uiscosos humores, & quod præclare omnino potest excretionū uias dilatare, unā cū hoc quod uim subducendæ alui & mouendæ urinæ complectitur. Quin & naturales actiones excitat, & transpirationem in sensilem ac obscurā procurat. Compositio autem hæc est. Radicis pæoniæ recentis drac. i. croci cilicij drach. iiii. rhei pontici drachmas iiii. calaminthæ montanæ, comæ saluig, cacuminum stœchadis, seminis thlaspeos, epithymi, centaureæ maioris radicis, cuiusq; drac. iiii. centaureæ minoris succi drac. iiii. succum accipito, quū in summo uigore herba est ac floribus prægnās. iridis illyrica, seminis rutæ syluestris, piperis longi, seminis anethi, cuiusq; drac. iiii. ligustici, seminis apij, petroselinij macedonici, seselis marsiliensis incorrupti, origani, cacuminum thymi, seminis trifolij bitumen olentis, seminis cardamomi medulla priuati, seminis dauci, piperis albi, cuiusq; drac. iiii. mei athamatici drac. ii. asari drach. ii. spicæ nardi, adiatri, calsiæ, polypodij, thuris, galbani puri, terebinthinæ chiæ, bdellij scythici nigri, pinguis, ac resinosi, ammoniaci thymiamaris, cuiusq; drac. vi. radicis symphyti recentis siccae, sabinæ, radicis rubiæ, helenij, agarici, herbæ scordij, seminis paliuri, sarxiphagi, betonicae, radicis cyclamini siccae, seminis uitis tosti, cuiusq; drachm. viii. mastiches chiæ, radicis bryoniæ recentis siccae, terræ lemnæ quæ sphragis appellatur, opobalsami, cuiusq; drachm. xvi. succi peucedani, drach. xvi. qui si non adsit, conijciendæ sagapeni drachm. viii. & radicis peucedan-

ni recentis siccae drachm. xvi. pastilli theriaci drach. xvi. habeant autem pastilli carniū partes duas, panis partem unam: compositio autē ipsorum in Serapione de theriaca dicta est: styracis siquidem adsit calamitæ, si uero non, flauis & pinguis drach. xxi. niger enim ut uiciosus reprobandus est: aristolochiæ rotundæ non rugosæ & plenæ drach. l. osium ceruinorum aut bubulorum ex furis recentium, & ut probè conteri queant, ustorum drach. l. mellis attici despumati quātum satis est, quo ad bonam eclegmatiscōpagem pharmacum reducatur. Arida omnia contundito & cribrato: mastichem autem & thus unūquodq; per se sensim, ne in latas crustulas abeat, terito & cribrato, deinde prædictum pondus ex eis expendito, & reliquis aridis tritis ammisceto. Bdelium autem & ammoniacum ac galbanum & peucedani succum aut sagapeni, in mortarium coniecta tundito, deinde ad ignem emollito, & postea cum modico melle liquefacito, & in pila optimè terito. Similiter autem & terebinthinam per se cum modico melle dissolutam ad reliqua in pilam conijcito. Styracem uero in mortario constanter tundito, opobalsamo paulatim ad eum infuso ac melle calido, deinde similiter in pila terito. Expedit etiam cū modico melle styracem liquefacere ac deinde terere. Cæterum ubi hæc sufficienter fuerint unita & dissoluta, paulatim arida trita addito: melle itidem sensim affuso. Ad finem uero centaureæ succum per se cum opobalsamo terito ac reliquis unito. His uero omnibus probè commisisis, mellis despumati tantum addatur, quantum suffecerit ad pharmacum delingibile futurum, & quo per dulcorem ægro commendetur. Quare si gustu pharmacū iudicaueris, nihil peccaris, etiā si piperis augeas modū. Noui namq; ego ipse quendam qui eo usus plus sibi de pipere ammiscere iussit, itaq; ammiscui sæpe tantum ex ipso post reliquorum omnium mixturam, quantum quisq; pro gustus sui modo experituit. Satis uero manifestum est, quod quando quidem præseruare aliquem à podagrico malo uelimus, tunc sanè plurimum piperis inijcere nō ab re est, & præsertim in hyeme, & si humores frigidi fuerint ac diuturni. Porro centaureæ succus tempore ueris, quum in uigore herba est ac florem fert, ex ea uiridi ac contusa exprimitur, deinde percolatus, usque ad mellis solidioris spissitudinem in sole reficcatur. Cæterum in compositione pharmaci, si is qui eo usus est amaris delectetur, amplius quàm drachmas quatuor ex succo centaureæ ammiscere expedit, atque id maxime si distillationes dissoluere uelimus, si uero æger amara auersetur, quatuor omnino succi drachmas inijcere oportet. Ex hac uero antidoto ad eclegmatiscōpagem redacta ad summum cochlearium i. exhibetur. Dupliciter insuper pharmacū hoc apparatus. Vno quidem modo pastillis theriacis, ut dictum est, ammixtis, itemq; osibus uistis. Alio autem modo contra pastillorum & osium admixtionem præparatur. Licet etiam si quis uelit post sufficientem mellis mixturam, mel ipsum in duas ex æquo partes diuidere, deinde ad unam partem, dimidium præscripti ponderis, tum pastillorum theriacorum, tum osium ustorum infarcire: est autem dimidia pars pastillorum theriacorum drachmarum viii. Osium uero ustorum dimidia pars est drach. xxv. Quandoquidem uero



de uero pastillos theriacos impossibile est per se con-  
tundi, si non cum alijs aridis tundantur, oportet eos  
quantum possibile est in mortario tundere, ac modi-  
co uino ueteri dulci madefacere, deinde in pila tere-  
re ac cum largo melle dissoluere, atque demum ad re-  
liquam mixturam diligenter coaptare. Cæterum  
quum humectare oportet & mollire, attenuareq; &  
crassa dissecare, repurgare item ac euacuare infartos  
humores, iteq; uias dilatare, nihil ex pastillis theria-  
cis, neq; ex ossium cinere ammiscere oportet. Vipe-  
rarum enim caro quàm celerrimè ad cutem ac super-  
ficiem digerit ac distribui solet. Quapropter ubi re-  
crementorum copia adfuerit, & uix fuerint obtura-  
tæ, minimè tutò uiperarum caro exhibetur: sed po-  
stea quū coniectauerimus humores attenuatos esse,  
& dilatatas uias. Ossium uero substantia facultatē ha-  
bet consumendi ac resiccandi, adeò ut etiam sola assi-  
due & opportunè exhibita inueteratum articulare  
morbum curet. Vt uero ne quid ex humoribus resic-  
cetur ac lapidescat, incurabileq; aut ægrè medicabile  
reddatur, tempore præseruationis eam minimè mi-  
scebimus, sed postea, si ita uidebitur. Consumit enim  
& resiccatur humores in ipsis articulis iuncturis re-  
lictos. Forinsecus etiam quādo discutere animus est,  
pharmacum hoc oleo ueteri aut sicyonio dilutū ma-  
ximopere profuit, maximè si citra ossium additio-  
nem est apparatus. Tunc enim non modo discussio-  
riam, sed etiam coactoriam facultatē acquirit. Qua-  
re eis qui non discussione solum, sed & exterarum  
corporis partium corroboracione opus habent, cō-  
modissimè hoc modo adhibetur. Hoc pharmaco si  
& arthriticis & podagricis medeberis, minimè pœ-  
nitueris. Hepaticos item ex obturatione affectos,  
itemq; splenicis curabis, & à uipera morsos, & qui  
uenenum hauserunt, & comitiali morbo apprehen-  
sos, si eo opportunè utaris: quin & aliorum morbo-  
rum per ipsum curationem fieri reperias sufficientē,  
de quibus sermonem producere minimè operæ pre-  
cium existimo. Theriaca itē ex uiperis, quæ An-  
dromacho inscripta est, de qua plurima tradidit Ga-  
lenus, utiliter exhibetur frigidioribus & magis hu-  
meatis corporibus, forinsecus etiam cōmodè illini-  
tur cum oleo ueteri aut sicyonio dissoluta, ut dictū  
est. Sales quoq; Theriaci, & ex gentiana pastillus, &  
qui ex hyperico constat, & similia, his qui ex multo  
& crasso fluxu ægrotant, utilia existunt. Verum his  
qui ex biliosa fluxione afficiuntur, & ut simpliciter  
dicā, omnibus calidiori temperamento præditis hæc  
ipsa nocentissima sunt, & quod suprā relatum est no-  
strum pharmacū. Ex horū enim pharmacorū potu  
non solum nihil opis ferunt hi qui calidiori tempera-  
tura præditi sunt, sed & resolutionibus immedicabi-  
libus apprehenduntur, sæpe nimium resiccati, & in uitio-  
sos humores dilabuntur qui eos erodunt, & in quib-  
us aliquādo pessimè intereunt. Porro in huiusmo-  
di pharmacorū usu etiam raritatem & densitatē cu-  
randi corporis respicere oportet: ampliusq; & æta-  
tem, & anni tempus, & regionē. Ad hæc itaq; respec-  
tu habito minus aut plus de eo dabis, neq; uero mi-  
nus & ad magnitudinem aut paruitatem corporis  
respiciendum. De uiperarum esu. Viperarū esus  
omnibus podagricis & arthriticis plurimum cōmo-  
ditatis affert, quemadmodū etiam anhelosis, & ele-  
phantasi correptis: exigit enim per cutem omnia re-

dundantia recremēta, siue calida siue frigida fuerint,  
quæ morbi ipsius sunt causa. Oportet autem crassa  
& uiscosa ex ipsis prius attenuare ac euacuare: quod  
ubi factū est, reliqua faciliè per uiperarum esum eua-  
cuantur, nimirum ad cutem delata atq; exclusa. Qua-  
propter etiam in sole ipsarum ferarum comestione  
facere iubet, utpote quod inde iuuentur, atq; ui calo-  
ris humorum delatio foras feratur: curandum iamē  
ne caput probè cōtegere ab æstu negligamus. Opor-  
tet autem recens captas esse uiperas, & iustæ magni-  
tudinis, & non ex maritimis: tales enim siticulosæ  
existunt. Cæterum ex uipera ipsa tum caput, tum  
caudam amputare oportet, itemq; interanea omnia  
abijcere, ac ex tribus aquis lauare, deinde cum aqua  
& anetho maximè uiridi, & modi cōgruentis oleo  
coquere, & post sufficientem coctionem congruenti  
sale condire, ac uiperam ueluti anguillam comeden-  
dam exhibere. Porro quidam ex harum comestio-  
ne plurimum exudant, & pediculorum copiam ge-  
nerant. Omnes tamen qui eas comederunt, maximè  
se alleuatos sentiunt. Quapropter his qui corpus re-  
crementis exundans habent, etiam bis ac ter in anno  
exhibere conducit: bis quidem ueris tempore, semel  
autem in autumno. Quod si uero sint quibus cor-  
pus per insensibilem & obscuram trāspirationem,  
aut etiam per sudores naturales euacuetur, his omni-  
no uiperarum esu interdiciemus. Periculosa enim sit  
huiusmodi ipsarum comestio propter immodicam  
per cutem exhalationem. Dicemus autem ex ordine  
& de alijs antidotis. Antidotus ex quatuor rebus  
constans. Tetrpharmacum igitur ex quatuor re-  
bus apparatus, & à quibusdā Mysterium appella-  
tum, ex gentiana componitur & aristolochia, baccis  
lauri, & myrrha, æquali pondere coniectis. Datur  
autem singulis diebus ex ea cochlearij dimidium ex  
aqua calida ad præseruationem. Prodest pituito-  
sis: biliosos autem lædit. Antidotus ex hyperico.

Antidotus ex hyperico à quibusdam hoc modo  
descripta est. Antidotus sanans podagras, coxendi-  
cum morbum, & ut in uniuersum dicam, omnes iū-  
cturarū & articulorum morbis implicatos per an-  
num potata. Firmat stomachum, & uisum acutiorē  
reddit. reliquosq; item sensus clariores & illustrio-  
res facit: euacuans leniter per urinam: unde etiā neq;  
aliud ullum membrū offensionem sentit. Neq; enim  
materiā ex affectis locis ad aliam corporis regionē  
depellit, quemadmodum epithemata forinsecus con-  
trahentia & cohibentia facere solent: sed causas mor-  
borum tum per uesicæ, tum per alui locos expellit,  
atq; uniuersum corpus sanius reddit. Quare etiam  
comitiali correptis morbo, auxiliatur in potu.  
Alios item à diuturnis & uehementer grauib; capi-  
tis doloribus liberauit, qui etiam de sanitate sua iam  
desperauerant. Splenem uero & hepar in scirrhum  
indurata moderatur ac demulcet. Articulare au-  
tem morbum adeò efficaciter sanat, ut etiam durici-  
es instar toforum in articulis quibusdam per uim  
morbi coactas dissoluat. Compositio autem hoc  
modo habet: Trixaginis dodrantem, centaureæ bes-  
sem, aristolochiæ rotundæ septuncem, radicis gen-  
tianæ sexuncem, comæ hyperici quincuncem, petro-  
selini trientem, mei athamantici quadrantem, phu-  
pontici sextantem, agarici sextantem. Mellis despu-  
mati lib. iiii. Hoc autem modo parato. Vnumquod-



que per se contundito & cribrato: deinde ponderata simul misceto, ac rursus cribrato, quo accurata permixtio fiat. Deinde melli despumato ammisceto, ac pastillos formato pondere drachmæ 1. atq; ex eis unum pro uice exhibeto. Vfus eius est circa tertiam horam diei, ubi uenter onus suum pro consuetudine deposuit: pharmacum uero ipsum cum aquæ calidæ sesquicyatho liquefacito. Oportet autem eum qui bibit, si nihil prohibeat, deambulare, quo ex motu euntis pharmacum inferna cōtingat. Porro pharmacum hoc aliàs quidem præclare efficax est, utpote ex fortibus simplicibus compositum: amplius autem efficacius redditur per aristolochiam, quæ natura sua articularibus morbis auxiliari solet, & duris corporibus in primis prodest. Ex cancris autem pharmacum etiam mollibus corporibus cōducit. Habet autem Antidoti ex cancris compositio hoc modo. Cancrorum magnorum uiuorum ustorum in greo uase, trientem, gentianæ incorruptæ quincuncem. Thuris integri & non secti albi unc. 1. Datur inde cochlearium unum. Ad cancrorum uero exustionē ligna uitis aduruntur. Pharmacum ex fluuiialibus cācris ustitis. Describā porrò & aliud pharmacū corporibus recrementis abundātibz & mollibus cōducens: est autē id quod à rabido cane morsus datur, cuius cōpositionem in Sermone de rabidi canis morsu tradidimus, huius inquā operis sexto. Adieci autem ego, inquit Philagrius, ad huius pharmaci apparatus, etiam petroselini drachm. viii. ut plurimum uero x. quo urinæ ciendæ uim acquirat. & multos sanē arthriticos iuuat, præsertim quibus tenerum & album corpus fuit, mediocris mystri mensura ex eo data, aliquādo ex aqua sola, aliquando ex aqua mulsa. Quin & melle despumato sæpe ipsum excepi, quo ualidum & citra transpirationem adseruarem, deinde uero ueluti prædictum est, bibendū exhibui.

Antidotus ex centaureis. Antidotus podagrica ex duobus centaureæ generibus est, ex uehementer laudatis & præter opinionem auxiliantibus, quod ipsum experientia testatur. Nam multos eius usu seruos noui. Est enim adeò salutaris podagricis, ut quosdā per xv. annos podagra correptos, eius usus ad iter pedibus faciendum præparauerit. Est autem stomacho grata, aluo conferens, & urinam ciens. Habet autem hoc modo. Centaureæ minoris comæ, cētaureæ maioris radices, trixaginis, gentianæ, aristolochiæ rotundæ, singulorum æquale pondus, puta lib. i. cōtundito & cribrato, & drach. i. præbeto per dies xl. ex aqua calida. In sequentibus autē ex ordine anni diebus cccxxv. drachmæ dimidium eodē modo præbe. Alia antidotus podagrica usu cognita. Anisi, cumini Aethiopici, piperis communis, piperis longi, seminis cnici interioris, cuiusq; drach. ii. euphorbij drach. iiii. mastiches drac. vi. myrrhæ drachm. iiii. moschi siliquam unam, caudæ scinci unius extremū. Mellis quantū satis est. Datur nucis auellanæ magnitudine ex aqua mulsa. Hac amicus quispiā usus bis in hebdomade ex ipsa bibendū præbuit, & affectos locos ex uiridi unguento Antho inscripto cū rosaceo aut melino singulis diebus illeuit, multosq; seruauit. Antidotus podagrica experimento constans, accipitur per annum, Anastasij. Agarici unc. i. rhei un. i. petroselini sextantem, phu sesquunciam, gentianæ quadrantem, hyperici sextā-

tem & uncia dimidiū, cētaureæ unc. i. Aristolochiæ longæ sesquunciam, & rotundæ quadrantē & uncia dimidiū, chamædryos trientē & uncia dimidiū, cinamomi un. i. folij unc. i. aloës primariæ unc. i. mei sextantē, aut spicæ nardi duplū. Alia antidotus podagrica experimēto cognita, datur per annum. Doari Episcopi. Agarici un. i. rhei Barbarici unc. i. petroselini sextantē, phu sesquunciam, gentianæ quadrantē, hyperici sextantem & uncia dimidium, centaureæ trientem, mei sextantem, aut spicæ nardi trientem.

Qui podagrici lauādi sint & quomodo. Cap. xlviii. Manifestum quidem existimo quod post inflammationum remissionē omnibus podagricis balneum cōmodissimum existit, quandoq; autem & in uigore utiliter adhibetur, si æger prurigne aut uigilijs uexetur, aut aliàs labore sit fatigatus. Lauare autem oportet tempore remissionis, ita ut spongiis aceto & sale permixtis madefactas locis affectis circūponamus, ut à fluxione immunes permaneāt. Amplius autē linteis siccis & plurimo nitro totū corpus pficare, & ut aëri diutius immorētur iubere, & moderate nō solum calidā, sed frigidā adhibere, & in ipsarū solijs desiderare. Vtile autē est balneū natura siccioribus, & gracilibus, & colore nigris, & qui à tumore in totum sunt liberati. In huiusmodi enim affecta particula nō intumescit adeò magno tumore excitato, uerū distrahi, uelut à cane apprehensas, in profundo sitas corporis partes aiunt, & inopinabili tensione distēdi. Et inhorrescunt sæpe, pellicula quæ os ambit, à fluxione salsa aut acri & tenui ualde ac erodēte uellicata. Hi à balneis opē sentiūt, quapropter nō semel tantū, sed iterū atq; iterum os lauare oportet, & in aëre per omnia moderato, citra aliquā pinguedinem adhibitam immorari, hoc enim modo magis euacuabūtur. Deinde oleo dulci cū aqua cōquassato illitos in aquā calidā demittere, & in eo aliquandiu morari præcipere. In frigidam uero minimè demittatur, nisi immodici caloris sensus infestet. Vt plurimū uero tepida aut lactei rēperamenti aqua perfundatur in prima balnei domo. Si uero cum tumore quodā nō ualde magno post euacuationes suborto aliqui dolore uexentur, conueniet in aëre balnei reliquū corpus per sicca lintea usq; ad rubefactionē perfricare. Vtendū autem & exterforijs smegmatis ex adarce, nitro, pipere, euphorbio, staphide agresti, æquali pōdere cōiectis, apparatus. Atq; his quidem reliquū corpus contentē defricatū excitetur: pedes uero eorū muria moderate perfundēdi sunt, & in calida aqua nō morandū, frigida uero ne cōtingēda quiddē. Quod si balneum nō adsit, eos qui ab acrioribus fluxionibus uellicantur, aqua dulcissima calida perfusos fouere oportet, & totū corpus ex oleo chamæmelino in ieiunio illinire: alios uero temperamento non calidos, & qui tamen tumore habeant post euacuationes relictum, si balneum non adsit, cucurbitulis admotis curabimus, initio à lumbis factis, sursum usq; ad scapulas progrediendo, fricabimus etiā per sicca lintheola & per exterforia smegmata iam dicta. A talibus enim hi tum in balneo, tum citra balneū opem sentiunt. quale & hoc est ex profundo humores euocās ac trāsferens, quod metasyncriticō Græci uocant. Eo itaq; in balneo urantur, aut si balneū non admittāt, post exercitia ex eo defricentur, deinde spongijs extergatur id quod ex hac arida inspersione



ne corporibus adhæret. Cōpositio eius hæc est. Nitri rubri lib. i. sinapis sicci lib. ii. sabinae lib. ii. uera-  
tri albi lib. i. sulphuris uiui lib. i. Aliud Andreæ co-  
mittis. Nitri, ueratri nigri, piperis æqualibus parti-  
tibus utere. Præter opinionem autē eis cōducit Sic-  
cum Magnum ipsi affectis locis in balneo insper-  
sum. Estq̃ hoc. Recremēti siue scorix ferri, spumæ  
nitri albæ, cuiusque æquales partes misce, & odoris  
gratia parum folij & costi adde. Siccum quod psi-  
lothro podagricorū inspergitur. Mastiches, thuris,  
lapidis asij, pumicis assati, alcyonij, staphidis agre-  
stis, cimolix, ueratri albi, samscud, spumæ argenti,  
amyli, careophylli, spicæ nardi, cyperi, floris iuncti  
odorati, buglosi, singul. lib. i. auripigmenti unc. x.  
sandarachæ unc. x. saponis quantū satis est. Prædi-  
cta omnia, excepto auripigmento, sandaracha & sa-  
pone, cōtundito, cribrato, & sicca in promptu habe-  
to. Vsus uero tempore calcis uiuæ unc. x. in oryzae  
aut prisanæ succo dissoluito, & auripigmenti unc. i.  
sandarachæ unc. i. saponis drac. iiii. & prædicti sic-  
ci cochlearia ii. magna, omnia quā tenuissimē tri-  
ta inspergito, ac unito, eoq̃ pedes aut etiam alios lo-

cos fluxione infestatos illinito. Cæterū qui hoc sic-  
co inspergimine utūtur, hoc modo dietam suam in-  
stituant. Thoth, hoc est, septembri, lac & edant & bi-  
bant. Phaophi, hoc est, octobri, allia edant. Athyr,  
hoc est, nouembri, in totum nō lauent. Choiac, hoc  
est, decembri, brassicam ne edār. Tybi, id est, ianua-  
rio, mane meracum bibāt. Mechir, id est, februario,  
betam ne edant. Phamenoth, hoc est, martio, dulcia  
tum in cibo, tum in potu sumant. Pharmuthi, id est,  
aprili, raphanū ne gustent. Pachon, id est, maio, po-  
lypum ne edant. Pauni, hoc est, iunio, mane frigidā  
aquam sumant. Epiphi, hoc est, iulio, à ueneris absti-  
neant. Mesori, id est, augusto, maluā ne edant. Sic-  
cum Maloriani. Aluminis scissi sextantem, pumi-  
cis unc. i. terito & in uitro reponito. Vsu uero expe-  
tēte, uino adstringēte locos praelauato, & quodam-  
modo extergito, ac siccū ipsum inspergito, tenerisq̃  
manibus affricato, & siccari finito. Rursusq̃ idem  
per diem octies facito, & toties similiter si possibile  
sit in nocte, & uidebis tumores quā celerrimē dis-  
cussos & resolutos. Ego utriusq̃ & aluminis & pu-  
micis equale pondus cōieci, & magis sanè succelsit.

FINIS.

# INDEX EORVM QVAE IN DECIMO TERTIO SERMONE AETII CONTINENTVR.

|                                                                                               |                                                                          |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>D</b> E his qui ab homine morfi sunt. cap. i.                                              | na & usus. cap. xxiiii.                                                  | De salamandra. cap. lxi.                                 |
| De his quos canis momordit. cap. ii.                                                          | De ammodyte aut cēchria. cap. xxv.                                       | De lepore marino. cap. lxi.                              |
| Ad leonum, pantherarum, ac ursorum morsus. cap. iiii.                                         | De sepe. cap. xxvi.                                                      | De rana rubeta. cap. lxi.                                |
| De suum morsu. cap. iiii.                                                                     | De cenchrite siue Acontio. caput xxvii.                                  | De rana palustri. cap. lv.                               |
| De his qui à fele morfi sunt. cap. v.                                                         | De ceraste. cap. xxviii.                                                 | De hirudinibus. cap. lvi.                                |
| De morsis à crocodilo. cap. vi.                                                               | De dryino. cap. xxix.                                                    | De ephemero. cap. lvii.                                  |
| De bestijs uirus eiaculantibus, & pri- mum quibus artibus adhibitis ea tol- lantur. cap. vii. | De amphishæna & scytala. cap. xxx.                                       | De dorycnio aut solano furioso. caput lviii.             |
| Illitiones præseruatiue. cap. viii.                                                           | De pareia & spathiuro. cap. xxxi.                                        | De aconito. cap. lix.                                    |
| Quæ apposita uenenata animalia oc- cidant. cap. ix.                                           | De peliade & elape. cap. xxxii.                                          | De melle quod in Heraclea ponti na- scitur. cap. lx.     |
| Communia remedia ad omnes uene- num iaculantium ferarum plagas. ca- put x.                    | De basilisco. cap. xxxiii.                                               | De coriandro. cap. lxi.                                  |
| De uespis & apibus. cap. xi.                                                                  | De draconibus. cap. xxxiiii.                                             | De psyllio. cap. lxii.                                   |
| Ad stellionis morsum. cap. xii.                                                               | De chersydro. cap. xxxv.                                                 | De cicuta. cap. lxiii.                                   |
| Ad salamandræ morsum & lacertæ chal- cidæ. cap. xiii.                                         | De rana rubeta. cap. xxxvi.                                              | De smilace cap. lxiiii.                                  |
| De mure araneo. cap. xiiii.                                                                   | De turture seu pastinaca marina. ca- put xxxvii.                         | De succo carpasi. cap. lxv.                              |
| Ad scolopendræ plagam. cap. xv.                                                               | De murena. cap. xxxviii.                                                 | De herba sardonis. cap. lxvi.                            |
| Ad araneæ ictum. cap. xvi.                                                                    | De dracone marino. cap. xxxix.                                           | De hyoscyamo. cap. lxvii.                                |
| De tetragynathis. cap. xvii.                                                                  | De scorpio marino. cap. xl.                                              | De mandragora. cap. lxviii.                              |
| De percussis à phalangio. cap. xviii.                                                         | De culicibus. cap. xli.                                                  | De succo papaueris. cap. lxix.                           |
| De his quos scorpio percussit. caput xix.                                                     | De muscis. cap. xlii.                                                    | De toxico. cap. lxx.                                     |
| De morsis ab aspidē. cap. xx.                                                                 | Ad pulices. cap. xliii.                                                  | De his qui ixian hauserūt. cap. lxxi.                    |
| De uiperæ maris & scæminæ morsu. ca- put xxi.                                                 | Ad cimices. cap. xliiii.                                                 | De chameleone. cap. lxxii.                               |
| De dipsade. cap. xxii.                                                                        | De uenenis. cap. xlv.                                                    | De fungis. cap. lxxiii.                                  |
| De hamorrho & hamorrhoidē. ca- put xxiii.                                                     | Methodus præseruatiua ne quis à ue- nenoso pharmaco ledatur. caput xlii. | De sanguine tauri. cap. lxxiiii.                         |
| Præparatio sanguinis testudinis mari- nae & usus. cap. xxiiii.                                | Quomodo cognoscantur qui uenenum sumpserunt. cap. xlvii.                 | De lacte in grumos coacto. ca. lxxv.                     |
|                                                                                               | Communia remedia & cura omnis ue- neni. cap. xlviii.                     | De gypso. cap. lxxvi.                                    |
|                                                                                               | Ad eos qui cantharidas hauserunt. ca- put xlix.                          | De cerusa. cap. lxxvii.                                  |
|                                                                                               | De buprestis. cap. l.                                                    | De argenti spuma. cap. lxxviii.                          |
|                                                                                               | De eruca pini. cap. li.                                                  | De argento uiuo. cap. lxxix.                             |
|                                                                                               |                                                                          | De calce, sandaracha, & auripigmen- to. cap. lxxx.       |
|                                                                                               |                                                                          | De thapsia, ueratro, elaterio, & aga- rico. cap. lxxxii. |
|                                                                                               |                                                                          | De ruta syluestris & melanthij. no- I 4 cumen            |



|                                                                                |                                                                   |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cumentis. cap. LXXXII.                                                         | De Antidoti Mithridatica usu. cap. c.                             | ces. cap. CXIX.                                                                                      |
| De acervato frigida aqua potu. caput LXXXIII.                                  | Antidotus Esdrae aut Prophetae doctoris. cap. CI.                 | De Elephantiasi, ex libris Archigenis. cap. CXX.                                                     |
| De strangulatis. cap. LXXXIII.                                                 | Antidotus paeonia. cap. CII.                                      | Cura elephantiasi affectorum. caput CXXI.                                                            |
| De his qui ex alto ceciderunt. caput LXXXV.                                    | Antidotus aromatica optima, Galli. cap. CIII.                     | De his qui castrantur. cap. CXXII.                                                                   |
| De praeservantibus & praesagis animilibus. cap. LXXXVI.                        | Antidotus ex duobus piperis generibus. cap. CIII.                 | De uiperarum esu, & de pruritibus. Archigenis. cap. CXXIII.                                          |
| De theriaca ex uiperis Andromachi. cap. LXXXVII.                               | Antidotus Athanasia. cap. CV.                                     | Illitiones ad tumentes corporis eminentias. cap. CXXIII.                                             |
| Pastillorum scilliticorum preparatio. cap. LXXXVIII.                           | Oribasij theriaca qua Marcus Imperator usus est. cap. CVI.        | Dieta Elephantiasi correptorum. caput CXXV.                                                          |
| Hedychroi confectio. cap. LXXXIX.                                              | Oribasij theriaca ex Bryonia. caput CVII.                         | De pruritu, Archigenis. cap. CXXVI.                                                                  |
| Pastillorum theriacorum preparatio. cap. XC.                                   | Antidotus Hadriani. cap. CVIII.                                   | Ad pruriginosas papularum eruptiones. cap. CXXVII.                                                   |
| De reliquis quae in antidotum coniunguntur. cap. XCI.                          | Antidotus Acharistus. cap. CIX.                                   | Ad pustulas psyrdracas Graecis appellatas, & ad papulas ex feruore aut sudore obortas. cap. CXXVIII. |
| Modus conficiendi. cap. XCII.                                                  | Philagrii Antidotus ex sulphure uiuo. caput CX.                   | Oribasij ad nigras cicatrices inalbandas. cap. CXXIX.                                                |
| Post quantum tempus ea sit utendum. cap. XCIII.                                | Theriaca Democratis. cap. CXI.                                    | Ad ulcerosas papularum eruptiones, tum in tibijs, tum in toto crure obortas. cap. CXXX.              |
| Quanto tempore efficax sit. caput XCIII.                                       | Antidotus Theodoretus ex anacardijs. cap. CXII.                   | Ad cicatrices nigras ex ulceribus relictas. cap. CXXXI.                                              |
| Modus probandi theriacen. cap. XCV.                                            | Theodoretus aliter apparatus. caput CXIII.                        | De Vitilagine seu alphi. caput CXXXII.                                                               |
| De exhibitionis mensura, & utendi modo, & quibus conueniat morbis. caput XCVI. | Theodoretus per acetum mulsum apparatus. cap. CXIII.              | De leuce vitilagine altius insidente, Galeni. cap. CXXXIII.                                          |
| Sales Theriaci ex libris Martiani, cum quibus consentit Galenus. ca. XCVII.    | Picra siue amara per acetum mulsum apparatus, Oribasij. cap. CXV. | De lepra, Archigenis. cap. CXXXIII.                                                                  |
| Antidotus Mithridatica. cap. XCVIII.                                           | Cyphi ex rebus XXXVI. cap. CXVI.                                  |                                                                                                      |
| Confectio Cypheas. cap. XCIX.                                                  | Cyphi ex rebus XXVIII. cap. CXVII.                                |                                                                                                      |
|                                                                                | Musuaphij confectio. cap. CXVIII.                                 |                                                                                                      |
|                                                                                | Thymiana siue suffimentum Berenices. cap. CXIX.                   |                                                                                                      |

# AETII MEDICI GRAE

## CI CONTRACTAE EX VETERIBVS MEDICINAE TETRA

BIBLI SIVE QUATERNIONIS  
QUARTI SERMO PRIMVS, ET  
EX ORDINE XIII.

*De noxiorum animalium morfu, & de bestiis uirus eiacularibus. Et de Elephantiasi, pruritu, scabie, alphi, lepra, leuce. Et de antidotis multae utilitatis.*

*De his qui ab homine morfi sunt.*

Cap. I.



De noxiorum animalium morfibus scribere auspices, initium ab his qui ab homine morfi sunt faciemus, ut Archigenes inquit, in his igitur quos homo momordit, loco ex oleo praesito, foeniculi radicem tritam cum melle cataplasmatis modo ulceri imposito usque quo repurgetur, deinde his quae explere possunt utitor. Cuius generis & hocce est. Mellis, terebinthinae, butyri, adipis anserini, medullae cerui, aut si non adsit, uiculi, aequalibus partibus liquefactis utitor. Si uero sinus statim in principio fiat, eum aqua multa diligenter eluito, & spongiam nouam Africam melle cocto imbutam imposito, & ligamento quod ad sinus referetur obligato, ac tertio die soluito. Aut myrrham terebinthina exceptam ut malagma imposito. Aut aes tritum melle cocto exceptum ueluti collyrium indito, & postquam repurgaris, coagulato: uel ossa uirulina ad albedinem usta, & pice liquida siue cocto melle, aut utrisque ex aequo simul excepta, in sinum indito, uel

mannam, aut ipsum adeo thus cum myrrha terito, & cum uino ac oleo imposito. Emplastra autem cruentis uulneribus destinata & adglutinatoria eis conueniunt. in expansis quidem & planis ulceribus, uiride ex atractylide. In sinibus uero cruentis emplastrum Piscatoris, ex aceto apparatus, & Athena, & Nigrum appellatum.

*De his quos canis momordit.*

Cap. II.

In his uero quos canis momordit, statim acetum irrorato, & expansa palma morsum percutito. Deinde nitrum cum aceto tritum ex alto supra morsum destillato, & spongiam nouam posca aut aceto imbutam imposito, & ad tres dies obligato, ligamentumque supernum ex posca aut aceto, prout uisum fuerit, madefacito. Egregie enim auxiliatur. Post haec uero ut commune ulcus curato. Aut perdicium herbam cum sale tritam imposito, quotidie eam alterando donec excidat crusta. Deinde ubi ad cicatricem perducere uolueris, ipsam per se tritam imposito. Quod si magnus sit morsus, quemadmodum a magnis canibus infligi solet, praescripta in sexto Sermonemethodo curato, ueluti eos qui a rabido cane sunt sauciati.

Si uero



Si uero cauus & angustus appareat morsus, in principio cum aceto, ut dictum est, irrorato. Deinde nitrum itidem cum aceto tritum ex alto superstillato, & anetho sicco usto morsum expleto, & linteolum conuolutum ex aceto madefactum indito, & obligato. Post triduum uero soluto, & reperies morsum repurgatum. Idem facit & cum inu tritum morsui inditum. Postquam uero ulcera fuerint repurgata, praedicto pharmaco utere liquefacto ad hominis morsum relato. Si uero inflammatio succedat, lenticulam cum malicorio coctam & tritam imposito, aut rubi folia contrita. Aut panis medullam in betae succo madefactam cum modico rosaceo pro cataplasmate adhibeto. Ad uulnera uero iam suppurata erui farinam cum melle subigito & morsum expleto. Summe enim auxiliatur. Aut irim cum melle & linamentis indito, ac supernè lenticulam coctam tritam cum modico melle & rosaceo pauco imposito. Repurgatis uero iam ipsis cum praedicto liquido pharmaco expleto, ac deinde his quae cicatricem inducere possunt, utitor. Emplastra autem ad demorsos à cane uel urso aut similibus animalibus statim à principio commodè adhibentur ex sale & cerusa apparatus. Etenim uenofum humorē in moribus ex dentibus relictum expurgant, & callosam ex impactis dentibus concretionem explanant.

*Ad leonum, patherarū, ac urforū morsus. Cap. III.*  
Horum animalium consimiles sunt morsus: nam robusta sunt haec & unciungula, implicantque quicquid contigerunt unguibus penetrantia, & corpora ipsa dilaniant. Perseuerando autem in manducatione non solum carnes dilaniant, sed & ossa aliquando ad polentae similitudinem confringunt, indeque & uicini stimulis affiduntur nerui. Satis uero manifestum est, quod corpora quae in eiusmodi ac tantas calamitates inciderunt, non effugiunt periculum ab alienationis: nam etsi maneant, putrefactionem suscipiunt, & ulcera serpentina inducunt. Huiusmodi igitur uulnera cum aceto elota & circumrasa, solutis item corporibus ac ossibus extractis, emplastris integere oportet, & post suppurationem partium dilaniatarum, repurgantibus linamentis curare & cicatricem inducere, quemadmodum in communibus ulceribus solemus. Emplastra autem his conuenientia sunt, id quod ex salibus constat, & similia, cuiusmodi etiā hoc est.

Asclepiadae pharmacū, ad cruenta uulnera accommodatum, & ad intercisos neruos & ad urforum ac leonum morsus. Aeruginis rasae drach. viii. aluminis rotundi drach. viii. squamæ aeris drach. xii. mannae, galbani, cuiusque drach. xii. ceræ unc. xvi. resinae pinus aridae unc. xxxii. olei lib. i. Arida & galbanum aceto terito, & liquecibilia liquefacta adfundito. Aliud, emplastrum Venatorum appellatum, admirabile. Radicis symphyti, comae dictamni, iridis Illyricae, atramenti Indici, aluminis scissi, misyos, ammoniaci thymiamatis, myrrhae, cuiusque sextantem, salis cappadocici quincuncem, aeris usti trientem, aristolochiae rotundae, iridis astragalitidis, gallarum, rosarum siccarum, squamæ aeris, singulorum unciam unam, aeruginis quadrantem, picis sesquilibram, resinae pinus siccae libras quatuor, olei trientem & dimidium unciae unius. Metallica in aceto terito. Habeat autem & ceræ sesquilibram. Quod si marcedo subsequatur & ulcus serpendo depascens, optime facit

subscriptum uiride emplastrum, carnem arrodens, exest usque ad os, & squamas eiecit, ac ulcus serpens compescit, & in uniuersum utile est ad omnia inueterata eiusmodi actionis, & maxime in quibus ueneni corruptio est, & corpora sunt ab alienata: quibus etiam immixtum pharmacū adhibere oportet. In alijs uero dissolutum. Habet autem hoc modo. Spumæ argenti unc. i. squamæ aeris unc. i. nitri, atramenti sutorij, salis ammoniaci, eruginis, singulorum sextantem, cyperi quadrantem, olei sexuncem, acetum scillitici quantum sufficit. Arida aceto terito ut strigmentitiam spissitudinem acquirant, & liquefacta adfundito, & in uitro reposito, aceto acri affuso, ut pharmaco ipsi innatet. Ad confectionem autem & præparationem si acetum scilliticum haberi non possit, scillam cum aceto coquito ac utitor.

*De suum morsu.*

*Cap. IIII.*

Quandoquidē uero & in uenationibus à syluestribus suis læduntur quidam, operæpretiū est & de his facere mentionem. Vulnera itaque ab ipsis incussa graui sunt, propterea quod non solum profunda, sed & magna existant: adglutinatorio autem medicationis ductu ea curare impossibile est. Nam una cum contusione labia uulnerum discindunt, imò & adurunt. Mutuō enim dentium inter se attritu, ac ueluti ad cotem affricu utuntur, ad uindictam eorum qui eis obueniunt currentes. Adusta itaque corpora crustam quandam iuxta uulnerum labia inducunt. Quare suppuratorium & non adglutinatorium curationis modum in eis adhibere oportet.

*De his qui à fele morfi sunt.*

*Cap. v.*

Omnia ferè quae ad canis morsum dicta sunt, etiam à fele morfis conducunt. propriè autem eis conuenit, mel, terebinthina, oleum rosaceum. simul eliquato ac utitor. Aut centauream tritam cum melle imposito. Aut galli sterces liquidum cum adipe gallinaceo subigito & imposito.

*De morfis à crocodilo.*

*Cap. vi.*

Primum quidē eos quos crocodilus momordit, quam tutissimè custodire oportet, in domo conclusos fenestras non habente: etenim ob contrariam quandam affectionem ferè in totum syluestres maxime feles ad demorsos accedere consueuerunt. Remedia autem his eadem quae ad morsos à cane ac ad reliquos relata sunt, conueniunt. Propriè autem humanum sterces & misy simul trita & imposita ad eos faciunt. Aut piscium garum, aut carniū salsarum iusculum morsui infunde, aut salem & myrrham aequali pondere in acerrimo aceto quam tenuissimè contere, & cerato excepta impone. Aliud. Stercoris hyænæ, drachmas iiii. aeruginis drachmas ix. adipis anserini drachmas sex, galbani drachmam unam, ceræ drachmas octo, olei drachm. xii. Aeruginem & sterces aceto terito, & liquefacta affundito. Quod si hyænæ sterces non adlit, porcino utitor. Apollonius autem inquit, demorsos locos acri muria aut piscium garo perfusos ac fotos, adipe crocodili eliquato illinito, & linamentis inditis obligato: aut carniū salsarum pinguiore partes rufas indito, aut melanchium cum acetum fece tritum imposito. Hæc enim & ulcus serpens compescunt, & morsus euestigio ab inflammatione uindicant. Post hæc autem lenticulam coctam cum melle tritam cataplasmatem modo adhibeto. Erui uero farina cum melle



melle subacta, aut iride cum melle morsum expleto. De cætero uero ulcera renutrito, & per cōmunia auxilia ad cicatricem perducto.

*De bestiis uirus eiaculantibus, & primum quibus artibus adhibitis uenenata animalia tollantur.*

Cap. VII.

De uenenatis animalibus scripturi, primum præsidia quædā indicabimus, quibus ea tollantur & perimantur. Perimuntur itaq; ex syluarū ac materierum exustione, in quibus uitam degunt. Verum in his quæ intra domos reperiuntur, feruentē aquam in eorum lustra ac latebras infundere expedit, & acidam muriam feruentem per instrumentum fusoriū, siphona Græci uocant, immittere. Vespis uero oleum infundatur, & assiduus fumus ipsarum tentorijs ac habitaculis obfundatur. Quæ substrata ab omni uenenata bestia præseruent. Iuxta uias quidē igitur & in domibus ab omni uenenato animali præseruāt substrata, abrotonū, conyza, dictamnū, uirga, echion, calaminthe, solanum, hastula regia, salvia, peucedanū, hypericū, polium, samolus, gentiana, origanum, ruta syluestris, serpillum, laurus, pulegiū, cupressi, aut cedri coma, aut ramenta, cardamomū, lysimachion, melanthium, bitumen. his addatur & gagates lapis.

Sufficiones præseruantes, quæ incensæ uaporem suo uenenatas bestias abigunt. Viticis folia, bitumen, castoriū, melanthium, cornu ceruinū aut caprinū, nasturtium, cardamomū, galbanū, propolis, peucedanum, panax, opopanax, conyza, cupressi, aut cedri ramenta oleo imbuta, gagates lapis, sagapenum, polium, canchryos radix, filix, baccæ lauri, & similia graueolētia. Quum enim uenenata animalia omnia angustos habeant meatus, quā celerrimē replentur, & ab huiusmodi odoribus obturantur ac suffocantur. Refertur etiā de stercore crocodili, quod per infundibulū suffitū, feras ipsas uenenosas ex latibulis suis eximat. Archigenes autē, ungulæ caprarū & pilī, inquit, suffitu fugant bestias uenenosas: procul enim per ipsorum odorē relegantur. Stratonis suffumigiū. Galbani, radicis cāchryos, cornu cerui, melanthij, cuiusq; uncia unam. Omnia terito, & in pastillos cum aceto redigito, atq; ubi uti uelis, oleo madefacito, ac incensa per mediam domū suffito, aut in ipsum ferarum latibulū per infundibulum uaporem immittito. Aliud suffimentum, scorpiones deturbans, & omne reptile ex ædibus exigens: galbani, sandarachæ, butyri, adipis caprini, æquales omnium partes in pilulas redigito, & ut dictū est, suffito. Probè facit & pyretrum cū sulphure suffitum. Mirificè item Beronices suffimentū facit, quod in hoc ipso Sermone descriptum est, ubi ipsum cyphi etiam reperitur.

*Illitiones præseruatiuæ.*

Cap. VIII.

Illita autem ferarum accessum prohibent, easque fugant: althææ semen & acerum cum oleo, baccæ lauri & galbanum oleo trita. Panacis semen & flos & succus cum oleo: uehementer efficax est oleum, in quo cædrina ligna uiridia incoquuntur. baccæ iuniperi cū oleo, conyza, peucedanum, silphium, salvia, hastula regia, abrotonum, galbanū. Horum unumquodq; excellenter facit aceto & oleo dilutū, aut etiam quædam ex his, aut omnia mixta & illita. Aut castorium cum medulla ceruina & unguento narcissino illitum uehementer efficax est. Apollonius autem inquit, Qui ex syluestris rutæ succo oblinuntur,

omnibus uenenatis bestiis manus admouet, & non mordentur. Dracunculi item succo manibus illitis qui uiperam tenuerit, non mordebitur. Semen autem dracunculī aqua tritum & latibulis ferarum iniectum, ipsas in terram fugat. Probè facit & solani succus illitus. In uniuersum autem omnem feram cuiusque earum adeps illitus fugat.

*Quæ apposta uenenata animalia occidunt, & de his quæ in edulia & potiones incidunt.*

Cap. IX.

Venenatas bestias occidit galbanum cum spondylis & oleo appositū. Cācri apposti scorpiones, ipsum occidunt. Lychnis syluestris scorpiones fugat: quod item facit pastinacæ semen. Cæterum & aquarum quas in potu accipimus animaduersionem habere oportet. Non pauci enim perierunt ex quibusdam bestiis in edulia & aquas dum coquuntur collapsis, atq; id maximè in peregrinationibus euenire solet. Quæ propter tunc culinæ procul ab arboribus extruendæ sunt, propter feras in eis latibula habentes. quoniam & salamandræ quandoq; & erucæ calefactæ obsonijs incidunt. Præcipuè itaq; pinus & picea arbor surgida: in his enim letales sunt erucæ. In obsonia quidem igitur dum coquuntur, illabi cōsueuerunt serpens & salamandra, & erucæ, in uinū uero uiperæ.

*Communia remedia ad omnes uenenum eiaculantium ferarum plagas.*

Cap. X.

Per prædicta quidem igitur præcauere oportet, ne in malignas bestias incidamus. Si uero cōtingat ab animalante quopiam uenenum iacente percuti, huiusmodi remedijs cōmuniter utemur. Si quidem leuior sit plaga aut morsus, posca calida cum proluemus, deinde uero locum ipsum exugemus. Verum qui exurturus est, prius os oleo colluat, ne inde ledatur, atq; ita ore ad morsum admoto exugat, & expuat uenenum. Cauere etiam oportet, ne exulceratā aliquam internam oris partem habeat exurturus. Post hæc uero cinis aceto subactus pro cataplasmate imponatur. Maximè autem ad hanc rem conducit, ex ficulneis lignis exustus, aut laurinis, aut lignis uitis, qui si non adsint, eo qui haberi potest utendum est, diligentia ad hoc potissimum adhibita, ut inflammatio in loco excitetur, & materiæ ad morsum prouocentur. Quod si minus nobile sit membrum, & uehementior morsus, cucurbitam cum plurima flamma ad morsum adhibe, & uicinos locos circumcirca impactis uulnusculis scarificato: attrahetur enim una cū sanguinis & flatus attractione ipsius bestię uenenum. Deinde a tepidè largè haustu uomere iube: & sic deinceps pharmaca exhibe. Vigilans etiā æger adseruandus est, ac desidēs per totum curationis tempus, donec euidentem remissionem acceperint molestiæ concomitantes. Venter item adstrictus citra dilationem per infusum eluatur, & uesicæ quoque cura habeatur, quo citra impedimentum lotium excernat. Optimè autem auxiliantur, si statim in principio post cucurbitas plagæ imponantur animalia parua discerpta, & adhuc intus calentia, uelut sunt gallinæ, hœdi, agni, porcelli, uenenum enim exungunt, & dolores leniunt. Aptæ sunt etiam his cataplasmata dilaniantia, uelut sunt allia cum melle, cepæ cum sale, ruta cum melle, silphium tritum inspersum, laser, piscis salus maximè uerustus, allium ustum, plantago cum sale, melissophillon, uirgultifici cū melle, suillum recrementū aceto coctum, calaminthe,



minthe, stercus caprinum cum aceto. Summe autem facit ad omnem bestiae uenenatae plagam, praeterquam aspidis, calx uiua cum oleo & melle crassitudine cerati imposita. At uero & inurere morsus ipsos expedit usque ad crustae productionem. Aut sinapi largum cum rumice acuto imponere, aut sale tritum liquida pice exceptum. Praeter opinionem autem facit ex uiperis theriace Andromachi emplastri modo imposita. Emplastra uero ad omnem uenens animalis ictum conueniunt, ex dictamno apparatus, omniaque quae attrahendi uim habent, qualia sunt & quae ex sale, & quae ex chamaeleonis radice constant, & aphroditae appellata. Egregie autem hoc auxiliatur. Spumae argenti libram unam, cerusae libram unam, resinae pinus librā unam, olei ueteris libras tres, ceræ sexuncem, ammoniaci thymiamatis trientem, galbani trientem. Cerusam, argenti spumam, & oleum coquito, donec non inquinant manus: deinde liquefacta adijcito, unito, & uti tor reposito ad omnem morsum, & ad abscessus, & tubercula mamillarum, panos, sinus, fistulas, parotidas: ad miraculum enim usque discutit ipsas. Vitiator & ad carbunculos. Arcet uehementer inflammationem, & raro citra magnam comoditatem & efficaciam adhibetur. Portiones communes. In potu autem citra dilationem in omni uirulenti animalis morsu, theriace Andromachi praebetur, aut Mithridatica, & consimiles compositiones. Ex simplicibus uero, uitis semen cum uino tritum bibendum praebeto, rutae syluestris semen cum uino similiter tritum dato, platani pilulas, poliū, polemonij quod & phileterium appellatur, drachm. i. leporis coagulum aut cerui, allium, trixaginem, dictamnū, saluam, castorium, ex unoquoque drach. i. bryoniae radicem drachmā pondere: seminis trifolij bitumen olentis drach. i. Prodest & conyza & chamæpitys & scordium, cuiusque drachm. i. ex uino. Auxiliatur autem omnino cancri fluuiales cocti aut assati comesti. Ranæ item elixæ & comestæ. Verum si qui earum esum auerferentur, ranas donec uletæ reddantur coquito, & iusculum ipsum ignaris absorbendum praebeto.

## De uespis &amp; apibus.

Cap. xi.

Quod si quis ab apibus & uespis illesus permanere uelit, cum maluae folia cum oleo illita, & cruca siue bruchus cum oleo illitus adseruabunt. Quandoquidem uero quidam ab his elaculum percussi, ob dolorem perturbantur, putantque se a maligno aliquo animalis percitos esse, necessarium existimo prius ostendere quae signa ad horum plagas comitentur. Hos itaque qui ab apibus punguntur, dolor ictus consequitur, & rubor loci, cum tumore partium in ambitu sitarum: stimulus autem omnino in percusso loco reperitur. Eadem etiam hos quos uespa pupugit concomitantur, sed intensiora: uerum stimulus uespa in percusso loco non relinquit. Auxilium autem utrique ferunt, luto aut stercore bubulo eis illito cum posca, aut maluae folijs impositis cum posca, aut cimolia cum malua & posca, aut sesamo cum posca. Naturaliter autem opitulatur ueneranda & uiuifica crucis imago in sigillo ferreo exsculpta, & plagae appressa. Non enim permittit amplius inflammationem generari. In potu praeterea ipsis foliorum lauri tenerorum drach. ii. cum uino austero praebeto.

## Ad stellionis morsum.

Cap. xii.

Qui a stellione morfi sunt, assidue & contentè dolitant, morsusque locum liuidum habent. Iuuantur autem euestigio si caepe & allia cataplasmaris modo eis imponantur. Auxiliantur amplius eadem comesta, uino meraco post eorum acceptionem absorpto. Vtiliter etiam sesamum eis imponitur, aut melathium aqua multa affatim affusa.

## Ad salamandrae morsum, &amp; lacertae chalcidis.

Cap. xiii.

Quos salamandra percussit, eos dolor uehemens & crustae productio consequitur. Adhibeatur autem eis communis cura iam praedicta. Qui uero a lacerta chalcide appellata percussi sunt, eos tumor pellucidus consequitur, ueluti nigrore in ambitu plagae relucente. Consequitur autem & putrefactio. Curatio uero eadem illis accommodanda est, quae ad muris aranei morsum referetur.

## De mure araneo.

Cap. xiiii.

Mus araneus colore quidem mustelae similis est, magnitudine autem muri, unde & mygales apud Graecos obtinuit nomen. Os autem sublongum habet & exiguum caudam. Dentes uero tenues, atque eos duplici ordine sitos in utraque maxilla, quo fit ut quatuor dentium ordines habeat. Qui igitur ab eo morfi sunt, his uulnera manifesta fiunt: quadrifido enim ordine uulnera conspiciuntur. Et sanguis quidem primum purus promanat, paulo post uero saniosus. Animal enim ipsum putrefactione occidit. Consueuerunt etiam bullae insurgere, quas si quis dirumpat, carnem subiacentem feculentam uidebit, & fissuris disparatam. Inflatio autem sequitur demorfos. Caeterum hoc animal frequentius ad testes insilire solet, eosque uerbere impetere non hominis solum, sed cuiusque etiam bruti animantis. Auxiliū autem ferunt quum ob putrefactionem periclitantur, post praedicta communia remedia adhibita, ab huiusmodi rebus. Lauri foliorum tenerorum drach. i. aut. ii. cum uino tritas bibendas praebeto. Conueniunt etiam ipsis omnia praedicta communia remedia in potu accepta ex uino dulci. In pecoribus uero & iumentis illa ipsa cum aqua trita naribus infunde. Est enim ipsis praesens remedium: unde etiam hominibus similiter in potu praebeto. Morsum porro cum cumino integito & allio, putamine extrinseco non abiecto, eadem etiam cum oleo trita assidue & diligenter locis circumfisis illinito. Si uero ruptae fuerint bullae, & ulcera oborta, acida muria prolue, & ordeum ustum tritum impone: uerum non rumpetur, nisi praegnās fuerit mus araneus, qui morsum inflixit. Quod si exulceretur, mali punici dulcis coriū coctum tritū impone, ulceraque ex eodem decocto, aut magis myrti decocto, perfusa foue. Strato uero inquit: in muris aranei morsu locum scarificato, ac ipsum murem araneum ustum cum aceto cataplasmaris uice imposito, aut sinapi tritum itidem ex aceto. In potu uero panaca exhibeto, erucam, capparis corticem, gentianae radicem, & uerbenacam rectā tum cum uino bibendam praebeto, tum pro cataplasmate impone: maluae item folia impone: & antidotos magnas bibendas exhibe.

## Ad scolopendrea plagam.

Cap. xv.

His qui a scolopendra icti sunt, eadem remedia conueniunt quae ad muris aranei morsum sunt praedicta, & sales tum liquida pice impositi: & cedria cum



cum melle: & allium cum folijs fici, & cumino, eruoq; ac uino. In potu uero etiam ea commodant, quæ à mure araneo morlis. Amplius autem & absinthium & menta cum uino.

*Ad araneæ ictum.*

Cap. xvi.

Est & araneæ genus, quod ictu cōtinentes dolores inducit: rubor uero circa præcordia, & urinæ emittēde difficultas egros cōcomitatur: aliquādo uero & suffocationes. Ab eo percussis rutam syluestrem, & uiticis albæ semen aut folia bibenda præbe. Allium etiam largè edendum, ac uinum insuper meracum absorbendum exhibeto.

*De tetragathis.*

Cap. xvii.

Tetragathus, species est phalangij subalbida, pedes scabros habens, & iuxta caput eminentias duas, unam rectam, alteram latā, ut existimes eum ora quidem habere duo, maxillas autem quatuor, & lineam per os æqualem. His qui ab eo percussi sunt, cōmuniter quidem eadē accedunt quæ à scorpio percussis. Propriè autem in ipsis plaga cōtente dolet, & percussus locus subalbicans est: tumor uero faciē & caput occupat, & percussæ partes usque ad articulos gracilesunt: cibum item ac alimentum non sentiunt membra, & post adeptam sanitatem uigiliæ intensæ succedunt. Opem autem ferunt ex calaminthæ potu, aut trifolij, rutæ, panacis, polij, & his quæ ad percussos à phalangio referuntur.

*De percussis à phalangio.*

Cap. xviii.

Phalangiorum genera quidem plura sunt: quæ uero apud eos qui de noxijs bestijs scripserunt referuntur, ut plurimum sex numero existunt: unum quidē ex eis rhagium, alterū lupus, terciū formicarium, quartum cranocolaptes, quintum sclerocephalon, sextū scoleciū appellatum. Ac primum quidē rhagium, id est, acineum, figura rotundum est, colore uero nigrum, acini uuæ nigræ similitudine, unde etiam appellationem accepit. Et os quidem iuxta mediū uentrem habet, pedes uero ex utraq; parte quā breuissimos. Alterū uero lupus appellatū muscas perdit, eisq; pascitur: ac corpus quidem habet latum ac uolubile, partes uero circa collū ipsius incisæ sunt, amplius autē & os eius eminentias tres habet. Tertium autem myrmecij, hoc est, formicariū dictum, formicæ maximæ assimilatur: colore est fuliginosum, corpus uero eius uelut astris quibusdam insignitū est, maximè circa dorsum. Quartum deinde cranocolaptes, sublongum est, & uiride, stimulumq; iuxta collum habet, atq; si in quē irruat, locos circa caput petit. Quintum sclerocephalum dictum, caput habet saxeum & obduratum: lineamēta uero per omne corpus similia animalibus illis, quæ circumuolitant noctu lucernas. Sextum autem scoleciū, siue uermicularium appellatum, sublongū est & submaculosum, maximè circa caput. Atque hæc quidem species phalangiorum enumerantur, quas sanè obseruare oportet. Quæ uero percussos ab eis concomitantur, cōmunia sunt iuxta magnitudinem & paruitatem discreta. Morsus porro tenuis est, ut uix cōspici possit, tumor autem liuidus, quibusdam etiam rubicundus: frigiditas adest circa genua & lumbos ac scapulas, quandoque uero totum corpus aggrauatur, amplius & dolor asiduus adest, tremor, pallor, uigiliæ: quibusdam uero pudēdi tentigo, & circa caput pruritus, aliquando etiā circa suras, oculi humecti & la-

crymantes ac caui, & uenter inæqualiter eleuatur. Intumescit autē uniuersum corpus, faciesq; & maximè circa linguā partes, ut impeditum habeant sermonem: quibusdam uero & urinæ emittēde difficultas adest cū pudendī tentigine & dolore. Si uero minxerint, aquosæ ipsorū sunt urinæ, quædam aranearū textis similia in se habētes: & uomitus quoq; cōsimilis est: aliquando uero per lotiū, & per uentrem talia excernuntur. Cæterum in calidam aquam demissi à dolore leuati sibi uidentur, post uero contentè dolent pudendū. Senioribus uero pudendum plurimum laxatur, ac minimè intenditur. Atq; hæc quidem cōmuniter ad omniū ictus sequuntur. Si uero cranocolaptes aliquē percusserit, caput magis dolet, & uerrigines consequuntur, frigus cōtinentis, delirium, corporis iactatio, & stomachi puncturæ. Omnes autē à phalangijs percussi assiduis balneis iuuantur: plaga etiā ipsa ex trifolij bituminosi decocto cū oleo proluatur, totū uero corpus ex cerato liquidissimo pinguefiat. Iuuantur etiā fomento spongiarum in calido aceto tinctarū, & sæpe ad plagam adhibitarum. Cataplasmata autē eis conueniūt, bulbi, sanguinaria, porrū, furfures aceto cocti, ordeacea farina folijs lauri cū ea in uino aut melle incoctis, ruta, grossi ficus, caprinum stercus cū uino, samfucus cum aceto, syluestris ruta cū aceto, itemq; cyperus. Asclepiades autem hoc inquit, utere ualde laudato. Seminis rutæ syluestris, seminis eruce, staphidis syluestris, canchryos, seminis uiticis, pilularum aut foliorum cupressi, æquales omniū partes aceto terito, & melle exceptas imposito. Idem & in potu acceptum auxiliatur. Aliud laudatum, quod similiter & potatū & impositum iuuat. Sulphuris uiui drach. iiii. galbani drach. iiii. succi cyrenaici drach. ii. aut si non adsit, laseris drach. iiii. amygdalarū amararum repurgatarū drach. ii. in uino diluito, & melle excepta imposito. Bibendū etiam, ut dictū est, præbeto. Amplius uero & cupressi folia aut pilulas tritas cū uini & olei hemina una à phalangio percussis dato. Aut anisum, aut daucū, aut cuminū, aut melanthiū, aut piper, aut agaricum, singula drachmæ pondere præbeto. Aut ammi drach. ii. aut iridis drach. i. aut hyperici dra. i. aut trifolij bituminosi quantū tribus digitis apprehēdi potest. Conueniūt etiā lauri bacæ, scorpiuron, serpillum, sulphium, calamintha, chamæpitys per se & cum ruta ac pipere, singula uero ex uino. Aut mentæ fasciculum posca meraciore coquito, & decocti cyathos ii. præbeto. Idem & samfuci, & radicis spinæ albæ decoctū, ac trixaginis & pulegij præstat. Lixiuū item & radicis hederæ succus cum aceto. Vtere etiā ad eos remedijs à scorpio percussorum, & ex uiperis theriaca, & cōsimilibus.

Asclepiadæ, ad percussos à phalangio: hac Chariton utebatur, & per hominum conuentus oberrans à phalangijs percussis auxilia promittebat. Seminis spondylii sicci, calaminthæ, æquale pōdus simul terito, & ex uini cyathis ii. præbeto, atq; id sæpe per diem facito. Aliud eiusdem. Succi cyrenaici, seminis dauci, mentæ siccæ, spinæ nardi, singulorum æquale pondus coagmentato cum aceto, & drach. i. cum poscæ meracioris cyathis iiii. præbeto, & à potu ægrum in calidam aquam demittito. Quod si succus cyrenaicus non adsit, pro eo laser purū conijcito. Aliud ualde præclarum. Canchryos, seminis rutæ,



rutæ, piperis, myrrhæ, staphidis agrestis, singulorū drachmam unam, radicis cyperi drachmam unam, coagmentato, & drachmam unam, cum uini odorati cyathis IIII. ac mellis cyatho I. exhibeto. Auxiliatur item eis allij esus, balneum, & uinum.

De his quos scorpio percussit. Cap. XIX.

A' scorpio percussos uehementissimus plagæ dolor consequitur, frigiditasq; ac tensio, & stupor, circaq; plagam & totum corpus frigidus sudor, & his qui iuxta infernas partes percussi sunt, inguina excitantur, ac intumescunt, qui uero circa supernas, locus sub alis, & hæc quidem leuiter percussis adsunt. Validius autem ictis, ardor circa plagam adest, quemadmodum in ambustis, & verrucarū instar formicarum eruptio, circa labra & totum corpus, ut grandine se impeti putent: facies distorquetur: sordes circa oculos adsunt glutinosæ, & lacrymæ uiscosæ: durities articularum, anusq; procidit cum egerendi cupiditate, spuma circa os est, & uomitus largus, singultus, conuulsiones opisthotonicis similes. His igitur serpillum, althææ radicem, & elaphoboscum bibendum præbeto. Præter opinionem autem facit elaphoboscus tum uiridis comesta, tum sicca potata. Pastinacæ item syluestris semen & nuces ponticæ: hæc enim in zona gestatæ non permittunt aliquem à scorpio lædi. Aliud. Cochleam hortulanam maximè accipito, eamq; unā cum testa tritam plagæ imponito, & confestim sedabis dolorem. Idem etiā uermes terreni facere dicuntur. Aliud. Cæcrum fluuialem cum uino & lasere terito, ac bibendum dato.

Aliud. Verbenacam rectam aut uiridem pro cataplasmate impone, aut siccam tritam bibendam præbe. Aliud. Cumini, melanthij, seminis uiti-cis, singulorum par pondus tere, ac drac. I. inde ex uino exhibe. Poteris etiam omnibus communibus auxilijs prædictis uti. Aliud, hoc & ad phalangij & scorpj ictum facit. Styracis drachm. VI. sulphuris uiui drachmas sex, pyretri drachmas IIII. seminis rutæ syluestris drachmas III. castorij drachmas duas, seminis erucæ drachmas duas, cum sanguine marinæ maximè testudinis subige, aut si non adsit, terrestris, & nucis ponticæ magnitudine præbe cum posca aut ex aceto. Alia antidotus, excellenter ad scorpj ictum conducent: qua etiā ad meipsum ægrè affectum usus sum, & seruatus. Habet autē hoc modo. Castorij, succi cyrenaiici, piperis, cuiusque drach. IIII. costi, spicæ nardi, croci, succi centaureæ, cuiusque drachm. II. mellis despumati quantum sufficit. Datur nucis pōticæ magnitudine. Datur autem à scorpio ictis cum uino diluto, ab aspide morsis cum aceto diluto. Detrahendi uim habet, adeo ut digestos etiam in membra uenenī succos eruat: & ob id etiam ad uulvæ stragulationem utiliter cum hydromelite exhibetur. Aliud. Aristolochiæ longæ, melanthij, radicis panacis, seminis rutæ syluestris, æquales omniū partes committe. Dantur inde drac. II. cum uini meraci hemina una. Optimè autē ad eos facit, similiterq; ad phalangij morsum antidotus ex quatuor rebus ad podagricos descripta, ex aristolochia uidelicet, gētiana, myrrha, & baccis lauri. Dato etiā si abundes ex theriaca. Ad plagam autē scorpionē ipsum qui percussit, si inueniri queat, imponito. Aut stellionem dissectum plagæ adhibeto. Calaminthe etiam quæ iuxta aquas nascitur im-

sita, confestim dolores remittit & tollit. Allium quoque aut per se aut cum sale tritum imponatur, aut syluestris ruta, aut scorpiorum herba. Ego uero syluestris rutæ drachmam unam in aceto tero, & ceræ unciam unam, resinæ pinus quadrantem liquefacio, & parum olei affundo, unio, ac impono. Et est mirabile pharmacum. Quin & ouillum stercus uino coctum & impositum, confestim dolore liberat. Vtere item præscriptis communibus emplastris, & eo quod ex dictamno apparatus, & quæ ex salibus quæq; ex chamæleone constant.

De morsis ab aspide.

Cap. XX.

Aspidum apud ferarū scriptores tres species reperiuntur. Quædā enim ex eis terrestres appellantur. Quædam uero Chelidoniæ, & circa fluuiorum ripas, præsertim Nili, latibula habent. Aliæ uero Pryades nominantur. Terrestres quidem igitur maiores sunt, & quandoq; usq; ad quinque cubitorum longitudinem reperiuntur. Maximè uero Pryades bicubitales sunt. Chelidoniæ autem, cubito maiores reperiuntur, & colorem hirundini similem habent. Pryades uero cinereo sunt colore uiridiq; & ad auri colorem declinatæ. Terrestres uero ut plurimū & ipsæ cinerei sunt coloris, quanquā & subuirdes reperiuntur. Cæterum accessiones & signa cōmunia sunt in his quos aspides momorderunt. Vulnere enim in demorso loco ueluti ab acu puncta inueniuntur. Bina quidē ex masculi morsu, ex foemellæ uero quatuor, citra magnum dolorem, à quibus nihil effluit, nisi uiolentum animal sit quod morsum inflixit. Consequitur autem stupor, pallor frontis, refrigeratio, assidui hiatus, palpebrarum nictationes, colli inclinatio, capitis grauitas, segnities, & collapsio in somnum profundū. Ad finē uero & conuulsio. Mors autem in tribus ad summū horis ex terrestris morsu sequitur. In chelidoniæ uero ictu præsentissima adest. Porro his qui à pryade conspuuntur, caligo oculorum succedit, & cordis dolor, faciei tumor, ac auditus corruptio. Tardius autē mors consequitur. Auxilium autem ab aspide morsu ferunt, & præsertim quos pryas momordit, ex acerrimi aceti potu: dandum autē est quousque aceti qualitatem circa dextrā præcordiorū partem perceptent: hepar enim in morsu ab aspide primū aiunt sensu priuari. Cæterum ad prænotionē an uicturus sit percussus, centaureā cum uino tritam bibendā præbeto: si quidē enim euomet pharmacum, morietur; si nō, uiuet. Quo uero malignitas uenenī distributi & in corpus digesti probè euomatur, allia trita cū zytho exhibeto, donec nau-seabundus reddatur. Aut opopanaca cū uino diluto dato, & cōfestim uomitionem operabitur. Numius autem inquit: Origanum uiridem aut aridā pro ægri uiribus cum uino dato. Post uomitum antidotis theriacis utēdum & communibus remedijs prædictis. Utiliter autem ad plagam imponuntur, post cucurbitarū adhibitionem & scarificationē, centaurea cū myrrha & modico opio. Rumex autē si cataplasmatis modo imponatur, nihil lædetur. Præter opinionē uero auxiliatur theriace tum plagæ imposita, tū potata. Profunt autē & assiduæ excitationes cū euulsionibus & plagis, & uniuersi corporis motus, & aqua marina calida pro fomento aspersa.

De uipera maris & femine morsu.

Cap. XXI.

Vipera foemina colore quidem est subflauo, multis  
K instar



instar rotarum notis exornata, magnitudine cubitali, longissima uero palmos tres æquat. Caudam autem habet acruatim in tenuitatem desinentem, non paulatim imminutam, estq; omnino carne nuda cauda & aspera. Oculi uero subrubri, & caput latius, & angustius collum. Vērem autem sinuosiorē habet, & in gressu ad summum caudæ nititur, sensim uero inambulat, & quatuor habet caninos dentes. Vipera uero mas eiusdem est coloris: uerum caput angustius, & collum crassius habet, & uniuersum corpus tenuius, & quodammodo prolixius: gressum autem supernè circa uentrem firmat, & alacrius mouetur: dētes autem caninos solum duos habet, paulatim uero cauda ei imminuta est, quemadmodum & reliquo serpentium generi, non acruatim uelut in uipera foemina dixi, & per hoc sanè à foemina differt. Reperiuntur igitur in eis quos uipera mas momordit uulnera in plaga binata: in his uero qui à foemina demorsi sunt uulnera quatuor. Primum autem ex eis excernitur sanguis, deinde sanies sanguinolenta & oleosa: adest tumor biliosus, feruidus, bullosus, subruber, deinde liuidus & denigratus & proserpens. Os adest exiccatum, ardor, exolutio, & frigidi horroris insultus, aliquando & bilis uomitus, tormina, capitis grauitas, uertigo, pallor, singultus, febris, spiritus & anhelitus celer, color plūbeus, sudor frigidus. Mors in horis septem, aut ut longissimè absit tertia die, in his qui non seruantur, & maximè his qui à uipera foemina sunt icti. Cōuenit igitur priusquā cruenta prodeant lotia, allij plurimum edere, & uinum meracum multum bibere, ac uomere. Efficacissimum enim in eis remediū est allij esus, ac meracior uini potio, inquit Archigenes: adeo ut si quis multū eius sustineat usum, itemq; meripotum, nullo alio auxilio habeat opus. Dato autem citra dilationem theriacen ex uiperis bibendam, eandemq; plagæ superponito. Quin & ipsam uiperam excoriatam & coctam, capite ac cauda & interaneis uisceribus omnibus reiectis, ueluti anguillā edendam præbeto. Caput autem amputatū diligenter per uolsellam teneto, & morsui imposito ea parte adhuc calente quæ contigit collum: id enim extrahet uenum. Aut quempiam qui ore plagam exugat adhibeto, qui, ut supra dictum est in communibus remedijs, os prius habeat ex oleo collutū. Aut gallinam dissecata, & internè adhuc calentem morsui imposito, atq; hoc remediū frequēter ac assiduè repetito. Scarificare autē per ambitū oportet demorsum locū, & cucurbitas ad mouere. Postea uero fraxini folia tundito & exuccato, & succum quidem in potu exhibeto, quod uero ab expresso succo reliquum est ad morsum imposito. Est autem fraxinus arbor ex qua fraxinea appellata ligna cæduntur: est enim ualde efficax ad uiperarum morsus hæc arbor. Melisso phylli item folia & succus cum uino potatus & uulneri impositus euidentis auxilium confert, etiā si iam moriatur æger. Aiunt autem si quis melanthij drachmas IIII. edat, non moriturum. Similiter etiam melaphroditos herba efficax est. & cancri fluuiales cum lacte triti & potati & plagæ adhibiti. Magnificè etiā prosunt ranæ coctæ comestæ, & iusculum earum bibitū. Præstat & nasturtium plurimū edere, ac tritum quoq; cū uino bibendum exhibere. Facit autē mirabiliter testudinis sanguis exiccatus cū

syluestri cumino potatus. Utendum etiā omnibus cōmunibus remedijs supra relatis: superuacaneū autem fuerit eadē sæpe scribendo repetere. Maximè uero utendū est Anchusæ radice, & heliotropio cum uino. Dandus & hæmatites lapis. Auxiliatur & raphani largè in cibo accepti, deindeq; uomitu reiecti. Statim uero à uomitu theriace Andromachi exhibeatur. Post scarificationē & gallinarū impositionē plaga ex trifolij bituminosi decocto calido per multum tēpus proluatur ac foueatur. Nā si pauco id tēpore facias, peius afficiuntur. Deinde porrū & panē cū sale imposito, aut alliū cū aceto, aut cinerē ipsius exustū, aut fraxini cinerē, aut aliumquēuis cū aceto, aut hastulæ regiæ folia, aut sycomori folia cū pane, aut lauri folijs teneris coctis & cū oleo tritis locos intege prius quā claudantur, aut caprinum sterces imposito cū uino. Asclepiadæ epithema, ad uiperæ morsum. Sgapeni, piperis, laseris maximè cyrenaiaci, opopanacis, cuiusq; unc. I. galbani sextantem, sulphuris uiui sextantē. Succos aceto dissoluito & arida trita inspergito, & ad emplastri formam redacta plagæ imposito. Forinsecus autē folijs fici aut urticæ contegito. Aliud. Centauræ, aristolochiæ, radicis peucedani, æquales partes contundito, cribrato, & aceto subigito, adiectoq; galbano in emplastri formā reducito. Aliud. Canchryos, staphidis syluestris, aristolochiæ, radicis bryoniæ, singulorū partē unā, opopanacis partes duas, aceto subige, & utere ut dictum est. Utendum & prædictis communibus cataplasmatibus & epithematibus, maximè uero Andromachi theriaca. Aliud ualde bonum. Cancrorum fluuialium carnes terito, & adiecta iride & calaminthe rursus sufficienter terito, idemq; rursus modico sale addito facito, & pastillos informato, quibus in umbra exiccatis utitor, in potu quidem ex aqua mulsā, aut uino: in cataplasmata uero, cum lacte dissoluito.

## De dipsade.

## Cap. XXII.

Dipsas à quibusdam causus appellatur, estq; uiperæ species, quæ in maritimis magis locis reperitur, magnitudine cubitali, ex crassa in tenuem desinens. Notas autem habet per omne corpus fuluas & nigras: caput uero angustius. Sequitur autem ab ea morsos, præter ea quæ de uipera dicta sunt, & sitis intolerabilis planè, adeo ut etiam si multus eis potus exhibeatur, sitis non sedetur. Et tamen neque per urinas, neque per uomitum, neque per sudores quicquam excernitur. Duobus igitur pereunt modis, aut ob multam sitim exusti, si potum non sumant: aut ob multam expletionem distentus rumpitur uēter, uel internè circa inguina, uel circa imum uentrem, quæ admodum in hydropicis fieri consueuit. Cæterum & his ueluti à uipera morsis auxiliamur: propriè autem in his potiones magis urinam cientes exhibeantur. Alius item per infusum eluatur, & oleo cū decoctionibus exhibito ad uomitum cogantur. Ad plagæ uero locum post exuctionem, & scarificationem, & cucurbitularum affixionem, & dissectas gallinas, calcem uiuam cum oleo imposito, & emplastra adtractoria, & theriacen.

## De hamorrho &amp; hamorrhoidē.

## Cap. XXIII.

Animalia hæc colore quidem sunt arenoso, magnitudine autem tres palmos æquant, & in tenuem ac angustā figurā caudam paulatim desinūt. Sunt autem igneo



igneo oculorū fulgore, rectaq; & tardè proreptant. Per corpus uero multis notis albis & nigris uariata sunt, & asperioribus squamis obsita, quapropter dum serpūt, sonus auditur. Et foemina quidem uentri incumbens per terrā reptat, & gressum infernè circa caudam firmat: mas uero circa uentrem in gressu nititur, & collū in serpendo extendit. Consequitur horū morsum color icti loci cruentus, mali coloris & nigricās: ex quo nihil in principio effluit, præterquàm paucum quippiam aquosum. Stomachi adest dolor, & spirandi difficultas. Deinde sanguis ex naribus profluit, & ex foraminibus ipsius morsus. Et quicquid est in toto corpore deatricum, id rumpitur & sanguinem profundit: atq; hæc quidem in maris hæmorrhii morfu contingunt. A foemina uero hæmorrhoidis morfu ad hæc & anguli oculorum sanguine manant, & gingiue dentium, & unguium radices: & ut simpliciter dicam, per omne corpus sanguinè efferri contingit. Dentes præterea excidunt, & gingiue putrescunt. Horum porro curam facere oportet, primum quidem sanguinis eruptioni obluendo ac resistendo per ea quæ aptè sanguinem sistere possunt, deinde cataplasmata plagæ imponendo ex folijs uitis coctis tritis cum melle, & portulacæ folijs cum polenta. Antea uero quàm cruenta prodeat urina, allium multum edant, & uinum multum dilutum bibant, & ad uomitum cogatur: deinde confestim theriace exhibeatur, & postea pisces multos, alijs tritis, cum oleo tinctos, edant. Sumant item in cibo panem & uuam passam dulcem, & deinde uino diluto largè hausto uomāt. Plaga uero aqua frigida proluatur. Vesica autem spongijs calidis foueatur.

*Preparatio sanguinis testudinis marinae, & usus.*

Cap. xxiij.

Testudinem super ligneum aut fictile uas supinam reclinato, eiusq; caput statim amputato, & leuata ipsa sanguinem supposito uase excipito, & congelatum deinde per harundinem in multas partes secato, atq; operculi uice cribrum uasi superponito, & ad solem locato, siccatum uero reponito, ac uisor ad uiperæ morsum drachmis duabus exhibitis, ex poscæ cyatho uno: sequenti deinde die sicci sanguinis drachm. iij. cum aceti cyathis duobus dato: & tertia deinceps, sanguinis drachmas octo, ex aceti cyathis tribus.

*De ammodite, aut cenchrid.*

Cap. xxv.

Ammodites magnitudine quidem cubitalis est: maior enim non pingitur, neque scribitur, colore uero arenosus, per corpus autem maculis nigris insignitur. Caudam autem habet prædurā supernè discissam. A quibusdam uero cenchrias, hoc est, miliaris, ob caudæ instar milij duritiem appellatus est. Latiores autem maxillas quàm uipera habet, quumq; in multis alijs ei similis sit, colore magis discerni potest. uipera enim subflaua est. Cæterum ab Ammodite percussos festina ut plurimum mors sequitur. Qui uero breui non pereunt, his sanguis ex uulnere promanat, & uulnus intumescit, paulo post autē sanies effertur, sequiturque capitis grauitas, & animi deliquium. Qui uero optimè dispositi sunt, in tri-duo intereunt, quanquā aliqui usque ad septimum diem durarint. Celerius uero mors adest his qui a foemina fauciantur. Auxilium porro & hi ferunt,

primum quidem à cōmunibus remedijs, utpote à cucurbitularum appositione cū scarificatione per ambitum uulneris locorum, & superiorum partium constrictione, & ad ipsam plagam scalpelli admotione. Proprie autem eis auxiliatur mēta cum aqua mulsa potata, castorium, calsia, & artemisiæ succus cum aqua. Danda etiā in potu theriace, eadem quoq; plagæ imponenda. Utendum & emplastris attractorijs: postea uero cataplasmata, quæ ad nomas siue ulcera serpentia conducunt, imponenda.

*De sepe.*

Cap. xxvi.

Serpens qui seps appellatur, lōgitudine quidem duorum cubitorum reperitur, ex crasso autē in tenuem abit, recta uero actardè proserpit: caput habet latū, os acutum: uniuersum autem corpus multis albis notis respersum. Cæterū his qui ab eo percussi sunt, ex uulneribus manifestus sanguis excernitur, paulo post uero sanies graueolens, tumor & dolor languidus est: affectæ partes putrefactæ dealbantur, ac totum corpus uiriligni (quæ alphos appellatur) simili colore inficitur: defluunt capilli toto corpore, atque intra tres aut quatuor dies pereunt. Porro opem & hi sentiunt ex eisdem rebus quæ in uiperæ & cerasæ & ammoditæ morfu relatæ sunt. Exhibenda est præterea portulaca multa in cibo, & uinum bibendum myrtites meracius. Conueniet item spongiam calido aceto imbutā morsui imponere, & ex butyro cū melle locum illinire, aut miliū cum melle, aut paleas unā cum terra eis adhærente exustas illinire.

*De cenchrite siue acontia.*

Cap. xxvii.

Cenchrites serpens est magnitudine duorum cubitorum, figura autem crassa in tenuem abeunte, colore uiridi maxime iuxta aluum, ut milium colore referat: unde & cenchrias, hoc est, miliaris appellatur. Aiunt etiam hunc seipso fortiores fieri, quum milium floret. Ceterum ubi se ad lædendum parat, extendit seipsum, ac ueluti iaculum uibratum corporibus inuolat, atque hoc modo uerberat. Ab huius morfu omnia quæ de uipera dicta sunt sequuntur, atque etiam grauiora, adeo ut etiam putrefactiones & carniū defluxus consequantur, ac grauior item mors succedat. Cæterū remedia similiter eadem quæ ad uiperæ morsum his conducunt.

*De cerasæ.*

Cap. xxviii.

Cerastes magnitudine cubitalis est, longissimus cubitorum est duorum, corpore uero arenosus est, & iuxta caudam desquamatus: eminentias habet in capite duas, cornuum similitudine. Partes uero circa uentrem ex ordine squamis obsitæ sunt, quapropter in serpendo sonum sibilo similem edit, per obliquum autem non recta proreptat. Cæterum percussis ab eo eleuatio ac tumor plagæ capitis clauī similitudine insurgit, & sanies profluit uini colore aut nigricans, & maxime per ambitum, uelut in cruentatis ac sugillatis alijs fieri consuevit. Reliqua item quæ in uiperæ morfu dicta sunt, etiā his succedunt, cum intensione uehementiori. Ut plurimum uero usque ad nonum diem supersunt. Remedia autem eadem quæ morsis à uipera conferunt,

*De dryino.*

Cap. xxix.

Serpentes dryini appellati abundant magis iuxta Hellespontum, latibula autem habent in quercuum radicibus. Est autem dryinus foetidus, unde & si quis eum nō uideat, foetore loci cognoscatur. Est autem

K 2 cubitorum



cubitorum duorum longitudine, & obelus, ac asperimis squamis circa uniuersum corpus munitus. In his ipsis squamis muscæ pennis æreis latibula sua habere dicuntur, quæ tandem ipsos serpentes occidunt. Adeo autem malignæ ac nocetis naturæ est, ut si quis eum calcet modo, illius pedes excoriet, & tumorem ingentem circa crura inducat. Et quod magis mirum uideri potest, aiunt etiam Medici curantis ægrum manus excoriari. Si quis autem, inquiunt, animal ipsum occidat, omnia quæ odorat ab eius fœtore corrupta putat. Porro qui ab eo percutiuntur, his tumor insurgit nigricans, dolor uehemens, nome, delirium, corporis siccitas, singultus, uomitus biliosus, aut omnino uomitus simplex, urinæ suppressio, tremor, interceptio uocis, stupor, scissura & mortificatio percussorum locorum. Plurimi etiam intereunt. Porro & hi ipsi quoque ex his quæ in uiperæ morfu dicta sunt, opem sentiunt, itemque ex communibus remedijs iuxta consequentium accessionum proportionem adhibitis.

*De amphibæna & scytala.*

*Cap. xxx.*

Animalia hæc inter se similia sunt: non enim ex crassissimis in caudam tenuem abeunt, sed æqualis crassitudinis per totum existunt, ut neque cognoscant uidentes ea, iuxta utram partem caput aut cauda sint sita. Differunt autem amphibæna à scytala, in eo quod ex utraque parte progrediatur: unde & amphibæna Græcis est appellata. Galenus autem amphibænam animal biceps esse dicit. De hac bestia ferunt, quod si foemina uterum ferens ipsam transgrediatur, conceptum male pariat ac abortiat. Cæterum ab utroque animante demorsis, contingit morsum obscurum esse, ac uix apparere, ueluti sunt muscarum puncturæ: quapropter etiam si mordeant, non enecat tamen, uerum inflammationes inducunt, ueluti contingunt etiam ab apum ac uesparum stimulis. Quare transferatur ad hos quoque quæ de illis sunt relata, uerum facultate intensiore. Aiunt autem scytalam chalcidicæ eiusmodi accessiones sequi, quales à uiperæ morfos. Unde & ipsædem remedijs ad eius morsum utendum, & ut compendioso dicam, ad omnem uenenatæ feræ morsum: cuius speciei hic non reperis nomenclaturam, auxilia eadem quæ ad uiperæ morsum conducunt.

*De pareæ & spathiuro.*

*Cap. xxxi.*

Pareas serpens in Syriæ locis reperitur, colore autem alij quidem æs referunt, alij uero nigricat. Morsum autem etiam si inflixerint, non enecant: uerum quem admodum amphibæna & scytala, ita & hic plaga sua tantum inflammationem inducit. Quare ex ipsædem etiam curentur, & ex his quæ de chersydro referuntur. Cæterum spathiurus in locis iuxta chalcidem magis inuenitur. Est autem animal ex crasso in caudam abiens tenuem, latum habens caput, ac mures comedens. Neque uero hic morfu enecat, sed inflammationes tantum inducit. Quapropter ab eis percussis itidem consimilibus remedijs curentur.

*De peliade & elape.*

*Cap. xxxii.*

Signa quidem horum animalium apud ueteres non sunt descripta, utpote quæ omnibus sunt manifesta. Contingit à peliade morsus dolor circa locum, & putrefactio, non periculosa tamen, & uexatio ac obfuscatio oculorum, ex ueneni nimirum ad ipsos distributione. Curantur autem succo prisanæ cum oleo in potu exhibito, & oxylapathi decocto, & simplicioribus remedijs ad istericos descriptis. Oculi uero lo-

tio pueri uenerem nondum experti proluatur tum per se, tum muria ammixta. Caput item similiter ex eisdem perfundatur. Post purgationem deinde corporis opobalsamum cum melle illine, aut collyrium aliquod uisum acuens quod meatus rarefacere potest. Simul enim cum lacrymarum profusione & uenenum excernetur. Si uero dolor consequatur oculorum, eum lenibus collyrijs mitigare oportet, quæ tamen non stupefacient. Elapis porro morsum tormen uoluulosum consequitur. Alias communibus auxilijs curantur. Maximè uero his quæ tormina leniunt, & urinam ciunt.

*De basilisco.*

*Cap. xxxiii.*

Hocce animal magnitudine est palmorum trium, subflauum, & capite acuto. In capite autem eminentias tres habet. Vm uero super alia omnia repulsa maximam acquisiuit, ut nulla ex eis queat uel sibilum saltem ipsius sustinere. Quin & si quod ex reliquis animalibus uenenum iaculantibus ad cibum aut potum capiendum properet, & basilisci iuxta locum præsentiam persentiscat, retro cedit, necessarij etiam ad uitam nutrimenti negligens. Cæterum percussos ab eo rotius corporis ardor comitatur, itemque liuor: defluunt capilli e corpore confestim, & in instanti omnino tempore mors sequitur. Neque uero corpus ipsius mortui ullum aliquod animal carniuorum attingit: si uero fame coactum ipsum contingat, tum & ipsi illi eodem loci mors instat. Aiunt autem quod conspectus modo, & sibilus auditus, eos qui ipsum audiunt, tollat, similiterque ab ipso conspectos. Quare uanum & superfluum duximus auxilia contra eum referre.

*De draconibus.*

*Cap. xxxiiii.*

Animal quidem hoc uenenum non iacit, attractione autem & ui sua enecat. Abundant quidem igitur dracones in Aethiopia & Lycia: colore autem differunt: alij enim nigri sunt, alij rufi, alij cinerei coloris: & rursus alij quidem cubitorum v. sunt, alij uero x. sunt & qui ad xxx. cubitos se extendant: quidam etiam maiores narrantur. Squamis autem oblitæ sunt per totum corpus asperrimis: magnos oculos habent, & supra oculos præ eminentias quasdam similitudine pellium flexibilium superciliorum. In mento autem excrescentiam quadam habent, quam barbam appellant: maximè hiantes sunt oris rictu, lingua exerta, & dēribus magnis similitudine syluestrium suum, cum quibus etiam fracturas & collisiones corporum inferunt. Quare curationes ueluti ad mordentia animalia fiunt, non ut in his quæ uenenum iaciunt.

*De chersydro.*

*Cap. xxxv.*

Serpens hic chersydri appellationem inde habet, quod in principio quidē in aquosis degit locis, & hydrus appellatur ab ipsis aquis, hoc est, Natrix: postea uero siccos incolit locos, & ex compositione locorum, chersydri, id est, natricis terrestris nomen inuenit. In terra itaque degens, chersydrus appellatur, & tum sanè seipso sæuior redditur. Equidem in humidis locis ex humido uictu exaratus, non purum uenenum habet: quum uero terrestri sit, maximè merum & nocentius id acquirit. Cæterum similitudine est aspidis terrestri parua, præterquam quod ceterum non ita latam habet. Hoc enim insigne solum aspides præ his habent. Qui igitur ab his morsu sunt, eis communiter eadem accedunt, quæ in aliorum serpen-



serpentium morfu; ueluti est tumor, continuus dolor arsius, liuidus locus & seculentus, uertigo oculorum, exolutio, uomitus biliosi foetidi. Proprie autem motus totius corporis inordinatus, ut & per uentrem quædam inordinate feratur. Mors autem intra tres dies. Porro ex communibus remedijs etiam hi opem ferunt, & ex theriacis anditotis. Priuatim uero cupressi pilularum drachm. i. & myrti bacca rum itidem i. drach. terito, & cum melle rosaceo aut uino mulso in potu exhibeto. Iuxta affectum autem locum calcem uiuâ & similia cum oleo imposito.

De rana rubeta.

Cap. xxxvi.

Rubeta, ranæ species est, quæ palustris uitæ conditionem in terrestrem mutauit, unde & rubeta appellatur: hac autem mutatione, similiter ut chersydrus, ægrè curabilem afflictionē eis qui in eam inciderunt, inducit: est enim animal magnitudine nihilo minus testudine parua: exasperat autem & uibrat terga dum spiritu expletur, atq; ob id ipsum audentius euadit. Ad lædendū itaq; & manifestè insurgit, & salibus interpositum spatium cōtrahit: rarò quidē morsum infligens, uerum anhelitū consueuit uehementē uirulentum inducere, adeo ut etiam si anhelitu contingat tantū, eos qui propè sunt lædat. Plura autem de hoc animante historijs relata relinquimus, his tantum quæ cognitu utiliora iudicauimus, appositis. Cæterū qui ab eis læsi sunt, his omne corpus intumescit, & diffinditur, ac citò omnino pereunt. Porro quæ opem auxiliariē his ferre possunt, ex uniuersalibus & communibus antidotis ac epithematis huc transferantur, itemq; & reliquis quæ ad curationem pertinere uidebuntur.

De turture seu pastinaca marina. Cap. xxxvii.

Qui à marina pastinaca percussi sunt, his uulneris locus manifestè apparet: sequitur autem dolor pertinax, & totius corporis stupor: acutum enim & firmum habet aculeum, quo uehementissima ui in altū impulsio nerui sauciantur. Quapropter in aliquibus mors derepente totū conuellēs corpus comitatur. Narrat quidam, si quis caudā pastinacæ quæ ictū intulit, auferat, & in arborem, maxime quercū, suspendat ac figat, ipsam quidem arborē arescere, egrum autem sanari, atq; id iuxta contrariæ affectionis & remedij rationem cōtingere. Cæterum auxiliū ferunt percussi ab ea, ubi stupor & refrigeratio totius corporis consequatur, ex calidis illitionibus & cōsimilibus cataplasmatibus. Proprie autem surfures aceto cocti & pro cataplasmate impositi eis auxiliātur, & ipsum adeo acetū affusum pro fotu ualde prodest. Magis autem conueniunt eis attractoria, & quæ tenuiū partium sunt, ac calida, quo nimirum per attractoriā facultatem uenenum ex profundo attrahatur, & per calorem frigiditas mitigetur: & quæ tenuium sunt partium in altū proreptent. Ad hanc igitur rem in promptu habebis apta. Sulphur uiuum urina ueteri rigatum, marrubium, lauri folia, echium, radicem panacis, saluiam & similia, at uero si his careas, fermentum acidum cum liquida pice emollitum imposito: mirabiliter enim auxiliatur. Cum his concordat emplastrum Piscatoris, & ex bryonia pastillus tum impositus, tum ex uino calido diluto potatus, euestigio autem utilitatem suam demonstrat: describetur autem in fine huius Sermonis. Dato item & lauri decoctum, aut succum cyrenaicum erui quantitate

cum myrrha magnitudine fabæ, ac modico pipere terito, ac dato cum uino: aut silphium, aut laser ex uino: aut succi fici guttas quinque cum tribus serpilli granis bibendas præbe.

De murena.

Cap. xxxviii.

Morsis à murena eadem accidunt quæ morsis à uiperæ: quapropter etiam similia remedia eis adhibenda. Dato autem & fici succū cum serpillio, ut prædictū est.

De dracone marino.

Cap. xxxix.

Ad marini draconis plagam, locum percussus cum plumbo fricato, ipsumq; draconem dissectum plagæ imposito. Serpillum item tritum aut lenticulam coctam pro cataplasmate imposito. In potu uero absinthium cū uino diluto præbeto, aut saluiam cum passo. Mirè etiam his conducit ex bryonia & eruo pastillus cum uino potatus.

De scorpio marino.

Cap. xl.

Scorpij marini plagam sanat mullus dissectus & impositus, sulphur uiuum cum aceto illitum. Lauri bacca tres tritæ in potu acceptæ.

De culicibus.

Cap. xli.

Quandoquidem & hi hominū corpora lædunt, etiam de ipsis pauca dicemus. Culices fugantur cedrinorum lignorum scobe cum atramento sutorio suffito. Idem faciunt cupressi pilulæ, aut coma, aut ramenta: & uini fex sicca, & conyza, & bubulum sterus postquam contraxerit nigrorem. Aut melanthium uel absinthium oleo coctum illine, & culices non appropinquabunt. Aut melanthium cum absinthio, aut cerusam cum atramento sutorio in bubulo stercore suffito.

De muscis.

Cap. xlii.

Muscas necat, ueratrū album tritum, lacti, aut aquæ mullæ inspersum. Aliud. Semen hyoscyami, & ueratrū nigrum, & argenti spuma simul trita, & cum polenta irrigata & subacta, butyroq; aut adipe nidorosa facta, & in massas coacta, & muscis exposita, ipsas occidunt.

Ad pulices.

Cap. xliii.

Pulices necat rhododaphnes, aut cumini decoctum respersum. Idem & aqua marina facit.

Ad cimices.

Cap. xliiii.

Vt ne cimices gignantur, chamæleonis nigri decoctū facit, si ex eo lectus proluatur. Deinde sutoriū atramentum cum felle tauri terito, ex eoque lectum illinito. Aut etiam oleum per se, aut cum atramento sutorio inungito.

De uenenis.

Cap. xlv.

Ex animalibus exitiosa & letaliter corrumpētia, sunt cantharis, buprestis, salamandra, eruca pinorum, rana rubeta, lepus marinus, rana palustris muta, hirusdines. Ex seminibus autem, hyoscyamum, coriandrum, cicuta, psyllium. Ex succis, papaueris succus, opocarpasum, succus thapsiæ, elaterium, succus mandragoræ. Ex radicibus, thapsia, aconitum, ixias, ueratrū nigrum, agaricū ephemeron. Ex oleribus autem, taxus, solanum furiosum, herba sardonis, papauer cornutum, ruta syluestris. In his etiam fungorum genera connumerantur. Ex animalibus uero, sanguis tauri, mel Heraclea Ponti urbe natum, lac coagulatum. Ex metallicis, gypsum, cerusa, calx, auripigmentum, sandaracha, spuma argenti, argentum uiuum. Ex his uero quæ nobis familiaria sunt, uinum multum acera-



uatim à balneo potum : similiter & aqua frigida ac  
ceruatim à balneo aut cursu ingesta.

*Methodus præseruatiua ne quis à ueneno phar-*  
*maco lædatur.* Cap. XLVI.

Quod si quis uenenum habeat suspectum, præcauere  
omnino oportet, prima cura ad hoc adhibita, ut cor-  
pus ita appareatur, quo læsioni ac ueneni impressio-  
ni minimè obnoxium reddatur : quam ad rem bo-  
na concoctio uel in primis conducit. Cibi autem ea  
gratia sumendi sunt boni succi & magis carnosii : ani-  
maduersione habita, ne quod obsonium cōsuetum  
non referat colorem, aut odorem, aut gustum, aut  
qualitatem. multa enim uenena à prouidis & pro-  
bè considerantibus facile cognoscuntur. Qui igitur  
in potu aut cibo uenenū suspectum habet, is signis  
certis quale sit id depræhendat. Ex odore namq; &  
amaritudine potus & cibi, opium cognoscatur. Ex  
colore autem cerusa, gypsum, calx. Ex his uero quæ  
in cibo & potu innatant, lac coagulatum, & recens  
mactati tauri sanguis. Ex foetore autem & qualitate  
ac odore, rana rubeta, & lepus marinus. Quin & re-  
liqua ex alijs quibusdam signis noscuntur, de qui-  
bus sigillatim amplius dicetur. Cæterum præseruan-  
tia sunt, quæ si quis ieiunus præsumat, & post sume-  
re uenenū contingat, minimè ab ipso lædatur : suntq;  
huiusmodi. Calaminthe quotidie accepta ex natura  
sua omni letali pharmaco resistit : & si in ueneni su-  
spicione exhibeatur, destruit iam acceptam exitio-  
sam facultatem. Theodorus autem ita inquit : An-  
tidotus quæ incorrupta manens omnia uenena uin-  
cit, hæc est. Nucum iugladium unc. i. caricarum pin-  
gulum sextantem, sesami unc. i. unumquodq; per se  
tundito, deinde etiam simul pistillo ex oleo optimo  
madefacto, & pastillos nucis Ponticæ magnitudine  
formato, ex eisq; unum aut tres dato, & non contin-  
get ipsum in uniuersum ullum aliquod letale phar-  
macum. Quidam etiam rutæ trientem ammiscent.  
Strato autem, commune est, inquit, hoc præsidium  
ab omni exitioso pharmaco præseruans. Rutæ folia  
xx. nuces iuglandes ii. caricas ii. salis grumum i.  
Hæc ieiuno præsumenda dato, & à nullo letali phar-  
maco lædatur. Alia antidotus Asclepiadæ, ad ex-  
itialia uenena, quæ antè data adseruat : si uero ab ac-  
cepto ueneno detur, ipsum cognobile facit. Baccarū  
iuniperi drac. ii. terræ lemnæ quæ sphragis dicitur  
drachm. ii. contere, & melle aut oleo excipe. Vsu ue-  
ro expetente ad nucis ponticæ magnitudinem ex a-  
quæ mulsæ cyathis ii. à balneo bibendum præbe.  
Hoc quidem igitur pharmacum si nulla letalis adsit  
uis, sumptum manet, neque per uomitum reiicitur.  
Si uero quippiam letale haustum sit, nauseam mo-  
uet, & uomere cogit, ut acceptum uenenum unā cū  
antidoto excernatur. Quidam dimidiam tantū par-  
tem lemnæ terræ, ex iuniperi baccis coniungunt, &  
cum oleo omphacino subactis, similiter utuntur.

*Quomodo cognoscantur qui uenenum sumpse-*  
*runt.* Cap. XLVII.

Cognoscere autem & discernere oportet eos qui tale  
quippiam sumpserunt ex signis quæ coincidunt &  
consequuntur. Vbi enim in aliquem placidæ & be-  
ne compositi prius mentis, & bonæ itidem habi-  
tudinis, accedente etiam iusta ciborum concoctio-  
ne, statim & derepente uariæ accessiones irruant,  
præsertim ab accepto statim cibo aut potu, ueluti si

accedat tussis, aut foetida sanguinis per os relectio,  
aut molesta & ægra lotij excretio, aut dolor in al-  
to nitens, aut ardor iuuenilis & uehemens, aut sen-  
sus erosioni, aut stuporis percussio, punctura item,  
tremor, singultus, contractio, eruptio bullarum, li-  
uor, tumor, coarctatio, quarundam partium pu-  
trefactio, uomitus foetidus & plenus, manifesta ali-  
cuius uenenosæ qualitatis apparitio & demonstra-  
tio. Ex his omnibus si quid repente ab accepto ci-  
bo sano homini accidat, ueneno infectum esse hunc  
ipsum existimandum est.

*Cōmunia remedia & cura omnis ueneni.* Cap. XLVIII.  
In his igitur qui ignari uenenum sumpserunt, aut qui-  
bus circumtectum exhibitum est, communibus re-  
medijs est utendum. Itaque ubi adhuc datum uene-  
num in uentre est, & ob id morsum & nauseam in-  
fert, aut etiā alias accessiones, euestigio ad uomitum  
infectus cogendus est, aut mox inde à ueneno uide-  
licet accepto, sua sponte, aut aqua & oleo tepidis in  
potu datis, aut butyro, si oleum nō adsit, cum aqua  
calida dato. Licebit & maluæ decoctum exhibere  
cum oleo, aut foeni græci, aut seminis lini, aut fursu-  
rum, aut prisanæ succum, aut seminis urticæ decoctū :  
unumquodq; ex his oleo ammixto. A uomitu au-  
tem raphanos multos edendos dato, aut cū aqua te-  
pida tritos absorbendos : aut si hæc non adsint, nitrū  
cum aqua præbeto, rursumq; uomere iubeto. Post  
sufficiētem uero uomitum communia remedia pau-  
lō mox dicēda in potu exhibeto. Dato etiā id quod  
ex iuniperi baccis & terra lemnia est præscriptum.  
Quod si uenenum antea ad intestina descenderit : &  
tormina circa umbilicum induxerit, clysteri effica-  
cissimo aluū euacuare oportet, ex maluæ uidelicet,  
althææ, foeni græci, fursurum, centaureæ, aristolo-  
chiæ, & similibus decocto, mellēque & nitro largo,  
itemq; oleo ammixto. In cibo uero exhibeatur ra-  
phanus, & salsamentum, alliaq; & cepe. At in potu,  
uinum recens mari mixtum. Si uero in uesicam im-  
petum fecerit uenenum, in aquā & oleum utere de-  
fessu, ita ut in aqua ipsa foenum græcum, ac lini se-  
men, malua syluestris & satiuā, ammiq; semen sint  
decocta. In potu etiam idem ammi semen præbē-  
dum, aut apium, aut foeniculum, aut spicam nardi,  
& similia odorata, & simpliciora urinam cientia. Si  
uero uesicam rodat uenenum, cucumeris semen de-  
squamatū & tritū cochlearij mensura ex passo  
diluto præbeto. Similiter autem & si uentrem uehe-  
menter exurat, idem semen dato, ab omni calidiorū  
rerum adhibicione abstinendo : & his quæ ad  
cantharidem & buprestim referentur utendo. Cæ-  
terum ad cutem iam delato ueneno, irrigationem  
adhibeto, & illirionē ex oleo modico calido, in oleū  
item aut aquam & oleum in folio defessum. Cibos  
autem facile digestibiles & sorbitiones cū melle ex-  
hibeto : piscibus item recentibus teneris, & uolucris  
facile concoctilibus utitor. In potu deinde ui-  
num album & rufum, uetus & quā odoratissimū  
præbeto. Quod si ad caput decurrat uenenū, ut gra-  
uitas & sopor consequatur, primum quidem aluus  
per infusum ex foeni græci, seminis lini, althææ & cu-  
cumeris syluestris maximè radicis decocto subdu-  
catur. Deinde sternutatorium ex strutio & pipere  
adhibeatur, & cyclamini succus aut elaterij naribus  
infundatur : odoramenta item admoveantur casto-  
rium



rium, & similia cum aceto diluta. Præterea & præfer uantibus præsidij utendum est, eoq; quod ex nucibus & caricis constat, & quod ex iuniperi bacis ac lemnia sphragide apparatus, & theriaca Andromachi ex uiperis, & Mithridatis antidoto, & consimilibus. At uero si composita non adsint, parabilibus utaris, & communiter ad omnia ferme uenena destinatis. Communiter autem ad omnia letalia uenena facit irionis semen cum uino & oleo. Lemnia sphragis cum uino: egregie enim & quam celerrime uomitum procurat. Aut nuces iuglandes cum caricis & ruta edat, aut hæc ipsa decoquito, & decocto accepto uomat, aut seminis lini, aut maluæ, aut foeni græci decoctum cum oleo sumat. Porro ad accessiones quæ cum frigore incidunt, abrotonum in aceto mulso cum sale dato: item irionis semen, eryngij radicem, spicæ celticæ radicem, serpillum, bryoniæ radicem, castorium, porri succum, laser, sagapenum, opopanaca, succum cyrenalcum, rutæ syluestris semen. Polij etiã ac scordij & betonice, cuiusque drachmam unam cum uino aut aceto mulso.

Ad eos qui cantharidas hauserunt. Cap. XLIX.

Qui cantharidas acceperunt in corpus, his statim uirus eorum in nares distribuitur odore picis. Picis item aut cedriæ qualitas linguæ inferri uidetur. Sequitur autem & stomachi morsus, uentrisq; ac renum, & maxime uesicæ. Quandoq; & sanguinis excretio per urinam & aluum fortes morsus concomitatur. Vnde sanè locus circa os uentris uehementer dolet, adeo ut ipsum pectoris os, quod chondrum xiphoidea à capitis gladij figura Græci appellat, dolore affici putetur. Inflammatum autem & dextrum illud: deinde urinæ eijciendæ difficultas, imò & supressio cõsequitur. Amplius autem & uis uisua oculorum consumitur, delirantq; & à loco in locum iactantur. Cæterum auxilium sentiunt, si quam celerrime uinum dulce eis præbeatur, nucleis pineis recentibus aqua calida præmaceratis ac probè tritis ei ammixtis, aut cucumeris semine decorticato similiter ammixto. Lac etiam assidue cum melle modico primum exhibendum, postea & per se recens mulctum. Aliquando & adipem anserinum aut gallinaceum liquefactum potui adfundito, aut terræ samiacæ drachm. i. aut rosmarini drach. i. ex aqua mulsa dato. Dada etiam iura pingua porcina, aut ouilla, aut anserina: carnes etiam agninæ, gallinarum, porcellorum recens natorum pingues ac probè coctæ, & cerebella porcina. amplius autem de iure absorbendum præbeatur, donec affectus ad uomitum concitetur. Bibat insuper uinum dulce tepidum plurimum dilutum, ubi biberit autem, unum quodq; uomitu reiiciat, rursusq; bibens uomat, idemq; sæpe repetitis uicibus faciat. Post uomitum uero lac recens mulctum, aut prisanæ succus, uel halicæ, aut oryzae, aut maluæ, aut seminis lini succus cum adipe anserino uel gallinaceo per clyster infundatur. Quod si exolutiones & morsus oboriantur, lac bubulum recens mulctum assidue bibendum & citò reuomendum exhibeto. Aut uitis germina contusa cum passo diluto dato. At uero contrariæ affectionis ratione quantum nihil aliud his auxiliatur cantharidum alæ & pedes cum passo potata, & scorpij radix trita ex passo potata, quæ itidè optimè ad buprestim facit. Dandum & ex uiperarum theriaca parum quid,

aut ex Mithridatis antidoto. Porro ubi accessiones fuerint sedatæ, farina hordeacea cum aqua mulsa illo imponatur, & uniuerso corpore ex oleo gleucino aut cyprino illito, æger in balneum deducatur, & in solio diutius moretur. Cibis autem facili concoctilibus, & acrimoniam lenientibus multo tempore utatur. Vinis item dulcibus & lactis potu.

De bupresti.

Cap. L.

Buprestis species quidem est cantharidis, uerum uirosi tum gustus, tum odoris. Ab eius autem haustu uehemens stomachi & alui dolor consequitur. Intumesceat item os uentris, uenterq; ipse ac totum corpus attollitur, quemadmodum in hydropicis fieri consueuit, & lotium cohibetur. Cæterum eadem remedia quæ ad cantharidas dicta sunt, etiã ad buprestis sumptionem exhibentur. Propriè autè post uomitum à iusculis pinguibus & passo cõcitatum, & post euacuationes per clyster, ficus aridæ pingues in cibo cõueniunt, & decoctum, ipsarum in potu cum uino. Cõmodissimum autè tum his, tum qui cantharidas acceperunt, est muliebre lac ex ipsis mamillis assidue exuctum.

De eruca pini.

Cap. LII.

Eruca pinus potata, statim dolor circa os & palatum oboritur, & linguæ inflammatio fortis, & stomachi aluiq; ac intestinorum adflatio uehemens, cum pruriginoso circa interna sensu. Ardor itè per totum corpus, & stomachi fastidium. Cæterum eadè his auxiliatur quæ ad cantharidas sunt relata. Propriè autè oleum melinum pro simplici oleo exhibitum, & uomitu reiectum.

De salamandra.

Cap. LIII.

Salamandra animal simile est stellioni, asperius & scabrum magis quam lacerta uenenata. Penetrat autem hoc animal per ignem ardentem, nihil quæ læditur dissecta & discedente ab ipso flamma. Si uero per tempus aliquod in igne immoretur, consumpto frigido in eo humore, exurit. Comitatur autem salamandræ acceptionem, inflammatio linguæ: mens impedita & turbata: tremor quæ cum stupore quodam & exolutione. Quædam etiam corporis partes per ambitum liuescunt, adeo ut etiam decidant sepius putrefactæ: primum equidem maculæ albæ per corpus apparent, deinde rubræ, postea nigræ cum putrefactione & defluuio capillorum. Danda uero & his quæ in cantharide sunt relata, ut inde uomant. Propriè autem resinam pinus cum melle tritam delingendam præbe: aut etiam galbanum cum melle, aut nuces pineas tritas cum chamæpityos decocto: aut urticæ folia lilij incocta cum oleo. Præter opinionem autem eis auxiliatur ranarum iusculum, si eryngij radices in eo coquantur.

De lepore marino.

Cap. LIII.

Lepus marinus reperitur ferme in totum inter loliginas, animal paruum, uirosus odorem habens. Comitatur autem eos qui eum in corpus ingesserunt, sapor in ore similis piscibus uirosus: paulo uero post aluum dolitant, & color corporis ad aruari similitudinem permutatur, deinde plumbeus redditur, cum faciei tumore. Incenduntur autem pedis plantæ, & pudendum tumefactum cohibet urinæ effusionem: progrediente uero malo etiam cærulei coloris lotium emingunt, quandoq; etiam sanguinolentum. Deinde nauseabundi facti biliosa uomunt sanguine permixta, & piscium loturam olentia. Exudant itè graueolentia, & omne piscis genus auersantur ac odio



odio habent præter cancrum. His igitur lac asininum recens multum cum passo assidue præbeatur, aut si hoc non adsit, bubulum, aut malum decoctum. Indeque confestim uomant, deinde radicis cyclamini tritæ drach. iiii. cum uino diluto dentur. Aut uera tri nigri drachmam unam, aut scammonia scrupuli duo cum bubulo lacte aut aqua mulsa. Aut mali punici acini, uel cedrides, hoc est, cedri fructus triti ex uino. Aut picem liquidam, aut cedriam modicam cum passo deligendam dato. Anseris item sanguinem adhuc calentem cum passo bibendum præbeto. Edat & cancrum assidue: piscem enim nullum admittit. Signum porro salutis iudicabis, si piscem edere possit.

*De rana rubeta.*

*Cap. LVIII.*

Ranæ rubetæ duæ sunt species: Altera quidem surda est: altera uero non. Surda autem exitiosa censetur. Pascitur autem in arundinibus roris lectu uiuens, ex ea sanè uenenum apparatur. Quod qui acceperint, febris comitatur, extremæ partes incenduntur, frequenterque anhelatione ac difficili spiratione anguntur. Tumor autem sequitur corporis cum pallore buxco intenso, foetorque oris & singultus. Quandoque etiam seminis inuoluntarium profluuium contingit. Ceterum facile opem reperiunt, si post aquæ & olei uomitum, uinum meracum multum sumant, aut picem cum uino. Radicem etiam harundinum, in quibus ranæ rubetæ pascuntur, contusam ex uino bibendam dato, aut cyperum ibidem enatam pondere drachmarum duarum ex uino. Aut maris testudinis sanguinem cum leporis coagulo & cumino ex uino præbeto. Porro dolium insuper aut furnum igne feruefacito, ignemque extracto laterem imposito, & ægrum immitti, multumque ac diu exudare iubeto. Cogatur autem & ad continentem inambulatione, cursumque ac exercitationem, propter contentum in ipsis stuporem. Vehementer enim efficax exercitatio in ipsis existit. Quotidie etiam lauetur.

*De ranapalustri.*

*Cap. LV.*

Qui ranam palustrem acceperunt appétitione priuantur, sequiturque oris humectatio, nausea, uomitus, & oris stomachi leuor morsus. Curantur autem uini multi potu cum omnibus que calfactoriam uim habent: uelut est cyrenæ succus, laser, silphium, cuminum, piper & similia.

*De hirudinibus.*

*Cap. LVI.*

Hirudines cum aqua deuoratae faucibus adherent, aut iuxta quempiam stomachi locum, aut ipsi ori uentris: & primum quidem sensim exugunt sanguinem, expletæ autem his que deglutimus, uiam obstruunt. Superexpletæ uero etiam sanguinem quem exuxerunt foras profundunt, ut imaginationem inducant tanquam sanguis ex internis locis reieceretur. Ceterum qui affectis contingit exuctionis sensus, is signum sit tibi hirudinem deglutitam esse. Excutit autem ipsas muria continue & paulatim absorpta, atque id eo magis si acida muria sit, & laser ei ammisceatur. Idem facit & nix aceto dissoluta & assidue absorpta. Gargarisset insuper nitrum cum aqua, aut aquam marinam, aut atramentum sutorium cum aceto, aut sinapi, aut hyssopum, aut origanum. Si uero inferne circa os uentris hirudo adhæreat, prædicta itidem omnia bibenda dato, præter sutorium atramentum, utendum etiam his quæ aluum soluere possunt, aut medicamento purgatiuo. Cum excrementis enim

exire consueuerunt. Nos autem per alij multi esum has eiicientes, nullo ex prædictis opus habemus. Quæ postremum gutturi affixæ sunt, hoc modo excutere oportet. Ægrum in solium calida expletum usque ad collum immitto, & frigidissimam aquam ore tenendam exhibeto, eamque frequenter permutato. Egredietur enim inde hirudo frigida appetentia prolecta.

*De ephemero.*

*Cap. LVII.*

Qui ephemero quod aliqui colchicum aut bulbum syluestrem adpellant, in corpus adsumpserunt, hos pruritus totius corporis concomitatur, non dissimilis ei qui urticae aut scilla irritamentis lacessitus excitatur. Circa stomachum insuper acrimoniam sentiunt & uruntur cum multa grauitate. Inualecente autem malo, per aluum cruentum quiddam ramentosa admixtionem habens effertur. His ueluti Salamandra accepta auxiliari oportet, per uomitus uel delict assiduos & infusorum immisionem. Ceterum antequam inualecat uenenum, quercii foliorum, aut glandium, aut malicorij decoctum cum uino præbeto, aut origanum cum lixiuio, aut uuas passas pingues tritas cum lacte exhibeto. Mirabiliter autem auxiliatur lac bubulum recens multum assidue potatum, & in ore detentum, ut alio auxilio non sit opus.

*De dorycnio aut solano furioso.*

*Cap. LVIII.*

Dorycnio siue solano, ut alij appellauerunt, furioso potato, in gustu ueluti lactis quedam qualitas sentitur, singultus adest continuus, humectatio linguae, & sanguis acruatim reijcitur, atque per aluum ramentosa quædam feruntur, quemadmodum in dysentericis fieri consuevit. Antequam uero quid tale consequatur, post uomitum & clysterem, aqua mulsa, aut lac asininum recens multum assidue potatum auxiliatur, passum item tepidum cum aniso potatum & amygdalis amaris tribus: pectuscula etiam gallinarum probe cocta, & omne cochylionum genus crudum & assatum in cibo acceptum, & locuste & gammari, & iusculum ipsorum in potu.

*De aconito.*

*Cap. LIX.*

Aconitum uero quod quidam irim syluestrem appellant, statim dum potatur linguam edulcorat cum quadam adstrictione, deinde paulo post in lingua amarescit, & constrictio mandibularum concomitatur, & oris stomachi morsus, & laterum dolor, pectorisque grauitas ac præcordiorum: materia enim quepiam circa umbilicum innititur, & cum multis flatibus consequentibus corruptio contingit, grauiatur item caput & tempora contremiscunt, oculi uero turbatiores fiunt, & subruenti, ac lacrymas profundunt. Quod si diutius perseueret malum, etiam tremor ac concussio ac tumor totius corporis sequitur. Ceterum his post uomitus & infusa, origani potu succurrendum est, & ruta, marubij, absinthij, erucæ, abrotoni, chamætrixaginis cum uino. Aut coaguli ceruini, aut hœdi, aut leporis potu ex aceto. Aut ferri recrementum, aut ipsum ferrum, aut aurum siue argenteum, aut lapidem molarum omnia igne candefacta in uino extinguita, ipsumque uinum calidum bibendum præbeto, aut lixiuium cum uino dato. Aut pullum gallinaceum tenerum & pinguisimum coquito, & decoquendo eliquato, donec ossa sola relinquantur, & iusculum per se uel cum uino bibendum exhibeto. facit & uitulinum pingue ius potatum, & uomitu



uomitum reiectum. Maximè uero propriè facit trixago potata & castorium, & iris ac ruta. Quanquam aliqui à nullo horum se auxilium sensisse asserant.

*De melle quod in Heraclea Ponti nascitur. Cap. LX.*  
Hoc mel siue in potu siue in cibo acceptum easdem adflectiones infert quas aconitum: in Heraclea enim Ponti urbe aconitum gignitur, ex quo colligitur ibidem istud mellis genus. Conueniunt igitur eadem auxilia in aconito iam relata, & magis usque rutæ folia ex uino mulso potata.

*De coriandro. Cap. LXI.*  
Coriandrum potum ualidam & asperam uocem facit, & delirium furiosum, non dissimile illi quod ab ebrietate proficiscitur inducit, hoc accedente etiam quod turpia dictu infecti loquantur, & per omne corpus odor coriandri transpiret. Auxiliatur autem eis uomitus ex oleo irino, & uinum meracum cum per se, tum cum absinthio potatum. Qua item in unum uasculum euacuata conuassata & tepescita ex muriaque absorpta, ius itidem pingue salsum tum anserinum, tum gallinaceum, passum etiam, & anisum in uino acido siue uappa sumptum.

*De psyllio. Cap. LXII.*  
Psyllio potatum totius corporis frigiditatem inducit, & stuporè cum exolutione & moerore. Auxiliatur autem his eadem quæ coriandro hausto.

*De cicuta. Cap. LXIII.*  
Cicuta potata uertiginem & caliginem oculorum inducit, adeo ut neque minimum cernere possint, singulum insuper ac mentis percussione & frigiditatem: sequitur deinde suffocatio, & segnities ac liuor, postremum conuulsi spiritu in respiratione supresso strangulantur. In principio igitur per uomitum ex aqua & oleo cicutam excutere oportet. quod uero ad intestinum delapsum est, per euacuationem expurgetur. Deinde tanquam ad maximum remedium ad passum meraci potum perueniendum, ita ut in intervalis meraci potus bubulum lac aut asininum recens mulctum, aut absinthium cum pipere in potu exhibeamus. Rutam item & castorium ac mentam cum uino. Aut amomi drach. i. aut styracis drach. i. cum semine urticæ ex uino. Aut lauri folia, aut silphium, aut laser, aut succum cyrenaicum, aut apij semen, aut iridis radicem, aut fœli marsilense, omnia ex uino dulci, aut nitrum cum aqua larga. Totum præterea corpus calefacere conducit & præsertim præcordia. Ad uehementiorem item motum, ac cursum æger cogatur.

*De smilace seu taxo. Cap. LXIII.*  
Smilax quæ & Thymion, atque apud Romanos taxus appellatur, potata frigus totius corporis & suffocationem inducit, & celerem omnino mortem. Cæterum remedia eadem quæ ad cicutæ haustum relata sunt, eis auxiliantur.

*De succo carpasi. Cap. LXV.*  
Carpasi succus potatus soporè grauiorem inducit & sensus hebetat absque dolore, exudatione etiam facit, & repentinam suffocationem cum exitiosa saniei reiectione. Opè uero sentiunt ex his quibus curantur qui cicutam hauserunt, & toxicum, atque item ephemeron.

*De herba sardonis. Cap. LXVI.*  
Herba quæ Sardonis appellatur, & ranunculi species est, potata furorè & conuulsionem inducit, malasque contrahit, ut risus imaginem de se præbeat qui eam

hauserit, à qua dispositione etiam sardonius risus non admodum boni nominis adagio uulgo circumfertur. Est enim accessio grauis omnino quæ falsi risus prætextu presentem & insperatam mortem inducit. Cæterum qui eam hauserunt, post uomitum, aquæ mulsæ ac lactis potu iuuantur, fotusque ac irrigatione & pinguefactione totius corporis, per calefactoria unguenta. Immittendi etiam sunt in aquam & oleum calidum, inungendi que ac fricandi plurima post egressum ex folio perfricatione. In uniuersum enim uelut ad conuulsionem curam moliri oportet castorio ite cum passo & per se in potu dato, & si qua ei consimilia existunt.

*De hyoscyamo. Cap. LXVII.*  
Hyoscyamus acceptus delirium quali ebrj obnoxij fiunt, inducit, & iactatione corporis cum distortionem. his succedit exolutio animi deliquio similis, & oculorum rubor, pruritus: deinde tremor, suntque omnino deliri, & putant se flagris corpore cædi. Cæterum facile curantur aquæ mulsæ largo & lactis potu, si haberi possit, asininum. Id uero si non adsit, caprinum aut bubulum exhibendum. Facit autem & ad eos uinum salsum, & urticæ semine, similiter & folia cocta ex uino salso. Sinapi præterea, & raphanus, nasturtium, cepe, & allia eis conueniunt unumquodque ex uino salso. At uero quiescere eos conuenit, ut uinum eo melius concoquatur. Auxiliatur etiam eis muliebris lactis exuctio.

*De mandragora. Cap. LXVIII.*  
Mandragoræ radicem nemo latenter exhibere potest. etenim trita quidè liquida grauem quandam & nauseabundum odorem exhibet, & gustui etiam amarulenta est & iniucunda. Certa itidem copia & mensura ad lædendum exhibetur: de cætero uero molestias quidem facit, interitum autem serius inducit. Cæterum ex his qui radicem hanc hauserunt: alij quidem segnes & languidi tristesque ac exoluti fiunt, & refrigerati in grauem ueternosum soporem delabuntur, & si quis eos excitet uix audiunt, & excitati cito rursus recidunt. Alij uero calidi quidem minime fiunt, uerum mente perturbati tarde in obliuiosum soporem incidunt. Cura itaque adhuc perturbatis adhibenda est post uomitum, coriandri semine aut pulegio tenuissime trito in potu cum aqua calida dato, aut his quæ uentrem inferne exoluere possunt. Eis uero qui graui sopore pressi sunt, post uomitum, origanum ex aqua frigida exhibendum est: ualde enim inde iuuantur. Dandum etiam absinthium in passo diluto. Caput uero ex aceto rosaceo irrigandum est ægro assidue excitato. Odoramenta etiam naribus admouenda, castorium, ruta, pulegium cum aceto. Porro mandragoræ mala perfecte maturata à quibusdam comeduntur citra noxam, semine ramen reiecto: & si plura quam oporteat edantur, plus somni quam iuxta naturam conuenit, inducunt. Immatura uero & crudiora & præsertim cum semine comesta, maximum periculum inferunt. Sequitur ab eorum acceptione ardor circa superficiem corporis. Lingua uero & os exiccantur usque eo, ut neque salua hæ partes humectentur. Hiant semper, ore citra intermissionem aërem attrahentes. Et si non statim auxilium feratur, conuulsi pereunt. At uero si remedia asserantur, facile curabiles existunt, aquam nanque cum theriaca ex uiperis Andromachi



machl potantes ab omnibus molestiis liberantur. Vehementer autem iuuatur in aqua frigida natatione, maxime si aliquandiu in ipsa immorentur.

De succo papaueris.

Cap. LXIX.

Quemadmodum de mandragoræ radice prædictum est, ita neq; papaueris succum quispiam latenter sano homini exhibere possit, propter saporis proprietatem & amaritudinem ac graueolentiam odoris, & quod certa copia ad interitum inferendum exhibeatur. Quando igitur aliqui uoluntarie hoc pharmacum biberint, siue id manifestare noluerint, siue uolentes dicere non possint, per huiusmodi accessiones cognoscuntur. Sequitur enim eos qui eum acceperunt in somnum grauem collapsio, cum frigidityte & pruritu intenso, ut aliquando ob ipsum excitetur, odorq; opij per totum corpus effertur & exhalat. Inferior maxilla laxatur, tumescunt labra, irruit singultus, distorquetur nasus, adest pallor, liuor unguitum, præcordiorum diuulsio, respiratio parua & frigida, & per interualla fissuræ ad finem etiam conuulsio. Auxiliatur autem his post uomitionem ex oleo, & acrioris clysteris infusionem, acetum mulsum potatum, & acetum calidum per se, & uinum uetus, rufum, meracum, largum cum absinthio & casia, & nitrum cum aqua. Et origanum cum lixiuio, rutæ syluestris semen, piper & castorium ex aceto mulso, satureiæ & origani decoctum cum uino. Oportet autem & hos odorem excitare, & in calidum solium immittere, & fouere ob pruritus, post balneum autem pinguius iuscula, & medulla ceruina exhibenda. Manifestum autem quod & his & omnibus qui etiam aliud uenenum sumpserunt, dari debeat theriace tum ante tum post uomitum.

De toxico,

Cap. LXX.

Toxicum inde appellatum uidetur, quod Barbari sagittas, quas toxemata Greci uocant, ex eo illinunt. Concomitatur autem eos qui toxicum biberunt, labiorum & linguæ inflammatio, furor adeo uehemens ut ægri uariis imaginationibus obuersantibus coerceri non possint, atq; ob id adeo etiam ægre curentur, & raro aliquem seruari contingat. Vinculis igitur eos constringere oportet, & cogere ad passum cum rosaceo potum, & uomitum per immisionem pinularum. Deinde iusculum pulli gallinacei pinguis absorbendum dato. Auxiliatur autem eis rapum semine potatum, magis proprie autem quinquæfolij radix, & sanguis hirci uel capræ, & cortex quercinus cum lacte tritus, & mala cotonea comesta, aut decoctum ipsorum potatum, & pulegium potatum, amomumq; & carpobalsamum ex uino. Quod si quis periculum effugiat, multo tamen tempore in lecto decumbet. Stupidus autem & dubiæ ac uacillantis rationis per reliquum uitæ tempus manebit.

De his qui ixiā hauserunt.

Cap. LXXI.

Ixia quæ & ulophonon appellatur potata saporem & odorem ocymo similem habet, linguæ autem inflammationem fortem infert & furorem; recrementorum uias omnes obstruit, murmuratq; ac rugitus intestinum cum animi deliquio inducit, quum tamen interim nihil excernatur. Auxiliatur autem eis post largam uomitionem & uentris per clysterem subductionem, absinthij cremor cum uino multo aut aceto, aut aceto mulso potatus, aut syluestris rutæ semine, aut silphij radix, aut tragorigani decoctum cum aliquo

ex prædictis, uel cum lacte. Aut resinæ terebinthinæ & nardi & silphij cuiusq; obol. i. ex uino. Aut castorij & rutæ & terebinthinæ singulorum drach. i.

De chamæleone,

Cap. LXXII.

A chamæleonis potu, morsus uentris & linguæ tumor cum rugitibus intestinum sequitur, facies distorquetur, & uomitus spumosus, & tremores, & conuulsiones, & totius corporis conuulsiones, ac uocis interceptio comitantur. qui uero album chamæleonem hauserunt, etiam strangulantur. Ceterum curantur ex his quæ ad fungos sunt relata. Datur eis & rhilaspis & betæ succus, & triticeæ prisane succus ex passo, absinthij cremor, & nitrum cum aceto mulso. ubi uero uomuerint, lac recens multum sæpe exhibeto, & aluum cum lubricis infusis eluito, uelut est fœni Græci & althææ decoctum. Præcordijs etiā fomenta ac calfactoria adhibeto.

De fungis.

Cap. LXXIII.

Fungorum aliqui genere, aliqui copia noxi sunt, inferunt autem suffocationes strangulationibus non ab similes, quibus confestim prius quam penitus uincantur, auxiliari oportet, per raphani aut rutæ foliorum largam comestionem. Dandum & nitrum bibendum ex posca tepida aut aceto mulso, ita ut his liquoribus hyssopum, origanum, thymumq; sint incocta, atq; inde ad uomitum cogantur. mirabiliter autem iuuantur lixiuij ex sarmentorum cinere excolati potu, atq; eo amplius si ex pirastri ligno lixiuium sit factum, aceto ac nitro ad cinerem eius adiecto. syluestria uero pira, aut arboris ipsorum, pirastri uidelicet, folia cum fungis cocta strangulandi uim ex eis tollunt, insuperq; ab eorum acceptione comesta, auxiliantur. Bibitur & comode aristolochiæ drach. i. aut absinthij ex uino, melissophyllon cum nitro, radix panacis cum uino. Nasturtium item uiride edat aut semen bibat. Cæterum Philagrius gallinaceum sterus album inquit, tritum exhibemus ex posca aut aceto mulso, huius enim manifestum habemus experimentum quod ad fungorum strangulationes auxiliatur. Oportet autem & acri infuso aluum euacuare. Quando uero quidam fungi à feris uenenum iaculantibus arrosi aut infecti, aut etiā in locis ubi eiusmodi bestiae latibula sua habent, enati, non modo suffocationem inducunt, sed & intestina exulcerant, absinthij & ficuum decoctum large in potu exhibendum est, & origanum cum melle, indeq; uomendum, deinde uero theriacem bibat, & in calidam aquam demittatur.

De sanguine tauri,

Cap. LXXIII.

Sanguis tauri recens mactati potatus in aluo in grumos cogitur, ægramque spirationem inducit ac suffocationem; comprimit etiam os uentris, & continuas conuulsiones infert. Inuenitur autem horum lingua rubra & gingiuæ corrosæ, & sanguinis grumi inter dentes. in his itaq; uomitum uitamus, etenim grumi in ore uentris coadunati uomitum impediunt. Damus autem eis quæcūq; grumos dissoluere possunt, grossos igitur ex fico maxime syluestri succi plenos cum posca & nitro dato, aut fici succum eodem modo, aut lixiuium ex cinere lignorum fici, aut ramulos fici tritos cum nitro & posca præbeto. at uero syluestris fici fructus etiā siccus comestus euestigio grumos dissoluit. Datur & silphij radix uuliter ex aceto, & amarantū, & brassicæ semen, & conyzæ folia cum pi



cum pipere & lixiuio. Alius autem pinguibus & lubricis infusis eluatur.

*De lacte in grumos coacto.*

Cap. LXXV.

Lac coagulatum aut multū & acruatim haustum, suffocationē aliquando infert in grumos coactum. Auxiliatur autē his coagulum omne, maxime uero leporinū ex aceto potatū. Etenim coagulū recētī lacti iniectū ipsum cogit & inspissat, id uero quod iā coactū est, ex natura sua dissoluit. Datur eis & calaminthæ uiridis succus, aut folia arida trita, & iuniperi baccæ, item ea quæ ad sanguinem in grumos densatum sunt prædicta. Vomitus uero etiam in his recusamus, neq; quicquam omnino falsum exhibemus.

*De Gypso.*

Cap. LXXVI.

Gypsum potatum in lapidem induratur, ac strangulationem inducit: quapropter eadem auxilia quæ ad fungos relata sunt, huc transferre oportet, ita tamen ut in his pro oleo, maluæ, aut fœni græci, aut ficuū decoctum exhibeamus, aut oleum cum aqua mulsa. His item eadem decocta per clysteres infundenda.

*De Cerusa.*

Cap. LXXVII.

Cerusa ob colorē suum latere nō potest, accepta enim palatū in albat, linguāq; ac gingiuas, in quibus etiā pars aliqua cerusæ reperietur. Infert autem singultus & tusses, linguæq; ac faucium ariditatem: frigescent corporis extrema cum delirio & mentis percussione, & difficili motu siue torpore. His porro aqua mulsa exhibenda est, aut ficuum & maluæ decoctū, aut lac calidum, aut sesamum tritum ex passo, aut lixiuium ex cinere sarmentitio, aut oleum irinum. Omnibus enim oleum large ammiscere oportet, ab uno quoq; uero uomant, facit & scammonia cum aqua mulsa potata.

*De argenti spuma.*

Cap. LXXVIII.

Argenti spuma potata grauitatem stomachi inducit, aluiq; ac intestinorum, cum torminibus uoluulosis intensis, quæ citra umbilicum maxime innituntur. Lotium supprimitur, corpus intumescit, liuescit ac plumbi colorem induit, & articuli incenduntur, ac ardent. Ad finē uero & suffocatio sequitur. Confert igitur post uomitū à decoctionibus lubricis factū, hormini semen, & myrrhæ oboli tres ex uino, aut absinthium, aut apij semen, aut hyssopum, aut piper. Et columbinum stercus cum uino & oleo, aut cum uino mulso & oleo. Si uero nimium proflua sit aluus, lauacra calida, & carnes suillæ pingues assatæ cōueniunt, & aquæ potus, & oleum similiter in potu.

*De Argento uiuo.*

Cap. LXXIX.

Argentum uiuum hydrargyros Græcis appellatū potatum, eadem infert quæ argenti spuma. Confimilem etiam curam expostulat. Auxiliatur autem imprimis lac asininum recēs multum potatum ac uomitu reiectum.

*De calce, sandaracha & auripigmento.*

Cap. LXXX.

Calx, sandaracha & auripigmentum potata dolorem uentris & intestinorum cum uehementi morfu inducunt. Iuuantur autem succi maluæ potu, aut seminis lini, aut oryzae, aut halicæ pinguibus iusculis potatis, aquaq; mulsa, & lacte calido, si ea assiduo uomitu reiecent.

*De thapsia, ueratro, elaterio & agarico.*

Cap. LXXXI.

Ex his quæ homini ob cōmoditatē in usum ueniunt, aliquādo uero pericula inducūt, est thapsia, ueratrū album & nigrum, elaterium agaricum. Quando-

que enim & hæc suffocationem inferunt & purgationem ultrā quā oportet. Agaricum uero in quibusdam per aluum nō subductum, tremorem & resolutionem produxit. Suffocationibus igitur, ueluti in fungis dictum est, nos opponemus, aut uelut de albo ueratro relatum est in tertio Sermone. Purgationes autem ultra modum factas per ea quæ cohibere possunt, sedabimus, & per ea itidem quæ firmitatem corpori addunt, de quibus similiter in tertio Sermone est prædictum.

*De ruta sylvestris & melanthij nocu-*  
*mentis.*

Cap. LXXXII.

Lubricorū & acrimoniam hebetantium decoctorum potu cum largo oleo opus habent, qui ea hauserūt.

*De acruato frigida aquæ potu.*

Cap. LXXXIII.

Frigida aqua acruatim pota, aut etiam uinum meracum, aut passum, à balneo maxime, aut cursu, aut concitatoribus exercitamentis morsus & dolores inducunt. Verum in his statim uenam secare oportet, & per clysterem euacuare.

*De strangulatis.*

Cap. LXXXIII.

Strangulatis, adhuc tamen inspirantibus, & aërem attrahentibus sternutatorium naribus admotum auxiliatur, & uenæ in cubito sectio. Piper autem ex aceto siue posca bibendum dato, & ad uomitum cogito. coartatis deinde colli locis aquam & oleum calidum adhibeto, aut anethinum calidum, aut adipem anserinum. Ianis insuper mollibus collum amplectendū est ac fouendum.

*De his qui ex alto ceciderunt.*

Cap. LXXXV.

Ex alto præcipitatis euestigio auxiliantur uitis. sarmentum aquæ incocta, si aqua in potu sumatur. Quod si æger potam aquam nō ferat, sed uomitu reiciat, morietur. Si uero is qui cecidit, sanguinē expuit, & uenarum ruptura sit suspecta, sarmenta ipsa urito & aqua restinguito, ipsamq; aquam percolatam bibendam dato, quo inde sanguinis grumi dissoluantur. at uero sarmentis non præsentibus cinerem quēcunq; pelluito, & lixiuio inde utilior.

*De præseruantibus & præsagis animalibus.*

Cap. LXXXVI.

Quando uero & præseruatiua quædā ac præsaga animalia descripta sunt ueteribus, quæ iuxta contrariæ affectionis rationem uenena produnt, ex his etiam magis probata eligemus atq; hic apponemus, quo uniuersus sermo huius tractationis perfectior fiat. Piso itaque in libro de animalibus ait: perdicem qui domi nostræ connutritur uociferari ac clamare circumplicareq; ac lacerare cortem in qua perdoes cōnutriuntur, ubi cognouerit medicamentum quodpiam intra ædes parari aut aliud uenenum. Menelbus autem, aquila, inquit, intra ædes connutrita insiliet & arcet eos qui talia moluntur. Simonides uero pauonem tradit, cognito apparato medicamēto, ad locū prodire & clamare, seq; expandere & medicamētum ex uasis dispergere, aut etiam effodere, si qui dem sit sub terra defossum. Aristodemus porro ichneumonē domi nutritū medicamenta sub terram defossa præsagire scribit. Pherecydes autem narrat psittacum marem obseruare & arguere ac nominatim deferre eos qui talia faciunt, aut in domum important. Cæterum post præscripta uenena, etiam antidotos multi usus & commoditatis, experimētoque cognitæ ex ordine subnectemus.

De the-



*De theriaca ex uiperis Andromachi. Cap. LXXXVII.*  
Ordinemur autem à theriaca Andromachi ex uiperis: Cuius admiratione ductus Galenus hæc de ea scribit. Quum multa discordia sit circa theriacæ descriptiones, nos Andromachi descriptione ut lōge optima utimur, quæ etiam in regum usus apparatus. Fit autem apparatus eius hoc modo. primum quidē scilicet pastillos apparare oportet, propterea quod resiccatione per multos dies opus habent. Apparantur autem hoc modo.

*Pastillorū scilliticorū preparatio. Cap. LXXXVIII.*  
Scillam accipere oportet recentem, probe coactam, rufam & non ualde magnam, eamq; non, ut quidam faciunt, luto, sed fermento mundo integere, & in cacabos in quibus panes assantur inditam in furnū ut affetur immittere. Deinde extractā per ambitū purgare, & acceptis internis partibus tenerioribus eas ipsas probe terere, & farinæ eruinæ ex eruo rufo recenti factæ, duas tertias scillæ partes inspergere, ita ut erui quidem libræ sint duæ, scillæ uero tres. Quam aliquando ex æquo ambo commisceantur. Hæc ipsa inquam, unire ac committere oportet, indeq; paruos orbiculos formare, rosaceo oleo in his conformandis adhibito, deinde in umbra resiccare, atq; bis per singulos dies uersare.

*Hedychroi confectio. Cap. LXXXIX.*  
Ari, asari, amaraci, aspalathi, opobalsami, floris iunci odorati, calami aromatici, phu pontici, singulorum dra. x. xylobalsami, cinamomi, costi, cuiusque drac. xii. myrrhæ troglodyticæ, folij, spicæ nardi, croci, casia, cuiusq; drac. xxx. amomi drac. vii. mastiches drachm. v. uini ueteris odorati dulcis quantum satis est. Arida contundito & cribrato, crocum uero cum uino in pila diligenter terito, deinde myrrha & mastiche adiectis ac probe tritis, opobalsamum adijcito, ac arida inspergito, simulq; cōmissis omnibus pastillos tenuiores formato, uino in his conformandis adhibito: ipsos deinde pastillos in umbra refrigerato, singulisq; diebus uersato.

*Pastillorum theriacorum preparatio. Cap. xc.*  
Cæterū pastillos theriacos hoc modo apparato. Viperas foeminas accipito, nō quocūq; tēpore captas, sed desinente uere, nondū uero inchoata æstate. si uero uer diutius hybernū sit, iuxta æstatis principium, non ita diu post uergiliarum ortum, quēcūq; enim uiperæ prægnantes fiunt, eas uitare oportet, neq; ad confectiōem pastillorum adhibere. magis enim exasperatæ seipsis redduntur prægnantes. Ipsas igitur accipito quum in latibulis suis delitescere cessant, & de cætero in locos sub diuo egrediuntur, & non adeo malignum habent uenenum. intus enim delitescencia animalia, & calentis aëris ui minime percutis meatus resoluta, nocentiorē & magis exitiosam ueneni uim in se coaceruant. Sunt autem animalia ipsa subflaua, ingentia, & agilia: oculos subrubros habent, collum angustū, & latius caput, & caudam acuatim in tenuitatem abeuntem ac carne penitus nudam, uentrem autē sinuosiorē habent, & gressum circa caudæ summum firmant, caudā ipsam non circunvoluentia, sed magis contorquentia, & lētiū inambulantia. His enim signis foemina à mare dinoscitur, insuperq; quod quatuor habet caninos dentes, quum mas tantum duos habeat, & angustius caput, ac crassius collum, & totum corpus tenuius,

caudamq; paulatim in tenuem desinentem, non acuatim ut foemina, neq; omnino carne nudam. Cauere enim oportet ne mares uiperas in antidoti confectiōem assumamus. Neq; uero minus etiam reliqua serpentium genera uiperæ similia uitanda sunt. Similis est autem uiperæ maxime quidem ammodytes, imò & hæmorrhus, & cēchrias, & seps. Quos omnes ex prædictis in eorum tractatu signis dignoscere oportet, & præcipue ex colore. flauo enim & subfuluo colore uipera est, alia uero genera arenosi sunt coloris, aut fusca, aut nigricantia. Verum non oportet etiam prædicta de unoquoque signa alia negligere. Has sanè uiperas prædicto tempore eadem die aut præcedente omnino captas accipito. ac primum quidem ipsarum capita ac caudas amputato, in tantum sanè, quantum uideris in eis carne nudatum. At uero non amputationis tantum respectum habere oportet, sed & nū statim ex angustia & immobilia ac omnino mortua animalia appareant: talia enim ut inutilia ad antidoti compositionem censenda. Si uero prædictis partibus amputatis, motū quēdam uideris in reliquo corpore superstitem, & animalia ipsa cruorem aliquandiu in se conseruent, hæc ipsa ut optima in antidoti confectiōem sunt ammiscenda. Post hoc uero ipsorum pellem totam diligenter excoriato, adipēque ac omnibus pectori insitis ut inutilibus reiectis, carnes ipsas ex duabus aut tribus aquis lauato, posteaque in ollam puram inijecto, & cōgruentem aque mensuram affundito, ac anethi uiridis fasciculū addito, subiectis que lignis uitis coquito. Quod si effuerat olla, solet enim assidue in decoquendo aqua ebullire & ex olla effundi, quotiescūque hoc ipsum contigerit, frigidam aquā irrorato. Modum autem decoctionis sufficētem iudicabis, ubi carnes à spinis discessisse uidebis, penitus que separatas, ut ne quid ex ipsis spinis inhærens carnibus te fallat. Ad manum deinde peluim appositā habere oportet mūdā, & ex iusculo cocturæ aliquid cōtinentem, atque in eam ipsam depuratas carnes iniicere. facile enim resiccantur, & proinde difficulter conteri possunt. At uero ubi carnes ipsas puras feceris, ac manibus diligenter expresseris, eas poterato, & in pilam culinariam asperiorē coniicito, ac fortiter aliquandiu terito, paulatimq; iusculum instillato. Vbi autem quā tenuissime fuerint tritæ, panis purissimi recentis aridi non ex ueteri farina apparati contusi & cribrati, quartam carnū partem addito, aliquādo autem quintā solum: & rursus paulatim iusculi quod satis est affundito, ac in cōterendo quā diligentissime unito: atq; ita pastillos mediocres tenues formato, modico opobalsamo in his formandis adhibito. eosq; deinde in umbra siccato in domus superiore cœnaculo, ad meridiem, aut omnino ad septentrionē sito. Versare aut ipsos assidue oportet quo æqualiter resiccantur, & ne aliqua pars diutius humecta permanēs, putrefactioni obnoxia fiat, & periclitetur. Postquā uero sicciores fuerint facti, eos opobalsamo optimo oblinito, & in uitreo uase adseruato: ac quicquid puluerulenti & albi ex eis per sitū productū est post dies aliquot linteo extergito. perforantur enim, si id ipsum eis diutius adhærescat.

*De reliquis quæ in antidotū coniiciuntur. Cap. xci.*  
Cæterum simplicia pharmaca quæ cum tribus antea præparatis pastillis in antidoti confectiōem coniiciun



conſciuntur hæc ſunt. Paſtillorum ſcilliticorum drachm. xlviii. paſtillorum theriacorum, drachm. xxiiii. maſſæ hedychroi, drachm. xxiiii. piperis nigri drachm. xxiiii. opij Thebaici recentis, drachm. xxiiii. roſarum ſiccarum repurgatarum, drac. xii. ſcordij cretici, ſeminis buniadis agreſtis, cuiuſq; drach. xii. iridis illyricæ non corroſæ, drachm. xii. agarici pontici albi, drachm. xii. cinamomi, drach. xii. aut caſiæ duplum: ſucci glycyrrhiſæ ſicci drach. xii. opobalfami optimi, drach. xii. myrrhæ troglodyticæ drach. vi. croci cilicij drach. vi. zingiberis nõ perforati, drachm. vi. rhei pontici recentis, drach. vi. radicis quinquefolij, drach. vi. calaminthæ montanæ, drach. vi. comæ marrubij in uigore conſiſtentis, drachm. vi. cacuminum & foliorum ſtoechadis, drach. vi. petroſelini macedonici, drach. vi. coſti recentis, drach. vi. piperis albi, drac. vi. aut nigri loco eius drach. ix. piperis longi non corroſi, drach. vi. dictāni cretici, drac. vi. thuris maſculi integri & in partes non comminuti, drac. vi. floris iunci odorati, drach. vi. terebinthinæ chiæ, drachm. vi. caſiæ fiſtulæ, drac. vi. ſpicæ nardi, drach. vi. radicis gentianæ, drac. iiii. comæ polij, drach. iiii. ſtyracis calamitæ, drac. iiii. ſeſelis maſſilienſis incorrupti, drach. iiii. ſeminis thlaſpionis, drach. iiii. ſeminis ammi, drachm. iiii. comæ chamædryos drach. iiii. chamæpityos, drac. iiii. ſucci hypocyſthidis ſicci, drach. iiii. foliorum malabathri, drach. iiii. ſpicæ celticæ, drach. iiii. aniſi helladici, drach. iiii. mei athamantici, drach. iiii. ſeminis ſœniculi, drac. iiii. lemnæ terræ quæ ſphragis appellatur, drach. iiii. chalcitidis ſemiſſatæ, drachm. iiii. amomi racemi, drach. iiii. radicis acori, drach. iiii. phu pontici, drach. iiii. carpobalfami, drachm. iiii. hyperici in uigore conſiſtentis, drach. iiii. acaciæ liquidæ, drach. iiii. gummi uermiculati, drach. iiii. cardamomi drach. iiii. dauci cretici, drach. ii. galbani puri, drach. ii. opopanacis, drach. ii. ſagapeni perſici, drach. ii. bituminis iudaici, drac. ii. comæ centauræ minoris, drach. ii. caſtorij, drachm. ii. ariſtoloſchiæ tenuis, dra. ii. uini ueteris dulcis quātum ſufficit, mellis atticij deſpumati libras x. aut quod ſatis eſt.

*Modus conſciendi.*

*Cap. xcii.*

Apparatur autem antidotus hoc modo. Sex drachmas caſiæ, & alias etiam xxiiii. quæ cinamomi loco ſunt coniectæ, per ſe tundito ac cribrato. deinde crocum primum in pilam coniectum cum uino probe terito. atq; ubi quā tenuiſſimus factus fuerit, ei cribratam caſiam addito, ac rursus inſuſo uino terito, ubi uero caſia ſufficienter fuerit trita, lemniam terrā cum uino modico in alia parua pila per ſe terito, & asphaltum ſiue bitumen ſimiliter diſſolutum ad crocum & caſiam inſuſo, ac rursus aliquandiu terito. Reliqua uero omnia herbacei generis cum tribus paſtillis & cum caſtoreo tundito & per tenuiſſimum cribrum excuſito. ſucculenta autem omnia, acaciam inquam, myrrhā, opium, thus, hypocyſthidis ſuccū, & glycyrrhiſam, opopanaca, ſagapenum, galbanū & gummi contuſa, in competenti uini menſura una die antè macerato. ſtyracem uero in pilam magnam ac amplam coniectum cum opobalfamo terito, & priuatim unito. deinde & præmacerata ſucculenta in pilam inſuſo ac probe terito, atq; ſi opus fuerit, uinum paulatim affundito. poſtquam autē & hæc ſufficienter fuerint trita, ſtyracem antea tritum, & caſiā, &

crocum & quæ cum eis ſunt adſuſo, & diligenter unito. Chalcitidis deinde bonæ ſexuncem aut amplius in ollulam paruam nouam ampli oris inſuſo, et ſupra carbonem ardentem imposito, ac chalcitidem aſidue cum pura rudicula agitato. Quum uero liqueſcere cœperit, & lutoſam ſubſidentiam acquiſierit, ſtatim ab igne auſerto, poſitaque in terrā ollula quo uniatur diligenter agitato, coagmetatāq; paulisper ſinito. Deinde ablato & abiecto eo quod in ſuperficie ſiccior & ruſum apparet, ex medio quod uiridius eſt & molle apparet, accipito, ac quatuor drachmas ponderato, eaſq; in mediā pilā inſuſo, in qua reliqua prius trita habes, cum modicoq; uino in uno aliquo pilæ loco diſſolutas, cum reliquis cōmittito, ac modico addito melle deſpumato unito. Poſtquam uero chalcitis ad reliqua trita fuerit admixta, omniaq; nigrum acceperint colorem, tunc addito etiam terebinthinam cum modico melle prius diſſolutam. Qua deinde ammixta, arida etiam cōtuſa & cribrata adſuſo, & reliquum item mellis paulatim ammiſceto. poſtea cum magno piſtillo omnibus quā diligentiſſime unitis, antidotū ipſam in mortariū transfundito, & piſtillis ligneis ex grauiſſimo ligno & politiſſimo fabrefactis, eam ad ſolem expoſita in mortario tundito. deinde probe conſectā ſinito, & rursus poſt triduū aut quatrimum ad horas tres tundito, atq; id donec quadraginta trāſierint dies facito: deinde uas uitreis modico melle deſpumato prius imbutis excipito. neq; uero uasa ualde expleto, ſed locum quendam quo tranſpirare pharmacum poſſit relinquito. probeq; conſectū ac obligatum adſeruato. Hæc quidem igitur omnia ad pharmaci uirtutem ac conſeruationem ſunt deſcripta. Vt autem nigrum fiat, nõ ſcio quomodo in conſuetudinem uenerit, & ſanè quiſquis hunc colorem eius apparatu nõ adſequitur, is irridetur. Modus uero adſequendi omnibus in promptu eſt. Noſſe tamē operæ precium eſt ex colore pharmaci, uim ipſius minime permutari. Quod uero circa colorem pharmaci offendamus & delinquamus, ob chalcitidem eſt plus iuſto uſtam. ſi enim paruum ſuperuratur rubicundiorẽ antidoti colorem reddit. Si uero amplius, non rubicundiorẽ, ſed à naturali parum immutatum facit colorem. Per menſem porro antidotū ipſam uſitare oportet, & rudicula munda agitare, ne id quod in ſuperficie eſt, & quod uas cōtiguū adheret, exareſcat. Cæterum tempore ad concoctionem non modico opus habet, quo matura uſui antidotus fiat, & iuſte concoquatur. Vt plurimum uero per duodecim meſium tempus coadunatur, & cōcoquitur.

*Poſt quantum tempus ea ſit utendum. Cap. xciii.*

Qui uero ipſa magis uigente & ualidiore uti uolunt, etiam poſt unum menſem ea utuntur, præſertim ad eos qui à uenenatis beſtijs demorſi ſunt, & à uenenoſis pharmacis infecti. hi enim quā grauiore malo urgeantur, potentiore etiam ab antidoto auxilio opus habent.

*Quanto tempore efficax ſit.*

*Cap. xciiii.*

Eſt autem pharmacum ualidum inquit Galenus, uſq; ad xxx. annum in hiſ affectionibus in quibus non tanta eſt nocentis cauſa. Quod ſi uero per tempus ſiccior fiat antidotus, eam in mortarium coniectam & piſtillo tritam, optimo melle deſpumato affuſo, rursus unire ac excipere oportet, atq; id quotieſcūq;

L

aridior

*ex gal. p. antidot. x*



aridior facta fuerit, faciendum est.

*Modus probandi theriacen.*

*Cap. xcv.*

Multi igitur ipsius potentiae probandae accognoscendae gratia, aliquod purgatiuum pharmacum prius exhibent, deinde ab eius acceptione antidotum bibendam praebent, atque hoc modo eius iudicationem per comparationem quandam faciunt. Si enim ualida & uigore efficax fuerit, purgationem fieri minime permittit, sua uel exuperans pharmaci purgatiui facultate. Si uero aequae purgetur homo, ueluti si antidotum non accepisset, manifestum sit eam inuolidam & exilem esse, ut quae retinere non potuit purgatiui medicamenti fluxum. Quidam uero papaueris succum duorum scrupulorum pondere aqua dissoluunt, eumque cani aut gallinae uel columbae bibendum praebent. Deinde etiam confestim antidotum dissoluunt, ex eaque nuntis ponticae magnitudinem ori animalis infundunt, neque quicquam mali inde comitatur.

*De exhibitionis mensura, et utendi modo, et in quibus conueniat morbis.*

*Cap. xcvi.*

Ceterum facultatis eius mensura non eadem in omnibus hominibus existit. Sicut neque liquor idem est, in quo dissolutam ipsam exhibemus. In uenenatis namque pharmacis, aut uenenum iaculantis animalis plaga, nucis ponticae magnitudine in uini cyathis tribus dissolutam bibendam praebemus. In alijs autem affectionibus tum mensura, tum liquore diuersimode utimur. Secundum affectionum enim diuersitatem, etiam pharmacorum quantitatem competenter metimur, & conuenientem similiter liquorem eligimus. Non enim solum ad bestiarum morsus & uenena a natura sua auxiliatur, sed & ad alias magnas affectiones auxiliare pharmacum per usus experientiam a nobis inuentum est. Capitis igitur dolores diuturnos & uertigines sanat. Auditum grauem & uisum obtusum potu sedat, quandoque & gustus organum debilitatum emendat, & comitiali morbo auxiliari consuevit. Auxiliatur & suspiriosis, & qui orthopnoici dicuntur ex aqua mulsa potata, diffecis & attenuas ac facile eductiles reddens coactos & uiscosos humores. commodat ueteri ac recenti tussi, & quibus pectoris aut laterum partes dolent, magnitudine fabae, febre carentibus ex uino mulso, febricitantibus ex aqua mulsa. Conuenit & sanguinem per spurum reicientibus siue ex pectore, siue ex pulmone eductio fiat, siquidem recens sit elatio cum posca, inueterato autem malo ex aquae cyathis tribus, praestiterit autem aqua ipsam radicis symphyti decoctum esse. Datur autem fabae aegyptiae magnitudo ad noctem & mane. Sepe uero & stomachi uitia curauit, & fastidium eius, ciborumque inappetentiam in eorum desiderium & appetentiam suauiter commutauit. Quin & uentriculi difficilem concoctionem & imbecillitatem corrigit, similiterque & stomacho inflatos, & intestinis tortos, aut colum dolentes placat. Aliquando autem & cholericae affectioni praeclare auxiliatur, corporis miscellam corroborans, & plerasque cohibens fluxiones. Maxima uero eius efficacia in his qui ex oris stomachi morsu animo linquntur, cardiacos Graeci appellant, apparet. praemultis enim & assiduus sudoribus corpore diffluente, & uiribus exoluto, quum ex uini potu sepe nihil opis sentiant, antidotus ipsa potu sudores sistit, & uires concidentem uelut erigit ac fortiores reddit. Lumbricorum etiam omne genus mirabiliter

liter ex intestinis exigit, & hepaticas omnesque inueteratas affectiones saepe curat. Arquatum item morbum ex aliqua hepatis affectione obortum strenue sanat. Quandoque & induratos lienes liquefacit, sordibus eorum & superflua substantia paulatim consumptis, atque hoc cum aceto mulso data praestabilius facit. Deterit & lapides renum, omneque terrenum & sordidum ex illis repurgat cum decocto petroselini, difficilem item mictionem uesicae compescit, & in ipsa ulcerationes quandoque per sanat. Laudatur & ob id, quod omnem insultum diuturni rigoris & algorem tollat, bilisque uomitum accessione exacerbatum tempore aliquando concomitantem sedet. Maxime uero quartanis conducit, si quis ea ingeniose utatur. Ego igitur, inquit Galenus, multos quartanarios hoc ductu usus facillime liberaui. primum quidem eos per uomitum a coena euacuaui. Deinde sequenti die mane abstinentiam cremorem exhibui, atque ita duabus horis ante accessione antidotum ipsam dedi: & mirabiliter adeo sepe successisse noui, ut confestim nulla accessione qui accepisset, impeteretur. Verum utendi tempus non in principio morbi est, sed quum perfecta concoctio in urinis apparet. Etenim si in principio morborum siue ipsa, siue aliud pharmacum praebetur, congeminat morbum. Datur & hydropicis cum sisari decocto & similibus, & eam praesertim quae aqua intercutem & Graecis leucophlegmarias appellatur, generose iuuare consuevit, per totum corpus digesta & distributa, atque undique ex carnibus exprimens humorem. Quapropter etiam his qui malo corporis habitum praediti sunt, optimum pharmacum existit, & elephantiasim saepe curare solet, corruptionem corporis fieri prohibens. Et rigore neruorum conuulsis plurimum auxiliatur. Et membrorum resolutiones in potu accepta saepe per sanauit. Credita est & foeminae menstruas purgationes ciere, & immortuos foetus eicere, quos natura propter debilitatem expellere non potest. Danda itaque eis ex passo aut aqua mulsa magnitudine fabae, ruta tamen aut dictamno in praedictis liquoribus decoctis. Podagra etiam affectis & articulorum omnium fluxione infestatis opitulatur, maxime quum augmenti tempus praeterierit, & status acuminis institerit. doloribus enim sedatis per ea quae eos mitigare possunt, antidotum in potu praebere oportet. Illatos enim fluores consumit, & alios inferri impedit. Maxime autem profuerit si sani adhuc ipsam accipiant. Superfluos enim humores expendit & totam corporis miscellam permutat. Multi igitur in principio podagrae per assiduum eius potum perfecte ab affectione sunt liberati. Admirari porro subit antidotum, quum ipsam non modo corpori medentem uidemus, sed & ipsum animum saepe ab affectibus male dispositum iuuare potentem: Extrabile enim obortos animi affectus ipsa sedat. Etenim assidue exhibitum pharmacum ex uenis & uicinis partibus atram bilem uelut exhaurit & consumit, quemadmodum etiam ex ferarum ictu illatum uenenum. Quin & aquae formidine pessimum morbum, quo a cane morsu laborat, saepe tollere consuevit, atque ita mirifice tantorum malorum concursum impugnat. Cognita est praeterea nobis antidotus, ut quae in pestilentibus constitutionibus peste apprehensis unice auxiliari potest. Eos uero qui eam praebuerint pestilenti affectione apprehendi prohibet. Ipsa enim uelut



uelut temperamentum quoddam & sanam constitutionem corporibus inducit, redundantes humores consumendo, & refrigeratas partes concalescendo, insuper & innatam facultatem corroborans, ad naturales actiones probe obeundas. Cæterum in peregrinando maxime cōsulo ut ea utaris, quum frigiditate aëre per hyemem iter facis. Est enim ueluti bonum uiscerum indumentum, quod plurimam caliditatem ipsis exhibere potest. De Mithridate sanè magno illo belli duce referunt, quod theriacem quidem non biberit, neque enim adhuc in usu erat; uerum ex alterius antidoti, quæ postea Mithridatica ab illo appellata est, usu, ita corpus apparauerit, ut nulla ueneni uel lædi posset, & quum etiam letale pharmacum acceperet, mori non posset. Quum enim ab hostibus uinceretur, seipsum interficere urgebatur, quando plurimo ueneni haustu mori sibi cōsciscere nequiuisset: Quapropter uocato quopiam ex amicis ei iugulum præbuit. Quare uides multæ mixturæ pharmacæ multam etiam uim habere, quo corpora ex eorum usu corroborata, nullis ueneni affectionibus uel raro & difficulter admodum obnoxia reddantur, atque hac facultate uel in primis theriacem præditam esse constat. Porro tempus exhibitionis commodum est, quum probe concoxerit, ipsam accepturus, neque ciborum copia sit oneratus. Bibat autem ieiunus, quo sufficiens temporis interuallum supersit ad ipsius pharmaci concoctionem. Anni præterea tempus, simulque regionem inspicito, in quibus ipsum es exhibiturus. Aestate enim neque in totum dabis. Quapropter etiam eis qui in ætate uigoris sunt, & plurimum habent naturalem calorem, neque multum, neque sæpe pharmacum ipsum exhibere moneo: Quæ admodum contra eis qui iam uergente & adfecta ætate sunt, tum plurimum, tum sæpe cum aqua, quam potius cōsulam ut cum uino accipiantur. In pueris uero pharmaci exhibitione omnino uitare oportet: Maior est enim pharmaci facultas quam uires eorum tolerare possunt, & corpus sanè facile dissoluit, & insicū spiritum cito extinguit: Quemadmodum & lucernæ flammam oleum ipsum, si ignem superer, facile extinguit. Atque ego uere id narrare possum, inquit Galenus, puerum quendam ab intempestiuo antidoti usu exolutum esse. Omnē namque ipsius habitum pharmacum ipsum dissoluit, & uentrem fluore commouit, atque ita noctu puer expirauit. Quod si aliquando calidiorē regionē inhabites, uitare oportet antidoti usum, sufficiente tibi illius loci aëris calore. Vnde neque hominibus qui sub primo solis ortu habitantes calidissimi sunt, & multum habent illius regionis calorem, antidotum theriacē cōuenire puto.

*Sales Theriaci ex libris Martiani, cum quibus consentit Galenus.* Cap. xcviij.

Sales ex uiperis hoc modo apparantur. faciunt autem & ipsi ad omnia prædicta moderate, per assiduum usum commoditatem exhibentes: quanquam sint qui eorum auxiliarem potentiam penitus negent, per exustionem dissipari affirmantes ferarum facultatē. Ego uero dicere ausim, eandem quidem potentiam cum theriaca sales non habere, non tamen eorum uim per ignem perire, quum multa sint quæ per ignis familiaritatem meliora reddita conspiciantur, uelut est aurum, & calx, & similia. Viperae enim integræ uisæ intensiorem & malignam uim per exustionem

deponunt: Temperamentum autem auxiliare & symmetriam ab igne sumunt. Proprie autem in affectionibus cutis curandis sales commendantur, cuius generis sunt leuce, lepra, impetigo agrestis, elephantiæsis, alphas, scabies agrestis, & raritas ac defluuium capillorum. huiusmodi enim cutis uitia confestim delent, & acria recrementa subter cutem redundantia optime discutunt. Plerisque enim ex eorum usu sudor prolicitur, atque ita per exudationem corrupta substantia euacuatur, adeo ut quidam in principio pediculos excluderint intra XIII. ad summum dies: post hos enim nullus in corpore pediculus apparet. Quidam uero pro pediculis sputa pituitosa reieciunt à salium reiectione initium facientes, deinde paulo post etiā sputa repurgata sistuntur. Licet autem tum in prandio, tum in coena eis uri, cum quibuscunque edulis eos accipere uelis, neque ultra ad eorum acceptionem prouocare oportet. Tanta enim ipsis insita suauitas est, ut magis uoluptatis gratia eos cōfectos quis dicere possit, licet igitur usque ad III. cochlearia per diem ex eis sumere, maxime si cibus prius in uentre sit probe concoctus. Qui enim eos accipiunt, concoquunt melius & cibi appetentiores fiunt, floridius etiam corpus habent, & sensus omnes uegetiores. Suffusiones igitur incipientes & nondum congelatas egregie dissolunt, neque plane quis suffusionem incurrat qui eos quotidie accipiat. Purgationes ite lunares propter obturationem aliquam aut sanguinis coactionem suppressas cient. Idem etiam largum & impetuosum mensium defluxum sistunt. Quisquis autem eos præsumpserit omnes uenenorum, & uirus iaculatum bestiarum insidias euincet: neque etiā quum infectus fuerit, & postea statim sales acceperit, periculum incurret, maxime si corporis sui temperamentum per horum salium usum multo tempore appararit ac ueluti condierit, quemadmodum Mithridatem fecisse dixi. Præstat & pestilenti constitutione instante ad auxiliare hoc & mali depulsorium pharmacum confugere, præsertim si ei myricæ herbam ammiscueris. Morborum præterea omnium medicinales sales existunt, maxime tamen eorum qui in renibus consistunt: lapides enim in eis atterunt, & plane marcidus renes restitunt. uertigini uero & dolori capitis inueterato, morboque comitiali nulla alia consimilis medela exhiberi queat, si quis eos per integrum annum ex ordine large sumat. Noui & arquatos diuturnos, & splenicos, ac colicos, qui frequenter hanc affectionem inciderunt, per eos sanatos, hydropem etiā maxime subter cutem per eorum usum resiccai & ingentem famem, bulimon Græci dicunt, dissolui. Ut quis etiā per frigidum aërem iter faciens minus frigore lædatur, comesti faciunt. Rigores autem per circuitum repetentes diuturnos cohibent, & tusses humectas resiccant. Tabidos uero iam mirabiliter ad bonam corporis habitudinem reducerunt paulatim edulis adpersi: Exolutos autem à languore perfecte reuiuiscere faciunt. Scio namque plurimos membrum penitus resolutos per ipsos sanatos. Ad podagrā demum maxime incipientem, & omnino ad omnes articulares morbo affectos unicū hoc edulium cōstructū esse uidetur. Adhortor igitur eos qui à podagra liberati sunt, ut eis continue utantur. Quidam uero uiperas rotas extēdunt & siccant, posteaque terunt ac eas in potu contra morbum articulorum exhibent. Cæterum



uix satis dignis uerbis assequi queas, quantum diuturnas quartanas & deliria ex atra bile oborta dilatent & remorentur, si ante accessiones, & in interuallis quoque sumantur. Enecat ite omne lumbricorum genus. optimum est etiam per ipsos maxime crassiores, dentes confricare. Non enim albiores tantum eos reddunt, sed neque dens postea laxior factus mouebitur, neque erodetur, neque stuporem incurrit. Extrahunt etiam per caput recrementorum copiam, ac caput purgant, & oculos leuiore reddunt. Apparatur autem hoc modo. Vi peras accipere oportet magnas, eiusmodi quale praediximus specie eodemque tempore captas, numero quatuor, non ultra biduum postquam captae sunt adseruatas: sed si fieri potest, eadem qua captae sunt die, easdem in ollam figulinam puram magnam coniungere oportet, statimque supra ipsas pro sale ammoniaco, salem communem lotum & exiccatum iniungere, praestiterit quidem ammoniacum salem esse, si uero haberi non possit, communis & albi italici modum dimidium, hoc est lib. x. iniicito, atque id non in meridie facito, sed mane. Tunc enim rigentes adhuc bestiae ad motum tardiores sunt. Quod si phagi etiam arboris ramulo uiperas caedas, ad motum ipsas tardiores reddes, & mirabile eis soporem induces. Est autem phagus species quercus. Quum igitur uelut dictum est, uiperas salibus grauatis & oppresseris, pastillos insuper ad sales adijce hoc modo apparatus. Radicis gentianae, sesquilibram, aristolochiae rotundae sesquilibram, comae cetaureae minoris lib. ii. seminis cardamomi lib. ii. marrubii, scorodii, apii, chamædryos, seminis rutae hortensis, singulorum lib. i. Haec omnia in crassas partes contundito, & cum attico melle subacta in v. aut vii. pastillos latiores, quo probe exuri queant, reducto. Hos equidem pastillos eo quo dixi modo preparatos habens ad sales uiperis uiuis iniectiones imponito. Deinde scillas electas, magnitudine sua manu explentes, recetes v. in tenues partes dissectas pastillis superindito, aliumque dimidium modum Italicum, hoc est x. libras alias salis supra scillam & pastillos iniicito, & deinde ollam operculo tria foramina habente obturato, eamque forinsecus totum figulino, ut si rumpatur, nihil pereat, oblitito. Indeque sensim igni adhibeto, paulatimque circumlitum lutum torreto, deinde aucta flamma per ficulneorum aut uitis lignorum ollae subiectionem exustione, uaporem inde per foramina elatum obseruato, primum enim fumus multus caliginosus & turbatus ualde exigens apparebit, significationem perhibens, quod ignis iam feras ipsas contingit. Quo tempore diligenter cauere iubeo, ne quid ex illo fumo per respirationem haurias, aere nimirum per ferarum exhalationem infecto, deinde ubi cessauerit uapor, & flammam quandam exilem per foramina conspexeris egredientem, tunc sane quam optime assatas putato, atque ita olla ab igne ablata, perque diem ac noctem refrigerata, uita per apertam ollam eximito, & cum subscriptis tundito. Sunt autem haec. Seminis rutae syluestris dodrantem, hyssopi dodrantem, nardi celticae sexuncem, stachyos sexuncem. Est autem marrubio similis, non tamen spinosa planta seu frutex, seminis foeniculi montani sexuncem, petroselinum macedonicum trientem, comae origani dodrantem, seminis hormini tosti dodrantem, racemi amomi quadrantem, cacuminum thymi dodrantem. Foliorum malabathri trientem, carniuium iuniperorum baccarum lib. ii. seminis corian-

dri sexuncem, piperis longi lib. ii. radicis silphii uncias xvii. zingiberis non corrosi lib. ii. seminis satyrj quadrantem. Quidam uero radicis satyrj coniungunt sexuncem, pulegij montani sexuncem, seminis menthae sexuncem. Aut si haberi non possit, herbae siccae sexuncem, tordylii & casiae cuiusque quadrantem, seselis malsiliensis sexuncem, cinamomi unc. i. Maxime mopere autem conandum est, ut crassiora ueluti sunt lignosa omnia contundendo attenuentur, neque quicquam ex eis reijciatur. Tusa autem per angustissimum cribrum excutito, bis & ter per eadem cribrella excutiedo, quo quam optime uniantur, atque ita omnia in uitreis uasculis reponito, neque statim uitior, sed post quadragessimam tandem diem. Inueteratum enim pharmacum maiorem commoditatem de se prebet, maxime si extra omnem humiditatem ipsum siccum adseruaueris. Ceterum colore non ualde nigrescit. Ego uero, inquit Galenus, bestias ipsas non exuro, sed pastillos ex eis, quorum confectionem in theriaca docui, reliquis quae cum bestiis uruntur ammisceo, & simul exuro, quo eam quam in se habet amaritudinem, per exustionem abijciat, tantam autem pastillorum mensuram adijcio, quantum coiectura assequi possum quatuor numero uiperas habere, & sane sales uere optimi euaserunt, utpote qui neque ex ustione cinerum retulerint saporem, neque nigrum colorem, sed & ob qualitatem usui gratissimi sint facti, & qui uim qua eos proprie praestare praedicaui efficacior habent. Efficiunt autem quatuor uiperarum magnarum, pastillorum siccorum sextantem & unciae dimidium. Atque hic quidem est totius confectionis salium theriacorum modus. Oportet autem medicum uarie ipsis uti: utpote si sanguinem spuentibus sales hos exhibiturus sit, radicis symphyti contusae & cribratae sextam partem ad salis modum addet, ueluti si quinque cochlearijs pharmaci unam symphyti addat. In phthisicis autem siue tabe factis & pectore suppuratis, iridis tenuissime trite aut dictani sextam partem salis ponderi adijciat. Hepaticis uero chamæpityn, splenicis cyclamini radicem, aut capparis corticem, aut piperis addet sextam partem. Quod si ad podagricos apparare uelis, dimidium praescripti ponderis satyrj auferto, uitando ne rabiofas & membra exoluentes in ipsis excites uoluptates. Ceterum in renibus lapides quam maxime atterunt sales, si carpobalsamum, aut lithosperma appellatum habuerint ammixtum. Si uero uim contra uenena intensiore facere uelis, in salium confectione scordiū & marrubiū duplicabis, insuperque anatum sanguinem siccum adijcies. Eis uero qui a rabido cane morfi sunt, amplius conferent, si paeoniae radicem addas aut caneros exustos. Opisthotonicis autem qui retro neruis conuelluntur, maxime profuerunt, si castorij & opopanax parum habeant admixtum, in eis sane qui id tolerare possunt. Visum porro exacuit malabathri folium duplato pondere in confectione additum. Concoctionem uero ciborum iuuant si casiae & costi eis sufficiens modus addatur. Ad inflationes autem cuminum adijcitur. Vrinam amplius ciet dauci semen additum. Quartanas uero amplius soluant, si uerbenacam rectam, & eupatorium, & succum cyrenaicum, aut ipsum laser adsumant. Verum ut summarim dicam, Omne quod commodum & habile noueris affecto membro, id ipsum ad sales, siue in ipsorum confectione, siue exhibitionis modo ammisceo. Quin & amariores scio sales appa-



ros. Ex his enim quæ cum uiperis uruntur aristolochiam, & scordium, & cardamomum, & dimidium centaureæ detraho, eadeamq; postea cū reliquis quæ tunduntur misceo, imò & stœchadis parē scordij mēsuram addo, atq; ita gustū amariores sales euaserūt, & in usu sanè ad multa mihi commodiores sunt experti. Porro cauendum est ne eos prægnantibus & ab ubere lactantibus exhibeamus. Et ne pueris, ac tēperamento calidioribus, & præsertim tempore æstiuo, & regione calida, & qui acuta & sicca febre laborant, eos quoquo modo præbeamus.

*Antidotus Mithridatica.*

Cap. xcviij.

Hæc ut Antipater & Cleopater tradūt, ista capit, Myrrhæ drachmas vii. obolos iiii. spicæ nardi tantundem, croci drachm. vii. obolos iii. opij drach. iiii. obolos ii. & dimidium, styracis drachm. v. castorij drachm. vi. obol. i. cinamomi drachm. xvii. polij drach. v. scordij drach. xvii. zingiberis tantundē, costi drachm. xvi. piperis albi drach. v. obol. i. piperis longi drach. xvi. seselis incorrupti drachmas v. obol. ii. petroselini drachmas xiiii. seminis dauci drachm. xvi. casia drach. xv. thuris drach. xvi. succi hypocisthidis drach. vi. & sesquibolum. nardi celtici drac. iiii. seminis fœniculi drac. iiii. folij malabathri drac. iiii. acori incorrupti, phu, sagapeni, carpo balsami, hyperici, iridis illyricæ, acaciæ, gummi, seminis cardamomi citra medullā, seminis pelecini, singulorum drach. ii. lemnia sphragidis, confectiois cypheos, partium scinci iuxta renes sitarum, singulorum drach. ii. seminis thlaspios drach. xvi. gentianæ dra. iiii. anisi drach. iii. rosarum siccarum mundarum drac. iiii. mei drach. iiii. florum iunci odorati drach. vi. opopanax drachm. vi. galbani drach. vi. obol. iii. opobalsami drachmas vi. obol. iii. aristolochias drachmā i. hyssopi drach. iii. marrubij drac. i. chamæpityos drachm. iii. rosmarini drach. v. terebinthinæ chiæ drach. vi. obol. iii. mellis atticī despumati quantū sufficit. Vinū ne addas, sed prædissolutis melle calido succis, indeq; tritis ac adiecta terebinthina, inspergito sicca contusa & angustissimo cribro excussa. Vnitoq; & reposito omnia. Datur drachmæ pondere, aut ad summum siliquæ xxiiii. ex ea exhibentur.

*Confectio Cypheos.*

Cap. xcix.

Cæterum Cypheos, quæ in antidotum coniicitur, descriptio hæc est. Vnæ passæ tenuis ac pinguisimæ de tracta pellicula & uinaceis, hoc est, ipsius carnis drachmas xxiiii. terebinthinæ ustæ drachm. xxiiii. myrrhæ drachm. xii. cinamomi drach. iiii. floris iunci odorati drachm. xiiii. croci drac. i. bdellij drach. vi. onychos, hoc est, unguis aromatici drach. i. aspalathi drach. ii. & dimidiam, spicæ nardi drachm. iii. casia drach. iii. cyperi drach. iii. & dimidiam, baccarum iuniperi magnarum drac. iii. & dimidiam, calami aromatici dra. ix. Mellis quantū satis est, uini odorati parum. Myrrham, bdelliū, & terebinthinā ustam contere cum uino ut mellis crassitudinem induant; deinde unā passam per se probe tritam adijce, simulq; tritis mellis sufficere modū infunde, ac reliqua insperge, pastillisq; inde formatis utere. Vritur autem terebinthina hoc modo. Terebinthinam conijce in ollam, & triplum aut etiā amplius aquæ infunde, & ad ignem adhibe, nihilq; omnino mouendo coque, ubi uero consumpta fuerit aqua & te-

rebinthina attenuata ac inualida reddita, ut digitis confringi possit, eam tolle atq; in antidoti confectio nem assume. Si uero insumpia aqua adhuc mollior appareat terebinthina, aliam aquam superfunde, rursumq; ad ignem adhibe, donec friabilis reddatur. Datur autem cyphi ipsum & per se commode his qui hepar aut pulmonem, aut rhenes, aut aliquod aliud uiscus exulceratum uel obturatum habent.

*De antidoti Mithridaticæ usu.*

Cap. c.

Datur itaq; ad summum ex præscripta antidoto Mithridatica nucis pōticæ magnitudo. Eis uero qui ad integram ætatem peruenerunt Græcæ fabæ. Augetur autē & minuitur hæc magnitudo in medijs ætatibus. Atq; his quidē qui febre carent ex uino danda est, aut uino mulso, aut cōdito, si quidē hepar habeāt obturatum, febricitantibus uero ex aqua, aut aqua mulsa. Facit enim ad antiquas stomachi fluxiones itemq; thoracis, & ad omnes inueteratas in profundo corporis exulcerationes aut abscessus: facit ad tabidos, & ad uentris inflationes. Et coeliacis medetur, & reducit obtusum appetitum, & bonum colorem corpori addit. Frangit lapides, sanat urinæ difficultatem & atram bilem congregari uetat: fœtus immortuos expellit, & ad alias item affectiones conueniens est. Acuit uisum eorū qui eam accipiunt, plurimam autem præsertim præsumpta uim habet, quod non permittat quempia à letali ueneno ledi, qua gratia etiam à Mithridate composita est & appellata.

*Antidotus Esdræ aut prophetae Doctoris.*

Cap. ci.

Amomi scrup. xii. floris iunci odorati drachmas ix. pyretri drac. vi. croci scrupulos xxxvi. cinamomi scrupulos vi. aut casia duplū, myrrhæ troglodyticæ scrup. xii. styracis calamitæ scrupu. xviii. petroselinis scrup. iii. seminis dauci scrup. iii. tragacanthi scrup. vi. succi hypocisthidis scrup. ix. iridis illyricæ incorrosæ scrupulos xv. seminis fœniculi scrupulos vi. bdellij scrup. ix. thuris drach. i. sulphuris uiui scrup. vi. seminis hyoscyami albi scrup. xxvii. casia scrup. ix. seminis papaueris scrup. xxx. spicæ nardi scrup. xii. seminis rutæ scrup. iii. seminis ocymi scrup. iii. rhois culinarij scrupulos lv. seminis anethi scrupulos vi. asari drach. i. seminis cardamomi reiecta medulla scrup. vi. opij scrupulos xxvii. euphorbij scrup. vi. piperis scrup. xxx. rosarum siccarum scrup. ix. folij scrupulos xii. opobalsami scrupulos xxiiii. uentris mergi scrupulos vi. laccæ scrup. xii. lycij indicis scrup. xii. cariophylli scrup. xii. stercoris reperi in aluo mergi scrup. vi. rhei pontici scrup. xii. mei athamantici scrup. vi. floris nerij scrup. iiii. & dimidium, terræ cimolizæ scrup. xii. succi artemisizæ scrup. uiginti, foliorum seridis scrup. ix. spicæ celticæ scrup. xii. rosarū rhododaphnes scrup. vi. aliq; etiam castorij scrup. xii. uerum tu castorij scrup. iii. conijcito. costi scrup. duodecim, gentianæ scrup. xii. confectiois hedychroi scrup. ix. anisi scrup. vi. lisonis scrup. xviii. ammoniaci thymiamatis scrup. xii. Quodque & foliorum citri scrup. duodecim, uini ueteris odorati quantū satis est: mellis despumati primarij libras v. uel vi. Apparatur autem hoc modo. Arida omnia cū croco & castorio ac hedychroo tūdito & per angustissimum cribrū excutito. Opium uero, myrrham, hypocisthidem, bdelliū, lycium, ammoniacum in uino macerato. Tragacanthum autē per se macerato. Sequenti deinde die rosas rhododaphnes



& serin terito ac unito, & tragacantho similiter probe trita reliqua trita adijcto, & cum succo artemisiae unito, mel quoque despumatum & tepefactum saepe instillato, ne tragacanthus exarescat. Deinde & arida tusa inspergito, sufficienterque unita probe cōtegitur: in sequentibus uero diebus septem aut nouem in sole terito, & uasis uitreis excipito. Neque tamen uasa expleto, sed locum respirationi reliquum facito.

Ufus eius est ad uenenum iaculantium animalium plagas, datur autem fabae magnitudine ex uini cyathis duobus mane & ante somnum eodem modo. Illinitur & plaga, eamque à periculo uindicat. Eis uero qui letale uenenum hauserunt post uomitus & ante, nucis ponticae magnitudine datur, mane & ad somnum cum uino. Praesumpta etiam ueneno uim laedere admittit. Ad capitis porro dolorem eam in sapa diluta fronti illinito. Dato & ad somnum phasioli magnitudine modica aqua & sapa dissolutam. Furiosis uero ante somnum datur fabae magnitudine ex sapa diluta: dissoluitur etiam cum sapa, & toti fronti & inter supercilia illinitur, per omnem item foris nasum ante somnum, maxime enim somnum inducit. Ceterum ad oculorum inueteratas fluxiones sapa liquefacta ad frontem usque ad supercilia illinito. Ad molares dentes erosos, itaque ad dentium dolores cum sapa liquefacta & calefacta ore detinenda prebe, & confestim quiescet dolor. Ad tussim uero diurnam & spirandi difficultatem ac orthopnoeam datur nucis ponticae magnitudine non febricitantibus cum aqua frigida, febricitantibus cum aqua mulsa. Datur autem ex ordine per dies septem ante somnum. Ad tabidos uero subcruenta expuentes & eos qui abscessum internum habent, fabae magnitudine dato cum sapa modica frigida aqua diluta. Dato, autem ad plures dies mane, & ante somnum, & sanabitur affectio quantumuis sit diuturna. utere igitur neque eam cōtemnit. Porro ad diuturnos stomachi dolores ex frigidityte obortos cum sapa cyathis tribus, magnitudinem fabae dato ante somnum: si uero febricitent, cum aqua mulsa. Ad singulum uero ob repletionem aut frigiditytem datur fabae magnitudine ex aqua mulsa ante somnum. Ad hepatis obturationes fabae magnitudine cum cōdito. Ad duricies uero cum aqua mulsa. Ad splenicos ex aceto aut aceto mulso. Arquato infectis ex uino mulso, hydropicis ex aceto mulso aut uino mulso, illinito etiam cum antidoto tumefactas partes, & tumorē reficcabit. è lapide laborantibus datur cum sapa: ad urinae difficultatem cum apij decocto, aut petroselinij aut aliquo consimili. Ad profluuium ueteris & coeliacis & dysenteriae maxime incipienti, nucis ponticae magnitudine dato, mane & ad somnum ex uino, in febricitantibus ex posca diluta confidenter utitor. Ad podagrā fabae magnitudine praebeto cum aqua mulsa. Eliquatam etiam cum sapa affectis locis illinito. Et si quidem principium fuerit affectionis, liberabitur ac euadet. Si uero diuturnum fuerit malum, magnopere iuuabitur. Ad coxendices affectos & reliquos articulos corporis fluxione infestatos, eam cum unguento aliquo, gleucino puta, aut irino, aut sicyonio eliquato, ac articulis illinito. Ad Elephantiasim in principio praesertim, imò & his qui iam malo oppressi sunt, nucis ponticae magnitudine ex aqua mulsa bis per diem dato, eliquatam etiam cum uino toto corpori per nouem ex ordine dies in sole illinito: disce

dit enim paulatim à corpore cutis & ueluti squamulae decidunt, & tota concretio & corporis miscella renouatur. Ad aegre parietes mulierculas ipsam per se ad imum uentrem illinito, & facile partus prodibit. Ad ulcera postremum maligna, & diuturna in cutis superficie oborta, uestis detritae panniculo exceptam imponito.

*Antidotus pæonia.*

Cap. cii.

Antidotus Pæonia uere pæonium pharmacum multo usu iudicatum & approbatum. Amomi scrup. xviij. croci scrupulos x. radice pæoniae scrup. xii. seminis pæoniae scrup. xii. piperis albi scrup. ix. piperis communis scrup. xii. phylli scrup. ix. euphorbiae scrup. ix. spicae nardi unc. i. rhei pondici scrup. xii. costi scrup. xii. petroselinij scrupulos xliij. opij scrup. xv. seminis hyoscyami albi scrupu. xii. alij scrupulos xviij. habet, styracis primarij scrup. ix. myrrhae troglodyticae scrup. xii. casiae unc. i. pyretri scrup. xii. thuris scrup. xviij. castorij scrup. vi. calaminthae scrup. ix. mellis despumati quod satis est, itaque uini, Opij, myrrhā, thus, cum uino terito: styracem uero cum modico melle liquefactum similiter probe terito, atque eis unito: adiectisque aridis tritis melle excipito ac utitor. Dantur ex ea siliqua iii. cum aqua calida ieiunis, frequenter etiam ante somnum prout res urget. Facit autem ad destillationes è capite, & tusses, purisque refectiones, tabidos, peripneumonicos, pleuriticos, praeter opinionem enim thoracem extra periculum sistit, tum quod à destillationibus, tum quod ab ulcerationibus imminet, etiam si sanguinem relectent. Ad anginam uero uino mulso diluta utere assidue gargillando, pinnulaeque etiam cum melle illini. Ad colicos autem & ex renum lapide affectos excellenter efficax existit. In exacerbationibus enim colicorum febre carentium exhibita euestigio dolores sedat. Si uero febrili, remissiones febriles obseruato, atque ita exhibeto. Frangit enim calculos, & ab urinae difficultate liberat ea praesertim quae ex crasis humoribus & propter obturationem est oborta. Infunditur etiam & maxime in ipsis colicis uehementissimis urgentibus doloribus cum oleo rutaceo, & statim à periculo liberat. Longas autem febres maxime quotidianam & quartanam facile soluit duabus ante accessionem horis data. Quin & aegros ad reficienda corpora optime apparatus fecit. Datur autem non in principio morborum, sed quum perfecta cōcoctio apparuerit in urinis. Ceterum ad pestilentes & populariter grassantes morbos ex uilitato aëre obortos in corporibus summe auxiliatur, & in principio sanè data pestilentem prohibuit sepe dispositionem. Praeseruat etiam à dysenterijs & torminibus intestinorum. Inducit & somnos dolori minime obnoxios, neque soporem ac stuporem infert, ueluti reliqua ad leuandos dolores apparatus: uerum somnum tamdiu detinet, quousque pharmacum penetrarit, & causas dolorum dissoluerit. Et sanè multum ex aegris à somno surrexerunt adeo cōcoquendi facultate praestantes, ut obiliti sint an unquam aliquid à principio doluerint. Plura autem his & ultra promissa ei confidere potes. At uero si uisceris alicuius inflammatio adsit, cauere oportet ne exhibeamus eam priusquam inflammatio laxetur. Quod si tamen periculum maximum instet, id ipsum praefatus ac pretestatus dato, quo successuræ curationi per ipsam aeger adseruetur, eamque tandem uictoriam obtineat morbi.

*Antidotus*

adē Actuarii  
cuius famen  
impositio est  
uersa



*Antidotus aromatica optima, Galli. Cap. ciii.*  
Facit ad omnes, maxime tamē inueteratas circa os uē-  
tritis, atq; ipsum adeo uentrem affectiones, & ad hepa-  
ticos. Est stomacho uehementer grata & efficax. Ci-  
namomi drachmam unam, aut casie duplum, amo-  
mi dextantem, spicæ nardi trientem, folij trientem,  
myrrhæ troglodyticæ drachmam unam, casie bē-  
sem, croci unc. i. floris iunci odorati unc. i. costi unc.  
i. piperis sexuncem, mellis atticī despumati quārum  
satis est. Ego autem inquit cinamomi modum con-  
duplico, meliorq; antidotus redditur. Datur nucis  
ponticæ magnitudine cū uino, aut uino mulso, aut  
etiam cum aqua mulsa, si adsit febris.

*Antidotus ex duobus piperis generib. Cap. ciiii.*  
Antidotus ex duobus piperis generibus, quemadmo-  
dum eam describit Archigenes, leuans dolorem, fi-  
niens febrem, resiccans & concoquens. Facit ad co-  
licos. Hanc etiam Crito apparauit hoc modo. Cro-  
ci drachmas sex, casie drach. tres, cinamomi drach.  
duas, costi drach. iiii. styracis drach. viii. piperis lō-  
gi drach. iiii. piperis albi drachmas quatuor, galba-  
ni drach. iiii. myrrhæ drach. quatuor, quidam uero  
decem sumunt, opij drachmas tres, castorij drachm.  
v. Succulenta cum uino uetere terito, reliqua uero  
contūdico & cribrato ac tritis adspergito, & mellis  
despumati quantū sufficit adijcito, unitoq; ac adser-  
uato. Datur quibusdā magnitudine fabæ, alijs ma-  
gnitudine erui. Colicis uero à cibo præbeto cum ui-  
ni austeri cyatho uno. In affectionibus autē circa he-  
par & uesicā ex passo dato. Tabidis & pectore sup-  
puratis fluxioneq; infestatis ex aqua mulsa. Vitor  
& ad quartanas & ad alios diurnos & per circuli-  
tū repetentes rigores, duabus ante accessione horis.

*Antidotus Athanasia. Cap. cv.*  
Athanasia ut nunc apparatur, est autē Aegyptiorum  
inuentum. Croci, spicæ nardi, folij malabathri, co-  
sti, foeni græci, glycyrrhizæ, radicis eupatorij, petro-  
selini, styracis, casie, opij, singulorū æquales partes,  
mellis quod satis est. Datur ad summū nucis auella-  
næ magnitudine, hepaticis quidē si nō febriant cum  
uino mulso, febricitantibus uero cū aqua mulsa, datur  
ad dies ex ordine septem. In angina cū melle delin-  
gendam dato, in affectionibus pulmonis & pleuri-  
ticis cum aqua mulsa. Stomachicis, & qui non cōco-  
quant cibum cū posca. In fluxionibus uero stoma-  
chi ac alui in cataportia informatā dato, quibus de-  
glutitis aquam frigidam præbe bibendam. Ad ex-  
ulceratam uesicam & uulnam cum tepida aqua. In  
morbo arquato, hydrope, & rhenum morbo cū ui-  
no mulso exhibeto. Ad febres diurnas per circuli-  
tū redeūtes summe auxiliatur ante accessione ac-  
cepta, his qui diurna oculorū fluxione laborāt ad  
noctem dato, & frontem ex ea illinito. Hæmoptoi-  
cis & dysentericis ex posca ante somnum exhibeto.

*Oribasij theriaca qua Marcus Imperator usus est  
quæ ante & post infectionem sumitur. Cap. cvi.*  
Trifolij bitumen olentis seminis, rutæ syluestris, fari-  
næ erui rufi, aristolochiæ rotundæ, æquales omniū  
partes in pastillos redige, & ex eis drachmam unam  
cum uino & oleo præbe. Alia confectio ualde bo-  
na. Farinæ erui rufi, drachm. xlviii. anisi, semi-  
nis foeniculi, ammi, seminis apij, singulorum dra-  
chmas octo, mei drachmas quatuor, seminis trifolij,  
opopanacis, serpilli, cuiusq; drach. iiii. cum uino

redige in pastillos, & cum uino ter præbe bibēdos.

*Oribasij theriaca ex Bryonia. Cap. cvii.*

Theriaca ex bryonia ad uenenatorū animalium mor-  
sus & ueneni haustum, ad morsos à uipera & à scor-  
pio percussos. Radicis bryoniæ, opopanacis, iridis,  
rosmarini, opij, myrrhæ, singulorum drach. iiii. ari-  
stolochiæ. drac. v. thuris drac. vi. seminis rutæ sylue-  
stris drachm. vi. cumini drach. xvi. alijs tres tantum  
drac. habent, farinæ erui drach. xvi. alijs iiii. habēt,  
cum uino pastillos informato, atque ter cum uino  
præbeto. Philonis antidotus ad colicos præscripta  
est. Isotheos antidotus ad tussim relata est.

*Antidotus Hadriani. Cap. cviii.*

Piperis drachm. xx. seminis hyoscyami albi drach. xx.  
opij drachm. x. croci drac. v. spicæ nardi, euphorbij,  
amomi, pyretri, cyperi, cardamomi, folij, rutæ sicce,  
casie, castorij, seminis dauci, myrrhæ, petroselinij, cu-  
iusq; drach. i. rosarum siccarum sesquidrach. seminis  
apij sesquidrachmā, zingiberis drach. ii. opobalsa-  
mi drach. ii. mellis quantum satis est. Datur ad sum-  
mum nucis ponticæ magnitudine, minimum uero  
fabæ Aegyptiæ modo. Facit ad colicos ante somnū  
data ex aqua calida: Stomachicis & qui reuomunt  
cibum ex posca, in urinæ stillicidio ex aqua calida,  
hæmoptoicis ex posca, dysentericis eam in cataportia  
redigito, & ab eorum deglutitione modicā poscam  
absorbendam præbeto. Tabidis ad noctem cum hy-  
dromelite dato, aride uero tussientibus cum melle  
delingendā exhibeto. Morsis à phalāgijs & uiperis  
cum uino mulso. Educit & menses cum uino mulso  
accepta, in quo pulegiū, aut calaminthe, aut ruta sint  
incocta. Colicis cum aqua mulsa datur.

*Antidotus Acharistos, cui digna gratia referri nō  
potest. Cap. cix.*

Casie, myrrhæ, piperis albi, piperis nigri, castorij, gal-  
bani, styracis, croci, costi, opij, spicæ nardi, singulo-  
rum par pondus. Mellis quantū satis est. Datur ma-  
gnitudine fabæ. facit ad omnia diurni temporis  
purulenta in thorace, & ad hepaticos cum aqua mul-  
sa, & ad colicos eodem modo, ad splenicis cum ace-  
to mulso. Reperias autem ipsam & ad alias pluri-  
mas affectiones approbatam.

*Philagrii Antidotus ex sulphure uiuo. Cap. cx.*

Febrem finit, hac, inquit Philagrius, omnino uitor ad  
diurnos per circuitū repetentes rigores. Sulphuris  
uiui, seminis hyoscyami albi, seminis cardamomi ci-  
tra medullam, styracis, opij, myrrhæ, cuiusq; drach.  
viii. costi drac. x. rutæ drac. x. croci drac. iiii. casie  
drac. xi. piperis drach. xii. excipe melle attico despu-  
mato. Dato hora una ante impetum exacerbationis  
ex posca diluore calida, & post modicū interstitiū  
dormire iubeto. Somnum enim inducit, atq; omnes  
diurnos febrium insultus soluit. Verum nō con-  
uenit eā prius exhibere quā bona cōcoctio mani-  
festissime ex urinis depræhēdatur. Bene prospicere  
etiā oportet, quo is qui accepturus est, redūdantibus  
excrementis nō sit onustus, & maxime si febres quo-  
tidianę existāt. Datur ad summū, quum adhuc in ui-  
gore est pharmacum, nucis ponticæ magnitudine.

*Theriaca Democratis. Cap. cxl.*

Medetur hæc moribus animantiū uirus iaculantium,  
uiperarum, cerastæ, aspidum, natricum terrestrium  
plagis, & paruorum bestiarum puncturis, itemq;  
uesparum. Et marinæ turturis siue pastinacæ ac dra-  
conis



conis ictibus, phalangiorū item & scorpionum. Apparatur hoc modo. Iridis illyricæ, zingiberis, opopanax, opij, herbæ rosmarini, myrrhæ troglodyticæ, seminis trifolij bitumē olentis, cuiusq; drachm. viii. aristolochiæ drach. xi. seminis rutæ sylvestris drac. xii. radicis bryoniæ aridæ albissimæ dra. xvi. serpilli, castorij, radicis eryngij, seminis apij, cumini æthiopici recētis, cuiusq; drac. vi. alij dra. xii. habēt, farinæ erui rufi, drac. xxiiii. Omnia hæc contundito & cribrato, oppopanax uero cū uino dissoluito, eiq; arida inspergito & in pastillos reducto, & ex eis drac. i. cū uino ueteri meraco bibēdam præbeto. Statim enim ut potatur cōmoditatem suā ostendit, facit ad colicū aut uentris inflationes ex aqua ter potatum, facit & ad eos qui intrinsecus aliqua parte dolent, citra manifestam causam.

*Antidotus Theodoretus ex anacardijs. Cap. cxii.*  
Antidotus theodoretos, hoc est, diuinū munus, ad totum hominē utilis est, facit ad uertiginē & omnes capitis affectiones, omniaq; pectoris uitia emēdat, maxime uero suspiriosis, orthopnoicis, tabidis, pleuriticis, hepaticis, splenicis, & quibus exacerbat in uentre cibis, & omnibus diuturnis circa stomachū & uentrem affectionibus prodest. His item qui ex longis morbis se ægre reficere possunt, & qui decolores sunt, & quibus corpus inarquati colorē mutatur, & quibus aqua subter cutem effundi incipit, renum etiā affectionibus, & eis qui assiduo colicū dolore affliguntur, auxiliatur; omnemq; habitū corporis corroboret. Quin & febribus inordinate ueterascentibus, atq; etiā per certum circuitū redeuntibus ante accessione data prodest. Mirabiliter utilis est mulierculis, quæ purgationis mēstruæ stillicidie ac stragulatū uexatur, & quæ ab utero suffocatur. Soluit etiā uentrem citra molestiā. Educit enim ea quæ iam longo tempore intestinīs inhæserūt, & ut semel dicā, est diuinū donum. Huius enim usu in omnibus senties successum. Quod si quis uere & autūno præsertim, semel aut bis ea utatur, neq; circa diætā magnopere delinquat, nullis morbis obnoxius fiet, non solum enim præsentēs affectiones sedat, sed quas etiā futuras timemus impedit. Habet autē hoc modo. Croci, casia, phylli, spicæ nardi, mei, agarici, rhei pōtici, floris iunci odorati, acori, epithymi, piperis, farxiphagi, iridis illyricæ, cariophylli, carpobalsami, myrobalani interni, cuiusq; scrupulos ix. anacardiorum scrupulos x. aloës scrupulos xxxvi. mellis despumati lib. iiii. Datur ad summū drachmarū iiii. pōdere ex aqua mulsā, aut uino, aut uino mulso, secundū quod cuiq; affectioni cōmodum fore putas. Cæterū si scammoniæ scrupulos ix. adsumpserit, præter opinionem flauā bilem purgat. Si uero epithymi scrupulos ix. acceperit & scammoniæ scrupulum dimidium, atram bilem expurgat. Id quod multo adhuc efficacius præstat, si pro epithymo ueratri nigri corticis drachmam unam assumat. In pituitosis porro utiliter ad eius exhibitionē colocynthidis medulla tusa & tenuissime cribrata ammiscetur.

*Theodoretos aliter apparata. Cap. cxiii.*  
Aloës drachmas lx. & filiquas lx. agarici drachmas xxxiiii. croci drachmas vi. rhei pōtici drachmas vi. asari drachmas iiii. costi drachmas viii. acori drachmas sex. cinamomi drachmas vi. xylobalami drachmas quatuor, spicæ nardi drachmas iii. casia

drachmas vi. mei drachm. ii. chamædryos drachm. iiii. mastiches drachmas vi. piperis albi drachmas iiii. mellis despumati quantum sufficit. Dantur ex ea ad summum drach. iiii. ad emolliendū uentrem. Quod si quotidie ea ut antidoto uti uelis, in aliqua ex prædictis affectionibus, nudis ponticæ aut ampliori magnitudine præbebis. Quidam uero & piperis nigri, & albi, & longi, singulorum drachmas ii. addunt, item amomi, floris iunci odorati, zingiberis, cuiusque drachmas duas, gentianæ insuper drachmas duas, aliqui adijciunt.

*Theodoretus per acetum mulsū apparata.*

*Cap. cxiiii.*

Facit hæc magis ad omnes capitis affectiones, & deliria ex atra bile oborta, itēq; infantiā, facit stomachicis & colicis, hepaticis, atq; amplius adhuc splenicis & hydropicis. Habet cōpositio hoc modo: Spicæ nardi, folij, croci, mei, casia, epithymi, floris iunci odorati, rhei pōtici, myrobalani, cariophylli, cuiusq; drac. iiii. aloës sextāte, carpobalsami scrupulos xvi. zingiberis scrupulos xvi. mastiches scrupulos iiii. iridis trientē, anacardiorū scrupulos iiii. agarici scrupulos viii. corticis radicis fœniculi lib. i. aceti acerrimi sesquiseptarium, mellis sesquiseptarium. Corticem prælotū in aceto per tridū macerato, deinde ut dimidium relinquatur coquito, percolato, & ad acetum mel adijcito, rursusq; ad mellis spissitudinem coquito, atque ubi tepuerit ad arida tenuissimè trita in mortarium addito, & diligenter unito, reponito ac utitor uelut in prioribus dictum est.

*Picra siue amara per acetum mulsū apparata.*

*Oribasij.*

*Cap. cxv.*

Facit ad stomachicos, colicos, uulue strangulatus, hydropicos. Corticis radicis fœniculi lib. iiii. aceti acerrimi lib. vi. Radices in aceto ad tertias coquito, & percolato aceto mellis libras iiii. adijcito, & ad mellis spissitudinem coquendo redigito, refrigerato, & paulatim ad subscripta tenuissime trita in mortariū addito. Sunt autem hæc. Aloës bessē, iridis sextantem, mastiches unc. i. zingiberis, casia, nardi celticæ, helenij, singulorū unc. i. piperis drach. iiii. mei unc. i. aut si nō adsit, nihil impedit. Datur cochlearij mensura cum aquæ mulsæ cyamis iiii. (Est id poculi genus & Aegyptio uocabulo ciboriū appellatur) Ab acceptione etiā aquæ calidæ cyamos ii. absorbeant.

*Cyphi ex rebus xxxvi.*

*Cap. cxvi.*

Thuris sexuncē, styracis pinguis lib. i. myrrhæ trientē, folij quadrantē, costi trientē, amomi quadratē, spicæ nardi quadratē, casia quadratē, sabine, cardamomi, ammoniaci thymiamatis, iridis, carpobalsami, singulorū sextantem, nardi celticæ, helenij, hypni, floris iunci odorati, aspalathi, cuiusq; uncia unam, mastiches quadrantē, ladani quadrantē, baccarū iuniperi magnarum & paruarū, bdellij, singulorū sextantem, seselis unc. i. cyperi unc. i. croci trientem, seminis cupressi unc. i. alij drac. i. habēt, calami aromatici dra. iiii. rosas uirides numero quingentas, terebinthinæ depuratæ sesquunciam, caricarum pinguium sexuncem, palmarum pinguium quadrantem, carunculae uuarum passerum quadrantem, nucum pinearum quadrantem, succi hastulæ regiae uncia unam, mellis sesquilibrā, uini odorati quantum satis est. Arida contusa & cribrata cū liquidis excipito, palmis, caricis, uuis pasis prius in mortario tulsis, deinde mastichen



chen tritam eis addito, & bdelliū ac pineas nuces rosasq; & thus unūquodq; per se tritū. postea etiā stīracē adijcito, & ladanū per se mortario contusa, deinde terebinthinā & mel adfundito, & arida infarcito. Ego uero thus, bdelliū, myrrhā, & ladanum cū uino tero, atq; ita ad tusa in mortarium conijcio, & pastillis inde formatis utor. Facit ad capitis dolorē fronti illitum cū aceto, similiter & ad oculorum lipitudinem cum uino. Ad hepatis & rhenū exulcerationes cū passo, ad obtrusiones eorundē cum uino mulso. Tussitibus, tabidis, orthopnoicis cum aqua mulsa, stomachicis, splenicis, ischiadicis cū aceto mulso. Ad tormina, lunaticos & morbum comitialem cum aqua calida. Datur drachmæ pondere.

*Cyphi ex rebus* xxviii.

*Cap. cxvii.*

Aspalathi, bdelli, heleni, ladani, styracis, myrrhæ, cuiusque drach. vii. baccarum iuniperi magnarum l. paruarum itidē l. succi hastulæ regiæ trientem. Sabinæ trientem, croci sextantem, costi sextantem, cardamomi quincuncem, cyperorum quincuncem, seminis cupressi quadrantē, nardi celtici dextantem. Alij etiam casia habent sextantem, sphagni siue hydni quincuncem, amomi sextantē, spice nardi sextantem, rosarum siccarum quadrantem, floris iunci odorati, sextantem, nucum pinearum quadrantem, foliorum malabathri quadrantem, caricarum lib. ii. uuarum passerum pinguium sextantem, terebinthinæ chiæ lib. i. palmularum pinguium carūculæ lib. i. mellis lib. v. uini sextarios ii. Apparato & utitur ut dictum est. Etenim quæ ex huiusmodi rebus adparantur, ad prædicta optime faciunt.

*Masaphij confectio.*

*Cap. cxviii.*

Croci quadrantē, styracis unc. xxx. ladani unc. xxi. galbani quadrantem, cariophylli sexuncē, rosarum siccarum unc. xii. sertulæ campanæ unc. xviii. hydni (canalicula id parua est ex arbore quæ Damascena dicitur, itemq; ea quæ Rhodacinea appellatur exorta) bessem, malabathri sexuncem, arnabo unc. xii. costi, unguium aromaticorum, casia, zacathij, singulorum sexuncem, asari quadrantem carpobalsami unc. xxi. pilularum cupressi quadrantem, foliorum lauri quadrantē, chachula quod cāchryon est, unc. i. amomi unc. xii. spice nardi, gummi, cuiusque sexuncem. Vini lib. vi. cōtere & ad formam quancunque uelis redige.

*Thymiana siue suffimētum Berenices.* Cap. cxix.

Seminis uiticis, melanthij, cornu cerui, samfuci, baccarum lauri, absinthij, sulphuris uiui, bituminis Iudæici, saluæ, radicis cyclamini, artemisiæ, origani, rutæ syluestris, cumini, castorij, lapidis gagatæ, anisi, conyzæ, rosmarini, buccinorum ustorum, resinæ, singulorum uncia unam, cedriæ sextantem, picis zacynthiæ pinguis lib. i. Quidam etiam radicis pæoniæ unc. i. sed nos eam nō admittimus. Omnia cōtusa & cribrata, cedria, resina, ac pice excipito, in pastillosq; redigito ac utitor. Facit ad anginam potatum & suffitum, ita ut hiantē ore æger uaporem hauriat. Ad omnem uero uigiliarū speciem uino liquefactū fronti illinito, atq; ipsi forinsecus naso: quin & intrinsecus nares sublinito, & super prunas proiectū suffito, & somnū ægro cōciliabit. Facit & ad ozænas sordidū & foetidū nariū ulcus, ipsis naribus ex eo illitis cū aceto. Fugatur animalia uenenata, muscasq; & culices suffitu. Et ut quidā tradunt, etiam immūdos spi-

ritus arcet. Porro de pharmacis dolorem leuantibus scriptum est in præcedentibus quaternionibus, Sermonis noni Cap. xxxii. & octauo Cap. lv.

*De Elephantiasi.* Ex libris Archigenis. Cap. cxx.

Elephantiasis à quibusdam leōtiasis, ab alijs satyriasis appellatur. Elephātiasis quidē à magnitudine & diuturnitate affectionis nomen accepit, imò & propter cutis asperitatem, quæ in quibusdam succedere consuevit. Leōtiasis autē appellatur, quum frons ægrorum cum quodā tumore laxior redditur, ad similitudinem pellis flexilis superciliorū leonis. Satyriasis uero dicitur propterea quod malæ faciei iisdem cum rubore attollitur, & musculis maxillaribus ueluti conuulsionē patientibus, mentum ipsum dilatur, quēadmodum etiam ridentibus euenire solet, similitudine quadā ad picturas satyrorū: quin & alacritas uehemens ad coitum ipsis adest, quēadmodū & de satyris fertur. Est autē grauis morbus & prope ex eorū numero qui incurabiles existunt, & grauis quidem est ipsi ægro, intolerabilis autē conspicientibus, utpote qui ipsum omnino auersantur, adeo ut & plerique ex necessarijs & domesticis ægri ipsius cōuersationem deuient. Etenim suspicionem de se præbet malum tanquam sit contagiosum. Atq; ego sanē malum esse affirmo cum ipsis conuersari: inquinatur enim aër quē inspirando adtrahimus ex ulcerum foetore, & ex uitiata spiritus exhalatione. Cæterum affectio ipsa non solum ob id grauis est, quod indissolubilem ferē habeat structuram & apparatus, sed quod principia generationis eius ferē sint ignota, quū enim circa superficiem iam uestigia eius apparent, tunc nō gignitur, sed perficitur, intus à uisceribus initio facto, & progressu usque ad cutem dilatato: quare non ab simile est, tumentes eminentias etiam in internis oboriri. Appræhenduntur autem hac affectione uiri magis quàm foeminae, atq; inter illos magis qui crassum & uiscosum ac atrabile redundantē sanguinem habent, & qui pituitā multam salis aut acidam gignunt. Amplius uero & qui uictu crasso & ægre cōcoctili utuntur, & qui in otio degunt. Non minus uero his & qui multis exercitijs inordinate utuntur, & per hoc sanguinē inspissant. Itēq; hi qui cibos assidue in uentre corrumpunt: quod uero ad etatem attinet, pueri & iuuenes, maxime quo tempore pubescere incipiunt. Regio uero huius mali inducatrix est, tum quæ ualde calida est, tum quæ uehementer frigida est. Et altera quidem ob id quod sanguinem adasset: altera quod frigore suo eundem congelet, & perspirationes prohibeat, ac insitum calorem suffocet. Consequitur eos qui obnoxij futuri sunt malo, segnities, spiratio tarda, spirandi difficultas, motus difficilis, assidua cōstrictio alui, urinarū, ueluti sunt iumentorū loria, excretio, respiratio grauis & foetida, ructus continui, qui etiā ipsis ægris aliquid molestiæ addunt, appetitus non obtusi quidē neq; inflāmati, impetus in uenerē intensus. Iam uero ubi ad cutem progressum fuerit malum, malæ primum crassiores fiūt & mentū, deinde rubescūt, non florido, sed liuido rubore. Et sub lingua uenulæ uaricosæ fiunt ac nigrescunt: quod signum est etiam uiscera ipsa in simili cōstitutione esse, eiusmodi plane qualis in porcis quibusdam circa interna uidetur, quæ Grandinis nomine insignitur. Quandoq; uero & per omne corpus eminentiæ apparent,



parent, & praesertim iuxta summam frontem ac mentum. Corpus praeterea ipsorum magnū esse uidetur, & cuiusdam intolerabilis grauitatis sensus eis adest, unde neque potu neque cibo admodum suauiter delectantur. Pusillanimes fiunt ad omnia, neque praeter uitae amore uitam relinquere & contemnere possunt, neque affectionem ipsam generoso animo perferre. Verū uelut seipsos condemnantes se occultant, & notos homines uitant. Quidam porro ex eis, ad modum eorum qui suffocantur aut strangulantur, maxime circa somnos afficiuntur. Quēadmodum igitur perfecte a malo eiusque diuturnitate uictis frustra manum admouemus, ita & abstinere ab his qui iam affectione corripiti & tentari uidentur, planē desperantium hominum est & malignorum. Humanum enim & plenum beneuolentiae signum est, in extremis etiam malis usque ad experimentum, procedere ad difficultatem affectionis compescendam.

*Cura elephantiasis affectorum.*

Cap. cxxi.

Quum igitur quaedam ex praedictis signa affectionis apparuerint, citra dilationem sanguis auferatur particulatim ex utroque cubito. Reuiuiscit enim inde aliquo modo insitus calor, ut sensibiliter corpus ipsum alleuetur. Habendus tamen est modus in euacuando. In multo enim inutili & uitiato sanguine parum quiddam genuini sanguinis inest. Post sanguinis autem detractionē paucis diebus interpositis aluus inferne subducatur. & primū quidem colocynthidis pulce utendum est, ex qua catapotia xviii. nucū ponticarum magnitudine exhibeantur. Eius autem apparatus praedictus est in coxendicum morbi tractatu. Sequenti deinde die xii. catapotia praebentur. Si uero ea accipere recusat, per hierā nostram purgato. Mirabiliter autem eis conducit per mensem semel data. Post dies autem aliquot sero lactis scissi utendum, ex eoque non minus tribus heminis, neque ultra quinque accipiendū. Sit autem lac asininum, si haberi potest, ex quo serū ipsum sumitur. Ammiscendum est etiā ipsi ueratrum nigrū trium obolorum pondere, & scamoniae scrupulus i. ita ut haec ipsa cum modico sero ieiunis praebemus, atque deinde ipsum serum paulatim per se exhibeamus. Hac enim purgatione frequenter utendū esse cenfeo. Omnino namque conandū est, ut omnē corporis miscellā ab affectione occupatā liquefaciamus, aliāque quādam uelut ex integro regeneremus. Id ipsum uero fiet, si per interualla oportune purgationes adhibeantur, & cibi apponantur qui facile concoqui, & per corpus distribui possint. Post quorum acceptionē uomitus a cibo fiant, deinde etiā a raphanis a ieiunis, postea ad ueratrum perueniendum: ac primū quidem decoctum ueratri exhibendum est, deinde & bulbos ipsius conusos, & ad finē uirgas opimas ex eo praebemus. Id uero quomodo fieri debeat, iam antea diligentissime traditū est in tertio huius tractationis Sermone. Post haec autem uirium refocillatrice diēta utendum est. Ad os uentris & utrinque ad uiscera cucurbita inanis affigatur. Et primo quidē circuitu auxiliōrū hoc modo perfecto, rursus ad principium reflectendum est. Et uenae quidē sectio uitetur: ab hiera uero principium purgandi sumatur, & reliqua consequenter facienda, uelut praedictū est, ter & quater in anno eodem ductu repetito. Maligna enim & difficulter cedens affectio est, quapropter plurima cura

opus est, ne in peius euadat.

*De his qui castrantur.*

Cap. cxxii.

Nouimus quosdam audaciores qui sibi ipsi testes ferro resecarunt: castratis enim non in peius malum ipsum procedet. Neque enim temere reperias, inquit Archigenes, ullum aliquem castratū elephantiasis laborantem, neque item facile mulierem: Quare etiam quidam ex confidentioribus Medicis manum admoouerunt, & quotquot sanē ex eis ex sectione periculum euaserunt, per consequentis curationis usum perfecte ab hac maligna affectione liberati sunt. Noui etiam quendam qui ualde correptus esse existimabatur, a tali quopiam pharmaco curatum. Aceti optimi & cedriae, singulorū cyamum i. succi brasicae cyamum i. comisceto & ieiunis mane praebeto, deinde ad uesperam ordeaceū panem modicum exhibeto cum quopiam uolucriū leuiorū, & per solum hoc maximum curationis sperato successum. Vtere autem ipso per annum, semel in hebdomade ex eo praebens, quandoque tamen bis, quanquā ad usum eius aduofactis etiam rigidius procedendum sit, nimirum ad duplam pharmaci mensurā. Quum uero & ad comitalem morbum preclare faciat, eo sane & ad ipsum uitor, & praeter omnibus alijs eius profectum laudo. Facit & brasicae decoctum quotidie potatum, quū ex cedria pharmacum non datur. Multi etiam sideritim herbam laudant: datur autem foliorum eius aridorū drach. i. ex uino austero. Noui & trifolium herbā bitumen olentem probe huc facientem. Datur autē & ipsa drachmae pondere trita ex uini cyatho uno, aceti uno, mellis una. Eboris etiam & cornu ceruini ramēra cochlearij mensura saepe ad praedictā mensuram ammiscentur. nam & per se ipsum unumquodque eorū potatum utilissimū existit. In regione Indorū elephantiasis affectos assidue per sedē eluere per urinā asininae infusionē heminae mensura calefactae consueuerunt. Crocodilum item terrestrem accipiunt, eiusque extremas partes amputant, ac interiora prolestant. deinde fermento obuolutū assant, deinde ablato fermento, & scabricie eius derafa, carnis ipsius drac. i. quotidie bibendum praebent, & magnum sanē testimoniū de hoc remedio praebent. Praclare autē succus cyrenaeus facit, erui magnitudine deuoratus: simul enim ut acceptus est, per omne corpus diffusus uehitur. Aselli item sub aquario uase stabulantes, qui & millepedae appellantur, quinque aut sex numero cum hydromelitis cyamidis iiii. triti potati praeter opinionem tum his, tum suspiriosis, & omnibus suffocatione apprehensis auxiliantur. Multae commoditatis est & scillae semen trium obolorum pondere in cyatho mellis semicocti delinctum. Asperam enim arteriam a pituita repurgat, & coarctationem uiarum uocis probe dilatat. Similiter autem & pastillorum scilliticorum, qui in theriaces confectionem coniunguntur drachma una, exhibetur cum uino austero meraco trita. Ex calida autem datur. Theriaca porro ex uiperis Andromachi compendium totius medicationis existit, si post purgationes per modica interualla praebentur.

*De uiperarum esu, & de pruritibus, Archigenis.*

Cap. cxxiii.

Mirabile elephantiasis remedium uiperarum esus existit, eas uero hoc modo apparatus edere oportet: primum quidem amputato capite & cauda, & de-

tracta



tracta pelle, exemptisq; interioribus uisceribus omnibus caro aqua pura bis ac ter lota, in olla instar anguillarum coquitur, aqua quidem sufficere affusa, & oleo modico cum anetho & porro. post sufficere deinde coctura, iusculum moderato sale conditur, atq; ita ægro in sole desidenti exhibeatur, capite tamen probe uelato. Neq; uero semel tantum aut bis uiperas edere satis est, sed sæpe id fiat, quum extra periculum sit, & insuper commoditatem afferat. Sint autem uiperæ recens captæ, & ex humectioribus locis accipiantur. Nam quæ iuxta mare degunt, uehementer siticulosæ existunt. Vrimur & ad ipsos salibus theriacis eos quotidie pro liquamentis ad intinctus exhibentes unâ cum obsonijs. Suntq; tum sapore, tum odore gratissimi. Quin & ex betonica antidotus ad podagricos præscripta utiliter purgâs, etiâ his cōmode exhibetur. Et ut in uniuersum dicâ, propter incidentes ipsis suffocationes, etiâ ea quæ orthopnoicis præbentur, his utilia sunt, utpote quæ crassos humores nō modo in thorace, sed & in toto corpore contentos secant & diducunt. At uero ob id quod ferinus est humor, ea quæ lumbricos enecant, & expellunt, etiâ his danda sunt. Forinsecus porro cuti psilothrum assidue per modica interualla in balneo adhibendū est, oculis probe cōmunitis, ne quid ex psilothro in ipsos dilapsum eos lædat. Commode item facies ipsa ex eo illinitur, utpote quæ maxime ab affectione sit correpta: multo etiâ tempore in eius usu perseuerandum est, donec cutis ipsa rubescat, non tamen exulceretur. Quapropter ex ptisanæ succo psilothrū appareatur. Vrsinus autem maxime aut uulpinus adeps, uel si hi haberi nō possint, taurinus cum sarmentitio cinere emollitus, & cum lixiuio coctus probe attenuat eminetes tumores, hoc enim modo etiâ sapo præparatur, quem in usum conuertere oportet, si ursinus aut uulpinus adeps nō adsit. Bona est & portulaca cum aceto trita, & semperuium minus, quod Romani illecebram uocant, & Mercurialis decoctum tum per se, tum cum aridis quibusdam mixtum, & fici syluestris folia arida contusa & cribrata cum aceto illita, & in balneo affricata. Optime facit & decoctum ipsorum, & betæ & ocymo cum aceto tritis aut coctis dignam laudem tribues, si per eorum attritum fueris deterfus. Myrobalanus item cum aceto præstat: probe auxiliatur & alumen cum sale, & sandaracha æquis partibus in uino & oleo maxime lentiscino, aut si non adsit, rosaceo tritis. Aridum quoque inspergimen ad alphos siue uutiliginem à nobis compositum liberaliter extergit & respurgat. Est autem hoc. Alcyonium, nitrum, sulphur uiuum, myrti folia, & fici agrestis folia sicca, singula pari mensura contundito & cribrato, deinde cum aceto trita oblinito, & in balneo affricato. Cōuenit & alcyonium assatum cum aceto tritum & affricatum: testæ item ostreorum omniū usq; & cum pari melle ac modico aceto tritæ. Et acetī fece arida usta, cum sulphure trita in exudatorio loco commode uteris. Amygdalino autē oleo inungito, atque hoc modo corpus forinsecus illinito. Oribasij smegma ad elephantiasin. Pumicis, testæ sepiæ, nitri assati, gallæ, cimoliæ, cuiusque sextantem, gummi unciam unam, arida affrica. Aliud optimum smegma. Nitri assati, pumicis usti, testæ sepiæ ustæ, gallæ, cimoliæ, cuiusque sextantem, gummi unciam unam, arido

utere in balneo aut lauacro & aqua marina ablue.

Aliud efficax. Spumæ nitri albæ drachm. xx. cimoliæ drachmas xii. melanthij drach. ii. radices bryoniæ drachmas ii. alcyonij drachmas vi. sulphuris uiui drachmas iiii. radices chamæleonis albi siccæ drachmas iiii. trita in balneo inspergito, & affricato. Aliud smegma. Ad omnem corporis pruritus & humoris atræ bilis fluxionem celebre. Veratri albi unc. i. ueratri nigri unciam unam, baccarum lauri sextantem, cerusæ, pumicis usti, testarum sepiæ ustarum, pompholygis, rutæ uiridis, singulorum trientē, sulphuris uiui bessem, spumæ nitri albæ bessem, mellis bessem, aloës quæ in uentriculis afferri solet, bessem, acetī quantū satis est. Vtere in balneo. Remedium ad psoras, Archigenis. Magni nominis est & ad elephantiasin laborâtes, id quod ad psoram feram à nobis priuatim est apparatus. Id ipsum hoc modo habet: Rumicis satiui, & rumicum acutorum radicum, fasciculos manipulares duos in aceto coquito, deinde in mortario tulsis, ac postea etiam in pila tritis, acetū paulatim instillato id ipsum in quo decoctæ sunt radices aut etiam aliud, atq; deinde hæc ipsis infarcito. Nitri drachmas xlviii. sulphuris uiui drachmas xxv. thuris drachmas xv. Omnia ad strigmenti crassitiem reducta unito, ac æstate quidē ad solem sæpe illinito, hyeme uero in balneo donec exudarint. Apparatur autem à nobis pharmacū ad elephantiasin summe cōgruum, huiuscemodi. Rumicis satiui & rumicis acuti radicum fasciculos manipulares duos in aceto coquito, tundito, ac terito, ut prædictum est. Deinde hæc quā tenuissime trita eis infarcito. Alcyonij lib. i. sulphuris uiui lib. i. spumæ nitri bessem, testarum cochlearum ustarum trientem, radices chamæleonis nigri sextantem. Omnia simul cōteruntur, donec ad strigmentitiā spissitudinē redigantur: & illinuntur æstate quidē ad solem sæpe, hyeme uero in balneo, donec exudent.

*Illitiones ad tumentes corporis eminentias.*

*Cap. cxxiiii.*

Illinantur autem tumores in cute efferati & inflammati ex glaucij succo, aut polij, aut lycij, aut hypocisthidis, aut aloës, & similibus succis. Aut halicæ uel erui farina cum plantaginis, aut poplygoni, aut perdicij, aut portulacæ, aut brassicæ succo diluta. Quod si cataplasmatīs opus habeant loci inflammati, cum halica cruda polijgoni, aut plantaginis, aut marrubij succo ammixto, contegantur. Postquam uero inflammationes mitigatæ, & laxatæ remiserint, herbæ serapiadis tritesticularis uiridis folia tenera aut semina probe terito, & ægrū ad solem calidum locatum ad horas ii. defricato, atq; ubi prodierit sudor, uinum meracum uetus odoratum bibendum præbeto, rursusq; herbam ipsam affricato. Deinde ipsum in aqua marina abluito, & hoc quotidie per dies aliquot facito, & reperies ad sanitatē consequendā successum. Optima est & hæc illitio Critonis. Ad tumētes eminentias, & ad faciei pruritus, ac principium elephantiasis. Gummi albi, spumæ nitri, thuris, sulphuris uiui, singulorum par pondus in aceto dissoluito, & ex probe penitus cōtritis pastillos formato, eosq; in umbra resiccato. Vfus uero tēpore postulante aceto dilutos illinito. Vbi autem exaruerint, subscripta cōfectione defricato. Est autem hæc. Saponis libram unam, ammoniaci thymiamatis libram unā, thuris, quadran



quadrantem, spumæ nitri albæ quadrantem, mastiches quadrantem. Ammoniacū cum aqua prius tritum, & sapone ei adiecto, in figulino uase coquito, duobus sextarijs aquæ affusis, atque ubi dissolutus fuerit, thus, mastichen, spumam nitri, unumquodq; per se tenuissime tritū & unitum adijcito. Deinde in mortarium translata & diligenter tusa in uitreum uas reponito ac utitor. Optime faciunt & hæc ad tumores nō inflāmatos illita. Ammoniacum thymia-  
ma ex aceto, aut marrubij succus & thus eodē modo, & uerbenaca recta, & fel capræ aut hirci, & flos æris cum melle, & caninum stercus cū aqua, & aloë cū thure ex aceto mulso potata & illita. Vtiliter illinitur & dictāni succus melle cocto & cedria. permixtus, & sulphur uiuum cum liquida pice, aut sesamum, aut amygdalæ amaræ, aut chamæleonis nigri radix similiter cum liquida pice, & alcyonium cum cedria. Efficacissima uero est cedria cum phocæ adipe aut etiam ursino illita, ita ut simul eliquatis sulphur uiuum infarciatur. Valde efficax & hoc est. Si alumen liquidum linteolo illigatum, & ustum, deinde cum aceto acerrimo & brassicæ, aut ocymii succo tritum, illiniri præceperis. Aliud. Thuris, aluminis scissi, cuiusq; sextantem, sulphuris uiui, ramentorum plumbi, cuiusq; quātum satis est, unito & leuiter illinito, eminentijs ex pumice præfricatis.

Aliud. Ammoniacum thymia-  
ma, & sulphur uiuum, & columbæ stercus, & uitrum tenuissime tritum, in aqua, aut uino, aut aceto terito, & prout cōmodum æstimaueris illinito. Aliud ualde efficax. Cedriæ sesquilibram, acetii lib. II. foliorum cupressi lib. I. folia tusa ad biduum in aceto macerato, deinde excolato aceto, cyparissum probe terito, eiq; cedriā adijcito ac unito, & cū uulturis pennis ægro in sole locato illinito. Aliud. Efficacissima est & hæc illitio. Auripigmenti drach. VI. thuris drach. VII. costi drach. II. calcis drac. IIII. baccarum lauri sextantem, cedriæ drachmas IIII. Omnia teruntur, & cum foliorum populi albæ arboris decocto in coquendo inspissato illinuntur. Aliud ad faciei eminentes tumores præcipue conducens. Mastiches unc. I. myrrhæ drach. IIII. sulphuris uiui drach. IIII. olei omphacini quantum sufficit, utere. Mirabiliter autem prodest ad faciei tumentes eminentias, ex milesia herba remedium. Tunduntur autem folia herbæ uiridia cum axungia ueteri, & imponuntur. Et rubescunt sane inde plurimum partes quibus imposita sunt: contrahuntur autem facile pane imposito, aut cerato ex oleo amygdalino, rursusq; in naturalem suum colorem restituuntur. Postquam uero exæquatae fuerint eminentiæ, illitionē talem parato. Thuris unc. I. gummi albi unc. I. cīmolij trientem. Vīno ueteri aut aceto trita illini. Emplastrum quod & ipsum ad maiores & liuentes eminentias facit, inquit Archigenes. Terebinthinæ drac. x. radici aristolochiæ drachm. IIII. radici capparis, ueratri albi, sulphuris uiui, lapidis pyritæ, cuiusq; drach. II. thuris drach. I. terebinthinam liquefacito, & ab igne ablata reliqua tenuissime trita infarcito. Optime facit & Andronis pastillus & Musæ pastillus similiter illitus uterq;. Maiores porro tumores etiam emplastro aliquo discussorio cōtegatur: efficaciter eis auxiliatur emplastrū ex asellis ad meliceridas ulcera mellei humoris & strumas descriptū. Magis proprie autē hoc cōuenit. Olei

cicini lib. I. spumæ argenti drac. c. picis crudæ hemina I. ad lentū ignem assidue agitādo coquito: atq; ubi coacta fuerint, ab igne ablatis chamæleonis nigri radicē tenuissime tritam drac. x. pondere inspergito, & ex tithymalli succo parū. Aliud. Ceram & uiscum cum modico myrteo oleo liquefacito, & diphrygis triti quod satis est inspergito, ac utitor.

Aliud. Radici panacis drac. IIII. nitri drac. v. calcis drac. I. ceræ drac. II. adipis ursini sextantē. Liquefacta aridis affundito, & misceto. Cæterum nigras eminentias, aut ualde liuidas, cū scalpello leuibus uulnuculis impactis incidito, deinde splenio cruentis uulneribus destinato, & quod inflātionem arce-  
re potest, integito, eius generis est emplastrū Barbarum appellatū, aut salem tenuissime tritū oleo subactum, & lanis succidis exceptū imposito, & postea radicem maluæ tenerā cataplasmatīs uice adhibeto, aut cerato ex diphryge cicatricē inducēte utitor. Audendum autē in fortioribus corporibus, præsertim ubi prius corpori robur addideris, etiam exco-  
riatorium ad impetiginē feram descriptum illinere, citra tamen cantharidū ammixturem apparatus, quod ubi factum fuerit, & bullæ eruperint, eas uiridi Epigoni emplastro, quod Isis à quibusdā appellatur, integito, & per balneas curato: & tunc lac potā-  
dum præbeto. Vlcerationes autē obortas, cerato ex diphryge cicatricē obducente, aut melino cerato ex uino apparato, sanabis. Facit idem & ex pompholi-  
ge ceratū, & quod ex cadmia apparatū appellatur. Quod si curationē difficulter accipiant, uelut chironia ulcera tractato. Si uero pascendo proserpant ulcera, corace pastillo ex aceto mulso apparato utitor, aut pastillo Andronis. Aliud, ad uiriliginem quæ leuce dicitur, & ad psoras. Calx in uino aut rosaceo fermētata cū aqua illinitur, & post hoc ceratum rosaceū adhibetur. Aliud celebre ad elephātiāsim. Atramenti futorij partes IIII. aluminis scissi made-  
facti partes VI. luto fusco subigito, & ægro nudato ac præforo, corpus eius illinito, deinde lauato, ac rursus eodē modo foueto, illinito, ac abluito: quod ubi ter feceris, cutē rosaceo inungito, ægrūq; per totā noctē contegito, & reperies sanū. Aliud, ad elephātiāsi affectos, carcinomata, podagrā, articulare morbum, strumas, cōdylomata, & cōuulsiones neruorū. Vulturis cerebrū unā cū capitis ossiculis & reliquis car-  
nibus capitis accipito, & in uino dulci coquito, atq; excolata quidē illa proijcito: cum iusculo uero ipso, euphorbij, croci, atramenti indici, piperis albi, castorij, myrrhæ, cuiusq; sextantē coquito, & foliorū rubi, seminis satyrj, cuiusq; quadrantē, picis quadrantem, succi mandragoræ, cedriæ, cuiusq; unc. I. fel tauri, aut capræ integrū, uermes ex lignis putrescentibus & marcidis numero tres, addito. Hæc sanē omnia in uini dulcis sextarijs nouem simul coquito. Hoc iuramento adstrictus accepi, ne cuiuspiam reuelarem. Hic apparatus ad illitionem in nouem dies sufficit, & eminentias ipsas exterit. Cæterum cum penna uulturis etiam illinatur. Aliud, ad elephātiāsim, abscessus, cōdylomata, strumas, eminentias corporis, tubercula, pingue quiddam in se collectum habentia Græcis inde steatomata appellata, unguis abscessus paronychias uocatos, & gutturis tumores qui bronchocelæ apellantur: ad omnes item malignas eminentias quacunque corporis parte, multo experimento



experimēto cognitum. Vulturem uiuum accipito, eumq; in uini dulcis aut sapae sextarijs nouem aut sex suffocato: aut uulturinum gallum eodem modo tractato, & à uespere usq; ad matutinū tempus ad uitis ligna coquito. Cæterum ægrū tenui uictu conuulso, sepe etiam in ediam perferre iubeto, & per subscriptum purgatiuum medicamentū purgato, perq; dies septem ex marina aqua lauato. Postquam uero uultur coctus fuerit ac excolatus, ossa ipsius contrita cum ægri sudore, præsertim qui à sole prolectus est, cani edenda proijcito: massas uero septē inde formatas cani dato. Vulturem autē ipsum per triduum à uespere usque ad matutinum tempus, ne ab auro-ra conspiciatur, coquito, atq; id similiter tertia die facito, probeq; cōtectum omni die mane in domo tenebricosa reponito. Atq; ubi tandem ita percoctum ac excolatum habueris, ad iusculum in nocte, minime uero in die, sequentia addito. Salis fossilis, algæ siue fuci marini, in petris cōdensati trientem, aliq; unciā unā habent, galbani, opopanacis, cuiusq; sextantem, colophonias, picis, cuiusq; quadrantem, euphorbijs, castorij, sanguinis capræ, cuiusq; trientem, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, glutinis aceto dissoluti, picis liquidæ, singulorum sex uncem, rutæ syluestris ramulos septem, catanancæ herbæ scrupulostres, amiatī scrupulum unum, polypathij herbæ, quæ per contrariam affectionem luna desinente auxiliatur, lapidis gagatæ, cedriæ, singulorū quadrantem, bituminis iudaici sextarium unum, artemisiæ herbæ, chamæleonis herbæ, cuiusq; sextantem. Hæc omnia cum iusculo ut dictū est apparato, probe trita committito & unito. Cæterū uulturem primum unā cum pennis usque ad pedes excocto, atque ita in sapam coniectum suffocato. Pellem autem ipsam cum pennis myrrha conditam, & in fumum suspensam exiccare sinito. Pedes uero in oleo coquito, & cum oleo podagricos, per uulturis etiam pennam, illinito. Neros uero ad pedes podagrici pro amuleto appendito, & ab affectione eum liberabis. Porro purgatiuum, cuius mentionem feci, hocce est. Aloës uncia dimidium, gari, aceti, parem mensuram unito, & octauam sextarij partem bibendam præbeto. Ad condylomata in facie elephantiasi affectorum. Thus cum uino austero tritum pinnulis illinito. Illitio alia optima ad elephantiasi laborantes: facit & ad pruritus. Gummi, gallarum, singulorū drachmas decem, pumicis drachmas uiginti: contundito & cribrato, acutitor ut optimo. Aliud, etiā ad lepram. Veratri nigri, gūmi, cuiusq; quadrantem, spumæ pisanæ quantum sufficit: conijce in ollam, & coque donec succulenta fiant, ac tritis utere.

*Dieta elephantiasi correptorum. Cap. cxxv.*  
Dieta elephantiorum talis sit. A somno membra eorum plurimum & leniter manibus cōtrectentur, deinde alius consueta recrementa deponat, & post hæc ipse æger sub diuo aut in porticu deambulet, mollibus calciamentis subligatis, conficiatq; deambulando usq; ad stadia triginta. Deinde cataplasma ei imponatur primum ex pane, aut faba cocta, aut pisanæ, aut aliquo consimili illinatur, uerum ad unumquodq; prædictorum citrij acidi succus ammiscetur si haberi possit, aut si desit, peponū aqua, & post modicū interstitiū aqua pura large abluatur. Postea cerato rosaceo liquidiore facies superne leuiter illi-

natur. Deinde ubi gestationis genere aliquo fuerit uectus, rursus deambulet concitatore gressu. Postea uero portione aliqua ex prædictis accepta, quotidiano alicui & consueto muneri uacet. Circa quartam autem horam concitatore gymnasio exerceatur, & deterfo sudore, ursino aut uulpino adipe illinatur, qui si nō adsint, caprinus aut taurinus, aut equinus, aut aliquis ex uolucrum genere, aut butyrum recens sumatur. Deinde cum foeni græci aut pisanæ succo, qui parū ammoniaci cum aceto liquefacti ammixtū habent, perfundatur, atq; ita lauacro quodam præscripto utatur. Nocuum est enim affectioni, si quis non lauet. Per interualla autem psilothro, ut dictum est, defricetur, & quodam ex prædictis smegmate quotidie expurgetur. Commoda sunt etiā arida fomenta, & post sufficientem ex dictorum usu exudationem, natationes in mari, aut in sulphurulentis & aluminosis aquis, non extreme frigidis, quales sunt aquæ Albulæ in Italia uocatæ. Quod si tales nō adsint, frigida lauacro assidue utatur, raroq; balneum petat, nisi psilothri gratia, aut altera aliqua urgente necessitate cogatur. Si uero quis ad frigida lauacrū cunctantior sit, eum in balnei aëre plurima aqua frigida perfundi commodius erit. Præstat item solium ex decocto aliquo eorū quæ adstringunt apparare, plātaginis præsertim, aut rumicis, aut perdicij, quā efficacius omnino censeatur betæ decoctū, cui sane & ex aceto parū est affundendum. Extergatur etiā uelut prædictū est, in balneis cum quopiā prædictorum smegmatum, & cum myrobalano assidue ex aceto. Quibus deinde ablutis, ad acrimoniæ & mordacitatis curationem ex oleo lētiscino cum aceto & uino austero conquassato, aut ex oleo myrteo & pari uino conquassatis illinatur. Licet etiam aliquādo parum ammoniaci, aut alumen rotundum in uino conterere. Optimum est & butyrum recens illitum. Post lotionem & extersionē per tenera lintheola, ad horæ dimidium quiescat: deinde aqua tepida hausta sponte uomat: aut si id facere nequeat, per immisiōnem digitorū. Postea modico interuallo temporis interposito, uinum absinthites aut origanites bibat, non infra heminae mensuram, & paulo post cibus ei apponatur. A uino in posterū omnino abstineat, passioq; & uino mulso, ab omniq; cibo difficulter concoctili, & maxime à frigida potu. Cæterum cibi tempore purgationum qui facile secerni queant, sumantur. Panis hordeaceus aut triticeus recens calidus. Ex oleribus betæ, & porrum capitatum duabus aquis edulcatum: lactucaq; & capparis ex aceto mulso. Ex mari uero herinacei recētes, ostrea, pelorides, pectunculi, tellinæ cum betæ coctæ, & salsa-mentum uetus ex aceto mulso. Vbi uero post purgationes refocillare, & uires restaurare uelimus, acrimia auferenda sunt, præter condimenta, quorum ut urinam cientium, usus commodus est. Exhibendus est autem panis optime præparatus, oua sorbilia, halica lota, & lac cum melle. Omnia tamen cum pane. Ex oleribus, malua, rumex, lisarum, lactuca, feris, foeniculum, ficus coctæ, à quorum acceptione parum aquæ calidæ bibat, in qua decocta sint, quæ urinam moderate cient. De cætero uero abstineat, ut ne poter usque ad cœnam. Bis enim cibum capere præstat, quā semel se explere: nam, ut dixi, etiam prandium ipsum simplicissime paretur: cœnam magis



uariam concedo. In coenam etiam duæ tertiæ panis partes referuētur. Præbeatur item in ea piscis molli carne non graueolens, coctus, simplici iusculo apparatus & ex auiculis mōtanis, extremæ partes & uentres, ex pedestribus, hœdorum carnes, & leporinæ & dorcadum. Pro condimento & embammate ad intinctus, acetum scilliticum, & sales scillitici commodi sunt. Ex leguminibus, prifana utilissima censetur. Danda tamen & per interualla oryza, porro in cocturam eius addito. Ex fructibus conueniunt, ficus electæ, uua arefacta, pirum coctū in aqua multa, similiter & cotonea: unumquodq; certo pro coniectura modo. A reliquis fructibus omnino abstinuant. Ex dulciarijs mellitjs, placētam dato ex amygdalis modice tostis, & paucis pineis nucleis, & cni ci semine contuso & cribrato, ac modico pipere apparatus. Ex bellarijs, parum ex caricis aridis concedito, & uuas passas pingues, amygdala tosta, pistacia, & terebinthos tostos, & cicer tostum, cnico cum eis torrefacto & muria adstillata. In potu aqua calida eis omnino cōuenientior est: sed uiribus restaurandis, uinum album & tenue, ac nō ualde uetus in coena post cibos detur: quā minimū tamen potēt, in sitis tantum expletionē. Reliquæ portiones ex uino & melle cōfectæ, propomata Græce peculiariter appellatæ, uitandæ. Acetum autem mulsum non in cōmode exhibetur tū ieiunis, tum inter cibos, si stomachus tolerare possit. Somnus porro diurnus nocuius elephanticijs est: nocturnus autem aptissimus. Post longū à coena interstitiū, deambulatio lenta ac sensim facta cōmoda est, quo cibi eo melius descendant. Matutinarū uero excitationū sint studiosi. Coitus affectioni infestissimus est. Etenim non reperias ullum aliquē temere, qui exectus ab elephantia si apprehendatur, neq; etiā facile mulierem. Fortē ob id quod ab utili ac bono humore seminis emissio prodeat, aut quod largior generatio ipsius in seminarijs locis ob materiæ spissitudinē contingat. Multo itaq; semine elephantia si correpti abundant. Non tamen absurdū fuerit puerorū gignendorum gratia per rariora interualla coire, neq; enim in totū contagiosæ successiones ipsius affectionis in omnibus fiūt. præsertim si quis optime dispositus, ad uenerem incitetur. Quod si succedat curatio, etiam ad quotidiana uitæ munia obeunda demittantur, & longis peregrinationibus sanitati uberius cōsulant. Si uero non succedat, procul à mari & urbibus segregentur.

De pruritu, Archigenis.

Cap. cxxvi.

In omnibus pruritibus uenæ sectione utendum est, si iuuenes sint, & multo sanguine redundēt qui ex eo laborant, & nihil aliud impediāt eam admittere: particulatim autē & paulatim eum detrahē oportet, & quandoq; sequenti die sectione repetita rursus auferre: deinde restauratis uiribus, per purgatiuū pharmacum alius subducatur. Lauādī sunt omnino quidē ieiuni, quandoq; tamen ubi parum quiddā cibi acceperint, à concoctione autem secundo lauentur, ægre enim humectari potest malum. Radenda etiā pilis obsita, & cum maluæ syluestris aut satiuæ, aut betæ, aut fœni græci, aut sesami, aut fursurū decocto repurganda. Totum uero corpus ex farina fabacea, aut lupinorū, aut myrobalani conspergatur. Quod si diutius duret affectio, fomenta quidē & lotiones ex saluæ, myricæ, mercurialis, origani,

pulegij, baccarum lauri, radicū cucumeris agrestis decocto adhibeantur: ex lixiuio item & muria acida. Corpus uero nitro tenuissime trito conspergatur, uini fece usta & arida adiecta. Aut cum hac mixtura: Spumæ nitri albæ, sulphuris uiui, alcyonij usti, singulorum æquales partes committe, & insperge. Si uero intensiorem uim eius facere uelis, etiā uerratum album adde. Eaq; simul citra pinguium amixtionem corpori insperge. Aliud, bonum & mitius. Spumæ nitri librā unam, thuris lib. i. cimolix sexuncem. Aliud. Atramenti sutorij, thuris, sulphuris uiui, nitri, æquales singulorum partes in uino terito, & in prima balnei domo illinito, deinde lauato, & cum uino & oleo inungito. Aliud, ad pruritum totius corporis. Plumbaginis, spumæ argenti, nitri, cimolix, iridis, chamæleonis nigri radicis, pumicis, aluminis, sulphuris uiui, samfuci, lapidis specularis usti, omniū æquales partes committo, ac utitor in balneo. Aliud smegma ad pruritum. Nitri librā unam, pumicis usti librā unam, spumæ nitri sexuncem, ostreorum ustorum quadrātem, baccarum lauri, costi, nardi celticæ, singulorum sextantem, cyperi unc. i. folij malabathri quantum uolles odoris conciliandi gratia: contulis & cribratis utere in balneo. Aliud, faciens & ad psoras. Sulphuris, nitri, spumæ argenti, pumicis usti, cumini, omnium parem modū sume & utere. Inungēdi sunt & aceto ac oleo in quibus staphis syluestris sit contrita, pulegij item ac thuris æquis partibus cū oleo & uino tritis. Frequētius uero cum cimolia in uino madefacta eos expurga, aut cochleas terrestres uistas & tritas cū melle adfrica. Optimum autē est & hoc in balneo. Mellis partes duas, aluminis liquidī partem unā. Coquito ad permutationē aliquantulā, ac utitor primū in sole, deinde in prima balnei domo: atq; ubi parum humectati fuerint, thus cū sulphure uiuo, & nitro, & gummi, æquali pōdere trita arida corporibus eorū inspergito. Critonis, ad pruritum uehementiores. Foliorū lauri uiridium fasciculum, salis pinguis cyamū unum, aceti sextarium unum, olei lib. iii. Omnia simul coquito, atque ubi bis aut ter efferbuerint, ab igne auferto, & frigesieri finito, deinde oleū segregatum inungito. Aliud, ad ægre tolerabiles pruritus. Fecis uini uste, nitri assati, cimolix, cuiusq; lib. i. staphidis syluestris quincuncē, iridis trientem, aceti sextarios quatuor, olei lentiscini sextarios duos. Arida contusa & cribrata humidis excipito. Vfus eius est in sole, aut in balneo. Aliud, Critonis. Radicis rumicis, fœni græci, gummi, singulorum drach. duodecim, sulphuris uiui, aluminis liquidī, cuiusq; drac. iiii. myrobalani, cimolix, fecis uini uste, cuiusq; drac. sedecim, aceti sextarios duos, olei sextariū unum. Committito ac utere ut dictum est. Efficax est & id quod ex rumicis radicibus ad elephantia si est præscriptum. Probe facit etiam ad omnem pruritum, inquit, oleum in quo rhododaphne incocta sit illitum. Aliud, ad intolerabilem pruritum, & qui domari non potest. Cæterum quum neque uenæ sectio, neque defricatio aliqua quicquam profuisset, quidam ex huius remedij usu malum exuperarūt. Testudo terrestris uiua in oleo coquitur, & ex oleo corpus inungitur. Sedāt & pruritus ualde egregie, mori folia arida trita affricata, & portulaca trita per se, & perdiciū, & apijum cū sulphure



phure uiuo & sale. Quū uero caliditas multa affue-  
rit cum pruritu, prisanę succus commodissimus est,  
tum per se, tū modico aceto ammixto. Quod si uehe-  
mēter urgeat afflictio, quēdā ex prædictis smegma-  
tis ad prisanę succū ammisceto. Vitandæ autē sunt  
insolationes, præsertim in æstiuo sole. Aqua autem  
marina maxime frigida conuenientissima est pruri-  
tui. Quare tentandū est ut æger bis & ter in die pro-  
be perfrictus in ea nater: bis quidē ante prædium, se-  
mel uero circa uesperam. Diæta boni succi & uentri  
commoda eligatur. Et si alius adstricta sit, catapotia  
ex aloë sex numero in erui magnitudinem formata  
post cōnā præbe. Abstineat æger ab omni acriū ci-  
borum esu, & ab omni falso edulio, & à cunctis ole-  
ribus crudis. Ad scabiosos pruritus. Cæterum ad  
pruritus scabie perplexos, lac scissum assidue adhi-  
bitum cōmodum est, & smegmata omnia prædicta  
utiliter adhibētur. Priuatim autē hæc. Myrrhā cum  
aceto & oleo tritam illinendam præbe donec exu-  
dēt. Sinapi item & myrobalanū cum aceto & oleo  
eodē modo. Aliud. Spumæ nitri, alcyonę usti,  
sulphuris, singulorū æquales partes tritas & linteo-  
lo exceptas in oleo madefacito, & deinde ex arido  
accipito, locosq; donec erodantur defricato, atq; ita  
aqua abluito. Aliud. Ammoniā salis, nitri assati,  
sulphuris uiui, singulorū unciam unā, myrti aridæ  
sextantem. Vtere sicco. Aliud celebre. Farina cicerū  
cū caprini stercoreis pari modo utitor. Aliud ad pso-  
ras, pruritus, uirilignes, & imperigines. Bituminis,  
sulphuris uiui, thuris, buccinorū ustorū, æquales par-  
tes cum aceto & melle tritas adhibe. Optime facit &  
pulegium cū mannæ puluisculo ex oleo & uino il-  
litum. Vnguentū ad pso-  
ras. Hederæ folia tenerri-  
ma & modicum salē cum uino & oleo trita illinito.

Aliud. Oleum amygdalinū uinumq; ac butyrum  
conquassata illinito. Aliud. Aloës, cerusæ, spumæ  
argenti, syrici, plūbaginis, glaucij, recrementi argen-  
ti, saponis constāini, singulorū æquales partes, aceti  
& rosacei, quantū satis est. Vtere in balneo. Aliud,  
ualde celebre. Nuces rancidas quindécim, sulphuris  
uiui quadrātem, gari pontici quantū usui opus fue-  
rit: tritis utere in balneo. Aliud. Perdiciū herbam  
cum sale & sulphure affricato. Aliud, experimen-  
to constans. Nuces rancidas quinquaginta, salis ma-  
nus plenæ mensurā, sulphuris uiui unc. i. tritis utere  
in balneo ad defricationē, oleo nō adhibito: atq; ubi  
exudarit, ægrū in solium calida expletū demittito,  
indeq; egressum rursus defricato, & statim rursus in  
solium demittito. Aliud præsens remediū. Panis  
aridi, nucū iuglandium rancidarū, æquales partes,  
sulphuris uiui, paulo plus q; pro panis mensura, o-  
ptime terito uino austero affuso, donec ad strigmen-  
torū spissitudinē redigantur, & absq; oleo in balneo  
affricada præbeto. Aliud. Saponis gallici, nitri, pu-  
micis, sulphuris uiui, perdicij herbæ, cuiusq; unc. i.  
adipis porcini recētis unc. xviii. carpobalsami dra-  
chm. iiii. Vtere in balneo. Vnguentū optimū ad pso-  
ras. Picis sexuncē, ceræ quadrātē, & uncia dimidiū, spu-  
mæ nitri sextantē, sulphuris uiui sextantē, olei myr-  
tei quod satis est, ut ad strigmentū solidioris crassitu-  
dinem redigatur. Vtere in balneo. Aliud. Pyretri  
drachm. iiii. herbæ lanariæ drachm. iiii. scēni græ-  
ci drac. viii. confusa & cribrata reponito. Vsu uero  
expetēte quantū tribus digitis apprhēdi potest ac-

cipito, & cū aceto acerrimo conquassato: deinde ro-  
saceo sufficēti addito unā cū smegmatis illinito. A-  
liud. Aluminis scissilis, spumæ nitri, sulphuris uiui,  
cuiusq; sextātem, staphidis syluestris sexuncē. Aceto  
& rosaceo diluta illinito. Aliud ad inueteratas pso-  
ras. Atramentū sutorium cū lacte & rosaceo tritum  
illini, quidā uero cum adipe suillo utuntur. Aliud.  
Chalcitidis, misyos, æquale pondus, tritis cū uino &  
rosaceo utitor. Aliud. Nitri assati, sulphur uiuum,  
alumen ustu, æquis partibus cū oleo circūlinito. Fa-  
cit & centaurea arida trita adfricta, similiter & cha-  
mæpitys. Aliud. Raphani succū cum ouo in bal-  
neo diligēter illinito, & in paucis diebus curabit æ-  
grum, idē & rapi succus cū ouo probe facit. Aliud,  
ad pso-  
ras. Spumę argēti trientē, oua integra quinq;  
aceri lib. v. & dimidiā, olei myrti sextariū unum:  
trita illini. Aliud, ad pso-  
ras sanie fluētes & foetidas.  
Mali punicæ ramulos teneriores aut folia tusa teri-  
to, aqua aut posca prout melius iudicaueris affusa: il-  
line assidue, & miraberis. Aliud, ad pso-  
ras ægre cu-  
rabiles, & principū elephantiasis. Serapiadis trite-  
sticularis manus plenæ mensurā, radicis altheæ tan-  
tundē, hyoscyami uiridis tantundē, myrti uiridis tan-  
tundē, scillam unā mediocris magnitudinis aut par-  
uas duas, olei sextarios tres, aceti sextarios tres, spu-  
mæ argenti dodrantē, cerusæ trientē, croci sesquiun-  
ciam, candidū ouorum decem. Spumā argenti, ceru-  
sam, & crocū cum aceto terito, herbas uero cū oleo  
& reliquo aceto coquito, percolato, ac tritis affun-  
dito & cadida ouorū addito, unito, utitor. Ego uero  
& perdicadem herbā adieci, & in magnis affectio-  
nibus etiā chamæleonem, & rosmarinum herbam.  
Aliud ad pso-  
ras, quo usus sum in elephantiasis prin-  
cipio. Nitri, aluminis, sulphuris uiui, ceræ, cuiusq;  
sextantē, picis trientē, olei in quo rhododaphnæ co-  
ctæ sint lib. i. Cæterū ego sulphuris uiui sexuncē cō-  
ieci, & pro arida pice liquidā indidi: & corpore ex  
his illito usq; ad miraculum profeci. Verū ubi iam  
ad cicatricē perducta essent ulcera, sulphuris sextan-  
tem, & picem aridā inieci. Ceratū ad pso-  
ras, ualde  
celebre. Colophonix unc. i. ceræ unc. i. emplastri ex  
succis sesquinciā, myrti quadrantem. Vsu expetēte,  
si quidē pso-  
ræ fuerint asperiores, ipsū ut habet adhi-  
be. In exulceratis uero rosaceo liquefacito, ac utitor.  
Aliud, quo in exulceratis pso-  
ris per omnia utimur.  
Cerę sextantē, picis aridæ sextantē, emplastri ex suc-  
cis quadrantem, rosacei trientē: liquefacito, ac utitor  
ueluti eo quod præter opinionē auxilietur. Cæterū  
si diuturna sit affectio, subscriptis uteris: Epithema  
præclarū: facit & ad ulcera cicatricē difficulter reci-  
pientia. Aeruginis unc. i. atramenti sutorij unc. i. ce-  
ræ uncia unam, adipis porcini recentis sextātem, li-  
quefacta aridis cōmittito & imposito, ac post tri-  
duum soluito. Facta uero exulceratione, uelut igne  
ambusta curato. Aliud epithema. Sandarachæ unc.  
i. ammoniaci unc. unam: terito, & terebinthina exci-  
pito, ut emplastri accipiant formā, & præfricto lo-  
co, pellicula excepta imposito, ac post dies quinque  
soluito. Vbi uero tectoriū ulceri fuerit inductū, eo-  
dem pharmaco donec tectorium excidat, utitor. Ad  
exulceratā autem cutē his quæ ambustis cōueniunt  
utendū est: & maxime emplastro ex hordeo appa-  
to. Porro ubi in callū induruerit affectio, magisq;  
fuerit exacerbata, sequentibus utendum erit. Epi-  
thema



thema ad pforas in callum obturatas, & ad leprosas dispositiones, pharmacum prospere accommodatum. nam & callos coercet, & ex profundo extirpat, & ulcerationes ad cicatricē perducit, solū enim ea quæ præter naturā accreuerunt corpora cōtingit. Farinæ lupinorū tenuissime tritorum, syluestrium quidem malim, si adsint, aut satiuorum, si illi haberi nō possint, uncias quatuordecim, farine loliaceæ septuncē, nitri rubri sexuncem, picis liquidę italicū sextarium unum, aceti acerrimi italicū sextarium unum, terebinthinæ bessē, picem, cū aceto coquito, & ubi unita fuerint terebinthinā adijcito, & ab igne ablata aliquo modo frigefieri sinito, & inspersis ac infartis farinis, assidue agitato, deinde ad ignē lentissimum admotum coquito indefinēterq; agitato donec pharmacū à testa in qua coquitur, incipit separari. Quo factō ipsum in mortariū trāslatum & probe tritum reponito. Vsu uero exigente præfrictō ex nitro loco, linoleo exceptum nouo & denso imposito, ac post tertium diē soluto, & alia noua splenia cōcinata imposito, atq; id usq; ad perfectā sanationē facito. Oporret autem nō modo hoc epithema, uerum etiam alia quæ ex aceto & pice cruda apparantur, in loco sub diuo apparare. Facile enim dehiscunt & dissipantur. Heraclides in æreo uase coquendū esse admonet, & terebinthinā postremā coniiciendam. Oribasij, ad ulceratas & feruidas in furis eruptiones. In balneis quidē myrobalanū & sulphur cum liquido cerato leuiter illinito; postquā uero frigida aqua solium inscenderit, ex oleo myrteo cū uino inungito, aut ex rosaceo aut lentiscino eodem modo. Potes & lentiscino citra uinū uti. Ad pforam, Magistriani, ualde necessariū. Rhododaphnes ramulos in oleo coquito, deinde nuces rancidas & sulphur uiuum in mortario terito, infusoq; ad ea oleo simulq; trito, locos in sole illinito, & post horam lauato, & sanabis. Aliud, præter opinionē ad pforas faciens: Cerusæ, spumæ argenti, sulphuris uiui, ceræ, singulorū sextantē, oua numero duo. Oua recētia in aceto per tres dies ac noctes macerato, deinde unā cū putaminibus trita, reliquis probe tritis aridis ammisceto, & cerā cum rosacei libris duabus & dimidia liquefactam cum eis cōmittito, ac utitor in balneo pro unguēto. Aliud ex ochra, ad pforas cōmodum. Spumæ argenti trientem, cerusæ unc. i. ochræ sextantem, cadmiæ unc. i. ceræ trientem, olei myrtei lib. ii. arida cum uino terito, & liquefacta affundito, ac utitor.

Ad pruriginosas papularū eruptiones. Cap. cxxvii. Diphryges cum aceto illinito, & mori radicem ex aceto, plumbaginem, rubiginem ferri, misy, cyclamini radicem, omnia ex aceto: alumen omne melle coctum, rutam cum sale & oleo, cerusam & argēti spumam ex aceto, rutam cum cerato myrteo quadrupla parte. Aliud, ad pforas, humentes lichenēs, pinguesq; & tumentes ac multo humore manantes, mirabile. Cadmiā uino & oleo tritam illinito. Ad omnem pforam ulceratam cum pruritu aut dolore, & ad ulcera capitis manantia, erysipelara, & herpetas. Plumbi usti, cadmiæ, plumbaginis, cuiusque unciam unā, scorix argēti quæ & helcysma sesquunciam, spumæ argenti sesquunciam, uini & olei omphacini aut rosacei quantum sufficit. Vtere ad omne ulcus aut papulam in toto corpore. Præter opinionem enim facit, præsertim in infantibus. Aliud, ad pforā

asperiorē & tubercula, optimū. Cadmiæ, cerusæ, sulphuris uiui, mastiches, cuiusque unc. i. ceræ quincuncem, rosacei dextantem. Vtere, locos ex eo integendo. In balneo autem ex pharmaco unciam unam, & saponē sesquunciam misceto, ac illinenda dato.

Ad pustulas psyrdracas Græcis appellatas, & ad papulas ex feruore aut sudore obortas.

Cap. cxxviii.

Fiunt in toto corpore pustulæ, dolorem inducentes citra saniei collectionē. Eas eczemata, ab ebulliente feruore Græci uulgo appellant. In his plumbago conuenit cum uino aut lentiscino oleo trita, aut cerusa cum uino & oleo myrteo: aut minium sinopicum cum adipe suillo recēti, aut misy assatum cū uino & rosaceo. Ad exulceratas pustulas. Vbi uero exulceratæ fuerint pustulæ, subscriptis utendum erit. Scoriam plumbi, & spumā argenti, pari pondere uino & oleo myrteo excepta illine. Aliud. Malicorij, spumæ argenti, atramentī sutorij, singulorū æquas partes, cum uino & rosaceo illine. Aliud. Baccharum myrti nigrarum, malicorij, atramenti sutorij, spumæ argenti lotæ, singulorū æquale pōdus, cum uino & oleo myrteo illinito. Smegma, ad pustularum eruptiones. Farinæ fabarum, pisanæ mola tritæ, radice polygoni contusæ & cribratę, terræ cimoliæ tostæ, singulorum drach. ii. spumæ nitri albæ drachm. i. thuris tenuissime triti tantundem. Vsus eius in balneo est. Ex eo autem quātum sufficere putaueris accipito, ac cum oui candido subigito: deinde corpus ex eo circumlitū exudare sinito. A balneo autem ex rosaceo aut myrteo corpus illinito. Aliud smegma. Cimoliæ drach. ii. farinæ erui drach. ii. quod ex myrobalano cōtusa & expressa reliquū est tantundē, iridis tusæ drach. ii. nitri drach. ii. myrti siccæ tusæ drachmæ dimidiū: tritis utere ut dictū est. Aliud. Radicis hyoscyami contusæ drach. i. farinæ lupinorum drach. i. cimoliæ drachmæ dimidiū, iridis drachm. iii. & dimidiā: tritis utere ut dictū est.

Oribasij, ad nigras cicatrices inalbandas.

Cap. cxxix.

Spumæ argenti, mentæ, thuris, æquales omnium partes, cum melle utitor. Aliud. Stercoris crocodili drachmas decem, thuris drachmā unam, cerusæ drachmas duas: aut ex aqua, aut cum cerato cyprino mixta illinuntur. Aliud. columbinum stercus ex aqua illinito, ipsumq; cito abluito, ne exulcerationē inducat. Aliud. Cimoliæ, stercoris columbini, saponis, thuris, singulorum pares partes cum aceto illinito. Aliud. Hirundinis stercus ex aqua illinito. Aliud. Saponis, stercoris canini albi, ceræ, olei inalbari, æquales omnium partes cōmitte ac utere. Aliud. Nitri, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, sulphuris uiui, singulorū æquas portiones in aceto albo terito, aut uino & aqua trita modice illinito, ne exulceratio succedat. De imperigine, præscriptū est Sermone octauo. De herpete, & similibus, in Sermone quarto decimo. De uerrucis, tum quæ myrmecia, à formicis, tū quæ thymi, à similitudine cacuminū thymi appellantur, item in decimo quarto Sermone scribetur. Ad papulas autē infantium, in quarto Sermone tractata sunt remedia.

Ad ulcerosas papularū eruptiones, tum in tibijs, tum in toto crure obortas.

Cap. cxxx.

In balneo ex myrobalano & sulphure cerato liquido exceptis



exceptis leuiter illinantur, & in aquam leniter calidam demittantur: postquam uero frigida aqua solium insederint, loci ex myrteo oleo cum uino, aut rosaceo, aut leniscino cum uino inungantur. Leniscino etiam per se utendum. Probe faciunt ad eas & mali punici putamina uino cocta & trita, ac cerato modico liquidiore ex myrteo aut rosaceo oleo apparato excepta, & illita. Facit & myrsinatū dictum pharmacum, & emplastrū ex hordeo cum largo rosaceo aut myrteo dilutum & illitū. Aliud. Valde commodum & hoc est, quod in adoleſcētulo quopiam sumus experti, qui pſoram multam inueteratam iam ac asperrimā circum crura habebat, quæq; à genibus usq; ad pedum digitos procedebat. Semen lini cum aqua cōtūsum quā crassissime illinito, & assidue tanquam uehemēter approbato utitor. Aliud, ualde efficax. In quodam qui asperrimam pſorā circum crura habebat cognitum, in quo adeo affectio ipsa inualuerat, ut elephantiorum corporibus nō abſimilis eſſet: qui sanē in paucis diebus sanatus est. Sulphur uiuum quā tenuissime tritum, amurca & oleo exceptum, in balneo ad defricationē exhibeto, & post balneū ex eodē illinatur.

*Ad cicatrices nigras ex ulceribus relictas.*

*Cap. cxxxii.*

Quandoquidem uero in profundorum ulcerū curationibus, cicatrices nigræ conſtantur, etiam de his dicere operæ pretium fuerit. Differunt autem cicatrices à uirilagine nigra, quæ alphos appellatur, in hoc quod leue corpus habent. Vitiligo enim tum ad speciem, tum tactui aspera ſubiacer. Ad nigras itaq; cicatrices ſubſcriptis utendū est. Plumbi uſti, ſpumæ argenti, æquales partes cum uino tritas, & in cerati crassitie redactas, reponito. Vbi uero uſus expetit, uino & rosaceo liquefactas, & ad pinguis emplastrī ſpiſſitudinē deductas, illinito. Aliud. Sulphuris uiui, & myrobalani, æquas partes cum aqua illine, aut terebinthina exceptas, & uestis detritæ panniculo infartas impone. Aliud. Myrobalani unciam unā, ſtercoris columbini unciam unam, melanthij sextantem, tritis utere pro ſmegmate, poteris & cū aceto illinere. Aliud. Myrobalanū, sulphur uiuum, alcyonium, cum aqua ad ſtrigmentorum ſpiſſitudinem redacta illinito. Aliud. Buccinorū uſtorum sextantem, thuris unciam unam: illine cum aceto. Orisbanij, ad cicatrices nigras. Radicis cucumeris ſylueſtris uiridis drachmas duodecim, adipis ſuilli recentis drachmas quindecim, aluminis ſciſſi drachm. ii. sulphuris uiui, nitri, cuiusq; drachmas duas. Aliud. Spumæ argenti, cerusæ, æquales partes lotas terito, & cum oui candido illinito. Smegma, cicatrices inalbans. Cimoliæ, ſtercoris columbini, ſaponis, thuris, æquales omnium partes cum aceto adfricato, & rursus ex eodem illinito. Aliud. Veratri albi drachmas duas, thuris drachmas duas, ſpumæ nitri drachmam unam, cimoliæ drachmā unam. Vtere cum aceto. Aliud. Bryoniæ radicē conciſam, in oleo donec ſucculenta reddatur coquito, & oleū ipſum assidue illinito. Aliud. Erucae ſemen cū felle bubulo, aut alio quod haberi poſſit, illinito. Aliud. Spumæ argenti sextantē, sulphuris uiui unc. i. erucae ſucco trita illini, ubi uero exaruerint, laua. A balneo uero ex ſola argenti ſpuma cum erucae ſucco illine. Aliud. Talum ouillū uſtum cū uino terito, ac illi-

nito. Paſtillus ad cicatrices nigras in quacuncq; corporis parte. Cornu ceruini uſti, buccinorū uſtorū, ſpumæ argenti, cerusæ, thuris, alcyoniū uſti, ſingulorum unc. i. piperis ſeſquunciam, sulphuris uiui ſeſquunciam, gummi unciam i. cum uino paſtillos, quæadmodum noſti, formato. Alius paſtillus, per experientiam concolores cicatrices faciens. Lapidis pyritæ, comæ abſinthij, lupinorū amarorum, pompholygis, cimoliæ, ſtercoris columbini, myrobalani, melanthij, æquales ſingulorum partes in paſtillos cum aceto cogito, ſimiliterq; utitor. Ad cubitorum & coxædicum nigredines ex cinctura obortas. Alcyonium uſtum, ſi quidem tenera cute præditus ſit, cum aqua: ſi uero duriorē cutem habeat, cū aceto ſtatim à balneo illinito. Smegma idemq; illitio, ad nigras in toto corpore cicatrices. Farinæ fabarum Italicam choenicem unam, baccarum lauri drach. viii. ueratri albi drach. viii. myrobalani drach. iiii. ſpumæ nitri drach. iiii. contuſa reponito. Vſu uero exigente, cū aqua illinito. Vtere & pro ſmegmate in balneo. Aliud. Farinæ erui, ſpumæ nitri albæ, radicis bryoniæ, alcyoniū aſperi, myrobalani, ſingulorum æquales partes committito, ac utitor, ut dictum eſt.

*De uirilagine, ſeu alphi.*

*Cap. cxxxiii.*

Viriliginum, quæ alphi Græcis dicuntur, generatio eiusdem ſpeciei eſt cū leuce & lepra, nō tamen omnino in profundo caro in eis affecta eſt, ſed ſumma tantum cutis, & uelut ſquamulæ quædam uiriligines ipſæ affixæ inherēt, albæ quidem ex pituita, nigre uero ex atræ bilis humore obortæ. Dictus eſt autem Græcis alphas, ex eo quod colorem cutis immutet: immutare enim apud ueteres, *ἀλφαινάν* dicebatur. Ad albas igitur uiriligines & nigras cōmuniter faciunt, folia ſici, sulphur uiuum, alumen, æqualibus partibus cum aceto illita: quare eis ut præſtantiffimis utaris. Aliud, ad utraq;. Calcem aqua multoties lotam in æſtuo ſole deſiccato: uſus uero tempore cum aqua liquefactam dilutiorem illinito. Ad nigras uiriligines. Ad nigras uero uiriligines priuatim ſubſcriptis utendum eſt. Veratri nigri, terræ cimoliæ, æquales partes aceto aut aqua dilutas, & ad ſtrigmentitiam ſpiſſitudinem redactas in ſole illinito, præſcripto antea loco. Aliud. Radicis narcissi, ſeminis urticæ, cuiusque sextantem, nitri rubri unc. i. cum aceto illine. Aliud. Veratri nigri, nitri, æquis partibus ex aceto utere. Aliud. Cochleas terreſtres uſtas & cum melle tritas, poſt modicū temporis interuallum affricato. Ad inueteratas nigras uiriligines, & ſuperficie iam in callū indurata, ſubſcriptis utendum eſt. Radicis chamæleonis nigri dodrantem, sulphuris uiui sextantem, ſpumæ nitri unciam i. Vtere in aceto diſſolutis illinendo ad ſolem. Aliud. Alcyoniū sextantē, nitri sextantem, ſtaphidis ſylueſtris unc. i. sulphuris uiui unciam i. hæc arida adſeruato, primumq; pſilothro utitor, & interiecta una die corpus in balneo humectū ex aridis conſpergito, & ſudorē ab eo excludet. Aliud. Alcyoniū uſti, ſpumæ nitri, sulphuris uiui, ueratri nigri, ſingulorum æquas partes cum aceto illinito, & cum eodem etiam in balneo defricando repurgato. Aliud odoratum efficaciffimum. Veratri nigri drachm. viii. iridis, ſpumæ nitri, coſti, cuiusque drachmas quatuor, cum aceto illinito, & in balneo citra pinguitudinis ammiſtionem affricato. Optimè facit &



ad hæc, id quod ad albas uutiligines apparatus adia-  
ptoton, ex eo quod citra opem non dilabatur, inscri-  
ptum. Smegma ad nigras uutiligines. Radicem  
cucumeris syluestris contusam & cribratā affrican-  
dam exhibeto. Aliud. Foliorum fici in umbra  
desiccatorum drach. VI. similaginis drach. IIII. nitri  
drachm. VIII. alcyonij drach. VIII. contusa, cribrata,  
reponito. Ante usum autem ad solem exudare affe-  
ctum oportet, deinde inspergere, & sinere exiccari,  
deinde citra olei ammixtionem defricare. Hoc in  
quinque diebus uutiligines curat. Aliud. Melan-  
thij, ueratri albi, costi, singulorum drachm. IIII. nitri  
drachmas XII. Vtere in balneo citra pinguium ad-  
mixtionem. Manifestum est autem, etiam si nullus  
dicam, quod prius ex hiera Galeni corpora purgare  
oporteat, aut ex colocynthide & aloë catapotijs. De-  
inde uero subscriptis uti. Bulbos cum aceto tritos il-  
linito. Poteris item purgatiuis ex ueratro nigro &  
epithymo uti. Ad uutiligines albas. Hos itidem  
prius cum Galeni hiera purgare oportet, aut per ca-  
tapotia ex colocynthide & aloë formata, deinde se-  
quentibus uti. Dracunculi radicem, aut ari radicem,  
cum farina ordeacea ex aceto illinito. Aliud. Bul-  
bos tritos cum aceto illinito. Aliud. Altheæ semen  
cum aceto tritū illinito. Aliud. Bryoniæ radicem  
concisam cum oleo decoquito, donec oleū inde suc-  
culentū reddatur, & assidue illinito. Aliud. Bac-  
carum lauri, cimoliæ, nitri, æqualibus partibus ute-  
re cum aceto. Illine autem ad solem, & post paruum  
interstitium aqua ablue. Aliud. Fœni græci trien-  
tem, spumæ nitri sextantem, alcyonij usti unc. I. cum  
aceto illinito. Eodem etiam pro smegmate in bal-  
neo utitor. Aliud ualde efficax. Alcyonij usti, sul-  
phuris uiui, ueratri albi, spumæ nitri, æqualibus par-  
tibus in balneo ad defricandū utere: cum aceto item  
in sole illine. Aliud adiaptoton, quod citra opem  
non dilabatur, appellatum. Radicis chamæleonis al-  
bi drach. VIII. alcyonij usti, sulphuris uiui, atramen-  
ti sutorij, spumæ nitri, cardamomi, pyretri, foliorū  
fici syluestris, aluminis liquidi, pulueris calcis uiuæ,  
qui parietibus adhæret domus, in qua calx reposita  
est, singulorū drach. IIII. tere, & in sole cum aceto il-  
line, egro prius in balneo ex eo defricato. Facit & ad  
uutiligines nigras. Aliud ad nigras ac albas uutili-  
gines celeberrimum. Myrrhæ, sulphuris uiui, spu-  
mæ nitri, ueratri albi, cuiusque sextantem, alcyonij  
usti sexuncem. Vtere confidenter pro smegmate in  
balneo: & in sole item cum aceto illinito.

De leuce uutiligine altius insidente, Galeni.

Cap. CXXXIII.

Pituitosus & lentus ac uiscosus sanguis, & affectorum  
locorū debilitas, causæ sunt ob quas leuce generatur.  
Quum enim ex pituitoso simulq; uiscoso sanguine  
caro per multum tempus cōnutritur, facilmè leuce  
omnis per profundū ipsius pituitosa oboritur, neq;  
potest amplius delatum ad locum nutrimentum ad  
propriam naturā in rubedinem transmutare. Acce-  
dit his, quod & ipse qui ad locum influat sanguis pi-  
tuitosus, ueluti prædictū est, existit. Qualem igitur  
locusta, aut cancer fluuiialis, & ferè omnia exanguia  
ostrea ex natura sua carnem habent, talem habent &  
ex trāsmutatione, ac in aliā speciem degeneratione,  
hi qui leucis corripiuntur. Etenim hanc carnis affe-  
ctionē ita appellāt ab albo colore nomine accepto,

Quum enim in pilo obsitis locis leuce oboritur, pi-  
lo locos ipsos non denudat, sed canos omnino facit.  
Si uero loci pilosi glabri & pilis nudi reddantur,  
incurabilis leuce censetur. Ad leucas igitur subscri-  
ptis remedijs utendum est. Fici syluestris nigræ uir-  
gultorum lib. I. rutæ sexuncem, misyos unc. I. calcis  
uiuæ uncia I. aceti acerrimi quantum satis est. Con-  
tere obnixæ & pastillos informa, eosq; in umbra re-  
sicca. Vsu uero exigente illine in sole, loco prius con-  
fricto: & si bullæ oboriantur, eas acicula penetrato,  
& ceratum imposito. Aliud. Fici nigræ uirgulta  
in aceto macerato, & quā tenuissimè terito, eisq;  
spumæ nitri, sulphuris uiui, fructus myricæ, singu-  
lorū æquales partes ammisceto, & locum cum nitro  
prius defricato, indeq; in sole illinito, diligenter ob-  
seruans ne ulceratio ex eis consequatur. Aliud. Fi-  
ci nigræ folia uiridia in aceto macerato: sit autem  
aceti tantū ut ea superet & penitus contegat, deinde  
contusa & trita cum sufficte calce uiua misceto, &  
locis prius exterfis in sole illinito, usquequo lētigini  
similem imaginem ipsa leuce induat, atq; deinde fici  
succum recentem supra istam illitionem inducito,  
ipsamq; leucen solam aliquandiu confricato, & ne  
uicinas partes exulceres obseruato. Egregiè enim au-  
xiliatur. Aliud, ad leucen diuinum donum: facit &  
ad lepram. Sandaracham terito, eiq; nucum iu-  
glandium uiridem testam adijcito, ac adfuso aceto,  
rursus simul probè terito, & loco prius deterfo, in  
sole illinito. Quod si acre ægro appareat, paucū pa-  
nem ammisceto, & assidue lauato. Aliud, ex cuius  
usu sæpiculè laudem adeptus sum, citra exulceratio-  
nem medetur. Vsus sum eo in muliercula quadam  
quæ in fronte leucen habebat, & ualde egregiè uires  
suas declarauit. Seminis cardamomi sesquiunciā,  
atramenti sutorij sextatē, sulphuris uiui drach. IIII.  
aluminis rotundi & scissi, cuiusq; drac. IIII. cū ace-  
to diligenter terito, locoq; ex nitro & aceto præfri-  
cto, in sole illinito. In quibusdam sanè bullam quo-  
tiescunq; illinitur producit, qua sublata leprā ipsam  
item tollit. Aliud, ad leucas & lepras. Nucum iu-  
glandium immaturarum & adhuc acerbarum exte-  
riorem corticem uiridē detrahito, & fici nigræ syl-  
stris ramulos amputato, & ad hæc spumam argenti  
conijcito, ac cum aceto coquito, terito, & ad unguen-  
ti formā reducito, idq; ipsum in sole illinito. In deco-  
quendo etiam hordei grana septē addito. Hinc enim  
sufficientis decoctionis signum habebis, ubi uideli-  
cet hordei grana cocta uideris. Aliud, Archelai.  
Veratri nigri, radicis bryoniæ, radicis chamæleo-  
nis nigri, sulphuris uiui, atramenti sutorij, misyos,  
alcyonij, foliorum fici nigræ syluestris, singulorum  
æquales partes contusas per angustissimū cribrum  
excusito, deinde in mortarium conijcito, & aceto  
affuso diligenter terito, atque ubi ad liquidissimū ce-  
rati spissitudinē fuerint redacta, in pyxidem plum-  
beam recondito. Vsu autem expetente, loco prius  
cum nitro perfricato, ad solem liquidius pharmacū  
illinito. Summè etiā ad lepras conducit. Ad leucas  
quantūuis crassæ existant. Adarces, canchryos, sul-  
phuris uiui, æquales partes: unumquodque per se  
priuatim contundito & cribrato, deinde simul cum  
aceto ad multos dies sufficienter in sole terito, & lo-  
co prius cōfricto nō acruatim illinito, sed dilutius,  
obseruans etiam in principio ne cutis exulceretur.

In pro



In progressu uero temporis parū quid ex ueratro, tantundemq; ex gallis, ad tria prædicta ammisceto.

Aliud. Olus est in Syria folia habens seridis angusto folio præditæ. Vocatur autem lepidium, & cum lacte conditum, seruatur: cum radice uero eius lanæ tinguntur, & nigrum induunt colorem. Hoc ipsum olus tritum & impositum, cutem liuidā reddidit & attollit, ut excoriatae similis uideatur. Est autē radix eius alba, crassitudine digitali: ex qua in sole siccata corticem detrahare oportet, & per diem unū in acerrimo aceto macerare, deinde mane probè & cōstanter terere, affusio que aceto sufficienti ad strigmentitiam crassitudinem redigere, atque ita repositum adseruare. Vbi uero usus exegerit, locum nitro defricum paulisper transpirare sinito, atq; ita pharmacum ipsum ad calentissimum solem illinito, & quodammodo adfricato, deinde acetum paulatim ad illitum instillato. Quum uero æger uellicationē ac morsum perceperit, eum ad tolerantiam inhortato. Bullæ namque succedent, quas acicula penetratas excoriare oportet. Vbi itaque excoriatae fuerint, si quidem adfectus locus excoriatus concolor appareat, ipsum ut secundum naturam habentem & restitutum sinito, si uero non, rursus ad duos & tres dies idem pharmacum illinito, donec omnino perfectè uideris locum ipsum sanatū. Aliquibus uero ex hac curatione bullæ non erumpunt, uerum locus ipse excoriatur, hos itaque uelut igne ambusta curare oportet. Aliud. Floris mali punici drachmas viii. spumæ nitri drachm. v. alcyonij drach. iiii. sulphuris uiui drachm. ii. Vtere cum aceto. Est item Sic cū optimum ad leucas, & inspergitur postquam exciderint crustæ ex acris pharmacis obortæ. Cæterum ad cicatricem obducendam, & cicatrices reliquo corpori concolores reddendas, aceto excipe, & loco probè præfricto illine. Vbi uero bullæ emerferint, pharmacum ipsum cum melle cataplasmatismodo impone. Efficacius autem fit si pro sulphure, ueratrū nigrum coniiciatur. Smegmatis porrò ad leucen itemq; lepram plurimis ex præscriptis illitionibus uti oportet. Præclarissimè autem ad ipsos Siccū magnum facit, quod Indum inscriptum est, quo etiam ad elephantiasim, & omnem cutis scabridem: ad articulare item morbum, & membrorum resolutiones, & ad hydropicos uti conuenit. Salis ammoniaci, salis communis, salis cappadocici, salis amari, nitri assati, farinæ fabaceæ, pumicis usti, spumæ nitri, singulorum trientem, uerati albi, ueratri nigri, radicis struthij, radicis bryoniæ, cyperorum, aluminis liquidi, aluminis scissi, floris iunci odorati, gummi, iridis, lapidis specularis usti, testarum sepiæ, seminis lini, costi, baccarum lauri, farinæ lupinorū, pulegij, thuris, seminis uiticis, singulorum sextantem, ostreorum ustorum, radicis dracunculi, fecis uini ustæ, pyretri, radicis chamæleonis nigri, sulphuris uiui, staphidis syluestris, sinapis, radicis pæoniæ, samfuci, spicæ nardi, comæ marrubij, foeni græci, grani cnidij, phylli, singulorū unc. i. radicis cucumeris syluestris, cimoliæ, gallarum, singulorum scrupulos xvi.

De lepra Archigenis.

Cap. cxxxiii.

Ex crasso ac uiscofo, & magis atræ bilis humore lepra generatur. Differt autem lepra à leuce & alphi uitiis lignis speciebus, in eo quod lepra aspera est ad contactum, & pruritus locorum inducit. Cutis enim

sola est quæ affecta est, unde & excoriata cute, caro subiecta sana reperitur. In leuce uero, ueluti dictum est, subiecta cuti caro tota per profundum transmutata est ad albidiorē colorē, & superficies affecti loci leuissima est, & confrieta citius rubescit, præsertim in his qui facile curantur. At uero alphi in superficie hæret, & uelut squamæ cuti affixus est. Cæterum à scabie differt lepra, quod in scabie quidē furfuracea quædam cuti inhærentia apparent. In lepra uero quædam uelut magnorum piscium squamæ. Differt autē lepra ab impetigine syluestri, eo quod impetigo orbiculatius semper ad uicinos locos proserpit. Lepra uero non ita eodem modo. Ad lepram igitur faciunt plurima ex his quæ præscripta sunt ad leucē, peculiariter autē talia. Glutinis, saluig, lacrymæ oleæ syluestris, singulorū dra. viii. corticis radicis capparis, gummi, singulorū dra. xvi. Vtere cū aceto illinēs præfrictis in sole. Aliud. Cardamomi, atramenti sutorij, aluminis rotundi, radicis chamæleonis nigri, nitri assati, farinæ lolij, singulorum æquales partes, loco ex nitro præparato, medicamentū hoc in sole impone. Aliud. Atramenti sutorij drachmas duas, sulphuris uiui dra. ii. cardamomi dra. iiii. farinæ lolij, drachmas viii. foliorum fici dra. viii. carnis caricarum pinguium dra. viii. Aceto trita impone, & alternis solue, ac rursus lotis impone. Aliud. Veratri nigri, sulphuris uiui, radicis bryoniæ, nitri, bituminis, foliorum fici, misyos, alcyonij usti, radicis chamæleonis nigri, atramenti sutorij, singulorum æquales partes. Vtere cum aceto ad præfrictos in sole. Aliud ad lepram experimēto cognitum, tollit eam per dies quinque. Aeruginis dra. iiii. resinæ pinus liquidæ dra. iiii. thuris recentis dra. ii. Arida cum aceto terito, & adiecta resina liquata, præfrictis imposito, & alternis soluito, & reperies lepram splenio adhærentem. Deinde uero loco per poscam deterfo ac confricto, ut cruentus fiat, rursus impone. At si exulceratio facta fuerit, per muriā & lenticulam cum melle depurga. Et postea per ceratū ad ambusta paratū curationē perfice. Aliud, ad lepras, ipsas excoriās. Radicis chamæleonis nigri partem unam, succi thapsiæ partem unam, uentriū cantharidum, sulphuris, æquales singulorū partes pice liquida excipe, & loco illine, ubi prius ipsum probè confricueris. Postquam uero bullæ ac pustulæ excitatæ fuerint, lenticulam cum melle impone. Archigenis ad lepram, Magistriani.

Arietis nigri adipem accipito, & locum ex eo assiduè inungito, & in paucis omnino diebus citra exulcerationem, eam tollit. Aliud. Seminis raphani drachmas quatuor, sandarachæ drachmas xvi. lupinorum aridorum decorticatorum, sulphuris uiui, singulorum drachmas xvi. gallarū omphacinarum, ueratri nigri, gummi, singulorum drachmas octo. Aceto excipe, & præfricto ex fici nigre folijs loco, illine in sole. Cum eodem item in balneo citra olei ammixtionem sicco, per dies nouem defricato. Critonis, ad lepram, ueluti Oribasius tradit.

Farinæ lolij choenicem Italicam unam, cardamomi drachmas iiii. spumæ nitri dra. iiii. atramenti sutorij drachmas octo, radices hastulæ regiæ medias quatuor, terito omnia & misceto. Vsu uero expecte quantū satis uidebitur accipito, acetoq; acerrimo coquito, & ubi ad cerati spissitudinem re-

M 4 degeris,



degeris, crassius illinito, loco tamen prius ex nitro confrieto; supernè uero linteolum obligato, idèq; tertio quoque die soluito, frigidaq; abluito, ac rursum illinito. Aliud, ut Oribasius tradit, citra exulcerationem per sanat. Radicis rumicis syluestris drachmas xiiii, gummi drachmas xii, sulphuris uiui drachmas sex, myrrhæ drachmas iiii, gallarum drachmas iiii. Rumicis radices in aceto ad tertias deco-

quito, eisq; tritis reliqua ammisceto, ac simul terito, ad finè uero etiam gummi addito. Vfus autem tempore loco prius ex nitro cōfricto, illinito; sequenti uero die lauato ac similiter curato. Vtere eo & ad impetigines ac psoras asperas ac scabras. Oribasij, ad leprosos. Succis radicis hastulæ regiæ sexuncem, sulphuris uiui drachmas quatuor, mannæ drachmas decem, nitri drachmas octo, illine cum aceto.

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN DECIMO QVARTO SERMONE AETII CONTINENTVR.

- |                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>D</b> E affectionibus sedis. cap. I.                                                                                       | neratorū in ulceribus. cap. xxviii.                                                                                   | inurunt. cap. LI.                                             |
| De inflammationibus sedis. caput II.                                                                                          | De neruorum contusione. cap. xxix.                                                                                    | Excedentia & urentia medicamenta. cap. LII.                   |
| De fissuris sedis, & de tuberculis. caput III.                                                                                | De glandularum inguinis inflammatio ne. cap. xxx.                                                                     | De sinibus. cap. LIII.                                        |
| De thymis in sede ac reliquo corpore nascentibus, sycosi'que, ac uerrucis formicarijs appellatis, item de clauis. caput IIII. | De quacunq; inflāmatione. cap. xxxi.                                                                                  | De sinibus attritam cutem habentibus. cap. LIIII.             |
| De hæmorrhoidibus sedis. cap. v.                                                                                              | De abscessibus. cap. xxxii.                                                                                           | De fistulis. cap. LV.                                         |
| De hæmorrhoidum chirurgia. cap. vi.                                                                                           | De cauis ulceribus nō malignis, & ratio curandorū ulcerum. ca. xxxiii.                                                | De gangrena & sphacelo. cap. LVI.                             |
| Ad anum aut sedē procidētē. cap. vii.                                                                                         | Medicamenta quæ per linamēta induntur, & ad suppurandum, repurgandum ac incarnādum. cap. xxxiiii.                     | De canceratis tumoribus. cap. LVII.                           |
| De prolabantis sedis perustione. caput viii.                                                                                  | De siccis repurgantibus ac incarnantibus, cephalicis appellatis. c. xxxv.                                             | De carbunculis. cap. LVIII.                                   |
| De abscessibus sedis. cap. ix.                                                                                                | De ulceribus in quibus caro superexcre scit, & quæ depreſione opus habent, & de medicamentis siccantibus. cap. xxxvi. | De erysipellate, hoc est, igne sacro. caput LIX.              |
| De ulceribus sedis proserpentibus, ac depascentibus. cap. x.                                                                  | De ulceribus non malignis cicatrice indigentibus. cap. xxxvii.                                                        | De herpete. cap. LX.                                          |
| De fistulis ani. cap. xi.                                                                                                     | Sicca ulceribus non malignis cicatricē inducentia. cap. xxxviii.                                                      | Ad epinyctidas, hoc est, pustulas noctu erumpentes. cap. LXI. |
| Ad intertrigines inter fœmora ex itinere obortas. cap. xii.                                                                   | Emplastra quæ non maligna ulcera cicatrice includunt. cap. xxxix.                                                     | De termintho. cap. LXII.                                      |
| De thymis in pudendis. cap. xiii.                                                                                             | De malignis & agrè recipientibus cicatricem ulceribus. cap. xl.                                                       | De papulis siue pustulis. cap. LXIII.                         |
| De rimis in pudendis. cap. xiiii.                                                                                             | Simplicia medicamenta quæ citra mordacitatem resiccant ulcera maligna. cap. xli.                                      | Ad ambusta ab igne. cap. LXIIII.                              |
| Medicamenta ad rimas ac reliqua pudendorum ulcera. cap. xv.                                                                   | De usu relatorum medicamentorum. cap. xlii.                                                                           | Ad flagellatos. cap. LXV.                                     |
| Ad inflammationes pudendorum caput xvi.                                                                                       | De ligamenti & curationis ratione. cap. xliii.                                                                        | Ad desquamata. cap. LXVI.                                     |
| Ad nomas in pudendis. cap. xvii.                                                                                              | De emplastrorum compositione ad maligna ulcera. cap. xliiii.                                                          | Ad intertrigines. cap. LXVII.                                 |
| Ad carbūculos pudendorum, caput xviii.                                                                                        | De ulceribus quæ post obductam cicatricem rursus rumpuntur. cap. xlv.                                                 | Ad contusa & sugillata. cap. LXVIII.                          |
| Ad interna in meatu urinae ulcera. caput xix.                                                                                 | Ad extremitatum ulcera. cap. xlvi.                                                                                    | De ruptione. cap. LXIX.                                       |
| Ad scabiosum ac pruriginosum scrotum. cap. xx.                                                                                | Ad callos extremarum partium caput xlvii.                                                                             | De uulsione. cap. LXX.                                        |
| De testium ac scroti inflammatione. caput xxi.                                                                                | Ad uermes in ulceribus. cap. xlviii.                                                                                  | Ad luxatos articulos. cap. LXXI.                              |
| De herina aquosa. cap. xxii.                                                                                                  | Ad nomas & putredines ulcerum caput xlix.                                                                             | Ad laxos articulos. cap. LXXII.                               |
| De hernia intestinorum. cap. xxiii.                                                                                           | Sicca crustam inducentia, inter quæ etiam pastilli multi usus. cap. l.                                                | Ad perniones. cap. LXXIII.                                    |
| De hernia inguinis. cap. xxiiii.                                                                                              | De sanguinis eruptione, & quæ crustā                                                                                  | Ad digitorum pterygia, siue reduuias. caput LXXIIII.          |
| De emplastrorum præparatione ac coctura, & quæ in ea coniiciuntur. caput xxv.                                                 |                                                                                                                       | Ad paronychias, id est, unguium abscessus. cap. LXXV.         |
| De cruentorum uulnerum curatione. caput xxvi.                                                                                 |                                                                                                                       | Ad contusos ungues. cap. LXXVI.                               |
| De sauciatis neruis. cap. xxvii.                                                                                              |                                                                                                                       | Ad subcruentos ungues. cap. LXXVII.                           |
| Curatio neruorum denudatorū ac uul-                                                                                           |                                                                                                                       | Ad motos ungues. cap. LXXVIII.                                |
|                                                                                                                               |                                                                                                                       | Ad scabros ac leprosos ungues. caput LXXIX.                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                       | Ad reparandos ungues. cap. LXXX.                              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                       | De anulis digitis impactis. caput LXXXI.                      |
|                                                                                                                               |                                                                                                                       | Ad clauos. cap. LXXXII.                                       |
|                                                                                                                               |                                                                                                                       | Ad plantarum rimas. cap. LXXXIII.                             |
|                                                                                                                               |                                                                                                                       | De crurum ac reliquarum partium uaricibus. cap. LXXXIIII.     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                       | De brachiorum ac crurum dracunculis. cap. LXXXV.              |



# AETII MEDICI GRAE

## CI CONTRACTAE EX VE-

TERIBVS MEDICINAE TETRA-

BIBLI SIVE QUATERNIONIS

QUARTI SERMO SECVNDVS, ET

EX ORDINE XIII.

*De sedis, pudendorum ac scroti affectionibus, & de simplicibus medicamentis quæ in emplastra coniunguntur. Et de cruentis vulneribus & inflammationibus, abscessibusq; ac ulceribus ueteribus.*

*De affectionibus sedis, ex Galeno.*

Cap. I.



**A**FFECTIONES circa sedē ob multas causas difficulter curantur. Nā & ualde tenero sensu prædita pars est: sæpe uero dictū est, tales partes facile ab acrioribus ac austerioribus medicamentis irritari. Et ipse superfluitatū alimenti transitus, tū per se mordax est, tū ob id maxime quod simul cū ipsis pertransit bilis, & aliquando quidā serosi humores. Et adhuc accedit, quod neque præfinitum est Medicis certū tempus ad medicamenta imponenda: sed aliquando etiam tempore non conuenienti, egrī ad recrementorum excretionē progrediuntur. Quin & humiditas ac caliditas locorū, siccantibus simulque frigefacientibus opus habens, non parum efficit ut ulcera egrē curabilia fiant. Mordent enim adstringentia, locus autē ferre non potest morsum, quū subtili sensu præditus existat. Quapropter conueniunt ipsis medicamenta, quæ adstringūt citra asperitatē: qualia maxime sunt ex metallicis, ea quæ neque acria, neque acerbā ualde sunt. Hec enim lora, citra mordacitatem faciūt id quo opus est. Horum igitur in summa memores, materiā experimento cognitam consequenter scriptam habete.

*De inflammationibus sedis.*

Cap. II.

Ad inflammationes ani, siue ex fissuris, siue ex tuberculis, siue ex ulcere fuerint. Palmarum passerum sextātem, panis siliginei unciam unam, croci drachm. II. Palmas & micas panis sapa præmaceratas terito ac illinito. Quum autem inflammatio cessauerit, immunito pane, palmulas & crocum auge, donec curetur. Curata uero inflammatione, utere sicco hoc ad ulcus. Cerusæ & syriaci pares portiones siccās tritas insperge. Facit hoc etiā ad tubercula condylomata appellata. Medicamentū optimū ad sedē, curat fissuras, & tubercula consumit, & dolorē confestim eximit. Sanat etiā ulcera depascētia, ac maligna, & egrē cicatricem accipientia. Deprimit præminentia, & replet caua. Facit etiā ad tibiārū ulcera, & ea quæ dulcia appellātur sanat. Mastiches, cerussæ, spumę argēti, succi hyoscyami, singulorū unciam I. olei myrtei aut lentiscini, quo strigmentosum pharmacum fiat. Quod si etiā amplius quid de hyoscyami succo cōieceris, prodest. Reponitur in plumbea pyxide. Medicamentum ad sedem, Oribasij. Olei myrtei, libram unam, cerussæ trientem, thuris sextantem. Cerussam cum oleo myrteo ad mellis compagem coctā, ad thus in mortario tritū affunde, & unitis utere. Phicoryche Oribasij emplastrū probatū. Thuris drachmas decem, myrrhę drachmas VII. opij dra-

IIII. butyri drach. IIII. aluminis scissi drac. I. cadmię ustæ ac lotæ, pōpholygis, utriusq; drac. VI. ceræ Tyrrenicæ drachmas IIII. uitellorum ouorum assatorum, numero quatuor, adipis anserini drac. XVI. rosacei drachmas XVI. medullæ ceruinæ drac. XIII. cerussę drachmas XIII. plumbi usti & loti drachmas octo, lapidis hæmatitæ drachmam unam, œsypi drach. IIII. & dimidiā. Arida teruntur cum uino. Ambrosia emplastrum Oribasij. Ceræ, mellis, rosacei, spumę argenti, cerussę, adipis caprini, butyri recentis, singulorum quadrantem, thuris unciam unā.

Aliud emplastrum sedis dolorem mitigans ac adimens. Spumę argenti, cerussæ, ceræ, singulorum unciam I. rosacei sexuncem, croci dra. IIII. medullę ceruinæ dra. IIII. amyli dra. IIII. meliloti unc. I. terebinthinę drachmas duas. Aliquando & ouorū assatorū uitellos duos aut tres. Spuma argenti & cerussa lotę ac siccata miscentur, deinde teruntur passo cum meliloto, croco & amylo. Emplastrum sedis ex cerebellis Andreæ. Adipis Anserini curati, ceræ, thuris, medullæ cerui, floris rosarum, pōpholygis lotæ, cadmię teneræ lotæ, plumbi usti loti, singulorum drac. IIII. cerussæ drach. VIII. cerebellorum gruum drach. II. opij sesquidrachmam, œsypi drach. V. succi intybi cochlearium I. rosacei sexuncem, præpara & utere uelut dictum est. Ad inflammationem ignis sacri in sede. Emplastri ex succis lib. I. panis siliginei lib. I. croci unc. I. opij drachm. IIII. rosacei lib. II. Crocus & opium passo macerantur, panis uero in aqua, & ad ipsa trita affunduntur liquida. facit etiam ad podagras, in calida intemperie ac fluxione biliosa. Ad eminentias protuberantes. De rumicis agrestis radice humida adhuc corticem detrahe, & ipsam radicem parum cōtusam ut ex proprio succo madescat, statim eminentiæ ipsi affrica post factam alui exonationem, nimirum ubi aqua ablueris, & linteo deterferis humiditatem. Hoc decrescēte luna fiat. Aliud optimū ad omnem sedis inflammationem, Malicorij sesquiunciam, meliloti unc. I. sceni græci cyathos II. Vini dulcis ueteris heminas quinque. Coquito ad tertias, & abiectis herbis, terito in uino cerussæ lotæ sextantem, pōpholygis lotæ unc. I. thuris trientem, plumbi usti unciam I. Et liquefacito ceræ Tyrrenicæ sextantem, olei myrtei quadrantē, rosacei quadrantē, butyri recentis insulsi sextantē, œsypi unciam I. medullæ ceruinæ unciam unā, adipis anserini trientem: hæc liquefacta, frigefacta ac crasa, ad trita adiuncto, & intybi succum paulatim adstillato, & probē unitis utitor. Aliud Andromachi, quo utor inquit. Rosarum uiridum, drachmas VII. capitum papaueris drachmas IIII.



oua cruda integra duo, butyri recentis, œsypi, mali corij leuissimè triti, singul. drach. xvi. mellis dodrā tē, rosacei aut myrtei sexuncē, ceræ bessē. Aliud, quo utor ait. Cerusæ drach. v. spumæ argenti lotæ drach. v. thuris drach. vi. aluminis drach. iiii. croci obolos tres, uini & rosacei quantum satis est.

*De fissuris sedis & de tuberculis. Cap. III.*

Tuberculum quod condyloma appellatur, in sede fit, ruga aliqua corporum in ano reduplicatorum insurgente, ac præter naturam intumescēte. Quum enim sinuosus sit anus, rugas coagmētatas habet. Vbi uero amplius intumuerit ruga, tunc sanè fit condyloma. Et aliquando quidem citra inflammationem fit, & molle est. Quandoque uero cum inflammatione, & durum est ac dolorosum. At uero fissuræ ac rimæ in sede fiunt, quandoque in adstrictiori parte, siue musculo adstringente, quandoque uero in ano. Et aliquando ex influentium acrimonia consistunt. Aliquando autem propter condylomatum inflammationem ac distentionem, partes circumsitæ rupturam sustinent. Curationes autem primum quidem fiunt per medicamenta. Dilata uero curatione, dum & indurantur & callosæ fiunt affectiones, chirurgiā adhibere oportet, ita ut in condylomatis quidem æger cōmodè locetur, & ipsum condyloma uolsella distentum funditus excidatur. In fissuris autem, ut callosa rimæ labia derādantur; quo supina ac recens ulceratio fiat ad facilem curationem. Post chirurgiā consequens curatio primum est suppuratoria, deinde repurgatoria, postea ad cicatricē perducens. Quæ uero in principio adhibētur ipsis auxilia, talia sunt.

Ad condylomata pharmacum, quod contrahit ac consumit ipsa. Misy assatum terebinthina liquida excipe, ut emplastri compagem habeat, & adhibito prius per aquam fomento impone. Vtere uelut admirando. Aliud. Testas ouorum uistas ac tritas lauato, & siccitas inspergito. Aliud Lucij. Ad inflammationes sedis, & rimas, ac condylomata. Facit etiam ad rimas pudendorum inflammatas. Cerusæ quincuncem, spumæ argenti lotæ sextantem & uncia dimidium, recrementi plumbi loti, aluminis scissi, thuris, singulorum sextantem. Hæc cum uino albo ueteri trita, ad ceratum myrteum ac rosaceū ammisceto ac utitor. Facit ad sordida ulcera sedis, maximè uero circa coronam glandis & præputium consistentia, quæ neq; linamentis repurgantur, & à medicamentis ad depascentia ulcera destinatis exacerbantur. In summa uero perfusiones in condylomatis adstringentes esse oportet, & medicamenta ipsorum adstrictione quadam participare debent.

Aliud ad rimas in sede inflammatas, & ad condylomata. Cadmiæ teneræ ter uistæ ac lotæ, cerusæ lotæ, spumæ argenti lotæ, singulorum sextantem, ceræ quadrantem, ouorum duorū assatorum uitellos, sapæ cyathū i. rosacei cyathū i. Vtere. Est ualde commodū etiā ad antiquata. Ad rimas inflammatas, morsusq; ac feruores, quo ego semper usus, nullo alio opus habui. Collyria asteris aut thuris, aut ali-quod consimile, succo hyoscyami & sapa diluito, & rosaceo sufficienti addito, quo strigmentosum pharmacum fiat, ex hoc anum assidue illinere iubeto. Et primum quidem dolores sedat. Celerrimè uero etiā ulcera sanat. Potes & species collyrii accipere, & cū hyoscyami succo terere, ac pastillos efformare. Et

usus tempore cum sapa ac rosaceo diluere. Aliud Andromachi, quo utor, inquit, ad rimas sedis, & cōdylomata inflammata. Lapidis hæmatitæ, ammoniaci thymiamatis, thuris, aluminis rotundi, singulorum drach. xii. In alio exemplari, sextantem, gallarum, croci, singulorum drach. i. terebinthinae drach. iiii. ceræ tyrrhenicæ drachm. xii. rosacei drach. x. Vtere ad sedem quidem cum rosaceo, ad uterum uero cum unguento Salca appellato. Aliud ad cōdylomata & rimas, quo melius non est. Aluminis scissi drach. iiii. croci drach. iiii. cerusæ drach. ii. opobalsami drachm. i. thuris drach. iiii. aloës drach. i. œsypi drachm. viii. ceræ drachm. viii. liquabilia liquefacito, & ad arida trita affundito, ac unitis utitor.

Ad rimas in ano ac pudendis. Resinam pinus siccam cum rosaceo terito, donec strigmentosa fiat, & oui assati uitellū ammisceto ac illinito. Ad rimas sedis, inflammationesq; ac condylomata, puluis ficus mitigans ac eximens dolorem. Rhoidarij, Syriaci, cerussæ, spumæ argenti, æquales portiones siccas insperge. Aliud. Foliorum hederæ siccorum cinerem cum uino & rosaceo in pila plumbea tere, ac utere. Aliud. Cineris rasuræ linteorum uistæ, & amyli, æquales partes tere, & foliorum oleæ uiridum succum misce, ac illine. Aliud Maij siue obfetricis ad fissuras & condylomata. Gallæ dra. viii. plumbaginis drac. viii. myrrhæ drac. iiii. cerusæ drach. iiii. tritis utere. Prodest ad omnia. Pastillus Aretæ Andromachi, pharmacum accommodatum ad rimas & condylomata, in maximis doloribus, citò liberat. Stribij, acaciæ, plumbi uisti & loti, singulorum drachmas xvi. cineris siue spodij pompholygis lotæ, drachm. viii. Fructus ericæ, aluminis scissi, thuris, atramenti sutorij, myrrhæ, opij, singulorum drachmas viii. Vno terito uelut collyrium, & excipe ac forma in pastillos, quos usus tempore passo diluito. Pastillus ad sedem & omnia ani ulcera, rimas ac condylomata. Pompholygis lotæ, terræ samia, amyli, terræ lemnia, aloës uistæ & lotæ, thuris, sandicis, plumbi uisti & loti, radicis symphyti, cetauræ, singulorum sextantem, croci, squamæ æris, opij, tragacanthæ, singulorum sesquiunciam. Excipe uino, & utere ut uoles. Pastillus ex solano halicababo, uelut Hieras prodit, qui ad rimas parari solet in sede ac pudendo, & ad ulcera, condylomata, ad uerrucas, thymos ac formicarias appellatas, & ad omnem eminentiam. Facit & ad pustulas nocturnas, papulas, reduuias circa ungues & ignem sacrū. Et ad aures purulentas, & labiorum ac plantarum fissuras. Spumæ argenti drachmas xiiii. cerussæ drachmas duodecim, corticis radicis halicacabi sicci drachmas viii. atramenti sutorij drachmas quatuor. Terito uelut collyrium cum aqua, & forma pastillos ac utere, ad ualde inflammata cum lacte muliebri, ad ea quæ cicatrice opus habent cum uino. Andromachus autem hūc pastillum sic præparat. Cerussæ libram unā, spumæ argenti, corticis halicacabi, atramenti sutorij, rubricæ sinopidis, singulorum sextantem; in alio exemplari sexuncē: terito cum aceto, ac formato pastillos. Medicamentum cicatricē inducēs ulceribus in sedē. Cadmiæ uistæ & uino extinctæ sextantem, cerusæ lotæ unc. i. plumbi uisti ac loti unc. i. ceræ unc. i. olei myrtei lib. i. Sicca cum uino terito ad dies sufficientes, & ceratum liquefactum ac refri



ac refrigeratum adijcito ac utitor unitis. Aliud sic cum, ad rimas præputij ac sedis, inducit cicatricem.

Cadmie, cerusæ, thuris, equales partes. Facit & ad alia ulcera mirabiliter. Aliud cicatricem inducens. Cadmiæ ter ustæ ac lotæ, plumbi usti ac loti, diphrygis, singulorū unc. i. Vino trita excipe cerato habete ceræ quincuncē, terebinthinæ drach. xiiii. olei myrti quincuncem. Et unita ac in massam coacta serua=to. Vfus uero tempore, de pharmaco sextantem, ceræ trientem, olei myrti quantum satis est accipe. Aliud siccum rimas ac ulcera ad cicatricē perducens. Seminis spinæ Aegyptiæ sextantem, mastiches unc. i. Singula seorsim trita miscentur, & post sedatas inflammationes inspersa cicatricem inducūt. Aliud. Lapidis phrygij ter usti ac uino extincti, cadmiæ ustæ lotæ, cerusæ lotæ, aloës, thuris, singulorum drachm. iiii. squamæ æris lotæ drach. ii. diphrygis drachm. ii. diligenter tere ac utere. Aliud. Fructus ericæ, gallarum, thuris, acaciæ, pares portiones siccas insperge.

De thymis in sede ac reliquo corpore nascētibus, sy=cosiq; ac uerrucis formicarijs, itēq; clauis. Cap. iiii. Thymi appellationis originatione transumpta est à cacuminibus eiusdem nominis herbæ in montibus nascētis. Thymi enim in corpore tuberculosæ sunt eminentiæ, asperæ, subrubræ, oblongæ, præter naturam auctæ, sanguinem effundentes dum auferuntur amplius quàm pro apparente magnitudine. Abundat autem hæc affectio circa sedem & pudenda ac media femora. Quandoq; etiam in facie consistit. Et quidam sanè parui sunt, & uocantur thymi: aliqui uero magnitudine excedunt, & appellatur ficus: & aliqui mansueti sunt, aliqui uero maligni. Mansueti igitur thymi, carunculæ sunt paruæ quidem, uerum inæ=quales, obscuris eminentijs exasperatæ, albicantis coloris, aut subrubræ, & doloris expertes. Maligni uero thymi, duriores sunt & asperiores ac maiores, feculentis, ac liuidi coloris, dolorosiq; ac puncturium dolorem inducentes, & exacerbantur maximè ad manuum contactum & medicamentorum adhibitionem. Sunt autem omnes mansueti facile curabiles, maligni uero incurabiles. Curantur autem aliquando hi, non locali excisione, sed cum ablatione totius partis in quo sunt. Ad thymos. Saluiam herbam siccam tusam cum pinguibus caricis præbe edendam, & disparebunt. Verum in pecoribus ordeum rori exponito, & eandem herbam inspergito, & edere finito, ac miraberis. Ad eminentias. So leas ueteramentarias humidis urito ac terito, & uino præimbutas imponito. Aliud. Serpētis exuuium tritū carne caricarū reiectis granis excipito, & emplastri modo imponito. Si uero intra sedem fuerint, glādulam inde facito, subdito, ac miraberis.

Aliud. Caninum sterus album ustum ac tritum & uino madefactum imponito. Cæterum uerruca acrochordon Græcis dicta, tuberculosa est eminentia. Nomen uero inde habet, quod similis est uertice suo resectæ chordæ iuxta extremitatem. At uerruca formicaria, tuberculosa ac callosa est eminentia, nigricantis coloris fundamentum latum habens, & ad cutem residens, ad contactum dolorem exhibens eius=modi, qualis à morfu formicæ animalis contingit. Vnde etiam nomen habet. Verum in ablatione sanguinē fundit, non pro apparentis magnitudinis ra=

tione. Clauus autem callosa est eminentia, capiti clauis alsimilis, frequens autem est circa manuum extremitates, & circa calcaneum. Appellant porro etiam in facie orientes magnas eminentias, ficus: à magnitudine imposita appellatione. Proinde conandum est ut per pharmaca tum mansuetos, tum malignos thymos curemus, ita ut mansuetis quidem, ea quæ consumere ac contrahere possunt adhibeamus. Malignis autem, ea quæ ad cancerata ulcera describuntur, præsertim in mammis ac utero. At ubi uicta fuerint pharmaca & curatio protrahatur, Thymos quidem qui sunt in musculo ani adstrictorio, uolsella attractos radicatus excindere oportet, & siccum medicamentum sanguinem sistens inspergere, quale est quod flauum appellatur. Et post chirurgiam, pharmaca resiccantia adhibere, donec perfectè curentur. Nam unctiua curatio affectionem refricat. Si uero in partibus magis expositis fuerint thymi, post excisionem quum magni fuerint ac multi, uisionē adhibere expedit ad sanguinē sistendum, & regenerationē in posterum prohibendam. Adhibita igitur uisione, curatio decernatur communis ad perusta, primum uidelicet ea quæ crustas amouere potest, deinde repurgatoria, postea resiccatoria. Crustas autem remouere possunt in talibus, lac & mel per linamenta adhibita. Quod si scalpello solum excisi fuerint thymi, post excisionem siccum sanguinem sistens adhibeatur, & reliquus curationis ductus resiccans, uelut dictū est.

Pharmaca consumentia ac resiccantia thymos, & uerrucas formicarias atq; acrochordonas. Medicamenta quæ consumunt ac resiccant thymos, sunt ea quæ cōmuniter curant etiam reliquas uerrucas: Quale est hoc quod facit ad thymos in sede ac pudendo, aut in alio corporis loco obortos. Aluminis scissi, atramenti sutorij usti, glutinis, singulorum unc. i. squamæ æris sextantē. Trita glutine excipito cū acetato prædissoluto, illinito. Ad thymos in sede, & dura ac non inflammata condylomata, & ficus. Squamæ æris drach. i. sandarachæ drach. i. auripigmenti drach. i. aluminis scissi drach. ii. Terito per se singula & cum rosaceo, & ad strigmentitiam crassitudinem redacta largè illinito, & rasuram lintecoli imponito, atq; bis singulis diebus curato. At uero in alijs corporis partibus aceto diluta illinito. Mirabiliter autē contrahit ac deprimit thymos in sede ac condylomata, & inflammata lenit, pastillus superiore capite descriptus, Arete appellatus. Heraclidæ Tarciini ad uerrucas formicarias inueteratas. Sulphuris uiui, sandarachæ, atramenti sutorij, singulorum æquales partes, terito cū aceto, & pastillos formato. Et usus tempore aceto dilutos illine. Nos autem apposui=mus his etiam elaterium pari portione, & ad formicarias atq; acutas uerrucas mirabiliter profuit. Verum in formicarijs primum scalpello circumscalpere oportet, atque sic pharmacum illinere. Oribasij ad formicarias uerrucas & acrochordones. Chalcitidis drac. vi. sandarachæ drach. iiii. cadmiæ dra. x. cum aceto assidue illine, donec exciderint. Aliud melinum siccum, geminæ mixturæ, heliocaës, hoc est, sole ustum appellatum: calcis uiuæ partes duas, auripigmenti partem unam. Auripigmentum aqua prius terito, & calcem adijcito, & in uas aqua repleto siccari finito. Hoc ubi tertio feceris, in uas fictile procul ab omni humiditate deponito. Facit ad uerrucas



rucas formicarias & instar chordæ apicis acutas, pterygia, callos, nomas, & epulidas. Aliud. Auripigmenti drachmas viii. sandarachæ drachmas sex, elaterij drachm. viii. sulphuris uiui drachmas vi. radicis chamæleonis nigri drachmas iiii. Aceto diluta cogito in pastillos, & utere cū aceto. Verū in formicaria uerruca basim prius circūscalpe, uelut dictū est. Aliud pharmacum accommodatum. Hoc usus sanauit thymos malignos. Elaterij drachm. viii. auri pigmenti tantundem, sulphuris uiui drach. vi. glutinis piscium drachm. iiii. trita excipe glutino aceto prædissoluto. Et utere in alijs quidem locis cū aceto dissolutis, ad sedem uero cum rosaceo. Quomodo uero gluten piscium dissoluere oporteat, dictum est in capite. De sanguinem spuētibz, in pastillo qui gluten piscium recipit. Sermone octauo. Ad Thymos ualde malignos, post excisionem & uisionem exorietes, uerrucas item formicarias, & instar apicis chordæ acutas. Pastillus Passionis. Squamæ æris drachmas xii. æris uisti drachmas viii. salis ammoniaci drachmas viii. aluminis rotundi drach. viii. thuris drach. xvi. Omnia terito excepto thure, ad multos dies aceto affuso in sole. Deinde thus adijce, ac rursus probe tere, & pastillos efforma, eosq; assidue cū aceto illine, donec penitus exciderint. Ad eos uero qui in sede sunt, um passo diluito. Cæterum ficus ablatus, & thymos ac condylomata curat, & rursus generari non sinīt, & iam extantes præclare tollit. Cinis Ignorum uitis cum aceto illitus, & cinis ex uinaceis uitis, cum aceto.

*De Hæmorrhoidibus sedis.*

Cap. v.

Hæmorrhoids appellationis originationem habet à sanguinis fluxu. Est autem uelut dilatio localis in sede facta, uasis quibusdam istic apertis, & progressu temporis callosioribus factis. Hæmorrhoidum uero alia sunt cæcæ, alia apertæ. Cæcæ sunt quæ omni tempore inflatæ sunt, & nihil excernunt. Apertæ uero sunt, quæ per tempora sanguinem effundunt. Hæc affectio malorum plurimorū causa hominibus existit. Nam & deformitatem, & miseram uitam hæmorrhoides inducunt. Multos uero etiam uita priuant. Et deformitatē quidem, propter coloris totius corporis uitiationem, ex euacuatione succedentem. Miseram uero uitam, propter corporis debilitatem. Quandoq; autem & de uita periclitantur sic affecti, quum ob excedentem euacuationem perfrigeratum hepar, aquā inter cutē operatur. Conuenit igitur recta diæta ac uenæ sectione præmissa, hæmorrhoidū extirpationem moliri, & nullam penitus relinquere, quemadmodum quibusdam uisum fuit: possibile enim incolumes euadere, optimumq; curationis finē assequi, post hæmorrhoidum extirpationē, eos qui oportuno tempore uenæ sectione & conuenienti diæta semper utantur, quemadmodū Hippocrati placet. Inquit enim: Hæmorrhoidas sanari in ueteratas, si non adseruetur, periculum est hydropē aut tabem succedere. Non enim uelut quidam opinantur, dixit, si nō una fuerit seruata hæmorrhoids ad sanguinis excretionē: Sed dixit, si non adseruetur, hoc est, si nō conuenienti diæta utatur. Quod autē sic uelit Hippocrates, ipsa aphorismi distinctio ostēdit. Ait enim hic uir, Hæmorrhoidas inueteratas sanari. Est autem Sanatio perfecta liberatio, & legitima curationis. Quare iuxta Hippocratem non oportet aliquā

hæmorrhoidem relinquere, sed omnes excindere, & post perfectam ipsarum curationem, per conuenientem, uelut dictum est, diætā, ad naturalem statum corpus curatum reducere, incidereq; cubiti uenam tempore opportuno, quo uidelicet coaceruatus in corpore sanguis euacuetur.

*De Hæmorrhoidum chirurgia.*

Cap. vi.

Agrū itaq; præparare oportet per modici cibi usum, & aquę potū, & ut plurimum etiam per clysteris infusum, tum prolestandi stercoreis gratia, tum ut sedes iritata promptior ad eersionem fiat. Deinde adhibeatur Chirurgia, quemadmodum in tractatu De chirurgia ostensum est, ita ut singulæ hæmorrhoides uncino distendantur, & basis prius circūscalpatur, & per uncinū obtorqueantur. Deinde paruo interstitio facto obligentur, & refecentur. ipsa enim obortio adstrictioni correspondens, uasa contrahit ut cōsistant, quo post excisionem sedes minus sanguinis effundat. Quapropter oportet unamquāq; hæmorrhoidem hamulo distendere, deinde fundamentum circūscalpere, postea per hamulum obtorquere, & porrigere hamum tenendum ministro. Postea uero etiam in alijs idem faciendum est. Postquā uero omnes hamulis distendimus, circūscalptas funiculis obligabimus, & ministro tenendas dabimus. Et tūc primum distentam primam excidimus, & reliquas consequenter ex ordine tollimus. Post excisionem uero, siccum sanguinem sistens apponimus, & spongiam lino obligatam adhibemus, & si li principium foris relinquimus. Postea decernimus consequentem curationem, per linamentorum immisionem, spongiarum appositionem, obligationem sedi conuenientem. Curatio uero postea cōmunis est. Securius itaq; & compendiarīa curatio hæmorrhoidum est ipsa chirurgia. Quandoquidem uero quidam melius esse putant assidue purgari per hæmorrhoidas, uelut mulieres. Quidā uero ob timiditatem, per medicamenta potius aliquas ex his aut omnes tolli cupiunt: cōsequēter subiūgemus auxilia ad has conuenientia. Extractoria hæmorrhoidū.

Quandoquidem pleræque hæmorrhoides opus habent extractione, ad faciliorem medicamentorum impositionem, necessarium est & talia pharmaca describere. Cyclamini succus illitus, & hæmorrhoidas irritat, & non sinīt ipsas contrahi in chirurgia, & sedem extrahit ac euerit. Magni pharmacū accommodatū, ad hæmorrhoidas extrahendas. Piperis ac nitri utriusq; pares partes terito, & sedi adhibeto. Aliud. Succum cyclamini cum pari mellis mēsurā ad cōpagē mellis coquito. Probē facit. Aliud. Hoc uix prolabentes hæmorrhoidas extrahit. Succu centaurij drach. ii. aluminis liquidæ drachm. ii. misyos drach. i. staphidis agrestis drach. i. Excipe melle & illine sedem. Aut lanam pharmaco imbutam in sedem inde. Quum autem promptitudinem induxerit, & sedes prolapsa fuerit, & hæmorrhoides apparuerint, imponito ea quæ ad hæmorrhoidum curationem describentur. Quæ aperiant hæmorrhoidas. Aperiant autē has, in his quibus sanguinē per ipsas excerni uolumus, amaracnū unguentū illitū, perdicij herbæ folia uiridia assidue affricta, mercurialis trita & uelut glans immissa, fel bubulū per lanæ tomentū inditū. Sistētia sanguinis hæmorrhoidum fluxum. Sanguinem qui ex hæmorrhoidibus

nimum



nihilum euacuatur, sistunt aloë imposita, squama ferri, plumbumustum cum posca. Aliud, sanguinem sistens confestim, Acaciae fuluae drach. iiii. plumbaginis drach. iiii. tragacanthi drachm. ii. Singula seorsim terito, & misceto, & aqua subacta crassius imposito. Si uero penitiores fuerint, in massam coacta indito. Aliud delens hæmorrhoidas & omnem sanguinis eruptionem. Mororum crudissimorum scilicet corum sesquiunciam, chalcitidis sesquiunciam, lapidis molaris trientem, pennarum corui scrupulos xxi. Extremitates pennarum torreto ac terito, deinde omnia uino subacta ad strigmentitiam spissitudinem redigito. Et in hæmorrhoidibus quidem indito: In extrinsecis uero sanguinis eruptionibus illinito, ac obligato. Asclepiadae prolutio hæmorrhoidum. Spinæ Aegyptiæ quincuncem, foliorum salicis, artemisiæ, sideritidis herbae, singulorum trientem, in quatuor aquæ sextarijs coquito ad dimidias, & herbas quidem abijcito, ad aquam uero decocti siccum hoc ammisceto. Melanteriæ a clauis drach. x. aluminis rotundi drach. viii. spumæ argenti dra. iiii. gallarum dra. iiii. misyos dra. ii. foreos drach. ii. Siccum in decocto diluito, & cum eo septies in die perfundito, atq; hoc per triduum facito. Si uero reliquæ quædam hæmorrhoidum restiterint, eas quarta die acucopungito. Et si quidem senserint, aut cruentatæ fuerint, decoctum illud similiter prodest, de sicco uero dimidiam partem misce. Prolutione uero facta, ipsum siccum pharmacum adhibe, ut exacte urantur, propter inflammationem aut forinsecus panem impone. Hoc cito urit. Ex cataplasmate uero intra septimum diem excidunt crustæ. Mirabiliter quoque hæmorrhoidas hoc tollit. Cicutæ siccae dra. ii. succi hyoscyami dra. iiii. aluminis dra. ii. gris usti dra. ii. rubricæ dra. i. cerato rosaceo excipe & impone, facit & mali punici acidi cortices sicci cum aceto impositi. Si uero penitiores fuerint, uelut gladii supposititiâ indito. Aliud ualde præclarum. Sandarachæ dra. viii. auripigmenti dra. viii. cum lixiuio diluta impone. ægro antea probe collocato. Mortificatur enim hæmorrhoidis, & dedit in semihora resiccata, & a fundamento deuoluta. Verum circû hæmorrhoidas ceratum illinitur, & fit hoc in sole, aut apud ignem. Debet enim homo in eodem situ permanere, donec pharmacum ablueatur. Aliud, ad hæmorrhoidas, quod sedat etiam in inflammationes ani. Et illæ mortificatæ resiccantur uelut uuæ passæ, & decidunt in septem diebus citra exulcerationem. Cæterum ad condylomata ac fistulas confert eaque curat hoc, secis uini siccae ustæ quadrantem, misyos sextantem, aut pro misy, foreos sextantem. Vtere uelut optimo, sex autem occultitur in prunas, & uritur, donec albescat. Aliud. Stercus asini siccum accipito, & ex eo ollulam paruam impleto, & mannæ thuris dra. viii. & tithymalli sicci manipulum unum addito, & accenso stercore bubulo, ad carbonum speciem exurito, eaque trita imposito, donec excident. Septima enim die citra inflammationem mortificatæ decidunt. Aliud mirabiliter excindens hæmorrhoidas. Chalcitidis ustæ, misyos usti, atramenti sutorij usti, diphrygis, foreos, singulorum drachmas iiii. squamæ æris ustæ drachmas duas. Vtere ipso sicco, & instar testæ induratæ excident. Est hoc præclarum, & omnem carnis eminentiam contrahit. Aliud Hippocratis ad hæmorrhoidas ad-

mirandum. Gallarum sextantem, myrrhæ sextantem, aluminis scissi quadrantem, melanteriæ quadrantem. Contundito, cribrato, terito, ac utere sicco. Ego uero in penuria melanteriæ, fori adieci, & fecit mirabiliter. Nam intra paucos dies citra mordacitatem ac ulcerationem, hæmorrhoidas dissipat. Verum uino præluere oportet, atq; sic inspergere.

Ad anum aut sedem procidentem.

Cap. vii.

Nos per muriam, aut marinam aquam, prius animum fouere solemus prolapsum, & sæpe nullo alio auxilio opus habuimus. Aliquando uero salem tritum inspergimus, egro commode ad hoc collocato, & sufficiens tempus expectamus, donec destillantes humiditates extra processerint. Deinde abluta prolapsa recti intestini parte, illitionibus adstringentibus utimur, nimirum acacia, aut hypocythide cum uino. Deinde anum retrudimus, & sequenti die infersionem paramus, aut infusum adstrictoriæ uim habens, quale est uinum nigrum austerum, in quo decocta est myrtus, aut oleæ folia, aut malicorium. Cæterum in pueris adstringentium usum remittere oportet, & mitiora adhibere. Si uero res urgeat, etiam lumbis adstringentia imponemus cataplasmata ex palmulis ac malis cotoneis & similibus. Item sedi similia adhibebimus. Victus autem sit boni succi, & lactis potus decernatur. Et pulres ex lacte parantur, qualis est oryza cum lacte cocta, & similia. Vinum deur aquosius. pharmaca uero huic affectioni commoda sunt eiusmodi. Gallam coquito, & cum leuigata anum integito, & siquidē foridore auxilio opus habes, in uino cocturam facito, sin leniore, in aqua. Aliud. Corticis pinus drach. viii. pilularum cupressi, drach. ii. plumbaginis drach. ii. prælauato cum uino adstringente & acerbato, & sicca trita inspergito. Aliud. Recrementi plumbi drach. viii. thuris drach. ii. præluere, & trita insperge. Aliud. Balaustrorum drach. i. malicorij drach. ii. seminis hyoscyami drach. viii. cerusæ drachm. viii. myrrhæ drachm. ii. plumbi loti drach. ii. præluere & insperge. Aliud nostrum ad procidentem anum. Fructus ericæ, gallarum, acaciæ, cerussæ, succi hypocythidis, corticis pini, myrrhæ, thuris, æquales partes siccas insperge, ubi uino austero sedem prius laueris. Aliud. Lentis uste, panis usti, farinæ erui, æquales partes imposito cum aceto & sapâ. Aliud. Sedem uino prælauato, & picem aridam tritam inspergito, aut ollulas uistas tritas. Aliud. Cupressi decocto perfundito, & sterco caninum siccum inspergito, picem uero siccam, bitumen, & cyperum suffito. Aliud. Coriandri semine, & laser, trita cum uino illinito. Et torpedinem uiuam assidue apponito, & contrahet. Aliud. Bitumen & gallam æquis portionibus tritis siccis sedi inspergito. Valde præclarum hoc est.

De prolapsis sedis perustione Leonidæ. Cap. viii.

Quum fluxus egre curabilis apparuerit, & diæta nihil profecerit, neque medicamenta contulerint, structura mali iam inueterata, ad uersionem peruenire oportet. Quum enim alia intestina inter partes principales connumerentur, externa extremitas intestini recti principalis non est: Sed & dum uritur & secatur, nullum periculum inducit, uelut ipsa experientia testatur. Inurere autem conuenit per cauteria nucleosformia externam sedis partem extremam, ex moderatis intervallis. Sufficiens est enim uisio ad fluxionem superandam. Cicatrix autem solida succedens, anum

N in am



in ambitu constringit, post unctionem uero, lac cum melle unito, & linamenta ex eo imbuta indito, ac obligato. Postquam nero elapsae fuerint crustae, lentem cum melle imposito. Repurgatis autem ulceribus, utere emplastro ex ordeo, aut alijs cicatricem inducentibus, supra ad sedis affectiones praescriptis.

*De abscessibus sedis, Leonida.*

Cap. IX.

Inflammatione praegressa aliquando circa anum abscessus oritur. Quod ubi contingit, plura corpuscula putrescunt, propter locorum humiditatem ac largam caliditatem. Vnde necessarium est in chirurgia ablatione uti, & propterea facile in fistulam transire. Proinde in simplicioribus quidem abscessibus facilis est curatio. Verum in magnis affectionibus, ano orbiculatim amputato, plerumque dum cicatrix inducitur, podicis meatus constringitur, & obturatio contingit. Quapropter conducit inter curandum, primis curationis temporibus linamentum parare, idque in tetrapharmaco, aut alio quodam ad curationem commodo, dissoluto intinctum indere in sedem. Tempore uero inducendae cicatricis, canalem stanneum rotundum sedis meatui convenientem immittere. Qui foris quidem sit amplius, uerum apposita parte in profundo sita rotundus ac levis, habeatque in medio foramen, per quod flatus reddi possunt. Illinatur autem canalis ex medicamento cicatricem inducente, aut samia terra cum uino, aut cerusa, forinsecus autem splenium aut lana incumbat, & commoda obligatio fiat. At uero canalis ipse usque ad perfectam curationem inditus sinatur.

*De ulceribus sedis proserpentibus, ac depascentibus.*

Cap. X.

Fiunt aliquando in sede ulcera proserpentia & depascentia. Si quidem igitur nome depascentes in adstrictorio musculo fiat, conari oportet ut per sedulam medicationem ad nomas pertinentem affectio curetur. Nam interiores ani partes, ipse inquam adstrictorius musculus, nervosus quum sit, neque unctionem neque sectionem sustinet: exciso enim musculo illo, conuulsio sequitur, & nimirum etiam carunculae imminutio ac decrementum: Id quod inde nobis cognoscere datur, quod saepe etiam non adhibita chirurgia, ab ipso depascente ulcere musculus ille consumitur, & carunculae decrementum, Rhoeada Graeci uocant, consequitur. Utendum igitur est auxilijs ad nomas descriptis, ita ut myrtorum ac malicorij & rubi decocto, ac similibus, assidue irrigemus, & primum quidem corporibus a natura alienis crustam inuramus, per faustinum appellatum pastillum aut consimiles. Deinde utamur eo qui ex usta charta constat, postea Isidem emplastrum cum multo rosaceo dissolutum per linamenta indamus, & sic reliqua deinceps consequentia faciamus. Ceterum phagedaenico ulcere proserpente exedente in ano existere, audere aliquid oportet, & aliena a sanis excindere. Deinde unctione adhibere. Quum enim carnosus sit podex, tales chirurgias facile sustinet, post chirurgiam autem, consequenter curatio, uelut aliorum ulcerum facienda. Si uero unctio adhibita fuerit, curare conuenit, uelut in prolabente sede praedictum est.

*De fistulis ani, Leonida.*

Cap. XI.

Quando quidem ex mala ulcerum curatione, & praecipue circa sedem, saepe fistula succedit, consequenter etiam de his dicendum est. Proinde aegro in sella, aut

alio quodam plano loco collocato, artifex a dextris magis ipsius aegri desidens chirurgiam perficiat. Conuenit autem specillum accipere, & caput eius in medium fistulae immittere, ipsumque propellere, quousque per inanem meatum progredietur. Deinde medium sinistrae manus digitum in sedem immittentes, per ipsum specilli caput arripiat, postea reflectens specillum, & ambas fistulae extremitates inter se ad quas sinistra manu distendat, atque sic omnia corpuscula callosa per ambitum excindat, unico contactu, si id fieri potest. Si uero post sectionem apparuerit callus adhuc insidens circumscalpatur. Manifestus autem est callus, quum sit subalbidus ac renites. Si uero etiam rugae propinqua apparuerint, uolles la extentae resecantur ad ulcerum explanationem, & facilem deinceps curationem, post chirurgiam mananthuris sectionem implebimus, & linamentis inditis conuenienter deligabimus. Et consequenter communi aliorum ulcerum curatione utemur. Ceterum in his qui ob molliciem aut timiditatem rogant nos, ut per medicamenta curentur, primum conari oportet ut per pharmaca resiccantia ac fistulas claudere curemus. Quae si nihil effecerint, ad ea quae callosa corpuscula erodere ac consumere possunt, transeundum est, quae fistularia collyria appellantur: quarum praeparationes in uniuersali de fistulis tractatu paulo post in hoc Sermone dicemus. At uero medicamenta quae fistularum resiccationem promittunt, sunt emplastrum ex spuma argenti & aceto ac oleo paratum, & emplastrum sine cera, & fuluum Galeni, & harmonia, & ex salicibus, & ex lolio constans, & consimilia: facit & hoc ad fistulas incipientes in sede, rimasque ac condylomata, paeoniae radice usta quadrantem, bituminis Iudaici sextantem, sulphuris uiui unc. i. cerae sextantem, olei myrtei quantum satis est. Aliud. Mala cotonea ad cinerem exurito, ac trita superne ad osculum fistulae imposito, & linamento indito, emplastrum ex uino & oleo, aut simile quoddam adhibeto ac deligato, & alternis diebus soluto. Pastillus ad fistulas sedis. Chalcitidis usta drach. viii. aeris usti drachm. iiii. cadmia drachm. iiii. cretae terrae drachm. iiii. pompholygis drach. iiii. Lycij drach. iiii. aloes drach. ii. croci drach. gummi drach. xvi. terito cum succo senecionis, aut serapidis tres testiculos habentis, & formato pastillos, & utitor siccis, & cum aceto & cum cerato. Utere etiam ad uniuersales fistulas describendis.

*Ad intertrigines inter foemora ex itinere obortas.*

Cap. XII.

Chalcitis cum aqua trita ac illita prodest. Et plumbago cum aceto aut uino. Et spuma argenti per se, & cum myrto sicca trita. Aut alumen in testaustum tritum insperge. Aut fici folia usta ac trita cum oleo illine. Aut rosarum capita una cum flore trita insperge. Aliud quo uitor ualde efficax, plumbaginis drac. viii. gallarum dra. iiii. aluminis drac. i. myrrhae dra. ii. sic cum hoc insperge. Aliquando uero cum oleo myrteo illine. Ego uero uino semper prius lauo, & siccu inspergo. Aliud, facit & ad papulas feruidas in femoribus ac sub alis, ex sudoribus obortas, praesertim in corpulentis hominibus. Syrici unc. i. fuci tinctorij unc. i. testae ex clibano antiquo sextantem, praelauato & inspergito, probe quidem facit, uerum lintea inficit, facit & ad ambusta cum cerato.

De



*De thymis in pudendis, Leonide. Cap. XIII.*  
 Huius affectionis proprietatem in loco de thymis in se de diximus, fiunt autē & hic thymi, aut in sola glande, aut in cole, aut in præputio. Aliquando uero in omnibus relatis locis. Antea uero dictum est, quod māsueti facile curātur. Maligni difficulter, & per affectus partis ablationem sanātur. Quomodo autem cognoscere oporteat & māsuetos, & malignos, etiā relatum est. Si quidē igitur māsueti fuerint thymi ac parui, per uolsellā distēti excindantur, & aliquo sanguine sistente ac crustā inducente illinātur, quale est siccū flauum appellatum, quo per crustā, simile quiddā ustioni efficiamus. Quū uero multi fuerint & magni, tūc post excisionem ustio adhibeatur ad sanguinem sistendū, & affectos locos ad aliū statū transmutādos, & thymorū regenerationē prohibendā. Quum autē totum præputiū thymis fuerit refertū, tū iuxta internā, tū circa externā partē, difficile erit ipsum cōseruare. Itaq; necessariū erit, quātum eius fieri potest, ad cutis præputij sectionem progredi. Quum igitur ustio post excisionem adhibetur, curatio decernatur ad perusta, relata in tractatu de prolabēte sede. Excisis autē thymis, & post excisionē sicco crustā inurente adhibito, post crustæ discessum reliqua curatio resiccatoria fiat. Vinctuosa enim pharmaca affectionē refricant. Cæterū in his qui chirurgiam reijciunt, utendum est talibus medicamentis. Medicamentum resiccans thymos xeraphium appellatū. Chalcididis crudæ sesquiunciam, misyos crudi sesquiunciam, squamæ æris sextantē, aluminis scissi unc. i. Locū cū uino prius lauato, & siccū inspergito. Aliud. Gallā & alumen trita inspergito, & exarescent. Vtere etiā si in alto corporis loco thymi fiunt. Aliud, egregie tollens thymos & carnē excrecentem in pudendis. Origanum & rutę radicem, paribus partibus urito, terito ac inspergito. Vtere hoc uelut optimo.

*De rimis in pudendis, Leonide. Cap. XIII.*  
 Rimæ ac fissuræ in præputij summitate fiunt, quādo angusta ea existens uiolēter reducitur. Ruptis autē corporibus, inflammationes succedūt & dolores intēti. In principijs igitur, omnis rima dū recēs est cruetatur, antiqua uero callosa fit, & rursus quū uiolenter dissipatur, rupta rursus cruetatur, proinde ad curam festinare oportet. Vbi uero antiquatæ fuerint, & callosæ factæ curationem distulerint, nihil proficiētibus medicamentis, cōfert cutem abducere, & callosa rimarum labia, supino scalpro quantum eius fieri potest, superficialia sectione diducere. Resupinatæ enim & recentes factæ rimæ ac fissuræ, celerrime sanantur.

*Medicamenta ad rimas & reliqua pudendorum ulcera. Cap. xv.*  
 Rimas medicamentis curare conandum est antea, citra chirurgiam, & utendum est plerisq; ad rimas sedis præscriptis, & præsertim eo quod Lucio inscribitur: facit enim & ad rimas in præputio, & ad ulcera fordidā, & præcipue quū detrahi ac reduci non potest. Inijcitur autem cum oleo & uino per clysteriolum. Mirabiliter autem facit ad rimas in præputio & recentes, & inueteratas, urina quæ inter mingendum intra præputium ac glandem obiter suscipitur, & celerrime sanat, ut ne opus quidem sit alio auxilio.

Aliud ad rimas præputij. Resinam frictam cum rosaceo terito donec strigmentitiā compagem accipiat, & ammixto oui assati uitello utere. Aliud,

ad rimas & reliqua ulcera. Colocynthidem siccam urito ac terito, & cū rosarum flore utere. Idem facit & anethum ustum. Aliud, ad præputij rimas, & glandis ulcera, repurgat, & cicatricem inducit. Lapidis phrygij ter usti & extincti, primum butyro aut rosaceo, deinde melle, postea uino, sextantem, florū rosarum unc. i. malicorij unc. i. utere. Aliud, ad rimas præputij & ani, & pudendi muliebris. Cerusæ, plumbaginis, gallarum, myrrhæ, æqualibus partibus utere siccis, aut cum uino & oleo. Aliud, rimas & ulcera ad cicatricem perducens, & acrimonias obtundens. Cadmiæ teneræ ter ustæ sextantem, rosarum recentium detractis unguibus sexuncem, Cadmiā tundito accibrato, & cum rosis terito donec exarescat, & sicca inspergito, ubi prælaueris cum uino. Aliud ad pudenda & sedem. Lapidis phrygij ter usti ac extincti uelut dictum est, cerussæ lotæ, cadmiæ, thuris, aloës, singulorum unc. i. squamæ æris drachm. ii. diphrygis drach. iiii. utere sicco. Aliud siccum, ad pudendorum rimas & ulcera spontanea. Aloës unc. i. florum rosarum sextantem, utere confidenter. Aliud ad eadem. Aloën solam tritam inspergito. Si uero adstrinxerit, cadmiā ter ustā ammisceto. Mirabiliter efficax est. Aliud. Pastillum ex halicacabo lacte dilutum exhibeto. Habetur eius preparatio capite tertio, ubi de fissuris & tuberculis sedis tractatur. Verū in his qui præputiū reducere non possunt, lacte eundem diluito & tepidum per clysteriorum injceto. Aliud, ad spontaneas pustulas in pudendis, & maxime in his qui præputium reducere non possunt. Glaucium cum uino terito, & ubi prælaueris, per fistulam pus attrahentem, tepidum injceto. Aliud lene incarnans & cicatricem inducens. Amylum per se tritum inspergito. Aliud. Colophoniam tritam solam inspergito. Aliud. Colophoniam, thus, amyllum, paribus portionibus inspergito. Aliud. Aloës primariæ, cerusæ, rosarum siccarum, æqualibus partibus tritis utere. Aliud. Collyrium ex thure tritum siccum insperge, aut cum uino dilutum per linamenta indito, aut cum lacte injceto, facit & quod Aster appellatur, & quod Cleoni inscribitur, & similia. Orisbasij ad præputij ac ani rimas. Inducit cicatricē. Cadmiæ lotæ, cerusæ, thuris, æqualibus portionibus, utere, facit & ad alia ulcera mirabiliter.

*Ad inflammationes pudendorum. Cap. xvi.*  
 Inflammata pudenda rosarū & meliloti decocto perfundito: Aut betæ folia siue semen tritum, in aqua feruefacito, & calido perfundito, facit ad eos qui præputium retrahere nō possunt. Cataplasma uero adhibe ex pane cū palmulis sapa præmaceratis, cū modico rosaceo. Aut malicorij in uino coctū ac tritum cum pane ac modico rosaceo pro cataplasmate impone.

*Ad nomas in pudendis. Cap. xvii.*  
 Si ulcus depascens, nomen Græci uocat, aut erosio fiat, laxa forinsecus apparet pars erodenda. Et si circumpremat, humorem tenuem subcruentum excernit, deinde seculentum. Conuenit itaq; perfusionibus adstringentibus in his uiti ex decocto myrti, ruborum, oleæ syluestris, rosarum, malicorij, plantaginis, polygoni, pharmaca uero ad nomas commoda sunt, pastillus corax, id est coruus inscriptus. Habet autem sic. Gallarum sextantem, squamæ æris sesquiunciam, chalcididis crudæ unc. i. thuris unc. i. terito



in aceto ad sufficientes dies, & ad finem mellis quincuncem addito. Et ex olei myrtei lib. i. ac semisse, adipis taurini recentis besse, cærae triente, terebinthinæ unc. i. ceratum effice, & in linamentis utere, & per fistulā puris attractoriam injice, per rosaceum dissolutū. Et superne spōgiam ex uino expressam impone, aut ceratum habens malicorium aut gallas. Aliud ex charta usta. Chartæ ustæ sesquiunciam, squamæ aeris sesquiunciam, auripigmēti dra. vi. sulphuris uiui dra. vi. plumbi usti drac. iiii. Insperge siccum, aut melle & rosaceo dilutum per linamēta inde. Si uero præputium reducere nō potest, plurimo rosaceo dilutum, & modico melle addito, injice. Aliud siccū, quod sanauit quosdam iam secandos. Chartæ ustæ sextantem, gallarum sextantem. Vtere sicco.

*Ad carbunculos pudendorum.* Cap. xviii.

Spumæ argenti dra. iiii. cerusæ dra. ii. thuris drach. i. Trita insperge, & rasuras linteorū impone. Aliud. Adipem caprinum cum uuis pascis tritum impone uelut cataplasma. Hoc suppurat, & dolorem eximit, postea eundem adipem cum pice liquida unitū imponito. Aliud, pilulas stercoris caprini uistas cū melle imponito.

*Ad interna in meatu urinae ulcera.* Cap. xix.

Lycij dra. ii. myrrhæ dra. ii. atramēti sutorij dra. i. chalcididis drach. i. omnia simul trita cum pasci hemina una, & uini ueteris odorati cyatho uno, coquito donec uniantur, & reponito in plumbo. Vfus uero tempore rosaceo diluta injice: facit & ad ulcera inter anum & testes. Ego autem cygnaria collyria cum lacte diluta per clysteriolum injicio, & bonum testimonium ipsis præbeo.

*Ad scabiosum scrotum & pruriginosum.* Cap. xx.

Contingit etiam circa scrotum assidue scabies & pruritus, ex influxu humorum acrium ulcerantium cutem. Et ubi quidem plures fuerint & acriores allati humores, cutem ipsam exulcerant. Si uero pauciores ac crassiores, squamas generant, & pruritus inducunt. Curatio horum fit per congruam uictus rationem, & per medicamenta. Aliquando & raro per chirurgiam. Itaque ab acrium esu abstinendum est, & præsertim ab oleribus mali succi. Quæ uero exhibentur bono succo prædita sint. Qualis est lactis potus assiduus, prisana, halica, gallinarum oua, porcellorum extremitates & uentriculi. Vinum tenuius dilutius & album. Ex localibus auxilijs, præsertim ubi squamæ ulceri adhærent, & dolor adest, conuenit cataplasma ex fabæ lomento, nam & dolor mitigat, & ulcera repurgat. Sit autem ex faba Aegyptia lomentum. Idem facit sesamū crudum, & erui farina melle subacta & imposita. Repurgatione uero ulcerū facta, pruritusq; lenito, ad cicatricē inducendā pergemus: probe autem facit in his partibus, misy cum sulphure uiuo tritū, & cerato myrteo exceptū. Conducit & plumbi recrementū, & spuma argenti cū myrteo cerato. Et emplastrum ex cadmia, & emplastrum ex hordeo. Præclare auxiliatur etiā scroto in superficie tumefacto, terra cimolia cum aqua diluta ac illita, quam illitā exarescere fines, & aqua tepida loco abluto, myrtum siccam tritam modica myrrha addita insperges. Inducta uero cicatrice, nullaq; molestia nec pruritus uexante, curatio transacta est. At si scabie sanata, pruritus restat, aut augetur, aut scrotum humore destillat, Nitrum cū staphide agres-

sti & alumine liquido, rosaceo & aceto dilutum, in balneo illinere iubemus. Et à balneo oui candidum cum melle imponere. Si uero uehemens & intolerabilis est scroti pruritus, sex acetī sicca cum uino madefacta adhibetur, eodem modo uelut præcedens medicamentum, illito etiam postea oui albumine. Quod si adhuc amplius uim eius augere uoles, ustrā fecem accipies. Idem præstat alumen cum melle probe coctum, & reliqua quæ ad pruritus retulimus.

*De testium ac scroti inflammatione, Leonida.* Cap. xxi. Quādoq; testes soli per se inflammantur, quādoq; testibus nihil affectis, scrotū inflammatum est. Aliquando uero testes unā cum scroto inflammantur. Sicut autem in alijs corporis partibus, ita etiam in his, uel ex humorum influxu, uel ictu, uel collisione inflammatio contingit. Proinde solo testiculo inflammato, scrotum colorē naturalem habet, ipse uero testis tumidior, duriorq; ac amplior tactui occurrit. Adest dolor pulsatiuus usque ad renes pertingēs. At si scrotum inflammatum est, tumor rubicundus in superficie est, renitens ad tactum ac dolens. Vtriusq; uero inflammationis, testibus uidelicet & scroto, ex signorum augmento magnitudinem inflammationis iudicabimus. Proinde cibi parsimonia, & aquæ potu per totū curationis tēpus utendum est. Et si inflammatio uehemens fuerit, præsertim in iuvene sanguinē multū habēte, uena cubiti secāda est, si id fieri potest, sin minus, tali. Nā & hanc secare prodest, ubi sanguis non fuerit multus. At pro localibus auxilijs, si testes sunt inflāmati, & maxime ubi nerui à quibus pendēt simul affecti fuerint, lanā oleo cōmuni aut anethino imbutam adhibebimus ac deligabimus, probe facit et uerbenaca recta in oleo cocta modico uino addito, & scroto imposita, atq; lana superilligata. Cataplasmatibus uero ad inflāmationes soluēdas idoneis utemur. E quorū numero admirandū est, ad testiū præsertim inflāmatōnē, Cataplasma ex faba Aegyptia. Decoratur autē faba cocta, & cū modico melle trita illinitur. præstat etiam ad testium ac scroti inflāmationes, cataplasma ex puro pane, quo ego assidue utor, quādoq; cum oleo & aqua, quādoq; cum mulla. Egregie facit etiam id quod ex uuis pascis cū cumino torrefacto ac trito, modico melle addito paratur, prodest & asphodeli radix cum polenta in uino cocta. Et lini semen in aqua mulla coctum. Et senecio cum polenta. Et cupressi folia per se, uel cum panis mica. Ceratum ad testium inflāmationes efficax. Cerae, resinæ pinus, olei anethini & narcissini, singulorum dextantem, cumini sex uncem, fimi asinini pilas tres, simum arefactum terito & cribrato, & cumino ammisceto, deinde cum cerato liquefacto committito ac imponito. Et lanam narcissino aut rosaceo oleo imbutam superilligato. Consert etiam emplastrum ex succis rosaceo dilutum, durante uero inflāmatione, aqua marina calida affundēda est, & cerata adhibenda inflāmationes discutiētia: qualia sunt ad mamillas inflāmatas descripta. Quod si non soluat inflāmatio, sed transmutetur, suppurationem cum cataplasmatibus adiuuare oportet, perfectōq; iam abscessu chirurgia adhibenda est, & communi curatione utendum. Si uero nome depascens accesserit, eadem curatione etiam hic utendum erit, quam superius ad sedis nomas tradidimus. Oribasij ad testium tumores laxos ac in



ac inflammationes. Olei lib. i. alij habent dextatē, plumbaginis, cumini, passularum sine uinaceis, farinae fabarum, singulorum trientē, ceræ sextantē, plūbaginem cū oleo ad cōpagem coquito, deinde cerā cū colophonitē dra. vi. adiūcto & ad perfrigerata passulas ac farinā ammisceto, ac utitor. Aliquando tamen farinā ad liquefacta inijcio inquit, postquā feruor ipsorū quieuit. Aliud eiusdem. Vuarū passarū sine uinaceis drac. x x v. cumini acetabulū i. resinē pinus quadratē, mellis quod satis est. Sanguinis porrō euacuatio efficacissimū auxiliū est ad testes inflāmatos, inquit Oribasius. Ceterū ad testitū dūritias, cucumeris syluestris radicē terito ac cribrato, & in aqua mulsā coctā cū loliacea farina imposito. Aut lilij radicem uino coctā, & modico melle subactā imposito.

De Hernia aquosa, Leonidæ.

Cap. xxi.

Hernia aquosa quandoq; ex occulta, quandoq; ex manifesta causa contingit: Ex occulta quidem, quum aquosus humor circa partes corpusculorum, quæ scrotum cōtexunt ac implicant, sanguini ammixtus collectus fuerit. Ex manifesta uero, quum ex plaga collisis, aut fractis uasis, sanguis affluēs ad aquosam substantiam transmutatur. Vbi igitur sponte cōstiterit aquosus humor collectus, subflauus aut subpallidus is inuenitur. Vbi uero ex plaga, cruentam ac feculentam materiam reperies. Humor autem uel intra rubicundam testiculi pelliculam consistit, uel extra ipsam, inter eam & pelliculas adiacentes. Vel in propria pellicula uelut uesica quadā continetur, atq; hoc genus herniam in tunica superagnata uocamus. Aliquando uero duplex hernia oboritur, quum collectio & in rubicunda tunica, & in superagnata consistit. Si quidem igitur in pellicula rubicunda humor collectus fuerit, tumor unius coloris apparet sine dolore, in principio dum adhuc parua est collectio, ad cōtactum cedens. Postea uero aucta collectione, testiculus humore undique circumdatus occultatur. At tumor in ambitu extentus ac renitens ad tactum, herniæ carnosæ suspicionem imperitiis exhibet. possunt tamen tactu discerni, nam hernia carnosæ omnino renititur, sed aquosa digitis cedit. Si uero in superagnata tunica humor colligatur, tumor ipse siue magnus siue paruus fuerit, omnino circumscribitur. At si simul quoq; in rubicunda tunica collectus fuerit, duo tumores depræhenduntur, alter in superagnata, alter in rubicunda pellicula. Quod si extra rubicundam pelliculā collectio fiat, testiculus tactui occurrit. Cæterū ab hernia aquosa differt hernia intestinorum. Quoniā in aquosa tumor eiusdem penitus magnitudinis semper, & in quolibet corporis situ persistit. Neque enim humores, uelut intestina transferuntur. Inguen præterea in hernia aquosa secundum naturam se habet, qua nota uel maxime aquosa, ab omenti hernia distinguitur. Nam in hernia omenti, semper in scroto omentum persistit, neque unquā transfertur, id quod etiam in aquosa contingit. Verum in omenti hernia inguen rarefactum depræheditur. Tutissima itaq; curatio herniarū chirurgia & uestione perficitur, si peritus artifex contingat. Potest tamen etiam medicamento scrotum inuri, & consumpto humore ac cicatrice indurata firmari. Ad hunc usum efficax hoc est. Radicis brassicæ ustæ cinerem, cum adipe suillo inueterato liquefacto ad emplastri formam adigito, & imposi-

tum alligato, ægrumq; quiescere finito, & postridie soluto medicamento fomentum adhibeto, & rursus apponito, idq; tamdiu repetito, donec uestio peracta fuerit. Emplastrum autem angustum & oblongum esse oportet, neq; plus quā conuenit locus inuratur. Ita ut in magnis tumoribus quatuor digitorum longitudinem & pollicis latitudinem habeat. In paruis duorum digitorum longitudinem, & auricularis digiti latitudinē exequet. At uero ubi tunica per uestionē detecta est, scalpello eam diduces, exclusoq; humore fistulare collyrium fissuræ indes, quo uiciinæ partes erodantur. Deinde suppurante medicamento uteris, postea dilapsa crusta, repurgatoria ulcerum per linamenta immittes, postremo ad adstringentia progredieris, quale est emplastrum barbarū appellatum. Poteris etiam pro brassicæ radice, medicamenta erodentia, septica Græcis appellata, adhibere. De quibus sequenti Sermonē agetur. Post humoris exclusionem, ne rursus collectio fiat, huiusmodi malagmatis uteris. Ceræ sesquilibram, picis dodrantem, ammoniaci thymiamatis lib. i. & dodrantē, aluminis liquidi sesquiunciam aut sextantem. Aliud Asclepiadæ, ad herniā aquosam accommodatū, quod peracta erosionē, & humoris exclusionē adhibet, per sanat & omnem duriciā resoluit, picis aridæ lib. iiii. ceræ terebinthinæ, ammoniaci thymiamatis, galbani, thuris, singulorum lib. i. aceti sextarios iiii. olei cyprini quantū satis est. Picem tritā cū aceti sesquiseptario coquito: Deinde ammoniacū cū modico aceto tritū adiūcto, & parū feruere finito, postea cerā inijcio, eaq; liquefacta, galbanum ac thus aceto trita ammisceto, omniaq; unita & ab igne ablata ad residuum aceti in mortarium mittito, & cyprino ad stillato probe subigito, ac utitor. Præclare facit etiā emplastrum ex lolijs, quod Sermonē decimo quinto inter Nigra habetur. Sunt etiā medicamenta quæ citra uestionem ac erosionem, humoris disculsionem promittunt. Quale est hoc quod habet. Spumæ argenti drach. vi. salis fossitij, atramenti sutorij, singulorū drachm. x. cerusæ drachm. xiii. terebinthinæ drachm. xi. olei libram unam. Spumam argenti, cerusam, sal cum oleo donec non inquinent coquito. Deinde atramentum sutorium cum aceto tritum addito, cauendo ne efferuescat, atque ubi parum ebullierit terebinthinam addito, & ab igne ablata in mortario subigito, & repositis utitor. Aliud, ad quæcunque sine scalpro curare uolueris. Ceræ, spumæ nitri, rubricæ sinopidis, nitri, singulorum sextantem, terebinthinæ, manne, thuris, mastiches, singulorum drachmas xviii. olei heminā i. aquæ marinæ siue muriæ sexuncem. Arida cum muria diluito, & liquefacta ammisceto, ac unitis utitor. Aliud. Nasturtij drachmas xxx. nitri drachmas x. fimi columbini drachmas vi. galbani, terebinthinæ singulorum drachmas xx. liquefacta cum aridis committito, ac utitor cōfidenter. Confert & psittacium inscriptum, quod Sermonē decimo quinto inter emplastra mollientia ac discutientia habetur. Hoc ego ad hernias aquosas usus sum, & primum tumorem emolliuit & ualde compescuit, ac post paucos dies exudantibus testiculis plurimam aquam extraxit. Aliud ad herniam aquosam, ualde efficax. Carnium uuarum passarū, ammonij, terebinthinæ, singulorum drachm. viii. nitri rubri drachm. x. mellis optimi sextantem. Arida



seorsim terito ac cribrato. Inde uuas passas probe cōtusas ammisceto ac unito, deinde mel cum terebīnthi na modice coctum addito, & ad emplastri formam adigito, & linteo excepta adhibeto, ac lata fasciola deligato, ægrumq̃ quiescere iubeto, & à balneo ac uehementi motu abstinere. Solues autem hoc alternis diebus, & spongia locum fouebis, ac rursus impones. Vtere etiam emplastris discussorijis ac resiccantibus ad hydropicos supra descriptis, & præcipue eo quod Vestæ nomine inscribitur.

De Hernia intestinorum, ex eodem. Cap. xxxiii.

Hernia intestinorum est intestini aliquando ad inguē, aliquando ad scrotum delapsus, qui multarum molestiarum autor est. Nam & deformitatem, & miserā uitā, & mortis periculum inducit, quando intestina duris recrementis distenta, ad scrotum delata condensantur. Inde enim tormina uoluuolosa, ac sepe inflammationes succedunt, ex quibus perniciēs consequitur. Generatur hoc malū aut peritonæo membrana aluum ac intestina amplectente nimium extenta, aut eadem rupta. Si ab extensione fiat, primum quidem laxitas ad inguen procumbit, & summa uentri incumbens pars conuellitur, simulq̃ pili pubis reuulsi cōspiciuntur. Verum postea tumore aucto scrotum uiolatur ac intumescit. Si uero rupta fuerit peritonæi membrana, quæ ad inguen pertingit, intestinum per rupturam delatum rubicundæ tunice inniditur, & hæc tandem temporis mora oppressa, etiam ipsa inferius prolabitur. Quod si plaga adeo uiolenta cōtigerit, ut simul & peritonæi membrana, & rubicunda tunica rumpantur, tunc intestina repente nudo testiculo occurrentia ad scrotum præcipitātur. Cæterum nosse expedit, intestinorū herniā qualiscunque fuerit, semper aquosa esse deteriorē. Quæ uero propter extensionē peritonæi membranæ sit intestinorū hernia, difficilius sanatur quàm quæ propter eiusdē rupturā. Et sanē intestinorū hernia extreme mala, sola chirurgia curari potest, eaq̃ graui ac periculosa.

De Hernia inguinis.

Cap. xxxiiii.

Inguinis hernia propter peritonæi membranæ extensionem facta, in principio adstringētibz appositis, aliquando curari potest. Tutior tamen est uisio, si peritus artifex cōtingat. Nunc autem quo pacto hoc malum medicamentis adhibitis ac ligamentis sistamus, ut ne in peius procedat ostendemus, & simul quomodo succedentibus accidentibus sit occurrendum. Proinde delapso ad scrotum intestino, & uoluuolis torminibus diuexantibus, statim conabimur, dediu locato ægro, diductis cruribus intestina sensim ad inguen reducere, ac reducta commodis ligamentis retinere. At si partes scroto uicinæ uehementibus doloribus unā cū inflammatione uexentur, tormina itē ac flatus adsint, tādū differenda est reductio, donec quieuerint. Et interim partes uicinas alternis diebus, primū lana succida oleo ac uino imbuta, deinde etiam illitionibus rigabimus. Et dolentes partes circūscarificabimus. Neglectæ enim sepe mortificantur. Declinante malo emplastra adhibebimus, quale est Mnascæ inscriptum, & alia huiusmodi. Et ne recidat æger, asseruandī gratia perpetuis ligamentis utatur. Presbyteri Emplastrum ad herniā inguinis. Thuris, myrrhæ, glaucij, opopanacis, sarcocollæ, tragacanthæ, gummi, glutinis taurini, glutinis piscij, cinnabaris quo fabri ferrarij utuntur, carnis

cochlearū terrestriū, singulorum sexuncem, fecis uini adstringētis ueteris quantū satis est, gluten utrūq̃ & quæ macerari possunt in uini fece macerato, atq̃ aridis tritis ammisceto, & ad emplastri formā reducto, imposito, alligato, & quiescere iubeto, ac septima die soluto. Ad intestina prolapsa. Symphyti libram unam, mannæ thuris quadrantem, candidi ouorū recentium unā cū uitello, numero sex. Symphytum tritum ac cribratū in fictile uas coniicimus, eiq̃ thuris mannā siue pollinem unā cū ouis subactū addimus. Deinde suillo adipe ueteri adiecto ad emplastri formā redigimus, atq̃ hoc intestino prius reducto adhibemus, & ligamēto alligamus. Aliud. Folia & teneras cupressi pilulas impone & alliga. Et si sicca fuerint, in uino prius coque. Hoc auxiliū inquit Galenus, omnibus corporibus nimio humore flaccidis confert, resiccant enim & corroborat. Decimo autē die id exoluere ac renouare oportet, ita ut ter repetatur, & puer interim per triginta hos dies in lecto decumbat, & cupressi decoctū bibat. Aliud celebre. Aloës, malicorij in uino nigro cocti, succi hypocisthidis, thuris, glutinis fabrilis, singulorū æquales portiones. Gluten in passo donec dissoluatur, coquito, ac probe terito, & reliqua minutissime trita ammisceto, ac utitor uelut iā sæpe dictū est. Aliud. Balaustiorum sexuncē, thuris, aloës, rhois coriarij, glutinis fabrilis, corallorū, singulorum quadrantē, malicorij, gallarum, singulorū lib. i. Gallas & malicorij in uino nigro è uinaceis expresso coquito, & postea in mortario terito, & ad trita reliqua cū polygoni succo dissoluta addito, & omnia melle cocto excipito, ac utitor uelut dictū est. Emplastrum datum cuidam adolescenti ob herniæ intestinalis turpitudinē summe anxio, ex quo sanatus est. Resinæ siccæ, ammoniaci thymiamatis, bituminis, sulphuris uiui, æquales portiones. Liquabilia liquato, eisq̃ ab igne ablati sulphur adijcito, & in mortario ad emplastri formam redigito, adhibeto ac alligato. Oportet autē spleniū in quo adhibetur calfactū apponere, neq̃ frequenter amouere, sed sinere donec sponte decadat. Quidam pro ammoniaco picem, quidā alcyonium inijciunt. Aliud. Terebīthinæ sesquunciā, cere, thuris, myrrhæ, glutinis piscij, carnis cochlearū, singulorum unc. i. Glutē per triduum aceto maceratur. Deinde in mortario teritur, & ad prunas eliquatur, rursusq̃ teritur, & ad ipsum reliqua trita ammiscuntur. Vtere præterea Iside inscripto emplastro, quod Sermone x v. inter emplastra multi usus habetur. Aliud Theodori, admirandum ad herniā intestinorum, quod nos experti sumus, & cum multorū admiratione sanauimus. Curat magnas & diuturnas affectiones. Chartā in aqua frigida ad tridū madefacito, & ubi humorē uelut spōgia imbibierit, ex ea pilā facito, quam reducto prius intestino, inguini adhibeto ac alligato, neq̃ ante tertium diē exsoluto. Tertio enim diē miraberis de efficacia ipsius. At uero ægro minime indicabis quid sit id medicaminis, sed chartā uel pāniculo inuolues, uel atro colore tinges. Neq̃ uero tu utilitatē rei despicias. Aliud, intestinorū hernias agglutinās. Chrysocollæ, glutinis piscij, lapidis gagatæ, rhois coriarij, acaciæ, symphyti, carnis cochlearū, singulorū sesquunciā, ammoniaci thymiamatis, lapidis pyritæ, lapidis magnetis, aluminis scissilis, thuris, sulphuris uiui, alcyonij, picis brutæ



brutię, nitri, singulorum unc. i. Gluten piscium in uino nigro austero macerato, postea in pila terito, & ad prunas cum eodem uino eliquato, & rursus terito, & ad ipsum reliqua trita ammisceto, quo solidum emplastrum fiat, quod inguini adhibebis ac deligabis, ægroq; quiescere iusso septima die solues. Verum ante adhibitionem locum alicuius ualde adstringentis decocto rigato. Sunt qui prædicta myrteo cerato excipiunt. Ego uero acaciā, thus, ammoniacum, seorsim in uino macero ac tero, atq; ad gluten piscium recte præparatum ammisceto. Deinde cochlearum carnibus tritis adiectis, itemq; reliquis tritis, ad emplastrum cōpagem redigo, quod crassissime inguini impono, & charta imposita deligo. Aliud Oribasij, picis liquidæ, terebinthinę siccæ, singulorum lib. i. uisci sexuncem, propolis trientem. Quidam etiā colophonix sextantē, galbani sextantem, picis & colophonix liquatis terebinthinam, deinde galbanum & propolim in mortario prius trita ammisceto, statimq; ubi ab igne sustuleris, uiscum adijcito, & rubicula agitato donec frigescat, facit ad strumas, meliceridas ulcera, & inflāmatos sub alis tumores, & ad abscessus colli. Repurgat & agglutinat. Añt porro Añiten lapidem gestatū ut inguen cōtingat, prohibere, ne intestinū assidue delabatur. Idem etiā tritus recte medicamentis quę imponuntur ammiscetur.

*De Emplastrorum præparatione ac coctura, & quę in ipsa coniunguntur, Galeni. Cap. xxv.*

Emplastrorum cōpositionis multæ ac uariæ particulares differentię sunt. Quædā enim ipsorum ad cruenta uulnera commoda sunt, itemq; uulnera agglutinant, atq; fracturis conueniunt, aliqua maturant, aliqua discutit, aliqua attrahunt, aliqua sinus explēt, alia resiccant, alia cicatricem inducunt, alia leniunt, alia pinguia sunt. Quorum omnium uarietates uaria simplicium medicamentorum natura distinguit. Quapropter prius simplicium uires cognoscere oportet. Ita enim etiā compositorum facultates & causas, propter quas inter se differunt, dinoscemus, ut nō solum singulorum naturas intelligamus, sed componendi quoq; artē ediscamus: quo si forte liber in quo pharmacorum cōpositiones quibus utimur scriptas habemus, intercidat, ipsi consimilia deperditis componere possimus. Graue enim fuit id quod duobus medicis mihi notis contigit: Quorum alter ob huiusmodi scriptorum amissionem mœrore contabuit, alter uero medicandi artē desinuit. Adest autem exercitatis, ad hoc quod pharmaca componere possunt, etiam iudicandi facultas de his quę priorum medici descripserunt, ut & his quę ab illis scripta sunt commode uti possis, & his quę ipse iuxta rectā methodum composuisti, præstat tamen his quę longo experimento probata sunt uti, quā noua usurpare. Sed uelut dixi necessitas aliquādo nos cogit in peregrinationibus, ut noua quædā & experimento non cognita usurpemus. At uero si omnibus præter naturam affectionibus simplici medicina mederi possemus, compositis non opus haberemus. frequenter enim ad certum quendam modum corpus calfacere uolentes, nullum simplex quod id facere possit reperimus. Nam medicamentum curandæ affectioni correspondere oportet. Quin & aliqua simplicia citra alterius mixturā in usum deduci non possunt. Velut quando medicamentum meatus obducens adhibere

uolumus, nullum simplex ad hanc rem idoneum habemus. Neq; enim bitumen, neque cera, neq; resina, neq; pix, neq; propolis, nec ladanū, nec ærugo, nec cerussa, nec argenti spuma, nec alia metallica, talia sunt. Ideoq; qui primo medicamenta emplastica & meatus obducētia excogitauerunt, cum oleo metallica coxerunt, & liquabilia eliquarunt. Deinde herbas siccas tritas ammiscuerunt. Cōtrā in aliquibus affectionibus, unico quidē simplici medicamento opus habemus, sed alia quædā illi miscemus, uel ad uirium ipsius uehementiam obtundendam, uel ad saporis asperitatem mitigandam, uelut quum ad purgantia medicamētia, quicquam ammiscemus ex his quę stomacho grata sunt. Et ad dolorem sedantia, quædam uim ipsorum lenientia, uelut castoreū & cætera huiusmodi, ad opium & mādregoram. Tunc autē maxima componendi pharmaca necessitas est, quum morbus contrarias facultates inter se requirit, uelut repellentes simul & extergentes, aut inspissantes & simul attenuantes, quale est quod ex papaueris capitibus ac melle paratur. papauer enim tenues destillationes à capite inspissat. Mel autē humores ad pectus iā delapsos, relectu faciles facit. Necessariō præterea componuntur medicamētia, ut idem medicamentum habere possimus ad plures morbos cōgruum, uelut ad uirus eiaculantium bestiarum ictus, & ad uenenosas potiones. De Antidotis ergo & epithematis satis supra tractatum est. Cæterum eorum quę in emplastra inijciuntur, quædam terrea sunt, uelut metallica, & lapidum ac terræ species, fecesq; ac cineres & testæ. quædam oleosa, quædam lacrymæ, quædam liquores, quædam succi, quædam liquabilia, quædam semina, quædam herbæ, quædam radices. Et rursus quædam qualitatibus expertia, quædam acria, quædam adstringentia, quædam calfacientia, quædam extensoria, quædam maturantia, aliqua diffundentia, aliqua mollientia, aliqua discussoria, & innumeræ aliæ differentiæ reperiuntur. Spuma igitur argenti exiccat, extergit, calefacit ac refrigerat moderate, ad omnia æqualiter efficax. Hæc aliquando in oleo solo, aliquando aqua aut uino, aut aceto ammixto coquitur. Primo autē seorsim exactissime terenda est, deinde rursus cum oleo ad strigmentiam compagem redigenda, atq; ita assidue agitata ad lentum ignem coquenda. Intumescit primum ac bullas emittit, quum autem sufficēti cocturæ propinqua fuerit, colorem fecis induit. Mensuram uero cocturę iustam recipit, quum tumor cōtractus fuerit, neq; amplius inquit. Similes spumæ argenti uires plumbago habet, ad frigiditatem tantum magis progressa, nec pariter extergens. Eodem etiam modo coquitur, nisi quod in eius coctura non solum queritur ut ne inquinet, sed ut colorē quoq; ex igneo rubore, ad fuluum ac ualde floridum trāsmutet. Aesustum adstrictionis & acrimonię particeps est, cōtrahit, cicatricem inducit, & ab inflammatione tutatur. Quum autem coquitur, nō statim in principio immititur, sed emplastro iam semicocto. Mensurā cocturę, nisi ualde modicum inijciatur, color indicat, ut uidelicet exuberet, & fuluum emplastrum faciat. Squama aeris carnem erodit, adstringit, & ualidius glutinat quā æs, sed minus discutit. Coquitur sicut æs, & eodem tempore inijcitur, eandēq; cocturæ rationē habet. Nisi enim color eius exuberauerit, & fuluum emplastrum effecerit,

N 4 nondum



nondum ad iustā cocturam peruenit. Squama uero ferri, praesertim stomomatis, ampliori adstrictione participat, quapropter ad malefica ulcera illi praefertur. Eodem autē tempore inijcitur, & rutilū colorem inducit. Diphryges mixtas uires habet, adstrictoriam cum acrimonia. Quare ad putrida ac maligna ulcera utilis est. Et hoc medio cocturae tempore inijcitur, bullitque donec color eius exuberet, neque amplius inquinet. Chalcitis adstrictione simul ac acrimonia participat, contrahit, attenuat, discutit, aperit, & amplius superioribus adstringit, ac minus mollit. Vsta uero tenuior euadit, & adstrictionem perdit. Coquitur sicut aes, citius tamen liquefit. Mensura cocturae est, ut rubicundius, ac puniceī coloris emplastrum faciat. Misy similes chalcitidi uires habet, tenuiorū tamen partium est, & ideo magis attenuat, discutit & aperit. Sed minus mollit ac adstringit. Ad finē uero cocturae inijcitur, neque ullā mensurā exhibet. Sori quoque similes chalcitidi uires habet, nisi quod magis terreū ac crassum est, atque ideo magis adstringit. Inijcitur & ipsum medio cocturae tempore, & tardius liquefit, & nisi quid prohibuerit, atrum colorē reddit. Flos aeris tenuior est aere usto & squama aeris, participat nonnihil absterforia ui, ideoque attenuat & agglutinat. Coquitur uelut de aere diximus. Atramentū sutoriū ex mixtis facultatibus constat. Valde enim adstringit, neque ingenerose calefacit. Prae omnibus itaque humidas carnes siccare, omnēque humiditatem consumere cogereque ac adstringere potest. Inijcitur medio cocturae tempore, & liuidiorem emplastri colorē facit. Imō nisi alia obsterint, atrum eius colorē facit. Auripigmentum & sandaracha ambo urendi facultatem habent. Magis igitur praedictis discutunt, & usta tenuioris essentiae sunt. Inijciuntur autē ad cocturae finem. Plumbum ustum ex his quae citra erosionem siccant, efficacissimum est ad maligna, chironiaque ac cancerosa ulcera, habetque per se, & cum alijs mixtum, facultatem inducendi cicatricem. Inijcitur medio cocturae tempore. Cerussa meatu obducit, & moderate frigida est. Cocta uero sicciore seipsa euadit. Haec in emplastro alba, ad finem cocturae inijcitur. Sic enim colorem conseruat, & magis inalbat. In nigra uero, aut melina statim in principio inditur. Aerugo aeris acrimoniae particeps est, discutiendi incidendique ac consumendi omnē carnē uim habet, plurimo autem cerato ammixta extergit ac cicatricem inducit. Haec in emplastro uiridia post cocturā inijcitur. In quibusdam uero ne inijcitur quidē in ollam, sed cum aceto in mortario teritur, & reliqua ad ipsam affunduntur. In melina uero emplastra medio cocturae tempore inditur. At in ea quae geminā faciem ac colorem praese ferunt, statim a principio inijcitur. Dū enim coquitur erugo primum melina, deinde bicolor, postremum fulua efficitur. Alumen omne uehementissimam habet adstringendi facultatem resicatoriam & agglutinatoriam. Omnium autem tenuissimum est scissile. Inijcitur plerumque post cocturam, neque peculiarem cocturae mensuram habet, color eius plerumque ad uiriditatem mutatur. Rubrica adstringit, resiccant, agglutinat, inijcitur in fine cocturae. Cadmia extensoriam uim habet, caliditate & adstrictione temperata. Vsta lota sine erosionem extergit ac resiccant, pompholyx quoque lenissimum

pharmacum est, & malignis ac ulcerosis ulceribus congruum. Inijciuntur ambo in cocturae principio. Sal mixtam facultatem habet extergendi ac adstringendi, magis tamen adstringit, & ualde resiccant. Nitrum autem extergendi incidendique ac exiccandi uim habet. In attractorijs emplastris sal ipsi misceri solet. Et ambo medio cocturae tempore induntur. Sulphur omne attractoriam uim habet, calidāque ac tenuis essentiae est. Inijcitur in fine cocturae. Nigrefacit enim emplastra. Atque haec quidēdem metallica sunt quae in emplastra inijciuntur. Terra uero in ipsa induntur, samia, erethria, cimolia, ampelitis & lemnia. Ex lapidibus autem phrygius, asius, pyrites, haematites, magnes, achates, iaspis, gages, cos. Horum uires superius exposuimus. Inijcitur & pumex, extergendi attenuandique ac discutiendi uim habens. Testae praeterea conchyliorum uistae, ac crudae, tanquam attenuantes, extergentes, ac discutiennes, & resiccantes, ad sinus glutinandos ammiscuntur. Idem praestant & fistilium testae, extensoriae etiam ipsae ac resiccantis facultatis. Inijcitur item calx tanquam praecclare resiccans, & ad cicatricem perducens. Cinis uero praesertim sarmentorum sinus agglutinat, callosque extergit ac resiccant. Haec omnia terrea in fine cocturae inijciuntur. At uero in pingua emplastra oleum recipientia, oleum statim a principio cum metallicis inijcere oportet. Si uero cum resina quadam, aut pice liquida emplastrum paratur, & oleum statim ab initio inieceris, incohærens faciet medicamentum. Quapropter ut compages fiat, resinas liquidas primum indere oportet, deinde in fine oleum superaddere, atque ita rursus ad bonam compagem coquere. Reliquae pinguedines, & praesertim adipēs recentes tenerrimi, medio cocturae tempore inijciuntur. Ex unguentis irinum quidem cocturam sustinet, cyprianum uero & rosaceum, minus ferunt, cetera omnino non tolerant. Quapropter haec in fine cocturae inijcies. Cera porro calefacit & moderate mollit, minusque glutinat uulnera cruenta. Nunquam coquitur per se, ita enim uratur. Neque cum resina aut pice liquida, ita enim incomposita maneret. Sed inijcitur ad oleum purum, uel aliud cum metallicis coctum, aut ad resinam uel picem praecoctam. Resina omnis multo magis quam cera calefacit, discutit, mollit, extrahit & aperit, ac cruenta uulnera glutinat. Et arida quidem resina post ceram inijcitur, liquida uero seorsim praeceteris omnibus coquitur, nisi admodum fuerit modica. Pix uires omnes resinae habet, sed ualidiores. Inijcitur praeceteris omnibus. Mensura cocturae liquidae est, ut cogatur. Siccae uero, praesertim si cum aceto coquitur, ut non amplius bullas emittat, neque intumescat. Bitumen cruenta uulnera glutinat, & praecclare calefacit ac resiccant, & sinus implet. Coquitur statim ab initio iniectum. Verum non minute tritum id inijcere oportet, habet enim asperitates ficuum granis similes. Quare crassius contundendum est, & in aceto coquendum citra agitationem, donec non amplius bullas emittit. Agitatum enim in grumos cogitur. At si absque aceto coquendum est, oleo simul additum facile liquefit. Propolis calefacit, discutit, maturat, extergit & attrahit. Hanc praemollire oportet, atque ita coquere ab igne ablatis iniectā. Nullā enim amplio



amplioſiorem cocturam tolerat. Ammoniacum mol-  
lit, diſcutit, caſcit, putredinem educit, attrahit. In-  
ijcitur medio cocturae tempore. Et ſi quidem coteri  
ac cribrari poteſt, leiſſimum inſperges. Sin minus,  
cum liquore quopiam leiſſigatiſſimum immittes. Cum ace-  
to quidē aut uino, ſi ad cruenta uulnera emplaſtrum  
paratur. Si uero ad fiſtulas aut ſtrumas, penitus cū  
aceto. Si uero molle fuerit emplaſtrum, qualia ſunt  
quae ad ſedem parantur, cum aqua, ita ut ad reliqua  
refrigerata infundas, ut ne efferueſcant, ac rurſus co-  
quas. Opopanax magis caſcit quam ammoniacū,  
diſcutit & reſiccit. Inijcitur peracta coctura, qua  
penitus modica opus habet. Et hunc aceto aut uino  
prius terere oportet. Galbanum ualde caſcit, con-  
coquit ac diſcutit. Cocturam autē penitus non tole-  
rat. Itaque ablato ab igne medicamento probe mol-  
litam inijcere oportet. Aut cum aceto uel uino ad  
ſtrigmentitiā compagem dilutā reliquis ammiſce-  
re. Sagapenum uires habet galbano ſimiles, magis  
tamen diſcutit & attenuat. Inijcitur in fine aceto aut  
uino prius tritum, ita ut cum ablato ab igne empla-  
ſtro emolliatur. Bdellium caſcit, diſcutit, attrahit,  
molliſcit. Inijcitur tritum poſt peractam cocturam. Si  
uero pingue fuerit, ac teri non poſſit, in mortario tu-  
ſum cum emplaſtro emolliatur. Thus parum caſ-  
cit, praeclare maturat, modice attrahit, & ſinus glu-  
tinat pollen eius, ſimiles uires habet, magis tamē ad-  
ſtringit. Quare medicamētis ad cruenta uulnera cō-  
mode miſcetur. Inijcitur utrumque in fine cocturae.  
Myrrha caſcit, concoquit, attenuat, diſcutit, & ex-  
ſiccit, facit ad uulnera cruenta. Inijcitur in fine coctu-  
rae cum aliquo liquore qui emplaſtris miſcetur con-  
trita. Aloē ex uarijs facultatibus conſtat. Adſtrin-  
git enim, caſcit, attenuat, diſcutit, ſinus glutinat ac  
reſiccit. Additur poſt omnem cocturam. Succus pa-  
paueris ſtrenuē perfrigerat, dolores ac inflāmatio-  
nes mitigat, & cruenta uulnera glutinat. Hic pridie  
in aqua modica maceratur, & in mortario teritur,  
atque ſic emplaſtrum ad ipſum diſfunditur. Tha-  
pſia caſcit & rubificat cutem. Inijcitur poſtrema  
liquore quodam trita. At uero nulla herba, aut ra-  
dix, aut ſemē cocturam tolerat, celerrime enim cor-  
reſiunt. Teruntur igitur ac manent in mortario, &  
liquefacta reliqua ad ipſa diſfunduntur. Aliquan-  
do tamen herbas aut radices praemaceratas, in oleo  
coquimus, & expreſſas abijcimus, & oleum ad me-  
dicamenta aſſumimus.

De cruentorū uulnerū curatione, Galeni. Cap. xxvi.  
Parua & ſuperficiaria uulnera, natura ſua ſponte nū-  
lius medicamenti indiga ſanare ſolet: labia ſolum à  
nobis contrahantur, & ligamento circundentur, ne  
piſſus, aut arena, aut tale quid illabatur, & ulcus pe-  
nitius coaleſcat. At ſi amplum fuerit uulnus, ut labia  
contrahi non poſſint, & ſanies congregetur, aut ura-  
geat dolor, tale uulnus ſola labiorum contractione  
agglutinari non poteſt, ſed per medicamēta reſiccā-  
tia collectam ſaniem conſumere, & aſſluentem pro-  
hibere oportet: talia uero ſunt agglutinatoria phar-  
maca inflammationem arcētia. Si uero uulnus pro-  
fundius fuerit, & in ſuperficie anguſtius, ſcalpello in-  
cidatur, ut aequalis amplitudo fiat, & inſinuati hu-  
mores non putreſcant, neq; uicinas partes corrup-  
pant: proinde qui cruenta uulnera glutinare uolue-  
rit, haec conſideret, & prā omnibus grumos dili-

genter ex uulnere educat. Quantulacūq; enim eo-  
rum pars in cautate relictā in pus cōuertitur, & car-  
nes ſubinde putrefacit. Educemus autē grumos ſpō-  
giarum mollium aſſiduo ſortu, atq; haec nō in omni-  
bus ex aceto exprimantur. Sed ſi uulnera ſine eru-  
ptione ſanguinis fuerint, aqua ſolum foueantur, ita  
enim carnem nihil offendemus, quam adſtringens  
acetum impedit ne cito coaleſcat. At uero profun-  
diora uulnera penitiores & difficulter extirpabiles  
grumos in ſe habētia, aceto rigabimus, quod ex ſpō-  
gia uſq; ad fundum ipſorum exprimemus. Acetum  
enim ad diſſoluendos gumos efficax eſt, per adſtri-  
ctoriā facultatē aperta uafa occludens, allationemq;  
ſanguinis cohibens, quibus omnibus à principio in-  
tentum eſſe conuenit, etiam ſi aliās acetum obturan-  
do corpora, tardioſiorem faciat uulneris unionem. Cae-  
terum ſi in capite uulnus fuerit, ſupra relata mēbra-  
na caluariam ambiens conſideranda eſt, an illaeſa aut  
ſimul pertuſa ſit: Si enim illaeſa permanſerit, labia ſu-  
turis protinus contrahes, & agglutinatorijs uteris.  
Si uero perforatam aut cōtuſam reperiſ, ad tutio-  
rem curationem membranam diſſecabis, & os dili-  
genter derades, linamenta q; cōuulſa indes, & forin-  
ſecus ſplenium inflāmationem arcens impones, &  
ſupra id lanam ſuccidā ſeu ſpongiā molliffimā,  
uino aut aceto imbutā ac expreſſā, ſine oleo ad-  
hibebis, praecipue ſi ſanguinis eruptio praecēſit,  
poſtea ſaſciolā lineā aceto rigatā ac expreſſā  
obligabis, uinculi capite in uulneris loco ſtatuto,  
quemadmodū in artuum fracturis fieri ſolet. Stu-  
dio uero habendum eſt ut ligatura ſurſum uergat.  
Verum conſtrictionem eius moderatā eſſe cōuenit.  
Nā uehemētiore dolore excitat, laxior inutilis eſt,  
poſt tertiā diem uulnus fractura carens ſpongijs fo-  
ueatur, deinde linamēta medicamēto ſuppuratorio  
illita indantur, & reliqua ſuppuratoria curatio ad-  
hibeatur, poſtea ad repurgandum ac incarnandum  
progreſſus fiat, quemadmodū paulō poſt de ueri-  
bus indicabitur. Porro quoniā rupta caluarię mem-  
brana, ubi uulnus negligitur, inflāmatio cōſequi-  
tur, ſi in principio inflāmationis uoceris, protinus  
ſiccare uulnus conare, & membranā diducere atque  
os caluae deradere. uulnere enim diducto, inflāma-  
tio antequā excaſceſcat, ſupprimitur: facta diſſe-  
ctione linamēta indes, & ad ea retinenda linetū uino  
& oleo imbutum, aut ſplenium inflāmationē arcēs,  
forinſecus impones, & ſupra hoc lanā uino & oleo  
imbutā adhibebis. Et deinde ad ſuppuratoriū ductū  
te conuerſes. Si uero inflāmationem uehementē na-  
ctus fueris, deradiſ capillis locum aqua moderate ca-  
lida rigabis, & medicamēta adhibebis inflāmationē  
ſedantia. Inflāmatione uero ſedata, mēbrana caluam  
ambiens ſuppuratur, & uicināe partes abſceſſum pa-  
tiuntur. Quapropter expedit ut diſſecetur uelut di-  
ctum eſt, & pus excernatur, ac caluarię os derada-  
tur, & poſtea cōmunis ulcerum curatio fiat. Si uero  
fractura in capite aut alio loco unā cū uulnere fue-  
rit, emplaſtrum ad fracturas accommodatum impo-  
natur. De eo uero partem quadrangularem reſecare  
oportet, quo loco uulnus exiſtit, aliudq; parū ſple-  
nium uulneri imponere, quale diximus. Atque hoc  
paruum ſplenium quotidie tollendum eſt, & ulcus  
curandum, ac deligandum. Cæterum agglutinato-  
ria medicamenta Sermone xv. ſcripta habentur.

De ſane



De sauciatis nervis, Galeni.

Cap. xxvii.

Nervus uulneratus aut punctus, dolorem & inflammationem uehementissimā habet, propter sensus subtilitatem. Quapropter cutis uulnus inagglutinatum seruare oportet, quo per ipsum saniosi humores effluant. Vbi uero uulneris os latius fuerit, conari ut resiccantibus medicamentis labia ipsius committantur ac uniantur. At si per acum aut paxillum, aut tale quiddam, uulnus inflictum fuerit, & in altum progressum, id saltem studio habendum est, ne inflammatio sequatur. Essetque longe tutius ut cutis circa uulneris osculum dissecaretur, quo commodius in altum procederent uires medicamentorum. At uero si uires ualidae fuerint, & nihil impederit, uniuersum corpus per uenae sectionē euacuetur. Seruandaque est in euacuando locorum affinitas, ut dextra manu sauciata, dexter malleolus siue talus, sinistra sinister incidatur: Et uice uersa dextro crure uulnerato, subalaris uena dextrae manus, sinistro sinistrae, rectitudine seruata secetur. Si uero subalaris non apparuerit, mediam secabimus. Quod si corpus uiciosi humoribus repletum fuerit, purgatione per idoneum pharmacum utemur. Caeterum aqua calida quae reliquis inflammationibus commodissima est, his infestissima existit. Ab humectantibus enim & calfacientibus putrefactio inducitur: praestat igitur nervos sauciatos oleo moderate calido tenui, ac nihil adstringente rigare, tale autem est dulcissimum, quod melius longe fuerit, si annos duos aut tres habuerit. Nerui enim sauciati curatio medicamentis opus habet, quae tepidam caliditatem habent, ualde uero siccant, atque hoc citra molestiam, & quae substantia tenuissima praedita sunt. Huiusmodi enim sola sine partium distensione ac mordacitate, saniem ex alto euocare possunt. Quapropter oleo in quo anethum & ruta decocta sunt, calido perfundimus. Saepē etiam ceratum ex Euphorbio, aut emplastrum Anicerum, aut quoddam ex his quae ad uulneratos nervos describuntur, modico oleo liquidum adhibemus. Deinde emplastro aliquo ex praedictis imposito, lanam oleo calido imbutam extrinsecus illigamus, & per singulos dies bis aut ter soluimus. Et si longiores fuerint noctes, noctu quoque, praesertim ubi mordacitas uulnus iritet. Quod si neque mordacitas, neque dolor percipiatur, bis tantum in die, & circa uesperam semel soluimus. Et praeterea alas ac collum oleo calido large rigabimus. Si uero nervus in crure sauciatus fuerit, inguina ac totam spinam & collum, oleo item calido ubertim perfundimus. At uero si nervorum uulnera a principio male fuerint curata, maxima inflammatio ac putrefactio sequi solet. Itaque farinam ordeaceam, aut fabarum, aut erui in lixiuio cum aceto mulso coctam imponere oportet. Est enim hoc cataplasma efficax ad ea quae iam putrescunt. Si uero uehemens inflammatio cum maximo dolore infestauerit, farinam erui aut fabarum cum optima sapa, modico aceto addito coctam imposito, calido oleo prius affuso. Ceratum uero ex euphorbio ad nervos uulneratos, cuius paulo ante mentionem fecimus, hoc modo praeparatur. Ceræ, terebinthinae, olei, singulorum trientem, euphorbij recentis sextantem, aut biennalis quadrantem, aut prorsus antiqui trientem. Et si terebinthina defuerit, colophoniam pro ea accipito. Longe uero praestantius euadet medicamentum, si propolim

pinguem ac recentem acceperit, ut sit terebinthinae quadrans, propolis triens, ceræ uncia i. olei triens, euphorbij sextans. Deficiente uero euphorbio, sulphur, aut castorium, aut cōsimile quiddam calidum ac tenuium partium ammiscabis. Quod si omnino ab exacta & media pharmacorum ad sauciatos nervos compage aberrandum sit, praestat ad molliorem compagem declinare, etiam si ita paratum inquinet. Optimum praeterea ad eundem usum pharmacum est ex brutia pice & oppopanace, quod etiam ad morsus canis rabidi facit, praecipue si corpora contigerint robustiora. Nam in tenerioribus per ceratum ex oleo aliquo discussorio uires eius mitigare potes, quale est irinum, aut amaracinum, aut opobalsamum, aut oleum uetus. Egregie facit & Anicerum, quod sermone xv. inter emollientia medicamenta habetur. Quin & ex metallicis constans pharmacum, efficax est ad nervorum punctiones. Habet id hoc modo. Chalcitidis crudae drach. viii. misyos crudi drach. xvi. squamæ aeris drach. xxiii. ceræ drach. xcvi. olei dulcis aut ueteris, aestate quidem drach. cviii. hyeme uero centum xx. thuris drach. xxi. terebinthinae drach. xvi. galbani drach. xii. aceti acerrimi & antiqui quantum satis est. Metallica ad solem aestiuum pluribus diebus terito, indeque addito thure rursus conterito, & quae liquari possunt liquata affundito ac subigito. Hoc medicamentum uulneri appositum inflammationem arcet, uelut saepe experti sumus. Admirandum praeterea ad sauciatos nervos medicamentum est quod e senecione paratur, & habet senecionis succi uncias xxiii. olei antiqui, olei cyprini, olei dulcis, apochymatis siue picis e nauibus erasae, singul. trientem, galbani, æruginis, singulorum drachm. iiii. terebinthinae drach. vi. adipis ueteris drachm. xi. ceræ drachm. viii. resinæ pinus siccae drachm. vi. Succum cum oleis coquito donec prope modum consumatur. Aeruginem uero cum modico succo terito, & quae liquari possunt liquato ac excolato, injecta quoque terebinthina cum decoctis uncto, postremumque omnia ad æruginem tritam affundito ac subigito: facit ad maximas musculorum in uulneribus inflammationes. Et duritias ac recētes puerorum strumas dissoluit. Porro qui sauciatos nervos habent, urgente necessitate post septimam, uel ubi dolor penitus quieuit, lauari possunt. Verum lauandis medicamenta uulneri indimus, & forinsecus multiplicia lintea oleo imbuta imponimus, & fasciam ex linteo obligamus. deinde egro in solum descensuro, ligamenta multo oleo rigamus. Et post balneum remotis omnibus quae applicata fuerant, praescriptam curationem adhibemus. At si uulnus in manu fuerit, admoneatur æger, ne id calidae siue frigidae lauacro humectet. Oribasij ad priuatos sauciatorum nervorum abscessus: priuatos autem uocat, quando in proximis puncturae locis abscessus parui & multi per certa interualla oriuntur. Ceræ, colophoniae, butyri, singulorum lib. i. picis siccae, mellis singulorum sexuncæ, æruginis quadrantem, aceti quantum satis est ad æruginem conterendam ac dissoluendam.

Curatio nervorum denudatorum ac uulnerorum in ulceribus.

Cap. xxviii.

Quod si nervus non fuerit punctus, sed manifesta dissectione incisus, ita ut etiam cutis praeposita sit dissecta, & appareat nudus nervus, secundum rectitudinem & non transuersim



transuersim dissectus:relata ex euphorbio aut metal-  
licis medicamēta,minime adhibēda sunt. Abstinē-  
dum etiā ab emplastro Aniceto, & ceteris tanta acri-  
monia præditis. Nudus enim neruus uehementem  
ipforum uim non feret, proinde calcem assumes lo-  
tam plurimo rosaceo dilutā. Sit autē calx in diebus  
canicularibus ad solem aqua dulcissima sæpe elota  
ac resiccata. Bonū est & ex pompholyge medicamē-  
tum plurimo ac optimo rosaceo dilutum, pompho-  
lygem autē itidem lauare uelut calcem oportet. Sed  
& cera in huiusmodi pharmaca recipienda lauanda  
est. Per omnē enim denudati nerui curationē, resicca-  
re citra mordacitatem intendimus, quare nihil acre  
uulneri admouendū est. subtilissimo enim sensu præ-  
ditus est neruus, & tēperamento frigidus, ac princi-  
palissimo principio cohærēs ac coniunctus. Sed nec  
oleo tale ulcus rigandū est. sordidum enim inde eua-  
dit. Verum lana molli specillo obuoluta sanies de-  
tergenda, & ne arida lana uulnus contingat, sapa im-  
bui potest, & ea expressa uulnus detergi, præterea  
medicamēta quæ adhibētur, tepida esse oportet. Quæ  
enim frigida apponuntur conuulsionē inducunt. Ad  
neruos quoq; denudatos emplastrū Aegyptium ef-  
ficacissimū est, quod ē succida lana paratur, & fuluū  
piscatoris, ambo rosaceo diluta & linamentis indi-  
ta. Omnium autem præstantissimū est & nulli com-  
parandum emplastrū Ihs appellatū, optimo rosaceo  
dissolutum, & cū linamento tepidum ulceri inditū.  
Sedat enim dolores & sordida ulcera cito repurgat,  
incarnat, & ad cicatricem perducit. At ubi linamēta  
ulceri immiseris, forinsecus emplastrū ē senecione si  
haberi potest, sin minus, anicetum adhibebis. Cæte-  
rum si uulnus nerui transuersum fuerit, maximum  
cōuulsionis periculū imminet, inflāmatione à disse-  
ctis fibris ad integras transeunte. Quod si integre fi-  
bræ couulsæ fuerint, eadem curatio & his, & ulceri  
adhibetur, parcius tamen hinc ægro sanguis auferen-  
dus est, & diæta tenuis constituenda, & quies impe-  
randa, & stratum mollissimum parandum, pluri-  
mum item oleum calidum inguinibus, spinæ, axil-  
læ, collo, ac capiti affundendum est. Atq; hæc cura-  
tio communis ad omnia neruorum uulnera est.

*De neruorum contusione.*

*Cap. xxi.*

Contuso neruo si cutis simul contusa fuerit, & ulcera-  
tio fiat, farinam fabaceam cum aceto mulso, aut erui  
farinam cū sapa & modico aceto impones. Ambæ  
enim sunt efficaces. Quod si cum contusione dolor  
adsit, picem liquidam ad fabaceæ farinæ cataplasma  
addes, & simul cocta calida adhibebis. Si uero maio-  
ri resiccatione opus habueris, parem mensuram fa-  
rinæ erui ammisceris, itemq; iridem illyricā, si ad-  
huc fortius resiccare uolueris. Vniuersi uero corpo-  
ris curatio eadem est cum ea quam paulò antea præ-  
scripsimus. At si neruus fuerit contusus citra manife-  
stam cutis contusionē, oleo calido discussorio, ane-  
thino aut rutaceo locus asidue perfundatur, & lana  
oleo imbuta adhibeatur. Reliqua uero curatio præ-  
dictis similis fiat. Porro si totus neruus fuerit disse-  
ctus, nullū quidē periculū imminet. Verū pars mu-  
tila sit, præsertim si dissectus neruus magnus fuerit.  
Curatio uero eadē uelut ad alia ulcera adhibetur.

*De glādularū inguinis inflāmatione, Galeni. Cap. xx.*

Quū glandulæ inguinis uniuerso corpore pleno, citra  
aliam manifestā causam, inflāmatae intumuerint, hu-

mores circa glandulas constipantur. Proinde nisi  
quid prohibeat, cubiti uenam secabimus, tantumq;  
sanguinis auferemus, quātum plenitudo ostenderit.  
Loco uero inflammato & ante sectionē uenæ, & in  
ipso sectionis tempore, adstringentia ac repellentia  
medicamenta apponemus. Verum postea euacuato  
corpore, discutientibus ea quæ affluerunt utemur.  
At si ulcus in crure fuerit, & per consensum glandu-  
las inguinis affligerit, quemadmodū in digitorum  
pedis offensa fieri solet, glandulā inflāmari incipien-  
tem statim à principio lana oleo calido imbuta miti-  
gabimus, non adiecto sale, uelut aliqui faciunt. Sal  
enim tenuiores humores cōfertim discutiēs, reliquū  
callosum, ægre curabile, & sæpe immedicabile re-  
linquit, postquam autē inflāmationis feruor quies-  
uit, mitigatoria relinquemus, & discussorijs utemur,  
quæ ad cerati compagem redacta glandulis impo-  
ni debent. Nam quæ duriora fuerint, eas partes di-  
stendunt, & rursus inflāmationes iritant. Atq; hoc  
quidē modo glandulæ tractentur, ipsum uero crus  
statim à principio calfaciendū ac humectandum est,  
ita ut ulceri inflāmationis causæ cataplasma mitiga-  
toriū, aut ceratū aliquod ad sedis affectiones paratū  
imponas, totumq; membrum lana oleo calido im-  
buta foueas, & ægro quietem imperes. Sedato autē  
ulcere plerunq; etiā glandulæ doloris exortes fiunt.  
Egrege uero glandulis confert psyllium aqua cali-  
da madefactū, & panniculo aut brassicæ folio exce-  
ptū & impositū. Item ceratū ex butyro paratum, &  
quod ostrea usta recipit. Confert & discussoriū em-  
plastrum Dionysia appellatum, & quod ē buccinis  
præparatur, quorū omniū præparationes Sermo-  
ne xv. habetur. Vbi etiā ceratum ē psyllio est, aut  
emplastrum, si ita appellare malueris.

*De quacunq; inflāmatione, eiusdem.*

*Cap. xxxi.*

Omnis inflāmatio ob sanguinis affluxum, uel à mani-  
festa, uel ab occulta causa generatur. A manifesta,  
quādo ab offenso pede glandulæ inflāmantur. Ab  
occulta, quando aliqua parte delegante, aut toto cor-  
pore transmittente, & affecta parte ob debilitatē reci-  
piente, humorū copia affluerit, uelut suprā de po-  
dagra ostensum est. Sæpe uero etiā pars quæ inflam-  
matur ob morbosam aliquā & præter naturā calidi-  
tatem, materiā ad se trahit. Erit itaq; inflāmationis  
principiū, quum primū pars sanguinea materia re-  
pletur. Augmentū uero, quādo affluxus aliūde cesa-  
sat, & qui in parte cōtinetur putrescere incipit. Atq;  
eo tempore calor præter naturā incrementū, & hu-  
morum diffusio, & partis distensio longe maior est  
quāam antea fuit. Vbi uero iam pus cōflatur, maxi-  
mūq; dolores adsunt, inflāmatio in uigore est. Declī-  
nationem autē dicimus, quū allapsus humor discus-  
titur, & tumor ac distensio minuitur, & dolores mi-  
tigantur. Inchoante itaq; inflāmatione uictus ratio  
moderāda est, cibuscq; contrahendus, & aquæ potus  
imperādus. Et si inflāmationis magnitudo sāguinis  
detractionē postulat, & ætas ac corporis habitus, &  
anni tēpus nō obstat, præsertim in hominibus sāguis  
ne abundatibus, post præstitutā uictus rationē, uenā  
secabimus, tantūq; euacuabimus, quātum plenitudo,  
& inflāmationis magnitudo, & ægri uires indicaue-  
rint. Verū in principio, & ante uenæ sectionē, & ipso  
sectionis tēpore, inflāmatę parti cataplasmata repel-  
lētia adhibebimus. In augmēto uero ex discussorijs  
aliqua



aliqua ad repellentia ammiscemus. At in uigore dū uehementissimi sunt dolores, mitigatoria applicabimus, uelut in declinatione ea solū quæ discussoriam uim habent. Inchoantes itaq; inflammationes repellunt glauciū, perdicū, stratiotes in aquis nascens, plantago, polygonū & similia. Mitigant autem & dolori in uigore inflammationis cōmoda sunt, malua per se, & cū modico pane ac rosaceo imposita, præstat & melilotū passo coctum & cum pane impositum. Idē præstant palmulæ in passo coctæ, & cum pane ac rosaceo subactæ impositæ. In declinatione uero agrestis malua pollet, & uuæ passæ, uinaceis exēptis, cū pane ac modico melle. Item ordeī farina cum melle aut oleo adhibita. Quod si locus affectus nimia materia turgat, nō mox ad chirurgiam prorumpere oportet, uelut quidā faciunt, sed conari ut materia collecta per pharmaca discussoria digeratur. Quale est quod ē buccinis uitis cōstat Ariobarzantium appellatum, aut Oribasij fuluum, aut quod Dionysias appellatur ē misy paratū, & reliqua eius generis, quæ Sermone xv. habetur. At si residuū ex inflammatione callosum factum fuerit, uehementioribus medicamentis utendum erit, ita ut singulis diebus bis quantum ea proficiant inspectemus.

*De abscessibus.*

Cap xxxii.

Si inflammationes producantur, & ad suppurationem conuertantur, adiuuare oportet ut quā celerrime transmutentur, proinde partē affectā altheæ ac ficū decocto rigabimus, & farinā ordeī aut panem cum aqua & oleo imponemus. Quod si egre suppuretur inflammatio, hordeum aut panem in pinguiū caricarum & altheæ decocto coctū imponemus. At si adhuc diutius perstiterit, simū columbinū, & nitrum, & terebinthinā adijciemus, peracta uero transmutatione in pus, locus aperiatur qua parte maxime eminet. ibi enim tenuissima est cutis. Et si pars aliqua suppurati loci, putrida uidebitur, ea necessario rescindenda est. Resectio autē ad myrti folij formam fiat, lōga uidelicet & angusta, quod sanē in axillis ac inguinum abscessibus faciendum est. In capite uero & huiusmodi locis simplici sectione utemur, qua facta thuris pollinem tenuissimum ulceris cavitati inspergemus, & linamenta cōuulsa indemus. At uero ubi duæ aut tres sectiones factæ fuerint, limniscos immittere oportet, & postea linamentis conuulsis ulcus replere. Ad tutandum uero locum simplex linetolum uino & oleo imbutum obligabimus. Tertia deinde die ad suppuratorium curationis ductum conuertemur, per tetrapharmacum & similia rosaceo diluta. Si uero post indita linamenta circumsitæ partes adhuc fuerint inflammatae, cataplasmata adhibebimus, & si nihil amplius urgeat, splenium sedandis inflammationibus aptum imponemus. Cæterum suppuratione facta repurgantibus utendum est, ex quorum numero præstat emplastrum Aegyptium, quod recipit terebinthinæ liquidæ & mellis ac rosacei portiones æquales simul liquatas. Sed in robustioribus corporibus, ac impurioribus ulceribus, terebinthinæ ac mellis par mensura absq; oleo liquatur, & mirifice repurgat. Verum ad ulcera quæ difficulter repurgantur, confert Aegyptiū quod coctum appellatur, colore fuluū, cum ærugine rasa ac melle coctum, donec fuluum colorē susceperit. Sunt & alia huic similia, quæ ad fistulas paulō post refe-

rentur. Repurgatis ulceribus ad incarnatiā transeundum est, quæ paulō inferius ad caua ulcera describemus. facta uero incarnatione, rhodio emplastro aut psaro cōmittantur, & ubi explanata fuerint ad cicatricem perducantur, per sicca medicamēta quæ referentur ad ea quæ cicatrice opus habent. Suppuratorium abscessuū, experimēto constas. Maluæ agrestis tritæ ac coctæ, farinæ tritici, stercoreis suilli, æquales partes in sapa coquito, ac imposito, & celerrime suppuratio cōtinget. Philosophi. Ad omnes inflammationes discutendas, facit priuatim ad mamillas & glandulas inflamatas. Adipis suilli sexuncem, albumina ouorū duorum, mel ad ouorū mensuram, nitrī sextantē, farinæ polētæ quantum satis est. Adipi liquefacto oua ammisceto & mel, deinde nitrū, postremum etiā polentæ farinam quantū ad emplastri compagem satis erit. Sunt qui ita præparent. Accipiunt oua unā cum uitellis undecim numero, farinæ polentæ libram unā, adipis suilli librā unam, mellis quantum sufficere putant. Nam discutere uolentes, uberius sedare intendētes, parcius ammiscent. Quisdam etiam nitrū addunt. Sed quod nitrū habet, magis discutit, quod nō habet, magis sedat. Vtere præterea eo quod ex psyllij succo paratur. Ruptoriū abscessuum. Nitrum & ammoniacū aceto subacta impone, quā diu locū perrumpi uolueris. Quidam pro ammoniaco thus adijciūt. Abscessus autē etiam permutatos discutiūt, Ariobarzantium ex buccinis constans, & quod Dionysias appellatur, ambo in sequēti Sermone descripta. At quod ad Oribasij refertur sic habet, lapidis pyritæ drac. xii. ammoniaci thymiamatis tantundē, farinæ fabarum drac. vi. terito ac cribrato & resina excipito. Sitq; resina, si haberi potest terebinthina, sin minus, liquida, quo emplastri forma fiat. Hoc uel discutiet, uel dirumper, euacuabit, ad cicatricem perducet, & sanabit. Nec uero diutius antea præparandū est hoc pharmacum, cito enim exarescit. In decimo quinto Sermone etiam aliud discussorium, & aliqua ruptoria reperies. Oribasij Aegyptium repurgans. Mellis despumati libram unam, aceti libras duas, squamæ æris uncia. i. æruginis drach. iiii. Acetum & mel ad mellis compagem coquito, deinde reliqua ammisceto. Aliud, eiusdem, ulcera sordida probe repurgans. Amurcæ coctæ, mellis despumati, aluminis Phorimi appellati, æquales portiones. Aliud ad abscessus, discutiens aut rumpens, & sine dolore euacuans. Spumæ argenti, cerusæ, ammoniaci, singulorum librā unā, olei quantum satis est, resinæ pinus, propolis, opopanacis, singulorum sexuncem, castorei trientem, galbani, myrrhæ, thuris, singulorum sextantem. Aceti quantum sufficit. Spumam argenti & cerusam cum aceto coquito, & terenda cum aceto terito, & quæ liquari possunt liquefacito, & ad coctā ammisceto, & tritis adijcito, refrigerato, ac subigito.

*De cauis ulceribus non malignis. Et ratio curandarum ulcerum. Galeni.*

Cap. xxxiii.

Cauum ulcus humidum ac sordidū est, & ideo pharmacis moderate siccantibus ac extergentibus opus habet. Sæpe uero à nobis dictum est, non omni naturæ eadē medicamenta cōuenire, sed debiliori molliorib; molliora, ualidiori ualidiora esse adhibenda. Neque enim tolerat debilis natura potentiora, proinde quanto humidius fuerit corpus in quo est ulcus,



ulcus, tantum minus resiccātes medicinas postulat. Quare duobus ulceribus æquali humiditate præditis, alterū quod in sicciore temperatura est, maiorem resiccationē postulat; alterū quod in humidiorē est, minore resiccatione opus habet, quanto hæc natura alia humidior existit. Carnem enim, quæ ad ulceris nutritionē distribuitur, reliquo corpori similē esse oportet. Vbi igitur pristina caro sicciore est, ibi noua quoque superueniens sicciore fieri debet. Merito ergo resiccāda est, & quanto prior sicciore fuerit, tanto ampliorē siccandi facultatē medicamentū habere debet. Et uice uersa, tanto minus resiccātia medicamēta conueniūt, quāto minus sicca prior fuerit caro. Thuris itaque qualitas ad humani corporis naturā comparata cū temperatis & medijs naturis cōsentit, humidiores autē paulo amplius resiccāt, quēadmodū sanē etiam extreme siccis, aliquādo humidius existit. Si igitur diligenter obseruariis, comperies thus in humidioribus quidem naturis carnē producere. In siccloribus autem minime, sed potius suppurare. Thus ergo sicut moderate calidum est, ita ex omnibus incarnantibus appellatis minime siccāt. At hordeacea & fabacea farina magis siccāt quā thus, & nulla caliditate participat. Aristolochia uero & panax omnibus amplius in suo genere resiccāt, & calidioris sunt naturæ. Mediū uero inter hæc obtinent, farina erui & iris. Et huiusmodi omnia in primo ordine resiccantiū ac extergentium locantur, & minoris ac maioris discrimine tantū inter se differunt, & quod alia uires quibus excellunt simplices habent, alia cōpositas. In libro uero De simplicibus medicamentis ostendimus pompholygem uisā & lotam, & cætera huiusmodi, uelut cadmiā & ostreorum testas, ex eorū esse ordine quæ sine mordacitate siccant & incarnant. Præterea ad ulcera caua incarnāda emplastrum uiride cōducit, quale est quod Ihs appellatur, multo rosaceo dilutum. Qui ergo recta uia medicandi procedet, ubi ægri naturā considerauit, statim dinoscit, quo medicamento ulcus indiget. Quū autem medicamentum incarnans adhibuerit, & nihil profecerit, sic quodammodo ad aliud transire oportet. Nam si ampliores sordes fuerint, & humidius ulcus, nosse debet quod medicamentum minus quā oportuit resiccauit, quapropter mellis ammixtione uires eius intendet. Si uero purum & humiditatis exors ulcus cōpererit, plus quā debuit resiccauit, quare oleū ammiscabit, & ceratū liquidū adhibebit. Atque in his summa diligentia utendū est: contingit enim aliquādo, ut à fortiore medicamēto ulceris caro colliquetur, & sordidum ac humidū appareat ulcus, uelut ea quæ minus quā oportuit sunt resiccata. Verū hoc à peritis facile dinoscitur: ulcus enī eliquatū cautius seipso efficitur, & labia protuberantia habet, rubet itē & inflammationē habet, & æger sæpe manifestē mordacitatē percipit. Alterū autē ulcus, quod minus resiccātū est, tale nihil cōsequens habet.

*Medicamenta quæ per linamēta indūtur, ad suppurandū, repurgandū ac incarnandū. Cap. xxxiii.*

Sunt & alia multa ad repurgandū idonea, uelut lens, iris, marrubium, singula cum melle cocta, herinacei marini testa uisā, narcissi radix cū rosaceo & melle. Basilicum uero tetrapharmacū, & quod ad Azaniten refertur, & Macedonicū, singula liquefacta suppurandi uim habēt, & omnia Sermone xv. descri-

bentur. Sed & hoc mirifice suppurat, omnē quoque duritiā citra dolorē emollit, & incarnat, & cauis ulceribus eximie prodest. Cerae, terebinthinæ, medullæ ceruinæ, adipis uitulini, anserini, bubuli, butyri recentis, mellis attici, olei rosacei, myrrhæ, singulorū drac. viii. Myrrha cū melle trita ad prunas coquitur, & reliqua liquata affundūtur ac unīuntur. Aliud Aegyptiū, ad ulcera repurgāda mirādū. Mel cū pari terebinthinæ mēsurā, aut rosaceo, aut si neruosæ fuerint partes affectæ butyro ad prunas colligamus. Verū in robustioribus corporibus, & sordidioribus ulceribus, terebinthinā cū melle adhibemus. Vtere etiā eo quod ex melle, aceto, & liliorum succo constat, quod Galenus ualde approbauit, cuius præparationē & utendi modum, in simplicium Sermone, capite De lilijis habes. His omnibus efficacius est quod aliqui Aegyptium uocant, sic habens. Aeruginis drac. iiii. squamæ aeris unc. i. aceti trientem, mellis dodrantē. Arida cum aceto terito, & adiecto melle ad prunas ad fuluum colorem coquito. Aliud aureū uocatū, antiqua & recentia uulnera repurgans & incarnans. Salis cōmunis, cerusæ, atramenti sutorij, spumæ nitri albæ, singulorū quadrātem, aristolochiæ longæ & rotundæ, aluminis scissi, singulorū unc. i. Arida cū aceto trita, ceræ sextante & olei dodrante excipito: deinde usu experire cū plurimo rosaceo ad olei spissitudinē diluito, & admiraberis. Idem capitis quoque ossibus denudatis per linamenta inditur. Aliud caua ulcera replens. Adipis uitulini recentis, ceræ, terebinthinæ, singulorum drac. iiii. rosacei drac. xvi. para & utere. Aliud Archigenis Nutrix appellatū, ad cauitates explendas. Rosacei, terebinthinæ, mellis, singulorū sextante, cerusæ, butyri, singul. unc. i. para & utere. Quidam & thuris unc. i. addunt. Aliud ad caua & pura ulcera explenda, experimento cōstans. Rosacei trientem, ceræ sextante, terebinthinæ, butyri, mellis, singulorū unc. i. Omnibus ad calidū cinerē colliquis ac simul unitis ad linamenta tingēda utere. Si uero sordida fuerint ulcera, repurgatis antea uelut dictū est, adhibeto. Aliud. Cerusæ, spumæ argenti, pares portiones uino odorato & oleo excipe, & per linamēta usque ad cicatricē inducā inde. Aliud, ad sordida, cicatricē non recipientia, maligna, ac callosa ulcera. Marrubij succū optimo melle exceptū inde. Aliud siccū, maligna & profundissima ulcera explēs. Farinæ erui drachm. xxx. iridis drachm. x. spumæ argenti drach. xv. aristolochiæ longæ tantundem, mannæ thuris, terræ samii, singulorū drac. x. squamæ aeris, cadmiæ, singul. drach. xv. Hoc in sordidis largē, in puris parcissimē linamentis illinito. Exaquatis uero ulceribus & iam cicatrice indigentibus, aridum specilli nucleo inspersum ulceri indito, & postea linamentum uino imbuto immittito.

*De siccis repurgātibus, ac incarnantibus, cephalicis appellatis, Galeni.*

Cap. xxxv.

Sicca medicamēta quæ cephalica, hoc est, capitalia appellantur, omnibus quidem totius corporis, maxime tamen capitis ulceribus incarnandis conueniūt, præsertim ubi ossa in quacunque parte fuerint denudata. Nam ad ossa denudata pinguium & eorum quæ ad tingenda linamenta parantur, usum uitamus, & siccis tantum utimur. Quin & citra ossium denudationē, pinguia non ita frequenter in ulcerum cura-

O tione



tionem adhibemus. Sunt autē sicca cephalica huiusce-  
modi. Asclepiadis siccum cephalicū ad Xenocra-  
tem relatum, quo fistulas sanabat. Erui farinæ trien-  
tem, iridis illyricæ sextantem, aristolochiæ tenuis,  
squamæ æris, mannæ thuris, singulorū unc. i. Misce  
ac utere. Quidam etiam radicis panaceæ unc. i. adij-  
ciunt. Et ex melle cocto oblongum quasi collyrium  
faciunt, quod in fistulā immittunt, & postea siccum  
inspergunt. Aliud siccum. Erui drach. x x. aristo-  
lochiæ tenuis drach. x. squamæ æris, radicis uitis al-  
bæ, singulorū drac. v. Vtere ad repurgandū cū mel-  
le, ad replendum sicco insperfo. Aliud siccū opti-  
mum, tuniculas ulcerum relictas consumens, callos  
rescindēs, sordida ulcera purgās, caua replens. Squa-  
mæ æris, resinæ pinus, singulorū drac. x ii. pumicis  
usti & uino extincti, iridis, aristolochiæ tenuis, sil-  
phii, singulorū drac. viii. thuris drach. iiii. Misce ac  
utere sicco, uel cū melle. Aliud siccum, omne pro-  
fundū ulcus incarnans. Farinæ erui drach. x x. thuris  
drac. x viii. fuci tinctorij, amyli, singul. drach. viii.  
misce & utere. Aliud, ad capitis ulcera replenda.  
Amyli, halicæ, thuris, lapidis specularis translucidi  
usti, singulorū unc. i. Aliud. Colophonia seorsim  
trita ulcus repleto, & citò sanabitur. Aliud. Co-  
lophoniæ, amyli, thuris, cerusæ, æquales portiones  
para & utere siccis. Aliud admirandum Severi, ad  
ossa præcipuè capitis denudata, derafo ossi insper-  
sum: celerrimè enim incarnat. pollinis tritici, colo-  
phoniæ tenuissimè tritæ, pares portiones præpara  
ac utere, & linamēto indito, eius retinēdi gratia em-  
plastrū quoddā molle cicatricem inducens impone.  
Aliud, ad ulcera contrahenda. Misyos dra. iiii. gal-  
larum, chalcitidis, atramenti sutorij, aluminis scissi,  
squamæ æris, singulorū unc. i. para & utere.

*De ulceribus in quibus caro superexcrefcit, &  
quæ depreffione opus habent, & de medicamē-  
tis siccantibus, Galeni.* Cap. xxxvi.

Carnem in ulceribus superexcrefcētē consumūt me-  
dicamenta fortiter siccantia. Qualis est flos asiae pe-  
træ, & testacea omnia usta, & uterq; herinaceus cū  
toto corpore exustus, & diphryges inspersum, &  
æris flos. Verū erugo omnia robore suo uincit. Sic-  
cum Herculis. Squamæ æris, misyos, chalcitidis u-  
stæ, atramenti sutorij, aluminis scissi, æquas portio-  
nes præpara & utere. Aliud, Rhodiū appellatū,  
refertur ad Hierā. Sistit itē sanguinē. Gallarū drach.  
i x. squamæ æris drac. v. atramēti sutorij drach. iiii.  
aluminis scissi drac. ii. Gallas ex dimidio uistas uino  
austero extinguito, & reliquis tritis ammisceto.  
Quidā atramēti sutorij drac. v. squamæ dra. iiii. cō-  
ijciūt, & gallas omnes cōburunt. Rhodiū, inquit He-  
ras, ad sanguinē sistēdū efficax est. Facit & ad sacros  
ignes, & ulcera proserpendo depascentia, ac nimio  
humore marcescētia contrahit, ac cicatricē includit.  
Quidā hoc modo Rhodiū cōficiūt, & ualde laudāt.  
Chalcitidis crudæ, misyos crudi, singul. dra. x. squa-  
mæ ferri drac. x vi. gallarū dra. viii. Siccū Pfarum  
appellatū. Hoc largè inspersū contrahit ac deprimīt,  
parcè adhibitū, ad cicatricē ducit. Chalcitidis crudæ  
lib. i. misyos crudi sexuncē, atramēti sutorij lib. i. æ-  
ris usti sexuncē, squamæ æris sexuncē, præpara &  
utere. Aliud utilissimū, deprimendū uim habens.  
Squamæ æris drac. iiii. æruginis drach. i. Aliud.  
Squamæ æris, calcis uiuæ, mannæ thuris, æquales

partes præpara & utere. Facit ad ulcera maligna, &  
carnes fungis similes cū melle repurgat, & cum ce-  
rato replet. Aliud. Misyos drac. iiii. chalcitidis dra.  
ii. gallarū dra. iiii. atramenti sutorij, aluminis scissi,  
squamæ æris, singulorū drac. ii. terito, & aperto ul-  
cere cum specillo inspergito. Vtere etiā ad maximas  
carnis superexcrefcētiās, his quæ ad sedis thymos  
descripta sunt. Aliud. Lanæ succidæ ustæ ac tritæ  
inspersæ carnes marcidas ac flaccidas consumunt.  
Idem faciunt balaustia ubertim inspersa.

*De ulceribus nō malignis cicatrice indigentibus,  
Galen.* Cap. xxxvii.

In ulceribus quæ cicatrice opus habēt, caro quidē in-  
nato operimento munitur, sed cutis enasci non po-  
test. Quapropter in summa carnis superficie simile  
quiddā cuti efficiēdum est. Quoniā uero cutis carne  
siccior est ac densior, si carnē siccabimus & adstrin-  
gemus, cuti per similem faciemus. Neq; uero satis est  
hoc docere, quod resiccātia & adstringētia adhibere  
oportet: nam & quæ cruenta uulnera agglutinant,  
siccantia sunt & adstringentia. Verū in glutinandis  
uulneribus id tantū quod influit resiccare conamur,  
quò pars affecta superfluitatibus careat: in cicatrici-  
bus uerò inducendis, non solū influentē, uerum etiā  
contentū in carnibus humorem consumere oportet.  
Itaq; medicamentū, quod cicatricem inducit, longè  
siccius esse oportet, eo quod glutinat, quo nō solum  
superfluitū consumat, sed naturalē quoq; humorem  
atingat. Hanc itaq; rem præstant, galla omphacitis,  
malicorium, spinæ Aegyptiæ fructus, & quæ citra  
mordacitatē uehemēter adstringunt, qualis est myr-  
tus. Testæ etiā & cadmia, & plumbum, singula usta  
& lota, citra mordacitatē siccant, & ad cicatricē per-  
ducūt. Sed his ualētiora sunt, chalcitis, misy, alumē  
scissum. Et his adhuc potentius est æs ustū. Omnium  
autē potētissima est squama æris, quæ usta lene me-  
dicamentū efficitur ad antiqua ulcera cicatrice inclu-  
denda. Illitio Tetanica, ab extendēdo ac explanan-  
do appellata, consumens ac deprimens. Adipis suila-  
li, ceræ, singulorū unc. i. terebinthinæ semunciam, nitri  
unc. i. fellis taurini semunciam, resinæ unc. i. Omnia  
simul decocta ac excolata ubi tepuerint, manibus  
subige ac utere. Quidam adijciunt atramenti sutorij  
drach. v. Et medicamēto ab igne remoto aceti & sa-  
ponis singulorū unc. i. adijciunt, ita ut hæc prius in  
alio uase simul sint cōtrita ac dissoluta. Obseruandū  
est ne pharmacū hoc in bulliēdo efferuescat, & as-  
siduè agitandum, donec ad compagem perueniat.

*Sicca ulceribus non malignis cicatricem indu-  
centia.* Cap. xxxviii.

Siccum quod cicatricē inducit. Ostreorū ustorū drac.  
x ii. mannæ thuris dra. vi. cadmiæ dra. iiii. præpa-  
ra & utere. Aliud. Spumæ argenti, cerusæ singul.  
dra. viii. recremēti plumbi, myrti sicce, gallarū om-  
phacitidum, singulorū dra. iiii. para & utere. A-  
liud siccū cicatricē inducēs. Cadmiæ, cerusæ, mannæ  
thuris, amyli, æquales partes unīto ac utitor. Aliud  
admirandum. Cerusæ sextantem, amyli unc. i. spumæ  
argēti, thuris, rosacei, singul. sextantē, unīto ac utitor.  
Incarnat enim & ad cicatricē ducit. Aliud. Hoc etiā  
diuturna ad cicatricē perducit. Corticis pinus drac.  
vi. cornu cerui usti dra. iiii. cerusæ dra. iiii. ærugi-  
nis dra. ii. cadmiæ dra. viii. mānē thuris dra. vi. præ-  
para & utere. Aliud. Aristolochiæ dra. vi. corticis  
pinus



pinus, pumicis usti & uino extincti, colophonix, singul. drac. iiii. iridis dra. ii. unito ac utere ad incarnandū & cicatricē inducendā. Aliud. Pumicis usti & uino extincti drac. viii. mannae thuris, squamæ æris, singul. dra. iiii. præpara & utere. Aliud mirabile. Aluminis scissi dra. iiii. in aqua dissoluto, & in eo diluto linteolū tenue, uetus ac detritū, purum, tingito, & in sole siccato, atq; hoc usus tēpore cōcisum ulceri indito. Verū ad sedis ulcera & diuturna alia, alumē in uino dissolues, & similiter facies: ad aurū uerò affectus, lanam pro linteo accipies. Aliud, plantaginē cum radicibus siccatō terito & cribrato, ac utere cōfidenter. Aliud. Cerusæ drac. viii. gallarū, myrti, recremētū plumbi, singul. dra. iiii. para & utere. Aliud. Ostrea usta, cerusam, cadmiā, mannam thuris, paribus portionibus unito ac utitor. Aliud siccū, ad caua & maligna ulcera replēda, expertus loquor. Farinæ erui dra. x. iridis dra. xx. spumę argēti dra. xv. mannae thuris drac. xv. terræ samie dra. x. squamæ æris, aristolochiæ tenuis, cadmiæ, sing. dra. v. præpara & ad sordida ulcera largē, ad pura parcē adhibe, & hapsū lanæ ē uino expressum superimponē. Hoc & chironia ulcera appellata, ad cicatricē ducit. Aliud, quod etiam callos exterit. Chalcitidis crudę, spumę argēti, ladani, singul. dra. x. bituminis dra. viii. ceræ dra. ii. olei myrti lib. i. uini heminā i. Vsu expectēre spleniū ex eo imposito, & linamēta eo tincta indito. Aliud Andromachi. Spumę argēti dra. xxxii. atramenti sutori dra. viii. aluminis scissi dra. xii. ceræ dra. c. squamæ æris dra. viii. bituminis, ladani, singul. dra. xxxii. olei myrti lib. i. & quadratē. Vinueteris adstringētis quātum satis est: utere uelut prædicto. Aliud. Bituminis, ladani, singul. dra. viii. squamę æris, myrti, spumę argēti, singul. dra. iiii. ceræ dra. xxxiii. olei myrti dra. xxx. Et si hyems fuerit, drachm. xxxvi. Vini quod satis est, præpara & utere uelut dictum est.

*Emplastra quæ non maligna ulcera cicatrice includunt.*

Cap. xxxix.

Emplastrū ē Cadmia præparatū, rosaceo dilutū repurgat ulcera, incarnatq; & cicatrices cōcolores cuti efficit: perniciosis itē ac fissuris, & anī affectionib. medetur: habet autē hoc modo: Chalcitidis ustæ lib. ii. cadmiæ ustæ & uino extinctæ lib. i. ceræ trientē, terebinthinæ lib. ii. olei myrti lib. iiii. chalcitidem & cadmiā cū uino sufficētū diluito ac conterito, & reliqua liquata ammisceto ac utitor. Aliud. Cadmiæ, chalcitidis ustę, sing. dra. xxv. ceræ dra. xlviii. terebinthinę dra. xiiii. olei myrti lib. i. uini quod satis est, præpara & utere. Aliud, ad cicatrices inducēdas efficacissimū. Facit & ad igne ambusta mirificē. Cerusæ, spumę argenti, ordeī usti, singul. unc. i. ceræ quadratē, rosacei aut myrti olei bessem, cerusam & argēti spumā cum uino terito, cerā uerò cum oleo liquesfacito, & ad medicamētum ab igne ablatū, hordeum ustū tritum ac cribratū inijcito atq; unito: & omnia frigesacta in mortariū coniecta subigito, ac utitor. Aliud ē ladano, ulcera antiqua ad cicatricem perducens. Spumę argenti dra. c. picis dra. l. ladani dra. xxv. æruginis dra. viii. eris usti dra. viii. squamæ æris dra. ii. olei myrti lib. vi. Argēti spumā cū oleo coquito, & medio cocturæ tēpore, æruginem, squamā, & es adijcito, & coquito donec nō amplius inquinēt. Et postea picē liquefactā ac excolatā coctis

ammisceto. His uero unis & amplius nō inquinātib. ac ab igne amoris, deposito iam feruore, ladanum cū uino tritū addito, & perfrigerata in mortarium coniecta probē subigito, & ad maligna ulcera ac fistulas utitor. Aliud. Cadmiæ, chalcitidis, sing. trientē, ceræ, colophonix, olei myrti, sing. un. i. uini quātum satis est. Aliud. Aeris usti & crudi, sing. sextatē, cadmiæ sexuncē, chalcitidis ustę sesquib. ceræ lib. i. olei myrti lib. ii. uini quod satis est. Aliud emplastrū candidum, ad cicatricē perducēs, experimento constans, faciens ad tenera corpora, uelut sunt mulierū, eunuchorum, ac puerorum. Conuenit etiā ulceribus spōtaneis. Spumę argēti lib. i. & trientē, cerusæ lib. i. cerę lib. i. & trientē, thuris & manne eius, singul. quincuncē, terebinthinæ unc. i. aquę lib. i. olei myrti lib. ii. cerusam & argenti spumam in aqua coquito, & consumpta aqua, ac medicamento non amplius inquinante, ceram primum, deinde resinam addito, & ablato ab igne pharmaco, thus ac mannam siue pollinem eius ammisceto.

*De malignis & agrē recipientibus cicatricē ulceribus.*

Cap. xl.

Quēadmodū antea diximus, duplex scopus propositus est in curatione partiū, quibus nullus deprauatus habitus inest: alter, repellendū quod influit: alter, discutiendū quod in affecta parte impactū est, atq; hæc à cōtrarijs qualitibus fiunt: nā quæcunq; adstringunt, repellere possunt quod influit: quæ uerò adtrahunt, discutiūt id quod in affecto loco cōtinetur. Adstringētia itaq; exasperāt, & ob id dolorē inducunt, attrahētia uero & discutiētia quū acra sint, loca ulcerata mordent. Quare contingit ut ex his quæ exasperāt, & mordent, superflua humiditas ad affectas partes illabatur, quam inflāmatio & erosio ulceris cōsequūtur. Cæterum eius meminisse oportet, quod sæpe a nobis dictū est, quod corpora plena sanguine, aut uitiolis humoribus referta, & mollia ac subtili sensu prædita, ex mordacitate facili inflāmātur. Mulieres autē & pueri & eunuchi, itēq; uiri colore albidī & mulierosā uitā degentes, inter molles naturas numerātur: proinde quātū eius fieri potest, medicamētōrū materia peruestiganda est, quæ citra mordacitatē ac dolorē ulcus resiccet, quā sanē nunq; inueniet medicus, nisi quid singula medicamēta adhibita peregerint, rectē expenderit. Itaq; cōsiderabit quātū humiditatis primū pharmacū ab ulcere desiccauit, aut si sordidū est, quātum sordium deterfit, idq; tertiu ac quartū experietur, donec purū ac siccū ulcus apparuerit: quod ubi depræhēdet, ad aliud medicamētū, eiusdē qdē generis cū priore, sed debilius, se conuertet: fortiora enim repurgatis iā ulceribus morsum ac dolorē inferunt, & influxiones ac inflammationes pariunt: alia igitur corpora exactē euacuare, & à superfluitatibus asseruare oportet. Alijs itaq; sanguis si redundet, detrahendus est, alijs purgatio uitioli humoris, & simul uenæ sectio cōuenit. Quibusdā uaricem excidere ex ulcere oportet, alijs quibus secur aut splenem curandā assumimus. Neq; uerò malignis crurium aut surarū ulceribus, ea curatione debetur: sed manuū quoq; ac reliquarū corporis partiū: nā cuidā adolescētī diuturnum ulcus ad radicē manus habētī, uenā ad ulcus supernē allatā excidi, atq; intra paucos dies hominē sanauit, qui per quinquennium ea affectione laborauerat. Sunt quibus



quibus loca ulceri uicina scarificare oportet. Quibusdā uero labia ulceris callosa circumcidere. Si uero nihil ex his fecerimus, humiditatis ac sordium quantitatē considerabimus, & inde ad cōgruum medicamentū transibimus, ita ut diligēter expēdamus, quæ siccādi quidem uim habent, non autē extergendi: & quæ cōtrā extergent, nō autē fortiter siccā: suntq; in hoc etiā qualitatis singulorū gradus expēdendi. Medicamentū cicatricē inducens. Plumbi usti sexuncē, cadmiæ trientē, æris sextatē, colophoniam, olei myrtei, sing. lib. II. Vini ueteris odorati quantū satis est. Aliud. Cadmiæ, cerusæ, singul. trientē, ceræ, olei myrtei, singul. sexuncē. Aliud. Cadmiæ, spumæ argenti, cerusæ, singul. unc. I. ceræ trientē, rosacei sexuncē. Aliud, è ladanō. Squamæ æris un. I. bituminis, terebinthinæ sing. dra. IIII. ceræ, ladanī, singulorū quadrantem, olei myrtei quadrantem, at si hyems fuerit, amplius de oleo accipies. Cerā cum oleo & bitumine liquefacto, & terebinthinam adiūcto, deinde omnia ad squamā ac ladanum prius trita ammisceto.

*Simplicia medicamentā quæ citra mordacitatē res-*

*siccant ulcera maligna.*

*Cap. XLII.*

Simplicia porro medicamēta sine mordacitate & manifesta exasperatione resiccantia ulcera, hæc sunt: Lemnia terra, sigillū appellata, moderatē resiccant. Cadmiā item sub caniculæ æstu cum uino trita ac siccata: ubi uero ulcera ualdē sunt maligna, ex aceto terēda est. Vtranq; superat chalcitis usta, & uelut cadmiā trita ac resiccata: nā cruda adeo efficax est, ut etiā crustas inurat. Huic similis est ærugo usta: non usta enim sicut & chalcitis nimis efficax est, nisi quod chalcitis simul adstringit. Atramētum sutoriū inter omnia metalla summē resiccant. Chalcitidi similia sunt misy & sori, maioris tātum ac minoris ratione differentia. Stibiū magis quā sori siccant & adstringit. Diphryges cōmodē siccant, sed aliquantulū mordax est. Omnia aluminis genera exactē siccādi uim habent, uehementēq; adstringunt: quapropter alumē solum per se ad huiusmodi usus adhibetur. Chrysocola naturalis & artificialis eandē uim habent. Plūm ustum sori ac stibio præstat, plumbi recrementum, & squama ferri præsertim stomomatis, plurimum siccant. Aeris squama præter resiccandi uim, etiā extergit: quare ulcera præ omnibus repurgat, omnia tamen metalla prius lauare oportet, deinde ulceribus admouere: ita enim mirificē siccare citra mordacitatē possunt. Siccant etiā buccinorum, purpurarū, ostreorumq; testæ ustæ ac lotæ. Item trāsucidus lapis specularis mollia corpora citra mordacitatē siccant. Idē facit nitrum ustum, & quod in æneis lebetibus balneorum adhærescens ex aquæ coctura reperitur: æquē enim siccant & adstringit. Præterea gallæ & malicorium usta ac arida trita adhibita, malignis & ægrē recipiētib; cicatricē ulceribus commodissima sunt. Quin & capparīs cortex tritus & siccus inspersus maligno ac putrido ulceri cōmodus est. Polium item tenuē siccādi uim habet, & caries lignorum unā cum extersoria facultate. Item peucedanī & pastinacæ, præsertim agrestis, radix & folia, scordium quoque ac centaurea, & alia huiusmodi, uel priuatim per se, uel simul composita.

*De usu relatorum medicamentorum.*

*Cap. XLIII.*

Necessariō uerō talia ulcera uitioso humore referta, sordidissima existunt, Quare ubi aliquod ex relatis

simplex aut compositum siccum adhibebitur sumus, linteolo prius molli puro ac sicco ulcus extergemus, deinde medicamēto cavitatē explemus, & extrinsecus splenium ad ulcerum labia attenuada imponimus. Et linteolo supra splenium imposito ac ligato, spongiā ex frigida aut uino expressam adhibemus, conamurque ut per totum tempus spongia frigida permaneat, quod facili cōtinget, si assidue illi frigida instilletur, citra uinculi, linteoli, siue fasciæ obligatæ solutionem.

*De ligamenti & curationis ratione.*

*Cap. XLIII.*

Ligamentū ulceri conuenit quod ad fracturas usurpamus. Quod si unū tātum fuerit ligamentū, principio ipsius ad superiorem ulceris partē locato obligabimus, siue sura, siue genu, siue talus, siue cubitus fuerit, pars ipsa affecta. At si duobus ligamētis uti malueris, uelut in fracturis fieri solet, primū ab ulcere ad superiorē regionē ducatur. Secundum uero initium sumat ab ulcere, & prius infra obligetur, & postea sursum desinat, & ad eundē terminum cū primo ducatur: nam ad alia cōmoda etiam hoc accedet, quod ulcera ob rotunditatē coalescere nequeuntia oblōga reddētur. Solutio autē non quotidie, sed alternis fiat, & a solutione aqua ulceri ne aspergatur, sed cū molli puro ac sicco linteolo sanies detergatur. Quod si partes ulceri uicinæ inflāmatæ appareant, splenio latiore facto liquidū medicamētum illines, quale est phoenicinū emplastrū, aut aliquod simile, ita ut hoc dissoluas uino adstringēte, sitq; oleū quod adiūctur melinū aut myrteū. At si purities circa uicinas ulceri partes apparuerit emplastrū phoenicinū oleo antiquo aut cicino dissolues. Futiusq; fuerit superiori regioni aliquod repellēdi ui prædiū adhibere, præsertim in crurū ulceribus, & his quæ eminentem uaricē habent: uena uerō quæ amplior fuerit, & atræ bilis sanguinē habuerit, excidenda est, uelut diximus. Aliquādo tamen eiusmodi uena excisa, ulcus quidē protinus coalescit ac sanū euadit. Sed qua parte uena recisa est, nouū malignū succedit, quod cicatricē respuit. Præstat igitur in talibus uires ægri perpēdere, & a uenæ sectione auspicari, deinde pharmacō atræ bilis ac pituitæ humorē educente purgare: nā & pituita aliquādo ad huiusmodi uarices confluit, atq; tunc uaricosam uenā resicare, multaq; sanguinis copia hinceducta, uaricis sectionē prius curare, quæ ubi exactē coaluit, tunc demū maligni ulceris curationē aggredi, eo quē retulimus modo. Alius porro lactis sero in quo enicus coctus est, aceti multī modica mēsurā addita assidue emolliēda est. Dabis autē ex eo, ab hemina una usq; ad quinq; mēsuram augens, sic tamen ut æger per multos antea dies aquā biberit. Optimum itē est & lac recens multum per se, uel cum aqua calida aut modico passo, ante cibum sumptum. Nam & humores contemperat, & uentrem eluit. Confert etiā aloēs drach. I. per interualla deuorata. Balnea uero minimē dulcia, sed sulphurea potius & bituminosa adhibenda sunt. Quod si æger illotus manere non possit citra totius corporis læsionem, lauādus est ulcere nequaquā denudato. Postremum ab omnibus edulīs ac potibus acribus & ægrē concoctilibus, ac uitiōsis humoribus generantibus, penitus abstinere oportet.

*De emplastrorum compositione ad maligna ulcera.*

*Cap. XLIII.*

*Quando*



Quandoquidē in malignis ulceribus quæ difficulter cicatricē recipiunt, is scopus nobis propositus est, ut medicamēto nō mordaci resicemus, & oleum ac aqua maximē omniū humectāt, ab utrisq; penitus ca uere oportet, ipsaq; neq; per se adhibere, neq; cū resicatis siccis permiscere: cera igitur recēs pinguis & in sole subacta ac emollita, idonea est ad sicca medica- menta excipiēda. Quod si caloris ex sole copia non detur, cerā prope ignē molliemus, uel in feruentem aquā inijcimus: neq; enim illi omnino ammiscetur aqua: at uerò proportio miscendi huiusmodi est, ut si moderatū pharmacū esse uolueris, metallicorum quartā partē ceræ misceas: si ualidius, tertiā. Neq; ue- rò parua uarietas est pro corporū ratione, an ne mol- liores aut duriores habeāt carnes: quare fieri nō po- test, ut omnibus idē medicamentū cōueniat: itaq; his cōsideratis, ubi simpliciu facultates cognoueris, fa- cile iudicare poteris uniuscuiusq; cōpositi medica- menti facultatē, prout ab antiquis sunt descripta. Em- plastrū admirandū ē fori, cicatricē inducens, deplo- ratis ulceribus opitulās, quæ à multis frustra fuerūt tentata, cui fidendū est, uelut multo experimēto co- gnito. Soreos dra. x x iiii. gallarū drac. x x x i. alu- minis scissi, calcis uiuæ, malicorij, sing. dra. xvi. thu- ris dra. x x x i. ceræ dra. c x x. adipis uitulini drach. c l x. olei antiqui lib. i. & si uitulinus adeps non af- fuerit, porcinus antiquus sine sale ammiscatur: nā taurinus calidior est. arida terito & cribrato: deinde liquata ab igne remota ammisceto: & omnibus probe unitis, alumē, thus, fori, calcē, cū uino adstrin- gēte trita adijcito, ac utitor. Ego, inquit Galenus, dū hoc medicamētū præpararē, oleū & adipē quadra- ginta annorū adieci, & semper mihi præter spem suc- cessit ad maligna ac diuturna ulcera. Sunt autē talia ulcera, à quibus pars affecta in deprauatū habitum perducta adeo est, ut etiā si probe coctus sit sanguis, qui ad ipsam alimēti gratia affertur, ipsum transmu- tet ac corrumpat, & si uitiolus sit humor qui affluit, ab ipso solo erodatur, etiam si pars ipsa minimē esset affecta. Aliud spleniū optimum. Plumbi usti & lo- ti trientē, cadmiæ sesquiunciā, æris usti unc. i. thuris sesquiunciā, aluminis scissi un. i. æruginis sextantē, ceræ sexuncē, olei myrtei lib. i. Aliud Galeni, ad ma- ligna & chironia. Ceræ, picis, bituminis, sing. lib. i. mannae thuris, cerussæ, æruginis, sing. sexuncē, ma- licorij, gallarū, spinæ Aegyptiæ fructus, iridis, ari- stolochiæ rotundæ, atramenti sutorij, sing. un. i. aristo- lochiæ lōgæ, æris usti, sing. sextantē. Olei antiqui aut cicini lib. i. arida in aceto pluribus diebus terito, & liquabilia liquata affūdito ac utitor. Aliud, Ori- bāsi, ad efferata ulcera deprimēda ac cōtrahenda. O- chra attica usta, trita, sicca, utiliter adhibetur. Ego ue- rò inquit, etiā cypria usus sum. Idē facit & chamæ- leonis nigri radix, & malicoriū ustum. Et supernē hapsus lanæ uino imbutus illigatur. Aliud Galeni, fuluū, Spumæ argenti lib. iiii. olei cicini aut antiqui lib. iiii. aceti acerrimi lib. ii. squamæ æris, chalcitidis, æruginis, singul. sextantē. Spumā argenti cū oleo co- quito, medioq; cocturæ tēpore metallica ad æstiuū solem multis diebus cū aceto trita adijcito, tādiluq; ad ignē finito, donec non inquinarint, quū autē me- tallica adijcis, lebes ab igne tollatur, ne efferuescant & superfundatur. Sed & spumā argenti cū aceto & oleo decoquere licet, & medio cocturæ tēpore me-

tallica addere, & simul sinere ut ebulliat, donec non amplius inquinent. Hoc pharmacū fistulas glutinat, & labia ulcerū callosa resicās unit ac cōmittit, ita ut non amplius disparentur, si quis recta diæta utatur. Diuturna insuper ulcera & cicatricē respuentia, chi- ronía appellata per se adhibitu, nullo antea puris ue- stigio apparente, maturat, & suppurat: at nō quoti- die, sed alternis hoc soluendū est, quod si stomoma- tis ferri squamā addideris, lōgē præstātius pharma- cum euadet. Ego dū hoc præparabā, aliquādo etiam diphrygis unc. i. adieci, aliquādo chrysocollæ sextā- tem. Sæpe etiā utrunq; ammiscui. Atq; ita præpara- tum magna uulnera glutinat. Hactenus Galenus. Nunc uerò hoc modo cōficitur. Spumæ argenti lib. iiii. olei antiqui lib. vi. aceti lib. ii. æruginis, squamæ æris, chalcitidis, sing. quadrantē, coquito sicut dictū est. Quidā diphrygis un. i. addūt, asseruntq; efficacis- simē strumas discutere. Aliud Galeni, ad chironia ulcera in mollibus corporib. Ceræ lib. i. cerussæ bes- sem, rosacei lib. i. salis ammoniaci trientē, squamæ æris sextantē, thuris, aluminis, æruginis, malicorij, calcis uiuæ, sing. un. i. quæ liquari possunt liquata ac frigefacta ad sicca cum uino trita misceto. Aliud ad maligna & serpēdo depascētia ulcera, præsertim ti- biarū. Spumæ argenti, mastiches, adipis caprini, ro- facei, singul. sexuncē, ouorū uitellos v. Argenti spu- mā cum rosaceo & adipe coquito, deinde mastichen adijcto, & ad frigefacta ouorū uitellos ammisceto. Aliud, ad maligna tiliarū ulcera, experimēto cogni- tum. Lupinos aridos uustos tritos largē inspergito, & hapsus lanæ ex uino expressū superligato. Hoc repurgat, incarnat, & ad cicatricem perducit.

De ulceribus quæ post obductam cicatricem rur- sus rumpuntur.

Cap. xlv.

Quædā ulcera post receptā cicatricē non multo tēpore interposito inflāmantur ac refringuntur. Nā quum substratū os malē sit affectū, uicina quidē caro cica- tricem recipit, & exactē sana apparet. Verū postea sanie paulatim ex corrupto in alto osse affluente pu- trefcit, & oborta inflammatione cicatrix rumpitur. Quæ igitur horū curatio instituenda est? nimirū ut hactenus exicemus, quatenus squama affecti ossis excidat: facile uerò, excident ossiū squamæ, si papa- ueris syluestris & fici folia cum uino & polenta im- posueris. Aut hyoscyami & atramenti sutorij pares portiones adhibueris: sed & peucedani radix trita ci- tissimē ossiū squamas disparat. Vtere etiā siccis ca- pitalibus suprā descriptis, præsertim eo quod silphiū recipit. Aliud siccū, ad chironia & cicatricē respuen- tia ulcera mirificū. Squamæ æris, thuris, singulorū sextantē, aluminis, salis ammoniaci, singul. trientē, malicorij, cerussæ, singulorum unc. i. utere sicco, uel si malueris cum cerato. Aliud. Pumidis multifori sexuncem, sulphuris uiui unc. i. terito & cribrato, ac utitor. Facit & pumex per se aridus tritus inspersus. Aliud, ad cicatricem inducendā diuturnis tiliarū ac totius corporis ulceribus. Calcis uiuæ ac lotæ in a- qua & siccatae un. i. dimoliæ tantundē, ceræ, terebin- thinae liquidæ, sing. sextantē, olei myrtei aut rosacei quadrantē: poteris & ostreorū ustorū tritorū un. i. ad- dere. Ad sicca in mortario cū uino trita quæ liquari possunt liquata ammisceto ac unito. Hoc, itemq; re- liqua omnia relata, & præcipuē quod ē fori fit, chi- ronij ac malignis ulceribus medentur. Eisdē quoq;

O 3 priuatim

De Lupinis



pruatiſſim commodant capparis radix trita inſperſa, cēraurea minor, ſcordium, caries lignorū ueterum, paſtinacæ radix, peucedani radix, malicoriū, oleum in quo ſcillæ bulbus coctus eſt, abſq; linamētis cum penna illitum. Malicorium in uino coctum & roſaceo cerato exceptum: omnium uero efficaciffima eſt theriaca Andromachi ē uiperis, roſaceo modico diluta, & emplaſtri modo adpoſita. Aliud. Sandaracham tenuiſſimē tritam urſino adipe exceptam imponito: aut ammoniacum ſalem eodem modo præparatum, uel per ſe adhibeto.

*Ad extremitatum ulcera.*

Cap. XLVI.

Myrti baccas cum uino coctas impone: uel peucedani radicem tritā: uel lignorum ueterum cariem inſperge: aut braſſicæ uel ſabinæ folia cum ſœni græci farina & aceto ſubacta impone: aut ſideritidem melle exceptā adhibe: aut oleū in quo ſcilla cocta eſt abſq; linamentis cum penna illine: ita enim ne muſca quidem ulceri appropinquabit.

*Ad callos extremarum partium.*

Cap. XLVII.

Braſſicæ folia cum melle terito, & cerato ex ſinopica rubrica præparato, excipito, & adhibeto. Aliud. Clibanī antiqui teſtam cum uino auſtero terito, & cum cerato ex ouis facto, aut cum medicamento ex pōpholyge ad ſedis affectiones parato, adhibeto.

*Ad uermes in ulceribus.*

Cap. XLVIII.

Vermes in ulceribus generatos enecāt, plantago ſicca, ligni ficulni cinis, calaminthæ ſuccus aſidue inſtilatus. Ceruſæ, inquit Theodorus, & polij pares portiones cū pice liquida adhibe. Quidā pro ceruſa abſinthium ſcribunt. Aliud. Linamentum ex ſaliua hominis ieiuni illitum adhibeto. Hoc etiam aurium uermes necat, & cicatrices concolores facit.

*Ad nomas & putredines ulcerum.*

Cap. XLIX.

Nomæ, hoc eſt, proſerpendo depaſcentia ac putrida ulcera appellātur, quæ uicinas partes erodunt & putrefaciunt. Et ſane uehemētiffimis medicamentis opus habēt. Et ſæpiſſimē uſtiones requirunt. Siccū optimū, faciens ad nomas, putredines, polypos, uerrucas, thymos & formicarias appellatas, hæmorrhoidas, citra omnē mordacitatē. Miſyos crudi, chalcitidis crudæ, ſing. dra. VIII. ochræ dra. III. ſandarachæ dra. IIII. calcis uiuæ dra. II. ſquamæ æris, aluminis, ſing. dra. II. diphrygis dra. IIII. Vnito ac uſitor.

*Sicca cruſtam inducentia, inter quæ etiam paſtilli multi uſus.*

Cap. L.

Melinū, cruſtas inducēs & callos exterens, inſperſum, ſiue cum ſpecilli nucleo adhibitu, & leuiter ſaltē ulceris ſuperficiē inductum, ut inde coloretur modo, ulcera cōmittit ac ſanat, quæ ægrè curantur. Chalcitidis crudæ dra. VIII. cadmiæ dra. IIII. ieiuni hominis ſaliua excipito ac ſubigito, & in mortario aperta, malī cydonij colorem aſſumere ſinito, & cum piſtillo leuiter trita in umbra aſſiccato. Alij tamen aliter præparāt, & a colore quē acquirit, ſuſcum appellant. Sumunt enim chalcitidis dra. XII. cadmiæ dra. VIII. & ad caniculæ æſtum cū aceto terunt, atq; ita in umbra ſiccant. Aliud ſiccū, quod item ad ſolis ſeruorē paratur, & melinum colorem habet. Calcis uiuæ ſextantem, auripigmētū unc. I. Auripigmētū cum aqua terito, & calcem addito, ac ſimul probe conterito, deinde in mortariū aqua plenum conſecito, ut ſubſideant, & ubi ſubfederint priore aqua diſſuſa, nouā affundito, ac diu uerſato, & rurfus ſub-

ſidere ſinito, quo facto rurfus priore aqua diſſuſa, nouam affundito, atq; idē tercio repetito. Poſtremū uafe aqua repleto ſinito, ac ſingulis diebus uerſato donec areſcat, & cōſumpta aqua aliā affundito. Atq; hoc per dies X. ſub caniculæ æſtu facito, & tandem pharmacū ſiccatur in ſictili uafe in ſuperiore parte domus nō humida ſeruato. Hoc citra mordacitatem cruſtas inducit, & ualde deprimit. Facit & ad gingiuas putridas, & epulidū eminentias deprimit, dentes inalbat. Poſteſt quoq; in mortario ſubactum in ſictile transferri, atque inſolari. Vtere Fauſtini quoq; paſtillo, ac reliquis eiufmodi ad dyſenteriam deſcriptis. Aliud, ad totius corporis putredines & nomas. Calcis uiuæ, chalcitidis, ſingulorū dra. II. auripigmētū dra. I. Hoc ad reduuias digitorum, & ad putredines adhibetur, partibus putridis ex eo inſperſis. Facit & ad carbunculos ſplenio reſinato exceptum. Conſert fiſtulis melle exceptū cocto, & uelut collyrium inditum. Oribafi, ad pudendorū nomas præſertim meliceridas dictas. Gallarum, ſloris mali punici, ſatiui, itemq; ſylueſtris, ariſtolochiæ rotundæ, ſquamæ æris, chalcitidis crudæ, ſingul. dra. VIII. atramenti ſutorij dra. VII. aluminis ſciſſi dra. IIII. malicorij dra. I. Adhibetur pudendo cum melle, quemadmodum id quod ex charta præparatur. Facit ad nomas ualde profundas, ſicut etiam paſtil- lus Andronis. Cæterum medicamentum ex charta hoc eſt: Squamæ æris, chartæ uſtæ, ſingulorum drachmas X. auripigmētū, ſulphuris uiui, ſingulorū dra. XII. uel ut alij habēt, XIII. plumbi uſti dra. IIII. alij dra. VI. Charta primum teritur, deinde metallica leuiſſimē trita ammiſcentur. Facit ad oris ac totius corporis putredines, ad humidiores quidē ſiccum inſperſum, ad ſicciores roſaceo imbu- rum. Additur aliquādo & mellis modicum. Ego uerò plumbi dra. VI. adiſcio. Siccū ad antiquas nomas, & ad gingiuas cruentas. Deprimit etiā carnem excreſcentē. Chalcitidis uſtæ dra. XL. miſyos dra. XXX. æris uſti dra. X. atramenti ſutorij dra. VIII. ſandarachæ dra. V. auripigmētū dra. II. unito ac uſitor. Aliud, experimento conſtans. Rhois culi- narij dra. X. ſquamæ æris, aloës, ſoliorum oleaſtri ſiccorum, ſingul. dra. VIII. chalcitidis dra. V. auripi- gmentū, ſandarachæ, aluminis ſciſſi, ſalis roſti, ſingul. dra. IIII. malicorij ſicci dra. VI. chryſocollæ factitiæ dra. IIII. ruſci ſicci dra. VIII. trita, unito ac uſitor. Aliud ad nomas & putredines, Oribafi. Salis ſo- ſilis dra. II. aluminis in ſictili uſti unc. I. ſquamæ æ- ris, pumicis uſti, ſing. unc. I. Aliud, eiufdem. Auri- pigmentū, ſquamæ æris, miſyos, chalcitidis, portio- nes æquas præpara & utere. Aliud Paſiphilum uo- catum. Atramētū ſutorij, ſandarachæ, miſyos, chalcitidis, pares portiones cōmittito. Siccū aureū ap- pellatū. Auſert oſſa, reprimit influxiones, fiſtularū callos exterit, & contrahit ſinus. In fiſtularū autē & ſinum cōcauitates per ſpecillū lana obuolutum in- datur. Melantheriæ a uetuftis clauis deraſe dra. V. malicorij dra. XXV. aluminis ſciſſi dra. III. atramētū ſutorij, miſyos, chalcitidis, æris uſti, ſing. dra. VIII. ſquamæ æris dra. XVI. gallarū dra. XV. Acei quātū ſatis eſt. Oportet autē aceto in uas æneum conieſto clauos quotidie agitare, & deinde acetum excolare: lōgē uerò præſtat quod in fundo reſidet. Aliud ſic- cum, ad nomas, deſluxus, gingiuas, columnellas, & pu



& pudēda. Ochrae sesquialibrā, croci lib. i. putaminū ouorum ustorū sexuncē, gallarū sexuncē, tritis utere. Gallae autē sint omphacitides. Pastillus ad nomas commodus. Sabine, myrrhæ, sing. dra. iiii. so reos, misyos, cyprī, atramenti sutorij, thuris, aloës, singu. dra. ii. terito cum uino, & formato pastillos.

Pastillus ad nomas & putredines, quo utor, inquit Oribasius, appellatur Asclepius siue Aesculapius, & Cyriacus, hoc est, dominicus. Gallarū drac. viii. florū mali punici, aristolochiæ rotundæ, chalcitidis crudæ, cadmiæ, sing. dra. vi. iridis, squamæ æris, sing. drac. iiii. misyos crudi, atramenti sutorij, aluminis scissi, thuris, nitri, singul. drac. iiii. Terito cū aceto ad dies sufficientes, & pastillos x. formato. Eosq̃ uisū tēpore aceto mulso dissolutos cerato excipito, hoc modo utens: Accipe pastillorum trientem, ceræ quadrantem, olei myrtei sexuncem, galbanī trientē. Et pastillis aceto dissolutis ac tritis, liquata ammisce to. Atq̃ hoc quidē modo præparantur ad ignem sacrum, panos, & condylomata. Ad ozenas uerò, carbūculos, & carnis excrescēcias, pastilli sicci insperguntur, uel aceto mulso triti ac dissoluti. Pastillus Corax, id est, Coruus appellatus. Ad putridorū ulcerū præsertim pudendorū nomas. Gallarū sextantē, squamæ æris sesquialibrā, chalcitidis crudæ, thuris, singulorū quadratē, ceræ trientē, terebinthinæ unc. i. adipis taurini bessem, olei myrtei dextantē. Arida cū aceto in sole ad sufficientes dies terito, & mellis sexuncem adijcito. Deinde cerato exceptis uitior. Hic pastillus citra ammixtionē per se adhibitus, omnibus nominis præsertim siccioribus cōfert, & ubi nerui sunt de nudari. Cū æquali uerò cerati portione, sordida ulcera extergit, cum uberiore cerato cicatricē inducit. Ego, inquit Asclepiades, sic præparauit: Squamæ lib. i. gallarū, adipis taurini, sing. dodrantē, chalcitidis, thuris, singulorū sexuncē, cū aceto uelut collyria tero, & pastillos formo. Postea uerò ex pastillis drac. xxii. aceto tero, & mellis drac. x. addo, & cerato quod habet olei myrtei, adipis taurini, singulorū dodrantē, ceræ sextantē, terebinthinæ trientē, excipio.

Pastillus ē croco. Myrrhæ, malicorij, eruginis, aluminis scissi, singulorum sextantem, croci unc. i. aloës, squamæ æris, thuris, sing. unc. i. sulphuris uiui drac. iiii. mellis lib. i. cū uino adstringēte terito. Facit ad nomas, putredines oris, & cuiuscunq̃ loci, dētes motos firmat, ulcera marcida & flaccida repurgat & adstringit, purulentas aures, sinus, fistulas, & carbūculos curat, squamas ossiū resoluit, & incarnat. Est enim ualdē cōmodus ad ossa carne uestiēda. Cōfert etiā dysentericis, & adhibetur uel aridus, uel hoc modo coctus. Mellis lib. iiii. aceti lib. i. pastilli sextās, simul ebulliant ad mellis cōpagem. Si uero partibus molli sensu præditis adhibendus est, uino tantum diluitur. Pastillus ex plantis inscriptus. Malicorij, foliorum myrū siccorū, testarum nucum iuglandium siccarum, fructus spinæ, singu. drachm. viii. gallarum drac. iiii. salis fossillis drac. viii. omnia runduntur, & cribrata aceto subiguntur, & in uas fictile mittuntur, ac assantur. Deinde cū aceto teruntur, & adijciuntur myrrhæ dra. iiii. thuris dra. ii. & formantur pastilli. Vfus horū est cū aceto. Pastillus ex lanis succidis quem Leonidas ualde laudat. Lanæ succidæ ustæ, ramētorū plūbi, squamæ æris, bituminis, sing. dra. x. aluminis scissi & rotundi, gallarū, malicorij,

misyos, thuris, chalcitidis, singulorū dra. v. myrrhæ drach. ii. amurci sesquiheminā, terito cū aceto, & formato pastillos, ac uitor. Pastillus Bubyneus, ad nomas, fistulas, reduuias edigitorū, carnē excrescentē citra mordacitatē deprimi. Cū cerato autē facit ad ignē sacrum & alia huiusmodi. Malicorij, gallarū, aristolochiæ, chalcitidis, cadmiæ, sing. dra. vi. iridis, squamæ æris, sing. drac. iiii. misyos, atramenti sutorij, aluminis scissi, sing. dra. iiii. nitri, thuris, sing. dra. ii. Sub canis æstu cū aceto terito, & pastillos formato. Pastillus Pasionis. Squamæ æris drac. xii. æris usti, salis ammoniaci, aluminis, eruginis, thuris, sing. dra. viii. Aeruginē cū ære, squama & alumine sub sole terito, & ad probē trita thus addito, simulq̃ terito, ac pastillos formato. Vfus est ex aceto. Polyidæ sphragis siue sigillū, ut habet Asclepiades. Aluminis scissi dra. iiii. thuris dra. iiii. myrrhæ, aloës, fellis taurini, sing. dra. viii. florū mali punici satiui dra. xii. atramenti sutorij dra. iiii. Excipe uino dulci & utere. Sigillū Coracinū. Facit ad cōsillarū inflammationes, luxatā columellā, & gingiuas humore flaccidas. Facit & ad nomas, & affectiones sedis. Aristolochiæ rotundæ, florū mali punici satiui, chalcitidis tostæ, thuris, myrrhæ, atramenti sutorij, crocomagmatis, aloës, fellis taurini, æquales portiones passo excipe, uelut dictū est. Pastillus Andronius. Ad ulcera fluida, inflammationes columellas, cōsillarū fluxiones, extrinsecus sub mērum illitus. Facit & ad pterygia oculorū, & glādularum circa inguina inflammationes incipientes, & ad ruptos intestinorū abscessus, callosq̃ fistularum exterit. Florū mali punici satiui drac. x. gallarum, aristolochiæ, sing. dra. viii. aluminis scissi, atramenti sutorij, singulorum drac. iiii. aliq̃ ii. tātum habent. myrrhæ, aloës, thuris, croci, singu. dra. i. singula seorsim primū, deinde simul terito, & in pastillos redigito. Infunditur per clysterē prout uires tolerarint ad ruptos intestinorum abscessus, si febris adsit, cum aquæ cyathis viii. si nō, cū uino. Pastillus Antonij Musæ. Aluminis scissi, aloës, myrrhæ, florum mali punici satiui, sing. dra. vi. atramenti sutorij drac. iiii. croci, crocomagmatis singulorū dra. iiii. Terito ē uino mulso ex passo confecto, & pastillos formato, quos in umbra exiccabis. Heras qdē & nos ita præparamus. Asclepiades autē hunc ad Aristarchū Tarsensem refert. Et cætera quidē simili modo cōponit. Verūm atramenti sutorij drac. vi. accipit, & cum uino salerno pastillos formare iubet. Facit ad ulcera recentia ac uetera, putrida, marcida, efferata, phagedenica, ac fistulosa, & quæ priuatim ceria appellantur. Ad ozenas diluitur cū uino. Ad suppuratas aures cum sapa & modico aceto. Ad condylomata item cum sapa. Ad ulcera genarum carbunculosa ac maligna cū sapa. Ad carnis excrescentias in naribus, ore, extremitatibus omnibus, uulua, pudendis, omnem eminentiā compescit, & digitorum reduuias tollit, ulcera caua replet, sinus & fistulas melle dilutus ac cum lixiuio instillatus glurinat. Idē ad oris ulcia gargarissatur. Quod si semel in mense fiat, neque dentes dolebunt, neq̃ aliquid incommodi ori accidet. Facit & ad testium sacrum ignē, & articulorum inflammationes illitus. Et ad hæc omnia utitur eo Asclepiades. Quod si mollire discutereq̃ uolueris, quadruplū ammoniaci miscebis, & cū aceto ad mellis spissi tudinem conteres, illinesq̃ & alligabis. Si uerò em-



plastri formā malueris, quadruplum terebinthinæ ammisceris, adiecto etiam oleo si durius pharmacū apparebit. mollit enim & cicatricē inducit, ac glutinat. Idē pastillus splenicis, hepaticis, ac dysentericis confert, & uiscerum ulcera sanat, & incipienti tabi auxiliatur. Dantur ex eo oboli tres cum familiari in singulis affectionibus portione. Per aliquot autē dies ducit urinas loturæ carnis similes. Itaq; ab eius usu desistendum non est ante sanitatem restitutam. Vino quoq; mulso, & mali punici dulcis succo diluatur, & cum pēna illitus, anginis medetur. Verū interm dū illinitur, nauseam excitat, & uomitum pro uocat. Ceterum crocomagma quod in pastillū recipitur, & quo ad capitis dolores utimur, ita preparatur: Croci dra. c. myrrhæ troglodyticæ, rosarū recentū resectis unguibus, amyli recentis, singulorū drac. c. l. Cū uino ad collyrii formā terito, & pastillos formato. Porro pastillus ex solano halicacabo, superius ad fissuras ac tubercula sedis descriptus est.

*De sanguinis eruptione, & quæ crustam inurant,*

*Rusi.*

*Cap. LI.*

Quādoquidē plerūq; ex his, quæ ad sanguinis eruptionē adhibemus, ad nomas quoq; usurpari solēt, annectemus etiā de sanguinis eruptione tractationē. Ex ea enim præfens aliquādo periculum incurrimus, exhibetq; ea res imperitis negotiū turbationemq; ac formidīnē, ut ne medico quidē parua sollicitudo impēdeat. Primum itaque nosse oportet, arterias ad sanguinis eruptionē magis q̄ uenas paratas esse. Perpetuō enim pulsant, amplioresq; meatus ac solidiores tunicas habent, ut non facillē cedant. Sanguis quoq; in ipsis cōtentus tenuior est, & plurimo spiritu abundat. Quin & aliquādo obducta cicatrice cutis, & arteriæ fissura non obturata, sanguis sub cutem exilit, & efficitur tumor, quem aneurysma, hoc est, arteriæ dilatationē Græci appellāt. Ab arteria igitur aut a uena sanguis manat, uel osculis ipsarū apertis, uel tunica diuisa, uel per transudationē, ut ita dicam. Porro tunica diuiditur, uel ex uulnere, uel ex contusione, uel ruptione, uel erosione. Oscula uerō aperiuntur, aut ob multitudinē cōfertim ad osculū uasis prorumpentē, aut propter acrē qualitātē extrinsecus alababentē, aut propter uasis imbecillitatē. Transudatio uerō aut persultatio fit, tunica quidem rarefacta, sanguine uerō attenuato. Potest tamen aliquādo etiā fieri paruularū uenularū osculis apertis. Si ergo ex uulnere, aut cōtusione, aut casu, aut clamore, ruptio cōtingit, causa iā præterijt. Si uerō ex multitudine, fieri potest ut adhuc nūc etiā uas amplius rumpatur, quum efficiens causa adhuc maneat. In huiusmodi itaque affectione, multitudo quā ciūssimē euacuanda est. Deinde sanguis sistendus, postremō ulcus curandū. In quibus uerō iā cessauit causa efficiēs, protinus sanguis sistendus est, & deinceps ulcus curandum. At quomodo sanguinē sistemus? Nimirum ut ruptum adstringamus ac obturemus, & sanguinem aliō diuertamus. Obturabuntur autem labia uel digitis nostris, si in superficie ulcus fuerit, uel per deligationē, & per refrigerantium ac adstringentium pharmacorum adhibitionem. Nonnunquam & grumis concreti sanguinis uasis oscula occluduntur. Cæterum ex his quæ imponuntur, aliqua adstringunt, aliqua meatus obducunt, aliqua crustas inurant. Quæ itaq; meatus obstruunt, ad sanguinis eruptionem adhibi-

ta, citō occludūt. Quæ uerō crustā inurant, crusta excidente ulcus cauum faciunt, & sæpissimē excidentibus crustis, sanguinis eruptio curati difficilima sequitur. Quapropter eiusmodi medicamentis nō nisi cogēte necessitate utemur, ueluti si a putrida erosionē sanguis erūpat. Tunc enim omni putrido exciso, tutius est uel cauterijs mali radicē exurere, uel crustā inuritā adhibere, præsertim in pudendorum ac sedis affectionibus. Nātales partes ob redundantem humiditatem, & acrium recrementorum transitum facillimē putrescunt. Proinde in eligēdis medicamentis quæ crustam inducunt, non tātum caliditatem, sed etiam adstrictionem considerabimus. Talia uero sunt, misy, chalcitis, atramentum sutorium. Quæ enim ex calce uiua & auripigmento fiunt, uehementiora quidē his sunt, sed crustæ inde inductæ citō excidunt, eod quod nulla adest ipsis adstrictoria facultas. Quæ uerō ab adstringentibus inducuntur crustæ, diutius in corporibus persistunt: quæ res non modicā cōmoditatē affert. Priusquā enim excidat, præuenit incarnatio, ut caro medijs partibus innata, tāquam operculum quoddā uasis fiat. Et hac de causa nō festinandum est, uelut multi faciunt, ad crustarum ablationē, ubi eruptionis sanguinis periculum imminet. Sed in his tātum affectionibus, in quibus ob putredinem cauterium adhibere coacti fuimus. Vocatur aut huiusmodi affectio Nome, quoniā ab affectis partibus proserpens, partes secundum naturā se habentes depascitur, & semper aliquā ipsarum ulterius inuadit. Medicus itaq; his cōsilijs instructus, ad sanguinis eruptiones curandas accedet, pro locorum natura, & uenarū magnitudine remedia adhibēdo. Et statim quidē digitis osculum ulceris uasis apprehendat, leniter innitens ac citra dolorē comprimens. Simul enim & sanguinē sistet, & grumū uulneri infiget. Quod si uas, unde sanguis manat, in profundo etiā situm fuerit, exactius sanè hinc & sitū ipsius, & magnitudinē didicerit, & utrū uena sit an arteria, cognoscat. Postea uerō immisso undino extendat, ac moderate ipsum obtorqueat. Si uerō neq; sic sanguis sistatur, si qdē uena fuerit, cōnādum est ut citra uinculū sanguinem supprimat, per aliquod sanguinē sistens medicamentū. Optima aut ex his sunt quæ meatus obstruunt, cōposita ex resina fricta, & farinæ triuici polline, ac gypso, & alijs huius generis. Si uerō arteria fuerit, ex duobus alterū faciēs, aut uinculū circundās, aut totū uas præcidens ac dissecās, sanguinē sistes. Cogimur tamē aliquādo etiā magnis uenis uinculū obligare, atq; etiā aliquādo rotas ipsas dissecare, trāsueras uidelicet: quæ necessitas incūbet in his, quæ rectæ ex alto sursum feruntur, & præsertim per angustiam aliquam aut principales partes. Sic enim utraq; pars utrinq; retrahitur, & ab incumbētib; corporibus uulnus tegitur & occultatur. His aut peractis, incarnandum uulnus est, priusquā uinculum uasis excidat. Nisi enim producta caro circumscitū dissecat arteriæ locū præmuniuerit, sed uacuus locus inuentus fuerit, affectio sequetur quā Aneurysma appellāt. Quapropter in his potius suadeo, ut sanguinē sistētib; quæ meatus obstruunt, utaris, quā his quæ crustā inurant. Citius enim ac tutius post illa uulnus incarnatur. Optimū itaq; omnium quæ ego noui medicamentorū est, quo etiā ad sanguinis cerebri mēbranis eruptionē tutius utemur, hoc est: Thuris partes 11,

aloēs



aloës partē .i. cū oul cādido ad mellis cōpagē subige, & mollissimis leporis pilis excepta, uasi ac toti ulceri ubertim impone, & forinfecus fascia ex linteo deliga, ita ut primas quatuor aut quinque eius obuolutiones super ipsum uas quod sanguinē fundit facias, & hinc ad radicē eius procedas, deinde alternis diebus soluas, & si quidē adhuc tutō adheferit ulceri medicamentum, rursus aliud ipsi circūfundas, & linamentū prius ex pilis cōstans, uelut madefacias, ac rursus uelut antea, deliges. Si uerō prius linamentū sua spē te exciderit, sensim per digitū uasis radicē cōprimas, & hoc quidē leniter adimas, aliud autē apponas. Atque eo curationis ductu uteris, donec uas carne impletū fuerit, egro in multa quēte seruato. At uerō hoc medicamento uariē utimur, aliquando duplū thuris ad aloē addentes, aliquando ambo æquali pōdere miscētes. Sed & mannā quandoque pro thure ammiscui, ut quē uehementius adstringat. Illud porrō constat, in durioribus corporibus ea quæ magis adstringūt, & plus aloës habent adhibēda esse. In mollibus, ea quæ plus thuris habent. Sed & ad sanguinis ē cerebri mēbranis eruptionē, & ad uulnera in collo, usque ad ipsas iugulares uenas, medicamento utimur, quod plurimum thuris recipit. In his enim sanguinē citra uinculum sistit. Et quāuis multa sint quæ meatus obstruunt medicamēta, nullum tamen æque incarnat. Optimē etiā obstruunt meatus pharmaca ex pice torrefacta, & colophonia, & puluere molendini parietibus adhærente, & gūmi, & tragacātha, ac similibus. Quandoque etiam ex gypso præparata. Et symphyti quoque radix ad hāc præstātissima est. Maximē cōuenit, ut Medicus pharmaca sanguini sistendo idonea apud se præparata habeat, quod singulis oportunē opē ferat. Tale est siccū Philagrī ad sanguinē sistendū ex aloē & thure paratū. Primum autē digitis dissectæ partes cōmittantur ac cōprimantur donec cohæreant: tunc enim impactū medicamentum sanguinis imperiū cohibet, qui amplius adhuc supprimeretur, si leporis pilos molles sub uētre repertos ad impactū medicamentū apponemus, & ex eodē sicco superin spargemus. Atque hoc ita finēdū est, donec caro excreuerit uelut operculū sectioni obducta. Cōfert ad idē rhodiū suprā inter deprimētia ac cōtrahētia relatū.

Cæterū quædā ex sanguinem sistētibz, uelut diximus, crustā inducunt. Quædā cū siccitate adstringūt, quædā explent & glutināt: quorū aliqua magis parabilia referemus, quō ad singulas causas peculiare medicamentū in promptu habeatur. Ex his igitur quæ crustam inurūt, citra mordacitatē & efficaciter sanguinē sistit hoc. Sandarachæ, auripigmētī, chalcitidis, calcis, singul. drac. iiii. Hoc Ammonius chirurgus utebatur. Eo uero adhuc efficacius est quod habet chalcitidis dra. viii. atramenti sutorij dra. x. calcis uiuæ dra. vi. æris usti dra. vi. misyos, diphrygis singul. dra. v. Aliud celebre. Aluminis scissi, atramenti sutorij, gallarū, singul. dra. vi. misyos dra. viii. foreos dra. iiii. Hoc optimē facit & ad nomas.

Aliud ex erethria terra. Terræ erethriæ aut cimoilæ, dra. viii. squamæ æris, aluminis scissi, resinæ aridæ, thuris, myrrhæ, singul. dra. viii. Aceti quātū satis est. Terito in sole ad cōpagem, & pastillos formato. Aliud. Spongiā nouā liquida pice imbutā bitumine trito insperso, in olla exurito. Deinde eius sextantem accipito, chalcitidis, misyos, singul. un. i. At

si mitius facere uolueris: accipe spōgiæ ita ustæ sextantem, plūbi usti & loti unc. i. sibiñ unc. i. Hoc crustā nō inducit. Aliud confestim sistens sanguinis eruptionē. Chalcitidis dra. viii. Thuris siue mānæ eius dra. xvi. resinæ aridæ, gypsi recētis, singul. dra. viii. Cætera, trita ac cribrata, in pyxide ærea seruato. Gypsum uerō quo tempore medicamento miscendum est, recens terito, & ammisceto. Aliud sanguinem sistens, citra crustæ inuentionē. Misyos, succi polygoni sicci, singul. dra. xlii. aluminis scissi dra. xxi. Aridum aceto rigatum spongiā excipe, & ulceri appositum deliga. Aliud Oribasij, facit ad pudendorū & totius corporis nomas. Callos etiam exterit, & strumas sanat. Minij cū oleo rosaceo subacti, sulphuris uiui, auripigmētī, sandarachæ, calcis uiuæ, æquas portiones unito ac utitor. Aliud, optimū ad sanguinis eruptiones, Galeni. Gypsum & tritidū pollinem oui candido excipe, & cum leporis pilis impone.

Aliud. Resinā pinus probē tritā uel per se, uel cum thuris polline adhibe. Qui ergo plura medicamēta expetit, multa in simplicium medicamentorū libris, & in tractatione de singularum partium morbis inueniet. Sed & quæ nunc recensui, sufficere possunt. Omnia enim alia ex hīsde præparantur, & non longē uiribus inter se differunt. quædā fortiora, quædā debiliora sunt, ut cuique cōgruū eligi possit. Etenim quū Eunuchus quidā in summitate manus ulcus haberet, idē malignum euaderet, & circū circa eroderet, & sanguis ex ipso manaret, medicamentum ex thure & aloē apposui albumine oui exceptum, & hoc magis auxit sanguinis eruptionē. Detracta itaque aloē, thus ipsum per se cum ouo imposui, & neque sic sanguis sisti potuit. Cognoui autē quōd ex multa sensus subtilitate hoc pateretur. Quapropter linamenta posca dilutissima imbuta indidi, iussitque eadē assidue super linamēta instillare, atque ita statim sanguinis eruptionē suppressi, neque ab eodē medicamento usque ad exactā incarnationē destitit. Aliud, ad arteriā dissectā. Sal cōmune & equi aut asini simū siccū, pari portione cū lixiuio quercini cineris subactū impone. Aliud. Porrū cū aceto rufum impone. Aliud. Cochleas cum domibz suis, tū paruas tū magnas, uistas tritas impone.

*Exedentia & urentia medicamenta. Cap. lii.*

Erodentia & ustoria medicamenta ad columellas adhibemus assidue destillātes ac laxatas, & ad callosas carnis excrescentias, ulceraque cancerata & strumas, quas erodere uolumus. Item ad coxendicum & articulare morbum, affectiones splenis, pro cauterio. Præterea ad formicarias uerrucas, clauos, ficosos tumores, & alia huiusmodi. Præcipua uero ipsorum uis est, ad carbunculosa & maligna ulcera. Adhibita enim nomas compescunt, & crustas exterunt. Erosiuum citra mordacitatem. Squamæ æris dra. iiii. sandarachæ dra. ii. ueratri nigri, auripigmētī, singul. dra. i. præstantius hoc euadet, si pro auripigmento aluminis scissi par pondus adieceris. Aliud. Squamæ æris, sandarachæ, auripigmētī, ueratri nigri, seminis urticæ tosti, æquales portiones cum rosaceo terito ac utitor. Aliud, citra omnē mordacitatē crustas in altū inducēs. Squamæ æris, sandarachæ, singul. dra. iiii. ueratri nigri dra. i. Ad humida ulcera utere sicco: ad reliqua cū rosaceo. Oribasij erosiuū efficacissimū, quo utor: Seminis urticæ, squamæ æris rubræ, sandarachæ, par pōdus cum rosaceo terito ac utitor.

Aliud



Aliud. Sandarachæ, aluminis scissi, singul. drach. iiii. squamæ æris drach. ii. auripigmenti drach. i. Et si qui dem nomie est, quæ adstringi debet, siccum adhibeto. Si uero struma, aut canceratus tumor curandus est, rosaceo excipe, & quotidie bis impone. Ceratum ustorium, quo ad lippitudines utimur, temporibus adhibito donec rubescant, facit & ad coxendices, statim enim sedat dolor. Cantharidū, atramenti sutorij, succi thapsiæ, allij, singul. unc. i. ceræ trientem, olei quincuncē. Aridis ex aceto tritis liquabilia liquata ammiscero. Et ubi locus rubicundus factus fuerit, illinito ea quæ ad ambusta ab igne preparatur. Aliud cauterium è uisco. Calcis uiuæ, fecis uini ustæ, sing. drach. iiii. uisci drach. ii. nitri dra. i. Mitius hoc fiet, si calcis dra. iiii. solum acceperis, & saponis quantum satis est. At si desit sapo, lixiuij lib. i. ad tertias coquito, atq; hoc modo præparato. Arida leuissimè trita, uisco ad ignē liquato excipies, & rudicula agitabis. Deinde ad frigesacta lixiuiū paulatim instillabis, & emollies, ut medicamentum strigmentitia spissitudine liquidius euadat. Quod in plumbea pyxide solidiore seruabis, & si resiccet, lixiuium subinde instillabis. Hoc ad menti imperigines ad semihoræ spatium illinito, & postea loco per spōgiam foto, albumen oui, aut emplastrū ex plumbagine, aut hordeo, paratum imposito. Hoc aliqui etiā ad coxendices, & splenis affectiones, ac articulare morbum utuntur, hoc modo applicantes. Linteolo cuidam detricto medicamentum aliquod glutinosum illinunt, & hoc rotundis foraminibus pertusum adhibent, foramina uertentes eo ubi inuentionē facere uolunt. Atque istis medicamentū ustorij ubertim imponunt, quo uidelicet pars requisita tantū inuratur. Tum brassicæ aut betæ folia superimponunt, & decē aut pluribus horis sinunt. Et ablato postea medicamento, ad mitigatoria trāseunt, quæ ad ambusta parantur. Erosiuū incomparabile. Veratri nigri dra. iiii. squamæ æris rubræ drach. xii. sandarachæ, auripigmenti, singulorum drach. ii. atramenti sutorij drach. iiii. uentrium cantharidū dra. xii. Omnia lixiuiū excipito. Cauterium ad columellas, Demosthenis. Calcis uiuæ dra. iiii. fecis uini ustæ dra. ii. Sit autem sex nō uetusta, sed duorum mensium, nitri tosti drach. ii. minij drach. i. Cum lixiuiū ad mellis liquidioris spissitudinem terito, & bis aut ter ebullire finito, donec cogatur. Deinde in plumbeā pyxidem recodito, ne exarescat, & ea gratia subinde lixiuiū instillato. Facit ad uerrucas cū alias, tū formicarias appellatas. reduuias digitorū, clauos pedū ac manuum, callos, cicatrices eminentes, & carbunculos. At uero post columellæ uctionē, oleum gargarissandū & in ore retinendū exhibeto. Tertia die transacta, ex aqua mulsa, aut lacte cū melle os eluatur, donec excidat crusta. Eodē modo etiā anthero, siue florido, aut phrygio medicamentū uteris. In alijs uero corporis partibus ad locum inuistū repurgandum, aluminis liquidi, amurcæ, mellis cocti, æquales portiones misce & adhibe. Et post repurgata ulcera mitigatorijs medicamentis utere.

De sinibus, Galeni.

Cap. LIII.

Omnia sinuosa ulcera modo aqua mulsa, modo uino, modo uino mulso, modo aceto mulso eluimus. Ad extergendam enim saniem aqua mulsa præstat. Ad repurgandum uero & roborandum uinum mulsum confert. Ad glutinationem, uinum. Ad cruen-

tum ac graueolentem humorem, acetum mulsum. At in diuturnis affectionibus incarnatione opus habentibus, medicamenta meatus obstructa plurimo rosaceo diluta, per fistulam in directum perforatā, cui uesica alligata est, infundemus. In quem usum probe facit Machæronis emplastrum, & quod Iliis, & quod Harmonia appellatur, & plerq; nigra. Sed & hoc quod subijcimus, probe facit. Primum enim sinus repurgat, deinde incarnat, postea glutinat. Corticem caprifici à teneris ramulis detractum in oleo coquito, & oleo excolato, ceræ quantum satis est ammisceto, ut liquidum & infusile fiat medicamentum. De quo quantum satis esse uidebitur, tepidum in sinum infundes, & parato ex eodem solidiore cerato, id ipsum impones ac deligabis. Potes & forinsecus imponere emplastrum barbarum, & quæ ex pice ac bitumine præparantur, & quod ex salicibus conficitur, & quod è uino mulso, & quod ex spuma argenti, & Harmonia, & emplastrum Piscatoris, & melinū Passionis. Ad eos tamē qui uicinas partes teneriores habet, magis cōueniunt emplastra ex sale parata. Super emplastra uero spōgia aceto mulso, aut posca, aut uino imbuta imponatur. Deligatio uero à fundo sinus incipiat, & ad osculū ulceris desinat. Et linteorū obuolutiones citra dolorem quidem fundum sinus adstringant, sed inde paulatim remittantur, ac laxius ad osculū ulceris cōnectantur: ita ut emplastrū quod forinsecus sinui adhibitū est, iuxta osculū forpice præcidatur, quo sanies excerni possit, & aliud paruum recisi loco imponatur ex eodē medicamēto, sit aut laxius propter eadē saniei excretionē, & alternis diebus auferatur, relicto illo totū sinū ambiente. Deinde ubi sinū agglutinū cognouerimus, ad cicatricem inducentia pergemus. An aut probe glutinatus sit sinus in profundo, ex pure effluente cognoscemus, si modicū effluerit & cōcoctū: Et si in ipso sinu neq; dolor, neq; tumor percipiatur, sed cōtractus fuerit locus siccusq; ac doloris expers. Illitio ad sinus antiquos. Gallas omphacitidas ad duas horas oleo macerato, & in fictile siue æneum lebetē cōiectas cum oleo coquito ad prunas, donec nigrescant & uelut torrescant. Deinde ex oleo eximito, ac frigesactarum un. i. accipito, & aluminis scissi, aloës, singul. un. i. addito, & radicem altheæ siccarum, arthemisiæ unicaulis sicce, sampuchij, sing. sextantem adijcero, & singula seorsim terito, ac cribrato, & postea mista simul seruato, & usu expectente, oui luteo excepta illinito. At uero in ipso ulceris osculo paruum emplastrū impones ex pastillo, qui ad Iudeum refertur. Idem medicamentum facit ad fistulas, herniam aquosam, & podagram.

De sinibus attritam cutē habētibus, eiusdē. Cap. LIIII. Inflammationibus ad abscessum mutatis si serius incisio fiat, cōtingit aliquādo ut cutis sinui incūbens tenuis, uelut detritum uestimētū reddatur, & propterea huiusmodi ulcera detrita appellantur, quæ difficulter coalescunt ac glutinantur, & præsertim si quis compage siccum medicamentum imponat. Ab his enim magis adhuc cutis deteretur, & exarescet uelut pelles attritæ. Ad ea igitur glutinanda utendum est medicamento, compage quidem liquido, facultate uero sicco. Quale est phoenicinum emplastrum Galeni, quod nos ad huiusmodi affectiones præstare cognouimus, si ita paratum fuerit, ut neq; ualde durū sit, neq;



fit, neq; adhuc inquinare desuerit, ita enim præparatum & cruenta uulnera glutinat, & omnibus ulceribus cicatricem inducit. Ad sinus autem detritos efficacissimū est, quod tenerū est & cōpagem mollē habet, & cum oleo ueteri ac uino moderate antiquo resolutum est. Nam sicut duriciam ad hos usus improbamus: ita molliem nimis fluidā reijcimus. Liqui dū enim calido corpori incumbēs diffluit, & lintheolum siccum relinquit, quod nō solum nihil prodest, sed etiam glutinandæ cuti obest. Sed & mel moderate coctū ad hanc sinuum affectionem mirifice conducit: Cui myrrhā, uel aloē, uel thus probe trita, seorsim singula, uel simul omnia inspergere prodest, præferā si lintheolo illitū mel liquidius appareat. Experimentum sum & cetaurium tenue mirādum pharmacū ad hos usus: Deinde symphytū, & plantaginis folia cū radicibus siccata. Conuenit & rumicis radix, oleastrī folia: Verbenaca supina cū radicibus, uitis alba, iris, dictamnū, saluta, poliū, sabina, cupressi folia, salicis succus. Et in teneris carnibus erui farina. Quæ omnia prius tūdenda ac cribrāda sunt. Et ex eis tunc melli ammiscendum est quum coctū ab igne auferatur, ita ut probe cum eis agitatum mel donec tepidū fiat, imponatur lintheo inductum.

De fistulis.

Cap. LV.

Quandoquidem sinus male curati in fistulas mutari solēt, de his quoq; ex ordine dicendum est. Appellatur autē fistulæ per trāslationē à fistulis harundinū, aut ex alia materia cōfectis. Nā in ipsis cauitas quædam est harundinum cauitatibus similis, & sinus callosus inest, qui citra chirurgiam aut fortius pharmacum rescindi nō potest. Fistulis itaq; obliquis sub cutem extensis specilli nucleū immittimus, & eleuata cute totā longitudinē una sectione incidimus. Deinde callos uelut fistularum causas, si in superficie fuerint, specillo deradimus: sin in profundum penetrauerint, scalpello rescindimus. Nisi enim rescindatur, neq; caro produci, neq; ulcus coalescere poterit. At si fistula non fuerit obliqua, sed decliuis & ad profundū uergens, fistulæ ambitū refecamus, tantū de carne circūscisa auferētes, quo calli cōmode refecari possint. Si uero fistula in os desinat, ab osse denudato, squamā deradimus. Cæterū fistulæ in os desinentes ampliores quidē nucleo specilli immisso ex renitentia deprehēduntur. In angustioribus uero apice specilli pertentamus, & durū ac osseū corpus occurrens cōtingimus, ac sonū quendā percipimus, uelut assis ere percussī, qua arte nō solū fistulā ossi cōtiguā esse, sed etiā an corruptū aut illesum sit, dinoscimus. Inducto enim undiquaq; specillo, si tanquam à leui corpore ipsum semper lapsare percipimus, os incorruptū est. Si uero specillū aliquibus partibus inheſerit, inæqualitates ac asperitates subesse indicium est, & ex eo os corruptū esse coniectamus. At in fistulis quæ amplissima habent oscula, sæpe uisu os deprehendimus, ut cōiectura nō sit opus. Si uero obliquæ fuerint, flexūq; aliquem uel plures habuerint, ut specilli apex progredi nō possit, uirgulā plumbeā aut stanneā parabimus, qua iter pertentemus. Quū enim flexilis ualde sit, ad fistulæ figurā facile se accommodabit. Si uero propter nimiam obliquitatē, fistula nihil tale admiserit, ex humoris allati natura fistulæ terminū cognoscemus. Quod si fistula neruū attigerit, ex dolore indicabitur, punctiōnis enim sensum exhibe-

bit, aut stuporis. Deinde motus q̄ ab illo neruo perfici solet, deterior apparebit. Sed & in specilli cōtactu molestus sensus perceptus, indicationem faciet. Humor autem inde allatus tenuior est, similis ei qui ab ossibus defluit, nō quidē oleosus aut pinguis, sed saniosus & glutinosus. Eadē uero accidētia cōcomitātur fistulas ad musculos penetrātes. In his autē quæ carnes tantū penetrāt, crassiorē ac humectiorē sanie reperiēs. Quæ uero uenas occupāt, eadē accidētia habent q̄ ad neruos sunt relata, sed imbecilliora, dolores itē ac pūcturas. Verū nullus motus impeditur. Idē uero etiā de his dicēdū est q̄ ad arteriā pertingūt. At uero si fistula locū erodente uena suberit, plurimus ac crassus sanguis effunditur: Si uero arteria, tenuis & flauus cū multo spiritu ac stridore exilit. Atq; hæcenus de fistularū signis ac differētijs, deinceps autē de medicamentis ad easdē cōferentibus tractādū est. Post callosarū igitur partiū resectionē, carnosus quidē partibus suppurādi ductū adhibebimus, & desquamata ossa siccare conabimur. Basilicū itaq; emplastrū & reliqua huiusmodi inter suppurātia medicamēta habentur, sicut etiā quæ capitalia appellātur desiccādū uim habēt. Linamenta quoq; melle illita cōmode induntur. Ad fistulas uero inchoātes, nec adeo profundas, quarū chirurgiā ægri penitus recusant, medicamēta callos exterētia adhibebimus. Deinde remoto callo, curatione reliquis ulceribus cōmuni utemur.

Collyriū fistulare, ab antiquis fistulis callos exte-rens. Atramenti sutorij, misyos, chalcitidis crudæ, æruginis, aluminis scissilis, rubricæ sinopicæ, gūmi æquales portiones aceto excipito. Quod si pro gummithus adieceris, & duodecuplū mellis ammiscueris, callosos sinus repurgat. At si uni eiusdem parti, octuplū mellis adieceris, incarnat & ad cicatricē perducit. Aliud, faciens ad fistulas antiquas. Misyos, atramenti sutorij, aluminis scissi, ammoniaci thymiamatis, æquales portiones excipe aceto. Aliud siccū, callos fistularū exterens. Cadmiæ, chalcitidis crudæ, sandarachæ, gummi, singulorū quadrantē, æris uisti, misyos crudi, singulorum sesquiunciam. Aliud xyraphium, hoc est, callos deradens, ad capitis ac mētī ficosas papulas faciens. Misyos, chalcitidis crudæ, singulorum drac. ii. aluminis scissi drac. i. præpara, & eloto prius loco, medicamentū ubertim insperge, & postridie rursus eloto loco & calli ramento spōgia deterſo, nouū medicamētū adhibeto, tamdiu hoc repetēs donec totus callus fuerit derasus. Et cauēdū interim est, ne olei contactu pars curanda inquinetur. Quod si ita uisum fuerit, poteris ammoniaci thymiamatis drac. i. aceto resolutam ad seprē huius medicamēti drachmas ammiscere, & collyria efformare. Aliud Collyriū fistulare. Chalcitidis crudæ, misyos crudi, æruginis, foreos, atramenti sutorij, ammoniaci thymiamatis, æquales portiones aceto excipito. Aliud philosophi: Brassicæ radicē, cucurbitiā siccā, os canini capitis, cerui cornu, simul exurito, & ad cinerē ipsorum origanū, & sterces gallinacē, utrūq; siccum ac tritū ammisceto, & arida seruato. Vsu uero expectēte fistulæ osculū uino humectato, & siccum large inspergito, & lintheolo imposito deligato. Hoc abscessus rūpit, & sanat fistulas chirurgiā nō dū attractas. Aliud eiusdē. Cōchas cū testis exustas & tritas adhibet: Vel carnes cochlearum cū myrrhā, thure & aloē, in fistulam inde, externisq; impone. Aliud



Aliud, fistulas mirificè resiccans. Facit & ad seminis fluxum, capitis destillationem, aures contusas, ac dysenterias. Consumit omnem humiditatem. Idem pubi & lumbis impositū, muliebre fluxū & hæmorrhoidas sistit. Cochlearū carnes cum domibus suis, bulbum paruum, bitumen, aloē, thus, cum aceto terito ac utitor. Aliud ad fistulas optimum. Polygoni folia à ieiuno commansa apponito, & uuas passas unā cum uinaceis tritas superligato. Et ne cōtēpseris medicamentū uilitatem. Aliud siccum Magistriani, fistulas incarnās. Chamæleonis nigri radicem, corticem pinus, thus masculum, aristolochiam lōgā, singula paribus portionibus terito, & fistulæ aqua mulsā elotæ sicca inspergito. Aliud. Aloēs sextantē, radicis anchusæ unciā 1. Replet & incarnat. Aliud. Scillam in olla ustam ac tritam indito.

Aliud presentaneū, quod Hercules appellatur. Idē etiā ægilopas radicitus tollit. Pridie uero papyrus in fistulam indatur, deinde collyrium ad fistulæ siue papyri mensuram immittatur, & per triduum sinatur, & in quarta fistulam prorsus sanatum comperies. Cadmiæ ostracitidis drachmas vi. æris usti drachmas v. misyos tosti drachmas ix. chalcitidis crudæ drach. viii. cantharidas numero septem, libanotidis siccæ drac. i. hermodactyli radicem integrā, gummi drach. x. excipe aceto & collyria formato. Sunt qui atramenti sutorij & æruginis singul. drac. vi. adijciunt. Aliud ad fistulas usq; ad os pertinentes. Squamæ æris, æruginis, ammoniaci thymiamatis, singulorum æquas partes aceto subige, & pastillos efforma. Vsu expetente quantum satis est accipito, & ad ignem emollito, & collyria formato fistulæ æqualia, eaq; indito. Aliud Oribasij, ad fistulas & uibices, à Dionysio acceptum. Foliorum lepidij herbę in umbra siccatorum, floris cnici, mellis despumati, terebinthinæ, æquales portiones. Arida cum aceto terito, & adiecto modico rosaceo, omnia simul ad emplastri formam subigito. Postea fistulæ ex aceto præfrictæ, lepidij folia sicca trita inspergito, & splenium ex medicamento illi tum superimponito. Aliud, experimento cōstans.

Radicum liliorum uistorum cinere fistulam expleto, & callus exteretur, quo sublato similacem herbā arundinibus se implicantem, flore cādido, folijs hortensi phaselo similibus accipito, eamque siccam ustam triā fistulæ indito, & incarnabitur. Aliud. Oleastri radicem ustam terito, & siccam fistulæ uino calido austero elotæ inspergito, & callus excidet. Aliud fistulas incarnans. Lapidem translucidum specularem appellatum urito, ac tritum fistulæ inspergito. Cæterum post usum eorum quæ callos exterunt, collyrijs repurgatibus utendū est ex ærugine & melle cocto. Medicamentum sinus repurgās & incarnās. Myrrhę, croci, aristolochię, rubricę sinopicæ, singul. unc. i. Fel taurinum integrū, mellis quadrantē. Fel cū melle coquito, deinde reliqua tenuissimè trita ammisceto, & rursus cocto, & collyria formato. Aliud. Muscij herbæ quā & dorcadiadē uocat, misyos torrefacti, singul. drac. viii. salis communis, aluminis scissi, æruginis, singul. drac. ii. chalcitidis dra. x. nitri, terebinthinę, sing. dra. iiii. mellis lib. iii. aceti libr. i. Quæ teri possunt terito, & omnia melle excepta coquito, & collyria formato, quæ in sinus ac cauitates indes. Emplastrū Oribasij ad sinus & fistulas, cē cedriā præparatū. discutit enim stru-

mas: & ad elephātiās tumores prodest. Cerae, picis siccę, singul. lib. i. colophonię bessē, cedriæ sexuncē, propolis trientē, uel ut alij habent, sexuncē. Reliqua omnia donec non inquinent coquito, deinde propolim adijcto, unito ac utitor. Aliud. Picis, cerae, singul. lib. i. colophonię, cedriæ, singulorū sexuncē, coquito simul donec non amplius inquinent, & propolis sexuncem adijcto, & sublati ab igne thuris, aloēs, & aliquādo myrrhæ, singul. unc. i. ammisceto. Emplastrū magus uel Hephæstias nuncupatum. Glutinat sinus & fistulas, & alia huiusmodi. Spumę argenti lib. i. scorix argenti, quæ helcysma Græcis appellatur, lib. ii. testæ clibanī antiqui, cerae, singul. lib. iiii. olei lib. v. succi coriādri sextar. i. Simul coquito donec nō amplius inquinēt, deinde cerā adijcto, unito ac utitor. Idem hydropicis confert. Quidā ceræ nihil, quidā quadrantem saltē inijciunt. Alij uero ita præparāt. Testæ fictiliū lib. ii. plūbaginis lib. ii. olei sextar. i. Sed hoc modo compagem nō acquirit. Commodū est fistulis etiā nigrū ē lolio præparatum, & reliqua eius generis. Tutō etiā adhibetur quod ex argēti spuma paratur, & quod ex aceto & oleo. Virumq; in proximo sermone habetur. cōmodat quoq; fuluum Galeni, quod ad maligna ulcera paulo antè descriptum est.

De Gangrænâ & sphacelo, Galeni. Cap. lvi. Gangrænā appellant, quādo ob inflammationis magnitudinē, mortificatio partis imminet, & nisi celerrimē succuratur, pars ita affecta facile mortificatur, & malū ad contiguas partes proserpēs, singulis, perniciē impertit. At ubi iam pars mortificata penitus sensum amisit, nō amplius Gangræna, sed sphacelus, id est, caries, malū appellatur. Accidit autē hæc affectio etiā ossibus, quū circumscita caro uitiosos humores generans, per hos illa perrigauerit ac putrefecerit. Proinde partem mortificatam celerrimē reseca-re oportet, quatenus contingit uicinam sanam, ita ut nihil prorsus putridi ac cariosi relinquatur: Deinde locum inurere, & postea sesamum cū melle, uel siccum capitale item cum melle adhibere, deinde panē exterius, uel farinā ordeaceam aqua & oleo subactā imponere: Sed & iris & panacis radix, & aristolochia ac eruum crustas tollunt, singula cum melle. Itē Machæronis emplastrum, & Iliis, cum rosaceo & melle diluta. Vbi uero crustæ exciderint, curationē reliquis ulceribus communem adhibeto. Cæterū priusquā pars mortificatur, & affectio adhuc gangræna appellatur, sanguinem in loco affecto impactum, quātum eius fieri potest, plurimum euacuabimus: propter quē sanē mortificatio contingit, quum arteriæ ob locorum angustia distendi non possint: atque sic reliquo perspirationem exhibebimus. Aut igitur si uena magna fuerit in loco affecto, hac dissecta corruptū sanguinē euacuare oportet, & sæpe uelut uaricē uolsella correptum excindere: Aut totā cutem affectæ partis profundis sectionibus diuidere, aut uulnusculis altioribus inculsis scarificare, & sanguinem effluere sinere, & postea imponere pharmacum ad putrescentia commodum. Talia uero sunt, farina erui aut lolij cum aceto mulso, uel si hæc non sunt, fabacea. Quarum uires si intendere uolumus, salē adijcimus, aut aliquē pastillum leuissime tritū, ad normas suprā descriptū, qualis est Andronis, Passionis, & Musæ, & noster Asclepius appellatus, quibus omnibus pro ægroti corporis habitu ueris.

Rusticana



Rusticana enim & duriora natura, fortioribus medicamentis opus habent, molliora debilioribus. Pro sunt etiam gangrænis nuces ueteres, farina lolij cum raphano & sale, & aliquando aceto. Vuæ passæ depis uinaceis cum raphani cortice, urticæ folia, raphani semen cum aceto, quæ etiam crustas tollunt. Item lupinorum amarorum decoctum affusum. Aliud ad Gangrenas. Sordes matulæ adhærentes illinito, & postea urina abluito. Nonnulli cedriam sordibus ammiscent. Aliud. Plurimas lactucas exemptis fibris cum loliacea farina imposito. Aliqui iridis farinam accipiunt. Aliud, hoc & utiligines & alia huiusmodi sanat, & inflammationes mitigat. Herbam caranancen urito, eiusq; drachm. viii. cum gummi drach. xvi. cum aceto terito & imposito. Aliud. Aeruginem, rubricam, alumen scissile, paribus portionibus ex aceto trita adhibeto.

De canceratis tumoribus, eiusdem. Cap. LVII.

Cancerati tumores ex atra bile crassiore efferuente generantur, quæ si etiam acrior fuerit, ulceratos tumores efficit. Quapropter huiusmodi tumores inflammationibus aciores sunt, citra tantâ caliditatē, habentq; uenas plenas & circum circa extensas, ad similitudinem pedum cancri animantis. Quandoquidem uerò è profundo inutilis sanguinis multitudo attrahitur, ideo uaricosæ redduntur uenæ, & insanabilis morbus efficitur, quum ob nimiam crassitudinē, humor neque repelli, neque discuti, neq; per totius corporis purgationē leuari possit. & leniora quidē medicamenta adhibita contemnit, ab acrioribus autem irritatur. Fieri tamen potest ut incipientes cancos, prius quàm in affecta parte cōfirmētur, augeri prohibeamus, atræ bilis humore euacuato. Primū itaq; mitioribus ad hoc utemur, quale est Epithymū cum sero lactis, deinde Hiera Rusi, quæ ueratrum pro uirium robore ammixtum habet. At solani succus forinsecus illitus, ulceratum cæcrum mirificè mitigat. Ex eo autem linteolum molle duplicatum madefactum imponendū est, & supra ipsum quoq; lana tenera imponēda eodem succo imbuta, sed & ipse succus assidue his superfundendus est, ut ne hæc exarescant. Utendum est & medicamento è pompholyge ad cæcos ulceratos. Sed & hoc quod subiungam, ad cæcerata ac maligna pudēdorum, seroti, sedis, mamillarumq; affectiones, & ad ani ac muliebrium locorū rimas & tubercula efficax est. Oleū rosaceū & hyoscyami, aut solani, aut semperuiuæ, aut umbilici ueneris, aut psylli, aut uuæ acerbæ succum, in plumbeo mortario, cum plumbeo pistillo ad strigmentitiā cōpagem terito. Confert & cancri usti cinis cū cadmiā lota inspersus, uel cum cerato adhibitus. Idem etiam gangrænis conducit. Aliud. Irionis semen cū melle ad emplastri formam terendo redactum adhibeto, & maligna ulcera in quacunq; corporis parte citò ad cicatricem perducet. Idem facit & malicorium ustum tritum inspersum. Aliud, ad cæcerata & maligna. Testudinē terrestrem donec inalbescat urito, & cinerem ad alia cum butyro, ad cancos uerò ulceratos cum oleo dulci ad emplastri formam subactū, splenio illinito ac imposito. Repurgat enim, cōstringit, & ad cicatricem perducit. Et prohibet ne malum reuertatur. Adhibetur idem utiliter & gangrænis. Nec incommoda est Theriace Andromachi cū modico rosaceo diluta. Aeger porro prisanae succo

uberrimè alatur, & lactis sero. Et ex oleribus, malua, atriplice, bliro, & cucurbita. Piscibus uerò petros, & uolucris omnibus præterquàm palustribus.

De carbunculis, ex eodem.

Cap. LVIII.

Carbunculi à sanguine atrabiliario effructe, & ad partem aliquam irruente generantur, & sunt sanè ulcera crustosa, plerunq; à pustula incipientia, aliquando etiam citra hanc. Pruritus certè in principio in parte affecta adest, deinde modo una pustula, modo plures tenues, uelut milij grana, insurgunt, quibus ruptis similiter crustosum ulcus succedit. Quod si etiā citra pustulas cutis excoriatur, semper tamen crustosum apparet ulcus, uelut ea quæ à cauterijs fiunt, crusta iam cinereum, iam nigrum colorem habente, & fundo adhærente, & uelut clauo affixa, comitante etiam noma depascente. At reliqua caro circumscita uehemēter inflāmatur, & nigra fit ac splēdida, instar bituminis & picis. Talis autē est exquisitè atra bilis. Febris autē ægrotos lōgè uehemētiōr quàm igne sacro correptos inuadit. At uerò carbunculi qui iuxta carnē cōsistunt, citò abolētur. Qui uerò in mēbranis aut neruis fiunt, diutius permanent, & subiectos locos per cōsensum afficiunt. Nā qui caput occupāt, ad collum aut ceruicem, aut pectus, aut brachia, aut sub alas, cōsensum distribuunt. Qui uerò pudenda inuadunt, crura & inguina simul afficiunt. Aliquæ uerò partes etiā ad suppurationē ueniūt, quæ uidelicet magis expositæ sunt iniuriæ. Dolores insuper accedunt lōgè maiores q̃ pro paruitatis ratiōe. Sepe etiā in re purgādo ulcere, membrana aut neruus putrefactus, medullæ speciē præ se ferēs eximitur. Carbunculum igitur ubi primū eruperit, statim curare oportet, sanguine usq; ad animi deliquū euacuato. Nisi enim uenæ sectionē quid prohibeat, à nullo auxilio maius emolumentū cōsequitur. Post sectā uenā nō incōueniēs est locū scarificare, uulnuscūlis profundioribus impactis, ob humoris crassitudinem. Deinde aluus eluenda est, tenuissimāq; uictus ratio cum quiete & trāquillitate imperāda. Ad locū uerò nihil uehemēter repellens aut refrigerās adhibendum est. hinc enim maius dispendiū, quàm cōpendiū sequetur. Nō tamē affluxus negligēdus est, sed medicamenta adhibenda quæ cum moderata repulsione etiā discutiunt. Tale autē est ex plātagine & lenticula cocta cataplasma, cui addita est panis clibano cocti, neq; nimis puri, neq; sordidi medulla. In ipso uerò carbunculi ambitu emplastra imponantur ad ambusta descripta. Super ipsum uerò ulcus fortiora pharmaca imponemus, quale est Andronis, aut Pasionis, aut Polyidæ pastillus, & reliqui huiusmodi ad nomas parari, cū passo ad mellis cōpagē diluti. Carbūculo rū aut crustas mirificè eximūt, & fluxionē ad locū sistunt, uerbenacæ rectæ folia cū adipe trita & apposta. Idem faciunt & cupressi folia ac tenera germina, & pilulæ teneræ cū polenta. Aliud. Gallinacū sterco sicco cū axungia subactū ipsi solum carbūculo imposito, & bene sperato. Aliud. Nitri & rutæ pares portiones cū aceto adhibeto. Aliud. Fimi columbini, & seminis lini, æquales portiones cū melle imposito. Aliud. Silphiū, rutā & nitrū, æquis portionibus cū melle soli carbunculo imposito. Sepe etiā erodētia aliqua suprā descripta ulceri imponimus, & per linamēta indimus. In ambitu uerò carbūculi lenticulā coctā circūponimus. Aliud

P

ad car



ad carbūculos mirabile. Liliū radicē recentē & humidā ad emplāstri formā tritā imponito, & brasicae foliū ne exarescat superimponito, & admiraberis. Circūscarificat enim & crustas eximit, repurgat, replet, ad cicatricē perducit, ut ne uestigiū quidē eius appareat. Aliud Oribasij, minimē contemnendū. Saponis partē unā, axungiae tūndem, salis, cineris farmetorū uitis, aut lignorū fici, singulorū dimidiā partē, præpara & adhibe, & forinsecus panē illine.

Aliud siccū, ad carbūculos & nomas. Chalcitidis crudę, misyos crudi, atramētī sutorij, aeris usti, æqua les portiones sub sole in aceto terito donec siccantur, & utere sicco. Misy uerō nō uratur, sed tātum torreatur. Siccū Oribasij, ad carbunculos, nomas, gāgræ nas, ulcera antiqua & chironia, & ad strumas ac podagras. Spumæ argenti librā i. olei antiqui sesqui librā, auripigmenti unc. i. Spumā argenti cū oleo coquito donec non inquinat, & ablatis ab igne, auripigmentū adiūcto, ac rursus coqto, donec nigrescat. De inde manibus refrigeratū subigito, & utitor, ad strumas quidē, talī quale est, ad alia uerō cum oleo diluto, quo linamentis illini possit. Aliud Malsiliensis, quod suæ ciuitati cōposuit, quum in ipsa carbunculi sæuissent, & multos occiderent. Bouis armētarij fimum siccum ac tritum seruato, usu uerō experiente aqua madefactū soli carbūculo imponito, & linteū aqua humidum, aut cataplasma ē lenticula superponito. Aliud. Chrysocollæ, nitri tosti, lapidis asij, auripigmenti, sandarachæ, misyos torrefacti, chalcitidis, aluminis scissi, diphrygis, singul. drach. iiii. terito, & in æreō uase seruato. Vtus uerō tempore, cū specilli nucleo in ipsum carbunculi ulcus indito, & uiride subscriptū superimponito. Emplastrū uiride. Thuris, æruginis, singul. drachm. i. squamæ aeris, aluminis scissi, salis ammoniaci, singulorum obol. iiii. ceræ drac. viii. resinæ pinus siccae dra. xvi. olei lib. i. Arida ad solē in aceto terito, & reliqua liquata adiūcto, ac utitor. Aliud Asclepiadæ. Nitri torrefacti, succi cyrenensis, singul. drac. iiii. laseris drac. iiii. s. cerę, colophonis, olei, singulorum sesquidram, præpara & adhibe. Carbunculi humorem resiccat, & circūscitas partes scarificat. His autē scarificatis, utere hoc quod mox describā; Nā post scarificationem carbunculos à uicinis partibus radicatus euellit. Mali punici acidī recētis ac maturi corticē, exemptis interioribus in aceto coquito, & flaccidum factum tritū & super linteolum ad emplāstri formā extēsum adhibeto, assidueq; acetum superstillato, ne exarescat. Idē etiā in pastillos formari potest, & in umbra siccare, qui deinde usu expetēte aceto diluti adhibentur. Hoc ego frequēter in principio usus sanitatem restitui. Cæterū pudendorum carbunculos eodē modo curabis, quē in oculorū carbunculis retulimus. Confert & mel ammixta sapa coctū, & cum specilli nucleo sæpe præputio impositum. Aliud Oribasij, ad carbūculos. Chalcitidis, atramētī sutorij, singul. drac. viii. spumæ nitri drac. i. cū aqua tere & utere. Probē facit & ouillū stercus torrefactū cum melle. Aliud, ad carbunculos, nomas, putredines oris, suppuratas aures, & digitorum reduuias. Aluminis scissi drac. viii. chalcitidis drach. vi. sandarachæ drach. iiii. masicorij, misyos, atramētī sutorij, nitri, omphacij fici, singul. drac. ii. præpara & utere arido, uel cum melle, & lenticulam coctam cum pane superimponere.

De erysipelate, hoc est, igne sacro, Galeni. Cap. LIX. Flaua bilis tenuior & acrior facta, unā cū sanguine ad aliquam corporis partem irruens, erysipelas efficit, quod aut exulceratur, aut sine ulcere existit. Si itaq; sanguis dominiū habuerit, inflāmatio ad erysipelatis naturā uergens exoritur. Si cōtrā, bilis dominatur, erysipelas ad inflāmatōnē tendēs appellatur. Quod si neuter humor excesserit, affectio inter erysipelas & inflāmatōnem media uocatur. At uerō erysipelatis tumor feruentior ac flauior quā inflāmatōnis percipitur, non tamen dolorem, neq; pulsum, neq; pressiōnem, neque tensiōnē inflāmatōni æqualem inducit. Sæpe enim per cutem tantum diffunditur, carnē nulla iniuria afficiēs, atq; hoc est quod exactē Erysipelas nominatur. Grauiora uerō sunt erysipelata circa caput, quare nisi efficacibus auxilijs opē feramus, partes tonsillarum per cōsensum afficiunt, inflāmantq; ac suffocant. Ea igitur uenæ sectione curabimus, si sanguis redūdatur. Sin bilis, per medicamentū bilē flauā expurgās. Vtemur & infusis efficacioribus. Et quod influit repellemus, & feruorē refrigerabimus, per ea quę humectāt simulq; frigesaciūt. Sit autē terminus refrigeradi, mutatio coloris. At uerō id quod nō exactē erysipelas est, sed quodāmodo ad inflāmatōnis naturam uergit, liuidam cutem facit, si plus æquo refrigeretur. Et nisi medicus destiterit à refrigerado, etiā denigrabit, præsertim si senile fuerit corpus quod curatur, ita ut erysipelata sic refrigerata, ne discussorij quidē medicamentis discuti possint, sed induratum quendā tumorē in parte relinquant, proinde præstat ab humectantibus ac refrigerantibus ad discussoria progredi, postquā mutatus fuerit color, antē quā niger aut liuidus appareat. Sunt autē humectantia ac refrigerantia, citra manifestā adstrictiōnē erysipelatis cōmoda, solanum, semperuiuum, portulaca, umbilicus ueneris, psyllium, lenticula palustris, hyoscyamus, & glaucium, et cerata ex frigida aqua præparata. Cera enim cū oleo optimo, præsertim rosaceo uel omphacino liquatur, & ceratum liquidum fit, quod frigesactum in mortario aqua frigida paulatim instillata, quātum imbibere potest, cū pistillo teritur. Sit autē oleum duplū, aut quadruplū, ceræ respectu. Si uerō tenuis & albi ac pellucidi aceti modicū affuderis, medicamentum refrigeratorium magis efficies: potest & succus aliquis herbarum relatarum ammisceri: pastilli quoq; ad erysipelata præparati, nō affectis modō partibus, sed sanis quoq; uicinis adhibēdi sunt, & assidue permutadi, citissimē enim resiccantur ac uires amittunt, prioribus itaq; per spongas ex tepida aqua expressas elotis, recētes adhibeantur. Pastillus Andromachi. Quo utor, inquit, ad erysipelata. Spumæ argēti lib. ii. cerussæ lib. i. opij, sulphuris uiui, croci, singulorū quadrātem. Excipe passo & utere cum passo. Oribasius autē pastillus, inquit, ad erysipelata admirandus ita præparatur. Spumę argēti, cerusę, croci, sulphuris uiui, opij, singulorum quadrantem, passo excipito. Alius. Acacię dra. viii. misyos dra. iiii. thuris dra. iiii. opij dra. ii. præpara & utere, uelut dictū est. Ad ignes autem sacros aceto dilue. Quidā etiā aloę dra. ii. adiūciunt. Cæterum ad erysipelata faciei præsertim, hirundinis nidum tritum ac cribratum melle excipito, & cum penna illinito: citō enim discuties: ac sedata inflāmatōne, priusquam pars liuescat,



scat, discussoria adhibenda sunt, & aqua calida affundenda, itēq; marina ac muria. Cataplasmatibus etiā eadē ammiscantur, cōfert & brassica per se uel cū polenta adhibita, aut mādragoræ radix cū pane & aceto. Aut terra sigularis cū coriādrī succo. Aut ceratū rosaceū paulō antē descriptum cum calce. Quod si liuor aut durities partē affectam præoccuparit, scarificatio profundior fiat, & marina aqua aut muria affundatur, deinde uerò cataplasmata adhibeantur.

De Herpete, ex eodem.

Cap. LX.

Si flaua bilis citra alterius humoris mixturam secreta, iuxta partem aliquam cōstitit, Herpes appellatur affectio. Si quidem igitur crassa fuerit cōpage, & magis acris, omnem cutem usq; ad subiectam carnem exulcerat, & uocatur Herpes exedens. Si uerò tenuior fuerit, & minus acris, superficiem solum uelut inurit. Atq; hæc species generis appellationem tulit, simpliciterq; accitra appositionē, Herpes uocatur. Est enim adhuc tertia herpetis species quæ Miliaris appellatur, eò quod pustulas paruas & multas in superficie cutis excitat, milio similes. Oritur autē etiā ipse à bile, uerū minus acris & calida quā priores. Alij uerò hunc pituitæ ad bilem flauam ammixtione fieri putant, proinde herpetem curabimus rectē, si præuacuato uniuerso corpore, localia deinde medicamenta adhibuerimus. Qui uerò cuti solidandæ statim à principio intentus est, hanc quidem sanabit, uerū humorem affluentem non prohibebit, sed semper prioribus ulceribus solidatis, contigua cutis rursus uelut prior in superficie erodetur. Itaq; in herpetibus erodentibus, sero lactis cum scammonia exhibitō, totum corpus euacuabimus. In miliaribus uerò pharmacum exhibebimus, quod bilem simul ac pituitam educit. At uerò partibus affectis non eadem quæ erysipelatis adhibetur. Tamen si enim refrigeratione uelut erysipelata opus habent, nō tamen item humectatione indigent. His itaq; medicamenta refrigerantia ac simul resiccantia cū adstrictione cōueniūt, ita ut erodētibus quidē, & in superficie hærentibus, mitissima adhibeamus: miliaribus uerò magis discussoria. Quare neq; lactucā, neq; semperuiū, neq; quicquā aliud refrigerās ac humectās adhibebimus. Sed in principio facta purgatione, pampinos uitis, rubiq; aut polygoni, aut plantaginis folia imponeamus, postea uerò his etiā lenticulā, & mel, & polentā miscbimus. Illitiones uerò ad herpetas commodæ sunt, acacia cū aceto, plāraginis succus, glauciū passō dilutū. Ad pustulosum uerò herpetē, plūbi recrementum ē uino austero tritū illinitur, & folia betæ in uino cocta imponuntur. Aliud. Olei myrtēi sexuncē, recrementū plūbi triētē, cerę triētē. Recrementū dilue cū uino, & liquata cera excipe, & illine. Aliud, ad herpetas uehementer erodētes. Lanæ succidæ mollis tēde obuolutæ & ustæ dra. iiii. malicorñ ē punico malo dulci, spumæ argēti, singulorū dra. vi. ceræ, adipis caprini, singulorū sesquiunciā, olei myrtēi trientem aut quincuncē. Præpara & utere. Ad herpetem uerò sub cute extātem, plumbi recrementū cum succo polygoni tritum illine. Aliud ad herpetas. Lanę mollis succidæ tædæ obuolutæ & ustæ dra. xii. s. recrementū plūbi sesquiunciā, ceræ dra. xxv. adipis caprini depurati, & frigida loti dra. xxv. olei myrtēi quincuncē, præpara & utere. Aliud, ad herpetas pustulasq; superficiarias insigne medicamentum. Cornu capri-

num ustum cum aceto tritum illinito. Cornu uerò urendum super flāma detineto, exurgentesq; bullas excutito, & postea in mortario terito. Idem præstat etiā cornu ouillum & præcipuē arietinum. Potest idē cinis etiam cerato excipi. Pastillus ad herpetas.

Terræ cimoliæ, rubricæ sinopicæ, singulorū dra. iiii. misyos torrefacti, aluminis rotundi, corticis thuris, singulorū dra. vi. terito ex aqua, & formato pastillos: Vtere uerò cū aceto aut uino myrteo. Alius pastillus. Misyos dra. viii. salis fossilis dra. iiii. gummi dra. ii. Terito cum uino & formato pastillos, & utitor cum uino. Alius. Aluminis scissi, atramenti sutorij, salis fossitij, singulorum dra. ii. excipe aceto, & utere cū passo. Alius præclarus. Aluminis rotundi, chalcitidis, melāteriæ, foreos, singulorū drachmas duas, misyos, malicorñ, acaciæ, singulorum dra. iiii. caldis uiuæ dra. xvi. aceti sextar. i. tere & forma pastillos, & utere cum aqua. Ego uerò his omnibus fortioribus, & Andronio ac Musæ pastillo, & reliquis huiusmodi, ad affectiones diuturnas utor. Quum enim fortissimi sint, ualde resiccant. quapropter in principio lenioribus utendū est. Est & hoc medicamentum ad diuturnas affectiones mirabile. Nitri, chalcitidis, atramenti sutorij, misyos, calcis, acaciæ, partes æquales aceto excipe, & utere cum aqua. Ceratum ad herpetas excoriatos. Cerusæ, spumæ argēti, radicis anchusæ ustæ, singulorum dra. ii. pollinis thuris, aluminis scissi, singulorum dra. i. ceræ dra. xvi. adipis uituli drachmas centum, olei sexuncem, ouorum candidum duorum. Arida cum uino tere, & liquatis reliquis, ammisce. Aliud ad excoriatos herpetas. Cerussæ, spumæ argēti, radicis anchusæ crematæ, singulorū dra. iiii. aluminis scissi, misyos torrefacti, singulorū dra. i. resinæ pinus dra. vi. ceræ trientē, olei myrtēi lib. i. & trientē, uini heminam unā. Arida cum uino tere, donec fuerit cōsumptū, deinde cum liquatis cōmitte, & paratū medicamentum linteolo inductum adhibe. Cōuenit quoq; emplastrū ex hordeo, oleo dilutum ad eodē herpetas, foveatur itē ac rigetur locus assiduē per spōgiā ex uino, uel si id nō liceat, ex aqua expressam. Et humiditas renui linteo extergatur, & postea relata medicamēta adhibeantur. Neq; interim squamæ ab ulceribus detrahantur, donec spōtē excidāt aut discedant: neque splenium durum imponatur. Si uerò depascendo proserpentia fuerint ulcera, cataplasma ex lenticula cum melle adhibeto. At si pura & nuda fuerint, & nome sedata, spumā argenti aut plumbaginem, cum uino tritam impone.

Ad Epinyctidas, hoc est, pustulas noctu erumpentes.

Cap. LXI.

Epinyctides ulcuscula sunt spontē erumpētia, pustulosa, subrubra, quibus ruptis sanies subcruenta effluit. Hæc interdum non ualde infestant, noctu uerò maiorem dolorem excitāt, quā pro ulceris magnitudine. His itaq; medentur brassicæ, uel solani, uel hyoscyami, uel rhamni folia, cum melle imposita, & plantago trita, & centaurium uiride, & uua passa cū ruta, & cucumeris satiui folia, cum aqua, & sesamū cum aceto tritum. Egregiē facit & calx cum oleo ad mellis compagem subacta, imposita, & laser cum aqua, desiccatur enim absque mordacitate. Aut sulphuris uiui, & spumæ argenti pares portiones, cum aceto & oleo myrteo ad strigmentiam formam tritas

P 2 adhi



adhibe. Ego uerò, inquit Orisbafius, oleum nō admitto, & pro aceto potius cum uino tero. Lenticula itē cocta, & emplastrū ex polline tritici, utiliter imponitur, postquam uero epinyctis excoriata fuerit, emplastris liquidis utere, & caue ne acris, & acida, ac falsa adhibeas. Vitāda sunt itē fomēta, balnea, & sol.

De termintho.

Cap. LXII.

Terminthus tuberculi species est. Incumbit autē ipsius pustula nigra supernē ac infernē, qua rupra infernē desquamato similis apparet, hoc autem dissecto, pus inuenitur. At uerò curatio huius similis medelae pustularum nocturnarum iam relatae.

De papulis siue pustulis.

Cap. LXIII.

Papulae quibusdam exoriuntur similes his quae a feruida aqua ambustis emergunt, non tamen multum dolorem inducētes. Quibus ruptis subflauū humoris copia paulatim effluit, ad biduum aliquando ac triduum durans. Hae scēminis quibus menstrua defecerunt, aut aliās non rectē profluunt, saepe in cruribus oriri solent. Infantibus uerò aliquando in toto corpore. Verum uiris rarissimē accidunt. Quomodo uerò infantium ulcera curare oporteat, iam antea sermone quarto, ostensum est. In scēminis autem menses oportune ciere oportet. Virorum uerò corpora congruo medicamento purgare. Vtrisque uerò alimenta aluum emollientia exhibebimus, & urinas proliciemus. Acrisq; ac falsa prohibebimus. Ipsas autem pustulas acu perforare oportet, & humorem excludere, & emplastrum ē tritici polline adhibere. Euacuato uerò humore, & non amplius effluente, id quod ex hordeo praeparatur, apponendum est.

Ad ambusta ab igne.

Cap. LXIII.

Corpora ab igne aut feruida aqua ambusta, moderatē extergentibus pharmacis opus habent, citra manifestam calfactionem aut refrigerationē. protinus itaq; ad pustularum bullas prohibendas, terra quaecunq; occurrerit, modō leuis sit, in teneris carnibus cum aqua, in durioribus cum posca illinatur, praestat tamen terra cimolia, si haberi potest. Ouum item crudum molli lana exceptum, refrigerat & siccāt citra mordacitatem, & thus cum aqua tritum, & betae folia contusa & cocta ac cum uino imposita. Et alumē omne cum aqua et oui candido. Facit & hoc mirifice. Aeruginis & spumae argenti pares portiones cū uino & oleo tritas, cum pēna illine. A manuū enim cōtactu prorsus abstinere oportet, & tenue linteolū superimponere. Quod si bullae emerferint, eas in principio ne rumpas, si uerò durauerint, rumpe & ceratum impone. potest autē pastillus praeparari, ac in hūc usum seruari. Aluminis drac. II. thuris drach. II. cū aqua terito, & pastillos formato, ac utitor cū posca.

Alius. Cimoliae sextātem, corticis thuris, misyos usti singulorū drac. VI. rubricae dra. III. cū aqua formato pastillos, & utere cum posca. Ceterum cūctari non oportet, sed statim terram quaecunq; ad manum fuerit cum aqua illinere, eamq; postea tepida posca abluere, & quae relata sunt adhibere, porro ad ambusta iam pustulosa, rhoēm & polentam aceto trita impone, aut fel porci coctum, aut hyoscyami uiridis succū assidue illine, & bullae marcescēt. Ex folijs quoque hyoscyami uiridibus pastillos forma, & in umbra exicca, & in hyemem referua, quos usu expetente aqua dilue. Aut calcem uiuam cerato liquido exceptam, & linteo inductam impone. Aut

myrrham uino tritam adhibe. Excoriatīs uerò & ulceratis, betae folia in uino cocta ac trita illine. Aut ad ceratum rosaceum liquidum, betae succum paulatim instilla, quantum imbibere potest. Sint autem olei partes tres, ceræ una, succi quantum satis est. Vtere, & miraberis. Aliud. Fimum columbinum panniculo linteo illigatum exurito, cineremq; cū uino tritum, aut cerato exceptum adhibeto. Aliud. Lupinorum madefactorum & coctorum, quales quotidie comeduntur, cortices in mortario tritos, unciae pondere accipito, & cum ceræ sextante, ac olei quinque colliquis, commisceto ac utitor. Sed & hoc ambusta cito ad cicatricem perducit. Cerussae, spumae argenti, hordei usti ac triti, singulorum unc. I. ceræ quadrantem, rosacei aut myrtei dodrantem. Hordeum ad ceratum liquidum ammisce, & postea spumam argenti ac cerussam in mortario cum uino tritas adijce.

Ad flagellatos.

Cap. LXV.

Pellem ouillam recens detractam & adhuc calentem flagellatis circūda, omninoq; intra unius diei ac noctis spatium sanabit. Cōfert & brassicae succus affusus. Est & haec irrigatio inflammationi arcendae cōmodissima. Olei partes III. aceti partem I. surculorū anethi fasciculum I. Acetum & oleum assidue per anethi fasciculum agitata coquuntur, ad acetī cōsumptionem. Deinde adijcitur cera, quanta satis est ad strigmentitiam compagem. potest autem ex hac irrigatione, etiam solidius ceratum praeparari. Sed & Sphaerium ad irrigationem efficax est, & reliqua quae sequenti Sermone habentur emplastra, diluta uelutibi ostendimus. At uerò aurigae ad ictus flagrorum utuntur calce trita cum ouis crudis soluta, adiecto rosaceo cerato. Accipiunt autem calcis quadrantem, ceræ quadrantem, rosacei sextantem, oua cruda tria. Hoc medicamentum illinunt, & assidue renouant. Ad uibices uerò flagellorum facit hoc, ceræ, terebinthinae, spumae argenti, butyri, thuris, mellis, aequales portiones, loco prius foto impone, & quotidie permuta. Aliud. Calcis uiuae lotae, succi solani, olei rosacei, pares portiones cōmitte, illine, & linteolum superimponere.

Ad desquamata.

Cap. LXVI.

Desquamata appellantur, quando ex lapsu aut uiolenta aliqua offensa cutis auulsa est. Hae ab inflammatione tutatur. Rhus ruber cum melle illitus, sideritis folia trita, stratiotes herba in aquis nascens, cum aceto. Vtere & cerato ad intertrigines subscripto, & cæteris huiusmodi.

Ad intertrigines.

Cap. LXVII.

Intertrigines ex calceamentorum attritu obortae, dum dolorem excitant, pulmone suillo aut agnino calido appposito mitigantur, & ab inflammatione asseruantur. Item calceamento ueteri usto trito insperso. Aut succida lana, aut mali punici satui flore, singulis ustis tritis inspersis. Aut acacia cum aceto illita. His uerò qui teneras carnes habent, emplastrum ex hordeo ad ambusta descriptum, & alia huiusmodi adhibeto. Sed & ad papularū eruptiones, intertriginesq; ac ambusta, efficacissimum est hoc. Recrementi plumbi quadrantem, ceræ trientem, adipis suilli recentis unc. I. olei myrtei lib. I. Ad cicatricē uerò inducendam absq; adipe praepara. Vtere etiam emplastro ē psyllij succo, quod sequenti Sermone habetur, ex spu



ex spuma argenti, cerusa, & amylo paratum.

*Ad contusa & sugillata.*

Cap. LXVIII.

Carne ab aliquo graui illapso contusa, & paruis in ea uenulis disparatis, sanguis per persultationem profunditur, qui sub cute collectus sugillationem appellatam efficit. Scopus igitur est curationis, ut sanguis sub cute cōtētus discutatur, & hoc citò antequam locus nigrescat. In principio autē aliquid ex adstringentibus ad discussoria ammiscēdū est, quēadmodū Ser-mone octauo ad faciei sugillationes docuimus. Tunicæ enim uenarum contusæ, opus habent ut densentur ac firmētur, ne noua materia attracta ad locū allabatur, postea uerò solis discussorijs utemur. Sed & in principio scarificamus sugillata, atq; sic reliquam curationem facimus. Optime autem facit ad contusa, citrj mali pars interna cum oleo illita: aut linteū oleo cicipo imbutum imposito, & miraberis.

*De ruptione.*

Cap. LXIX.

Ruptio non in fibrosis, sed carnosus musculorum partibus soluta cōtinuitas existit, nunquam citra sanguinis effusionem contingens. Quæ à sinu differt, eò quod nullum osculum ad humorum effluxum uelut sinus habet, proinde & in hac discussorijs utemur, ad ea quæ in rupto corpore continentur discutienda. Ad hoc autē idonea sunt medicamēta lassitudinē eximētia. Acopa Græcis appellata. Tale autē est quod ex populo nigra paratur, itemq; quod ex abiete, ac reliqua huiusmodi. Omnino uerò ubi in profundioribus partibus ruptiones fuerint, acriora ac magis incidentia pharmaca adhibere oportet. Atq; ea de causa cucurbitę quoq; adhiberi debent. Si quidē igitur statim totus sanguis effusus, fuerit discussus, facile caro diducta coalescit. Si uerò diutius perseuerauerit, & sordes subnutrita fuerit, ruptio de cætero coalescere nō potest, labia solū inter se cōponuntur, ut ex leui occasione facile disparētur, & intermedium locus humore quodā repleatur, fiatq; quodam modo assidue sanguinis effusio, similis ej quę ab initio contingit.

*De uulsiōe.*

Cap. LXX.

Vulsiō fit fibris quibusdā distractis, quæ in mēbranis ac musculis cōtinentur. Et sola mitigatione opus habet, ut doloris exors maneat. Neq; enim fieri potest ut huiusmodi fibræ glutinentur, quū è sinuū genere sint, uelut etiā ruptiones. Est & huius affectiōis similis uelut ruptionum prædictarū curatio, ex discussorijs & citra molestiā siccantibus constans. Verū ad ruptiones ac uulsiōes in profundo factas, in pectore uidelicet aut intestinis, aristolochia rotunda utiliter potatur, & si quicquam aliud, commoda existit. Similiter etiā centaureæ magnæ radix & succus. Itē rheon, costus, bdelliū, singula cū aceto mulso pota.

*Ad luxatos articulos.*

Cap. LXXI.

Luxationes ex lubrica præsertim emotione factas, mitigat lana succida, aut spōgia noua aceto & oleo imbuta ac imposita, ita ut quies imperetur, & deligationes fiant ad ossium fracturas fieri solitæ, facit etiā ad easdem bulbus coctus cum melle, aut cerato liquido exceptus, & folia uiticis, & sal, ac nitrum assatū cū cerato, aut symphytū cū cerato, & urticæ folia cū sale, & heliotropiū, scorpiurum appellatum, & cinis sarmentorū cum axungia ueteri. Sed nihil præstantius est quàm emplastrū quoddam apponere ex his, quæ ad ossiū fracturas parantur, si eius copia detur.

*Ad laxos articulos.*

Cap. LXXII.

Laxos articulos contrahit ac firmat acacię succus aqua dilutus ac affusus. Et spinæ Aegyptiæ fructus, rubi item ac myrti, & malicorij, ac foliorum quercus decoctū, & myrteum ac lentiscinum oleum assidue illitum. Et malicorium coctum & cerato myrteo exceptum, aut per se uino coctum tritū ac impositum.

*Ad perniones.*

Cap. LXXIII.

A pernionibus præseruat sal cū melle tritum, manibus ac pedibus assidue inde perfriētis. Aliud, non modo præseruans, sed genitos etiā perniones curans. Citriorum magnorū internā partem acidam, reiectis seminibus diligēter terito, & cum adipe suillo uetusto ad cerati compagem redigito, & ad hyemis initium quotidie illinēs ex eo digitos, utitor. Aliud Oribasij. Sulphur uiuū cū melle cocto imposito. Aliud, facit etiā ad omnes feruidas eruptiones. Myrrhæ trientē, aluminis liquidī sextantē, aceti quantū satis est, præpara & pernionibus nō ulceratis, ac pruriginosis feruidis eruptionibus imposito. Aliud. Succu uæ acerbæ lib. i. thuris dra. iiii. ceræ dra. xvi. coquito simul ad succi ferme cōsumptio nē, deinde in mortario subige ac utere. Aliud, ualde insigne, ad reliquas quoq; inflammationes commodum. Cerussæ, spumæ argenti, aluminis liquidī, singulorum lib. i. myrrhæ, thuris, singulorum quadrantē, ouorū assatorum uitellos xvi. adipis suilli ueteris lib. i. Arida cum aceto terito, in quo malicoriū decoctum est, & ubi strigmentitiā compagem habuerint, adipē adijcito, ac simul probe subigito, & in plūbeo uase seruato. Vsu uerò postulante, rosaceo aut myrteo oleo diluito ac illinito. Aliud. Hyoscyami succus assidue illitus, eodē die inflātionē ac dolorem sedat. Aliud. Alliū in oleo torreto, eoq; abiecto, & cera ad oleū addita, ceratum facto ac imposito. probe facit etiā amurca illita, & rhus coriarius. Ceterū irrigationes circū perniones cōueniunt. Radicis cyclamini decoctū, item rhois coriarij, betæ, ac lupinorū amarorū, marina aqua calida per se. Verū rapī decoctū reliquis omnibus præstat. Aliud, ad ulceratos perniones efficacissimū. Ceratū rosaceū in magno rapo ad ollæ similitudinē excuato, ad feruentē cinerē liquefacto, & adhibeto. Idē ceratū etiā in raphani radice liquefieri potest, faciūt & cācri fluuaitiles usti melle aut cerato excepti. Aliud. Umbilicum ueneris & malicorium in uino coquito, & cerato rosaceo excipiro. Aliud. Rutę, medullæ taurinæ, rosacei, æquas portiones unito. Hoc etiā ad ulcera antiqua facit, & articularū ossa denudata. Aliud, perniones imminentes arcens. Atramētī sutorij, florum mali punici satui, singulorum drach. iiii. aluminis scissi drach. iiii. myrrhæ, thuris, singulorum drachm. ii. ceræ drachm. iiii. adipis suilli drachm. viii. olei myrtei quantum satis est. Aliud. Aluminis scissi drachm. x. spumæ argēti drach. iiii. myrrhæ drach. i. ouorū albumina duo. Vino & oleo myrteo excipe ac utere. Aliud. Aluminis rotundi drach. iiii. calcis uiuæ drach. ii. ceræ unc. i. rosacei aut myrtei olei trientē, præpara ac utere. Idem & ad attritus facit. Aliud. Spumæ argēti drachm. x. cerussæ drachm. iiii. ceræ drachm. xii. adipis suilli recentis drachm. xx. ouorum assatorum uitellos duos, pollinis thuris drach. i. Spumam argēti, cerussam, & oua cum aceto terito, deinde ceratum adijcito, ac præparatum seruato.



Vfus autem tempore cum rosaceo dilutū adhibeto.

Aliud, perñiones ac cicatricem ducēs. Cōfert etiā ad papularum eruptiones, excořfatas intertrigines, & desquamata. Cerae, adipis suilli, singulorum drach. viii. spumae argenti, corticis pinus, singulorum drach. xvi. mannae thuris drach. viii. rosacei quantum satis est. Quidam plumbaginem pro argēti spuma sumūt. Oribasij Hexapharmacum. Ad perñiones ulceratos, olei omphacini, taurini adipis, succi hyoscyami, singulorum lib. i. spumae argenti sexuncem, colophoniae trientem, mellis sexuncem.

*Ad digitorum pterygia siue reduuias. Cap. LXXIII.*  
Ferruginem cum aceto illine. Aut aluminis, sandarachae, calcis uiuae, diphrygis, aequales portiones impone, & linteolum uino imbutum ac mollem spongiam superimponere. Aliud. Squamę aeris, malicorij, caricarum leniter assatarum, aequales partes melle excipe, & loco prius ex spissamentorum astringentium decocto rigato impone. Et quod de pterygio exarescit depurga. Aliud cito resiccans ac curans. Soreos usti, thuris, singulorum drachm. ii. aeruginis rasae drach. i. cum melle tere, & super ipsum pterygium impone, facit & ad reliqua horum locorum ulcera maligna, nigredines & putredines. Oribasij zopyrios ad pterygia. Aluminis rotundi acetabulū in fictili exurito, & ad tritum aceti cyathum, hoc est, sextantem ammisceto, & mellis quadratē, & hæc simul pterygijs imponito. Aliud bonum, cimoliae tostae drach. viii. pumicis usti drach. iiii. aeris usti, gallarum, singulorum drach. ii. præpara & utere. Aliud ad pterygia putrefacta, & ulcera pudendorum. Thuris drachmas quatuor, squamę aeris drachm. ii. aeruginis rasae drachmas iiii. Mellis quadratē, terito ad solē donec flauescant, & loco ex uino prærigato impone, & linteolum ex aqua expressum, ac spongiā superimponere. Ex huius usu magnū successum habui. Aliud. Hoc per triduiū citra mordacitatem sanat. Caricarū pinguium tostarū, ut probe teri possint, drachmas duas, misyos cyprij drachmas duas, squamę aeris drachmas duas, mellis quantum satis est, præpara & utere, ac miraberis. Ego uerò squamam aeris per se tritam adhibui, & linteolū ē uino expressum superimposui. Oribasij ad pterygia. Gallarum, auripigmenti, atramenti sutorij, aequales portiones unito ac utitor. Aliud. Aeruginis dra. iiii. mannae siue pollinis thuris, sulphuris uiui, sing. dra. ii. Vtere etiā pastillo Musae uelut admirando, linteūq; ē uino expressum superimponere. Aliud ad pterygia experimento constans. Gallam non perforatam cum carie ligni quercini tritam insperge.

*Ad paronychias, id est, unguiū abscessus. Cap. LXXV.*  
Ad paronychias incipientes priusquā suppurētur, siue ī manu siue pedū digitis fuerint, lanā ex aqua frigida ibutā imponito, aut p linteolū ex aqua expressū assidue refrigerato. Aliud. thus & gallā cū melle trita, simul aut seorsim imponito. Aliud. folia myrti trita inspergito, aut ceratum myrtē imponito. Aut sordes auriū assidue illinito, & sanabis. At si fuerint inflamatę, panē aqua madefactū cū rosaceo adhibeto. Aliud. Oliuę folia tenera imponito. Aliud. Cadmiā tritam inspergito. Oportet autem carnem undiquaque ab ungue disparare, linamentis conuulsis, ē linteo interpositis, & probe adhibita

medicamenta alligare. potest etiam Spodium simili modo inspergi. Aliud, ad paronychias exulceratas. Aeruginis, spumae argenti, sing. drach. iiii. sarco-collę drach. i. terito & large inspergito. Aut farinam erui adhibeto. Carnem item eodem modo uelut dictum est disparato, & linteum ex uino expressum, itemq; spongiā uino imbuiā superimponito. Hoc ego sæpe uti soleo. Aliud, quo utor. Nitri, squamegris, pumicis usti, sing. unc. i. cimoliae quadrantem. Omnia cū aceto & modico melle terito, & pastillos formato. Vfus aut tempore aqua diluito, & adhibeto linteo exceptum. Vtor etiam pastillo insigni, quē Iridem uocāt, cum uino diluto, qui sic præparatur. Aluminis liquidi drach. centū, croci, myrrhae, singulorum dra. viii. Quidā etiam aloēs drach. viii. adiungunt. Subigito ac formato pastillos, ac utitor cum uino, & linteum ex uino superliga, prodest & Musę pastillus, ac reliqui eius generis. At uerò depascendo iam proserpentes fistes, auripigmento usto trito ubertim insperso, & linteo ē uino expresso superimposito. Ego uerò sandaracham & auripigmentum, æquis portionibus simul trita adhibeo. Et si cicatricem inducere oportet, eadem terebinthina liquida excipio ac adhibeo. Quod si suppuratae fuerint paronychie, primum ipsas perforabis, & humorem exprimes, & deinde lenticulam cū melle impones. Aut rosas uirides, aut siccas aqua madefactas, tritas adhibebis.

*Ad contusos ungues. Cap. LXXVI.*  
Myrtē & mali punicea folia tenera impone. Aut felle tauri euacuato, in ipsam fellis uesicā unguem indito, ac finito donec perfecte sanetur. Aliud. Sal fossile cū aqua & oleo tritū illinito. Est enim efficacissimū.

*Ad subcruentos ungues. Cap. LXXVII.*  
Picem siccam liquefacito, & cum farina mixtam apponito, præstat tamen subcruentatum unguem in medio perforare, ac cruorē subterlapsū exprimere. Si enim perstiterit, putrescet, & ulceris difficulter curabilis causam exhibebit.

*Ad motos ungues. Cap. LXXVIII.*  
Vngues ex aliqua offensa motos, & pūgituo dolore affectos, caricę cū melle tritę mitigant. Quod si dimidium unguis exciderit, nitrū aut salem cum pari fellis uitulini mensura misce, adhibe, & sanabis.

*Ad scabros ac leprosos ungues. Cap. LXXIX.*  
Adipem ouillum emollitum, & super linteū extēsum adhibeto, ac tertia die soluito, & si mollem unguem repperis deradito, & eundē rursus imponito, & tertia die solutū similiter deradito. Atq; hoc tandiu facito, donec integra sanitas accedat. Aliud. thus tritum adipe ouillo excipe, ac utere uelut dictum est. Aliud ualde bonū. Alumē scissum anserino adipe excipe ac utere uelut dictū est. Aliud, ex cuius usu successum sentio. Mastichen chīam in aquam feruentem coniectam ac emollitam, ungui impone ac obliga, & tertia die solue, & derafo ungue rursus impone, atque hoc facito usque ad perfectam restitutionem. Aliud. Hordei farinam cum pice ad emplastri formam coquito ac imponito, uelut dictum est.

Aliud. Gummi drachmas sex, lacrymae oleastri drachmas quatuor, atramenti sutorij drachmas tres: Gummi & lacrymam aceto diluito, & adiecto atramento sutorio in olla ad prunas ad compagem coquito, & derafis unguibus apponito, & alligato, ac tertia die soluito, & ungue derafo rursus imponito,



ponito, idque tandiu facito donec unguis excidat. Aliud. Auripigmentū colore aureo, & sandarachā, æquis portionibus probè terito, & terebinthina ad emplastri formam excipito, & imposito, ubi prius per unū atq; alterum diē, farinam ordeaceā cum aceto & sylvestris cucumeris radice tritam adhibueris. Tertia uero die similiter soluito, ac tandiu repetito, donec unguis excidat. Cauendum est autē ne locus oleo attingatur. Aliud. Sandarachæ, auripigmenti, chalcitidis, myrrhæ, thuris, singul. drac. ii. farinæ lo li dra. v. terebinthina excipito & adhibeto. Aliud, auferens ungues citra exulcerationē. Bituminis dra. ii. sulphuris uiui, sandarachæ, auripigmenti, singul. dra. i. Excipe terebinthina & utere, ac per septimum diem solue, derafoq; ungue, rursus nouum impone, atq; ubi unguis exciderit, ceratū myrteum, cui aliquid eiusdē medicamenti admixtum est, applica. Aliud. Calcem uiuā cum oleo, aut mastichen cū opo balsamo imposito. Postquam autē morbus occalluit, & præscripta medicamenta nihil proficiunt, exco riatoria nunc referenda statim adhibeantur. Exco ratorium leprosi unguis, callos, uerrucas & clauos auferens. Cantharidas numero x v. sulphuris uiui, chalcitidis, singulorū drac. i. aliq; depurgati nucleos i x. omnia probè trita terebinthina excipito. Vfus autē tempore partes ungui uicinas miti aliquo me dicamēto munito, & exco ratoriū hoc pelliculæ ue sicæ bubulæ illitū adhibeto, & postridie soluito, bul lasq; exortas rūpito, & si subiacentibus locis sordes inhæserint, panē cum aqua mulsa, aut lenticulā cum melle illinito. Et deinde ulcera repurgata, ceratō ex anserino adipe, thureq; ac cerato parato, curato. Aliud exco ratoriū. Nasturtij, sinapis, sulphuris uiui, nigellæ, cātharidū, atramentū sutorij, æquales portio nes ex aceto probè tritas terebinthina excipito, & ue lut diximus utitor. Aliud, Oribasij leprosos ungues exterēs. Propolis, cere, bituminis, sing. dra. ii. sulphu ris uiui dra. i. præpara, & oleo, ne inquinetur. Vfu autē experēte, calefactū unguibus impositur. Aliud eiusdē. Atramentū sutorij & sulphur uiuū sufficien te uisco excipe, & corio inductū adhibe. Aliud. Pic cem liquidā, ceram, colophoniam, ammoniacum thy miama æqualiter misceto ac imposito. Aliud. Ce ræ, colophoniam, terebinthinā, sulphuris uiui, staphi dis agrestis, nitri, singul. dra. ii. sandarachæ, cāthari dum, singulorum, drach. i. cedriæ quantum satis est.

Ad reparandos ungues.

Cap. lxxx.

Myrrhæ drach. viii. aluminis scissi drach. iiii. panis hordeacei sicci drach. i. excipe melle & impone. Aliud, ad ungues ægre orientes. Betæ agrestis semen cum aceto tritū imposito. Aliud, poliū cum adipe uitulino & terebinthina tritum adhibeto.

De anulis, digitis impactis.

Cap. lxxxi.

Anuli aliquando digitis impinguntur, quum circulus ipsorū angustior, uolenter illorū partibus crassio ribus fuerit adactus, atq; hoc tum maxime contin git, quum homo cibo ac poru distētus, prona ac pen dula manu sopitus decubuerit. Ita enim manū ex tremitates longē magis intumescunt, quā si erigā tur. Aqua igitur & oleo, aut malue decocto, manus largē perfundatur. Nam parca perfusio tumore ma gis auget. Deinde anulus leuiter uersatus detraha tur. Quod si perfusio nihil effecerit, filum crassius cōtortum accipito, & alterū eius caput sub anulum

ponito, & reliquum totum digito laxè circumliga to, & postea caput filii anulo suppositum sursum tra hito: filo enim attracto, anulus deorsum procedet. Quod si neq; sic successerit, specilli partem latiore sub anulū submitto, & anulū utrinq; propē sigil lum per spatham incidito, & filo lineo utrinq; cir cundato anulū attrahito. Et consequenter lanam ui no & oleo imbutam mitigandi gratia adhibeto.

Ad clauos.

Cap. lxxxii.

Clauus rotundū est tuberculum, album, clauī capiti si mile, plerunq; in calcaneis ac plantis pedū enascens, & in gradiendo dolore inducens, ad durioris alicuius rei occursum. Sed & in summis manuum digitis sæpissime oriri solet. Huius itaq; tollendi gratia se ctionem & uisionē recusamus, quoniā hę partes ner uosæ sunt ac subtili sensu præditæ. Vimur autem ustorij medicamētis huiusmodi. Cantharidum pe ctuscula x v. sulphuris uiui, chalcitidis crudæ, ammij, sing. obolos. iiii. Singula seorsim terito, & pice li quida siue terebinthina ad emplastri formā excipi to, atq; utitor hoc modo. Caput clauī & circūsitum eiū ambitū deradito, & spleniū inflammationi arcē dæ idoneū, glutinosum, in medio excisum, quātum clauī totius ambitus patet, adhibeto, & tūc splenium ex relato medicamēto sup ipsum clauū, ad glutinosi splenij cæsura imposito, & forinsecus charta integri to, ac rursus aliud linteolū custodię gratia superliga to, atq; ita per bīduū aut trīduū, ægrū quierū dimit tito, idēq; sæpe repetito, donec clauus a subiecta car ne prorsus discesserit. Clauo uero sublato deraditur plāta, & rursus adhibetur emplastrum, donec ulcus fuerit explanatū. Aliud. Derafo prius ac repurgato loco, sicut diximus, succū cyrenaicū, uel si is desit, la ser cū nitro ficus pinguisimę carne, uel terebinthina excipito ac imposito. Aliud. Lupinos crudos uistos melle excipe, & circūraso ac depurgato clauo impo ne. Aut gallinacū stercus uistū melle exceptū, aut nigellā cū aceto tritā, eodē modo adhibe. Aliud. Cla uum circumcirca repurgato, & succum cyrenaicum probe tritum, aut laser uberrim adhibeto, & deinde splenium ē melle eodemq; succo illitum apponito. Hoc etiā ad strumas facit. Aliud. Rpurgato clauo fabam fresam, aut lomentum fabacū aceto coctum apponito. Idem ad cicatricem perducit. Aliud. Cla uo repurgato atramentum sutorium leuissime tri tum inspergito, & linteo alligato. Aliud, clauos ē manibus ac pedibus tollēs. fimum columbinum in acerrimo aceto ad cerati compagem coquito, & cla uo repurgato imposito. Et per bīduū aut trīduum funditus tollet, aut circumraso ac repurgato clauo, ex erodentibus medicamentis supra relatis aliquod adhibeto. Aliud, clauos digitorum citra mole stiam auferens. Mastichen nigram Aegyptiam in aceto coquito, atque ita calidam adhibeto.

Ad plantarum rimas.

Cap. lxxxiii.

In plantis quoque rimæ oriuntur, gradientes magis infestantes. Planta igitur assidue scalpī deber, & hæc medicamenta adhiberi, picem liquidā ammixta ce ræ, ita ut ceræ pars una sit, picis uero liquidæ duæ, illinito. Aliud. Scillæ medullam in oleo coquito, & cum terebinthina tritam imposito, aut etiam ab lecta scilla, terebinthinam in oleo liquato, ac utitor. Aliud. Cancrorum fluuiatiliū ustorum cinerem cum melle subactum impone, uel oleo dissolutum



rimis præscalptis instilla. Aliud. Malicorium acetum coctum per dies quinque imposito, indeque purgatis calcem cum oleo adhibeto. Aliud. Cornu caprini usti cinerem liquida pice aut terebinthina excipito ac utitor. Aliud. Amurcæ in æneo uase ad mellis compagem coctæ cyathum unum, acetum cyathum unum, squamæ æris, pollinis thuris, singulorum drachm. duas, lanæ succidæ teneræ manipulum unum. Lanam rædæ obuolutam urito, ac reliquis aridis ammisceto. Amurcam uerò cum aceto ad mellis compagem coquito, & illis adijcito. Vtere hoc ad uulnera quidē cum uino dissoluto, ad plantarum uerò ac pudendorum affectiones cum passo. Aliud ad pedum rimas, porcini adipem sale inueteratum calidum assidue instilla. Aliud. Spumam argenti, colophoniam, mel, oleum, æquis portionibus præparato. Hoc etiam ad reliqua caua ulcera facit. Aliud, ad pedum rimas, quod labiorum quoque duriciam emollit. Cerussæ drachm. II. spumæ argenti drachm. x. myrrhæ drachm. I. ouorum cædida II. Vino odorato paulatim instillato terito ac utitor. Mihi uerò etiam oleum adijciendum uidetur, ut pinguis compages fiat. Et ualde probò commune illud quod è melle paratur, & mellis, ceræ, olei, spumæ argenti, æquales portiones recipit. Nam hoc ad omnes pedum ac manuum exulcerationes facit, siue in uola, siue intra digitos fuerint, & præsertim si propè ungues extiterint. Ad calcaneorum præterea intertrigines ex calceamentorum attritu obortas, & ad attritus ex longo decubitu factos, quales sæpe in cubitis ac coxis uidentur eorum qui diutino morbo laborauerunt. Hoc medicamento sæpe prosperè usus sum. Neque enim simile habet, præsertim ad os sacrum & femora ex longo decubitu attrita ac ulcerata. Aliud floridum, ad rimas. Calcis uiuæ drachm. x. cerussæ drachm. x. ceræ drachm. xxx. adipis suilli recentis septuncem, colophoniam dodrantem, succi seminis lini cyathum unum, olei dulcis quincuncem. Cerussam & calcem cum succo terito, & ad ceratum frigefactum ammisceto, & loco prius repurgato adhibeto. Hoc præ omnibus teneram plantam efficit. Ad reliqua uerò ulcera ob foetorem improbat. Aliud. Amurcæ, mellis despumati, singulorum drac. II. aluminis phorimi drac. I. Hoc etiam gingiuas purgat ac firmat.

*De crurum ac reliquarum partium uaricibus.*

*Cap. LXXXIII.*

Varices appellantur uenæ dilatatae, quæ aliquando circa testes, aliquando circa crura ampliatur. Sed qui in testibus fiunt, chirurgiâ difficulter admittunt. Qui uerò alibi consistunt, hoc modo curari solent: primum simplex sectio fit cutis uasi adiacentis, deinde uas ab ambiētibus corpusculis separatim cæco uncino attrahitur, ac lineo funiculo supernè deligatur, & non aliter quàm in uenæ sectione fieri solet uas inciditur, & euacuato sanguine quantum opus esse uidetur, superior pars cōstringitur, & postea totum quod ampliatum fuerat amputatur, peracto opere sectio pol-

line thuris impletur, & splenio ac linteo imposito deligatur. Aeger autem quiescere iubetur, seruato accliuu partis situ, ne si decliuis iaceat, humores ad ipsam confluant, postea curationis ductus ad puris generationē dirigitur, & reliqua cura ulceribus communis adhibetur. Atque hæc compendiaría ac securacuratio est. Quidam uerò uisionem malunt, & perlati digiti spatium cauteria uasis adhibent. Et ubi crusta exciderit, ulcusque incarnatum ac cicatrix inducta fuerit, locum roborant. Alij uarices incipientes talibus medicamentis prohibere conantur. Emplastrum citra molestiam resiccans, etiam si ulcera manantia in ipso uarice fuerint. Bituminis iudaici sesquialbram, olei uetustissimi bessem, terebinthinæ liquidæ septuncem, sulphuris uiui trientem. Bitumen ad cicerum magnitudinem crassius contusum, in oleo donec liquecat, coquito, deinde adiecta terebinthina simul coquito, donec non amplius inquinent, & sublato ab igne medicamentum sulphur tritum inspergito, atque simul omnia in mortarium frigida aqua plenum iniijcito, & probè subactis utitor.

*De brachiorum ac crurum dracunculis, Leonidæ.*

*Cap. LXXXV.*

Qui appellantur dracunculi, lumbricis similes sunt, & aliquando magni, aliquando parui reperiuntur, frequentius quidem in cruribus, quandoque uerò & in musculosis brachiorum partibus cōsistentes. Nascuntur autem hi in Aethiopia ac India in pueris præcipue, estque ipsorum generatio non dissimilis lumbricis latissimis uentris. Sub cute enim mouentur nihil molestiæ afferentes, uerum temporis progressu circa dracunculi extremitatem locus suppuratur, & cutis aperitur, ac dracunculi caput exeritur. Quod si dracunculus attrahatur, uehementem dolorem inducit, præsertim si nimia tractus uolentia fuerit ruptus. Nam quod relinquitur, molestissimos dolores infert, proinde ut ne recurrat animal, ualido filo brachium cōstringere oportet, & quotidie hoc molliri, ut dracunculus paulatim progrediens constrictione quidam intercludatur, nequaquam autem abrumpatur. Locus item aqua mulsa, & oleo in quo abstinthium aut abrotonum coctum est, aut alio quodam ex his quæ ad alui lumbricos descripsimus, irrigandus est. Omnia tamen acria uitanda, propter periculum inflammationis. Cataplasmata quoque laxatoria ac suppuratoria è farinis cum aqua mulsa & oleo præparata adhibeantur. Quod si dracunculus sponte progrediens facile extrahi poterit, nihil amplius faciendum est. Sin ad suppurationem uertetur, à cataplasmatibus, & aquæ mulsæ ac olei irrigatione non est discedendum. Nos uerò emplastrum è baccis lauri, post cataplasmatum ablationem, imponere solemus: facta uerò suppuratione, cutis per longitudinem dissecetur, & dracunculus denudatus auferatur, & cutis linamentis inditis disparetur, & reliqua curatio suppuratoria adhibeatur, ita ut animal suppurato & extracto, ulcus incarnetur & ad cicatricem perducatur.

*FINIS.*



## INDEX EORVM QVAE IN

DECIMO QUINTO SERMONE AETII

CONTINENTVR.

|                                                                                       |            |                                                 |            |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| De tumoribus laxis.                                                                   | cap. I.    | De emplastro Aniceto.                           | cap. XVI.  | caput XXXII.                                              |
| De inflatione.                                                                        | cap. II.   | Emplastra ruptoria.                             | cap. XVII. | Emplastrum Phycotiche appellatum. ca-                     |
| De tumoribus induratis.                                                               | cap. III.  | Emplastra discussoria & attractoria.            |            | put XXXIII.                                               |
| Tendinum ac ligamentorum induratio-<br>rum curatio.                                   | cap. IIII. | Emplastrum Nechepsonis è cupresso.              |            | Emplastrum Sphaerium appellatum. ca-                      |
| De strumis.                                                                           | cap. V.    | caput XIX.                                      |            | put XXXIII.                                               |
| De bronchocela, hoc est, gutturis tu-<br>more.                                        | cap. VI.   | Apochymatis præparatio.                         | cap. XX.   | Emplastrum pentatheton. cap. XXXV.                        |
| De pulpacei ac mellei humoris tumo-<br>ribus.                                         | cap. VII.  | Cerata utilissima.                              | cap. XXI.  | Emplastrum ex Ochra. cap. XXXVI.                          |
| De steatomatibus, hoc est, tumoribus<br>adiposis.                                     | cap. VIII. | Heptapharmacum laxans, suppurans,<br>incarnans. | cap. XXII. | Emplastrum Telamonium. caput<br>XXXVII.                   |
| De ganglio.                                                                           | cap. IX.   | Enneapharmacum, Hori mendesij. ca-              |            | Pilarium ex recremento argenti. caput<br>XXXVIII.         |
| De uasorum dilatatione.                                                               | cap. X.    | put XXIII.                                      |            | Emplastrum ex pompholyge. caput<br>XXXIX.                 |
| De cerijs, hoc est, fauis.                                                            | cap. XI.   | Emplastrum philosophi. cap. XXIII.              |            | Emplastrum rutaceum. cap. XL.                             |
| Emplastra ad cruenta uulnera gluti-<br>nanda, & ad multos usus commoda.               | cap. XII.  | Oesypi præparatio. cap. XXV.                    |            | Ceratum è perdicio. cap. XLI.                             |
| Emplastra cephalica, & ad fracturas,<br>& ad multa commoda. Et de iusto<br>eorum usu. | cap. XIII. | Emplastrum Manus appellatum. ca-                |            | Ceratum è succo betæ. cap. XLII.                          |
| Emplastra emollientia ac discussoria,<br>ad multa commoda.                            | cap. XIII. | put XXVI.                                       |            | Ceratum ex sandyce, Homo appellatum.<br>caput XLIII.      |
| De emplastro ex aspidibus.                                                            | cap. XV.   | Emplastrum Bromiū appellatum. ca-               |            | Emplastrum ex allijs. cap. XLIII.                         |
|                                                                                       |            | put XXVII.                                      |            | Emplastrum è scilla. cap. XLV.                            |
|                                                                                       |            | Emplastrum ex ouis. cap. XXVIII.                |            | Emplastrū ex pompholyge, Hieræ Cap<br>padocis. cap. XLVI. |
|                                                                                       |            | Parhygrum Galeni. cap. XXIX.                    |            | Emplastrum nigrum, Essentia appella-<br>tum. cap. XLVII.  |
|                                                                                       |            | Emplastrum ex ouis, Oribasij. ca-               |            |                                                           |
|                                                                                       |            | put XXX.                                        |            |                                                           |
|                                                                                       |            | Parhygrum Oribasij. cap. XXXI.                  |            |                                                           |
|                                                                                       |            | Emplastrum Rosaceum inscriptum.                 |            |                                                           |

AETII MEDICI GRAE  
CI CONTRACTAE EX VE-

TERIBVS MEDICINAE TETRA-

BIBLI SIVE QUATERNIONIS

QUARTI SERMO TERTIVS, ET

EX ORDINE XV.

De tumoribus laxis itemq; duris, &amp; de strumis, &amp; emplastrorum multi usus compositione.

De tumoribus laxis.

Cap. I.



VE M A D M O D V M ab influ-  
xu bilioso erysipelas, hoc est, i-  
gnis sacer, ita à pituitoso tumor  
laxus, què œdema Græci uocāt,  
generatur. Est aut tumor hic ci-  
tra dolorē, flatuosū spiritū con-  
tinēs, uelut à uaporoso humo-  
re pgnatus. Solēt etiā aliter tumores laxi fieri, circa  
pedes præcipuē, in hydrope, ac tabe, & malo corpo-  
ris habitu, q si digitis prematur, cauus locus fit. Et hi  
in qbusdā etiā faciē occupāt. Verū hi tumores accē-  
sio sunt aliarū affectionū, & nullā ppriā ac præcipuā  
curā requirūt. Sufficit em̄ ipsis frictio, aliquādo p ace-  
tū ac oleū rosaceū pmixta, aliquando p oleū & salē,  
potest etiā sal ad acetū oleo rosaceo permixtū adijci.  
At si ob pituitosū humoris influxū in parte aliqua  
laxus tumor cōsistit, spōgia posca imbuta ac impo-  
sita, & leui adstrictione alligata, q ex infernis partib.  
iniciū sumat, & in supnas desinat, affectionē quādoq;  
sedauit. Oportet autē spongiā esse nouā, si uerò talis  
nō adsit, expurgāda est nitro uel spuma nitri, & li-  
xiuio. Quod si neq; sic tumor deprimatur, parū alu-  
minis ad poscā adijcies. Aptum est & Tarsicū elly-  
chniū, aut aliud mollissimū, eodē humore imbutū  
ac impositū. Cōfert & glauciū, & collyriū ex eo pa-

ratum. Sordes itē lucernarum aqua mulsa dilutæ uo-  
tiliter adhibētur. Cæterū diuturnos tumores laxos  
oleo præillitos, & spōgia noua ex lixiuio superim-  
posita uolētius cōstrictos sanabis. Discutit itē ac cō-  
pescit laxos tumores terra omnis illita, & præsertim  
quæ in lētibz reperitur ad salē adhibita, uelut Ser-  
mone secūdo retulimus. Itē isatis hortēsis ac satiuæ.

De inflatione.

Cap. II.

Flatuosus spiritus aliquando sub cute, aliquando sub  
pelliculis ossa aut musculos ambiētibus, colligitur,  
& inflationē parit. Aliquando etiā circa uiscera uen-  
tremq; ac intestina coaceruatur. Si itaq; uiscera infla-  
ta fuerint, satis cōstat, ex uitioso uictu malū esse ob-  
ortum. In musculis autē cōtingit præcedere plerūq;  
contusione. Suntq; huiusmodi musculorū affectio-  
nes curatu difficiles, quoniā in omnes fermē muscu-  
li partes flatuosus spiritus dispergitur, constringi-  
turq; ac intercluditur ab ambiētibus pelliculis, &  
plurimis alijs corpusculis usque ad cutem prætensis.  
Ad uentris ergo ac intestinorum & uiscerum infla-  
tiones, oleum tenue efficax est, in quo ruta aut cymi-  
num, aut apij semen, & alia attenuantia ac calefacien-  
tia coctum est, si aut irrigetur, aut per clysterem in-  
fundatur. Magna etiā cucurbita circa umbilicum  
absque scarificatione apposita, tam citō hominem  
à molestia liberat, ut admirabilis sit ea celeritas,

&amp;



& incantationi similis. At uerò musculis ex contusione inflatis, ex calidorū & acriū usu partes exacerbantur, & auctis inde inflammationibus musculi magis læduntur, ac dolores intendantur. Mixtas itaq; facultates habere oportet ea, quæ inflatis musculis adhibentur, præsertim si cōtusio fuerit aliquatū inflāmata. Quapropter in principio mitigatoria augēda sunt. In declinatione uerò discussoria. Neq; repente ab alteris ad altera trāseundū est. Sed paulatim mitigatorijs detractis, discussoria augebimus. Mitigatoria uerò in huiusmodi affectionib. sunt, sapa, & celypus, modico oleo adiecto. Discussoria autē acetū, nitrū, spuma nitri, & lixiuū. Et in principio quidē solā sapa cū modico oleo, & aliquādo uino adhibemus, ut ne omnino repellendi uī careat, & hæc omnia succida lana excepta. Quæ si nō adsit, celypū reliquis quacūq; lana exceptis ammiscemus, præ omnibus uerò curādum est, ut hæc calida permaneāt, neq; sinātur donec frigeant, forinsecus itaq; calida lana adhibeatur, & ubi calorē eius æger amplius non percipit, noua statim applicetur. Mitigato autem ægroto, acetū ac nitrū ammiscēbimus, copia ipsorum paulatim aucta. At uerò neglectas & antiquatas inflammationes, primū lixiuū fouebimus, deinde emplastrum quoddam molliens ac discutiēs imponemus. Quale est hoc. Strigmēta feruefacta excolato ut pura fiant, & rursum in ollam mittito, & calcem uiuam uelut farinam tritā infarcito, ut lutosa cōpages medicamenti euadat, & utilior. Hoc uerò adhuc efficacius est pharmacum ex sycomoribus compositum.

*De tumoribus induratis.*

*Cap. III.*

Indurati tumores laxis opponuntur. Laxorū enim nota est, ut appressis digitis cedant & cauus locus fiat. Durorū uerò tumor pūtax est, & ad tactū renitēs, & ad sensus difficultatē inclināt, ut tandem hi loci in quib. est, sēsus exortes fiant, & ad ossis duritiā perueniant, & nullā oīno curationē admittant. Sed & pilli in ipsis oriri soliti, minimē nutriūtur, & exactē glabri fiūt. Duri itaq; tumores aliquādo statim ab initio cōsistūt ac augētur. Aliquādo uerò a medicis inducuntur, q̄ inflammationes ac erysipelata uehementer pfrigerantur ac adstrinxerūt, quū tamen trāfacto principio discussoria adhiberi debeāt. At uerò q̄ ex erysipelatis fiunt, cutis duritiā saltē præ se ferūt. Qui uerò ex inflammationib. succedunt, subiectas etiā carnes inuadūt, tanto pfundius quāto inflammationes erysipelatis sunt pfundiores. Inchoantibus ergo duritijs, & debile aliquē sensum adhuc habentibus, medicamenta emolliētia adhibebimus, quæ simul moderatē etiā discutiunt, & talia sanē sunt quæ & molliēdi ac diffundendi uim habēt. Nā quæ uehementer discutiunt, & sine molliēione statim euacuant, manifestē quidē tumorē imminuūt, reliquias uerò affectionis incurabiles efficiūt. Discussis enim tenuiorib. humoribus quod exactē terreū ac solidū est pūtaxiter resistit, quapropter in hūc usum medicamēta adhibēda sunt, quæ molliēdi simulq; discutiēdi uires habēt. Primū igitur molliētib. utemur, deinde ad discussoria pcedem⁹, eaq; molliētib. paulatim miscēbimus. Cōsiderādus tamē est & curādi corporis habit⁹, & affectionis status quantū processerit. Hęc uerò si rectē cōsideraueris, cōiecturalē qdē, non tamē penitus arte carētem, peritiā acquires. prima em̄ die statim molliētia adhibebis, altera deinde aut tertia trāfacta, facile intelliges an augere aut remittere medicamenti

uim oporteat, præstat autē tum ad hos usus, tū ad reliquos, si rectā curationē peragere uelimus, opposita medicamenta, ualidissima uidelicet ac mitissima, preparata adseruare, quod pro affectionū diuersitate, diuersæ mixturæ fieri possint. Ad duros itaq; tumores molliēdos caprinus bubulusq; adeps cōmodus est. At sicut taurinus ac hircinus ualidiores sunt, ita hōdinus ac uitulinus imbecilliores, & suillus debilissimus. Sed his omnibus præstat ad discutiendum, non autē molliēdū, leoninus, pātherinus, hyænæq; ac anseris. Gallinaceus autē inter suillū ac anserinum medius est. At inter medullas prima est ceruina, deinde uitulina. Cæterū resinæ odoris nō acris, his medicamētis ammixtæ uiscositatē exhibent, nec tamen molliēdi uim auferunt. Cōmodissima uerò omniū resinarū est terebinthina, quæ chia appellatur, & laticis resina, liquoris compage nihil ab illa differens. Deinceps uerò pinea & abietina. Verum sicciore, qualis est resina pinus arida, physēma priuatim appellata, nimīū siccant. Et propterea ad emolliētium medicamētōrū cōpositionē inutiles sunt, sed terebinthina ac laticina eligendæ. Pix quoq; Brutia quum eiusdē facultatis sit, in eisdē usus recipi potest, sed ardiore reprobamus, sicut etiā bitumen. Habet & mastiche chia uim emolliēdi, Aegyptia uerò mastiche nigra emollit qdē, sed magis siccant ac discutiūt. Thus insuper nō expers est facultatis molliēdi, itemq; fœni græci semē, hoc enim cōctū molliēre potest, quāthus quoq; in mollitorijs medicamētis paululum est coquendū. Eiusdē ordinis sunt & balneorū strigmēta, butyrū, althææ decoctū. Media uerò inter lenia & ualidissima propolis est. Validissima autē appello, ammoniacū thymiana, bdelliū, præsertim Scythiū resinofum, & colore nigricās: styracē maximē pallidū, qui calamites uocatur, flauum item ac pinguem. Galbanum enim & opopanax supra uim discussoriam, etiā molliunt. Verum galbanū molliendo, opopanax discutiendo præstat. Atque huiusmodi sanē molliētium medicamentorum materia est. Tu uerò libros adeptus medicamentarios, singulorum compositorum uires ex simplicibus expendes, quod uarias pro maioris ac minoris ratione ipsorum differentias cognoscas, & corporum simul ac affectionum differentias consideres, atq; ita fortia fortibus, & mitia debilibus adhibeas. Inter curandum autem affecta pars oleo calido foueatur, & glutinosa medicamenta apposita antequam sponte decendant, ne remoueantur: imò etiam si lauandus sit æger, omnino permittēda sunt. A balneis tamē medicatis abstinentiā cōsulo, præsertim quæ aluminis, aut sulphuris, aut æris qualitatem ammixtam habēt. Hęc enim huiusmodi affectibus aduersantur. Et hęc profectō sufficere possent ingeniosis, & in artis operibus aliquatenus exercitatis uiris. Verum quum non omnes tales sint, medicamēta quoq; usu & experimentis cognita explicare oportet, initio sumpto ab his quæ summā molliēdi uim obtinent, & paruis etiā inflammationibus commoda sunt, quæ aliqua duritia participāt. Horum autem simplicissimū est parhygrum appellatum, ex cerē, butyrī, & colophonæ æquis portionibus cōstans. Deinde quod Mnassæ, inscribitur, & reliqua eiusmodi. Item helladicū mollitoriū, & quod ex perna præparatur, & quod Lucio inscribitur, ad anchilopas & reliqua quæ paulo inferius in hoc Sermonē habentur.

*Tendinum*



*Tendinū ac ligamētōrū induratorū curatio, Cap. IIII.*  
 Tumorū equidē induratorū emolliō ac discussio prædictis medicamentis perficitur, quæ emolliētia appellatur. Quū uerō partes quedā natura rariores, quædā densiores sint, consequens est ut singula proprijs medicamentis priuatim opus habeāt. Quapropter ad tendines ac ligamenta præstabilius esse iudico, ut molliētibz medicamentis aliquid adiungatur, quod incidendi uires habeat, inter quæ præcipuū est acetum. Affecta itaq; parte cōmodis medicamentis præmolliata, huiusmodi fomentū sæpe habuit successum. Acerrimo aceto ignitum lapidē pyritē, si haberi potest, aut molarem, ex quo molas faciunt, restinguo. Deinde ad excipiendum substrati lapidis calidū uaporē ab asperso aceto emergentē, ligamētum siue tendinem induratum adhibere iubeo ac cōmouere. Hinc enim mirificē opē sentit. Et postea rursus medicamētum molliōrū impono, & paucis interpositis diebus, idē fōmētum rursus repeto. Sæpe enim in hac ligamēti aut tendinis admotione ac cōmotione, ita ab eleuato uapore duritiā resoluta est, ut res incatationi similis uideretur. In principio tamen affectam partem nō aqua, sed oleo plurimo quotidie largē perfundo. accipio autē oleum dulcissimū adstrictione penitus carens, in quo interdū foenū græcum, & altheę ac cucumeris syluestris radicē, uel alius cuius consimilis coquo. Vtor præterea aceto etiam ad alias partes, quæ iam diu medicamēta alia expertæ sunt. Scio enim esse quædā medicamēta ex aceto parata, quæ post molliētiū usum per integrū diem imponere soleo, deinde rursus molliētia adhibere, & paucis interpositis diebus, rursus ex aceto præparata imponere. uis enim aceti per interualla locis iā præmolliatis admota, crassos ac uiscosos humores incidit ac dissoluit, & hinc tales affectiones nō leuiter iuuat. Verū si quis adeo fortiter discutientibus plus æquo usus fuerit, præsertim in principio, tenuiores quidē humores discutiet, residuū uerō ad lapideam naturā mutatum, loco impactū persistet, supra hoc quod nimius etiā eorū pharmacorū usus, neruorū essētiā lædit. Quapropter neq; frequēter, neq; ab initio, neq; duobus cōsequēter diebus, medicamētis cū aceto preparatis, ad ligamētōrū ac tendinū duritiā, utēdū est. Lienis tamen partibus induratis, tutus & cōmodus ipsorum usus est. Et multi sanē indurato lienis tumori, ammoniacū thymīama cū aceto subactum adhibēt, & hoc solū sæpe ad splenis indurati curationē sufficit. Ego uerō etiā carnosarū partium musculis induratis, inter molliētia medicamēta, ammoniacum cū aceto adhibere soleo, & summā eius cōmoditatem depræhendo. At hoc etiā hic una tantum aut altera die adhibēdum est, & deinde ad molliētia reuertendū; et pluribus diebus interiectis rursus ad medicamētū ex aceto trāseundū, siue ammoniacum id sit, siue aliud quoddā emolliens cū aceto præparatū. Molliēs autē esse oportet, quod cū aceto paratur: siccatia enim primū quidē prodesse uidentur, sed residuum postea incurabile efficiunt. Proinde inter emolliētia frequēter hoc cataplasmate uti soleo. Altheę radicem tritā ac angustissimo cribro excretā, adipe excipio ac appono. est enim medicamētum ad huiusmodi affectiones efficax. Sit autem adeps anserinus, si haberi poterit: sin minus, gallinaceus. At si hic quoq; defuerit, suillo utemur. Sed

& maluæ agrestis ubique nascentis folia aliquo relato adipe subacta utiliter apponuntur, quæ si moderate fuerint cocta, crudis erunt præstantiora. Talia enim pharmaca locis iam præmolliis adhibita, citra mordacitatem ac tutō discutiunt.

*De strumis, Leonidæ.*

*Cap. v.*

Strumas appellant Græci choeradas, à porcis, in quorū gutture adenoſi quidam tumores reperiuntur, strumis similes. Alij à multiplici partu porcorū nomen desumptum putant. Sunt autem strumæ carnes subcandidæ, faciliē augescentes, in membrana contentæ, & in summa, glandulæ induratæ, quæ in collo, sub alis, ac inguinibus oriuntur, ubi glādulæ uasis substratæ sunt. Aliquando etiam, sed tamen rarō, ex carne eorundem locorum fiunt, quæ affinitate quadam ad strumarum naturam uertitur, & materiæ accessione augetur. Differunt strumæ inter se, magnitudine, natura, loco, ortu, multitudine, & uasorū complicatione. Magnitudine, quia aliæ paruæ, aliæ mediæ, aliæ magnæ, aliæ ingentes sunt. Natura, quoniam aliquæ mansuetæ, aliquæ malignæ cōperiuntur. Mansuetæ citra inflammationem, citra dolorem, moderatam duritiā habent. Neq; enim molles sunt uelut tubercula adiposa, Steatomata appellata, neq; duræ, sicut tumores indurati, sed mediā quandam tactus proprietatē habēt, & tumore cūscriptum, rotundum ac æqualem. Malignæ uerō strumæ inflammationes ac dolores pulsantes inducunt, & tumorem inæqualem præ se ferunt, in quo uasa prominent, & ad manuum cōtactum ac medicamentorum impositionē efferantur. Loco autem differunt, quoniam quædam in anteriore colli parte, quædam ab altera ipsius parte, quædam ab utraq; oriuntur. Quædam item statim sub cute superficiem habent, quædam circa magna ac nobilia uasa penitus insident. Ortū, quod quædam uelut eleuatæ, quædā insertæ oriuntur. Et eleuatæ quidem faciliē huc & illuc mouentur: insertæ uerō ad cōtactum renitentur. Multitudine, quia & una, & plures generantur. Vasorum complicatione, quædam enim uenas ac arterias implicatas habent, quædam omnino non habent: paruæ igitur strumæ facilius curantur quàm magnæ, & mansuetæ citius quàm inflammatæ. At uerō malignæ incurabiles sunt. Quum enim omnes huiusmodi strumæ canceratæ ac uasis refertæ sint, si eas per chirurgiam aggrediaris, sanguinis eruptio nis periculum imminet supra hoc quod penitus insidentes, rescindi nō possunt. Vasa enim nobilia, uenas, uidelicet iugulares & arterias carotidas appellatas, maligna struma uelut radices habet. Verū pro loci ratione superficialē facilius curatur quàm profundē, deinde & quæ in collo oriuntur facilius curantur quàm reliquæ. Vocales tamen neruos in his diligenter uitare oportet. Multi enī strumas circa asperā arteriam secantes, uocalibus neruis simul recidis, hominem de cætero uoce priuarunt. Nā supra nerui recisionē, uocalia instrumēta denudata, & inter curandū perfrigerata, uocis actionē amiserunt: pro multitudine uerō, certū est unā facilius quàm plures curari posse. Sicut quātū ad ortū attinet, lōgē citius curatur eleuatæ, q̄ insertæ. Optima porrō ac cōpendioſissima sanabilitū strumarū curatio sit per chirurgiā. Aegrū igitur prostratū decumbere oportet. Sedens enim faciliē animi deliquium incurret. postq; igitur decubuerit,



decubuerit, cruribus inter se cōpositis caput à ministro detineatur. Deinde cutis tumori incūbens, recta uel obliqua sectione incidatur. Sectio enim trāsuersa collo incōmoda est, quū uasa & nerui recta porrigantur. Neq; uno impetu tota cutis crassitudo dissectetur. nihil enim uiolentē fieri debet. Et in paruis quidē tumoribus simplex sectio fiat, in maioribus autē ad myrti folij figurā cutim rescindens, tum uasa paulatim denudata sepones, quæ quū naturali carne sint cādidiora, faciliē discernes, postea sectionis labia hamulis distendes, & pelliculas de struma tū manu, tum scalpello detrahes. Quod si incerta fuerit, attēte res peragenda est, ne per incuriam sanguinis eruptio fiat, atq; ea gratia unū tantum sectionis labiū hamulis distendatur, & ita sensim à connexis corporibus per scalpellū separetur. Et ubi ex una parte connexa fuerint disparata, in altera idē fiat. Deinde tota basis diligēter, propter neruos & uasa substrata rescetur. At in strumis circa alas ac inguina orris, sectio trāsuersa fit ob cutis reduplicationem, peracto opere si sanguis erumpat, medicamēta sanguinē sistentia supra relata adhibeantur. Sin minus, sectio thuris poliline expleatur, & linamenta indantur, & lana uino imbuta adalligetur, post die permisis ligamentis, locus uino, & oleo profūdatur, & hoc usq; ad tertiā aut quartā diem fiat. Deinde soluatur, & suppuratio procuretur, & curatio reliquis ulceribus communis fiat. Ad repurgādum autē, & incarnandū, ac cicatricem inducendā, theriaca efficacissima est. Cæterum inchoantes strumas, tum in pueris, tū his qui chirurgiam nō admittunt, medicamētis dissoluere ac discutere conabimur, & sanē curatio ipsarum similis est ei, quā ad induratos tumores paulō antē retulimus. Primū enim mollire, postea discutere oportet. Emplastrum ad strumas. Strigmēta à palæstræ parietibus derafa ac probē subacta, super linteolo extendito ac imposito. Aliud. Laser aut calcē uiuam cerato cyprino aut irino exceptā imposito. Aliud. Sulphuris & galbani æquales portiones resina excipito. Aut clibanī testā cum aceto terito, & uelut ceratum efficit. Aut corticem radicis mādragoræ cyprino aut irino cerato excipito. Hoc equidē efficacissimum est. Aliud, Strumas erodens. Sandarachā cum adipe caprino aut bubulo, aut calcē cū eodem imposito, aut nasturtiū cū cerato. Aliud. Succum cyrenaicū, aut si haberi non potest, laser cū melle atico ad cerati cōpagem illinito. Aliud, rumpēs strumas. Pumex cū aceto tritus strumas rumpit ac resiccatur. Aliud. Semē nasturtij & lomentū aqua subigito, & quotidie bis imposito. Et post eruptionē eodem usq; ad exactā sanitatē utitor. Aliud. Vrticē semen cum uino tritū, rūpit, repurgat, incarnat, & cicatricē inducit. Aliud. Grossos præsertim caprifici cū axūgia imposito. Omnē enim tumore discutit. Aliud. Recremētū ferri cum oleo, aut bdelliū cū melle, linteolo inducito, ac adhibeto. Et quinq; diebus transactis soluto, & spongiā locū foueto, cauens ne oleo inquinetur. Oportet autē bdelliū ad prunas cū melle subactū optimē distēdi, atq; ita applicari. Aliud. Psyllij, lomēti, feminis urticæ, pares portiones, pice liquida exripe ac utere. Aliud. Ostreorū testas ustas ac minutissimē tritas inspergito, loco prius usino ex ore consputo. Atq; hoc frequēter facito. Emplastra etiā adhibeantur, quæ paulō inferius descri-

bētur. At quod ex achate lapide præparatur, ad suppurandū, rumpendū, ac persanandū cōmodissimū est. Itē quod pardalis appellatur, superius ad hydropicos relatū. Strumis insuper laborātes uiperarū esu magnoperē iuuantur, quēadmodū de elephātiacis diximus. Itē si laser quotidie ieiuni ciceris magnitudine uorauerint. Alium etiā facile solubilem habere oportet, & tenui uictu uti, uomitūq; frequenter cedere, & pituitā per os detrahare, ac caput resiccare. Cataplasmata quoq; sincipiti adhibenda sunt, quæ mediocres pustulas excitare possunt, uelut est capparidis radix cum polenta, ac reliqua huiusmodi. Smegmatis item ac puluillis eiusdem facultatis utendum est.

De Bronchocela, hoc est, gutturis tumore. Cap. vi. Brōchocele appellatur tumor in gutture oriēs. Omnis enim tumor apud antiquos, cele nūcupatur. Nomē igitur cōmune est, sed species tumorū differūt. Quidam enim meliceris à melleo humore, quidā adiposus, quidā pultaceus, quidam canceratus appellatur. Aliquando etiā propter localē uasorum dilatationē oritur, quomodo frequentissimē ex partu cōtingit, quum in uehementissimis doloribus puerpera spiritū uiolenter detinuerit, cōstatq; uasorū huius loci dilatationē incurabilem esse, quēadmodum etiā tumorem in scirrhum induratum, malignūq; ac magnitudine ingentē. Verū reliqui omnes chirurgiæ ac medicamētis cedentes facile sanātur. Chirurgia uero præsentī tumori cōueniens fit, siue meliceris, siue adiposus, siue pultaceus tumor fuerit. At uerō quæ gutturis tumores discutunt, sunt bdellium cū melle tritum, calx cum axungia, laser cum sulphure, lixiuium cum melle, stercus caninū cum aceto. Aliud. Calcem uiuā, ammoniacū, bdellium, testam clibanī ustam, æruginē, sulphur uiuum, paribus portionibus cū aceto terito, & axungia aut terebinthina excipito ac imposito. Aliud, Adamāthij. Gallarū un. i. lapidis pyritæ drac. iiii. pyrethri drac. ii. nitri drac. i. silphij sesquidrachmā, sandarachæ dra. ii. terebinthinæ dra. ii. ceræ, picis, singul. drach. tres, axungię ueteris drach. ii. aluminis liquidī unc. i. Arida e uino ac sapa terito, & liquabilia liquefacta ammisceto, ac utitor. Aliud. Spumæ argenti, æris usti, singulorum drac. viii. olei antiqui drac. centū, resinæ pinus drac. xl. galbani, ammoniaci thymiamatis, singulorū unc. i. aluminis scissilis, mannæ thuris, sing. drac. iiii. oleum cum spuma argēti coquito, & medio cocturæ tempore æs tritum inspergito, & bullire finito donec non amplius inquinent. Deinde liquabilia liquata adijcito, & ab igne sublatis pollinē thuris ac alumen ammisceto, ac utitor. Aliud. Silphij, similaginis, singulorum drac. viii. calcis uiuæ drach. xvi. sandarachæ dra. xii. mellis quantū satis est, præpara ac utere. Ad laxos autē tumores qui sub mēto oriuntur, iridem illyricam cum aqua tritam, adiecta modica rubrica, ter singulis diebus illinito. Est enim medicamentum insigne.

De pultacei ac mellei humoris tumoribus, Leonide. Cap. vii.

Atheroma est tumor cōcolor, citra dolorem, in tunica neruosa, humore pulticulē similē, quæ ex farina cocta fit, & athera Græcis appellatur, cōtinēs. Aliquādo autē unā cum pultaceo humore, lapidosa quædā duraq; corpuscula, & alia tanquā sulphuris ramēra reperiuntur. Aliquādo uelut māsā gallinarū ossicula.

Inueni



Inuenimus etiā aliquādo uelut pilos crassissimo humori cōplicatos. Philoxenus autē dicit se aliquando reperisse animalia in humore, culicibus aut muscis paruis similia. Est autē atheromatis tumor specie & figura oblōgus, sublatūque, & ad compressiōem digitorū, ob humoris crassitudinē, tardē cedens, & amoris digitis tarde reuertēs. Meliceris autē est pellicula neruosa tenui humore instar mellis referta, similiter citra dolorē consistens, differens ab Atheromate figura, & humoris essentia. Nā & figura rotundior est, & humoris essentia tenuior. Et huius tumor magis extēditur, & ad digitorū cōpressiōnē celerius cedit, & amoris digitis pari celeritate reuertitur. Cæterū p chirurgiæ ratione nihil refert, siue pultaceus, siue melleus, siue feculentus humor, aut cuiuscunq; essentia fuerit cōtētus. Vnus enim scopus propositus est, ut tunica siue pellicula humorē continens auferatur. Sed id considerandū est, quod tumores quidam sunt eleuati, & ad motum ac contactū expositi, facileque curabiles. Quidā contrā inserti, & ad motū nō expositi, & in chirurgiæ aggressiōne summā diligentia expetentes, propter imminentes sanguinis eruptiones ac neruorū puncturas. Pleriq; enim chirurgi ob imperitiā etiam neruos substratos cum huiusmodi tumoribus recidūt. Chirurgiam itaque aggressuri, ægrum in sella locabimus. Et si paruus fuerit tumor, simplicem sectionem faciemus, uelut in strumis diximus. Si uerò maior, ad myrtei folij figurā pro tumoris ratione, cutē incumbētē rescindemus. Sed neq; hic uno impetu tota sectio fiat, ne pellicula humorē cōtinens disseccetur, & humor euacuetur. Si enim euacuatus fuerit, & tumor cōciderit, tunica difficulter excoriari ac curari poterit. Summa itaq; diligentia pellicula paulatim excorianda est, nihilq; de ipsa circa basim relinquendū, ne malū regeneretur. Post ablata pelliculā, labia sectionis cōmittimus, & si plus æquo laxa fuerint, redundantē cutem rescamus, deinde suturis labia cōnectimus. Illud porro animaduersione dignū est, ut si in capite huiusmodi tumor fuerit, post ablata pelliculā, membranam os ambientē secemus, & caluariam diligenter deradamus. Peracto opere in paruis tumoribus, quū paruam sectionē fecerimus, nulla difficultas imminet, & statim post futurā, splenium glutinatoriū inflammationibus arcēdis idoneum adhibemus. Qui uerò adhuc cruenti sunt, & glutinari non possunt, in his ex maioribus interuallis futuras fieri oportet, ut oblōga sectionis figura fiat; deinde linamēta indere, & puri generationi studere, quemadmodū superius de abscessibus docuimus. At uerò ad eos qui chirurgiā recusant, medicamētis tumorē discutientibus utemur. Emplastrū ad Meliceridas, passarū uuarū uinaceis exēptis lib. i. cumini leuissimē triti sexūcem, nitri quadrātem. Omnia simul in mortario subacta adhibeto, acadalligato. At si tēSIONES ex cōstriCTIONE remittere oportet, cerato excipito, ex oleo sicyonio & pauca mastiche præparato. Aliud ad meliceridas, & ceria, id est, fauos appellatos tumores, commodū. Squamā æris & pollinē paribus portionib. ad malagmatis formā subigito ac adhibeto. Aliud, ad meliceridas & steatomata. Cerae, terebinthinæ, squamæ æris, sing. sextāte, sulphuris uisui, nitri, sing. unc. i. radicū siccarū cannabis syluestris dra. x x x v. Et si defuerint, Aristolochiæ tantundē, olei antiqui

lib. i. Radices per triduum aqua madefactas & confusas in oleo coquito, donec torrefiant. Deinde ipsis abiectis, cætera quæ liquari debēt liquata ammisce-to, & arida ex aceto trita adijcito, ac utitor. Aliud discussoriū ad Meliceridas. Salis ammoniaci, spumæ argēti, cerussæ, sing. lib. i. ceræ, terebinthinæ, galbani, opopanacis, sing. unc. i. rubricæ sinoplicæ sexuncem, aceti heminā, olei antiqui lib. iiii. Spumā argēti, cerussā, & sal leuissimē trita in oleo coquito, deinde rubricā aceto tritā adijcito, & liquabilia liquata affundito, omnibusq; simul subactis ac perfrigeratis opopanacē ac galbanū aceto dissoluta ammisce-to ac utitor. Aliud ex asellis paratū, ad strumas, & meliceridas, quod etiā cicatricē inducit. Asellos sub hydrijs stabulātes ducētos, ostreorum ustorū drac. iiii. rubricæ sinoplicæ drac. viii. terebinthinæ lib. i. ostrea & rubricā primum seorsim, deinde simul terito, & tū asellos adhuc uiuos adijcito, ac simul terito, & postea cum terebinthina ad calidū cinerē lente coquito, donec non amplius inquinet. Sublatūq; ab igne medicamētum in mortario subigito, ac adhibeto, & quinta die exoluito, potest tamen locus subinde prolui ac rigari aceto.

*De steatomatibus, hoc est, tumoribus adiposis.*

*Cap. viii.*

Steatoma est tumor præter naturā, adipē in se cōtinens, mole cōcolor, & tactu lenis, & in principio quidem pusillus, sed tēporis progressu ampliatur, pleraq; uerò steatomata basim habēt ampliorē, raroq; contingit, ut basis angustior, & apex amplior reperiat. Differt à struma, tactus mollitudine, qua nota etiā à meliceride & atheromate discernitur. Curatur & hic p chirurgiā, sectione p tumoris magnitudine fiēte, simplici aut ad myrtei folij similitudinē, atq; hic libere cutim incidimus. Nō enim sicut in atheromate ac meliceride tunicæ sectionē formidamus. Nā pinguedo adiposa etiā si secetur, non effluet. Verū illud negligendū non est, quod in strumis quoq; prædiximus: si steatoma eleuatū fuerit, in circuitu & subter excoriari oportere. In circuitu per scalpellū, subter uerò, digitis. Insertū uerò in ambitu & subter incidendū esse, peracto opere uulneris labia futuris cōstringātur, ut melius glutinētur. Aut linamēta profunda indantur, & curatio ad puris generationē adhibeatur. At uerò si steatomata apicem amplum, & basim angustam habuerint, missis superuacuis, tota à basi rescindemus. Hic enim chirurgiæ modus expeditissimus est, & ulcus parū ac planum fiet, & curatio cōpendio transigetur. Cæterum steatomata discutiūtur, floribus buphthalmi, cera & oleo antiquo exceptis. Idem facit & cyclamini radix axungia ueteri excepta, possunt & emplastra ad meliceridas præscripta adhiberi, præsertim quod ex sulphure & nitro paratur, & similia inferius referēda.

*De ganglio, Philagrii.*

*Cap. ix.*

Gangliū est nerui nodosa coactio ac tumor, ex plaga aut labore obortus, raroq; spōte proueniēs, manū iuncturas, ac talos frequētius occupans, rarius cubitū & caput. Fit & in alijs partibus. Quantū ad notas attinet, tumor est inæqualis, paruus, dū cōprimatur, stupidum sensum exhibēs. Differtq; à meliceride & atheromate tumoris inæqualitate & renisu, & quod nō orbiculatim uelut illa trāsferitur, sed dextrorsum solū ac sinistrorsum pro nerui situ flectitur. Ceterū à

*gangliorum*



gangliorum chirurgia abstinemus, praesertim si in manibus fuerint ac pedibus, & medicamentis tantum curamus. Ad hanc rem ammoniacum iuxta ignem ad emplastri copagem emollitum imponitur, & lamina plumbum tumori aequalis supponitur, & ne hinc & inde labet, arctis uinculis media costringitur. Transactis aliquot diebus ubi ganglium fuerit emollitum, nulla rei mentione ad aegrum facta, statim dum adhuc calet locus, uincula tollimus, & pollicem dextrae manus ganglio immittimus, ac reliquos quatuor digitos ipsi parti injectos comprimimus, & ganglium coestim dissolvitur. Vtere etiam mollitorijs emplastris, praesertim eo quod ex psyllio, pice, masticha nigra, stercore columbino, & malua sylvestri preparatur. Vtere & Lucij malagmatis ad contractos articulos descriptis. Commodum est etiam hoc. Cerussae, olei antiqui, resinae pinus, sing. lib. i. cerae sextantem, ammoniaci thymiamatis, galbani, sing. unc. i. Cerussam cum oleo coquarot, donec non amplius inquinet: deinde ammoniacum tritum, postea resinam & cera. Postremum galbanum praemollitum adjecto. Alij resinae quincuncem, cerae autem trientem coniungunt.

*De uasorum dilatatione.*

*Cap. x.*

Vasorum dilatatio, quam aneurysma Graeci uocant, in qualibet corporis parte fit, sed in gutture frequentius, ubi tumor branchocela appellatum producit. Accidit saepissime mulieribus in partu, propter uiolentam spiritus detentionem. Sed & in capite circa arteriarum locos, & in reliquo corpore, ubi arteriae uulnerantur. Sicut quando imperiti medici uenam cubiti secturi, simul subiectam arteriam dissecant. Oritur autem omnino uasorum dilatatio, aut dum sanguis & spiritus ex arterijs persulcant, aut dum oscula ipsarum aperiuntur, aut dum rumpuntur. Sanguis autem & spiritus paulatim excreti sub cute colliguntur. Notae aneurysmatis sunt, tumor paruus, aut magnus, concolor, citra dolorem, ad tactum mollis, spongiosam laxitatem praeferens. Et ita ad digitorum compressionem cedens, ut promodum euanescere uideatur, uerum amoris digitis citissime reuertens, id quod in menti aneurysmate, & reliquis quae sine uulnere fiunt, praecipue uidere datur. At ubi arteriae uulnus praecessit, & deinde coalescente cute uasorum dilatatio accessit, tumor non similiter mollis occurrit. Sanguis enim copiosior spiritu est, qui in grumos coit, & tumorem extendit. Atque haec quidem sunt notae. Quantum uero ad curationem attinet, sciendum deplorata esse aneurysmata apud chirurgos, quae gutturi aut capiti accidunt. Simul enim cum aneurysmatis sectione, abundantissima sanguinis eruptio contingit, cum qua etiam uitalis spiritus simul erumpit, ut homo saepe in medicorum manibus deficiat. At uero quod in cubiti cauitate fit aneurysma, hoc modo per chirurgiam aggredimur. Primum arteriam superne, ab ala ad cubitum, per internam brachij partem delatam signamus: Deinde in eadem interna brachij parte simplicem sectionem, tribus aut quatuor digitis infra alam, per longitudinem facimus, ubi maxime ad tactum arteria occurrit, atque ea paulatim denudata, deinceps incumbens corpuscula sensim exoriamus ac separamus, & ipsam arteriam caeco uncino attractam, duobus filii uinculis probe adstringimus, mediamque inter duo uincula dissecamus, & sectionem polline thuris explemus, ac linamentis inditis congruas deligationes adhibemus. Postea uero tumorem in cubiti cauitate siue flexura, securi secamus, nihil amplius ue-

rentes sanguinis eruptionem. Tunc grumis euacuat, arteriam unde sanguis prodit perquirimus, & repletam uncino attractam sicut priorem costringimus ac dissecamus, rursusque thuris polline sectione expleta, puris generationem procuramus. Caeterum ad gutturis aneurysmata, emplastrum e cupresso inferius inter discussoria medicamenta describendum commode adhibetur.

*De cerijs, hoc est, fauis.*

*Cap. xi.*

Cerium tumor est ulceratus, incumbens cutem perrodens, ita ut ex foraminibus melleus humor excernatur: quapropter tumore ob foraminum figuram, tum propter excreti humoris speciem, cerium, hoc est, fauus appellatur, frequenter autem in musculosis locis, in articulis, & plantis pedum oritur. Saepem etiam sextam colli uerterem occupat, & aliquando etiam costas inuadit. Si uero in capite generatur, primum reliquis partibus, deinde caluae etiam putredinem transmittit. Proinde in principio subscriptionis medicamentis curationem tentabimus. Quibus superatis partes corruptas praesertim in capite resecare oportet, deinde membrana caluam ambiente dissecta, os caluae deradere, tum ferreis cauterijs labia sectionis exurere, ita ut caluam ne attingamus, id quod etiam in alijs diuturnis affectionibus fieri debet. Postea medicamenta ad nomas descripta adhibenda sunt. Quale est siccum ex charta uista preparatum, & pastillus e lana succida, ac reliqua huiusmodi. Lenticulam quoque coctam, cum malicorio aut oliuae folijs imponemus. Sedata autem noma, curatio reliquis ulceribus communis fiat. At uero incipientibus fauis commoda haec sunt. Sulphur & ordeum farinam aqua mulla coctam imponito: aut adipis suilli, terebinthinae, & mellis pares portiones ad congruam compagem coctas adhibeto. At ubi aperti fuerint, sulphure uiuo cum pice liquida utitor. Aut erui farinam cum melle impone. Aut squame aeris, pollinis thuris, passerum uuarum, pares portiones simul tritas adhibe. Ad ampliores autem fauos ficus probe tritas apponito. Ego uero lenticulam coctam, cum malicorio, ac melle subactam imponere soleo, & si inflammatio adsit, modicum panis adjecto. Sedata uero inflammatione, malagma Helladicum, aut emplastrum melinum Serapionis, aut Pasionis, aut Venus appellatum, adhibeo. Molliora autem adhibenda medicamenta esse oportet, propter molestias ex duris oborientes. Si itaque durius fuerit, cum oleo emolliendum erit.

*Emplastra ad cruenta uulnera glutinanda, et ad multos usus commoda.*

*Cap. xii.*

Atractylis, quam aliqui Androsamon uocant, herba est aculeata, humorem sanguineum reddens, si folia eius comprimantur. Hanc radicem euulsam & in umbra siccata terito, & angustissimo cribro excernito, & de ea accipito trientem, colophoniam sesquialteram, olei dulcis trientem, aeruginis sextantem, cerae bessentem. Oleum, ceram, & colophoniam liquefacto & excolato, deinde aeruginem, & postea herbam tritam ac cribratam adjecto, tum omnia simul in frigida aqua coacta manibus subigito, & in eadem frigida per totam noctem finito, ac deinceps ad cruenta uulnera in quacunque corporis parte reposito, siue in infantibus, siue in adultis fuerint. Facit & ad ulcera antiqua, sectiones, ictus, sugillata, & ex frigore dolores. Exerit crustas & caetera quae in ulceribus difficulter repurgantur. Lepras item ac uirilgines curat. Etenim femur cuiusdam ense dissectum, ita ut uulnus usque ad inguē penitissimè progrediretur, quum per quatuor menses aeger decubisset, neque glutinationis initium appareret, hoc ego medicamento agglutina-



glutinaui. Tibiam præterea alterius à poplite usque ad talum uulneratâ, inflammatione prius mitigata, cū cataplasmate ex lomento passo, uino mulso, & rosaceo, intra paucos dies persanauit. Ego uerò inquit Philagrius, cum Iside emplastro antiquos sinus, nō inflāmatos, & repurgatos, ac uino mulso elotos, ad uires uidelicet excitandas, feliciter curauit. Illud uerò constat, fistularū sinuumq; ligamēta, à superioribus partibus ad inferiores moderata cōstrictione ducenda esse, quō humores in cauitatibus delitescētes, ad osculum ulceris exprimantur. Viride Andromachi hecatōtodrachmō uocatū. Ammoniaci thymiamatis drac. viii. squamæ æris drac. xii. pollinis thuris drac. xvi. resinæ pinus drac. xii. adipis uituli drach. xiiii. terebinthinæ drach. viii. ceræ drac. xxx. olei drac. viii. acetī quātum satis est. Hoc magna uulnera glutinat, sordida ulcera extergit, crassaq; ipsorū labia deterit, sinus contrahit, discussoriā ac repulso-riam uim habet. Et cū ceratō linamentis illitū ac inditum caua ulcera incarnat. Viride quod Isis appellatur, à quibusdam Hermoni sacerdoti inscriptum. Hoc ad multos usus cōmodat, & ad omnia uulnera, præcipue capitis unā cum ossibus dissectis. Sanat enim citra destructionē ac perforationē: facit etiā ad puncturas, aculeos infixos, hominū ac canum morsus. Ad uiperæ itē ac scorpionis, draconisq; marini ac pastinacæ uenena. Et ad artuū fracturas cum uulnere, citius enim ac securius callū obducit, facit ad fistulas omnes recentes, & antiquos ipsarū recessus, sinus, tubercula, parotidas, mammarumq; ac alarū abscessus, aut ut ne fiant, aut ut facti curētur, cōmodum saniei effluxum nobis procurantibus. Idē strumas aufert cum tunicis celerrimē suppurans: fronti uerò impositum fluxiones oculorum sistit. Liures delet, gangrænas obliterat, putredines repurgat. Et in summa efficax est medicamentū ad omnia. Ceræ drach. centū, colophonix drac. ducentas, aliq; centum, squamæ æris rubri, eruginis rasæ, aristolochiæ rotundæ, thuris, salis ammoniaci, thymiamatis, æris uisti, singul. drac. viii. aluminis uisti dra. vi. aloës, myrrhæ, galbani, singul. drach. xii. olei antiqui lib. i. uel sexuncē, acetī quātum satis est. Atq; hoc quidē emplastrum absolutē Isis appellatur. Verūm Isis quæ Epigono inscribitur, etiā radicis dracūculi dra. viii. recipit: qua Galenus se uti dicit. Sola enim dracūculi radix per se tusa ac probē trita ad puluilli formam, maligna ulcera curat. Metallica igitur cum aceto in mortario terito, & deinde reliqua trita ac cribrata adijcto, & liquabilia liquata ad ipsa in mortarium affundito, subigito, ac unito, & uitor aliquando puro, aliquando mixto ac dissoluto. Ad ulcera enim sordida adhibetur medicamenti pars una, cerati uerò rosacet liquidī partes duæ. Verūm ad ea quæ modica extersione opus habent, medicamenti pars una, cerati partibus tribus ammiscetur. Emplastrum Machæionis celebre, & ad multa cōmodum. Congruit ad relata omnia. Sed & recēta uulnera glutinat, & ab inflammatione tutatur, & præsertim quæ cōtusa sunt, facit & ad canis rabidi morsum spatiofiore loco impositum, & asidue permutatū, facit ad omnē nomen ac ulcera depascētia, & ad auriū ac pendendorū ulcera. In ossibus autē denudatis carnē auget. Cōpetit & nariū ulceribus. Diluitur autē rosaceo. Aristolochiæ rotundæ, galbani, æruginis rasæ,

opopanacis, iridis illyricæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, singul. drac. viii. terebinthinæ, ceræ, olei omphacini, singulorū septūcē, & uncia dimidiū. Olei dimidium cū ærugine terito, & reliquū cū cera ac terebinthina coquito, opopanacē aurē cum aceto dissoluit, & simul subigito omnia, ac unito. Emplastrū Cephalicū ex herbis, sine perforatione: squamas disparat, & ossa corrupta educit. Verū ossibus præralis adhibere oportet. Idē ad recēta uulnera facit, & nomas linamētis indita repurgat. Cū rosaceo uerò cerato replet, una eius parte, ad duas cerati ammixta, facit & ad carcinomata ac putrida ulcera. Exterit lepras, furunculos dissoluit, strumas suppurat, & expurgat, cōuenit podagricis, & tophaceas ipsorum duritias dissoluit. Anagallidis cæruleum florē habētis, papaueris corniculati, foliorū tenerorū hyoscyami, marrubij uiridis, singulorum drachm. lvi. squamæ æris rubri drach. xxv. mannæ thuris drac. xx. resinæ pinus siccæ drach. xvi. aloës drachm. vi. aluminis scissi, & rotundi, ammoniaci thymiamatis, salis ammoniaci, singulorum drachm. iiii. ceræ drachm. centum, olei ueteris heminas duas, siue uncias xxiiii. acetī quantum satis est. Herbarum folia in pila leuiter tundito, ut succus nō exprimatur, deinde in mortarium coniecta minutissime terito. Et in alio mortario, squamā, pollinē thuris, resinam pinus, alumen, aloën, salem, & ammoniacum thymiamata, ad solē ad strigmentitiā spissitudinē cum aceto terito, & ammixtis herbis, omnia simul terito. Liquabilia deinde liquata frigefactaq; ac erasa adijcto, subigitoq; simul ac uitor. Emplastrum Hestia, id est, Vesta appellatum, quod etiā ex Græci nominis ἱστία literarum calculo, drachmarū dxvi. inscribitur, & ad Nechephonē regē refertur. Conducit ad omne uulnerū genus. Ad neruorū puncturas per se sufficit, omnē oculorum destillationē pro glutinamento appositū reprimit. Venenū uirus eiactantiū bestiarū exugit, ita ut emplastro adhærens cōperiat. Nomas itē & fistulas ac ulcera maligna repurgat, & ad cicatricē perducit. Nariū ozænas sanat cū aceto, facit & ad strumas, & tumores induratos. Aut enim discutit ipsos, aut rūpit, ut admireris. Varices sanat, sagittas & aculeos extrahit. Spumæ argenti, ceræ, singulorū drach. lxxiiii. terebinthinæ dra. xvi. Aristolochiæ, propolis, galbani, singulorū dra. xx. æruginis dra. x. gallarū, radicis chamæleonis nigri, singul. drac. xiiii. olei sextar. iiii. adipis uitulini dra. xlviii. acetī dra. xiiii. succi brasicæ dra. viii. serapiadis tritesticularis dra. xvi. succi medullæ arundinū dra. xii. oleū, spumā argēti, & adipē simul coquito, donec probē uniatur. Deinde cerā, resinā, galbanū, propolim prius cū modica cera in mortario tusalū adijcto, & ab igne ablati, aristolochiā, gallā, radicem chamæleonis addito. Aeruginē uerò cū succis & aceto tritā reliquis, ubi iā tepuerint, postremum ammisceto, omniaq; simul in mortariū cōiecta subigito ac manibus emollito. Et utere tanq; admirādo. Aliud ad cruēta uulnera glutināda, purpura inscriptū. Spumæ argēti, olei dulcis, sing. lib. ii. picis, ceræ, colophonix, sing. unc. xvi. radicis symphyti minutissime tritæ ac cribratæ sextātem, sanguinis draconis sextātem, aquæ marinæ un. xx. oleum, spumā argēti, & aquam marinā simul coquito, donec nō amplius inquinēt. Deinde liqua-



bilis liquefacta adijcitur, & ab igne ablatis draconis sanguine ac symphytum addito, & perfrigerata manibus subigito, ac in massas efformato. Cæterum sanguis draconis in India ex herba dracunculo appellata colligitur. Phœnicinum, Galeni. Spumæ argenti leuissimè trite libras tres, adipis suilli insulsi, antiqui, libras duas, olei antiquissimi libras tres, chalcitidis crudæ trientem. Spumam argenti tritam, ac cribratam, rursus cum chalcitide in mortario exquisitissime conteres. Deinde oleum in sole ammiscabis, ut liquidum medicamentum permaneat. Tum adipem exëptis fibris in mortario tusum, quod facile liquefaciat, ad ignem liquefacito, & excolato, donec purissimus euadat. Atque eius ita præparati lib. ii. in mortario diligenter cum cæteris permisceto. Deinde omnia simul in cacabum transfusa coquito, ac palmæ ligno agitato. Sufficiet autem tibi ramus unus magnus, ut crassiore eius parte ad agitationem spatulæ uice utaris. Adherentes autem crassæ eius parti ramulos utrinque exortos resecabis, & corticem detrahes, & in tenues partes cōcisos in medicamentum cōijcies, ut ibi succus ipsorum excoquatur. Hæc uero segmenta palmæ, cum demum inijcies, ubi medicamentum cerato simile cōpagæ habuerit. Si enim à principio inieceris, succus per decoctionem cōsumetur, quæ ob uim adstrictoriā permanere uolumus. Sed & ipsius spatulæ qua pharmacum uersatur pars infima in coctura arefacta, resecanda, ac abijcienda est, ac residua utendum, atque hoc sæpe faciendum est, ubi fuerit resiccata. Vbi uero pharmacum non amplius inquinabit, priusquam exarescat, ab igne tollatur, & exemptis omnibus rami segmentis agitetur, donec frigeat. Deinde in mortarium trāslatum, ac manibus subactum, in massam redigatur. Hoc ad cruenta uulnera, & ulcera ægre cicatricem accipientia utimur, & oleo dilutum in sinus fundimus. Cōuenit partibus omnibus inflāmatis, & podagris, quo tempore dolores non uehementer urgent, & irrigationibus ac fomentis mitigantibus opus est: facit ad inguinum tumores, tubercula, ambusta, perñiones, cōtusa, fracta, & omnes fluidas affectiones. At uero si chalcitidis sexuncæ inieceris, longè efficacius fiet ad ampla uulnera glutinanda, & ad cicatricem inducendam. Sed non ita inflāmatis conueniet. In dissoluendo uero pharmaco, hanc proportionem seruabis, ut medicamentum paululum olei quantitatem excedat, præsertim æstatis tempore, ut sit medicamenti quidam dextans, olei uero dodrās. Emplastrum duplicis coloris. Aeris uisti quadrātem, aluminis scissi unc. i. colophonis, adipis suilli recentis, ceræ, singulorum lib. i. aceti quantum satis est. Emplastrum ex aqua & oleo, Spumæ argenti, olei sinceris, aquæ puræ, singulorum lib. ii. Argenti spumam cum oleo, & aqua in mortario exquisitissime terito, deinde ad prunas assidue uersata coquito, donec non amplius inquinent. Hoc moderate refrigerat, & ideo partibus ulceratis nihil influere sinis, & quod iam influxit, repellit. Desiccatur etiam ac discutit, & ulcera ad cicatricem perducit. Utimur eo ad mulierum, infantium, eunuchorum, ac cætera corpora, quæ molles ac albas carnes habent. Efficitur autem adeo glutinosum, ut ne ablutum quidē detergi possit. Sed ulceribus cicatrice includendis præcipue cōmodum est, ut adhibitu multis diebus adhæreat. Cuius facultatis est, & parhygrum appellatum, & reliqua huiusmodi. Emplastrum ex uino & oleo.

Spumæ argenti lib. i. uini & olei, singulorum lib. ii. Spumam argenti in mortario sub caniculæ ardore per dies quindecim cum uino antiquo dulci terito, tantum uini instillando, quantum exiccare potest, & post prædictos dies oleum ac uinum affundito, & coquito simul assidue agitando, donec non amplius inquinetur, & utitor. Hoc ego medicamentum oleo dilutum ad ulceratas affectiones adhibui, & sinus glutinaui. Et femur diu induratum perfraxi, & optimum etiam ad uulnera cruenta cognoui. Ad sinus uero & duritias solidum, prout habet, imposui. Emplastrum ex aceto & oleo. Spumæ argenti libram i. olei antiquissimi libras tres, aceti albi acerrimi libras tres, Ad lentum ignem assidue uersatu coquito, obseruas ne in grumos cōcant, & per integrum diem ebullire sinis, donec nigrescat, ac splendeat medicamentum. Enitendum est autem ut reuera non inquinet, facile enim imperitis imponit. Nam in frigidā aquam diffusum, durissimum statim euadit. Sed postea diutius subactum remollescit, læguetque ac rursus inquinat: proinde non prius ab igne remouebis, donec cōpertum habueris, non amplius inquinaturum. Habet hoc summas exiccandi uires, & ideo cruenta uulnera glutinat. Ulcera curatu difficilia, & fistulas incipientes sanat. Ego enim cum eo fistulam pueri à parotide exortam sanavi, quæ semestris existens usque ad mandibulæ articulationem progressa fuerat. Sed & mulieres & adolescentulos eodē curauimus, & induratos musculos emolliuimus. Tribus autem diebus trāsactis soluere hoc oportet, & nouum adhibere, idque rursus post triduum exoluere. Emplastrum Galeni fuluum, Harmonia appellatum, supra ad maligna ulcera descripsimus. Emplastrum fuluum Piscatoris, ad cruenta uulnera, sinus glutinat, inflammationes sedat, duritias ac strumas discutit, plurimo rosacco dilutum caua ulcera replet, sordida extergit, & ad cicatricem perducit. Spumæ argenti sesquilib. ceræ lib. ii. galbani, cæsyphi, terebinthinæ, propolis, pollinis thuris, rubricæ, singul. sextantē, olei lib. ii. aceti lib. iii. Spumam argenti ad æstiuum solē cum aceto terito, quantum imbibere potest. Deinde oleo ac reliquo aceto affusis simul coquito, donec non amplius inquinent, tum liquabilia liquata & excolata inijcitur, & postea ab igne ablatis pollinē thuris, rubricæ, ac galbanum ex aceto trium adijcitur, omniaque simul subigito. Et demum frige facta ac erasa manibus mollito, ac utitor. Hoc ad sinus glutinandos efficacissimum est, ita ut spōgia ex uino expressa superimponatur. Aliud fuluum piscatoris, facit ad cruenta uulnera, & cōcisos neruos. Itē ad antiqua ægre recipientia cicatricem ac fluida ulcera, probè etiā emollit, præsertim duritias circa mamas exortas. Utimur eo & ad hominum & canum morsus. Egregiè facit & ad pastinacarum marinarum, & draconum, & aliorum horrendorum piscium plagas. Et in summa est cōpositio admiranda. Spumæ argenti, ceræ, singul. drac. cētum, terebinthinæ, mannæ thuris, galbani, rubricæ sinopice, singul. drac. viii. olei lib. ii. præpara sicut diximus, absque tamen aceto. Aliud piscatoris celebre. Spumæ argenti, ceræ, sing. drac. c. terebinthinæ, myrrhæ, minij sinopidis, æruginis rasæ, squamæ æris, sing. drac. viii. aristolochiæ drac. viii. thuris drac. x x v. diphrygiæ drac. vi. ammoniaci thymiamatis, galbani, sing. drac. xii. olei lib. ii. Aliud Tyrium. Ad ampla uulnera & qua



& quadrupedū morsus, surūculos discutit aut rum-  
pit, humorē ex crustis inductis extrahit, & ad cic-  
atricē ducit, fronti impositū oculorū fluxiones repri-  
mit. Hoc post cocturā purpuræ tyriæ colorē habet,  
atq; hinc appellationē traxit. Spumæ argēti, libr. v.  
æris usti, squamæ æris, æruginis, galbani, sing. trien-  
tē, ceræ lib. ii. resinæ pinus pinguis lib. iiii. olei lib.  
vi. Spumā argēti, & oleū in mortario simul probè  
trita, in ollā coniecta coquito, & assidue uersato, do-  
nec mellis cōpagem acquirāt. Deinde adiecta ærugi-  
ne, & squama ebullire finito, & postea æs ustū ad-  
dito, & simul coquito, donec bonus color euadat,  
& nō amplius inquinēt: tunc cerā, ac resinā excolata  
adijcto, ac rursus coquito donec non inquinent, &  
postremū ab igne ablati galbanū ammisceto, ma-  
nibusq; probè subigito, ac utitor. Emplastrū ex ane-  
mona. Colophonix drac. lxxiiii. resinæ pinus li-  
quidæ, ceræ singul. trientē, olei dodrantē, florū ane-  
mones recētium, exēpto nigro quod in eis reperit-  
tur, & recisis unguibus bessem. Colophoniam cum  
oleo ad lignorum pini ignē coquito, & tēdacea spa-  
thula usq; ad solidā compagē agitato, deinde resinā  
adijcto ac rursus coquito, donec nō amplius inqui-  
nent, & postea cerā addito, qua liquefacta medica-  
mētum ab igne tollito, & ad flores in mortario tri-  
tas diffundito, manibusq; oleo illitis subigito: est e-  
nim glutinosum. Aquā autē uisitare oportet, facit ad  
cruēta uulnera, & carnes contusas, ad maligna anti-  
qua exuberantia ac ægre cicatricē admittentia ulcera.  
Aduenenū eiaculatiū bestiarū ictus. Ad tumidos, in-  
flāmatos, dolētes ac egre mobiles articulos. Ad stru-  
mas, fistulas, gāglia, steatomata, surūculos, sinus, no-  
mas, abscessus cū aliarum partiū, tum maximē tho-  
racis. Ad eruptionē sanguinis nariū, spleniū ex eodē  
stomacho imponitur, potest & ad frontē imponi. Et  
in summa, mollit, discutit, contrahit, siccāt, ac dolorē  
mitigat. Quod si cū aceto præparare malueris hoc  
medicamentū, ita facito, flores anemones recisis un-  
guibus purgatos, & ad solē siccatos, in uitreo uase  
seruato, & eorū postea bessem sumito, & acetī albi  
acerrimi heminas atticas tres affundito, ac per diē ac  
noctem macerato, deinde manibus subigito, paula-  
timq; omnē succū exprimito. Et colophonix luci-  
dissimæ drac. xlii. resinæ pinus liquidæ, ceræ, olei,  
singul. trientē, succi anemones heminas Atticas duas,  
& dimidiā accipito. Et colophoniam cum oleo ad tæ-  
dæ lignorum ignē lērum coquito, tēdaceaq; spathu-  
la assidue agitato, donec solidius pharmacum eua-  
serit. Deinde resinā paulatim adijcto, ne ebulliens  
extra ollā redundet, & rursus bullire finito, & ubi  
iā planē solidū uideris, cerā addito, eaq; liquata me-  
dicamentū ab igne ablatū spathula uersato, atq; ubi  
iā deferbuit, succū paulatim instillato, diligēter ob-  
seruādo ne efferuescat. Facile enim ebullit, ut pericu-  
lū sit, ne superfundatur. Postq; autē ita paulatim am-  
mixtus fuerit, uariū purpureū ac suauē colorē phar-  
maco affricat. Omni igitur succo iniecto ac unito,  
medicamentū in mortariū transferatur, atq; frige-  
factū manibus subigatur, donec totus succus secedat.  
Hoc ad eadē cōmodū est, ad quæ illud prius recētū  
florū pharmacū cōducit, Nisi q; leuius est, ac magis  
tēperatū, & ad canū morsus, ac uenenatorū ictus cō-  
modū. Idē rosaceo dilutū ad anī ac pudēdorū ulce-  
ra cōducit, ubi remissione medicamēto opus habet,

*Emplastra Cephalica, & ad fracturas, & ad mul-  
ta comoda. Et de iusto eorum usu. Cap. xiii.*  
Cephalica, hoc est, capitalia, emplastra dici solent, quæ  
uulneribus capitis adhibita, uim penetrādī in alium  
habēt, squamasq; ac ramenta ossiū disparata, nō so-  
lum in capite, sed etiā reliquo corpore educūt, ac ex-  
trahūt. Itaq; acrimoniā quandā ipsis insitā esse opor-  
tet, per quā ex profundo extrahūt ad superficiē ex-  
ternā, non solū ossa, sed multo magis crassum uisco-  
sum, aut omnino uitiosum humorem. Quæ uerò ad  
fracturas fiunt, extensoriā ac discussoriā uim habent.  
Quidā uerò etiā adstringentia ipsis ammiscuerunt,  
ut quod ad affectas partes influit repellatur, & exter-  
siorū uis usq; ad profundū deducatur. Verū hoc  
nosse expedit, quod si adstringentia nō ad lanuginē  
minutissimā trita fuerint, atq; hoc cū aceto, damnum  
magis quā utilitatē afferent, si attractorijs fuerint  
ammixta. Sed & hoc scire oportet, quod inter em-  
plastra ad fracturas præstantiora sunt, quæ capita-  
lia inscribuntur. Et propterea cū cerato præsertim ro-  
saceo, incarnare solēt, linamentis excepta, ac indita.  
Eiusdē porrò generis cū cephalicis est Ixis quoq; su-  
perius descriptū emplastrum, & quod Machæioni  
inscribitur, & Barbarū Hierē Cappadocis, quod a-  
liqui Aphrū appellāt, hoc. Emplastrū nigrū, ad infi-  
gniores præsertim capitis dissectiones, fistulas, sinus,  
fracturas citra inflātionē glutinādas, ad neruos,  
chartilagines, ac ossa cōcisa. Facit & ad ulcera profū-  
da, sinusq; magnos glutinat. Adhibetur etiā cōmo-  
dē abscessibus dissectis ad saniei educationē. Spleni-  
cis etiā, ac hepaticis cōducit. Et est ad cruenta effica-  
cissimū uulnera. Ad sanguinē reijciētes duobus co-  
rijs inducitur, quorū alterū pectori, ac costis impo-  
nitur, alterū dorso. Sanguinē em supra opinionē si-  
stīt. Facit & ad hominū, ac canū morsus. Et omnino  
inflāmationes arcet. Ceræ, picis, bituminis, resinæ  
pinus, sing. lib. i. mannae thuris sexūcē, cerussæ, atra-  
mētī sutoriū, sing. trientē, opopanacis sextācē, olei, a-  
cetī, singul. lib. i. Cerā, bitumen, oleū, acetū, modico  
ex eo relicto, omnia simul in ollā nouā indito, ac li-  
quefacito, deinde picē, & resinā probè cōtusa adij-  
cito, & omnibus semicoctis, & ab igne remotis, ac  
excolatis, atramentū sutoriū modico aceto residuo  
tritū inspergito, & ne efferuescat caueto, atq; iterū le-  
niter coquito, ac uersato. Vbi uerò nō amplius in-  
quinat pharmacū, opopanacē residuo aceto macera-  
tū ac dissolutū affundito. Et postea cerussam ac mā-  
nā probè trita inspergito, & paululū tepefacito, ut  
uniantur, cauens ne opopanax aut manna cōbura-  
tur. Atq; ita medicamētū in mortariū diffundito, ac  
frigefieri finito, emollito, reponito, ac utitor. Hoc  
omnia uulneraria medicamēta superat, uelut experi-  
mento cōstat. Est autē hyeme p septē dies, æstate per  
quinq; aut re ita urgēte, per tres exoluēdū. Nigrum  
insigne ad multa cōmodū, Panaletthes appellatū. O-  
lei dulcis dodrantē, bituminis, ceræ, resinæ pinus sic-  
cæ, picis, singul. lib. i. spumæ argēti, cerussæ, ærugi-  
nis, singul. drac. x. ammoniaci thymiamatis, thuris,  
aloēs, myrrhæ, singul. drac. viii. opij, succi malorū  
mādragoræ, sing. drach. vi. aluminis scissi, atramētī  
sutoriū, chalcitidis, croci, singul. dra. iiii. acetī quātū  
satis est. Omnia spuma argenti usq; ad crocū, probè  
ad strigmentitiā spissitudinē terito. Deinde oleum,  
& bitumē ad fabarum magnitudinē cōtusum, &



ceram simul liquefacto, eisdem liquatis picem, ac resinam adijcito. Et hæc liquata, ac excolata rursus coquito, & trita adijcito, subigito ac utitor, facit hoc ad uulnera recentia, ad ensium, sagittarum, ac lancearum puncturas, ad fracturas item, ac contusiones, siue cum uulnere, siue sine uulnere fuerint. Vtere & ad neruos uulneratos, ad canum, luporum, urforum, leonum, aprorum morsus, facit & ad uenenum eiacularium, & præsertim uiperarum ictus, loco prius scarificato, & inde medicamento imposito. Idem apponitur ad abscessus simplici sectione diductos, & sanie exclusa. Vulnere, ac ulcera repurgat. Et quosdam uertebres, ac talis fauciatos persanauit. Ego uero manum alicuius ense inter ulnam, & radium uulneratam, eo curauit. Cõfert & ad scrotum cõcisum, & ad hepatis, ac splenis inflammationes ex febribus obortas. Duobus item corijs illitum, ut alterum pectori, alterum dorso imponatur, sanguinis relectionem sistit. Ad inflammationes autem irrigationis uice adhiberi potest, ita ut accipiatur de eo quadras, ceræ uero, & resinæ frictæ, ac picis, singul. sextans, & olei lib. i. Hæc liquentur, ac colentur, & cum medicamento, ac farinæ ordeaceæ quadrante, cum aceto trito imponantur. Sic etiam flagellatis conducit. Aegyptium Andromachi celebre, ad sinus maximos glutinandos, ad ossa carne nudata, ac cõcisa, ad detortos, ac luxatos articulos, ad abscessus, ad hominum, quadrupedum, ac reptilium bestiarum morsus, fronti impositum oculorum fluxiones sistit, maximas ac profundissimas ensium caesuras triduo sanat. Eximiam discutiendi uim habet, ut etiam pus, nisi ualde multum fuerit, sine cutis perforatione discutiat. Membra quomodocumque indurata emollit, & maligna ulcera, ad cacatricem perducit. Ceræ, spumæ argenti, singulorum drach. c. xliiii. ammoniaci thymiamatis drachm. lxii. terebinthinæ drachmas xxxii. lanæ succidæ ustæ drachmas xviii. aristolochiæ, thuris, squamæ æris, singulorum drachmas viii. squamæ ferri stomomatis drachm. viii. myrrhæ drachmas iii. opopanax drachm. ii. olei cicini aut sicyonii, uel antiqui lib. iii. Spumam argenti, cum oleo ad compagem coquito. Deinde addita squama rursus bullire finito, donec non inquinat. Tunc ceram primum, deinde ammoniacum tritum adijcito, & his liquatis terebinthinam addito. Et ab igne ablati, thus tritum, & lanæ cinerem inspergito. Et frigefactum pharmacum manibus subigito, ac utitor aliquando puro, aliquando diluto. Panacea emplastrum, quod aliqui Trium fratrum uocant: Hieras Hygieam, id est, sanitatem appellat, facit ad nomas, & omnia ulcera maligna. Coercet enim nomas, neque crustam inducens, neque circumscissa corpora indurans, sed omne corruptum rumpens, ac tabefaciens, ut nihil differat ab uuis passis humectis. Sanguinis fluxum suppressit, tum alibi, tum ex hæmorrhoidibus erumpentem, sed & ipsas hæmorrhoidas tabefacit, ac consumit, præterea fistulas sanat, & carbunculos, & ægilopas, & ulcera chironia appellata, & in summa totum ægre curabilius ac diuturnorum genus, priuatim uero ad mammam duritias, earundemque cæcos, ac nomas conducit, facit & ad hydropicos, splenicosque ac articularum affectiones. Et ad uteri quodæ affectiones oleo cyprino dilutum, ac liquidum iniicitur. Externis autem præstat ita, ut est, imponere, uelut singula alia. Omni uero ulceri impositum, etiam si ferum fuerit, statim ipsum

mitius efficit, & dolores iidem, ac uigilias mitigat. At uero rosaceo dilutum, sinus magnos, & fistulas glutinat, prius elotos: recentes autem sinus aqua multa eluere oportet, deinde exterius medicamentum adhibere, & debitam ligationem facere. Ad fauos etiam inflammatos efficacissimum est. Verum Damocrates etiam ad canis rabiosi morsum, & uenenum eiacularium bestiarum ictus, iam liuescentes ac denigratos, & ad medicatas sagittas facere asserit. Spumæ argenti, bituminis Iudaici, terræ ampelididis, singulorum drachmas ducentas, thuris, propolis, singul. drach. l. aloës, polii, centaurii, galbani, aluminis scissi, singulorum drach. xxv. chalcitidis ustæ drach. xvi. chamæpityos, symphyti, radicis chamæleonis nigri, marrubii, helenii, aristolochiæ, singulorum drach. xvi. gallarum, myrrhæ, iridis, singul. drach. xii. terebinthinæ drach. xxv. mellis Attici unc. xxv. olei noui lib. viii. Spumam argenti, terram ampelidem, bitumen contusum, ad lentum ignem coquito, assidueque uersato, citissime enim exurit. Et ad strigmenti spissitudinem redactis, chalcitidem inspergito, bullireque finito. Deinde alumen adijcito, ac rursus coquito, donec non amplius inquinet, in alio uero uase galbanum, propolis, & terebinthinam cum melle liquefacta habeto, & medicamento ab igne amoto, hæc ammisceto, & his probe unitis, arida trita adijcito, omniaque simul subigito, & in uase pelle cooperto reposito, ac utitor tanquam admirando. Poteris etiam Archigenis nigrum emplastro uti, quod inter orthopnoica medicamenta sermone octauo habetur. Nigrum Icesii, ad omne ulcus recens ac uetus, ad contusa, luxata, fracta, ad inflammationem, & omnem dolorem. Statim enim a dolore liberat, facit ad canum, ac hominum morsus, ad furunculos, & duritias, præsertim mammam, ad tubercula sedis, ad hydropem, & quæ discuti oportet. Est enim attractorium, ac glutinatorium. Vlcera maligna, strumas, parotidas, perniones, panos, clauos, nigredines, imperigines, fistulas, & hæmorrhoidas inflammatas sanat, aculeos & infixos extrahit, facit & ad uenenatorum ictus, & quadrupedum morsus. Spumæ argenti, bituminis, terræ ampelididis, singulorum drach. ducentas, propolis, ceræ, singul. drach. l. terebinthinæ, galbani, aluminis scissi, singulorum drach. xxv. chalcitidis drach. viii. myrrhæ, iridis, gallarum, singulorum drach. xii. Mellis lib. iii. olei omphacini recentis lib. viii. coquitur uelut panacea, & spatula tædacea assidue agitur, ne subsideat, facillime enim comburitur. Nigrum Asclepiadæ, ad ossium fracturas optimum. Hoc usus sum ad ossium fracturas, in quibus ossa disparata uelut innatabant, quæ cum cæteri auferenda iudicarent, ita præter opinionem detinuit, ut instar calli coaluerint. Spumæ argenti drachm. ccl. bituminis drach. cc. ceræ, picis, singulorum drach. c. resinæ pinus drachm. l. aluminis liquidi, propolis, singulorum drachm. xxx. ammoniaci thymiamatis drachm. xxiii. æruginis drach. x. olei drach. xlv. Spumam argenti cum oleo coquito, donec non inquinet. Deinde ceram, & bitumen priuatim liquato, & picem adijcito, & omnia colata ad spumam argenti ammisceto, postea ammoniacum tritum addito, & rursus ad bonam compagem coquito. Deinde propolis ac resinam pinus adijcito, & ab igne ablati alumine & æruginem minutissime trita ammisceto, postremum medicamentum, in aqua acetosa per-



to permixtā diffundito, manibus subigito, ac utitor.

Emplastrū Athena inscriptum. Cadmiæ dra. xx. æris uisti, malicorij, gallarū aristolochiæ lōgæ ac rotundæ, salis ammoniaci, squamæ æris, nitri, aluminis scissi, aluminis rotundi, iridis, misyos, atramēti sutorij, chalcitidis, æruginis, aloës, myrrhæ, thuris, ammoniaci thymiamatis, galbani, sing. dra. xxx. ceræ, picis, sing. dra. c. uelut alij habēt cc. colophonij dra. cccc. olei sexuncē. Hoc quidē modo apud Oribasium habetur. Asclepiades autē habet aloës drac. xii. myrrhæ drac. xii. & ammoniaci thymiamatis dra. xvi. Arida ad solē æstiuum sufficiētibz diebus terito, & ad ea postea liquabilia liquefacta adijcito ac unito, facit ad sinus, & maxima capitis uulnera citra inflātionē glutinat. Cerato liqdo dilutū per linamēta inditur, ad punctos ac uulneratos neruos, ad musculos cōcisos, ad capitis ulcera, ad fistulas & ulcerū cuniculosos recessus. Ossa corrupta citra perforationē educit, facit ad nomas, putredines, cāceratas affectiōnes, inguinum, alarū, ac colli nigredines, & ad ulcera ægre recipiētia cicatricē. Et omnino uires siccādi habet, quas laudes Asclepiades ipsi adscripsit. Nigrū ex salicibus, celebre & ad multa commodū, facit ad cruetā uulnera, ad resolutos articulos, ad fistulas, madore flaccidas carnes cōstringit, erysipelata & alias affectiōnes citra ossiū fracturā obortas sanat, pectori ac dorso adhibitū sanguinis refectionē, tabidosq; ac pectore suppuratos curat. Misyos, chalcitidis, æruginis, cerussæ, gallarū, aluminis scissi & rotundi, mēlāteriæ sing. sexuncē, malicorij sexuncem, atramentū sutorij sexuncem, ceræ, resinæ pinus, picis, bituminis, foliorū salicis uiridū, olei sing. lib. ii. olei rosacei trientē, acetū sextarij dimidiū, uel quantū satis est, folia salicis cū aceto ad tertias decoquito, deinde folijs cōtritīs ac humore expresso, primū æruginem, cerussam, & melāteriā leuissime trita, & deinde etiā reliqua trita ammisceto. Et postremū liquabilia liquata affundito, frigefacito, subigito, eradito, ac utitor. Aliud ē salicibus, à Critone ad Herodotū relatū. Melāteriæ, gallarum, aluminis scissi & rotundi, sing. sexuncem, ceræ, bituminis, picis sicce, resinæ pinus, foliorū salicis, singul. lib. ii. olei lib. i. acetū sextarij dimidiū, præpara uelut dictū est. Aliud ē succo salicis, ex Oribasio. Hoc Magnus, inq̃t, inuenit ad destillationes. Salicis folia uiridia ad solem terito, postea in ollā nouā cum sufficiente uino mittito, & appposito operculo, ad lētū ignē coqto, & excolato, abiectisq; folijs expressis succū adseruato, postea uerō sumito colophonij unc. xxiij. olei sextarē, succi lib. i. Et colophonij percolatā cū oleo, ad lētum ignē coquito, donec in aquam diffusa, & manibus subacta, nō amplius inquinēt. Deinde ceræ unc. xxiij. ammisceto, eaq; liquata, ollaq; ab igne amota succū salicis adijcito. Vinū uidelicet in quo folia cocta sunt, paulatim instillando ut ne efferuescat, & rursus ad mitissimum ignē decoquito donec medicamētū resederit. Et deinde in mortarium trāsfusum eodē succo infuso, manibus diligentissime subigito. Emplastrū Cyzicenum appellatū, facit ad recētia ac uetera uulnera & ulcera cuniculosa. Duritias præsertim māmārū diffundit, attrahit, repurgat, replet, glutinat, cicatricē inducit: facit & ad cāceratas duritias ac fistulas, & ubi scapellū admoueri non potest, uelut in collo, collyriū ex hoc medicamēto inditur. Idē minātes fieri abscessus miti-

gat, tubercula diffundit, gāglia & collectiones fastigiat ac rumpit. Sagittas, & ossa, & aculeos, & infixā extrahit, crustas citra molestiā exterit. Verū in ulceribus cuniculosis, magnis splenīs utendum est. Discutit etiā strumas, & ad uesicæ affectiōes egregie facit, pectini impositū sanguinis eruptionē, uel ut alij habent, hæmorrhoidas, supprimit, thoraci & dorso adhibitum, tabidīs cōfert. Thuris, myrrhæ, croci, iridis, bdellij, atramēti sutorij, propolis, aloës, chalcitidis, misyos crudī, aluminis scissi & rotundi, radices panacis, malicorij, ammoniaci thymiamatis, uisci, opopanacis, æruginis, acaciæ, florū rosarū, sing. dra. viij. æris uisti dra. xxiij. Alij pro ære, squamæ æris tantundem adijciunt, aristolochiæ, gallarū, sing. dra. xvi. terebinthine drach. cxliij. ceræ unc. xxxij. adipis uitulini unc. xxxij. acetū aut uini antiqui sextarium. Si itaq; pharmacū acre & discussoriū habere malueris, acetum eligito: sin adstringēs ac repulforium, uinum accipito. Arida & quæ ad succorum naturā accedunt, cum uino aut aceto terito. Deinde ad cerā cum adipe liquatā, ac excolatā, terebinthinā adijcito, simulq; ad cōpagem coquito, postea propolim ac uiscum addito, & spathula uersato, & ad hęc dissoluta, arida antea trita paulatim adijcito, ac fortiter agitato. Et postremū in mortarium trāslata manibus subigito, ac unito. Ego uerō neq; acetū, neq; uinū adhibeo, sed arida omnia solū cōtero & adijcio. Nā si uinū aut acetū aut aqua ammixta fuerit, ad cōpagē non peruenit. Emplastrū Moschionis, ad uulnera recētia ac cōcisos neruos, & dissectiōes cum cōtusione, facit & ad fracturas cum uulnere. Nā & uulnera sanat, & ossibus callum obducit, cū debita deligatione impositum, facit & ad inchoatē hydropē, & testes cōtusos. Arefacit etiā eminēcias sedis. Curat rimas butyro dilutū, & gutturis tumores sanat: dissoluit omnē duritiē, facit ad articulos luxatos ac distortos. Callosas manuū ac pedū eminēcias, quas clauos appellamus, aufert citra exulcerationem. Et est omnino pharmacū ad multa commodum, præparatur sic. Spumæ argēti, picis siccæ, adipis uitulini, sing. unc. xx. terebinthinæ, mānæ thuris, singulorū dextarē, ceræ quincuncē, æruginis, opopanacis, galbani, singulorum unc. i. picis liquidę selibram, acetū, succi sycomororum, olei cicini, uel sycionij, uel antiqui, singulorum heminā unā, id est, librā i. Spumam argēti cū oleo coquito, & ubi ebullierit, adipē adijcito, & assidue agitato, & ubi cōpagē acceperint, cerā, picem, ac resinam adijcito, & coquito donec non amplius inquinēt. Deinde succum sycomororū, & picem liquidā seorsim cocta, & ad compagem redacta ammisceto, & galbanum, ac æruginem, & mānā thuris inspergito, postremum opopanacem aceto dissolutum addito. Et ad ignem admota rursus coquito, donec nō amplius inquinēt. Atq; ita præparatum medicamentum in uinum transferto, & per triiduum finito, postea uerō manibus emollito, ac utitor. Oportet autē post impositum medicamētum, fasciā uino imbutā exprimere, & circumdare. Cæterū quod statim subijciā, succum sycomororū nō habet. Est autē medicamentū ad ossium fracturas commodū. Ad cruetā uulnera ad sinus glutinādos, & præsertim capiti aptum. Spumæ argēti, adipis taurini, picis siccæ, sing. unc. xx. uelut alij habent xvi. olei cicini aut sycionij, aut antiqui, dextantem, pollinis thuris,



terebinthinæ, sing. bessem, ceræ trientē, opopanax, æruginis, galbani, sing. unc. i. uisci sexuncē. Spumā argenti cū oleo & adipe ad bonā compagem coquito. Deinde cerā, picem, ac resinā adijcito, & mox ab igne tollito, atq; ubi paululū frigefacta fuerint, reliqua cū aceto trita paulatim adijcito, ne efferuescant, & rursus ad prunas admota sensim coquito, donec non amplius inquinent. Et demum manibus emollito, ac utitor. Emplastrum insigne, ingentes sinus, ac fistulas sanās, aculeos & sagittas extrahens, inflammationes ac duritias dissoluens. Coxendicum item ac renum affectionibus cōmodū est, Spumæ argenti dextantem, olei unc. x v. picis siccae, colophonix, sing. unc. x vi. adipis taurini tantundem, misyos, iridis, calcis uulæ, singul. quadrantem, atramenti sutorij sesquiunciam. Spumam argenti cum oleo ad bonam compagem coquito. Deinde liquabilibus liquatis ac excolatis adiectis, rursus paulatim coquito, donec non inquinent. Et postea paululum frigefacta ad reliqua in mortario cū aceto trita ammisceto. Emplastrum theriaca appellatū, ex centauryo, quod laudat Oribasius, facit ad nervorū ac musculorum uulnera & puncturas. Ad ferarū canis rabiosi morsus. Glutinat sinus antiquos, & ad cicatricem perducit, præcipue uerò ad reptilium ictus facit. Genuum ulcera fluida & ægre curabilia sanat. Spumæ argenti sexuncē, olei antiqui trientem, resinæ pinus siccae dra. x x x ii. ammoniaci thymiamatis, propolis, thuris, singul. drach. x ii. cerussæ drac. viii. æruginis, squamæ æris, galbani, aristolochiæ rotundæ, centaury, singulorum drach. iii. thuris, aloës, iridis, gallarum, chalcitidis, singulorum drac. iiii. Spumā argenti cum oleo ad moderatā compagem coquito. Deinde squamā, æruginē, cerussam, & chalcitidem adijcito, & ubi non amplius inquinant, propolim, ammoniacum ac galbanum in mortario prius dissoluta, addito. Et ab igne ablati ac aliquatulum frigefactis, reliqua arida minutissime trita ammisceto. Et iam planè frigefacta manibus emollito. Aliud ex dictamno, cuius admiranda uis est. Ad nervos, musculos ac charitlagines cōcitas. Ulcera quoq; antiqua ac ægre curabilia sanat, ossa corrupta, aculeos, & infixi extrahit. Habet uim discussoriam, facit ad capitis dolores. Reprimi oculorū fluxiones. Est & malagma pleuritidis cōmodū, & hepaticis, cum emplastro ex siccis parato, facit ad omnium uenenum eiaculatiū reptilium plagas. Spumæ argenti drac. c. colophonix drachm. l. ceræ drachmas x x v. ammoniaci thymiamatis, aristolochiæ, singulorū drachmas x vi. mannæ thuris, galbani, singulorum drachmas x ii. æris usti, æruginis, dictamni, aloës, propolis, singulorū drachmas viii. diphrygis, squamæ æris, radicis gentianæ, singulorum drachmas vi. olei antiqui lib. ii. Hieras autē dictamni & aristolochiæ, singulorum drachmas x. coniicit, ammoniaci uerò solum drachmas x vi. In reliquis consentit. Hoc preparatur uelut emplastrum Piscatoris, aut Tyrium, quæ suprā retulimus. Verum eius meminisse conuenit, herbas non nisi ablato ab igne pharmaco, minutissime tritas immittendas esse. Sed & Democrates in cæteris similis, dictamni drachmas x. diphrygis uerò viii. recipit, & ad mammarum, colli ac spinæ ulcera conuenire asserit, quantumuis fuerint diuturna.

Emplastra emollientia ac discussoria, ad multa commoda.

Cap. XIII.

Emplastrum Nigrum Asclepiadis, Achillæ inscriptū. Mammarum duritias, & testium inflammationes discutit. Hoc medicamentum discussoria ui omnibus alijs præstat, & ad multa commodum est. Locus autem prius abluendus est, deinde medicamentum adhibendum. Spumæ argenti libras sex, picis brutiæ libras quatuor, bituminis, resinæ pinus siccae, singulorum libras vi. terre ampeletidis lib. ii. ceræ lib. iiii. thuris sequilibrā, aluminis scissi, aloës, myrrhæ, singul. trientem, olei omphacini antiquissimi lib. viii. succi serapiadis lib. vi. aceti quantum satis est, præpara uelut panacæam. Nigrum ē lolio Hieræ, facit ad fistulas, alarumq; ac inguinū abscessus, ut nihil abscondere opus sit per chirurgiam, sed tantum perforatione facta ac sanie exclusa, medicamentum imponere. Illinendum est autem duobus corijs, altero iuxta alterum locato, neque humor de splenis detergendus est. Imbibitur enim & fortius sit medicamentum, picis libras duas, resinæ pinus siccae dodrantem, ceræ tyrrhenicæ, ceræ ponticæ, singulorum quadrantem, olei antiqui quincuncem, liquabilibus liquatis ac excolatis loliaceam farinam inspergito, & bitumen in aceti triente dilutum affundito, omniaq; simul in mortario subigito manibus frigida humectatis. Sit autem bituminis sesquiuncia, farinæ loliaceæ unc. x iiii. facit ad malignas mammarū duritias, parouidas ac perniones. Emplastrū Essentia appellatū, desiccandi uim & mitigandi dolores præ omnibus habet, facit ad sanguinis reiectionē, ad articulorum ac costarum duritias, ad gāgrænas, sinus, strumas, ulcera chironia, fistulas, egilopas. Spicula extrahit, hydropicos intra septimum diem curat. Hepati ac spleni magnopere conducit, pluribus diebus impositum, splenē penitus consumit, facit ad podagricos, & coxendicum affectiones. Spumæ argenti drachm. x x. cerussæ, æruginis, singulorum drachm. x x. squamæ æris, thuris, singulorum unc. i. bituminis bessem, resinæ pinus dextantem, & uncix dimidium, ceræ uncias x vi. picis uncias x x x i. In alio exemplari habetur, ammoniaci thymiamatis drach. vi. galbani drach. vi. Spumam argenti & cerussam ad bonam cōpagem coquito. Aliqui etiam bitumē in principio cū his iniiciunt, utiturq; eo ubi magis siccare proposuerunt; deinde reliqua ex ordine imposito, uelut sæpe diximus, at si plus iusto coxeris, duritias non mollit. Emplastrum Ebrietas uocatum. Vim habet discutiendi ac rarefaciendi, duritias inflammatas diffundit, facit ad ossium fracturas, ad uulnera cruenta, cōuulsa, rupta, uulsionem, coxendices, calculos. Ad omnes capitis affectiones utiliter adhibetur, aliquando fronti & temporibus, aliquando uertici derasis pilis impositum. Spumæ argenti dodrantem, olei antiqui sexuncē, olei rosacei, ceræ, singulorum sextantem, adipis taurini, terebinthinæ, thuris, singulorum trientem, picis dodrantem, galbani, opopanax, æruginis, singulorum quincuncem, aceti sextarium i. præpara, uelut sæpe dictum est.

Emplastrum ex succis. Uulnera nervorum ab inflammatione tutatur, sectiōes glutinat, ulcera inflammata, & musculos uulneratos, citra aliud cataplasma aut fomentū sanat, facit ad podagricos quocūque tempore adhibitum. Ad uteri inflammationes ueteres ac recentes



recentes in pelsis siue talorum formis subditur. Rosaceo, aut myrteo oleo dilutum caua ulcera replet, citoq; persanat. Et in summa, omnia reliqua cataplasmata ac medicamenta exterius adhiberi ulceribus solita, superuacua sunt, hoc præsente. Durities quoque mollit ac discutit, cæteris ad hunc usum commodis ammixtum. Spumæ argenti lib. vi. olei recētis æstare quidem libras vii. hyeme uerò libras ix. succi libras iiii. oleum cū succo ad prunas coquito, & ubi feruere & bullas emittere desierint, spumam argenti inijcō, & ad lentum ignem donec non amplius inuinent coquito, & ubi flauum ac bonum colorem acceperit, nondum autem fuluum attigerit, ab igne tollito, frigefacito, manibus subigito, ac in massam cogito. Vsu uerò expetente sumuntur medicamentum partes duæ, olei & ceræ, singulorum pars una, aut plus, prout res postularit. Succus porro ita præparatur. Aquæ sextarij xx. accipiuntur, radicis althææ recentis lib. iiii. seminis lini fœnigræci, singul. sextarij dimidiū. Radices lotas & cōtusas aqua madefacito, & postridie fœnumgræcum purgatum & lotū adijcō, ac madefieri sinito, & tertia die semen lini similiter lotū addito. Et quarta die ad bonā spissitudinē coquito, & percolatū succū ad medicamentū præparationem accipito. Ego uerò, inquit Oribasius, duodecim aquæ sextarijs althææ lib. iiii. fœnigræci ac lini seminis, sing. sextariū inijcō. Aliud emplastrū ē succis, Oribasij. Spumæ argēti, olei sing. lib. ii. ceræ bessem, fœnigræci, seminis lini, radicū althææ, prisanæ, sing. æquales portiones prius madefactas cogito, donec crassissimus succus euadat. Et huius excolati lib. ii. postea coquito, uelut dictum est. Emplastrum ex prisanæ, fœnigræci, seminis lini, prisanæ, singulorum unc. i. meliloti, radicis althææ, singulorum sextantiē. Hec probe mundata ac lota per biduum in aqua madefacito ac coquito, donec succū reddiderint. Et eius excolati lib. ii. sumito, & olei antiqui lib. ii. ac simul coquito, donec oleum solum restiterit, & huic postea taurini adipis sexuncem ammisceto, colophoniam tantundē, galbani unc. i. ceræ lib. i. Hoc unguento quopiam dissolutum, etiā laxadi uim habet. Emplastrum ex psyllio. Spumæ argēti lib. iiii. olei dulcis lib. vii. ceræ lib. i. resinæ pinus lib. vii. succi psyllij lib. iii. Succum uerò ita parabis, psyllij quadrantem in aquæ sextarijs quinque madefacies, deinde coques, & excolatum succum rursus cum oleo & spuma argenti ad bonam compagē decoques, & liquabilia liquata adijcies. Hoc ad omnes induratas inflammationes utiliter adhibetur. Aliud ē psyllio simplicius, inflammationibus, intertriginibus, papularū eruptionibus, tuberculis ac podagris cōmodū. Spumæ argēti, cerussæ, sing. sextantiem, ceræ sexuncem, olei rosacei lib. i. succi psyllij lib. iii. præpara & utere crudo. Nō enim coquitur. Aliud ē psyllio simplicius, ad inflammationes podagricas in ipsa præsertim exacerbatione cōmodum. psyllij triētē in duobus aquæ sextarijs madefacito, ac coquito, & excolato succū, ei q; ceræ sexuncē, olei lib. i. ammisceto. Emplastrum ex Serapiade, ad tubercula, papulas, & intertrigines. Spumæ argēti lib. i. olei lib. ii. succi serapiadis triteæ sticularis lib. iii. Spumā argēti cum oleo & succo ad bonā compagem decoque ac utere. Pūtiadum, foliorum hyoscyami uiridium, colophoniam, ceræ, adipis porcini, singul. sexuncem, ad folia trita affundis

to liquefacta, ac utitor. Emplastrum ex Althea, Polleis. Corticem radicis althææ herba uigente in pila contundito, deinde in æneum aut fictile uas translatum, uino albo ueteri odorato ac adstringente respergito, ut solum humectetur. Deinde tegito, ac per triiduum sinito. Quarta die rursus in pila tundito, & succum fortiter exprimito. Et accipito colophoniam uncias xx. iiii. ceræ trientem, olei, æruginis, singulorum sextantiem. Succū heminas Atticas ii. præparatur autem hoc modo, colophoniam oleo liquatam ac colatam, ad lentum lignorum pini ignem coquito, & tædacea spathula agitato, donec in aquam instillata solidior euadat, deinde ceram adijcō, ea q; liquefacta ollam ab igne tollito, & ubi frigefacta fuerint, succum paulatim affundito, ac caueto ne efferuescat: facile enim ebullit ut super effundatur, postquā autem constiterit, rursus igni adhibeto, & ubi incaluerint, æruginem inijcō, & ablata ab igne frigefacito, ac manibus subigito, ut probe uniantur, facit hoc ad noua & antiqua ulcera, ad ferarum ac canum morsus. Virus enim ab ulcere extrahit, panos & strumas aut discutit, aut suppurat, aut rūpit, aut materiam ad superficiē euocat, uelut in sugillatis, ac in uaporē diffundit. Sedar dolores, scabiem ac scabros ungues, lepramq; ac utiligines exterit, nec soluendū est in his ante septimum diem. Aculeos & infixa extrahit, podagricas inflammationes in ipsa exacerbatione mitigat, tumores articulorum ac ganglia dissoluit, fauos ac ficus curat, hydrocephalam infantū, aquosam capitis affectionem sanat. Splenis duritiā mollit, caneros non ulceratos lenit, imminet q; erosionē cōpescit, pello exceptum ac subditū mēses ducit, pectini impositū calculos pellit, urinæ difficultatē corrigit. Aluū suppressam laxat. Rosaceo dilutū, plātārū rimas sanat, ulcera testū ac pudendorū repurgat & incarnat. Et si absq; ærugine pparetur, serapēia ulcera sistit. Osiū fracturis prodest, irrigatiōis uice adhibetū. Dolores tñ sedat, fit etiā ex floribus althææ rosaceis similibus efficacissimum pharmacū, hoc modo. flores illi resectis unguibus tunduntur, & ad puluillum rediguntur: & eius sumuntur partes x. i. colophoniam partes xxxvi. ceræ partes vi. olei partes ii. Omnia simul uelut dixi præparata manibus probe subigito ac utitor, priore cōmodius est, & dolores amplius mitigat. Emplastrum ex semine lini, Polleis. facit ad pectoris affectiones. Neruofarū partium inflammationes discutit, ac dolorē mitigat, facit ad exacerbationes podagricas, & contractos articulos relaxat. Seminis lini partes ii. farinæ ordeæ ceræ partes iiii. colophoniam partes iiii. ceræ partes iiii. resinæ pinus liquidæ, uel cupressi, si haberi potest, partes ii. seminis thlaspios partē unā, florum chamemeli, pilularum cupressi clausarum, singulorum partē unā, olei partes duas. Cerā & colophoniam cum oleo ad prunas liquefacito, & assidue uersato, & ab igne ablati cupressi pilulas tritas & cribratas adijcō, ac caueto ne efferuescant. Deinde farinā, semen lini, resinam liquidam addito, & rursus ad ignem adhibeto, & paulatim donec uniantur coquito, postea procul ab igne chamæmelum & thlaspim inspergito. Et tandem medicamentum in mortarium frigidā semiplenum coniectum diligenter manibus subigito. Emplastrum Elephantinum. De Elephantino Polles libro secundo. Id ego inquit, prius inuenieram,



neram, sed postea longo usu ductus immutauit, & quum facilius meliusq; ac fortius cognouerim, in hunc secundum librum retuli. Dorycnij siue solani uescarij dextratem, radicis mandragorae bessum, radicis panacis sexuncem, colophoniam sextantem, resine pinus liquidae trientem, opopanax sextantem, ceram, terebinthinam, singul. lib. i. bdellij unc. xx. aceri lib. i. uel amplius. Quidam etiam potamogitonis unc. xx. adijciunt. Verum descriptio non habet. Aliud Elepharium, facit ad contractos articulos, mollit ac discutit podagricorum callosas concretiones, & in ossium fracturis inductos callos dissoluit, panos, strumas, & quamlibet duritiem emollit. Quod si experiri libuerit, eboris aut cornu segmentum ex eo illinito, & ad dies triginta aut quadraginta alligatum finito, & deinde soluto. Et non reperis eboris aut cornu naturam, sed aliud quid, quod commode flecti possit. paratur autem sic. Corticis radicis dorycnij aut solani uescarij uirentis, siue in umbra siccata, corticis radicis mandragorae, singulorum bessum, radicis panacis sexuncem, opopanax bessum, potamogitonis uiridis, bdellij, resinae pinus liquidae, singulorum uncias xx. terebinthine lib. i. ceram sextantem, aceri albi bessum. Mandragorae ac solani corticis uirentes quidem, in pila tundito, & postea in mortario terito: siccos uero cum panacis radice terito ac cribrato, similiter etiam bdellium terito, ac potamogitonem, omniaq; simul in mortario mixta terito, aceto paulatim instillato. Et liquefactis quae liquari debent, excolatisq; ac ad probam compagem coctis, & ad trita ammixtis, medicamentum frige factum manibus subigito, & in fictili uase aceto affuso seruat, & ne transpiret probe cooperito. Emplastrum ex herba sacra siue uerbenaca, Polletis. Verbenacae rectae in uigore cum radice euulsae ac exiccatae, tuseq; ac cribratae sexuncem, colophoniam lib. ii. ceram trientem, olei sextantem. Liquabilia liquefacto, colato, & ad bonam compagem coquito, & adiecta uerbenaca subigito ac utitor, facit ad omnem capitis dolorum, ad hemicraniam, ad oculorum fluxiones, ad dentium dolores extra adhibetur. Ad scorpionum ictus. Ad neruorum partium inflammationes, & omnino impositum partes a fluxione tutatur. Emplastrum Gerani, Polletis. facit ad laxatos ac crassos neruos resolutionis periculum expectantes. Ad omnes fluxiones, tumidosq; ac inflammatos articulos, ad gaggia, steatomata, atheromata, strumas, panos, & quaecumq; molliri, attenuari, rupti, ac extergi debent. Rameta statuae aereae, ex assidua olei illitione sordidae ac aeruginosae lib. ii. ceram lib. ii. sandycis, sandarachae, terebinthinam, singulorum lib. i. Quod si statuae ramenta sicciora fuerint, terebinthinam lib. ii. accipito, & cum his omnibus gruis pennas unito. Hoc modo. Gruis pennas omnes in ollam nouam conijcito ac operito, argillaq; oblinito, & in fornacem mittito. Eamq; ubi tota exterius ignita uideris, extrahito, ac frige fieri finito. Ea deinde aperta pennas uistas eximito ac terito, & longo tempore antea paratos asseruato, & medicamentum postea sic praeparato. Ceram ac resinae liquidatis ac excolatis, sandicem & sandaracham minutissime tritas adijcito, & uersato donec omnia fuerint probe mixta, & postea ab igne ablatis pennarum cinerem ammisceto, ac simul subigito, frige facta autem aliquatenus medicamento statuae aeruginem cum modico aceto trita adijcito, atque in mortario probe unito, subigi

to, ac utitor. Emplastrum ex buglossa, Polletis. Buglossum herbam cum radice euulsam, & in umbra siccata, terito ac cribrato, & sumito eius partes iiii. colophoniam, resine pinus liquidae, ceram, singulorum partes viii. olei partes v. Colophoniam cum oleo ad lentum ignem coquito, ac spatula agitato: ubi uero durior apparuerit, resinam liquidam adijcito, ac rursus coquito, donec non amplius inquinet, & postea ceram adijcito. At ubi ab igne amoueris, cribratam herbam addito, & medicamentum in mortarium aqua semiplenum infundito, ac manibus subigito. Facit ad omnes inflammationes, strumas, parotidas, panos, plagas, collisiones. Ad antiqua & maligna ulcera, ad uulneratos neruos, sinus, nomas, fistulas. Repurgat, mollit, contrahit, attenuat, & quaedam discutit, quaedam rumpit, replet, & ad cicatricem perducit. Dolores ulcerum ueterum ac recentium statim sedat, & liuida abolet. Ego uero in buglossae defectu nycteridem herbam, ab aliquibus unguentum Helenes appellatam, ad coxendicum affectiones adhibui, & bene successit. Emplastrum ex achate lapide, Polletis. Lapidem achates appellatos, leoninae pelli colore similes, in fornacem fabrillem mittito, & aggestis carbonibus ualde sufflato, & ubi ignitos lapides uideris, forcipe extrahito, refrigeratosq; terito ac arctissimo cribro excutito. Deinde accipito colophoniam drachmas xlviii. resinae pinus, ceram, singulorum bessum, olei trientem, achatum lapidum ustorum quincuncem. Colophoniam cum oleo liquatam coquito donec non amplius inquinet, deinde ceram ac resinam prius liquata & excolata adijcito, & his unitis lapidum cinerem addito, ac rursus ad moderatam compagem coquito: postea medicamentum in frigidam aquam missum frige fieri finito, & manibus subactum in massam cogito. Vtere hoc ad scorpionum, uiperarum, & uenenum eiacularium bestiarum ictus, facit ad tumores aegre concoctiles ac sanabiles, ad induratos tumores, ad liuida. Velocem suppurandi uim habet. Strumas aut discutit, aut concoquit & rumpit. Erit autem efficacius ad strumas, si capparis folia uiridia, aut corticem eiusdem probe tritum, ad emplastrum calefactum ac remollitum ammiscueris. Emplastrum parhygrum, facit ad inflammationes ad duritiem quadam inclinantes. Adipis porcini a fibris depurati uncias xliiii. ceram uncias xxiiii. spumae argenti, cerussae, singulorum sexuncem. Liquida cum aridis permisceto. Manebit quidem hoc pharmacum aliquandiu liquidius, sed postea ad bonam compagem perueniet. Emplastrum e buccinis. Hoc Xenocrates malleoli abscessum suppuratum iam discussit. Inflammationes autem induratas, praesertim parotidas, priusquam in pus transmutentur, mirifice dissoluit. Spumae argenti dra. cc. ceram dra. lvi. olei antiqui lib. i. cerussae drach. viii. terebinthinam drach. lvi. buccinorum ustorum drach. x. thuris drach. xix. aquae sextarium. Spumam argenti & cerussam minutissime trita, rursus cum aqua terito, & iterum cum oleo, & ex mortario in ollam translata, lento igne coquito, assidueq; uersato ne subsideant, deinde ceram, & mox thus ac terebinthinam adijcito, & ad bonam compagem, non tamen multam duritiem coquito. Postremum cinerem buccinorum addito, & paululum feruere finito, & medicamentum ab igne tollito, & in mortarium aqua humectum effundito,



dito, & diu manibus subigito, ut glutinosum euadat: nam temporis progressu durius propter buccina efficitur. Emplastrū Dionysia appellatum. Inflammationes & abscessus mammarum præsertim, discutit: omnē enim humorē per cæcos meatus diffundit. Sed & duritias ac parotidas dissoluit. Cerae, terebinthinæ, spumæ nitri, olei antiqui, singulorū sexuncē, misyos crudi un. i. aquæ coactiliariorū quantū sufficit. Spumā nitri & misy cum aqua terito, & cū oleo coquito, deinde cerā, mox terebinthinā adijcito, & ebullire finito, donec nō amplius inquinēt, nō tamē nimis solida euadāt, & sublatum ab igne medicamentū in mortariū aqua humectū diffundito, manibus subigito, ac utitor. Hec dionysia inter attractoria emplastra rectē descripta habetur, eaq; utaris uelut istic descripta est. Emplastrū ē saponē, discussoriū præcipuū ad furunculos. Adipis porcini, picis, ceræ, saponis nigri, æquales portiones liquatas excolato ac utitor: discutit etiā hydropas. Aliud, ad furunculos, parotidas & panos. olei antiqui, ceræ, saponis, nitri, lixiuij, æquales portiones. Cerā cū oleo liquefacito, nitrum uerō cum lixiuio in mortario terito, & deinde saponē simul cōterito, & in ollā cōiecta paulatim coquito ad moderatā compagem, & utitor. Emplastrū ex Heliotropio. Facit ad percussa, collisa, luxata, uulsa, rupta, stilorū ac similium rerū pūcturas, ad dolores in profundo. Neros ab ictu aut frigore crassefactos, aut aliter affectos curat, firmat, & dolore liberat. Vlceribus antiquis, & uulneribus recentibus confert. Aduersus medicatas sagittas loco affecto imponitur. Ad digitos contusos, etiam si ossiculum collisum sit, ab inflammatione tutatur, & dolorē eximit. Maturat, suppurat, discutit, contrahit, glutinat, repurgat, incarnat, cavitates replet, & ad cicatricem perducit. Heliotropiū herbā tria grana habētē, in autumnō totā cum radice euulsam & in umbra siccatā terito, ac cribrato, & eius accipito trientē, colophonix splendidissimę unc. xlviii. resinę pinus, aut cupressi liquidæ bessēm, cerę bessēm, olei trientē. Resinā, oleum, cerā, simul liquefacito: deinde herba adiecta ad lentū ignē coqto, & tædacea spathula agitato, donec bonā cōpagē acquisierit medicamentum, & in frigidam diffusum subigito ac utitor. Strumas & duritias suppurat, rumpit, siccāt, incarnat, ad cicatricē ducit, & dolorē sedat. Emplastrum Mnaseæ, secundū mollientiū ordinis. Spumæ argēti, adipis porcini, olei, æquales partes simul decoque, donec non amplius inquinant, & si fortius medicamentū efficere uolueris, adipē & oleū utrunq; uetus accipito: uetustiora enim efficacius reddūt medicamentū. Quod si magis emolliens esse uolueris, oleū minues, & adipē augebis. Si uerō magis discussoriū, adipi detrahe, & oleo adde. Quidā cū oleo & adipe radicis altheæ cōtusæ sesquiliabrā coquunt, donec torrefiat, eaq; abiecta, in oleo ac adipe colatis spumā argēti coquūt, sicut diximus. Atq; sic quidē Galenus. Mnaseas autē sic. Spumæ argēti, ceræ, passī, colophonix, olei, axungię, sing. lib. i. oleū & spumā argēti coquito, donec nō inquinant, & cerā, colophonix, axungiā, liquatas & excolatas adijcito, ac rursus ad bonā cōpagē coquito: deinde passum affundito, ac fortiter agitato. Et sublatum ab igne pharmacū sub canis æstu insolato, & quodidie cū spathula uersato, donec ad debitā soliditatem perueniat. Emplastrum Helladicum

mollitorium. Ammoniāci thymiamatis, spumæ argēti, cerussę, olei antiqui, resinę pinus, ceræ, sing. lib. i. thuris sexuncē, galbani sextantē, castorij lib. ii. propolis, opopanacis, sing. lib. i. aceti quantum satis est. Oleum, spumā argēti & cerussam simul coquito, & medio cocturæ tēpore ammoniacū tritū adijcito, & ebullire finito, donec nō amplius inquinent, deinde liquabilibus additis ac probē ammixtis, thus & castoriū minutissimē trita addito. Et postremum opopanacē aceto dissolutū affundito, & perfrigeratum pharmacū manibus subigito, ac utitor. Discutit abscessus etiā in pus transmutatos. Aliud, emolliens ac discutiēs abscessus. Spumę argēti sexuncē, cerussę sesquiunciā, ceræ trientē, ammoniaci thymiamatis sextantē, galbani, myrrhæ, thuris, singulorū trientem, olei lib. i. oleū, spumam argēti, & cerussam coquito, donec nō amplius inquinet, deinde ammoniacū, mox cerā & thus ac galbanum adijcito, & ab igne ablatis myrrham addito, subigito ac utitor. Aliud, discutiēs abscessus, & iā ruptos expurgans ac sanās. Facit & ad capitis lendes. Colophonix sexuncem, ammoniaci thymiamatis sextantē, mastiches un. i. ceræ unc. i. galbani scrup. iiii. opopanacis scrup. iiii. æruginis scrup. iiii. resinę pinus lignosę, olei, singulorum trientem. Aliud ē tritici polline. Facit ad abscessus & furunculos, ad herniā aquosam & intestinorum, post chirurgiam inflammationibus sedatis. Ceræ, pollinis tritici, resinę liquidæ, singulorū sexuncem, ammoniaci thymiamatis quadrantem, olei trientem, aceti aut uini quātum satis est. Pollinē pridie in aceto aut uino subiges. Sequēti die liquatis his quæ liquari debēt, fermentatū pollinē probē subactū in mortario ammiscbis, & uteris. Aliud ē fermento. Saponis, sandarachæ, singulorū sextantē, fœni græci un. i. resinę pinus lib. i. colophonix, cerę, sing. sexuncē, fermenti sexuncem. Fermentum aqua dilutum cū liquabilibus liquefactis miscebis, & terēda trita adijcies, omniaq; simul subiges, ac uteris. Hoc discutiēdi ac rumpendi uim habet. Aliud ē Masticha. Colophonix lib. i. ceræ sexuncē, ammoniaci thymiamatis trientē, mastiches, galbani, terebinthinæ, singu. sextantem, omnia liquefacito ac excolato, & in frigidā cōiecta emollito ac utitor. Aliud trium specierum appellatū. Cerā, colophonix, terebinthinā liquidam, paribus portionibus simul liquefacito, & in frigidā mittito, subigito ac utitor. Hoc sicut etiā quod proximē præcedit, ossa capitis denudata incarnat, & squāmas citra molestiā disparat, & solum absq; alterius usu ad cicatricē perducit. Quod si mastichē pari portione adijcias, ad ossiū fracturas admirandū euadet. Emplastrū Iudæi. Colophonix lib. i. mastiches un. i. olei trientē, omnia simul liquefacta in frigidā mittito, & post ruptos abscessus utitor, ita ut nihil reseces, neq; linamentum indas, sed solum medicamentum cavitatem expleas. Ex eodem etiā emplastrum adhibeto, citissimē repurgat, ac præ cæteris incarnat. Postquā autem ulcus explanatum fuerit, ad cicatricem inducendā aliō medicamento opus est. Nā hoc superuacua carnem efficeret. Emplastrū reipublicæ præsidis. Resinę quæ in uasculis ac lagunculis ligneis affertur, excolatę lib. i. ceræ quadrantem, mastiches taurindem, olei à Martyreo uel aliunde allati, sesquiunciā. oleum cum resina liquefacito, cetaurijq; uiridis, si haberi potest, sin minus, arido fasciculo agitato,



agitato, & his excolatis reliqua ammisceto, ac manibus subigito. Quidam centaurij sicci un. i. adijciunt: inter liquadū uerō & dū agitas, hæc uerba insusurra-  
ro. Deus Abrahā, deus Isaac, deus Iacob, huic phar-  
maco uires largatur. Hoc sinus & fistulas glutinat,  
ægilopas siccatur. Et si centaurium receperit, duritias  
ac strumas inchoantes emollit. Emplastrum Mu-  
rum appellatum. Ammoniaci thymiamatis, gal-  
bani, opopanacis, singulorum unc. i. mastiches, ceræ,  
colophonix, singulorum sexuncem, aquæ marinæ  
quantum satis est. Aliud. Hoc ad ossium fracturas  
inflammationibus sedatis facit. Optimè cicatricem  
inducit. Colophonix, resinæ pinus, singulorum lib.  
i. ceræ sexuncē. Omnia in ollam feruidæ aquæ missa  
liquato ac excolato, deinde in frigidam transfusa  
emollito, & in massam cogito, ac utitor. Aliud, mi-  
rifice molliens. Facit ad stomachi duritiam ac frigi-  
dos affectus. Colophonix puræ sextantem, ceræ al-  
bæ trientem, mastiches puræ unc. i. olei cyathum i.  
Omnia simul liquata ad probam compagem coqui-  
to. Emplastrum Pyxis inscriptum. Confert ad  
omnes inflammationes, præsertim pedum, egregiè  
enim emollit. Ceræ, colophonix, singul. sexuncem,  
succis seminis lini trientem, adipis porcini sextantem,  
terebinthinæ quadrantem, & uncix dimidium, olei  
omphacini dextantem, ammoniaci thymiamatis unc.  
i. thuris quadrantē, lactis bubuli trientē, & uncix di-  
midium, ouorū candida nouē. Ammoniacū & thus  
cū lacte, succo, & ouis terito, & reliquis liquefactis  
ammisceto. Aliud è melle, molli ac discutit. Spu-  
mæ argenti, olei, singul. lib. ii. colophonix, ceræ, axū-  
giæ, mellis, sing. unc. xx. spumæ argenti cum oleo &  
axungia coquito, donec non amplius inquinant; de-  
inde reliqua liquata adijcito, & ab igne ablatis mel  
affundito, & frige factum medicamentum manibus  
emollito. Melinum Serapionis uulnerarium, ad  
multa cōmodum, Omnes duritias dissoluit, absces-  
sus discutit, humores per occultos meatus diffundit,  
Sinus glutinat, spicula, ossa corrupta & aculeos ex-  
trahit. Rosaceo dilutum caua ulcera replet, Sedat  
etiam inflammata. Hoc præceptor Lucius utebatur,  
atq; ipsum dupliciter præparabat, modò glutino-  
sum, modò solidius efficiens: collyria enim ex soli-  
diore formabat, & filum innectebat, & sic ad usum  
paratos habebat, ac in sinus fistulosos indebat, filo  
foras propedente ad cōmodiorem extractionē: quæ  
enim sine filo induntur, quum duriora sint, sæpe  
frāguntur, & priuatim abscessus efficiūt. Spumæ ar-  
genti drach. c. colophonix dra. lxxiii. ceræ drach.  
xlviii. ammoniaci thymiamatis dra. xxiiii. æru-  
ginis, myrrhæ, galbani, sing. dra. xx. olei æstate unc.  
xv. hyeme xviii. spumæ argenti cū oleo ad lentum  
ignē coquito, & ab igne ablatis æruginē inijcito, ac  
ne efferuescat caueto, & rursus coquito donec nō in-  
quinant, & ad cotonei mali colorē perueniant. Dein  
de cerā ac resinam liquefactas ac excolatas addito, &  
ubi parū ebullierint, ammoniacū leuissimè tritū, &  
aqua aut aceto dilutū ammisceto, & mox galbanū  
tritum addito, & tandē ab igne amoris myrrhā in-  
spergito. Melinū Pasionis Athanasia inscriptū, ad  
ueteres sinus, etiā si usq; ad uacua perforati fuerint.  
Idem puerorū strumas recentes discutit. Facit & ad  
articulos distortos ac lacinatos, sicut Hieras & Gale-  
nus testantur. Spumæ argenti, resinæ pinus sicce, sin-

gulorum drach. c. ceræ drach. xii. s. olei, uini ueteris  
odorati adstringētis, singulorum heminæ dimidiū  
Spumam argenti cum uino ad solem æstiuum plu-  
ribus diebus terito, donec fuerit exiccata, & postea  
cum oleo ad lentum ignem coquito, donec non am-  
plius inquinet. Postea ceram ac resinam adijcito, præ-  
parato, ac utitor. Emplastrum Venus appellatum,  
ad multa cōmodum. Omnem duritiā dissoluit, stru-  
mas discutit, spicula & aculeos extrahit. Ad uenenū  
eiaculantū bestiarū morsus mirificè cōmodum. Fi-  
stulas & sinus glutinat. Podagricis per exacerbationē  
interualla utiliter imponitur, & coxædici diuturna  
medetur, spumæ argenti unc. xxv. ammoniaci thy-  
miamatis dextantē, colophonix unc. xvi. æruginis,  
galbani, sing. sextantē, bdellij, opopanacis, sing. qua-  
drantem, myrrhæ, aristolochiæ, sin. un. i. olei antiqui  
lib. ii. Oleum cum spuma argenti coquito, & in me-  
dio cocturæ tempore æruginē adijcito, & donec nō  
inquent bullire finito, deinde colophonix liquatā  
& excolatā addito, & ab igne ablatis, aristolochiam  
ac myrrhā aceto trita, cū galbano, bdellio, ac opopa-  
nace ammisceto, & in mortariū transfusa subigito,  
unito, ac utitor. Aliud emplastrum Venus appella-  
tū. Facit ad eadē uelut præcedens, & est ad podagras  
per exacerbationē interualla ualde insigne. Olei an-  
tiqui lib. iii. spumæ argenti lib. ii. ammoniaci thy-  
miamatis lib. i. ceræ unc. xxi. colophonix dodran-  
tē, galbani, æruginis, singul. quadrantem, resinæ pinus  
unc. xvi. myrrhæ trientē, præpara, uelut dictum est.  
Emplastrū Panacæa, emolliens ac discussoriū. Ceræ  
bessæ, colophonix, terebinthinæ, sing. lib. i. ammo-  
niaci thymiamatis sexuncē, galbani, opopanacis, pol-  
linis thuris, olei, sing. un. i. uini quantū satis est. Em-  
plastrum è rumice, ad multa commodum, abscessus  
discutit ac rūpit, strumas molli. Ceræ, resinæ, adipis  
porcini, foliorū rumicis uiridium probè cōusorū,  
spumæ nitri, ammoniaci thymiamatis, sin. lib. i. præ-  
para, & usus tempore cum oleo antiquo emolli, ac  
utere. Emplastrū è perna, omnē duritiā, strumas, gā-  
glia, meliceridas, & reliqua huiusmodi dissoluit, si-  
nus glutinat. Facit ad furunculos, abscessus, neruorū  
per cōsensum affectiones, confert pleuriticis, coxen-  
dicūq; ac articulorū affectionibus. Pinguedinis suillæ  
è perna antiquissima, spumæ argenti, sin. lib. iii.  
resinæ pinus lib. i. ammoniaci thymiamatis quadrā-  
tē, galbani, thuris, euphorbiæ, sin. un. i. pinguedo ue-  
rò de perna sic parāda est. Pernā suis antiquā in olla  
fistili cū aqua præsertim marina coquito, & eius iu-  
sculi excolati ac refrigerati pinguedinē cōcretā, cū su-  
perstantē, tum subsidentē accipito, & expurgatā ad  
medicamentū præparationē asseruato. Cum hac itaq;  
liquata spumæ argenti ab lentū ignē coquito, donec  
nō amplius inquinet, deinde ammoniacū adijcito tri-  
tū, & postea resinā excolatā, & thus minutissimè tri-  
tū: his uerò unitis galbanū præmolliū addito, & sub-  
lato ab igne medicamēto, euphorbiū ammisceto, ac  
utitor. Emplastrū è perna; Galeni. Callosas instar ro-  
phorum concreciones dissoluit. Pinguedinis pernae  
suillæ præparatæ, uelut dictū est, lib. i. ammoniaci thy-  
miamatis, casei bubuli aut caprini uetustissimi, adi-  
pis taurini, apochymatis, hoc est, resinæ cū cera ex na-  
uigijs derase, sing. lib. i. medullæ ceruinæ bessæ, cēs-  
pi quadrantē, opopanacis unc. i. olei cyprini sexun-  
cē, uini quantū satis est: cætera liquato ac excolato.

Caseum



Caleū uerò cū uino terito ac liquefactis adiūcto, præparato, & in mortario manibus emollito. Emplastrum mollitorium Lucij præceptoris, ad distortos articulos inscriptum. Facit ad abscessus profundos, neruos & articulos contractos. Prodest opisthoroniciis neruorum per consensum affectionibus, eximit lassitudinē oleo cyprino aut irino, aut laurino dilutum. Item ad duricias diuturnas ac ægrè curabiles. Bdellij, adipis uitulini, ammoniaci thymiamatis, iridis Illyricæ, sin. dra. xvi. opopanacis dra. l. galbani, canchryos, styracis, thuris, sing. dra. viii. piperis grana clx. ceræ, terebinthinæ, singul. sexuncem, olei irini æstate quidem sextantē, hyeme uerò quadrantē, uini quantū satis est. Ceram cum oleo liquefacito, & ammoniacū, bdellium, ac thus trita ammisceto. Et si thus ægrè teri possit, uino madefactū conteratur: & his omnibus probè unitis, terebinthinā ac styracem addito, deinde ab igne ablati, iridē, cāchry, & piper minutissimè trita adiūcto, & postremū opopanacē uino dissolutū affundito, & probè subigito. Hoc medicamentū supremi ordinis est emollientiū: nec facile reperias quod magis induratas partes molliat, ac duritiā discutiat. Emplastrum ē psyllio, experimento cōstans. Strumas resiccat ac discutit, furunculos dissoluit, inguinū ac alarū abscessus etiā in pus transmutatos discutit, sinus glutinat, ganglia diffundit, clauos in manibus ac pedibus exterit, carbūculos sanat, uirilignes emēdat. Radicis althææ tritæ cribratæ un. i. psyllij triti cribrati sextantem, stercoris columbini minutissimè triti, axungiae ueteris purgatæ, singulorum quadrantem. Picis siccae lib. i. mastiches nigræ Aethiopice quadrantem, aut si haberi nō potest, Chie tantundem, quæ liquari possunt liquato, & ab igne amotis arida ammisceto, & frigefactū medicamentū probè manibus subigito, atq; usus tēpore, chartæ aut corio inducito. Mollitorium ex ruta. Articulos manuum contractos mirificè emollit. Ceræ trientē, terebinthinæ sextantem, galbani, opopanacis, cæsyi, castorij, singul. unc. i. euphorbij trientem, rutæ sextantem. Liquabilia liquefacito, & euphorbium, castorium, singula seorsim trita, cum opopanace acrutæ folijs in mortario contritis simul subigito, & ad liquefacta ammisceto. Aliud emolliens.

Strumas, parotidas, furunculos, panos ac meliceridas dissoluit. Ladani mollis, bdellij Scythici resinof, propolis recētis ac mollis, ammoniaci thymiamatis, terebinthinæ, æquales portiones præpara & utere. Aliud molliēs ac discutiens. Facit ad strumas, parotidas, meliceridas, itemq; atheromata. Vitmur eo etiā ad uasorum dilatationē. Spumæ argenti dra. c. colophonie, adipis caprini, singu. drach. lxx. ceræ, rubricæ, uisci, singul. drachm. xl. lapidis pyritæ drachm. xvi. picis drac. xxiii. calcis uiuæ marmoracæ drach. xxii. galbani, ammoniaci thymiamatis, bdellij, singul. drach. xvi. cerussæ, aloës, myrrhæ, bituminis, mannæ thuris, dictamni, singulorum drach. xii. olei antiqui lib. iii. spumā argenti, oleū, cerussam, adipem, simul ad bonam compagem coquito: deinde ammoniacum & bdellium trita adiūcto, & his liquatis primum uiscum, deinde lapidē pyritē, ac calcem, & cætera sicca trita addito, & omnia unita, frigefacta, manibus subigito, ac utitor.

Aliud, abscessus ac strumas discutiens. Candidum canis finum terebinthinā excipe, ac utere. Aliud. Se

dat inflammata, strumas, hernias carnosas, & omnē duriciam emollit. Caricarū pinguium, nitri costi, seminis nasturtij, singulorū æquales partes cum melle emplastri forma excipito, ac emollito. Emplastrum ē buglofso. Duricias dissoluit. Buglofsi bellem, spumæ argēti quadrantē, ammoniaci thymiamatis sextantem, adipis porcini sexuncem. Olei antiqui tantundem. Emplastrū Persarum ē lapidibus, Tyrrhenicū & Pampathes appellatū. Vesicæ & rhenum callos cōfringit impositum. Callos in manibus ac pedibus dissoluit: citra molestiā enim eos suppurat, & est post septimā tādē diem exoluendum: idem etiam in steatomatis, strumis, gutturis tumore, gāglijs, & similibus facit. Ad egilopas & fistulas antiquas, præsertim sedis, sub alis inguinum ac mammarū, uelut mysteriū diuinum habetur, in his autem quinta exoluendū est, & callus fistulæ derafus apparebit, nec desistendū est ab eius usu, donec callus penitus fuerit excisus. Facit & ad ulcera maligna, & ad ungues manuum ac pedum motos, ut à Deo missum putes. Ad herniam aquosam, hydropem, splenis tumorem, corio pro tumoris magnitudine inductū imponitur. In hydrope sanè antè ab alis usq; ad inguina, posterius à ceruice usq; ad lumbos: omnē enim aquā uidebis diuino quodā mysterio efferri, eoq; uteris donec res melius habere uidebitur. Ad anhelosos insuper ac erecta ceruice spirantes, tabidos, & deploratos intus delitescentes abscessus, pilulas cum modico melle ex eius pastillis feci, easq; uiris, mulieribus, pueris, senibus, exhibui, & deploratos reuiuiscere uidi. Idem & in pestilentibus constitutionibus feci, & plures à peste liberaui. Verum desino plures aliās eiusdē uires recensere, ne tantum Dei munus aliquis fabulā putet. Spumæ argēti lib. i. ceræ un. xvii. ammoniaci thymiamatis quadrantē & semunciā, propolis unc. xvi. s. galbani sesquiunciā, squamæ aeris unc. i. lapidis phrygij unc. xviii. resinæ pinus siccae lib. i. diphrygis sextantē & scrup. xviii. aeris usti un. i. thuris sextantem, & obo. iiii. radicis aristolochiæ rotundæ un. xl. & scrup. xvi. lapidis magnetis uiuentis ac trahētis un. i. aloës sextantē & semunciā, dictamni quadrantem. Cinnabaris cōmunis scrup. xviii. adipis struthocameli lib. ii. lapidis pyritæ sextantem, lapidis uitæ scythici scrup. xviii. lapidis hæmatitæ unc. i. cadmiæ ustæ trientem, gentianæ, aristolochiæ longæ, lapidis parciaci, aut pro eo gagatæ, singul. unc. i. betonicæ, radicis chamæleonis nigri, singu. unc. i. in alio exemplari, scrup. xviii. æruginis un. i. olei antiqui lib. i. in alio lib. ii. floris salis, aceti scillitici, singulorū quantū satis est. Spumā argēti & lapides omnes primū seorsim, deinde simul tritos, ad salis florē ammisceto, & ad fecis compagē simul cōterito. Deinde æruginem & æs trita adiūcto, postea thus, aloēn, ammoniacū, singula seorsim trita addito, & mox galbanū, & semper florē salis addendo cōterito. Postremū herbas minutissimè tritas ac cribratas immittito, & rursus flore salis addito cōterito ac subigito, & cum aceto scillitico pastillos & massas formato. Quæ uerò liquari debent, priuatim liquefacta seruato, & ubi medicamentum in usum assumere uoles, ammisceto. Cæterū locus cui adhibēdum est medicamentū, oleo ne inquinetur. Aliud, strumas discutiens. Spumæ argēti lib. i. olei antiqui sesquilibram, auripigmenti unc. i. spumā argēti cum



ti cum oleo coquito, donec non amplius inquinet. deinde auripigmentū prius cum olei sextante tritum adijcito. Vtere cōfidenter, & ne contempseris uilitatem. Aliud ad strumas. Spumæ argenti sexuncē, æruginis ferri sextantē, ammoniaci thymiamatis, olei antiqui, singulorū bessem. Spumā argenti, æruginē, & ammoniacū, singula seorsim trita coquito, ita ut æruginem & spumā argenti cū oleo primū coquas, & ad semicocta ammoniacū adijcias, sinasq; ebullire donec non amplius inquinent. Aliud ē sale, Democratis, omnē duritiā discutit. Salis triti, cerussæ, singul. lib. i. galbani, propolis, aristolochiæ, singulorum sextantem, olei ueteris libras ii. & si crassius fuerit pharmacum, aliā adhuc olei librā adijcito. Cerussam & sal cum oleo coquito, donec nō inquinet. Deinde galbanum & propolim, postremum aristolochiā, singula trita addito, ac preparato. Aliud eiusdem. Discutit strumas, omnem frigidum humorem absorbet, hepatis ac splenis aquosas affectiones sanat, urinā prolestat, coxendices ueteres curat. Cerae, resinæ pinus, colophonix, sing. lib. i. calcis uiuæ, aluminis scissi, auripigmenti, sing. unc. i. liquabilia cum modico oleo liquato ac excolato, deinde ad arida cū modico aceto trita ammisceto, ac utitor. Posse hoc diuturnas uiscerum duritias dissoluere constat, ita ut multā humiditatem extrahat. Ciet quoq; mēses diu suppressos. Ego uerō ablata calce, duplum aluminis adijdo, & medicamentū longē præstātius cōperio: neq; enim pustulas excitat. Emplastrum Philagrii discussoriū. Curat gutturis tumores, & duritias discutit. Spumæ argēti dra. l. resinæ pinus dra. xl. olei antiqui dra. lxx. æris uisti, ammoniaci thymiamatis, sing. dra. viii. aluminis scissi, mānæ thuris, sing. dra. iiii. ceræ dra. l. spumā argenti cū oleo coquito, & ad semicocta æs adijcito, & bullire finito donec nō amplius inquinet: deinde ammoniacū tritū addito, eoq; liquato resinā & cerā liquatas ac excolatas affundito, ac rursus ad cōpagem nō inquinārē coquito, ac mox galbanū præmollitum addito, & ab igne ablatis, thuris mannā inspergito, unito, & frigefactū medicamentū manibus subigito. Emplastrū discussoriū abscessuū admirādum: nulla enim ruptione abscessus facta, pus crassissimum in emplastro inuenitur, idq; detergēdū est, ac medicamentū reparatum, rursus imponendū. Colophonix lib. i. ceræ sesquialbrā, olei hyeme cyathū i. æstate uerō dimidiū. Nitri berenicarj fului aut albi & friabilis sexuncē. Cetera liquefacito ac excolato, nitrū uerō minutissimē tritum inspergito, & probē uersato, perfrigerataq; manibus emollito, & in massam cogito. Obseruandum est ne medicamentum in aquā transfundamus: aliās enim nitrū abolebitur. Aliud. Picis siccae, ceræ nouæ, sing. lib. ii. olei lib. iiii. ad lentum ignē coquito, subigito, ac utitor. Facit ad abscessus, strumas, fistulas, & alia huiusmodi. Aliud Oribasi, ad strumas, & alarū ac inguinum & colli tumores duos. Papatueris corniculati folia cum axungia & propoli piniguiterto, & imposito. Aliud ad strumas & omnē duritiā. Verbenacæ rectæ foliorum uiridum dra. xlii. hyoscyami uiridis dra. cxliiii. adipis porcini, resinæ pinus siccae drachm. xlv. picis drach. xxiiii. Liquabilia liquata ac excolata cū herbis tritis committito. Aliud ē rumice. Foliorū rumicis, perdicj, senecionis, resinæ pinus, singu. dra. xlviii.

foliorum hyoscyami, axungia antiqua, singu. dra. xcvi. galbani dra. viii. liquabilia liquefacito, ac cū herbis cōmittito. Aliud ē rumice. Ad strumam & omnem duritiā, ad alarum ac inguinum abscessus, ad ulcera maligna & fistulas, ad ueri stragulatū. Facit & ad splenē indurātū. Alij nucleos xv. ceræ dra. xcvi. olei dra. xcvi. nitri Alexandrini dra. xlviii. æris uisti, terebinthinæ sing. dra. xxiiii. thuris dra. viii. foliorum rumicis in olla uel charta sub calēd cinere resicatorū dra. xlviii. Liquida cū aridis tritis cōmittito, & in mortario subigito. Alia uerō in oleo friata terantur. Aliud ē scolopendrio, philosophi. Discutit abscessus, furculos, & ad multa cōmodat. Colophonix lib. ii. ceræ, axungia recētis, sing. lib. i. resinæ pinus bessem, olei sexuncem, scolopendrij sextantem. Vini antiqui sextarios ii. pollinis tritici un. xiiii. tritici pollinem cum uino coquito, deinde liquida affundito ac unito, & postremū scolopendrium addito, ac utitor. Quod si oleū reprobas, pro eo axungia sexuncem accipito, & magis emolliet: at si oleum receperit, magis discutiet.

De emplastro ex aspidibus.

Cap. xv.

Emplastrum ex aspidibus, strumas & alias duritias discutit. Facit & ad podagras per exacerbationū interualla adhibitum. Terebinthinæ, lapidis asij, bituminis, sing. dra. ccc. lx. spumæ nitri, adipis uisuli, ceræ, baccarum lauri, ammoniaci thymiamatis, sing. dra. ccc. xl. lapidis pyritæ, calcis uiuæ, sing. dra. cxx. cineris aspidum uiuarū uistarū dra. cxi. olei antiqui lib. ii. Oleū & cerā primā, deinde bitumen tritum liquefacito, & ad hæc adipē, mox ammoniacū, & terebinthinā adijcito. Et his ab igne ablatis, calcem, & lapidē asium ammisceto, deinde baccas lauri & nitri spumā. Postremum autē aspidum cinerē frigefacto medicamēto inspergito, ut ne pereat, omniaq; simul subige ac utere. Cæterū ad aspidū exustionem, ollā totā forinsecus argilla crassius oblinito, & ad solem siccato. Et iniectis aspidibus ollā operito, & probē munito, duobus aut tribus foraminibus relictis, ex quibus cognoscas ubi uapor purus exhalat. Hoc emplastrū oleo gleucino dilutum & illitum articulorū affectiones ac coxendicum resolutiones curat, & cū laurino oleo illitum uirilignes albas exterit.

De emplastro Aniceto, Critonis.

Cap. xvi.

Emplastrum Anicetum, id est, insuperabile appellatū, in multo nobis usu est. Attrahit, rumpit, expurgat, glutinat, pus per splenium educit. Collyrium ex eo in sinus inditur. Diffundit duritias, & cōtractis neruis opitulatur impositū citra irrigationē, ut ne perfrigerentur. Vngenti uicē explet dissolutū uelut ungentū ad lassitudines eximēdas paratum: sedat enim lassitudines in principijs morborum, & ex obscura causa obortas. Est & extremarū partiū mollitoriū, in magnis splenij impositum. Glutinat etiā cruenta uulnera, post futurā, aut hamulos impositos, ita ut lintheum cōplicatum solo aceto imbuitū splenio superponatur, æstate frigido, hyeme calido. Facit & ad plātarū offensas, putredinesq; ac digitorum affectiones, & ad fracturas cum uulneribus, & neq; incarnāte, neq; cicatricē inducēte alio utendū est, sed ipsi soli fidendū. Facit etiā ad hominum, canum, ac ferarum morsus. Maxima uerō eius promissio est, quod nō sinat fieri abscessus oculos in colo & mēbrana aluū ac intestina ambiente, si sanē non fuerint suppurati, aut si



aut si fuerint facti, quod eos attenuet, & ad intestina eorū ruptionē diuertat. Oportet autem spleniū ad locū imponere, & hapsū lanæ aut linteum superponere, aceto & oleo calido imbutū, & irrigare bis per diē. Ne solueris autē, nisi per tres aut quatuor dies. Deinde fomento ad uaporem adhibito, rursus impone. Appellationem accepit, ab admirandis ac multis operibus. Squamæ æris drac. lviij. pyrethri, staphidis syluestris, grani cniidij, seminis sinapis, cāchrysos, stercoris columbini, aristolochiæ tenuis, æruginis, misyos cyprij, seminis erucæ, cumini, sing. dra. xvi. nitri, salis ammoniaci, sin. dra. xxxij. mānæ thuris, baccarū lauri, iridis, singul. drac. cxx. aceti acerrimi sextarios xvi. caricarū decocti cyathos v. Decoctū porrō caricarū sic paratur: Caricarū pinguiū li. v. in aque sextarijs vi. coquuntur ad tertias. Omnia itaq; cōtusa ac cribrata simul cū aceto terito sub caniculæ feruore. Vbi uerō siccū & uiride euasit medicamentū, affundito caricarū decoctū ac cōmollito, & ablātū in æris rubri pyxide seruato. Vsu autē postulāte, medicamentū partem unā cum aceto ad strigmentitiā spissitudinē dilutā, cum ceræ ac colophonij modico oleo liquefactarū partibus sex cōmittito. quod si durius efficere uolueris, ceræ & colophonij quatuor partes sumito. Sin mollius & magis dilutū, octo ammisceto. Idem & ad impetigines feras conuenire dicitur, si meracius adhibeatur. Aliud, discutiens abscessus. Ceræ, terebinthinæ, nitri, butyri, æquales portiones committito. Aliud ad abscessus. Verbenacā rectā cum nitro, sulphure, & resina liquida committito, ac utitor.

*Emplastra ruptoria.*

Cap. xvii.

Emplastrū scalpelli usum explens. Nitri lib. iij. propolis, simi colubini, salis ammoniaci, æruginis, sing. sex uncem, aquæ marinæ aut muriæ sesquilib. olei antiqui lib. iij. arida seorsim primū terito, deinde æruginem, nitrū, & sal, simul in mortario leuissimē cōterito, & mox affusa aqua rursus probē terito, & mox oleū quoq; ammisceto, ut strigmentitiā cōpages fiat, postea simul omnia in fictilē ollā cōiecta lento igne ad aque cōsumptionē coquito. postremū propolim premollitā adijcito, & ablato ab igne medicamento ac tepēfacto, simū columbinū inspergito, ac cōmisceto, & hoc linteū illitū, fastigiato ac molliori abscessus loco imposito: sit autē spleniū ex eo illitū minutū, & aliud amplū ipsi superponatur, cui emplastrū ē succis, aut melle, aut melinū Serapionis, aut Mnales, aut aliud mollitoriū sit inductū. Aliud perforās,

Ceræ unc. xvi. salis cōmunis, cerussæ, sin. dra. xl. cineris farmetorū uicis, harundinū Græcarū uistarū, æruginis, nitri rubri, sing. dra. x. Singulis seorsim tritis, deinde permixtis aquā affundito, & ad strigmentitiā spissitudinē cōterito. Postea cerussam cum olei quincunce aliquatenus coquito, & deinde cerā addito, simulq; bullire finito, donec non amplius inquinent, & ad reliqua trita ammisceto ac utitor. Aliud, perforās arundines & aculeos, & quęcūq; infixa, ac in profundo herētia extrahēs, & ulcera glutinās. Bituminis, nitri, sing. dra. xxv. aristolochiæ drach. xij. baccarū lauri dra. xx. præpara & utere. Aliud. Fimī columbini, nitri, sing. drach. iij. caricas numero vii. nitrū & fimū simul terito, & postea cū caricis cōtulis subigito, & linteū inducto, & si durius uidebitur, mel & axungia depuratā addito. Hoc eadē die

dissipat ac rūpit. Oribasij ruptoriū. Picis liquidæ, picis siccæ, propolis, portiones æquales unito, & adhibeto: rūpit & ad cicatricē perducit. Aliud eiusdē, extrahit, rūpit, & glutinat. Ammoniaci thymiamatis, propolis, aluminis, sing. sextatē, thuris sesquidrachmā, galbani, auripigmenti, sing. dra. i. Emplastrū ruptoriū. Succī ranunculi, auripigmenti, chalcitidis, lathyridis, squamæ æris rubri, uentriū cātharidū, sing. un. i. calcis uiuæ dra. ii. excipe cedria. Vsu tempore spleniū dimidij digiti latitudine, & longitudine quāta uidebitur, ex eo illinito ac imposito, & emplastrū ex succis emollitū superimposito. Sinatur autē ad horas iij. uel v. & caueatur ne neruus, aut uena, aut arteria attingatur, neue prius adhibeatur quām maturus fuerit abscessus: hoc etiā strumas rumpit.

Aliud, Oxynitrū appellatum. Cerussæ un. xx. salis fossilis dra. vii. nitri quadrantē & semunciā, olei ueteris trientē, aceti heminā i. omnia simul coquito donec nō amplius inquinent. Aliud sine molestia rumens. Ceræ, nitri, sing. dodrātem & semunciā, secis uini uisæ un. xiiij. auripigmenti dra. vii. olei antiqui lib. ii. liquabilia liquefacito, & ad arida trita ammisceto. Aliud ad strumas, ac omnē duritiā: aut enim discutit, aut molliat, & rūpit, purgatq; ac sanat. Succī potamogitonis, stratiotæ, ceparū acerrimarū, ceræ, propolis, pollinis tritici, sing. un. xvi. fermenti acidī, serapiadis tritesticularis, sing. sexuncē, tragacanthæ, resinæ pinus, sing. quadrātem. Aliquī etiā horū sexuncem adijciunt, galbani, opopanacis, olei antiqui, sing. dodrātem. Tragacanthā in parte aliqua succorū madefacito, similiter opopanacē, & galbanum seorsim madefacito ac terito. & his postea fermentū cum succis subactum ammisceto: postea oleo & resinæ liquatis & excolatis, propolim emollitam adijcito, & ad hæc tritici pollinē inspergito & unito: postremū omnia in mortariū trāsata manibus probē subigito. Aliud, abscessus dissipās, uel rūpens. Vitriū, specularis præsertim lapidis minutissimē tritum, & thus, æquis partibus cū aceto probē trita, pēna illinito. Ruptoriū efficax. Bulbū Aphricanū, nasturtiū, nitrū, simū colubini, ficus aceto premaceratas, axungia depuratā, æquis portionibus oīa cū melle ad emplastrī formā subigito, ac imposito pro partis ratione, quā rūpi uoles. Aliud, discutiedī ac extrahendi uires habēs. Ad strumas & gutturis tumore mirū in modū cōmodū: olei ueteris lib. iij. plūbi lib. ii. coquito simul donec nō amplius inquinēt, deinde terebinthinæ, galbani, sing. sexuncem, ammoniaci thymiamatis sextatē ammisceto, ac utitor. Aliud Oribasij. Candidum canis stercus terebinthina excipe, & impone.

*Emplastra discussoria & attractoria.* Cap. xviii.

Qui cōpositorū pharmacorū facultates descripserunt, quædā emplastra attractoria appellauerūt, sicut quædā discussoria: aliquibus uerō testimonium præbuerunt utriusq; facultatis: sunt em̄ uicinæ inter se facultates, attractoria ex profundo, & discussoria attractorū. Nam quę attrahūt, omnino etiā discutiunt, & quę discutiūt, etiā attrahunt. Et prædominatur in discussorijs quidē medicamentis facultas discussoria. In attractorijs uerō attractoria: attractoria porrō ex simplicibus cōposita sunt, quæ uim habent humorū superfluitates ex profundo ad cutem attrahendi. Discussoria autē ex his quę uim habēt discutiendi attracta. Quò itaque emplastrī forma fiat, aliq; spuma ar-



gēti miscetur, aliq̄ resina, aliq̄ oleum, aliq̄ cera, aliq̄ pix: quum talia neq̄ discussoria memorabilē, neque attractoria uim habeāt, quemadmodum propolis, galbanū, calx, medullā, aliā petræ flos, spuma nitri, acetum, piper, sinapis, herba lanaria, sal cibarius & ammoniacus, & multa huiusmodi quæ in superioribus Sermonibus de simplicibus cōmemorauimus. Ceterū aliqui adstringentia medicamēta attractoria ammiscuerunt, uerū id quod fieri solet, in his quibus superflui sunt humores: attrahūt enī aliquādo plus quā cōuenit, ut ne solū ex parte quæ curatur à profundo attractionē faciāt, sed etiā ex omnibus circūfictis eliciāt. Eius uerō meminisse oportet, quod suprà de incarnatibus medicamētis relatum est, attractoria & discussoria, & quæ magis quā oportet detergēt, omnia fieri incarnatū per ceram ammixtionē, ita ut his quæ fortia sunt, amplius, quæ uerō debilia, minus de cerato ammiscatur. Atq̄ hac ratione diuturna ulcera cicatricē respuētia, putrida & serpētia, per emplastra ex sale, ac reliqua huiusmodi, cerato ammixto repurgātur, & cicatrice includuntur. At si medicamento attractorio aut discussorio ammixtū fuerit aliquod adstringens, eo pharmaco nō est utendū ad incarnandum, eo quod facultas adstringendi, ad uulnera quidem glutinanda, & sinus, & ad ulcera cicatrice includenda utilis est, uerum inutilis ad incarnandum: ceterum emplastra attractoria ac discussoria faciunt ad omnes panos, ac inflammationes induratas, ad furunculos, strumas, atheromata, hominum ferarumq̄ morsus. glutinant etiā sinus, quibus asperi aut flaccidi ac marcidi calli insunt. Podagricis itē ac arthriticis in declinatione auxiliantur. Frigidos enim & crassos humores ab articulis exugunt. Et si discussoria ac attractoria medicamenta in memoriā reuocaueris, tum suprà relata, tum describēda, facile fuerit eorum utilitatem ac usum comperire. Emplastrum, ad omne panorū genus discutiendū & attrahendum, quod ab abscessu etiā in pus trāsmutato, citra cutis celsurā, pus uelut per colum exugit. Desiccet etiā sinus forinsecus impositū efficacissimē. Radicū siccarum hyoscyami, & cucumeris syluestris, farinæ ordeī, singulorū quincuncem, terito & cribrato, ac hyoscyami succo aspergito, & in pastillos cogito, eosq̄ in umbra quotidie uersando siccato, & usus tēpore aqua diluito, ac crassius illinito. Ego uerō inquit, etiā corticum radicis capparis dra. ii. & succi scamini dra. i. si habere potui, adieci. Emplastrū attractoriū album. Ad strumas ac parotidas & particulares abscessus. Facit & ad fistulas ac ægilopas, ut citra sectionē liberet. Facit & ad fluida ac ægrē curabilia, & ad hydropicos. Spumæ argenti, cerussæ, salis, singulorum drac. lxx. olei ueteris libras duas, singula seorsim trita cū oleo in mortario subigito, tum in ollā coniecta, assidue agitādo coquito, donec nō amplius inquinēt, & in mortariū trāslata frige factaq̄ probē tundito, mollito, ac utitor. Aliud, occultos abscessus discutiens, rosaceo dilutum duritias dissoluens, uetera ac putrida ulcera repurgans ac incarnans. Cerussæ, ceræ, singulorum lib. ii. olei ueteris libras iii. atramenti futorij, salis cōmunis, singulorum sexuncem, nitri lib. i. aceti quantum satis est, cerussam cum oleo ad bonā compagē coquito, deinde ceram adijcito, & hac liquata ad arida trita in mortariū diffundito, & omnia probē subigito,

unito, ac utitor. Aliud, attrahens, rumpens, ac cicatricem inducēs. Picis siccæ, picis liquidæ, propolis, æquales portiones cōmittito ac utitor. Aliud attractorium, huic Philagrius testimonium præbet. Irisdis, mānæ thuris, spumæ nitri, pumicis, singu. drach. viii. ammoniaci thymiamatis drach. xxv. galbani drach. vi. cāchryos drach. xii. ceræ dra. c. olei lib. ii. æstate uerō unc. xv. ceræ cum oleo liquatæ ac excolatæ, ammoniacū tritum adijcito, & eo liquato galbanum præmolliūt addito, & ab igne ablata aridis minutissimē tritis ammisceto, ac simul commollito.

Andromachi Melinum, abscessus profundos reformat, & habet exactam ponderum proportionē. Facit ad strumas, gangliā, meliceridas, atheromata, panos, parotidas, furunculos. Perforat abscessus, fistularum callos atterit, sinus glutinat. Cerussæ, salis fossilis, olei antiqui, sing. lib. i. ceræ, colophonis, singulorum quincuncem, ammoniaci thymiamatis quadrantem, opopanax, galbani singul. unciam i. Salitritum, & cribratum, ad minutissimum puluillum redigito: deinde cum aqua marina præsertim probē subigito, & cerussam simul terito: deinde oleum affundito, & omnia probē unita ad bonam compagem coquito, & adiecto ammoniaco bullire finito, donec non amplius inquinēt. Postremum liquabilia liquata cum galbano & opopanaxce madefactis ac præmolliis ammisceto. Aliud, ad strumas, gangrænas, antiqua, & chironia ulcera.

Spumæ argenti, olei antiqui, auripigmenti, sing. lib. i. Spumæ argenti cum oleo coquito, donec nō inquinēt, & ab igne ablatis, auripigmentum cum olei sextate tritum adijcito, & ebullire finito, donec medicamentū nigrescat, & postea in mortariū trāslatum primū pistillo, deinde manibus diligētē subigito ac utitor, ad strumas quidē ac duritias sincero & meraco: ad podagras uerō & ulcera, cum oleo diluito. Facit & ad carbunculos. Aliud attractoriū, Orisbasij. Spumæ argenti, cerussæ, nitri, ceræ colophonis, ammoniaci thymiamatis, singulorū trientē, olei ueteris lib. iii. spumæ argenti, cerussam, nitrū, oleū, cum lixiuū ē cinere ficulneo libris duabus coquito, donec nō amplius inquinēt, deinde ammoniacum tritū, postea cerā, mox colophonis adijcito. Præstat tamē pro nitro, spumam nitri inijcere. Aliud, ad strumas, gangliā, parotidas, mammarum abscessus, mirificē efficax: tumores enim dissoluit, & impactum humorē per occultos meatus educit, sinus agglutinat, fistulas & ægilopas citra sectionem curat. Cere, terebinthinæ, nitri fului, olei ueteris sing. lib. i. aquæ heminā i. Andromachus pro aqua lixiuū ponit. Nitrū tenuissimē terito per se, & mox cū aqua, ut penitus diluatur, & postea in fictili coquito, & cooperitū per interualla uersato, & post sedatū feruorē, liquabilia liquefacta affundito, assidueq̄ agitato donec nō amplius inquinēt, & in mortariū trāslata, frige facta probē emollito. Aliud, quo Menecrates utebatur. Ad strumas ac mammarū duritias, peculiare auxilium: tumores em discutit, & ferē non rumpit, sed tenuissimas riumulas infert, per quas uelut per colum impactus humor excernitur. Sinus etiā glutinat, & ad cicatricē perducit. Ceræ, terebinthinæ, spumæ nitri, galbani, resinæ pinus, olei antiqui, sing. lib. i. cineris quercini ac ficulnei, singulorum sextarium unū. Pēdet autē cineris sextarius unc. x. Liquabilia liquata ac



ra ac excolata coquito, deinde galbanum præmolli-  
tū adijcito, & ab igne ablatis cineres ammisceto, &  
probè subigito, & utitor, ita ut primum quinta die,  
postea tertia exoluas, donec tumor perforetur. Dein  
de uerò quotidie soluas ac cures. Aliud attractoriū  
ac discussoriū efficax. Abscessuū humores citra ru-  
ptionē per cæcos meatus uelut excolar, ac diffundit.

Olei antiqui unc. x xii. ceræ albæ uncias xv. aphro-  
nitri albi quadrātem, terebinthinæ librā i. lixiuū ē ci-  
nere quærneo aut ficulneo sextariū i. spumā nitri, si-  
ue aphronitrum cū lixiuio per pistillum ad strigme-  
ntiā compagem terito. Cerā uerò cum oleo liquefa-  
cito, & terebinthinā ammisceto, & ab igne ablatis,  
alsidueq; uersatis ac frigefactis, spumam nitri ammi-  
sceto, subigito, ac residuū lixiuium paulatim adstilla-  
to. Aliud, Dionysia inscriptum. Hierē Cappadocis  
confert ad relatas affectiones, & ad mammarum ac  
aliarum partium induratas inflammationes præci-  
puum est. Ceræ, terebinthinæ, mānæ thuris, spumæ  
nitri albi, sing. lib. i. olei antiqui lib. ii. aque siue lixi-  
uū coactiliariolorum sextariū i. misyos crudi sextiāte.  
Misy & spumam nitri cum dimidia lixiuū parte te-  
rito. Ceræ uerò cum oleo liquatæ terebinthinā adij-  
cito, ac paulatim ad compagem coquito. Et ablatis  
ab igne, mannam thuris inspergito, & alsidue agitā-  
do frigefacito, & ad reliqua prius trita ammisceto,  
residuū lixiuū paulatim instillādo, donec totum fue-  
rit absorptum. At ubi inflammatione discussa, & do-  
lore sublato, durities aliqua restiterit, hoc medicamē-  
tum remouebis, & pro eo melinū, aut Venus inscri-  
ptum, aut aliud emolliens ac discutiens adhibebis.

Aliud attractoriū ac discussoriū, longo usu cogni-  
tum. Colophonix lib. i. ceræ sesquiunciā, nitri sexun-  
cem. Olei hyeme quidem cyathū i. æstate uerò dimi-  
diū. Nitrum cum aqua, uel posca, uel aceto tritum,  
prout res postulat, cum liquabilibus liquatis cōmi-  
sceto, ac manibus subigito, obseruando ne nimia  
aque copia ad nitruū affundatur, & in pastillum cogi-  
to. Facit hoc ad carbunculos, furunculos, strumas,  
abscessus, fistulas, egilopas. Humore per cæcos mea-  
tus citra ruptionē exugit, ut emplastro impactus ui-  
deatur. Emplastrū Piscatorium inscriptū. Nitri unc.  
i. salis cōmunis, cerussæ, singulorum drac. viii. pro-  
polis drac. x xiiii. galbani drac. viii. medullæ ceru-  
inæ lib. i. olei ueteris lib. ii. aristolochiæ unc. i. Erit au-  
tē medicamentum præstātius, si pro oleo medulla su-  
matur, ut sint medullæ lib. iiii. Aliud Piscatoriū, lō-  
go usu constans. Nitri dra. x viii. stercoris columbi-  
ni, salis cōmunis, cerussæ singulorū dra. viii. Aristo-  
lochiæ rotundæ drach. x viii. propolis dra. x xiiii.  
galbani dra. x xvi. medullæ taurinæ, olei antiqui,  
singulorum lib. iiii. Cerussam, sal, nitrum, singula  
seorsim trita, ad emplastri compagem simul coqui-  
to, & postea propolim ac galbanum adijcito, & ab-  
latis ab igne, stercus columbinum & aristolochiam  
ammisceto. Aliud, ad strumas, & reliqua huius-  
modi usu cognitum. Ceræ libr. i. colophonix dextā-  
tem, auripigmenti, galbani, opopanacis, myrrhæ,  
haleyonij, sing. unc. i. adarcæ sextantem, floris salis,  
misyos, singul. sesquiunciā, atramenti sutorij, alu-  
minis scissi, singul. sextantem, & scrup. vi. aluminis  
rotundi, aluminis liquidi, singul. unc. i. & scrup. iiii.  
sulphuris uiui sextantem, & scrup. vi. nitri drachm.  
x viii. salis communis drachm. x lvi. terebinthinæ

quadrantem, olei lib. i. aquæ marinæ lib. i. & sextan-  
tem. Colophoniam cum oleo dissoluito, deinde ce-  
ram, mox terebinthinam adijcito, & simul ebullire  
finito, & ab igne ablata, ad arida prius seorsim, &  
postea simul cū aqua marina trita ammisceto, subi-  
gito ac utitor. At uerò ubi superficiem ignitā, & lo-  
cum ruptura uideris, infra scriptum emplastrum ad-  
hibeto. Spumæ argenti, plumbaginis, singulorum  
lib. i. picis siccæ, galbani, chalcitidis crudæ, æruginis,  
squamæ æris rubri, mannae thuris, singulorū drac.  
x xii. salis assati, uisci, singulorum drachm. lxxii.  
olei lib. ii. Spumam argenti, plumbaginem, chalcit-  
idem, squamam, cum oleo coquito donec nō inqui-  
nent, & ad compagem redacta fuerint. Deinde liqua-  
bilia ammisceto, simulq; paulatim bullire finito. Po-  
stea uiscum adijcito, & demum arida addito, ac frige-  
factum medicamentum manibus subigito, ac uti-  
tor, usque ad sanationem.

Emplastrum Nechepsonis, ē cupresso. Cap. xix.  
Facit ad strumas, tumorem gutturis, parotidas, omnē  
duritiā, & totum laxorum tumorum genus. Cu-  
prepsi folia uirentia in uigore minutissimè terito, ui-  
no insperso quod à uinaceis post primi uini colle-  
ctionē exprimitur, efficitq; solidi strigmenti crassitu-  
dinē, ac locis affectis imposito: omnem enim tumo-  
rem discutit, & si strumis imposueris, tertia die solui-  
to, strumasq; cōtractas, & uicinas ac incūbentes par-  
tes desquamatas cōperies. eas itaq; digitis exprimito  
ac dissoluito, & medicamētū rursus adhibeto, ac ter-  
tia die rursus soluito, iterūq; ualidissimè exprimito,  
& tertio medicamentū adhibeto, ac similiter exolui-  
to. Intra septē enim aut summū nouem dies, strumæ  
abolebuntur. Vtere hoc auxilio uelut admirādo, &  
tanquā naturalē quandā proprietatē habente, aduer-  
sus hanc affectionem. Nā si aliquid ammiscere, aut  
aliquo modo ipsum permutare uolueris, magis offi-  
cies quā proficies. Facit & ad gutturis tumore ex-  
tra fauces prominentē, & est eodem penitus modo  
adhibēdū cum digitorum pressione, uelut diximus:  
contrahit enim ac discutit, siccātq; ac tumorem extir-  
pat, & uasa materiā ad affectum locum afferentia cō-  
stringit. Confidenter igitur eo utaris: promissioni-  
bus enim nostris experimentum testimoniū dabit.  
Emplastrū ē Cappari, Oribasij. Plumbaginis, olei  
antiqui, sing. lib. ii. salis communis lib. i. ceræ sexun-  
cem, resinæ pinus trientem, squamæ æris, corticum  
radicis capparis, singulorū quadrātem. Aristolochiæ  
rotundæ sextātem, propolis tātundem, galbani unc.  
i. Squamam & plumbaginem tufas ac cribratas, &  
sal primum seorsim, deinde simul cum his tritum, cū  
oleo in mortario probè subigito, & in ollam conie-  
cta coquito, donec nō amplius inquinent. Deinde ce-  
rā, resinā, propolim, liquatas ac excolatas, & mox  
galbanum adijcito, & ablatis ab igne aristolochiam  
ac cortices capparis tritas inspergito, unito, frigefaci-  
to, emollito, ac utitor. Facit ad durities, coxendicum  
affectiones, hemiscranas, ac hydrocephalam in pue-  
ris aquosam capitis affectionē: abrasis enim capillis  
capiti impositum, humorem exugit. Glutinat etiam  
sinus: aliqui etiam sine cera præparant. Empla-  
strum ex Agarico, occultos abscessus & omnem hu-  
miditatem resorbens. Ceræ, colophonix, picis, spu-  
mæ nitri, thuris, agarici, singulorū lib. i. terebinthi-  
næ, uisci quercini, singulorum sexuncem, medullæ



ceruinæ trientem, œsypi quadrantem, grani cniđj, pyrethri, galbani, singulorum sextantem. Liquabilia liquato & excolato, & ab igne amotis uiscum adñcito, eoq; liquefacto, arida ammisceto, subigito, ac uitor.

*Apochymatis preparatio, Oribasij. Cap. xx.*  
Picis aridæ lib. i. picis liquidæ, ceræ, singulorū trientē, resinæ pinus sexuncem. Omnia liquata & excolata in peluim aquæ marinæ siue communis plenā mitto, & manibus uelut pastillū subigito ac uitor. Emplastrum eiusdem, ad collisa, mitiganda, irrigationis uicem supplens. Spumæ argenti lib. ii. strigmento- rum balnei excolatorum lib. vii. aquæ marinæ è pe- lago haustæ sextarios ii. colophonix unc. xvi. ceræ sextantem, squamæ æris quincuncem. Spumam ar- genti, squamam, strigmenta, aquam marinam simul coquito, & arundinibus uirentibus agitato, donec non amplius inquinent. Deinde cerā ac resinā adñci- to, & rursus ad bonam compagem coquito, & irri- gationis loco uitor. Ego uerò etiam olei lib. ii. ad- ñcio. uerum inter emolliētia emplastra Oribasij, hac serie reperitur. Strigmentorū lib. iiii. s. aque marinæ, olei antiqui, spumæ argenti, colophonix, sing. lib. ii. ceræ lib. i. æris usti, ammoniaci thymiamatis, singu- lorum sextantem. Facit inquit, ad duritias, & præpa- ratur uelut dictum est.

*Cerata utilissima. Cap. xxi.*  
Basilicū tetrapharmacū. Ceræ, colophonix, picis, adipis taurini, æquales portiones. Macedonicū. Ceræ, colo- phonix, picis, adipis taurini, thuris, æquales portio- nes. Liquabilibus liquatis & ab igne amotis, thus in- spergito ac infarcito. Macedonicū Azanitæ, ad mul- ta commodum & insigne. Picis siccæ unciam unā, ceræ quadrantem, adipis suilli antiqui & expurgati sexuncem, adipis taurini, œsypi, singulorum quadrā- tem, resinæ pinus siue piceæ quincuncem. Liquefaci- to ac uitor. Facit ad omnia maligna, ad gāgrænas, fistulas, uulnera recentia, ambusta, perfrigefacta, ue- lut acopon lasitudinē eximendæ destinatum. Est & pessus mollitorius. Conuenit etiam ad uteri ulcera, panos, parotidas. Et ubi caua fuerint ulcera, maiori eius copia utendum est. Vbi uerò propē cicatrix in- ducta fuerit, pauciore. Aduersatur huic pharmaco oleum, quare hoc uitabis. Maxime autē facit in his quibus plaga circa nervos aut musculos est.

*Heptapharmacum laxans, suppurans, incar- nans. Cap. xxii.*  
Cerussæ bessem, spumæ argenti trientem, ceræ, picis, co- lophonix, adipis taurini, thuris, singulorum sextan- tē. Liquabilia liquata cum aridis unito, atq; usus tē- pore medicamenti quidem ac ceræ singul. unc. i. olei uerò rosacei trientem accipito ac uitor. Quod si la- xandi uim intendere uolueris, oleum irinū aut sicyo- nium, aut gleucinum sit, & maiore copia sumatur.

*Enneapharmacum, Hori Mendesij. Cap. xxiii.*  
Hoc suppurat & laxat, præcipue neruis per cōsensum affectis. Ex eodē fit & pessus, siue pessarium ad sedis affectiones cōmodum. Adipis anserini, uitulini, bu- tyri, medullæ ceruinæ, ceræ, terebinthinæ, olei rosa- cei, cicini, mellis, singulorum portiones equas lique- facito, unito ac uitor.

*Emplastrum Philosophi. Cap. xxiiii.*  
Facit ad calcitratus, uulneraq; tumida. Rūpit, pus edu- cit, cicatricem inducit. Hyoscyami perdicij, & sideri

tidis folia recentia, æquis portionibus conterito, & panem siligineum tulum ac cribratum, unius herbæ portione adñcito, omnia simul cum axungia subigi- to, & ad emplastri formam redigito, & uitor uelut admirando.

*Oesypi preparatio. Cap. xxv.*  
Huius quidem optimam præparationē in secundo li- bro descripsimus: ex lanis enim succidis paratur, ue- rum ubi illud haberi non potest, accipe hoc quod ita parari solet. Meliloti trientē, cardamomi, hyssopi her- bæ, singulorū sextantem, lanæ succidæ ex alis ouīū sumptæ trientem, colophonix, ceræ, resinæ pinus, singulorum dextrantem. Olei dulcis lib. ii. aquæ sex- tarios iiii. melilotū, cardamomum, lanam, & hyssopum, per triduum aqua macerato, deinde ad tertias coquito, & excolato. Postea liquabilia liquato ac excolato, & succum ac oleum ammisceto, & omnia simul ad succi consumptionem ebullire finito.

*Emplastrum Manus appellatum. Cap. xxvi.*  
Hoc emplastrum à quinque rerum speciebus quas reci- pit, Manus appellatur. Colophonix lib. v. ceræ lib. iiii. resinæ pinus lib. iiii. adipis taurini lib. ii. butyri lib. i. liquefacito ac uitor.

*Emplastrum Bromium appellatum. Cap. xxvii.*  
Fœni græci, seminis lini, succi althææ, singulo. lib. i. simul ad succi consumptionem coquito. Et colopho- nix, resinæ pinus, singulorum quadrantem, ceræ sex- uncem, galbani trientem, liquefacito & ammisceto ac uitor. Aliud optimū. Seminis lini, althææ, fœni græci, singulorū trientē, in duobus aquæ sextarijs macerato, & de expresso succo sumito lib. i. ceræ lib. i. resinæ pinus, colophonix, singulorū sexuncē, gal- bani sextantem, opopanacis unc. i. præpara & utere.

*Emplastrum ex ouis. Cap. xxviii.*  
Spumæ argenti, cerussæ, singulorum trientem, cadmiæ sextantem, ceræ libram i. rosacei lib. ii. ouorum can- dida x. metallica cum aqua ac uino terito, deinde cū ouorum candidis subigito, & liquabilibus liquatis ammisceto, unito, ac uitor.

*Parhygrum Galeni. Cap. xxix.*  
Spumæ argenti, cerussæ, singulor. lib. i. olei purissimi, aquæ, singu. lib. ii. Ego uerò, inquit, sæpe olei qui- dem lib. i. adipis uerò anserini sex uncem ammisceto, aut si is desit gallinacei, aut hoc quoq; deficiente, suil- lum recentem accipio. Omnia simul ad prunas fu- mum non edentes citra solidam compagem coquun- tur, & in cocturæ fine, aliquādo etiam amyli sexun- cem adñcio. Si itaque adipem receperit hoc medi- camentum, maiorem mitigandi uim acquirit, & do- lores ex uulnere inflammato obortos sedat. Sed ad cicatricem inducendam inutile est. At uerò aquam addere frigiditatem satis constat.

*Emplastrum ex ouis, Oribasij. Cap. xxx.*  
Ceræ unc. i. spumæ argenti, cerussæ, amyli, singulorū sextantem, oua numero iiii. rosacei lib. i. oua in præ- paratione postremum addantur.

*Parhygrum Oribasij. Cap. xxxi.*  
Facit hoc ad spontanea ulcera in corporibus delica- tis. Adipis suilli recentis deuncem, ceræ sexun- cem, cerussæ, spumæ argenti, singul. unc. x. liqui- da cum aridis committito. Facit & ad ulcera serpen- tia. Et cum rosaceo dilutum uuluarum ac sedis affe- ctionibus medetur, & malignas faciei pustulas curat.

Emplastrum



*Emplastrum Rosaceum inscriptum.* Cap. xxxii. Hoc mammarum duritias discutit, & est ad sedis affectiones efficacissimum, si cum rosaceo, aut myrteo oleo diluatur. Spumæ argenti, cerussæ, adipis suili recentis, singulorum sexuncem, olei ueteris sesquilibram, myrrhæ drach. iiii. ouorum crudorum uitellos duos. Reliquis ad bonam compagem coctis, ac frigefactis, oua cum uino albo trita ammisceto, & utitor hoc medicamento aliquando sincero, aliquando diluto.

*Emplastrum Phycotiche appellatū.* Cap. xxxiii. Ad omnia ulcera, & præcipue in sede commodum est hoc emplastrū. Croci unc. i. cerussæ, spumæ argenti, medullæ ceruinæ, adipis anserini, ceræ, singulorum sexuncem, rosacei uncias xxxvi. ouorum candida xxx. uini quantum satis est.

*Emplastrum Sphærium appellatū.* Cap. xxxiiii. Hoc irrigationis uicem supplet. Facit ad desquamata, excoiata, intertrigines, ambusta, ad flagellatos, ad tibias collisas. Spumæ argenti, cerussæ, calcis uiuæ, singulorum quadrantem, ceræ sesquunciam, nitri unc. i. olei rosacei unc. i. Aridis minutissimè tritis li quida ammisceto, & sphæria, hoc est, pilulas formato. Vsu uerò expetente olei sexuncem, rosacei quadrantem, ceræ sextantem, ad prunas liquefacito, & medicamenti sextantem adijcito, spathulæque agitato, & ubi frigefactum fuerit medicamentum, cum aquæ dodrante contundito.

*Emplastrum pentatheton.* Cap. xxxv. Ceræ, picis, colophonæ, adipis taurini, calcis uiuæ, æquales portiones. Liquabilia liquato, & calcem adijcito. Vsus autem tempore olei sexuncem, ceræ sextantem, olei sicyonij quadrantem, liquefacito uelut proximè dictum est, & medicamenti sextantem adijcito. Facit ad uibices flagellorum, ad cutem excoiata, & ad collisa, ac cætera huiusmodi.

*Emplastrum ex Ochra.* Cap. xxxvi. Easdem cum prædictis uires habet etiam hoc. Ochreæ lib. ii. cretæ, ceræ, singulorum lib. i. colophonæ, picis, resinæ pinus, singulorum lib. i. spumæ argenti, terebinthinæ, singulorum bessem, olei lib. ii. arida cū uino terito, & liquabilia liquata ammisceto, & in massas efformato. Vsu uerò postulante, ceræ lib. i. olei ueteris lib. iii. liquefacito, & excolato, & medicamenti lib. i. ammisceto, & uino adstillato cōtundito.

*Emplastrum Telamonium.* Cap. xxxvii. Hoc carbunculis medetur. Dilutū sinus siccatur, & cicatricem inducit. Spumæ argenti, calcis uiuæ, ceræ, resinæ pinus, singulorum dodrantē, cerussæ un. xxv. olei sesquilibra. Spumæ argenti cum oleo ad compagem coquito: deinde ceram, ac resinā adijcito. Postea calcem, & cerussam minutissimè trita ammisceto, ac utitor. Et ad carbunculos quidē linteo inductum imponitur. Ad reliqua uerò, rosaceo aut myrteo oleo, ad strigmentitiā compagem dilutum adhibetur.

*Pilarium ex recremento argenti.* Cap. xxxviii. Recrementi argenti sexuncē, ceræ, adipis taurini, singulorum quincuncem, colophonæ trientē, picis, olei, singulorum sextantē. Argenti recrementū uino, aut foeni græci succo teritur. Quod si non possit haberi argenti recrementū, plumbaginem pro eo accipimus. Facit ad desquamata, ac excoiata, & his similia.

*Emplastrum ex pompholyge.* Cap. xxxix. Hoc longo usu constat eunuchorum, mulierum, pue-

rorum, ac aliorū mollium corporum ulceribus cōuenire, ad cicatricem citra dolorē inducendam, & ad cancerata ulcera tutò adhibetur. Cerussæ, spumæ argenti, pompholygis, singulorum sextantem, cadmiæ trientē, medullæ ceruinæ quadrantē, ceræ, olei rosacei, singul. lib. i. olei myrtei sexuncē. Metallica trita, ac cribrata, & cū uino subacta, liquabilibus liquatis ammisceto, ac utitor. Aliud Archigenis, & Oribasij. Pompholygis, cerussæ, spumæ argenti, singulorum unc. i. ladanī sextantē, acaciæ trientē, ceræ quadrantem, olei myrtei bessem, ouorū assatorum uitellos ix. uini quod satis est. Aliud Oribasij. Spumæ argenti, cerussæ, singul. sextantē, pompholygis unc. i. croci un. i. ceræ un. i. adipis anserini quadrantē, ouorū assatorū uitellos iiii. Rosacei, uini, quod satis est.

*Emplastrum rutaceum.* Cap. xl. Hoc ad fistulas scabras facit. Cadmiæ, spumæ argenti, recrementi argenti, sulphuris uiui, singulorum sextantē, aluminis scissi, rutæ uiridis, singulorum un. i. ceræ bessem, olei myrtei lib. ii. uini quantum satis est.

*Ceratum è perdicio.* Cap. xli. Facit ad sinus. Foliorum perdicij lib. ii. ceræ, colophonæ, olei, singulorum lib. i. Herbā exactissimè terito, & liquida ammisceto, & in mortario unito. Hoc in aliquibus ob nimiam uim repellendi, uicinos locos inflamat, & materiam eò colligit. Quod ubi contigerit, ad locum quidem inflammatum, idem medicamentum imposito: uerū ad sinus osculum emplastrum è lolio, aut quod Venus inscribitur, aut quoddam attractorium adhibeto.

*Ceratum è succo betæ.* Cap. xlii. Facit ad uulnera inflāmata, ad achoras capitis ulcuscula, & ad ambusta. Ceræ libram unam, olei sesquilibram, liquato, ac excolato, & ab igne ablatis, betæ succum quantum imbibere possunt affundito, & in mortario subigito. Præstat autem paulatim succum cerato instillare. Aliud è succo plantaginis, ad inflammationes, & sinus. Ceræ lib. i. olei lib. ii. s. succi plantaginis quantum satis est. Ceratum liquefactum & in frigidā aquam diffusum, aqua sæpe permuttera probè lauatur, & postea in mortario pistillo tunditur, ac subinde plantaginis succus paulatim instillatur, quantum eius imbibere potest. Ceratū Myrteum, ad oculorum inflammationem, & cicatricem inducendam, ad intertrigines, ac scabiosas affectiones commodum. Ceræ lib. i. olei myrtei lib. ii. plumbi uisti sexuncem, cerussæ, spumæ argenti, syrici, singulorum unc. i. uini quantum satis est ad conterendū. Melinum cicatrices inducens. Chalcitidis crudæ sexuncem, cadmiæ quadrantem, ceræ lib. i. olei myrtei lib. i. uini quod satis est.

*Ceratū ex sandyce, Homo appellatū.* Cap. xliii. Hoc ulcera diuturna, ac maligna, & in tibijs oborta, solum per se adhibitum ad cicatricem perducit. Sandycis lib. i. olei dulcis lib. ii. coquito, donec non amplius inquinent, & utere confidenter.

*Emplastrum ex allijs.* Cap. xliiii. Hoc uim attractoriā habet. Facit ad omnē duritiā, abscessus, furunculos, strumas, inguinū tumores, fistulas, impetigines humidas, mamas induratas. Ceræ lib. ii. colophonæ sexuncem, medullæ ceruinæ tantundē, nitri albi bessem, allia uiginti, olei lib. iiii. Allia depurgata in oleo coqto, donec torrefiant, deinde ad oleū excolato liquabilia adijcito, & postea



nitrum tritum adijcitur, ac utitur. Nos uero ita praeparamus: Ceræ, colophonæ, olei, singulorum quincuncem, nitri sexuncem, medullæ ceruinæ sextantem, alliorum nucleos x x x. præpara & utere, præsertim ad fistulas: humorem enim attrahit, quem quotidie crebro detergere oportet. Hoc solū citra alterius opem extrahit, incarnat, & cicatricem inducit. Aliud Oribasij, ad pustulas, intertrigines, ambusta ab igne, perniones non exulceratos, ad bullas nondum apertas, ad cutis tibiæ excoctionem, ad ulcera antiqua, & proserpentia sub cute. Recrementi plumbi trientem, aut quadrantem ad ceratum ammisceto, quod habet ceræ bessem, aut dextantem, adipis suilli recentis, olei myrtei, singulorum sextantem, aut quadrantem. Quod si cicatrix inducenda est, absque adipe præparetur.

*Emplastrum è scilla, Asclepiadæ.*

*Cap. XLV.*

Hoc ad fistulas, sinus, nomas, & putredines facit. Viscerum eminecias contrahit, ad fistulas angusta oscula habentes collyriū ex eo formatū inditur. Si uero lata ac ampla fuerint oscula, rosaceo dilutū adhibetur, eloto prius sinu siue fistula cum posca, aut uino mulso, injectum, locusq; emplastro munitur, ac deligatur: hoc enim modo incarnat, ac replet fistulosa capitis ulcera. Cōuenit & nomis, si membrana non fuerit denudata. Idē sincerū ad capitis fracturas adhibetur, & ad anhelosos ac orthopnoicos amplis splenis inductum pectori imponitur: cōuenitq; omnino ubi ad superficiem materias attrahere uolumus. Scillæ repurgatæ quincuncē, squamæ æris, iridis, singulorū quadrantē, myrrhæ drach. x viii. ammoniaci thymiamatis drach. x ii. galbani, picis liquidæ, styracis, æruginis, resinæ pinus siccæ, aristolochiæ, singul. sexuncem, ceræ unc. x x. terebinthinæ trictē, olei ueteris lib. ii. aceti acerrimi sextarios ix. aut quod satis est. Scillā ad solem æstiuū tundito, & acetū paulatim instillato, quantū satis ad exactē renderam. In alio autē mortario squamā æris, & æruginem cū aceto diutissimē terito, & arida trita, ac cribrata adijcitur. Postea ammoniacū, styracem, myrrham, galbanū addito, & instillato aceto simul probe cōterito, deinde liquabilia liquefacta, iride ac aristolochia inspersis, frigefacito, & ad reliqua ammiscero, subigito, ac utitur. Ad fistulas quidem & ossa corrupta, collyria ex eo formata indens, uerū ad ulcera repurganda sumito medicamentū trientem, ceræ sextantē, rosacei quadrantem, & pro repurgationis

ratione aliquid de medicamēto detrahito, & cerato adijcitur, donec cicatrix inducatur, ita ut postremum quū iā absoluēda est cicatrix, medicamenti un. i. olei rosacei, aut myrtei dodrantē, & ceræ trictē cōmiscas.

*Emplastrum ex pompholyge, Hieræ Cappadocis.*

*Cap. XLVI.*

Hoc ad sedandos dolores, ac inflammationes facit, præcipuē ad ulcera maligna, ac cancerata, antiquaq; ac cicatricem non recipientia. Facit & ad ambusta ab igne. Rosaceo, aut myrteo oleo dilutū cicatricem inducit, & butyro dilutū incarnat. At cum rosaceo ad omnes sedis affectiones cōmodum est. Cadmiæ bostrygidis lotæ dra. viii. pompholygis lotæ dra. vii. plumbi usti, & loti drach. ix. thuris drach. iiii. cerussæ lotæ drach. ix. spumæ argenti lotæ drach. viii. ceræ albæ drach. c. terebinthinæ chiæ drach. vii. olei myrtei drach. clxx. Arida trita & cribrata, in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, cū uini sextarijs iiii. terito: cæterū in uino hoc, infra scripta polentæ modo contusa, per diem ac noctem præmaduisse oportet. Iridis, meliloti, aristolochiæ, capitorū papaueris, seminis hyoscyami albi, singulorū drach. viii. cum hoc itaq; uino excolato, metallica sicut diximus sunt conterenda, usq; ad mellis compagem, & deinde oleum myrteum adijciendum, quo illitionis spissitudo fiat. Postea uero omnia in ollam nouam coniecta lento igne ad emplastri formam, & terebinthina adiecta medicamentum ab igne tollito, ac frigefacito, subigito, & utitur.

*Emplastrū nigrū, Essentia appellatū.*

*Cap. XLVII*

Facit hoc ad duritias, ad articulos, & costas fractas, gāglia, strumas, & tumores dissoluit. Tibiarū ulcera chironia & fistulas curat. Facit ad morsus ferarum. Aquæ inter cutem molem delet. Clauos sanat, aculeos extrahit. Splenicis, podagricis, hepaticis prodest. Spumæ argenti, cerussæ, æruginis rasæ, singulorum quadrantem, squamæ æris sextantem, thuris masculi sextantem, & semūciā, bituminis Iudaici bessem, terebinthinæ quadrantem, ceræ flauæ, picis aridæ, singulorum libr. iiii. olei antiqui lib. i. lapidis gagatæ, lapidis asij, aluminis scissi, magneti uiui, myrobalanorum, singulorum quadrantem. Spumam argenti, cerussam, squamam, æruginem, bitumen, & thus, omniaq; arida tundito, & in mortario aceto paulatim instillato, ad strigmētitiā spissitudinem terito, deinde ceram, picem, oleum, ac reliqua liquabilia liquata ammisceto, unito, ac utitur.

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN

DECIMOSEXTO SERMONE AETII

CONTINENTVR.

|                                               |            |                                      |            |                                                         |             |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D</b> E uteri situ, magnitudine, ac forma. | cap. i.    | ptus tempus adueniat.                | cap. vi.   | Cura prægnātib. adhibenda.                              | cap. xii.   |
| Quæ intra prægnātis uterum nascuntur.         | cap. ii.   | Fœcundarum mulierū dinotio, Sorani.  | caput vii. | Notæ partus secundum naturam futuri.                    | cap. xiii.  |
| De secundæ generatione.                       | cap. iii.  | Quomodo cognoscantur quæ cōceperunt. | cap. viii. | Parientibus facienda.                                   | cap. xiiii. |
| Menstruæ mulierum purgationis ratio.          | cap. iiii. | Notæ fœtus masculi ac fœminæ.        | caput ix.  | Cura circa ægrè parientes adhibenda.                    | caput xv.   |
| Notæ futuræ uirginum purgationis.             | caput v.   | De pica.                             | cap. x.    | Quomodo opem ferre oportet his quæ non tutò concipiunt. | cap. xvi.   |
| Quando semen appareat, & conce-               |            | De tumoribus pedum in prægnātibus.   |            | Pessi sterilitatē inducentes.                           | cap. xvii.  |
|                                               |            |                                      | caput xi.  | Fœtum corrumpentia.                                     | cap. xviii. |
|                                               |            |                                      |            | Signa                                                   |             |



- Signa futurum abortum præceden-  
tia. cap. XIX.  
Quomodo abrupti foetus eiectioni opi-  
tulemur. cap. XX.  
De his quæ bimestres aut trimestres fo-  
tus abortiunt. cap. XXI.  
Pariendi difficultatis causæ. cap. XXII.  
De foetus extractione, ac exectione.  
cap. XXIII.  
De secundæ educatione. cap. XXIII.  
Cura post foetus exectionem. cap. XXV.  
Causæ sterilitatis, itemq; curatio in ui-  
ro, ac muliere. Notæ item conce-  
ptionis. cap. XXVI.  
Frigidioris uteri signa, ac curatio. ca-  
put XXVII.  
Calidioris uteri signa, ac curatio. cap.  
XXVIII.  
Humidioris uteri curatio. cap. XXIX.  
Siccioris uteri curatio. cap. XXX.  
Diuerfarum affectionum, ob quas mu-  
lieres non concipiunt, curatio. cap.  
XXXI.  
Potiones, peſsi, & suffitus ad conce-  
ptionem. cap. XXXII.  
De lactis defectu. cap. XXXIII.  
Ne lac in mammis coeat in grumos. ca-  
put XXXIII.  
De coagulato in māmīs lacte, & iisdē  
turgentibus ob lactis redundantiam.  
caput XXXV.  
De uitiatō lacte mammis lædente. ca-  
put XXXVI.  
Ad mammas inflāmatas. cap. XXXVII.  
Ad induratas mammarum inflamma-  
tiones. cap. XXXVIII.  
De mammariū abscessu. cap. XXXIX.  
De mammarum fistulis. cap. XL.  
De mammarum nomis. cap. XL.  
De exedentibus mammarum ulceribus.  
cap. XLII.  
De cancris mammarum. cap. XLIII.  
Qui cancri curatu faciles, & qui diffi-  
ciles. cap. XLIII.  
Cancris chirurgia. cap. XLV.  
Cancris curatio post amputationem, &  
inustionem. cap. XLVI.  
Cancerorum curatio citra chirurgiam.  
cap. XLVII.  
Cancerorum tumorum non ulcera-  
torum curatio. cap. XLVIII.  
Cancris ulcerati curatio. cap. XLIX.  
De mammis induratis. cap. L.  
De menſtruis ſuppreſſis. cap. LI.  
Mulieribus quæ non purgantur acci-  
dentia. cap. LII.
- Curatio earum quæ ob nimiam calidita-  
tem non purgantur. cap. LIII.  
Frigidæ temperaturæ dinotio, ac cura-  
tio. cap. LIII.  
Peſsi menſes educentes. cap. LV.  
Curatio earum quæ præ pinguedine nō  
conciunt. cap. LVI.  
Curatio earum quæ ob plenitudinem  
non purgantur. cap. LVII.  
Curatio earum quæ ob maciem nō pur-  
gantur. cap. LVIII.  
Curatio earum quæ ob uitioſos humo-  
res non purgantur. cap. LIX.  
Curatio earum quibus ſanguis ad na-  
res, uel ſedem deſertur. cap. LX.  
Curatio earum quæ ob nimium ocium  
non purgantur. cap. LXI.  
Curatio earum quæ ob aliquam uteri  
affectionem non purgantur. ca-  
put LXII.  
De menſium ſtillicidio. cap. LXIII.  
De nimia menſium purgatione. caput  
LXIII.  
De fluxu muliebri. cap. LXV.  
Curatio rubri uteri fluxus. cap. LXVI.  
Albi fluxus curatio. cap. LXVII.  
De uteri ſtrangulatione. cap. LXVIII.  
Peſsi ad uteri ſtrangulationem idonei.  
caput LXIX.  
Vnctiones ad uteri ſuffocationem. ca-  
put LXX.  
Varia auxilia ad uteri ſtrangulatio-  
nem. cap. LXXI.  
De ſeminis fluxu. cap. LXXII.  
De uteri debilitate. cap. LXXIII.  
De furore uterino. cap. LXXIII.  
De uteri reſolutione. cap. LXXV.  
De uteri prolapſu. cap. LXXVI.  
De reclinatione, auerſione ac reſuſu  
uteri. cap. LXXVII.  
De uteri inflatione. cap. LXXVIII.  
De uteri hydrope. cap. LXXIX.  
De mola uteri. cap. LXXX.  
De tumore uteri laxo. cap. LXXXI.  
De ſatyriafi. cap. LXXXII.  
De uteri inflāmatione. cap. LXXXIII.  
De utero in ſcirrhi tumorem indurato.  
caput LXXXIII.  
De uteri absceſſu. cap. LXXXV.  
Absceſſus oris uteri chirurgia. caput  
LXXXVI.  
Absceſſus uteri inter inteſtina, & pe-  
ritonæum membranam rupti cura-  
tio. cap. LXXXVII.  
De uteri exulceratione. caput  
LXXXVIII.
- Vlcerum uteri carbunculoſorum cura-  
tio. cap. LXXXIX.  
Ad ſordida uteri ulcera. cap. XC.  
Ad humorem à muliebri pudendo pro-  
fluentem. cap. XCI.  
Ad uteri nomas. cap. XCII.  
Quæ ad cicatricem ducunt. caput  
XCIII.  
De cancris uteri. cap. XCIII.  
De uteri obturatione. cap. XCV.  
De utero non perforato. cap. XCVI.  
De hæmorrhoidibus uteri. caput  
XCVII.  
De calculo uteri. cap. XCVIII.  
De calculo ueſicæ muliebris. caput  
XCIX.  
De hernia aquoſa mulierum. cap. C.  
De hernia inguinis mulierum. cap. CI.  
De hernia uaricoſa. cap. CII.  
De nymphæ ſectione. cap. CIII.  
De cauda. cap. CIII.  
De thymis, & uerrucis tum alijs, tum  
formicarijs uteri. cap. CV.  
De condylomatis. cap. CVI.  
De rimis, ac fiſſuris uteri. cap. CVII.  
De tuberculis uteri miliaceis. caput  
CVIII.  
De ſcabris uteri puſtulis. cap. CIX.  
De alarum pudendi muliebris abſceſ-  
ſu. cap. CX.  
Ad umbilicum prolapſum. cap. CXI.  
Ad rugas uentris, rimasq; ac nigredi-  
nes à partu exortas. cap. CXII.  
Præparationes unguentorum ſiccorum,  
moſchatorum. Item conditorum, &  
œnanthariorum, ac ſuffumigiorum  
uariorum. cap. CXIII.  
Olei ſalca præparatio præcioſa. ca-  
put CXIII.  
Clei ſiue ungueti foliati, ac ſpicati,  
præparatio. cap. CXV.  
œnanthariorum præparationes. ca-  
put CXVI.  
Abſinthati ſiue rodabſinthati præpa-  
ratio ſalubris. cap. CXVII.  
Conditi purgatorii præparatio. caput  
CXVIII.  
Rhodomeli præparatio. cap. CXIX.  
Muſtati præparatio. cap. CXX.  
Gari præparatio pro abſtemijs. ca-  
put CXXI.  
Suffumigij moſchati præparatio. ca-  
put CXXII.  
Myrrhatio ad cadaueris conſeruationem.  
cap. CXXIII.



# AETII MEDICI GRAE CI CONTRACTAE EX VE-

TERIBVS MEDICINAE, TETRA-

BIBLI SIVE QUATERNIONIS

QUARTI, SERMO QUARTVS, ET

EX ORDINE XVI.

*De conceptus, ac partus ratione, & de affectionibus muliebribus uteri praesertim & mammarum.  
Item de unguentorum pretiosorum, & potionum, ac suffumigiorum preparatione.*

*De uteri situ, magnitudine, ac forma.*

Cap. I.



**U**TERVS Graecis Metra, hoc est, Matrix appellatur, quod ex ipso omnia animantia, uelut à matre oriatur. Vocatur eisdem hystera, quod posterior situ sit omnibus uisceribus. Situs est enim uterus intra peritonaeum membranā, aluum, & intestina omnia circūcirca amplectentem, inter uesicā ac rectum intestinum. Atq; huic quidē ferme toti incūbit: uesicā uerò iuxta umbilicum, ubi fundū habet, ut plurimū supereminet. Iuxta partē autem ad pudendū tendētem ipsa uesica uterū excedit collo. Magnitudo eius nō in omnibus eadē est. Multo enim minor est uterus eius quē prēgnans nō est: maior autē prēgnantis. Eius uerò quā nunquam prēgnans fuit, longē adhuc minor uterus existit. Et iuxta aetate minimus est his quā ad uenērem experiendā tempus nondū attigerunt. Nam & aliās semper minor est his quā uenere non utuntur. Longitudo itaq; in moderatē se habētib; mulierib; a fundo circa umbilicū, usq; ad pudēdū, est plerūq; undecim digitorū, latitudine uerò ad utrūq; latus per cornua sua extenditur. Quantū uerò ad figurā attinet, totum quidē reliquum corpus, & maximē fundū uesicā simile est. In quantū uerò exortus papillares ad lūbos nutātes habet ab utroq; fundi latere productos, uesicā similis nō est: appellatur autē hi exortus cornua, & primum sursum uergūt, postea deorsum tendunt, & paulatim angustiores fiunt, ut postremā partes uenis similes sint. Hae itaq; angustae cornuū partes sinuosis flexibus ad testes inserūtur, qui à lateribus uteri siti sūt, singuli ab utraq; fundi parte propē cornua: & per hos sinuosos cornuū flexus, in cōgressu uiri uterus semen à testibus attrahit. Sunt autē testes mulierū parui, neq; sicut in uiris rotundi, & oblōgi, ac tenera carne praediti, sed latī, ac glandulosi, & pelliculosi. Appendet porrò uterus uesicā, & intestino recto, per fibrosa quaedam interstitia. Appendet & ossi sacro, per robusta quaedam ligamenta neruosa, ac musculosa. Sunt & ligamenta, ac appendices quā in ipsum uterū inseruntur, partim quidem texentia & perplicantia ipsum uteri corpus, quorū non exigua pars sunt nerui à spinali medulla orientes. Partim uerò incrementi, ac nutrimenti ipsius uteri, itēque foetus gratia facta, uelut sunt arteriē & uenā. A uena enim caua quē per spinam à gibba hepatis parte fertur, & ab arteria magna quā illi incumbens simul defertur, duae uenae, & duae arteriā exoriuntur, utrinque sanē uena & arteria: atq; haec quatuor uasa ad uterum delata, anrequām in ipsum inseruntur, ramulos ad testes extendūt, & postea in ipsum uteri corpus deferuntur, ipsūq; intertexūt, & per ea mēstruus sanguis in ute-

rū deriuatur. Sūt autē & alię uenę, ac arteriā utrinq; utero insertae, partim ad testes, partim ad ceruicē tendentes. At uerò ipsum uteri corpus ex duabus tunicis cōstat, & externa quē neruosiore est, interna uerò uenosiore. Et externa quidē simplex & una est, interna uerò duplex, ut si excoriare uolueris, duo tibi uteri esse uidebuntur, sub una & eadē tunica siti. Cæterū collū uteri musculosum, ex dura, ac chartilaginosa carne factū est, & semper durius seipso euadit, & progressu tēporis chartilaginosum, adeo ut quā sepius pepererūt, aut iā aniculę sunt, his multū durū, ac chartilaginosum collū sit, ut gutturi sūmo simile existat. Est & in collo uteri foramē, p quod & menses deferūtur, & mulier masculi semē suscipit, exitq; per ipsum etiā foetus: incredibile enim dictū est, quā tū hic meatus pro tēpore amplitudinē euariat. Nā reliquo tēpore toto specilli extremū, aut paulo crassius quiddā suscipit. Prēgnate uerò muliere ita clauditur, ut nihil suscipere possit. At ubi foetus ab utero exoluitur, dolores partus ipsum quā plurimū extendūt, & quod mirū auditū est, animal totum per ipsum trāsit. Finit autē collū, ac desinit in muliebrē sinū siue pudendū. Lōgitudo porrò pudendi in mulieribus aetate perfectis sex fere digitorū mēsurā est. In partu tamē & cōcubitu breuius efficitur, collo nimirū uteri se extēdēte. Est & in puellari aetate pudēdū delicatius, ac mollius. In aniculis uerò & his quē sepius pepererūt, callosius euadit, & chartilagini simile: ex crebro enim cōgressus attritu, & partiū exeuntū collisione callescit. Sed & mēsiū delatione indurescit, nō aliter quā ob plurimū, & acrem humorē influentē ulcera callosa, ac fistulosa fiūt. At uerò imminēte mēsiū tēpore, uterus crassescit, ac intumescit, aliās tenuior, ac cōtractior existens. Crassior item est, in his quā sepius pepererunt. Tenuior autem in his quā nondū prēgnates fuerunt. Idem etiā primis à conceptu diebus crassescit. Vbi uerò foetus adoleuit, ac iam pariendi tempus adest, tenuissimus euadit. Attenuatur autem uelut uesicā flatu repletā solent, crassitudine in longitudinē abeunte. Atq; hactenus de situ, figura, ac magnitudine uteri dictū sit.

*Quae intra prēgnantis uterum nascuntur.*

Cap. II.

Imprēgnationis tempore primū Secūda utero adnascens, & totū foetū ambiens generatur. deinde aliā duae pelliculae, altera farciminalis, à farciminis similitudine appellata, eminētibus foetus partibus duplicata incumbens. Altera agnina, à teneritudine uocata, quā totum foetum ambit, ac complectitur.

*De secūda generatione.*

Cap. III.

Secūda hoc modo generatur. Singula uenarū, ac artiarū oscula, quē intra uterū pueniūt, in extremitatibus suis nodosas quasdam eminētias haemorrhoidib. ani similes habēt, quas aliqui coryledonas, hoc est, acetabula appellāt. Atq; hē in mulieribus sunt minores, quā



res, quàm quæ in uaccis, capris, ac ceruis, atq; alijs talibus animalibus reperitur. Sed & in brutis flaccidiores, ac mucosiores sunt, figura cotyledoni herbe, id est, umbilico ueneris similes. Tales igitur eminentiæ in uteri sinu ubi mulier cõceptura est aperiuntur. Contingit autem hoc tempus, incipientibus fluere menstruis purgationibus, aut desinētib. Et quāquā etiam reliquo toto purgationis tēpore apertæ sint, tamen nō cōcipit mulier. Nō enim potest semē in utero manere, quū influentis sanguinis multitudine eluatur. Quando uerò cessant mēses, & quum incipiunt, aperta sunt uasa, & purgatio lunaris neq; multa neq; coaceruatim effunditur, ut semē ob uteri asperitatē facillē adhæreat, & ab allabentis sanguinis paucitate abundē alatur: priusquam enim fluere cõperint menses, mulier non cõceperit, quod & semen careat alimento, & unde adhærere possit nō habeat: leuis enim tunc uterus est ob uasorū conclusionem, ut inde semen tanquā color à leui pariete elabatur. Nā qui parietes illituri sunt, eos primū exasperant, deinde colores inducunt. Proinde semē uiri iniectū, & in utero detētum, acetabulis dextri uel sinistri sinus impingitur, cōtrahitq; seipsum uterus, ac semen undiq; complectitur. Secundæ itaq; generatio ab osculis in uterū apertis initium sumit, ita ut ab unoquoq; osculo uas generetur, ab osculo arteriæ arteria, à uenæ osculo uena, atq; hæc uasa distinguit ac cōnectit mēbrana. Et hoc modo Secunda generatur. At uerò hæc uasa per Secūdā dispersa rursus inter se cōeunt, & in duos ueluti stipites desinūt, binasq; uenas ac binas arterias perficiunt, quæ ad ipsum fœtū se ingerūt circa umbilicū. Nihil enim aliud est umbilicus quàm quatuor hæc uasa, in medio sui uragum, hoc est, lorij duæ arteriæ appellatū habētia. Hic uerò est principium pelliculæ farciminalis, perforatusq; est ad fundum uesicæ ipsius fœtus, ut per ipsum lorium fœtus excernatur, & in pellicula farciminali colligatur. Tum uerò ex duabus uenis una tantū efficitur, quæ per umbilicum delata, siue parti hepatis ipsius fœtus inseritur, uenæq; caua appellatur. Et per hanc ad fœtum alimentū sanguis ab utero deriuatur. Postquam enim hepar ipsius fœtus sanguinem allatum suscepit, in omnes corporis partes distribuit. Similiter etiam duæ arteriæ in unam coalescunt, quæ circa uesicam firmatur, & magnæ arteriæ inseritur, quæ spinæ eiusdem fœtus adhæret. Et per hanc uitalis spiritus ex uteri arterijs ad fœtum distribuitur. Porro partus tempore instante, quum magnus perfectusq; infans uterum undiquaque distēderit, Secunda pro infantis mole angusta efficitur, neque iam sanguis ab utero allatus alimentum sufficiens exhibet. Quapropter concitatus infans exilit, & ambientes pelliculas dirumpit; atque ita arcana quadam ratione uteri hostium aperitur, ac fœtus progreditur. Et hæc quidem de fœtus generatione breuiter, & quàm lucidissimè id fieri potuit explicauimus. At si quis diligentius speculari hæc uoluerit, capram aut uaccam, uel ceruam disseccare poterit, ossa pubis remouendo, & cutem aptè reseccando. Et uteri cum uicinis partibus unionem apertè uidebit.

*Menstruæ mulierum purgationis ratio.* Cap. IIII. Circa quartumdecimū annum menses in fœminis apparere incipiunt, quo tēpore, & pubescunt, & mammae ipsis intumescunt. Non tamen omnibus eodem tempore, eademq; mēsurā, & per totidem dies pro-

deunt. Sed plerisq; plus minus duarum heminarum mēsurā, quatuor dierum spatio, interpositis uiginti duobus diebus, aut summū triginta, singulis mensibus deferuntur. Nec ante trigessimū quincū, nec serius quàm quinquagesimo anno desinunt. Rarissimè enim ad sexagesimū annum mēstruæ purgationes perueniūt. Citissimè uerò in pinguib. corporibus deficiūt. Cæterū sāguinis qui profluit copia paulatim usq; ad ætatis uigorē augetur. Deinde aliquādiu æqualitatē seruās, paululum penitus crescit, aut minuitur. At ubi ad finē tendit, paulatim rursus minuitur, donec in totum desinat. Ut autē ordinem seruent, aut excedāt, & ut multitudine uel paucitate delinquāt, in ætate situm est, ac anni tēpore, itemq; uictus ratione, & peculiaribus mulierum studijs. Huc faciunt & ciborum qualitates, & morbi accedentes.

*Notæ futuræ uirginum purgationis.* Cap. V.

Virginibus futurā purgationē prælagiunt mammarū pruritus, lumborū, pectinis, & capitis dolor, bilis, aut pituitæ uomitus. Quum hæc circa decimū quartum annū apparuerint, Medicū coniectare oportet, quomodo purgationē maturet, & per leniores decoctiones sanguinis delationem adiuuet.

*Quādo semē appareat, & cõceptus tēpus adueniat.* VI. Semen quoque circa decimū quartum annum, & plerisque in ipso pubertatis tempore apparet: uerum ad generationem aptum efficitur, anno plerūq; decimo octauo, aut uigesimo. Et statim sanè ubi semen comparuerit, cōeundi desiderio flagrare incipiunt.

*Fœcundarum mulierū dinotio, Sorani.* Cap. VII.

A' decimoquinto ætatis anno ferè usq; ad quadagesimum, mulieres ad cõcipiendum idoneæ sunt, quæ neq; uiragines, neq; corporis habitu denso, aut duro præditæ sunt, neque contrā humecto, ac languido, neque alui fluxione assidua laborant: sed & recta ratione, ac læta mente funguntur, & lumbos habent latos, & uentrem amplum. Et quibus menses non impediuntur, & quæ uteri affectionibus non infestantur. Cæterum conceptura sit an non mulier, hoc modo depræhendi aiunt. Internas partes uestimenti cõtectas resina suffiūt, ita ut intra pudendum uapor recipiatur. Et si quidē odor per corpus ad os, & nares transeat, fœcunditatis signum iudicant: si minus, sterilitatis. Allia itē decorticata, & lanæ inuoluta, mulier dormiēdi tempore sibi ipsi uelut pessum, siue tali formā subdat. Et ex odore an ad os peruenit aut non, fœcunditatem aut strilitatē iudicet.

*Quomodo cognoscantur quæ cõceperunt.* Cap. VIII.

Mulierem concepisse argumento primum est, si ab obstetrice interrogata respondeat, se post concubium uiri semen non effudisse, & in ipso coitus opere horrorem quendam percepisse, & moderato dolore circa pudendum, ac umbilicum uexari. Et ad hæc si pudendi sinus & os arida sint. Et uteri osculum non durum, nec inflammatum, sed interius ac exterius occlusum fuerit, & aliquantulum sursum progressum. Et si Veneris appetentia languerit, & menses cõsuetō tēpore non apparuerint. Si uenæ pectoris uirere, & mammae intumescere inceperint, & progressu tēporis lac habuerint. Si cavitates oculorū subpallidæ fiant. Si nigræ maculæ in facie, & aliquibus lētigines oriātur. Si colli pars anterior calidior, ceruix uerò frigidior appareat. Si circa secundū mensem præter cõsuetudinē salsa, aut acida appetat. Quibusdā etiam os nimio humore madescit, & ad



& ad agendum torpor adest, & aspectus languidus ac planè effœminatus efficitur, & color ad albedinè, ac pallorem mutatur, prægresso plerunque rubore si foeminae uiriliores fuerint. Circa consueta, item purgationis menstruae tempora aggrauantur praegnantès, & mammae intumescunt, lumbi difficulter mouentur, uesica rubens, ac ignitum lotium cum dolore excernit, & suppressorum mensium calor sinum, ac ceruicem uteri accendit.

*Notæ foetus masculi ac foeminae.*

*Cap. IX.*

Hippocrates, & alij quidam maris notam esse dixerunt, si praegrans sit bene colorata, & ad motum facilis, & si dextra mamma amplior, & praesertim papilla sit. Contrà uerò pallidus color, sinistraq; mamma, ac papilla tumidior, foemellae indicium est. Sed & in masculi conceptu dextrae partis uasa, uenae, ac arteriae, magis intumescunt, praesertim sub lingua. At in foemellae conceptu contrarium apparet. Aiunt etiam papillas in foeminae conceptu deorsum nutare, in masculi uerò sursum tendere. Sed & lac praegnantis aquae instillatum, si foetus foemella sit, diuelli, ac detrahi: si uerò masculus, in superficie persistere. Certissimum uerò minimè fallax masculi foetus signum est, si praegrans dextrae manus pulsus ualidiorem, uelociorem, maioremq; ac duriorē habuerit: Et uice uersa in foemella.

*De pica, Galeni.*

*Cap. X.*

Circa secundum mensem affectio quaedam praegnantibus accidit, quae à pica auicula nomen accepit. Alij tamen ab hederæ similitudine, quæ cirtos Græcis uocatur, hanc affectionem cirtam Græcis appellatam esse sentiunt. nam sicut illa uarijs plantis prout occurrunt se implicare solet: ita mulieres ex pica laborantes, uaria edulia appetunt, atq; ea contraria, quae tum uoluptatē, tum insauitatem gustari exhibent. Accidit autē ferè circa quadragesimum diem à conceptu. Et est stomachi languor cum nausea, & auersione ciborum, bilis ac pituitae uomitū inducens. Cōsequuntur assidue expulsiōes oris, uētris morsus, ac anxietates. Atq; hæc omnia ob humoris sanguinei praesertim redundantiā fiunt: q; enim per uteri uasa singulis mētib; excerni solebat, à foetu suppressus, sursum uergit, & stomachū præcipuè, uelut subtiliore sensu præditū infestat: pro uarietate autē uitiosi humoris, uaria ac peregrina edulia appetūt, quædam salia, aliquæ acida, aliquæ terrā, aut testas, aut extinctos carbonēs. Et sæpe usq; ad quartū mensem hæc affectio durat: in principio enim modicus sanguis ad foetus alimoniam distribuitur. Postea uerò crescente foetu, plus alimenti attrahitur. Itaq; tum demum uitioso humore partim per uomitum euacuato, partim ad uterū alendi foetus gratia delato, relata accidentia remittūt. In quibus igitur multus sanguis collectus uidetur, his modicus cibus competit, & exercitia mulieribus cōueniētia, quæ redundatē discutere possunt. Profunt & fatigationes, ac peregrinationes: quæ uerò citra laborem uiuere consueuerūt, hæc praegnatēs ægrè ferunt repentinis aut laboriosiores motus. Quarum uerò stomachus ab acri, acido uel falso humore mordetur, hæc ad excitandum uomitum tepidam aquam commodè bibent, ut humor affligēs reuomatur. Abstineant autē à dulcibus obsonijs, & uinum fuluum, odoratum, antiquum, & subastringens bibāt. Sic autē potus moderatus ne

alimenta uentriculo innatent. Confert etiam ante cibum oliuas muria conditas cum pane molli exhibere. Aut quinq; uel septē amygdalas amaras. Aut polentā succo coroneorum, aut puniceorum malorum respersam. Aut seridem siue intubum. Aut asparagū palustrem, aut fistarum. Ex auiibus deligendæ sunt, quæ neq; pingues, neq; uirosæ sunt. Cōueniunt etiā pedes, ac rostra & uentriculi porcorum, & herinaei marini recenres. Post cibum uerò uuae passæ, mala punica, ac pira exhibeantur. Sint tamen omnia quantitate moderata. At quæ cibos auersantur, obsoniorum uarietate, ac iucunditate illectentur. His autē quæ terrā comedunt, nihil ita prodest, uelut amyllum recēs pro terra oblatum. Cæterum medicamenta cōtra picam cōmoda sunt, portulacæ cremor, & ipsa in cibo sumpta, cucumeris semē decorticatū, & ex aqua potum. Polygoni decoctū potum, similiter etiā anethi. Et rhei pōrici, ac spicæ nardi cremor. Itē intubi succus, uel ipsa herba cruda, aut cocta assidue comesta. At si crassius est quod euomunt, & ob uiscositatē difficulter excernitur, fassamenta & raphanos ex aceto mulso edant, omni studio adhibito, ut infestus humor citra molestiam ac conuulsionem educatur. Forinsecus autē adhibita lāguido stomacho cōferunt hæc, oenanthe, balauistiū, rosæ, cithyni, myrtus, smyrnæ coma, foeniculi semen, cū uino cataplasmatibus modo adhibita, addita etiā galla, aut cumino, aut absinthio. Palmularū item carnes uino coctas, aut maceratas, tritas pro emplastro imponere prodest. Aut mala coronea cum posca trita, rosaceo uel nardino cerato excepta, addito croco. Aut lanam succidā, aut linteolum uino, & oleo, aut aceto & oleo, uel rosaceo, & aceto, aut nardino & uino imbuto, & stomacho adhibeto. Morsus enim, & stomachi puncturas mitigant. Præterea calidā aquā, non tamen feruidam assidue absorbere, & sensim assidue obambulare, & præcordia molli lana integere, fouere ac inungere, & ante cibum infernas partes pro uiribus exercere, hæc omnia ad sanitatem assequendam mirificè faciunt.

*De tumoribus pedum in praegnantibus. Cap. XI.*

Pedū tumores in praegnantibus, rosaceo & aceto, & sale aliquando addito, perfricato. Prodest & terrā cineroliam cum aceto illinere, aut alumē scissum cum uino. Bonum est, & citriorum malorum decocto pedes lauare. Et anthyllim aceto maceratam obligare, & brassicæ folia per latū distēta imponere ac obligare.

*Cura praegnantibus adhibenda, Aspasie. Cap. XII.*

Praegnatēs quæ recens conceperunt, à timore, tristitia, ac omni forti mentis perturbatione asseruandæ sunt. Prohibendæ etiam gestationes in curribus, & uiolenta exercitia, ac spiritus detensiones, & coxendicū ictus. Neque uerò permittendum est, ut graue onus eleuet, aut saltet, aut duris sellis insideat. Sed nec acris edulia, nec flatuosa, nec clysteres acutos, nec cibi aut potus inopiam, aut superfluitatem concedemus. Sanguinis etiam effluxio, siue è naribus, siue ab hæmorrhoidibus, aut alio quocunq; loco, praegnantibus periculū inducit. Quapropter alimentis utendum est moderatis, & stomacho cōmodis, lecticæ gestatione, leni deambulatione, molli frictione, & lanificij exercitio. At circa octauū mensem qui omnium molestissimus est, alimentū contrahendū est, & motus uehemētiore praescribendi. Et si aluus suppressa fuerit,



fuerit, ob intestini recti angustias ab utero illatas, e-  
dulia exhibeantur uteri subducendo apta, uelut est  
pitisanæ succus, rumex coctus, malua, lactuca. Cæte-  
rum mense nono relaxandi corporis gratia, balneo  
frequenter utendū est, & omni modo prospiciendū, ut  
paritura futuros partus dolores foriter ferre possit.

*Notæ partus secundum naturā futuri. Cap. xiii.*

Parituris pectinis, ac superioris uentris grauitas, pu-  
dendiq; ardor adest. Et uterus ad pudendū procum-  
bit, ut obstetrici facile sit per contactum tentare. Os  
quoq; uteri disparatum, ac dilatatum est, & ad tactū  
lēue, ac humectum percipitur. Partu autem instante,  
superior uenter cōtrahitur, & inguina, ac pubes in-  
tumescent, & assidua mingendi cupiditas adest. De-  
inde plurimus humor prodit, plerisque etiam san-  
guis tenuioribus secundæ uasis ruptis.

*Parientibus facienda. Cap. xiiii.*

Quæ præparare oportet, & quomodo secundū natu-  
ram parientibus cōsulendum sit, superuacuum fuerit  
scripto prodere, quā ex longo usu nō modo obste-  
trices, sed reliquæ quoq; mulieres ista sciant. De hoc  
tamen uelut necessariō admonebimus, quod parien-  
tes spiritum detinere oportet, & ad inferiores partes  
propulsare, nō uelut imperitæ aliquæ faciunt in gut-  
ture congregare. Inde enim plerisque gutturis tu-  
mor, & uasorum eius loci dilatatio contingit, quæ  
affectio penitus incurabilis existit.

*Cura circa aegrē parientes adhibenda, Aspasiæ.*

*Cap. xv.*

Quum partus difficultas instat, & loci præclusi manēt,  
prægnans in balneum ducatur, & in calidæ labrum  
desideat, sæpeq; perfundatur. Utaturq; infusionsi-  
bus, ac illitionibus lubricitatem inducentibus. Qua-  
le est oleum tepidum, ouorum candida tusa, malug,  
foeni græci, seminis lini decoctum. Aut cerato liqui-  
do ex oleo cyprino præparato loci, ac inguina illi-  
nātur. Sed & hīrūdīnū nidus oleo dissolutus, & lū-  
bis iuxta spinam affusus, partum accelerat. Ferunt  
etiam tithymalli maioris radicem linteo illigatam  
femori utiliter alligari, & similiter styracem, corian-  
drum uiride, polygoni radicem, halcyonium, cucu-  
meris syluestris semen, atq; hæc omnia statim à par-  
tu amouenda esse. Cæterum si post partum secunda  
non sequatur, uiolenter ne extrahatur, sed sternuta-  
tio excitetur, & spiritus detineatur, & os, ac nares  
obturentur. Et si adhuc remanserit, extractio fiat ue-  
lut postea docebimus.

*Quomodo opem ferre oportet his quæ non tuto  
conciunt. Cap. xvi.*

Quædam mulieres etiam si concipiant, in partu tamen  
periclitantur, siue ob uteri paruitatem, ut ob id foæ-  
tum perficere non possit, siue ob colli eiusdem angu-  
stiam, siue quodd tuberculū, aut tale quiddā in eiufa-  
dē ostio exortū est, quod partū impedit. Atq; hæc sa-  
nè optimè fecerint, si à partu omnino cauerint. At si  
cōceperint, satius est foetū corrūpere, quā excide-  
re, quare ex ordine de corrūpentibus foetū, & de in-  
ducētib; sterilitatē agemus. Quod enim sterilitatē  
inducit, differt ab eo quod foetū corrūpit. Illud enim  
conceptū fieri prohibet, hoc factū corrumpit & ex-  
pellit. Proinde, ut ne mulier cōcipiat, primū caueat,  
ne temporibus conceptui idoneis cum uiro coëat, in-  
cipientibus uidelicet, aut desinentibus mensibus. In  
ipso uerò concubitus tempore, quum uir semen ele-

cturus est, spiritum detineat, ne in uteri cavitatem se-  
men feratur, statimque exurgat, ac genibus innixa  
sternutamenta cieat, & pudendum probè detergeat.  
Ad prohibendum etiam conceptum os uteri cum  
melle illinere oportet, aut cum opobalsamo, aut ce-  
dria per se, uel cum cerussa. Item cum cerato myrteo  
liquido cerussa ammixta: aut alumine liquido, aut  
galbano cum uiuo. Talia enim frigida, meatus ob-  
ducentia, ac adstringentia, ante coitum os uteri clau-  
dunt, & semen in eius cavitatem penetrare nō sinūt.  
Calida uerò proritantia, non solum uiri semen ab  
utero pellunt, sed reliquos etiam eius humores at-  
trahunt, ac exugunt. Sed & ea quæ sequuntur con-  
ceptionem prohibent, ac sterilitatem inducunt.

*Pessī sterilitatem inducentes. Cap.*

*xvii.*

Corticum pinus, rhois coriarij, singulorum æquales  
portiones cum uiuo è uinaceis expresso terito, & in  
lana ante concubitum adhibeto. Et hoc ablato post  
duas horas mulier cum uiro coëat. Aliud. Mali-  
corium recens cum aqua tritū subdito. Aliud. Ma-  
licorij partes duas, gallarum partem unam, terito,  
& glandulas paruas efformato, easq; ubi menses de-  
suerint subdito. Aliud. Gallarum drach. iiii. myr-  
rhæ drach. ii. cum uiuo uelut erui grana efformato,  
& in umbra siccato, atque ante coitum pro pessis  
subdito. Aliud. Caricarum carnes cum uiuo sub-  
actas adhibeto. Aliud. Florum mali punici sati-  
ui drachm. ii. gallarum tantundem, absinthij drach.  
i. cum cedria uelut ordeī grana formato, & duobus  
diebus à sedatis mensibus subdito, totoq; die sumā-  
tur, & his amotis tādē uenere mulier utatur. Hoc  
non fallit, & longo usu cognitum est. Potio ad  
idem. Succus cyrenaicus ciceris magnitudine cum  
duobus uini diluti cyathis potus, cōceptum prohi-  
bet, & menses ducit. Aliud. Succī cyrenaici, fo-  
liorum rutæ, opopanacis, æquales portiones terito  
& cera obducto, & fabæ magnitudinē exhibeto, de-  
inde uinum dilutum propinato. Et hoc menses pro-  
lestat. Aliud. Aloës drach. i. seminis uiolarum  
albarum obolos iiii. myrrhæ drach. iiii. piperis gra-  
na ii. Hæc in tres partes diuidito, & tribus uicibus  
exhibeto, statim ubi menses cessarint. Quin & fabro-  
rum aqua in qua ferrum extinguunt, assiduè pota,  
maximè statim ubi menses cessarint, sterilitatem in-  
ducit. Idem facit & populi albæ drachma, ex aqua  
singulis mensibus semel pota. Aliud. Mustelæ he-  
par sinistro pedi alligetur. Aut testes eiusdē anima-  
lis circa umbilicum gestentur. Aliud. Adeps siue  
pinguedo uuluae leænæ in uase eburneo gestetur.  
Est hoc efficacissimum. Aliud. Cerussa cum o-  
leo uelut pessus subdatur. Aliud. Florum ma-  
li punici satiui, malicorij, gallarum, succi uuæ acera-  
bæ singulorum drachmas duas, absinthij drachm. i.  
cedria excipe, & uelut ordeī grana efforma. Et mu-  
lieri quæ per biduum à uiro secubuit subde. A-  
liud. Postquā mulier à uiro secubuit, tot hederæ  
grana nigra è uiuo propinato, quot diebus foeminā  
concupere nolueris. Aliud. Hyoscyami semen  
antequā in terram exciderit, ab ipsa herba decer-  
pito, & cum lacte asinino terito, & modica myr-  
rha, ac hederæ nigro grano, aut corymbo ammixto,  
leporis aut muli, aut cerui corio inuolutum, gestan-  
dum exhibeto. Obseruandū est autē ne hoc amuletū  
terrā contingat: aut fabrorum aquā frigidā ieiunæ  
S propinato



propinato: aut salicis decoctum cum melle, propter eximendam amaritudinem, potandum dato. Ferunt etiam dentem infanti elapsum, si terram non attigerit, in anulo à muliere efficaciter gestari. Item lumbricū lapidicīnæ pro amuleto efficaciter appēdi. Aliud. Hyoscyami semen cū aquæ pullū alentis lacte subactū, & ceruino corio illigatū, sinistro brachio appendito, & ne terram contingat caueto. Aliud. Coriandri semē toto anno potū, sterilitatē inducit. Aliud. Vir aliquo adstringenti illinatur, quale est alumen, malicoriū, galla ex aceto trita, & ante coitū muria abluat, & non generabit. Omnia porrò medicamenta spleni conferentia, maxima ex parte conceptionem impediunt. Idem faciunt, & mulorum castratorum testes usti, & cum salicis decocto poti.

*Fœtum corrumpentia, ex Aspasia. Cap. xviii.*

Si mulier ad gignendum fœtum inepta, per negligentiam cōceperit, primū usq; ad trigessimū diem contraria fiāt his quæ suprà de cura prægñatibus adhibenda diximus, ita ut uehementissimis motibus uti iubeatur, & ut saliat, ac grauissima onera leuet. Et ut decoctionibus urinā, ac menses prolestantibus atq; aluum subducentibus assidue utatur, & acrioribus infusis uentrem eluat. In balneo item superiorē uentrem, pubē, ac lumbos quotidie defricet, & in aquæ tepidæ labro diu moretur, infessusq; paret ex fœni græci, althææq; ac artemisiæ decocto, & cum oleo antiquo per se, uel cum rutæ succo, ac melle perfundatur: & si adhuc persistit conceptus, præcordia & lumbos ex lupinorum farina taurino felle subacta integat, & epithemata huiusmodi imponat. Cyclamini, elaterij, artemisiæ, singul. drach. v. absinthij, grani cnidij, singul. drach. x. nitri drach. viii. radicis cucumeris syluestris drach. v. opopanacis drach. x. lupinorum amarorū, radicis chelidonij, seminis aut radicis uiolæ albæ, singulorum drach. vi. olei cyprini quantū satis est ad emplastri formā. Hoc post perfusionem cum artemisiæ decocto, superiori uentri imponere oportet, deinde caricas cum nitro, aut simile quiddā in pudendi sinum subdere, aut cum oleo trita illinere. Hoc autem simplex insigne est. Cupressi folia cocta trita, post balneum cubitum itura uentri imponat, & tota nocte sinat, & supina iaceat. Præstat & collyriū ex opopanace subdere, & alij corisces, ac pilos muliebres suffire. Quod si hæc nihil profecerint, ad ualidiora auxilia pergendum erit, neque tamen temerè hoc faciendum est. Omnis enim fœtus corruptio periculosa est, præsertim in muliere robusta, uterumq; duriores, ac densiores habente. Quare diligentī animaduersione opus est. Et secundus maxime, ac quartus mensis uitandus: est enim in utroq; naturalis quædam difficultas ac mora, & impares menses aptiores sunt ad aggræssionem, ac firmitatem. Vnicū itaq; tertij mensis tempus diligendum est: neque enim prius, neq; posterius cōueniet. Mulier autem à qua fœtus expellendus est, per aliquot dies antea tenuissimo uictu, & assiduus balneis, ac pelsis emollientibus subditis utatur, & à uino abstineat. Deinde uena secetur, & sanguis copiose detrahatur: sanguis enim à muliere prægñate euacuatus abortū facit, inquit Hippocrates. Tum post bīdium, aut trīdium, ubi interim à cœna euomuerit, foliorum mercurialis fœminæ decoctum, cum oleo, & garo conditum, ieiuna absorbeat. Aut aga-

ricum cum aqua mulsa bibat. Aut seminis uiolæ albæ drac. i. aut artemisiæ, aut dictamnij, aut gentianæ, aut castorij, singulorū drac. i. aut ammoniacum thymia, aut myrrham, aut lauri baccas cum aqua mulsa. Aut cacumina thymi, aut fel tauri cōgelatum nucis auellanæ magnitudine ex uino odorato dilutum bibat: hæc enim omnia etiam mortuos fœtus expellunt. Atque hæc quidem conceptum fœtum corrumpunt. si tamen non profecerint, oportet ante potionem, & epithemata quæ adhibentur, sternutamenta ciere cum his quæ ad hoc efficacissima habentur. Pessus corrumpens fœtum. Iridis, galbani, grani cnidij, terebinthinæ, singul. drac. i. cum fusino, cyprino, ac rosaceo oleo æquis portionibus efformato, & mulieri prius lotæ subdito, ac per totam noctem sinito. Mane uerò in fœni græci, & artemisiæ decocto sedeat, & si non successerit, idem rursus post balneum fiat. Alius. Seminis uiolæ albæ, nitri, absinthij, myrrhæ, pares portiones cum uino subactas in lana subdito. Alius. Foliorum rutæ, baccarum lauri, myrrhæ, singulorū drac. ii. cum uino subacta subdito. Collyrium citra molestiā trimestrem fœtum expellens. Seminis nasturtij, seminis uiolæ albæ, myrrhæ, absinthij, singul. drach. i. cum aqua efformato, & mulieri prius lotæ subdito, & interim pulegij decoctū bibendū dato. Aliud insigne. Abortonum quantū uoles in aqua ad totius aquæ consumptionē coquito, & exprimito, eumq; liquorem exceptū lana subdendū exhibeto, utere etiā auxilijs, ac epithematis, quæ ad retētos menses describemus. Tradūt etiā stercus columbinum suffitum fœtū expellere. Et cucumeris syluestris grana spōte excidentia, panno excepta antequam terrā attingant, adalligata magnā uim habere ad fœtum corrumpendum.

*Signa futurum abortum præcedentia. Cap. xix.*  
Futurum abortū aquosa primum euacuatio, deinde saniosa aut cruenta, & uelut carniū lotura præcedit. Vbi uerò planè exolutio aduenerit, purus sanguis, deinde grumi, ac demū fœtus ipse formatus, aut in formis egreditur, plerisq; etiā lumborum, ac coxarum grauitas adest, & superioris uentris, capitisq; ac oculorū dolor, stomachi morsus, extremarū partium frigiditas, animi deliquiū, horror febrilis: quædā etiā conuulsiones retrorsum, & uelut à comitiali morbo habet. Atq; hæc præcipue accidunt his quæ per medicamentorū uolentiam abortū procurarūt. Nam in his quæ citra medicamēta abortum faciunt, præcedit, uelut Hippocrates testatur, mammarū grauitas præter rationem oborta, femorū frigiditas, & grauitas, etiam lumbos occupans. At uerò ex abortu minus læduntur, quæ saniores sunt, & aluum natura laxiorem, ac uteri partes humidiores habent. Et quæ frequenter magnos infantes sine molestia pepererunt, & ætate proecliores, paucumq; sanguinem habentes, & non pingues.

*Quomodo abrupti fœtus eiectioni opitulemur.*

*Cap. xx.*

Si fœtus abruptus fuerit, & in uteri collo detineatur, oleo cyprino, terebinthina ammixta totū corpus, & præcipue partes utero uicinæ perfundantur. Eodem etiā eiectione loci assidue rigetur, & si sic non succedat, mulier aromatū decocto insideat, ac sternutamenta adhibeat. Et ex resina sicca, bitumine, propoli, & cancris fluuiatilibus, ac galbano suffitus fiat. Hæc & alia



& alia huiusmodi facienda sunt, si inflammatio non obstitit: nam ea præsente, intra infessus laxandi, ac mitigandi vires habentes nos continebimus. at si foetus detinetur ex eo, quod uterus citra inflammationem conclusus est, papyrū & spongas aridas, primū tenuiores, deinde crassiores, instar pessi subdemus, & extrema opopanace, uel panacis radice, cum melle, ac terebinthina trita illinemus. Porro eiectione foetu, si secunda non fuerit sequuta, uiolente extrahenda non est. Sed neq; umbilicus incidendus, & secunda relinquenda est. Strangulatus enim, & certa perniciēs ex hoc consequeretur. Verū si res diutius protrahatur, umbilicus incisus foemori mulieris alligetur, & summum studiū adhibeatur, ut secunda eximatur, quē admodum inferius de foetus exectione referemus.

*De his quæ bimestres aut trimestres foetus abortiunt.*

Cap. XXI.

Quæcunq; moderatè corpus habentes, bimestres, aut trimestres abortus faciūt, citra manifestam causam, his acerabula siue cotyledones mucosæ plena sunt, & non possunt præ gravitate foetū continere, sed abrumpitur, inquit Hippocrates. Has igitur curare oportet per medicamenta pituitā ducentia, totū corpus euacuādo: qui enim ante totius corporis purgationem, & ante prohibitum humorum influxum, statim à principio locos euacuare nititur, simile facit, uelut si quis perennē putei aquā exhaurire uelit, dū interim in exhaustæ locū assidue riuuli scaturiunt. Toto uero corpore euacuato, tandē cum his quæ pituitā ducent, etiam uterū purgabimus. Quales sunt pessi ex colocynthide præparati, qui cōtra sterilitatē ex humorum redundantia contingentem inferius describentur. Optima autē è lorio purgatoria pituitam ex utero educēs, sic fit. Colocynthidem magnā supernè incidito, & seminibus eiectionis, ac dimissa medulla oleum irinū infundito, & cum defecta particula colocynthide operito, & per diem, ac noctem madescere finito, deinde seruati cinere coquito, ac oleū excollato, & hoc repidum in uulvā inijcito. Hoc multas steriles foecundas fecit,educta ex alto pituita, quæ conceptum impediēbat. Viētus autē ratio adhibēda est calefaciens, ac siccās, moderata item exercitia, ac frictions, & omnis perfrigeratio uitanda. At uero his quæ ob naturalē facultatis retētiuæ debilitatem abortum faciūt, herinacel terrestris pellis usta, ex aqua, aut uino pota, ex naturali quadā proprietate auxiliatur. Idem facit & pudendi osculo illita. Idem potest & marinus herinaceus, ac conchæ usta. Itē myrti baccæ cum uino, aut oleo lentiscino siue susino illite. Rubi quoq; ac myrti & similium decoctis, loci utiliter irrigantur. Aētiles etiam lapis circa uentrem gestatus, & prægnantes, & foetus cōseruat, nec finit uterū flaccescere. Idē facit tritici granū intra panem repertum, sinistro brachio alligatum. Sardonius quoque lapis prodest superiori uentri appensus, donec dolores partus instant, & tunc ablati. Lapis itē in uulua, aut corde, aut intestinis ceruarum repertus pro amuleto gestetur: est enim ad retinendos foetus efficacissimus. Iisdem uiribus prædictus est lapis qui trunco arboris pro cunei more impingi solet.

*Pariendi difficultatis causæ.*

Cap. XXII.

Pariendi difficultas uarijs de causis cōtingit: aut enim eo quod puerpera animo, aut corpore, aut utrisque simul imbecilla est, aut ob uteri paruitatē, aut pro-

pter meatus angustiam. Quæcunq; autē propter ætatem staturæ breuioris sunt, hæ ferè uterū reliquis corporis partibus correspondētē habent. Potest & difficultas pariendi cōtingere: aut ob ceruicis uteri obliquitatē: aut ob carnē eidem ceruici, uel osculo eius adnatam: aut ob eiusdē loci inflammationem, uel abscessum, uel duritiā: aut quod tunicā ambientē solidiorem foetus perrumpere nō potest: aut quod humor in utero collectus ante debitū tempus excretus est, & iuxta partus tēpus sine humore, ac siccū manēt loci, quādo maximè opus est hoc humore, ut qui facilem transitū foetui exhibeat: aut quod puerpera uel sicæ calculo laborat, qui dū uteri collū comprimit, difficultatē pariēdi inducit: aut ob prægnantis carnositatē, siue pinguitudinē. Sed & ossa pubis nimium cōserta, pariendi difficultatē faciunt, dū in partu dilatari nō possunt: neq; enim uelut in uiris, ita in mulieribus ossa pubis alternatim cōseruntur, sed forti copula cōnectuntur. Contingit itē pariendi difficultas ob nimiam lumborum cavitatē uterum comprimentem: aut ob excrementorū copiam, in intestino recto, aut uesica detentā. Aliquæ etiā prouecta ætate debilitate ægrè pariunt. Aliæ quod primū parere incipiunt, anguntur, & propter imperitiā corpus aptè præparare ignorāt, aut quod per ætatē nondū uiriles sunt, nec uires uigores adeptæ sunt, sed adhuc puellæ pueriliter agūt. Difficilis præterea fit partus, quū foetus totus, aut pars magnitudine excellit: sæpe enim caput, uel thorax, uel uēter, plus equo augetur: aut quum debiliior est foetus, & saltibus, ac motibus suis matrē adiuuare nō potest: aut quū biceps est, aut tripes: aut quū gemini prodeunt, & repente uterq; simul collo uteri illabitur: aut quū foetus interiit, & parturiēti nihil auxiliij præbet: aut quū mortuus intumescit, & præter naturā iacet: situs enim prodeūtis foetus naturalis est, ut rectā in caput, manibus ad utrumq; femur extētis prodeat. Præter naturā uero caput in dextrā, uel sinistrā uteri partem declinat: aut altera, aut utraq; manus exeritur, & crura intus inter se diducuntur. Reliquis tamē figuris minus suspecta est ea quæ in pedes cōtingit, præcipuè si manibus super utroq; femore extētis prodeat. Foetus uero qui altero pede prodeunt, altero intus detēto, aut duplicati alicui uulvæ parti innituntur, directione indigent, sicut & qui manus expansas habēt. Cæterū qui obliqui prodeūt, minus improbandi sunt, & hoc tripliciter cōtingere potest: aut enim in alterutrum latus, aut in uētrē prodeūt. Sed tutius est in latus progredi: ita enim obstetricis manui locus datur, ut in caput, aut pedes nascentem dirigat. At qui duplicati prodeūt, in pessimā figurā illapsi sunt, maximè si in coxarū uertebras deferantur. Tripliciter autē duplicari solent: nā uel capite & cruribus, uel uētre, uel coxarū uertebris, osculo uteri incumbūt. uerū præstat uentrē incubere, eo enim à nobis dissecto, & intera-neis exēptis, confidēte corpusculo, facilis est figuræ trāsmutatio. Difficilis item fit partus, si secunda, aut propter crassitudinē nō abrumpitur, aut propter tenuitatē antequā oportet diuellitur. Porro ab externis causis pariēdi difficultas oboritur, uelut si anni tēpus frigidum, & hyemale meatus cōstrinxerit, aut calidū & æstiuū exoluerit. Hæc omnia de muliere ægrè pariēte medicum percūctari ex obstetrice oportet, nec temere ad chirurgiam progredi. Neque



uerò obstetrici permittendum est, ut uterum diutius dilaniet. Si ergo ob lumborū cavitatē pariendi difficultas contigerit, puerpera in sella, prona flexis genibus collocetur, ut uulua delabens ceruicē rectā extendat: eodē modo sistantur etiā pingues, ac carnosae. si uerò propter aliquā angustiam, aut stuporē, aut coarctationē, opem ferre oportet laxationi per infusus calidos, & suffusiones, ita ut etiā aer domus calefiat, & per infusiones oleorum, tum actu, tum potentia calidorū, itemq; per illitiones, ac cataplasmata eiisdē generis. Adhibēda quoq; sunt laxamenta à balneis, si non febris, aut aliud quid prohibuerit, & ex gestatione lecticā in loco calidiore. Quidā etiam concussiones fortes in his adhibuerūt. At uerò eam quae ob exolutionē imbecilla est, ad partū corroborare oportet cōdensantibus, ac maximē cōstringentibus, & firmitatē inducētibus: qualia sunt respirationes, ac infusiones ex myrto, aut pampinis uitis, aut malis punicis, aut rosīs. Et odoramēta cum aceto, & ungēta ex uino & oleo rosaceo frigidis: si uerò propter figurā prae naturā ipsius foetus, partus difficultas adest, ad naturalē sitū reducendus est, quātum eius fieri potest. Et si pedē, aut manū protrusit, ne attrahatur per membrū: magis enim impingitur, aut luxatur, aut etiā abrumpitur. Verū per digitos humero aut coxae foetus admotos, promissa pars ad cōueniēte locū introducatur. Si uerò unā cū coarctatione, totius foetus figura mala fuerit, prius ab osculo uterī in sublime eleuetur, & postea rursus ad osculum rectā dirigatur, fiantq; omnia placidē, leniter, ac citra compressionē, oleo assiduē locis affuso: hoc enim ex salute tū foetus, tū parientis fuerit, & uterus ita quoq; illaesus manet. At si uterī osculū clausum permanserit, pinguibus medicamētis emolliatur, ac relaxetur. Quod si uerò calculus affuerit, eum extra uelicae collū per catheterē propellemus. & si uelicalio plena fuerit, eodē catheteris instrumento lotiū educemus, si uerò intestinū rectū excrementis plenum fuerit, per clysterē eluimus. At si ob inflammationē, abscessum, ulcus, tumore laxū, aut duritiā, aut simile quiddā mulier parere nequeat, singulis pro affectionum ratione succurremus. Si uerò ob carnem collo uterī adnatā, aut ob tunicā aliquā innatā solidiorē, parturiēdi difficultas eueniat, uelut in nō perforatis mulieribus accidit, quicquid impedimēto fuerit, resecetur. Et si solidior fuerit, membrana foetū ambiēs quā ut abrumpi possit, discindatur. Quibus uerò humor in tunicis cōtensus ante debitū tempus effluxit, ita ut loci sint resiccati, eis albumina ouorū cum maluae aut speni graeci decocto excolato, aut cū prisanæ cremore tepido infundantur. At si uterī paruitas in causa fuerit, loca pinguedine aliqua inungantur, ac foueantur, & os uterī digitis dilatetur, & foetus uolēter extrahatur. Si uerò nō successerit, disseceretur. Quod tum maximē faciendum est, ubi foetus fuerit magnus, aut mortuus. Mortuū autem cognoscemus, ex eo quod ad tactum frigidus occurrit, & motu caret. At si gemini, aut tergemini fuerint, ac collum uterī obsederint, reliqui ad fundū uterī repellantur, & is qui magis paratus uidebitur, prius educatur. Si uerò ob capitis, aut thoracis, aut uentris magnitudinē, partus difficilis fiat, omnino necessariū est foetū secare. Porro tēpus collocandi puerperā in sellam, est quum uterī osculo aperto, digitis oc-

currerit, ac prominuerit id quod praeurpi solet. De foetus extractione, ac exectione, Philumeni. x xiii. Medicū ante exectionis aggressione spectare oportet, resoluta sit ne mulier aut nō. Et an seruari possit, uel sit deplorata. Et seruari quidem potentem aggredietur, deploratā uerò relinquet. Quae igitur letaliter affectae sunt, lethargico sopore premuntur, & resolutae sunt, ac difficulter reuocari possunt. Et ad maximas inclamationes reuocatae, debiliter respondent rursus deferuntur in soporem. Quaedam etiā per conuulsionē contrahuntur, aut neruis tremulae fiūt. Et pulsus fortiter tumidus, uerum obscurus, ac debilis depræhenditur. At uerò seruadæ, nihil tale patiuntur. Mulier itaque supina in lecto decumbat capite declinui, eleuatis cruribus, teneaturq; utrinq; à peritis, ac robustis mulieribus. Ac primum duae, aut tres buccellae panis uino imbutae offerantur, ad arandum animi deliquium. Et in ipso opere assiduē facies uino respergatur. Chirurgus autem difficultatis causam per instrumentum pudendum diducens conspiciat, thymusne sit, an callosa eminentia, aut aliquid ex his quae retulimus, quicquid id fuerit, uol sella arreptum scalpro amputabit, uelut postea docuimus. Si uerò tunica uterī os obstruxerit, eam quoq; resecabit, sicut inferius de non perforatis mulieribus trademus. Si uerò pelliculae foetum ambientis soliditas obstiterit, eam uol sella extensam cultro aculeato incidemus, & incisam digitis dilatabimus, & locum idoneum ad foetus egressionē parabimus. At si caput foetus locum obstruxerit, in pedes uertatur, atq; ita educatur. Quod si ita impactum fuerit, ut nullo modo retrudi possit, uncinus attractorius oculo, aut ori, aut mento infigatur, & ita infans extrahatur, hoc modo, ut instrumentum tractorium in dextra manu teneatur, uncinus uerò ipsius digitis occultatus, per sinistram manum leniter cointroducatur, & in aliquo ex dictis locis figatur, & deinde alterum instrumentum ex altera parte oppositum similiter immittatur, ac infigatur, ut aequalis, & ad neutram partem declinans attractio fiat, eaq; tutior, ne forte unum instrumentum in attrahendo elabatur, ac foetum dimittat. Atque ita aequaliter non solum in directum, sed etiam ad obliqua trahatur, & digitus pinguedine aliqua illitus, intra uterī os, & impactum corpus immittatur, & circumcirca ducatur. Dimidio autē foetu extracto, attractorium instrumentum ad superiores partes transferatur, ac infigatur. At uerò si caput, uel natura, uel hydrocephala affectione aquosa, magis tumidū impactum fuerit, scalpro incidendum est, atque ita euacuatum, ac contractum extrahendum. Quod si neq; sic prodierit, caluam contundere oportet, & ossa digitis eximere: si uerò ossa eminuerint, per forcipem detarium, aut ossarium auferre, ac tum demum instrumentum attractorium infigere, ac foetum extrahere. at si capite progresso, circa thoracem coarctatio fiat, itidem scalpro loci circa clauiculas dissecantur usq; ad uacua: ut humore euacuato, moles thoracis confidat. si uerò nimis uenter inflatus fuerit, mortuo foetu, aut hydropico existente, eadem methodo uerentes uētem dissecabimus, ac intestina eximemus: si uerò manus protensa fuerit, ab humero resecetur: oportet autem linteo obuolutum, ut ne elabatur, aliquantulum extrahere, quo sic humeri articulus exeratur,



exeratur, & tunc diductis pudendi labijs refectionē facere, & postea sinistram manum immittere, ac caput dirigere, & ita foetum educere: Idem faciendum est etiam ubi ambæ manus fuerint protensæ. similiter etiam pedes protensos reliquo corpore non consequente, ab inguinibus rescare oportet. At si duplicatus foetus occurrerit, & dirigi nō poterit, si caput magis expositum fuerit, ossa eius conteremus cute non dissecta, deinde alicui eius parti attractoriū instrumentum infigemus, ac attrahemus, & cruribus directis educemus. Sed si crura magis exposita fuerint, coxæ articulum rescabimus, & ita coxas transgrediemur, ut caput fiat contritioni facile paratū. Si uero duplicatio pertinacior fuerit pedibus magis expositis, caput circa coarticulationē ad uertebam amputetur, deinde transgresso thorace pedes attrahantur. Si uero reliquis partibus ablatis, caput reatū detineatur, sinistra manus oleo illita in uteri profunditatem immittatur, & caput requiratur, & per digitos ad uteri os deuoluatur, & unū, aut duo attractoria instrumenta infigantur. Cæterum loci ad infigendū instrumentū idonei, in capite sunt oculi, auriū meatus, os, mēti pars inferna. In thorace axillæ, clauiculæ, præcordia, pectus, uertebrearum articuli, iugulū. In cruribus ossa pubis, foemineū pudendum. at uero si osculū uteri ob inflammationem fuerit conclusum, nihil uiolenter agendū est, sed infusionibus pinguibus largē utendū, infussionibusq; ac irrigationibus, & cataplasmatibus, quō inflammatione aliquatenus sedata, & osculo dilatato, foetus uelut dictū est educatur. Vbi uero integrā foetus sectionē fecerimus, omnes eius partes cōponantur, diligēterq; obseruemus ne aliqua desit, aut interius clam nobis relinquantur. Deinde Secunda protinus educatur.

De secunda educatione, Philumeni. Cap. xxiii.  
Si Secunda, quæ etiam locus appellatur, & Secunda quidem dicitur, quod uelut secundū domicilium, ac receptaculū sit ab utero, & uelut foetus indumentū. si Secunda inquam detinetur, interdū uteri os clausum, interdum apertū reperitur, & aliquando inflammatum, aliquando citra inflammationē. Et modo uteri fundo cōiuncta secunda reperitur, modo seiuncta. si ergo os uulue apertū, & secunda seiuncta reperitur, circa aliquā uteri partem instar pilæ conuoluta, facilissima est educatio. Sinistrā enim manū calidam & pinguefactā in profundū immittere oportet, & arreptam secundā extrahere. Si uero uteri fundo connexa fuerit, similiter quidem manum immitemus, uerum appraehensam secundam non statim rectā attrahemus, propter prolapsus uulue timorem, sed sensim nulla uiolentia adhibita, primum in obliquum placidē ducemus, hac & illac obuertētes. Deinde aliquando ualidius attrahemus. Sic enim obedit, & à concrectione exoluitur. At si uteri os clausum fuerit, perfusionibus pinguibus utemur, & per sinistram manū digitos leniter aperire, ac paulatim dilatare conabimur. Et si non successerit, superiorē uentrem ex cruda ordeacea farina aqua calida, ac oleo subacta integere oportet, rursusque locos perfundere, pinguiasq; fomenta adhibere. Et si uires non fuerint debiles, etiam sternutatorijs utendum est, ex castorio, ac pipere præparatis, & porionibus mēses cietibus, de quibus postea agemus. Atq; hæc omnia prima, ac secunda die faciēda sunt. Suffribus insuper utemur

per aromata ex olla, qualia sunt casia, nardus, iunci odorati flos, artemisia, iris, sabina, dictamnium, pulegium, & huiusmodi, ita ut olla sellē supponatur, cui mulier insideat undiq; uestimentis coniecta. Postea uero tentabimus, & si uteri osculum apertū inuenierimus, manum immitemus, & sicut dictū est, secundā educere conabimur. Si uero neq; sic educata fuerit, perturbari non oportet: intra paucos enim dies putrefacta, & in saniem dissoluta excidet. Quandoquidē uero ob graueolentiam caput replet & obturat, ac stomachū subuertit, odoramenta assidue suffiantur cōuenientia: & ad hunc usum probata sunt, cardamomum, carica, bdelliū, sabina, thus, styrax, lapis gagates, onyx aromaticus, ladanum. Eisdem quoq; castorij, ac pulegij singul. drac. i. ex aqua multa bibenda detur. Conueniunt etiam leniora menses ducentia, artemisiæ decoctū, & baccarum lauri, cum uino mulso. Pelsi etiā subditi ad hoc faciunt, myrrha & cyclaminus ungento excepta. Facit item ouis & capræ secunda arefacta, trita, & uino pota. Aut cū ungēto subdita, aut pro amuleto gestata. Alius pelsus. Carnium uuarū passarum, cumini, resinæ, terebinthinæ, spumæ nitri, singul. drac. x. excipe melle, ac subde. Idē possunt & infusiones in artemisiæ, baccarum lauri, anethi, ac chamæmeli decoctis.

Cura post foetus exectionem, Aspasia. Cap. xxv.  
Postquā secunda siue statim ab educito foetu, siue postea educata fuerit, neq; quicquā superuacuum in utero relictum, crura cōponantur ut partes distractæ cōueniant. Et si loci satis purgati uidebuntur, maluæ, aut foeni græci decocto eluatur, & oleo calido perfundantur. Eodemq; lumbi, ac pubes perfundantur, molliq; lana oleo calido imbuta integantur. Et alimenta forbilia offerantur, & aquæ potus uiletur. Ac si purgationes non suffecerint, infusiones ex foeni græci, artemisiæ, althææ, pulegij decoctis adhibebimus. Pulegij itē, ac foeni græci decoctū propinabimus. Si uero purgationes nimīū processerint, irrigationes moderatē adstringentes, ac infusiones consimiles adhibeantur, & uenter lōga fascia uinciatur, & cibi adstringentes offerantur. Si uero inflammatio superuenerit, inflammationi succurrendum est. Et si copiosa sanguinis eruptio, etiam ipsi medendū est, cum his quæ postea referemus. Si nihil horum acciderit, uteri collum, ac osculum, & pudendum pinguitudine aliqua inungantur, ac foueantur.

Causæ sterilitatis, itemq; curatio in uiro, ac muliere. Notæ item conceptionis. Cap. xxvi.  
Sterilitas aut ulri, aut mulieris, aut utriusque ratione contingit. Et ex uiro quidem est, quum semen eius uel seruidum, & uelut torrefactum, uel frigidum, tenue, aquosum, languidumq; fuerit, quale est decrepitorum. Vel crassius quàm oportet emittitur. Aut quum uiri semispadones sunt, & penem breuissimū habent, ut semen in uulue profunditatem eiaculari non possint. Quod etiam aliquando ob nimīā obesitatem contingit: tales enim præ nimia aqualiculi mole, semen ad uteri recessus non eiulantur. At uero mulier non concipit, si uterum habet uel calidum, & igneum, uel frigidum & humidum, uel squalidū ac siccum, uel carnosum & pinguem, uel excarnem ac gracilem, aut debilem, aut angustū, aut breuem. Aut quod uasa eius clausa sunt & obstructa, aut per cicatricem inductā excæcata. Aut quod membranæ



osculum uteri obturantes, nullum foramen relin-  
quunt. Aut quod uteri cervix obliqua est. Aut quod  
osculum nimis angustum, uel amplum. Aut quod  
alia aliqua affectio ex inferius recensendis uulvam  
impedit. Sed & inuerti coitus inanes, ac steriles sunt.  
Amor enim genituram conciliat, & propterea fo-  
minae amantes crebro pariunt. Aetas etiam, uel iu-  
nior, uel prouectior conceptionem impedit. Qua-  
propter primum pubescentes à uenere prohibendae  
sunt, ita ut uir quidem trigelimum annum, mulier  
uero decimum octauum attingat. maxime uero ine-  
pta mulieris forma sterilitatis occasio est: foecunda  
enim mulier habere debet proceritatem corporis mo-  
deratam, lumbos & superiorem uentre latos, nates  
eminentes, pectus angustum, mammas amplas: tales  
enim mulieres foecundae, his autem oppositae steri-  
liores sunt. Potest & praeter enumeratas causas, ali-  
qua magis recodita esse. Verum tot ferme sunt quae  
noscuntur. Viri itaque qui ob deprauatam uictus  
rationem semen corrumpunt, ad magis compositum,  
ac salubriorem uictum conuersi, seminis foecundita-  
tem acquirunt. At qui alienis foeminis delectati pro-  
prijs uxoribus non conueniunt, seruata temperantia  
generabunt. Qui uero seminis profluuio laborant,  
curati, foecundi fiunt. At qui geniturę meatus occa-  
ratos habent, uelut quidam quibus calculi excreti sunt,  
eos pro deploratis habebimus. Sed neque semispado-  
nes, ac nimis angustis meatibus praediti, semen ex-  
cernunt. At uero ubi uir, & mulier bene se habent,  
neque aetas, neque corporis habitus, neque aliqua uteri  
affectio obstat, tali uictus ratione utemur, ut neque ni-  
mio labore, tum uirum, tum mulierem defatigemus,  
neque prorsus oculos esse sinamus. Hoc enim super-  
fluitatibus corpus replet. Illud sanguinem siccant, &  
purgationes consumit. Balneis utantur neque assidujs,  
neque copiosis. Cibos ac potus concoctu faciles, &  
quos uenter superare potest sumant. Hoc uero uelut  
maximum negligendum non est, ut nec uir, nec mulier  
pinguem habitum acquirant. Tales enim inepti sunt ad  
pueros gignendos: nam neque pudenda inter se adaptare  
possunt, & uiri parum seminis emittunt, & mulieribus  
menses pauci feruntur, quum maxima alimenti pars  
in pinguedinem transeat. Caeterum quomodo pingues  
se gerere debeant, Sermone quarto de carnium subuer-  
sione diximus. Conuenit & cibos, ac potus ueneremur sti-  
mulantes, ac semine generantes assumere, atque tales sunt  
qui calfaciunt & inflant. Vinum igitur aquae preferen-  
dum est. Et ex oleribus prodest horminum, eruca, &  
irio, ac similia. A ruta uero mentha, ac calamintha  
penitus abstinendum est: metra enim semen quidem mul-  
tum, sed debile, ac languidum gignit: ruta uero cor-  
rumpit. Illud autem obseruandum est, lunari purgatio-  
ne appetere opportunissimum concipiendi tempus esse.  
Tunc ergo mulieri ex uberiore alimento aliquid de-  
trahendum est, & cibus moderatus, attenuans, ac boni  
succi exhibendus. Omnibus tamen alimentis ammiscen-  
da sunt quae purgationes irritare possunt, uelut sunt  
olera odorata & acris, scandix, crethmon, foeniculum,  
gingidium, apium, smyrnium, asparagus palustris, & si-  
milis: spes est enim probe purgata priusquam uterus  
refrigeretur coceptura esse: quod si à concubitu co-  
ceptionis notae apparuerint, spes rata erit. Coceptionis  
notae sunt, si uteri os clauditur, ac siccum est, & à pudē-  
do recedit. Imò peritiores foeminae post semine immis-

sum, uterum moueri percipiunt: mouetur enim ad ge-  
nituram complexum. Quibusdam praecordia exiliunt, a-  
lijs oris uentris dolor, ac exolutio cum uoluptate qua-  
dam accidit. Est & hoc non exiguum indicium, si mulier  
urinae stillicidio uexatur, quod praecipue patiuntur,  
quae primum concipiunt, & quae menstruas purgatio-  
nes integre non exegerunt, quanquam idem etiam alijs  
usque ad septimum diem aliquatenus accidit. Post septi-  
mum autem obscura quaedam plicae signa oboriuntur,  
acidorum, ac salforum desiderium, uertigines, pal-  
lor, somni longiores. Eodem etiam tempore men-  
ses citra molestiam detinentur. Mas autem uehemen-  
tius, ac uelocius in dextera parte magis mouetur:  
foemella debilius & tardius, atque in sinistra. Atque  
hactenus de praeseruatione dictum sit. Nunc quo-  
modo singulae affectiones conceptionem impediē-  
tes curandae sint, dicetur.

*Frigidioris uteri signa, ac curatio. Cap. xxvii.*  
Si mulier ob uteri frigiditatem non concipit, exercitijs, om-  
nibusque fomentorum genere calorem reuocet: neque inco-  
modum fuerit castorium, cuminum, anisum, pulegium,  
& alia huiusmodi bibere, & singulis piper ammi-  
scere. Utilius tamen hoc medicamento purgabitur.  
Epithymi, euphorbiae, piperis, dauci, petroselini, sin-  
gularum aequales portiones bibat, sit autem totum drag-  
m. hoc & aluum ducit, & uulvam calefacit, ut mul-  
tis prius non purgatis hinc menses eruperint. Quod  
si purgatio per inferna non suffecerit, uomitus quoque  
prouocetur origani, aut thymi decocto, ante & post  
cibum, omni studio adhibito, ut pituita euacuetur.  
A uomitu uero castorium & praedicta semina bi-  
bat. Uteri uero fomera sunt per suffitus & uapores,  
arundine ollae operculo perforato inserta, ita ut ua-  
por intra pudendum excipiat. fiunt etiam per affusio-  
nes aquae calidae, in qua decocta est artemisia, salvia,  
ruta, cuminum, pulegium, cyperus, acorum. Possunt &  
haec singula pectini imponi cataplasmatibus modo. Co-  
fert & polyarchii epithema, & quod Amythaoni  
inscribitur, & reliqua huiusmodi. Pecten item, ac co-  
xae irino & amaracino, ac cyprino oleo perfricetur.  
Et pessus ex myrrha, ruta, galbano & castorio para-  
tus uuluae subdatur. Possunt etiam aliquando ualidiora  
ammisceri, uelut est piper, sal, fel bubulum. Validum  
est elaterium, sed minime molestum. Fiat quoque ex  
aqua malsa, aut marina per se, uel aceto ammixto  
fomenta. Praedicta tamen medicamenta molli lana  
excepta adhibeantur, ut ne corpus mordeant, & exul-  
cerationem faciant: neque difficile est ipsorum quan-  
tatem metiri: pro affectionum enim magnitudine, ac  
diuturnitate, medicamenta sunt augenda, aut minuen-  
da, mora item longioris, aut breuioris temporis tra-  
henda in ipsorum usu. Caeterum uterorum frigidi-  
tatem ex mensibus suppressis coniectamus. Neque  
enim praeter nimiam crassitudinem commode deferuntur. Sed  
& stupidus sensus circa pectinem, lumbos, ac crura  
percipitur. Aliquae etiam penitus crurum impotentes  
sunt. Quod si prorsus perfrigeratae fuerint, ne uene-  
rem quidem appetunt, & uteri osculum contractum  
habent. Atque haec de uteri frigiditate sufficiunt.

*Calidioris uteri signa, ac curatio. Cap. xxviii.*  
Uterorum caliditas ex reliqui corporis caliditate conie-  
ctatur, & ex mensium paucitate cum dolore prodeun-  
tium, ita ut pudenda mulieris exulceret. Sed & quae  
prodeunt nigriora sunt, & ob nimiam puncturam nullum  
ordinem



ordinē seruant. Sequitur etiā ad hanc temperaturam insignis salacitas, & totius corporis siccitas. His itaq; cōueniunt humectantia ac frigefaciētia, qualia sunt ex oleribus quidem lactuca, malua, blitum, cucumis, cucurbita, pepō, atrīplex, & portulaca. Itē aliq; cōsimiles cibi. Vinum uerō tenue sit, & album, ac aquosius. Somnus autem longior, & aquarum dulcium balnea. Ad uescā uerō, & summum uentrem ac lumbos, frigefaciētia adhibenda sunt, uelut est solani aut umbilici ueneris succus rosaceo ammixto lana exceptus. Idem & in pudendum commodē subditur. Mercurialis item lumbis ac pectini imposita, utero calidiori prodest. Spuma quoque argēi & cepussa cum aqua trita. Horum autem omniū quantitatem recte metieris, si semper singula multum posse arbitratus, perfrigerationis excessum caueris.

*Humidioris uteri curatio. Cap. xxix.*

Quæ ob uteri humiditatem non cōcipiunt, eas sicciorē diæta uti conuenit, multumq; exerceri ac fricari, & euacuationis ac auersionis gratia aliquando post cibum, aliquando ieiunas uomere, & moderato cibi usu resiccati, & carnes assatas potius uiscentium ætate animalium, ac pisces duriores comedere, & uinū potēs meracum quidē, sed parcius bibere. Sicca etiā fomēta crebro: balnea uerō rarō adhibenda sunt. Cæterū qui statim à principio resiccantia ac adstringentia utero adhibēt, non parū lædunt: cohibita enim materia ad principales partes decurrit. uerum ubi totum corpus purgatū fuerit, tutius deinde utero adstringentia corroborantia adhibētur. Quale est lentisci decoctum, & myrti, ac rosarum, & rubi tenerorum uirgultorum, & polygoni fœminæ decoctū: mas enim graminis magis similis est, flore puniceo, folijs rutæ similibus, semine intra folia pusillo. Poterit tamen etiā huius decoctū ieiunæ cōmodē in potū dari. Ad nimiam quoq; uteri humiditatem huiusmodi potiones cōueniūt. Myrti baccas, aut malicorū punici dulcis, cū uino terito ac exhibeto: aut auellanas nuces uistas cū uino tritas propinato. Hoc autem epithemate utēdū est. Psylliū tritum, & palmularum carne cū aqua mulla trita exceptum apponito. Aut mala cotonea similiter palmulis excepta adhibeto.

*Siccioris uteri curatio. Cap. xxx.*

Mulier quæ ob uteri siccitatem nō concipit, humidiora alimenta exhibenda sunt, & reliqua uictus ratio humidior constituenda. Toto enim corpore humectato, uterus quoq; eadem qualitate participabit.

*Diuersarum affectionum, ob quas mulieres non concipiunt, curatio. Cap. xxxi.*

Si propter humorum crassitudinem mulier non concipit, humorē cōsiderare oportet, & mordentem sero lactis purgare, heminis quinq; paulatim exhibitis. Cibus item boni succi offerre, & uomitū per interualla ciere. Pituitosos autē & aquosos humores, laboribus & exudationibus ac uomitibus crebris euacuare oportet. Quādoquidē uerō etiā flatus in utero existentes, cōceptionē impediunt, & flatus ab imperfecta cōcoctione fiunt, primum quidē parciore cibibus exhibendus est, deinde danda quæ flatus expellūt, uelut est ruta, cuminū, anethū, ac reliqua familiaria fermina, & pleraq; aromata, quæ etiā subdi possunt, præsertim ruta cum melle ac modico nitro. Possunt ex hisdem etiā fomēta parari, & cataplasmata ac cerata, ad pubē imponēda. A' leguminibus autē & edulij

dulcibus ac flatuosis omnibus abstinendū est. Si uerō cōclusi fuerint uteri, odoratis perfusionibus, & mollitorijs ex adipe anserino paratis aperiēdi sunt. A' mollioribus tamen infusionibus ac perfusionibus incipiendū est, ex malua, semine lini, ac fœno greco, & oleo, & aliquādo melle paratis. Deinde ad ualidiora trāseundū, artemisiā, conyzam, calaminthā, pulegium, amaracū & chamæmelum. Atq; his adhiēciendū est irinum ac cyprinum oleum, ac mel, myrrha uerō troglodytica, terebinthina, nitrū, calia, caricarū carnes, ungentū amaracinū, & huiusmodi subdantur. At uerō his quæ ob uteri os nimium hians non cōcipiunt, conueniunt uictus, & fomenta, ac medicamenta sicciora ac adstringentia. Talia sunt gallarum decoctum, cytini, lentiscus, rubi radix, myrtus, & eiusmodi. Vteros uerō distortos mollientibus fomentis dirigere ac corrigere oportet: fomenta enim ad hoc maxime faciunt, & pessos mollitorios subdere. Quin & specillo & digito correctio eorum faciēda est. Maxime uerō pulegij & artemisiæ decoctū, & castorium ē postea potū, utero distorto cōferunt, & tota curatio ad uteri declinationē postea referenda. At si per aliquorū pharmacorū adhibitionē, quæ conceptionem prohibent, mulier non concipiat, eius pharmaci facultas consideretur, nunquid humoris attractione semen eluerit, aut flatuum multitudine idem elegerit, aut per adstrictionem os uteri obturauerit, ac seminis accessum interceperit. Et deinde singulis affectionibus succurratur, perfusionibus ac infusionibus cōgruis. Hæ uerō maxime utiles fuerint, si osculum & acetabula uteri fuerint adstricta. Pinguiā etiā cuncta ac fomēta adhibenda sunt, & quæ humiditates attrahere possunt. Cæterum medicamentā sterilitatē inducentia, quum uasa uteri excæcent, incurabilem plerunq; affectionem faciunt. Et tamen non statim omnes uires adimunt: quædam enim portiones cæcitatem curabilem inducunt, cui si protinus subuenias, mederi possis. Quemadmodū enim lethalia uenena uomitu, aut clysteri, aut medicamento cōgruo exoluuntur, temporis uerō progressu nullo modo corrigi possunt, sic & quæ ualidam sterilitatē inducunt, aliquando depellere datur, si statim opem feras: si uerō diutius perseuerauerint, incurabilia euadunt. Porro ulcera & inflammationes uteri quomodo curare oporteat: itē carnis excrescentias, thymosq; ac tunicas auferre, singula suis locis ex ordine dicentur. Superuacuum est enim eadē sæpe dicere. At uerō si nulla re infesta, nec in utero, nec in reliquo corpore apparente, incertum fuerit cur mulier non concipiat, asinino lacte ipsam purgabimus, cibisq; boni succi alemus, & fomentis suffusionibusq; odoratis, & pessis subditis, uteri os aperientibus, & sanguinem attrahentibus utemur, ueneremq; per duos aut tres menses prohibebimus.

*Potiones, pessi, & suffitus ad cōceptionē. Cap. xxxii.*  
Mercurialis cum castorio, item absinthium, tribus aut quatuor diebus consueto mensium tempore in potu exhibeto. Est & hæc portio ad conceptum efficax. Salis ammoniaci drac. ii. saluæ, cumini, sing. dra. i. omnia simul per tridū menstruis desinentibus cum uino præbeto. Alia. Nigellæ, salis ammoniaci, singul. drac. i. cyperi dra. vi. simul terito, & in quatuor partes diuidito, & unam singulis diebus cū uino bibendā dato, menstruis desinentibus, & postea cū uiro



congregiatur. Sed & uirum strenuā operam nauare oportet, interimq; à uenere abstinuisse, & boni succi cibis nutritū esse. Pessi uerò subscripti cōueniunt, præsertim si ex humorū mucositate infœcundæ fuerint, poterisq; ex his, cōgruum singulis affectionibus medicamentum eligere. Pessus Asclepiadæ, utero purgādo idoneus. Cyperi, nitri, aluminis scissi, myrrhæ, thuris, croci, spumę nitri, mellis, æquales portiones cum modico pipere tritas melle excipe, & pessum in de tenui linteo aut lana pura inuolutum ac rosaceo imbutum, mulieri prius elotæ subde. Vtere etiam elotione purgatoria admirāda suprā ad bimestrem aut trimestrem fœtum abortientes descripta, ex colocynthide & oleo irino. Alius pessus purgatorius. Succī cyclamini, medullæ colocynthidis, nitri rubri, mercurialis, singul. drachm. iiii. myrrhæ drach. ii. omnia seminis lini decocto excipe, & utere post menses purgatos uelut dictū est. Alius, Medullæ colocynthidis, myrrhæ, nitri, cumini Aethiopici, singulo. unc. i. excipe carne caricarum, & utere post menstruā purgationem. Alius. Anisi, cardamomi, nitri, aristolochiæ, pulegij, fœni græci, carnis caricarum pingulum, singul. drach. ii. arida terito & cribrato. Carnes autē caricarū passo subigito, eisq; arida excipito, & in cornea pyxide seruato. Deinde usu expetente columbini oui magnitudinē accipito, & irino oleo madefactum ad uteri osculum subdito. Huiusmodi pessi mucosos humores educunt. Sufficiente uerò purgatione facta, infusions adhibeantur. At uerò quoniam nō ea solum quæ uterum purgant, conceptioni conferunt, sed alia etiam medicamenta ad parādā fœcunditatē descripta sunt, ea itidem iuxta ueterum traditionē subiungemus. Pessus ad conceptionē idoneus. Coaguli leporis partes ii. aluminis scissi partem i. melle excipito, & pessum formato, ac utitor ubi prius uterus per prædicta fuerit purgatus. Alius, Seminis satyrj, mellis, singulorum sexuncem in pessum efformato: aut uescicam felis dorcadis aut hirci euacuato, & ex uiscoso intus reposito pessum formato, & paululū ante congressum subdito, aut penem ex eo illinito. Aut purpuram uerā hircino felle imbutam, mulieris umbilico per septē dies imposito, & deinde crescente luna uiro congregiatur. Alius. Dorcadis, hoedi, leporis coagulū, & fel, cum sanguine & adipe agnino, & medulla ceruina, post purgationem subdito. Nardini etiam ac rosacei olei aliquid addito. Alius, quo Asclepiades in nobilibus fœminis utebatur. Myrrhæ drach. iiii. iridis, stercoris leporis, singul. drachm. ii. cum aqua in collyria efformato, ac subdito mensibus desinentibus. Et postea cum uiro misceatur. Alius. Aluminis scissi, rhois rubri, singul. drach. ii. myrrhæ drach. i. croci obol. ii. terito, ac melle excipito. Vsu autem postulante, medicamentū gallæ paruæ quantitatē accipito, & hoc molli lana exceptū ac rosaceo imbutū, post mensium declinationē subdito, & per tridū finito, donec purgatio fuerit peracta. Tertia uerò die mulier lauet, & locis rosaceo illitis cum uiro concumbat. Alius. Leonis, aut urli, aut hyænæ, aut taurini fellis uescicam euacuato, & in ipsam olei rosacei, nardini, irini, mellis, æquales portiones indito, omniaq; simul ad calidū cinerē unita seruato, ac utitor post mēsum purgationē ante cōcubitū. Alius. Fel piscis per se uel cū melle subdatur. Aut uerbena

cæ rectæ succus cū butyro, desinēte lunari purgatione supponatur. Alius lenissimus. Radicis althææ purgata ac lotæ quadrantem cōtundito, & in olei sextario torreto. Deinde abiectis radicibus, adipis coturnicis sexuncem, ceræ sextātem ammiscero. Ego uerò trientem ceræ ammiscero, & similiter in pello subdo.

Amuletum naturale. Ossa quæ in corde cerui reperiuntur, sinistro brachio adalligata, arcana quadā naturæ uel cōceptionem iuuare creduntur. Suffumigium ad cōceptionem efficax. Bitumen, pilos leporis, rutā aridā, simul terito, & cū cera præmollita in pastillos formato, & super stercore bubulo suffito. Aliud obstetricis. Sādarachā tritā cum cupressi ramēis, sufficiēti cera in pastillos cogito, eosq; super bubulo stercore statim post mensium purgationem quatuor diebus suffito. Aliud eiusdē. Caprini cornu ramēta oleo cōspersa peractis mēlibus suffito, & locis adhuc calētibus mulier cum uiro cōgrediatur.

Ad mares generādos. Si uir dextro pede fascia cādida uincto cū muliere coeat, marem ut ferunt, generabit. Si uerò sinistrū pedē colorata fascia ligarit, fœmellam. Tradunt etiam satyrj ac serapiadis radicē, solidiorem salaces facere, & masculis generādis prodesse, flaccidiorem uerò contrarium efficere.

De lactis defectu.

Cap. xxxiii.

Hæc affectio infantibus magis quā mulieribus grauis est. Quapropter Sermone quarto ubi de pueris tractauimus, conuenientem curationem tradidimus. facit autem naturaliter lapis galactites pro amuleto adalligatus, & aqua dissolutus, ac potatus.

Ne lac in mammis coeat in grumos. Cap. xxxiiii.

Vt ne lac in mammis puerperarum in grumos coeat, ab adultis ac peritis mulieribus leniter exugatur, & marmæ cyprino oleo, cum ouo & croco illinatur. Aut fœni græci succum, aut cumini decoctum cum modico croco oblinito. Aliud. Ceræ unc. i. portulacæ sesquiunciā, cum oleo sesamino illine, ac utere uelut probato. Lac etiam instar casei coagulari in mammis prohibet cera alba in pilulas redacta, & quotidie magnitudinē trium erui granorū exhibita. Cæterū Soranus mammæ assidue dolentes, neq; à mulieribus, neq; ab infantibus exugi oportere affirmat, & suctione plus materiæ attrahi asserit.

Probè etiā facit terra cimolia cū aceto aut aqua, & oleo rosaceo imposita. Et cādidi marmoris aut cādidorum lapidū ramenta similiter adhibita. At si amplior fuerit plenitudo, & ob id mulier grauetur, ac doleat: lentes aqua marina aut muria coquito, & cū decocto quidem mammæ abluito, ipsas autem lentes contusas imposito. Confert item apium & mentam, & fel bubulū præsertim illinere aut imponere.

Aliud. Fucum tinctorium terito, & cerato excipito, & adhibeto, ac singulis diebus bis permutato. Sit autem fuci triens, ceræ quadrās, olei myrtei dextans. Aliud. Pollinis thuris drach. x. ceræ dextātem, pumicis unc. x. olei rosacei unc. xx. utere eodē modo. Aliud. Lapidis asij, ceræ, singulorū sextātem, olei rosacei, aut cicini bessēm, præpara ac utere bis in die permutando. Lac enim abolet, & inflammationes sedat. Quod si alius lapis defuerit, pyrites succedat pro ipso. Præstat & aqua marina aut muria assidue fouere.

De coagulato in mammis lacte, & iisdē turgentibus ob lactis redundantiam.

Cap. xxxv.

Ad hæc



Ad hæc uisla in principio leniter reprimentibus utendum est, uelut est spongia pura posca imbuta, & pal mulę cum pane & posca tritæ, deinde uincire, ac moderate cōstringere oportet, quod si lac restinguere malueris, alumē & psyllium cum aceto & coriandri succo; aut lapidē pyriten cū rosaceo & aceto adhibeto. Ad coagulationem uerò lactis priuatim fursures in aceto coctos cum rutę decocto imposito, quū primum lac gignere incipiunt, Idem facit menta polentæ ammixta, & iuglans cum ruta ac melle, & ricini folia trita, & cuminum priuatim, uel cum polenta, & capita papaueris cocta cum melle, & crocus cū lacte, & muriæ fomentum, & apium uiride impositum, quod etiam grumos lactis dissoluit. Utendum & ceratis ad grumos descriptis.

*De uitiato lacte mammas lædente. Cap. xxxvi.*

Lac uitiatū aliquando māmārū uasa exulcerat: quæadmodū itaq; in reliquis partibus uitiati humoris peculiare destillationes efficiunt: falsa enim lacryma oculum mordet, & acres excrementitæ superfluitates intestina erodūt. Ita & lac in mammas uitiatum, scabiem, panos, & papularum eruptiones producit. Ulcera ergo hic enata, simili modo n̄sdemq; remedijs, quibus cætera totius corporis ulcera curantur. Ipsi tamē lactis uitationi primū succurrendū est, cuius improbos colores, subalbidū, nigricantē, flauū, subfuluū, aut uiridē, hac arte deprehēdemus. Tenuia ac cādidiſsima linteorū frusta eo lacte imbuta, in umbra siccabimus, & in his postea quātum lac a natiuo colore discessit, speculabimur. At uerò uirosū ne sit, aut aliās fœtidū: ex olfactu cognoscemus, sicut sal sedinē, amaritudinē, acorem, insipiditatem, gustu dignoscimus: tenuitatē uerò ac crassitiem, lubricitatē item ac lentorē ex ungue probabimus: si enim gutta eius ungui instillata non decurret, nec uelut mel aut gluten adharebit, lac bonum esse iudicamus. Aliqui pilo probitatē lactis experiūtur, nā si pilus lacte madens suspēdatur, & lac delabitur, aut uni parti guttula adhæret, lac reprobandū est. Si uerò totum pilum circumſideret, optimū esse conſitentur. Alij lac per coagulū concretū digitis exprimunt: deinde seri ac casei mensuras expendunt. Postquā igitur cuiusq; lactis uitium cognouerimus, recta uictus ratione id corrigemus, purgationesq; prorsus recusabimus, præsertim si nutrices semper eo uitio laborare nouerimus, quādiu lactauerint. Priuatim itaq; eas quæ falso humore abundant, balneis & uini diluti portione curamus. Deinde copiam lactis uino mulso, & aceto mulso reuocamus, & in cibo exhibemus lac ex alijs animalibus probatissimū, quod forma & similitudine humani lactis speciē refert. Est autē omnino rectæ diætæ eò amplius innitēdum, quod scimus hoc uitium solo alimēto bono non difficulter curari posse. Neq; negligenda est hæc curandi ratio. Sæpe enim infantes eiusmodi lacte corrupti, ad ultimam perniciem deueniunt. Ad panos & scabiem mammarum, myrrham cum oleo sampſuchino tritam, uelut maximū remedium illinito. Ad coërcendas autem uirginum ac reliquarum mammas, æruginem ferri cum oleo omphacino aut uino subactam adhibeto, aut cicutæ semen cum folijs tritum illinito.

*Ad mammas inflāmatas, Philumeni. Cap. xxxvii.*  
Sesamum tritū butyro ammixto moderate tepesactū, quotidie bis imposito. At si inflammatio perseuera

uerit, medullæ panis aqua madefactæ ac tritæ partes ii. perdicij herbæ seorsim tusæ partem i. cerati liquidi partem unā & dimidiā simul subigito, & bis in die adhibeto. Idem etiam post eruptionē abſcessus usq; ad perfectā sanitatē conuenit. Vtere etiam hoc, uelut probatissimū. Foliorum hyoscyami recentū, ceræ, colophoniæ, adipis porcini recentis, olei, æquales portiones, liquabilia liquefacito, & folijs tritis ammisceto. Pharmacum Iuniadæ, ad omnes inflāmationes, præsertim mammarum. Olei antiqui lib. iiii. ceræ quadrantē, colophoniæ, adipis suilli, singulorū sesquilibrā, spumæ argenti lib. i. pollinis tritici, seminis lini, cerussæ, singulorū sex uncem, thuris sesquiunciā. Aliud eiisdē. Spumæ argēti, cerussæ, singulorū sex uncem, adipis gallinacei libr. i. pollinis ordeacei sesquiunciam, succi seminis lini dextantem, olei communis trientē. Spumam argenti, cerussam, & thus cum modico succo terito, deinde cū residuo succo pollinem ordeaceum subigito, & ita per duas aut tres horas finito, postea omnia ammisceto, & cerato excipito. Aliud, ad inflamationes plurimū prurientes, ac rubicundas. Cerussæ, spumæ argenti, mellis, butyri, ceræ, adipis gallinacei, singulorū sex uncem, thuris sextantem, rosacei unc. i. Spumam argēti & cerussam cum rosaceo coquito, & reliquo liquefacta adijcito, & unitis mel addito, & ab igne amotis thus ammisceto, ac utitor. Aliud ad inflamationes, quo utor. Tenerorum solani foliorum quantum satis esse uidebitur coquito & terito, & mellis sex uncem ammisceto. Postea uerò emplastri parhygri, ceræ, singulorum sex uncem accipito, olei unc. i. omniaq; simul unita reliquis ammisceto, & loco prius eloto apponito. Hoc mammarum inflamationes per exudationes plurimas discutit. Vtere & medicamento ex seride ad sedis affectiones præparato, & alijs huiusmodi. Facit hoc & ad igneas māmārū inflamationes. Ceræ, colophoniæ, olei, sing. lib. i. foliorū papaueris cornuti quadrātē: liquata folijs tritis ammisceto. Tradunt & leporis coagulū cum aqua tritū ac illiū, omnibus tumoribus māmārū, & affectionibus ob lactis redūdantiā obortis, prodesse. Ad profundas mammarū duritias. Sphōdylī herbā, & asphodeli radices uino coctas imposito: aut terræ intestina cū malis cotoneis: aut cæcros fluuiales cum ouo adhibeto, hoc & lac extinguit.

*Ad induratas mammarum inflamationes, Philumeni,*

*Cap. xxxviii.*

Semen lini, aut fœnigræci, aceto mulso coctum imposito: aut sesamum illotum modicē tostum cum melle terito, & calidum apponito: aut sterus caninum album terebinthina exceptū adhibeto. Aliud optimum. Spumæ argenti lib. ii. strigmentorum balnei in quo uiri solum lauantur lib. iiii. colophoniæ, ceræ, singulorum bessem, squamæ æris sextantem & semunciam. Aquæ marinæ aut muriæ lib. i. squamam aqua marina sufficientibus diebus terito, & adiecta argēti spuma ac strigmentis, ad probam cōpagem coquito, deinde cerā & colophoniam liquefactas adijcito, & ablatum ab igne medicamentum frigefacito, manibus subigito, ac utitor, inter coquendū autē cū arūdinis radice uersato, donec nō amplius inquinet. Facit & ad collisa, fracta, ulcera antiqua, cōdylomata oleo dilutū & adhibitū. Vtere etiā emplastro dionysia,



nylia, superiori Sermone descripto, quod habet terebinthinā, mannam thuris, spumam nitri, oleum aniquum, cerā, singula ponderibus istis adscriptis. Nec minus conuenit piscatorium.

*De mammarum abscessu.*

Cap. xxxix.

Inflammatione & duritia perseverantibus, & ad abscessum progredientibus, spe discutiendi sublata, maturantibus auxiliabimur, nos tamen mammarum inflammationes iam in pus transmutatas, per dionysiam emplastrum supra relatū frequenter discussimus: locus enim humor ab ipso per occultos meatus transpirat, & durities evanescit. Probè facit & fuluum piscatoris, citra acetum paratū. Et nigrum Asclepiadæ. Quæ omnia si parum profecerint, chirurgia opus erit. Reliquæ igitur mammae partes tuto inciduntur, si putrida corpora reperiuntur, uerum locus circa papillam lunari sectione exactè incidendus est, ut per sectionem quidem abscessus profunditas denudetur, sed papilla conseruetur, in maribus quidē formæ gratia, in foeminis uerò præter formam, ut ne lactandi facultas intercipiatur. Peracta chirurgia linamenta sectioni indantur, & omni modo obseruetur, ne plaga linamentis nimium obturetur, huic enim sæpe fistula inducitur. Postea tertia die suppurationi studendum est, deinde his quæ repurgare possunt, postea resiccantibus ac glutinantibus. Bene autem facit ad hæc emplastrum fuluum piscatoris, citra acetum paratū. Et fuluum Galeni, ad maligna ulcera supra præscriptum. Est autem his spongia ex uino expressa superponenda. Prodest etiam nigrum è lolio præparatū. Euacuat enim & glutinat. Magistriani ad mammarum abscessus. Intestina terræ cum polenta terito, & imposito.

*De mammarum fistulis, Leonidæ.*

Cap. xl.

Aliquando rupto abscessu si mamma non fuerit rectè curata, fistula consequitur, & sanè fistulæ istic obortæ plerumque in carnem desinunt, rarissimè ad os, nisi diutius durauerint. Has itaque congruis primū medicamentis curare conabimur, quale est quod ex lolio præparatur. Sed & hoc emplastrum peculiariter prodest, quod & in mammarum abscessibus atque omni tuberculorum genere, pus per occultos meatus educit, & probè incidendos abscessus discuit, & foris impositū fistulas efficacissimè desiccant. papillā tamen semper ab eo medicamento adseruare oportet. Spumæ argenti, olei, sing. lib. i. aquæ sexuncæ, ammoniaci thymiamatis, pyrethri, singulorum sexuncem, resinæ pinus trientem, colophoniam unc. i. spumam argenti, oleum, & aquā simul ad prunas coquito, donec non amplius inquinent. Deinde ammoniacum cribratum inspergito, eoque soluto resinas adjicito, & ab lato ab igne pharmaco pyrethrum addito, subigito, ac emollito, & imposito, lana sicca superposita, ita ut papillam uelut diximus non contingat. At si perseverarit fistula, nucleo specilli attollatur ac incidatur, quatenus in profundum specillum fuerit progressum, & quicquid duri ac callosi inest amputetur. Et facta incisione emplastrum adhibeatur repurgans, deinde resiccans, & ad cicatricem perducens.

*De mammarum nomis.*

Cap. xli.

Nomæ mamarū per fusionibus ac cataplasmatibus curantur ad reliquas nomas descriptis. uerū ad muliebriū mamarū ac pudendorum nomas ac putredines, & alia huiusmodi facit hoc medicamentum. Rhois co-

riarū lib. i. pilularum cupressi recentium tantundē, gallæ omphacitidis sesquilibram, uini austeri libr. xx. Hæc solida per triduum macerato, deinde cum uino ad dimidias coquito, & cupressi ramo uersato. Postea ad horā quiescere sinito, ac deinde excolato, & rursus ad mellis cōpagē coquito. Atque ita paratū pharmacum in uase uitreo seruato. Vsu uerò expectante, si extersione opus fuerit, melli ammisceto, si uerò uim obducendi meatus augere uolueris, lac adjicito.

*De exedentibus mammarum ulceribus.*

Cap. xlii.

Phagedænicum & exedens ulcus à cancerato differt, id quod circumscissas partes non ita duras, neque uenas uaricosas habet, neque ita ad fundum perrepiat. Sed & omnis phagedæna medicamentis cedit. Maligna uerò & efferata ulcera medicamentis magis exacerbantur. Ad exedentia itaque ulcera compendiarium curam adhibere oportet, callosorum uidelicet labiorum excisionem, ita ut eadem labia ignitis cauteriis inurantur. Nam sic & sanguinis eruptionem coercimus, & tutiorem medicationem peragemus. Postea uerò medicamenta ad mammarum putrefactiones commoda adhibeantur, infra ad canculos descripta.

*De cancriis mammarum, Archigenis & Leonidæ.*

Cap. xliii.

Cancerati tumores circa mammas frequentissimè generantur, & mulieres magis quam uiros inuadunt, & ex illis eas quæ amplas ac carnosas mammas habent. Veteres autem ulcus canceratū, malignū ac ferum appellabant, & cancerati sanè appellatio à cancro animante transumpta est: sunt enim ea animalia aspera & dura, & si quid forcipibus suis ceperint, haud facile auelluntur. his itaque canceratus tumor similis est. Nam & prominet, & ad tactū reniditur, & difficulter tractabilis est. Malignum autem & ferū ulcus à feris ac malignis animalibus cognominatur. Est enim proteruum, & curatione efferatur, & manu tractatione exacerbatur. Duæ uerò sunt supremæ cancrorum differentiae. Quidam enim sine ulcere, quidam cum ulcere consistunt. Qui sine ulcere sunt, ab omnibus ferme ueteribus Oculti appellantur. Philoxenus tamē cancrum occultū priuatim nominauit, qui in utero ac intestinis esset. Cancro itaque non ulcerato in mamma existente, tumor apparet ingens, ad tactū renitens, inæqualis, instar feræ sæuus, penitissimè pertinaciter insertus, radices longè lateque extendens, & uenis circumscissus uelut illigatus, quas circum circa uaricosas habet, colore cinericius ad ruborem uergens, & aliquando subliuidus, & uidentibus quidem mollis apparet, tangentibus autem durissimus est, ut uisui hac parte non sit credendum: do lorem autem inducit pungentem late se extendentē, ut sæpe per cōsensum, glandularū malignas inflammationes sub alis excitet. Pertingunt etiam dolores usque ad clauiculā & scapulas. At uerò exulceratus cancer assiduè erodit, & ubi ad profundum perfodit, nec si sit potest, & saniem emittit omni ferarū ueneno deteriore, copia & odore abominabilem. Ad sunt & huic dolores pungentes. Arque hic præcipuè medicamentis ac manuum tractatione exacerbatur.

*Qui cācri curatu faciles, & qui difficiles.*

Cap. xliiii.

Cācros in pectore obortos oīno deploratos esse scito, quemad-



quemadmodum & eos qui in capite, collo, humeris, sub alis, & in inguinibus generantur: sunt enim & hi incurabiles. Nam præterquam quod perfectè tolli non possunt, sanguinis eruptionis timor incūbit, ne ex ea æger inter manus pereat. Eos uerò qui papillæ summam occupant, affectæ partis amputatione facili curaueris.

*Cancris chirurgiæ, Leonide. Cap. XLV.*

Ego quidem in cæcis in pectore obortis chirurgiæ uti soleo, quæ sic fit. Aegram supinam decumbere facio. Deinde supra cancrum partem mammæ sanam incido, & incisam cauterijs inuro, donec crusta inducta sanguinis eruptio sistatur. Mox iterum incido & profundum mammæ dissecō, ac rursus partes incisas uro, sæpeq; idem repetō, & secans, & sistendi sanguinis gratia inurens. Ita enim sanguinis eruptionis periculum euitatur: post amputationem uerò integrè peractam, rursus partes omnes ad resiccationē usq; inuro: et primæ quidē inustiones sistendi sanguinis gratia fiunt. Postremæ uerò ad omnes morbi reliquias abolendas. Sæpe uerò etiam citra inustionem opus perfecit, ubi induratus tumor cancri generationem minas in mamma fuit: tunc enim affectioni amputatio usq; ad sanam partem sufficit, quum nullum hic periculum eruptionis sanguinis imminet.

*Cancris curatio post amputationem, & inustionem. Cap. XLVI.*

Post amputationem si inustio facta non est, linamenta ulceri indemus, deinde suppurationi studebimus, & deinceps ad reliquā curationē resiccatoriam progrediemur. Si uerò post chirurgiam locos inusserimus, aliquādo solo cataplasmate ex plantagine, aut polygono, aut sesamo trito utimur. Aliquādo etiā panis medullam alicui ex prædictis ammiscemus, & supra cataplasma lintheum aqua madefactum adhibemus. Citra dolorē uerò crustas aufert lac melli ammixtū ac illitū. Coniendæ autē sunt ægrotae in domo calida, omnis enim frigiditas ipsis infesta est, præcipuè quo tempore ulcera repurgantur: tunc enim maxime conuulsionis periculū imminet. Secunda uerò aut tertia die ex oluto medicamēto, tepida aqua locū perfundimus, & lenticulā coctā cum modico melle imponimus: mellis enim uim exacerbandi formidamus, deinde folijs uitæ aut lactucæ foris impositis, deligamentū adhibemus. Neque ab horū usu discedimus, donec crustæ exciderint, postea linamēta indimus, atq; in his tum acria, tum pingua medicamēta uitamus. Vtraque enim malum renouant. Quapropter soleo muliebri aut asinino lacti rosaceū ammiscere, & ex eo madefacta linamenta indere, & pro linamenti conseruatione lintheum lene ac simplex eodem lacte imbutum forinsecus obligare. Nam plurimum lintheorum onus graue est in hac affectione. Et suppurationis quidem tempore rosarum amplius sit: dum uerò repurgamus, lac excellere debet. Quod si resurget, melilotum cum rosaceo & aqua aut lacte muliebri cataplasmati exterius adhibēdo ammiscetur. Cerata enim & nimis elaborata cataplasmata, huiusmodi affectionibus sunt aduersa. At si arido aliquo opus fuerit, spodium pompholygis probè lotum ac siccātū, aut cadmiā ter uisam & rosaceo extinctā, & postea probè lotam ac resiccātam inspergito. Toto uerò curationis tempore à uino & cibis ægrè concoctilibus, & frigida potu abstinendum est. At

dū ulcus ad cicatricem ducitur, diligēter studebimus ut totius corporis firmus reddatur habitus, & ut bono succo impleatur, id quod bonis alimentis, exercitijs, gestationibus, ac reliquis eiusmodi corpus resistentibus, facere oportet.

*Cancrorum curatio citra chirurgiam. Cap. XLVII.*  
Primū, uelut sæpe diximus, ante cuiusque maligni ulceris curationē, totū corpus curare oportet, deinde localia auxilia adhibere. Alius itaq; cōuenientibus alimētis, & aloē uel picra ex aloē præparato pharmaco soluatur, & quæ uenenis resistūt assiduè exhibeantur, uelut est theriaca, mithridaticum antidotum, & quod ex sanguinibus constat. Ex simplicioribus autem anseris aut anatis recens iugulatae sanguis calidus in potu datur. Aut trifolij bitumen olentis cochleare I. aut II. cum aquæ cyathis III. aut seminis rutæ unc. I. aut pulegij ueteris drachmam I. cum maluæ decocto. Prodest etiam cancrorum fluuiatilium decoctum cum lacte asinino per dies quinque exhibitum, ita ut per totidem dies etiam ipsi cancri comedantur: talis enim periodus septeno circūitu peracta, mammarum cancris placidissimos efficit, ut deinceps per simplicium epithematū usum pristina sanitas restituatur.

*Canceratorum tumorum non ulceratorum curatio. Cap. XLVIII.*

Tumoribus canceratis non ulceratis panem cum modico symphyto imposito, exigua quantitate, ut ne grauet. In exacerbationibus autē rosas, melilotum, semen papaueris, omnia cum passo paululū trita coquito, & cū uitellis ouorum subacta imposito: aut althææ folia cocta per se, uel panis ammixta imposito. Est & hoc in exacerbationibus efficax, plantaginis, capitū papaueris unā cū seminibus, psyllij, æquales portiones accipito, & reliqua quidē terito ac cribrato. Psyllium uerò passo cretico maceratum, cum palmulis pinguibus subactum, aridis ammisceto, & parum adipis anserini adijcito. Hoc medicamentū se curē adhibetur calefactum. Si uerò frigidum potius malum postulauerit, omnia prædicta palmularum carne & modico pane madefacto excipito, ac frigida imposito. Prodest & Trionis semen cum œsypo & aqua mulsā calidum impositum. Fraxini item arboris folia mollia, aqua cocta, & trita, per se calida imposita, malignorum ulcerū dolores mitigant, & assiduus ipsorū usus mirificè ipsa discutiet. Ego uerò eorūdem foliorū decocto huiusmodi locos fouere soleo. Arbor ipsa sterilis est, & ad materiā idonea. Postea uerò cataplasma ex plantagine rursus imponatur. Item Icesij emplastrum, aut nigrū panacæa inscriptum, ad contactū mollissimum, aut aliud quoddam huiusmodi adhibeatur, nisi obstiterit ulcus.

*Cancris ulceratis curatio. Cap. XLIX.*

Ulceratis cancris lenissima epithemata imponantur, quorum uelut fundamētum, inquit Archigenes, hoc est: Spumæ argenti, adipis porcini recentis, ceræ albæ, sing. lib. I. olei boni unc. XVI. uitellos ouorum assatorum XII. Spumam argenti cum pauca terito, deinde olei parum affundito, & uitellos ammisceto. Adipem uerò exemptis in mortario terito, & cum cera liquefacto ac excolato. Et his frigefactis residuum olei paulatim affundito, & omnia simul in mortario probè subigito, postremumq; reliqua trita ammisceto. Hoc medicamentum usus tempore rosaceo dissoluit,



dissoluto, & molli lana excepto, pro linamento uti-  
tor. Et si dolor aberit ab ulcere, etiā iridis, myrrhæ,  
aristolochiæ, singul. drach. III. adjcito. Idem etiam  
non ulceratis cancris adhibitum utile comperies.

Aliud, ulceratis cancris blandè hoc medetur, &  
non ulceratos egregiè mitigat. Cera tyrrhenicæ, te-  
rebinthinæ, adipis taurini, medullæ cerui, aut uituli  
recentis, olei cicini & rosacei recentis, adipis anserini  
recentis, mellis optimi, thuris, diphrygis, singulo-  
rum partem unam, œsypi triplum. Sine thure tamè  
micius est, & ulceribus commodius. Verum cū thu-  
re magis discutit ac maturat, & non ulceratis magis  
commodat. Et si absque thure præparabis, diphry-  
ges cum uino teres. Si cum thure, utrunque diphry-  
ges uidelicet ac thus aridum, liquatis reliquis ad-  
jicies, & deinde addito melle securè adhibebis.

Aliud Theodori ad maligna. Spodij cyprij loti &  
resiccati, plumbi usti & loti, succi rosarum, singulo-  
rum drachmas quatuor, præpara & utere cum rosa-  
teo. Hoc quidè magis mitigatorium est. At si uerò  
multa & depascens putrefactio fuerit, ultra quàm  
credas efficax est hoc ad totum malum extirpandū.  
Rhois coriarij sextarios duodecim, pilularum cu-  
pressi libram unam, gallarum omphacitidum, cas-  
siæ, singulorum sexuncem. Omnia simul contusa in  
uini Adriani, id est, adstringentis, odorati & antiqui  
sextarijs uiginti, per triduū macerato, & deinde ad  
tertias coquito, ac cupressi spathula uersato. Postea-  
que omnibus probè expressis ac relectis, succū rur-  
sus ad mellis compagem coquito, ac uitreo uase ser-  
uato. Hoc medicamento ad nomas sincero utendum  
est, modico uino aliquādo addito, si crassius uisum  
fuerit: uerum si affectio in muliebri pudendo fuerit,  
exactè diluendum est. Sed & asinino aut muliebri la-  
cte dilutum, mitigatorium est, & reliquas item no-  
mas citra inflammationem curat. Aures diu puru-  
lentas, gingiuasq; madore flaccidas resiccat. Ulcera  
curatu difficilia, & ægrè cicatricem admittentia sa-  
nat, si moderatè adhibeatur, ac pro ratione diluatur:  
quomodo enim ipsi mitia restiterint, cui fera & agre-  
stia cedunt. Cæterum hoc animaduersione dignum  
est, ut ne ulcera ad cicatricem perducatur, priusquàm  
omnis duritia fuerit resoluta, modo linamētis matu-  
rātibus, modò splenij adhibitis, quāle est Icesij me-  
linum, aut Serapionis, aut panacæa. Ego uerò decli-  
nationis tempore sæpe usus sum theriaca, lacte & ro-  
saceo diluta, & in molli lana ulcere indita. Eandem  
etiam ex passo bibendam præbeo. Ad huiusmodi  
enim affectiōes efficacissima est, sicut quoq; reliqua  
antidota ad reptilium ictus, & uenenosas potiones  
parata, his itaq; cōfidenter utere, ac irrisores contem-  
ne, qui mali naturam minimè intelligunt.

De mammis induratis, Leonidæ.

Cap. I.

In alijs equidem corporis partibus prius ostendimus,  
induratum tumorem sine dolore esse. At in mam-  
mis non ex affectionis natura, sed detractæ papillæ  
grauitate dolorem inducit. Si itaque tota mamma  
indurata fuerit, atque ita scirrhi tumor induratus  
thoraci annexus, ut citra periculum à sanis partibus  
amputari non possit, chirurgiam nequaquam atten-  
tabimus. Si uerò summittas mammæ solum indura-  
ta fuerit, aut ultra dimidium affectio non occupauit,  
summitas amputanda est citra inuisionē: neque enim  
in scirrhi tumore indurato, uelut in cancro, sangui-

nis eruptionem uereri oportet. Post amputationem  
uerò linamenta indemus, & reliquam ulcerum cura-  
tionem adhibebimus.

De mensuris suppressis, Rufi & Aspasie. Cap. LI.

Mulieres aliquas menstrua purgatione omnino care-  
re, uel naturale est, uel præter naturam. Naturale est,  
si mulier nulla inde molestia uel totius corporis, uel  
uteri afficitur. Proinde quantum ad ætatem attinet,  
infra decimum quartum annum, aut ultra quinquæ-  
gesimum purgationes mensuræ non fiunt. Sed &  
steriles, & prægnantes, cantrices item ac saltatrices  
naturaliter non purgantur. Quicquid enim in eis su-  
perfluum est, nimia exercitiū uehementia consumit.  
Et in summa: Mulieres calidioris tēperaturæ, & for-  
tibus exercitijs utentes, & agrestes, parum purgan-  
tur. Quādo igitur mulier plus iusto calida fuerit, si-  
ue ob naturalem temperaturam, siue ob exercitiōrū  
excessum, mensuris purgationibus carebit. Ex mul-  
to enim calore corpora sicca euadunt, & calida tem-  
peratura cibos optimè cōcoquens, nihil superflui in  
toto corpore relinquit. Est autem talis mulier omni-  
no uirililis, coloris fusci, corporis probè compacti,  
neruis robustis, uenosa, lumbos & nates ampliores  
habens, pectore ac humeris latioribus, mammis soli-  
dis, uocē graui, fortior item ac hirsutior. Talis enim  
aut omnino non, aut modicè purgatur. Aliquando  
uerò etiā menses uel ob nimiam pinguedinem, uel  
ob gracilitatē suppressi solent. Pingues enim magis  
exangues reliquis sunt, minimasq; uenulas habent,  
& sanguis qui in ipsis est paucissimus, ferè in pin-  
guedinē transit. Atque huius rei ex eo indicium est,  
quòd tales minimè omnium concipiunt. Et si ali-  
quando conceperint, foetus graciles ac ualdè imbecil-  
les pariūt. Quomodo ergo purgabuntur, quæ neque  
sanguinem, neque uenas amplas habent? At uerò  
graciliores ob diuturnam aliquam egritudinem at-  
tenuatæ, nihil penitus superflui sanguinis habēt. Si-  
stunt præterea menses eis quibus sanguis crassus aut  
uiscosus est, & quibus ad alios locos defertur, uelut  
per nares aut sedē. Quin & ex thorace sanguinē reie-  
ctantibus, & quibus ex uenæ sectione multus san-  
guis euacuatus est, menses supprimuntur. Sed & re-  
liqua excretionum genera sæpe faciunt ut menses  
intercipiantur. Velut est multus sudor, assiduū uomi-  
tus, alui profluvia, saniei copia alicubi prodiens, pu-  
stularum omne genus per cutem erumpens. Sistunt  
item menses morbi acuti ac magni, & alimenta uel  
infra uel supra modum ingesta: modicum enim ali-  
mentum statim transpirat: multum uerò meatus ob-  
turat, & excretionem intercipit. Ad hos itaq; sco-  
pos etiam curandi ratio digerēda est. Quæ enim ob  
plenitudinem non purgantur, uenæ sectione curan-  
tur. Cibi porrò crassi ac pituitosi purgationibus  
aduersantur. uerum acres sanguinem fluidum effi-  
ciunt. Quapropter uina crassa & noua, aquas frigi-  
das & crudas, labores nimios, ocium item sublestū  
uitare oportet. Atq; hæc uictus ratio ad totum cor-  
pus pertinet. Quantum uerò ad ipsum uterum, con-  
clusiones, ceruicis eiusdem distorcionēs, durities, in-  
flammationes, macles, resolutiones, perfrigeratio-  
nes, distentiones, atq; aliæ huiusmodi affectiones cō-  
siderandæ sunt. Et insuper attendendum, an aliquid  
uteri os obturans, sanguinis exitum impediat. Cal-  
lositates enim istic exortæ, aut carnis excrescentiæ,  
aut pin-



aut pinguedinis copia, sæpe purgationē prohibent. Aliquibus etiā statim à principio pellicula quædam circa collum aut osculū uteri adnascitur, quemadmodū his accidit, quæ imperforatæ appellantur. Et tales curari non possunt, nisi pellicula illa locum obturans perforetur, aut refecetur. Aliquibus etiā ulcerū cicatrices, oscula uasorū in utero excecant, quæ penitus incurabiles sunt. Quibusdam post abortum uteri os exulceratur, ac deinceps ad cicatricē perducitur, atq; sic obturatio superuenit, quæ tum alias uulvæ transpirationes impedit, tum sanguinis excretionem prohibet. Quin & curæ assiduæ, & immodicus timor, ac moror ingens, menses supprimunt.

*Mulieribus quæ nō purgantur accidentia. Cap. LII.*

Mulieribus quæ non purgantur cōsuetō more, sanguinis refectionis ac syderationis periculū imminet. Nam suppressis mensibus molesta accidentia consequuntur. Totius corporis grauitas, nausæ, fastidia, horridi quidā discursus uelut in his quæ cōceperunt. Non tamen ita sicut his quæ conceperunt uteri osculum clauditur: illis enim occlusio adest cum quadam duritia. Dolores insuper circa lumbos, fœmora, collum, sinciput, & oculorum radices adsunt. Febres itē assiduè cōcomitantur, & urinæ nigræ sunt cum rubicundo quodā seroso ac sanioso humore. Difficultatē itē ac stillicidium urinæ patiuntur. Et quædam in melancholicum atræ bilis morbum, aut insaniam delabuntur. Cutis superficiem dolent, & inflammationes ac ignes sacros diuersimodè sustinent.

*Curatio earum quæ ob nimiam caliditatem non purgantur. Cap. LIII.*

Præstaret equidem ad integram sanitatis conseruationē, uictus rationē prescribere, à qua mulieris corpus ita resicaretur, ut menstrua purgatione non haberet opus. Verum hoc conceptioni penitus aduersaretur. Non enim condipiunt quæ non purgantur. Proinde cōceptus gratia, & eò quod omnes ferè mulieres temerè uictitant, purgationes sunt necessariae. Et propterea curationē conscribere cōuenit, per quam menses suppressi euocantur. calidiores itaq; mulieres & quæ plurimum exercētur, quàm maximè humectare oportet, aquarū dulciū balneis, uberiore humidioreq; cibo ac potu, quales sunt pisanæ ac alicę forbitiones, & quæ ex lacte præparantur. Et ex oleribus lactuca, cucurbita, & eiusmodi. E' carnibus agni, hœdi, ac porcelli recentes, cicures præsertim & fœmel-læ. E' piscibus qui teneras carnes habent. Ex auibus teneriores. Ex fructibus ficus recentes, uuæ maturæ, pepones, cucumeres. E' potibus uinum tenue, albū, dilutum, non uetus.

*Frigidæ temperaturæ dinotio ac curatio. Cap. LIIII.*

Frigidioris temperaturæ fœminas, tum ex his quæ dicta sunt cognoscemus, tum quod somnolentiores & ad motum pigriores sunt, & coloris albi siue plumbei, uenis subnigricantibus, urina aquosa, pituitam etiā assiduè exscreant, & aliquando pituitosos humores euomunt. Harum itaq; curationem oppositā esse oportet ei, quam ad calidiores retulimus. Plurimos enim labores imperabimus, & edulia calidiora exhibebimus. Vinum item suluum, odoratum, uetus, ac minime dulce. Confert etiā uinū aqua marina dilutum. Medicamenta uerò eligenda sunt, quæ calore suo sanguinē dissoluunt. Velut est thymi, pulegij,

calaminthes, dictamni, abrotoni, iridis, radicū asphodeli, corticum radicis mori, mercurialis, casia, carpesij, floris iunci odorati, spicæ nardi ac celticæ, acori, mei, phu, sabinae, asari, ac similium decoctum. Hæc enim singula in uino albo ueteri coquuntur, & uinū ipsum merum excolatū calidum à balneo ieiunis bibendum datur. Atq; ita menses ciuntur his quæ frigidam temperaturam habent. Probe facit & succus cyrenaicus erui quantitate potus. Aut opopanax unc. i. Aut sagapeni tantundem. Aut myrrha magnitudine fabæ. Aut castorij drac. i. Aut nigella pota, & subtilita. Idem possunt etiā seminum nobis familiarium decocta, uelut cumini, fœniculi, petroselini, laueris, dauci, ammi, cicerum. Est & hoc efficacissimū atq; acerrimum. Pulegij, artemisiae, rutæ, saluiae, anethi, singulorum manipulum unum, piperis grana uiginti, aquæ sextarios duos, piper contusum & herbis ammixtū per noctem aqua maceratur. Mane uerò ad dimidias coquitur, & ad excolatū mellis quantū satis est adijcitur, indeq; cyathi duo ieiunæ exhibentur. Ipsa uerò sensim inambulare iubeatur, & lectica gestetur. Tempora autem ad talia medicamenta accipienda commoda sunt: alterum appropinquante iam purgationis tempore: alterum ut post unctionem fomentaq; ac balneum statim bibat, ita ut in calidum adhuc & solutum corpus illabens medicamentū, uires suas efficacius declaret. At uerò si quis omnia auxilia in hunc usum commoda recensere uelit, ei multo ocio opus fuerit. Sufficere tamē possunt relata. Si uerò nullum ex his menses euocauerit, alius modus potentior exquiratur. Ego etenim cum hæc medicamenta frustra adhibuissem, mulierem solutiuum pharmacum bibere iussi, atq; ea accepto euphorbio cum petroselino, per aluum purgata, & deinde menstruum excretio successit. Quod si redundans humor atræ bilis magis fuerit, epithymi drachm. v. exhibeto, cum aceti mulsi diluti hemina, pauco sale adiecto. Fecit enim sanguiniseducta, pars subtilior deinceps facilius sequetur. Pleriq; etiā uomitus profuit. Vomant autem accepto prius thymi aut origani, aut hyssopi decocto. Deinde post uomitum cetaurij aut absinthij cremorē potant. Quin & pessis subditis uteris iritatus est, ut per uictū quidē, sanguis calidus ac tenuis reddatur: per pessos uerò, excretio prouocetur. Fortiores tamen euitabimus, quales sunt qui ex elaterio, cātharidibus, cyclamino, felle bubulo, & ueratro fiunt. Periculū enim est, ne ex eiusmodi medicamentorum uehementia, inflammationes, ulcera, ac febres exoriantur.

*Pessimenses educentes. Cap. LV.*

Mitiora proinde in pessis adhibere oportet, uelut est ruta, baccæ lauri, artemisia, conyza tenuia folia habens, pulegium, mercurialis. Hæc singula cum oleo irino subdantur. Quod si ualidioribus opus erit, myrrhæ drachmam unā, aluminis scissilis drachmas duas, cum uino terito, & rosaceo ammixto subdito. Aut terebinthinam cum myrrha, melle, & croco efformato. Hoc autem ualidius est, pelecini semen cum myrrha & melle. Aut bdellium, uel galbanum, uel styrax, cum absinthio & lupinorum decocto. Aut caricæ pingues granulis exemptis, cum thure & nitro, singulis fabæ magnitudine subdito.

Vterus item calido quodā oleo siue ungento perfundatur, uelut est susinum, cyprinum, irinum, sam-

T psuchinum,

*Purgat*



psuchinum, laurinum, amaracinum, narcissinum. Assi-  
dui etiam suffitus per styracem, galbanum, ac thus  
fiant. Probe facit etiam lapis gagates. Suffumigiū  
probatissimū. Radicis aristolochiae, radicis aspho-  
deli, resinae siccae, sandarachae, atractylidis agrestis,  
stercoris uulturis, bdellij, sabinae, cardamomi, arte-  
misiae, singulorum drach. unam, osium piscium sal-  
sorum minutissime tritorum drachmas tres, nigellae,  
styracis, singulorum drachmas quatuor, pastillos  
cum aqua formato, & usus tempore super bubulo  
stercore, bis in die, mane ac uesperis suffito. Praecipue  
uerò odoratis fomentis uterum fouebimus, amara-  
co uidelicet, serpillio, pulegio, calamintha, cypero, iri-  
de, chamaemelo, costo, aniso, ac similibus in aqua co-  
ctis. Sit autem fomenti usus talis. Olla operculo per-  
forato operiatur, arundōque foramini inseratur, &  
undique oblinatur. Et mulier sedēs excepta intra pu-  
dendum arundine forum admittat. Alius uerò fo-  
menti modus est, ut mulier in aliquo ex relatis deco-  
cto usque ad umbilicum insideat, & deinde calida  
aqua dulci abluatur, & postea pessos praedictos sub-  
dat. Pessus optimus menses educens. Carpobal-  
sami, caryophyllorum, olei amaracini aut fusini, sin-  
gulorū drachmas octo, passiarum uuarum pinguiū  
exemptis uinaceis libram unam, carnes palmularū  
duodecim, salis communis drachmas sedecim, mel-  
lis cochlearia tria, efforma ac utere post balneum,  
aut fomentū. Cataplasmata insuper adhibebimus  
ex cruda ordeacea farina, artemisia, amaraco, iride,  
aut alio quodam ex relatis ammixto. Liquor autē  
cataplasmati ammiscendus sit, uinum odoratū, mel,  
amaracinum, irinum, anethinum oleū. Postea la-  
nam quoque oleo aliquo ex praedictis imbutam su-  
perponemus. Bonum est etiam bdellium cum styra-  
ce ac thure tritum, cum uino & unguento quodam  
relato, imo uentri ac lumbis illinere. Epithema ad  
sanguinem menstruum euocandum. Elaterij, myr-  
rhae, galbani, farinae ordeaceae, singulorum drach-  
quatuor, foliorum rutae recetium drach. ii. fellis tau-  
rini quantum satis est. Reliquis omnibus minutissi-  
me tritis & unitis sel ammisceto, & lūbis ac imo uē-  
tri imponito. Ducit hoc menses, & sedis haemorrhoi-  
das prouocat. Vtere etiā alijs epithematis Sermo-  
ne tertio conscriptis. Philosophi ad menses educen-  
dos. Cancrum fluuiatilem in uinum coniectū suffo-  
cato. Deinde uinum id meracum, calefacito, ac totū  
bibendum dato, & ubi satis sanguinis purgatum ui-  
debitur, cancerum suffocatum comedendum dato.  
Glans subdititia menses educens, facit ad uteri stran-  
gulatus diuturnos. Fellis taurini, succi absinthij, &  
comae eiusdem, radicis struthij, myrrhæ, singulorū  
drachmas quatuor, castorij, opobalsami, singulorū  
drachmam unam, succi cyclamini drachmas decem.  
Omnia artemisiae succo excipito, & glandes paruas  
subdititias formato, probe facit & fex uini antiqui  
apij succo excepta ac subdita. Aut lilij radix tosta  
subdita. Aut nigella, aut sesamum, aut rutae semen &  
foenum graecum butyro ac melle exceptū ac subdi-  
tum. Pessus eadem die plerūque sanguinem ducēs.  
Folia artemisiae & nitrum pari portione oleo iri-  
no aut rosaceo excipito, & post balneum subdito.

*Curatio earum quae praepinguedine non concipiunt.* Cap. LVI.

Pinguiores mulieres uictu attenuante curabimus. Di-

ctum est autem in secundo ac quarto sermone de his  
alimentorum facultatibus, & quomodo macies sit  
reparanda. Non tamen interim fomenta & potiones  
praetermittantur. Si enim materia infra declinabit,  
haud ægre euacuabitur, & corpus gracilius redde-  
tur. & quanquā purgatio per inferiorem aluum nō  
sit ualde tuta, ut quæ corpus tabefaciat, mulieri tamē  
ita habenti hæc quoque adhibenda est. Sæpe enim sola  
purgantis medicamentū potio ad menses educendos suf-  
ficat. Ex purgatorijs itaque acerrima & pinguius  
maxime idonea sunt, granum cnidium, scammonia,  
& cortex radicis tithymalli myrsiniae. Singulis au-  
tem petroselinum, aut daucum, aut apium, aut ani-  
sum, iucunditatis gratia, & ad sanguinē attenuandū,  
ammiscere oportet. Pessos quoque ualidiores his ad-  
hibebimus, uelut pulpā colocynthidis, nigellā, myr-  
rhā, simul cū uino dulci trita ac subdita. Aut nitrum  
cū cyclamino, felle bubulo, ac melle. Aut caricarū  
carnes cū nitro, melle, & ruta. Fomenta itē ac epithe-  
mata ad frigidiores temperaturas relata huc transfe-  
rantur.

*Curatio earum quae ob plenitudinem non purgantur.* Cap. LVII.

Quæ propter plenitudinem non purgantur, congruo  
menstruorū tempore magis grauātur, dolores circa  
lumbos ac imum uentrē percipiūt, flatuque replētur,  
ad quē distēriones ac horrores totius corporis cōse-  
quuntur. Sed praecipue insigni uenarum tumore di-  
noscuntur. Atque hæc quidē copiosa sanguinis missio  
ne sanantur. Cubiti itaque ac tali uenas secare opor-  
tet. Deinde euacuato sanguine cetera facere supra re-  
lata, potiones uidelicet ac fomenta adhibere. Post-  
quā autem menses fluere incœperint, mulieri quies  
imperanda est, & in lecto eadem detinenda. Ac pri-  
ma die a balneis ac cibis abstinendum, proxima ue-  
rò pisanæ succus cum aceto præparatus in cibo ex-  
hibeatur. Deinde olera ad hunc usum idonea. Tertia  
autē die lauanda est, & cōsueti uictus ratio repetēda.

*Curatio earum quae ob maciem non purgantur.* Cap. LVIII.

Quaecunque ob maciem gracilitatemque non purgantur,  
siue id ex morbo, siue alia ratione contigerit, eas pri-  
mum reficere oportet, & corpori carnem congruo  
exercitio, moderatoque labore ac uberioribus exerci-  
tijs reparare. Vbi enim carnosae factae fuerint, maxi-  
ma spes est menses sponte erupturos esse. At si hoc nō  
contigerit, potionibus ac pelsis prouocentur.

*Curatio earum quae ob uitiatos humores non purgantur.* Cap. LIX.

Biliosos ac pituitosos humores, & quicumque alij san-  
guini ammixti mensium purgationem impediunt,  
totius habitus uitiatione cognoscemus, ac reliquis  
notis sæpe a nobis relatis, & aliquando ex his quæ  
circa uterum contingere solent. Pauci enim menses  
qui deferuntur, si biliosi fuerint, uuluum mordent ac  
rodunt, & coloris sunt abunde fului. Si uerò pituito-  
si, segnius prodeunt, crassi sunt, albi que ac subfrigidi,  
& stuporem inducunt. Quum igitur huiusmodi si-  
gna apparuerint, præstātissimum est totum corpus  
congruis medicamentis purgare. Deinde muliebres  
locos colluere ac fouere. Cibos autem dulces ac bo-  
ni succi exhibere, & in potu uinum mulsum dare.  
Exhibeatur etiam lacasinum cum melle. Et aqua  
in qua pulegium ebullit cum uino dulci propine-  
tur. Hæc



tur. Hæc & menses prouocat, & nullam superfluitatem in sanguine relinquit. Cibis insuper ac potibus semper aliquid odoratum ammisceatur. Ex oleribus Crethmum, gingidum, & daucum, singula ad flacciditatem cocta, & foeniculum eligemus. Neque interim pessum negligatur, qui quales esse debeant, partim relatum est, partim proxime dicitur. Si enim billosa ducere uoueris, elaterium cum carica pingui, aut cyclaminum cum uino subdes. Pituita uero subdita trahunt folia anemones, iris cum melle, lolacea farina lolio prius paululum tostato, cum modico pipere & melle, colocynthis cum carica. Aquositate autem euocat porrum cum melle. Post pessum uero mulier in aqua calida desideat, & ungento rosaceo aut cerato, aut adipe gallinaceo, uteri os inungat.

*Curatio earum quibus sanguis ad nares, uel sedem defertur.*

Cap. LX.

In his à quacunque parte fluxerit sanguis, reprimendus est, & ad uterum congruis auxiliis reuocandus, ne forte inde propulsus ad principalem ac nobilem aliquam partem uertatur. Itaque & sudoribus, & uomitu, & alijs excretionibus corpus euacuetur. Verum hoc sciendum est, non multum male affici eas quæ ob tales causas non purgantur; sicut neque quæ ob maciem, aut laborum excessum. Concipere tamen nequeunt, quum uteri purgationes defecerunt.

*Curatio earum quæ ob nimium oculum non purgantur.*

Cap. LXI.

Certum est eas quæ ob nimium oculum non purgantur, laboribus destinandas esse. Labores autem mulieribus congruentes deambulationes sunt, & gestationes aliquanto uehementiores. De cetero uero uelut frigidae ac pituitosæ curantur, & omnino contraria iuxta Hippocratem, datur his quæ sanguinis delationem impediunt. Et si ex aqua frigida cruda pota sit offensa, aliam optimam perquiremus, quam uino albo ac tenui permiscemus. Cibos item per frigidis calidos, per crassis attenuantes, per siccis humidos exhibebimus, & reliqua iuxta rationem.

*Curatio earum quæ ob aliquam uteri affectionem non purgantur.*

Cap. LXII.

Si corpus bene se habuerit, uictusque ratio purgationi congrua fuerit, & tamen mulier non purgatur, considerandum est an uterus aliqua affectione laboret. Id quod si fuerit, nullum medicamentum omnino adhibeatur, neque aliqua potio menses ducens detur, ut ne attracto ad uterum sanguine, dum loci laxari non possunt, dolores molesti uelut in partu ingruant. Primum itaque affectio curetur, quæ suppressorum mensium causa est. Deinde sanguis prouocetur. Quomodo uero uteri affectiones curandæ sint, postea ex ordine referemus.

*De mensium stillicidio.*

Cap. LXIII.

Mensium stillicidium uocatur, quum grauissimo dolore in rimas partes uexatæ sanguis stillatim prodit. Aliqui enim morbi uteri affectionibus uesicæ similes sunt. Nam & in illa aliquando urina supprimitur, aliquando stillatim prodit, & quandoque difficulter mingitur. Quinque uero sunt stillicidii causæ specie diuersæ: meaturum angustia diuersimode contingens, uirium debilitas, sanguinis multitudo, sanguis pituitosus, & sanguis seculentus. His singulis quoties impedimento fuerint, succurrendum est: ita ut multitudinem, euacuemus, crassitudinem attenuemus, uires firmemus, & meatus dilatemus. Angustiae tamen causam inquirere oportet, eamque auferre. Causis enim sublati libera purga-

tio consequitur. Quomodo uero singulis causis occurrendum sit, partim de mensibus suppressis diximus, partim deinceps referetur, ubi de uteri morbis agemus. Nunc autem explicare instituiamus, quomodo graues dolores lenire oportet. Exacerbatione itaque instante mulier in domicilio locetur, moderate tepido, non tamen obscuro. Et manuum ac pedum extremitates fasciis deligantur, neque ullus pessus irritatorius interim adhibeatur. Aquæ potus uideatur, & omnino ab acris potionibus ac cibis, præcipue flatuosis, abstinendum est. Imus autem uenter & femora uarijs calefactorijs foueantur, ita ut aliquando lana succida uino & rosaceo calido imbuta imponatur, aliquando uesica oleo calido semiplena adhibeatur, aliquando uasa uaporatoria lenticulata admoveantur. Quod si dolor

*vide infra*

perstiterit, & uires ferre poterint, cubiti uena secetur, & sanguis pro uirium ratione auferatur, & deinde rursus eadem fomenta repetantur. Et si neque sic successerit, cataplasma est semine lini, pane, & aqua mulsa paratum adhibebimus, cui aliquando terebinthinam liquatam ammiscebimus. Vtemur & infusionibus ex altheæ, seminis lini, foeni græci, anethi, rutæ, ac artemisiæ decoctis, & spongijs ex hisdem expressis pudendum fouebimus. Rutam item tritam ac melle exceptam & panno lineo indutam pubi ac pectini imponemus. Aliquando eodem cataplasmate etiam pudendum integemus. Prodest & per uteri fusorium instrumentum infra scriptum liquorem infundere. Rutam & foenum græcum in oleo coquito, & ad hoc ex colatum buryri, terebinthinæ, cæsypii, quantum ad cerati liquidioris formam satis est ammisceto. Idem etiam in sedem ad trium uel quatuor cyathorum mensuram injici potest. Aliud consimile infusum. Cæsypii drach. iiii. cerebella anserum duorum, adipis anserini, phasiani, gallinacei, singulorum unc. i. ceræ quadrantem. Misce ac utere uelut priore. Pessum præterea Libanus & enneapharmacus ac alijs consimiles subdantur, qui inferius ad uteri inflammationes & induratos tumores describentur. Adhibenda sunt & epithemata, primum tetrapharmacum, bromium, & quod ex succis constat. deinde polyarchium, & quod ex meliloto, & quod est seminibus paratur, prout usus postulauerit. Si uero adhuc malum non quieuerit, sed aut per certos circuitus, aut incerto ordine uexauerit, ad ualidiora pergendum est auxilia. Et cucurbitæ pectini ac inguinibus apponendæ. Primum quidem tres aut quatuor citra scarificationem. Deinde si affectio durauerit, etiam scarificabimus, & moderatam sanguinis quantitatem euacuabimus. Conferunt & hirudines post cucurbitas admoventur, nihil minus quam cucurbitæ attrahentes. Deinde epithemata ac dropaces adhibeantur, & cutim rubificata, & loci molliter assidue cum oleo ac sale confricetur. Exercitium præterea temperatum imperabimus, ac gestationem deambulationi præferemus. Postremum balnea naturalia adhibebimus, & marina aqua frigida iugiter abluemus.

*De nimia mensium purgatione.*

Cap. LXIII.

Nimia mensium purgationes mulieribus fiunt, aliquando sanguine copiosiore & per plures dies prodeunte, id quod rarius, & in uehementioribus moribus fieri solet. Aliquando post partum, plurimo sanguine sortum insequente. Sæpe uero post abortus contingunt, & repletum quandoque periculum inducunt. Primum itaque consideranda est erupentis sanguinis multitudo, & delationis modus. Amplioribus enim uasis ruptis aut apertis,

T 2

magna

*vide supra*



magna sanguinis copia cōfertim profluit, à minoribus uerò uice uersa. Ab erosione uerò paulatim & cū maximo dolore prodit. Sequitur autē ad redundantes sanguinis eruptiones decoloratio, ac coloris uitiatio, aliquādo cū febre, quādoq; citra febrē, appetitus p̄stratus, difficilis cōcoctio. Sæpe etiā pedū ac totius corporis tumores, & omnia quæ ad nimium hæmorrhoidū fluxū consequi diximus. Artus ergo & extremas partes primū cōstringere oportet, ab alis & inguinibus exordio factō, & poscā nō frigidā, sed tepidā propinare, & eadē posca locos perfundere, & multam lanā uino & oleo rosaceo, aut melino, aut myrteo imbutā imponere. Nā spongiæ ex posca expressę uterum ac uesicā perfrigerāt, & damnum amplius quā cōmoditatem afferunt. Imperādū est autem unius aut alterius diei ieiuniū. Quod si tolerare nequeāt, panis mīcras ē posca exhibebimus, aut alicā lorām, aut oryzam ex posca, aut ouum sorbile molle frigefactū. Dabimus item in potū balaustrum ex posca, aut hypocysthidis aut acaciæ succum. Aut lyciū, aut terrā samiam stellam appellatā, aut uuæ acerbæ succum siccū. Prodest & sesamum posca macerare, atq; ita molle factū edendum præbere. Potest idē etiā cōteri, ac in potu dari. Exhibebimus & rhei pontici decoctū, aut idem tritum porioni inspergemus. Aut loti ramenta, & eorundem decoctū. Aut corallorum drach. ii. Aut pæoniæ grana rubra xii. At uerò spongia noua liquida pice imbuta, & in olla exusta, cum aceto aut posca subdita, mirifice auxiliatur. Nā & his quę in uterū subijciuntur ac induntur, uti debemus. Noui inquit Galenus, per quatuor aliquādo dies sanguinem ab utero manasse, & ad nullū auxilium celsisse, & tandem à nobis plantaginis succo suppressum esse. Quātitas autē eius inijciendi, sit cynthii mensura. Hoc itaq; optimum est medicamentū ad sanguinis eruptionem ex erosione obortā, cui aliquando fortius aliquod ammiscere soleo, aliās aliud, pro affectionis respectu. Si igitur uas unde sanguis profluit, magnū & amplū fuerit, austeris medicamentis opus erit, balaustrum, acacia, hypocysthide, succo uuæ acerbæ, gallis, malicorio, & similibus. Si uerò paruum, id quod facile cognoscemus ex modico sanguine citra dolorem prodeunte, cōferent aloē, māna thuris, cortex pinus, terra lemnia sigillata, spinæ ægyptiæ fructus, crocus, lapis hæmatites, & reliqua huiusmodi cū succo plantaginis, aut uino nigro austero, aut senecionis succo subdita & iniecta. At si ab erosione sanguis profluxerit, plerūq; uelut diximus nō cōfertim, sed modicus at paulatim defertur. Et propterea Andronis, aut Pasionis, aut Polyidæ, aut Musæ pastillo, aut eo qui ex charta paratur, utēdū est. Omnes enim tales quum nomen sistant, erosionem curāt, ac sanguinis eruptionē reprimūt. Sunt autem quodā liquore ex relatis diluendi. Pessī uerò ad sanguinis ab utero eruptionē faciunt huiusmodi. Aluminis scissi, acacię, medullę gallarū, pollinis thuris, singulorū dra. i. Hęc plantaginis succo terūtur, & uitelli ouorū assatorum quatuor ipsis ammiscerur. Vfus autē tēpore pello lanæ excipiatur, qui rosaceo tinctus subditur. Sunt quę pessī omnes penitus usq; ad uteri os immittendi. Est autē pessus lana carpta ac tōuoluta ad digiti figurā, qua medicamēta excipiuntur. Alius. Medullæ gallarū, & thuris, pares portiones aqua subactas subdito. Aut ē polygono trito pes-

sum formato. Ipsas præterea in hoc decocto assidue insidere iubeto. Capimulorū iunci acui, foliorū myrti, rosarū, rhamni, uirgultorū rubi, æquales portiones in aqua coquito pro infessu. Alius Pessus. Cytinorum, foliorū cupressi, oleæ, rubi, singulorū æquas partes efformato. Forinsecus autē imposita profunt epithemata ac cataplasmata ex palmulis ac malis cotoneis, quæ adsumunt balaustrum, acaciā, hypocysthidem, alumen, & similia. Conferunt & emplastra glutinatoria, quale est fuluum Galeni, & Icesij, & quod ē salicibus paratur. Et Harmonia, & Pallas siue Athena inscriptum, si lumbis ac pectini imponantur. Tauri itē glutinū aceto maceratur donec dissoluatur, deinde ualido panniculo inductū lūbis agglutinatur, & efficaciter prodest. Sed & cucurbitæ leues ac magnæ ad mammas utilissime affiguntur.

De fluxu muliebri, Archigenis.

Cap. LXV.

Fluxus muliebris est uteri destillatio diuturna, à menstrui sanguinis eruptione differēs, eò quod in illa sincerus sanguis prodit. Hic uerò fluxus corruptus apparet, & aliquando ruber est, uelut sanguinis sanies; aliquando albus, uelut pūsanę succus, à pituitoso uidelicet sanguine. Interdū pallidus, ubi bilis amara redūdarit; interdum aquosus, à serosorū humorū superfluitate. Qui itaq; exquisitè colorē prę se fert aliquē, is redundantē humorē facile indicat. Si uerò obscurū colorē habet, causam eius perscrutabimur. Lintē eo inquinatū arefactū simplici aqua eluemus, & inde à maculę colore redundantis humoris notionē capiemus. Hic uerò fluxus plerūq; citra dolorē prodit. Aliquando tamē ulcere exulcerato etiā cū dolore promanāt. Si itaq; aliqua pars doluerit, & humor profluens planē cruentus fuerit, partis alicuius in utero ruptionē aut erosionē indicat, id quod maxime in collo uteri contingere solet, & potest hoc digiti immisione percipi. Inferre uerò solet hic fluxus debilitatē, coloris uitiationē, appetitus subuersionē, inenarrabilē tristitiā, pedum tumorē. Et in aliquibus perpetua destillatio perseverat. In aliquibus per interualla quēdā redit. Et ætate quidē uigētes, rubra ferē fluxio infestat. Declināte uerò ætate, alba. Et utraque sanē fluxio si suæ ætati acciderit, facile curatur; si alienę, difficulter. In oī uerò defluxu os aperitur ipsius uteri, & uelut relaxatur. Quibusdam etiā uterus ipse p̄cidit, ut usque ad muliebre pudēdū progrediat.

Curatio rubri uteri fluxus.

Cap. LXVI.

Mulierī rubro fluxu uexatæ primū sanguinē euacuabimus per uenę sectionem. Hęc enim nō solum materiā ad uterū confluentem diuertit, sed detentionem etiā ac cōstrictionem tutā efficit. Multa enim sequeretur incōmoda, si sanguinis uel cuiuscūq; defluxus lationem localibus auxilijs reprimeremus. Nam aliquæ inde in hydropēm, aliquæ in neruorū affectiones, aut oris uentris, aut capitis uexationes collapsæ sunt. Proinde si nihil obstitit, hoc est, si non ualde magna fuerint obstacula, sanguis mittatur, præsertim si ætas uenę sectionē nō prohibet, & sanē paulo antē dictum est, iuniores fere rubro fluxu uexari. Detractio uerò sanguinis uelut in his qui sanguinē reijciūt partiatur, ut paulatim reuulsio fiat. Et dilata uenę cūbiti sectione, à frōte, aut naribus, aut scapulis sanguinem auferemus. At uerò lumbis ac femoribus detrita ac mollia lintea imponantur, frigidis succis imbuta. Locetur autē mulier coxis accliuibus, cruraq;



racq̃ extendat ac inter se complicit ad uteri partes cōtrahendas. Quod si copiose sanguis feratur, coxæ, peten, & lumbi spōgīs posca madefactis integantur. Si uerò modice destillet, lana succida uino & rosaceo imbuta adhibeatur. Et extreme partes deligētur, atque hæc non solum in principio fiant, sed etiā post circuitus ante exacerbationem, & in ipsa exacerbatione. Vtatur ægra etiam infelsionibus, ex myrui, rubi, malicorij, & similium decoctis, in quibus sepe aceto affuso usque ad umbilicum immergatur. Adhibeat & infusiones adstringentes ac moderate frige facientes, uelut est plantaginis succus, polygoni, stratiotæ, malorum cotoneorū, ac mespilorum. Sed & sideritidis herbæ aut parthenij succus eximie cōfert.

Hæc autem singula cum rosaceo aut myrteo oleo infundantur. Vinum item dulce in mali punici cortice calfactum, utilissime tepidum infunditur. Efficacissime uerò fluxum compescit spōgiæ pice liquida imbutæ ac ustæ cinis subditus, itemque leporis piliusti. Solemus & lintheum alumine madefactum ac resiccātū similiter adhibere. Asininū autem lac, si eius copia fuerit, præsertim asinæ per pascua pratorū nutritæ, omnibus succis præstat, ubi fluxus cū dolore defertur. Confert & stercoris eiusdē asinæ succus, & alicæ aut prisanæ succus: & rosaceum uel per se, uel cū lacte infusum. Cæterū pessī ad rubrū fluxū nō faciunt, qui ad sanguinis eruptiones sunt relati: sunt autem in aliquo ex prædictis succis madefaciēdi. Facit & lycium, acacia, hypocysthidis succus, singula lacte bubulo aut sapa diluta. Aut galla cum thure & rosaceo. Aut spodiū pōpholygis cū rosis & passo. Aut oui testa usta cū myrto sicca & passo. Aut cinerē sarmentorū lintheolo illigatū, & aliquo prædicto succo tinctū subdito. Aut fenerionē herbā tritā subdito, & bibēdā dato. Galla itē usta, & modo uino, modo aceto extincta, ac in pessum efformata subijcitur. Ablatis autē his, pedes adstringentibus decoctis moderate frigidis aut tepidis abluantur. Et ex relatis succis aliquis utero infundatur. In debilioribus tamē ac delicatioribus foeminis miudora adhibebimus. Aliis quibus enim oculi uteri meatus à uehementioribus medicamentis adeo cōstringuntur, ut ulcus aut duricia oboriat, & concipiendi facultas tollatur. Ventrī quoq̃ ac lūbis refrigerātia ac adstringētia adhibeantur, uelut est portulaca, perdictū, solanum, hyoscyamus, per se & cū poscra acetoq̃ ac palmulis. Aut ordeacea farina cū palmulis, malis cotoneis, ac mespilis. Cerata itē ex iisdem præparata pectini ac lumbis imponantur. Cōferunt & cucurbitę dorso & sub alis affixæ. Et quęcūq̃ portiones sanguinē reiectantibus cōgruunt, his quoq̃ comodæ sunt. Velut est ex simplicibus rheon pōticū, terra samia stella siue aster appellata, terra lemnia sigillū uocata, cū plātaginis aut polygoni succo, & reliqua tum simplicia, tū cōposita, suo loco relata. Sic porrò & uniuersa uictus ratio ad strictoria, quæ aliquatenus crassefaciat, & potus aqua. Quod si uires collabatur, uinum crassius exhibeatur. At si fluxus multitudo reprimatur, paucus autē adhuc feratur, pro refrigerantibus ac adstringentibus, media inter hæc adhibeantur, ut ne fluxu repente suppresso, inflammatio aliqua oboriat. Utendum est & emplastris ad cruenta uulnera idoneis, uelut est quod è salice paratur, & quod Icessū appellatur, & alia huiusmodi.

## Albi fluxus curatio.

Cap. LXVII.

Si fluxus albus, aut serosus, ac saniosus, aut liuidus infestat, in principio quidem resistendum non est, ut aliena à corpore excernatur. Post principium uerò oleo susino totū corpus large illinatur. Gestationes autē & uocis exercitationes, frictiones item ac deambulationes, non in hac solum fluxus specie, sed etiam in alijs conueniunt. Ipsi uerò locis moderate adstringentia adhibeantur, quæ simul extergendi uires habent. Et sanies profluens assidue calida aqua eluatur, & lana detergeatur, ne ab humore transeunte ulcus excutetur. Rosaceum item aut myrteum, aut melinum oleum illinatur. Aqua etiam pura nihil adstringens habens ammixtum, in principio præsertim adhibeatur ob influētis humoris acrimoniā. Et ob eandem causam etiam alicæ ac oryzæ succus infundatur. Facit & foeni græci decoctum plurimo oleo susino ammixto. Susinū enim oleum tū huic, tum alijs succis utiliter ammiscetur. Atq̃ hi quidem succi efficaciores erunt, si quid acacię, aut hypocysthidis, aut de alio quopiam ad rubrum fluxum relato, fuerit ammixtum. Possumus etiā pro susino oleo lēscinum aut cœnanthinum adhibere. Stercus insuper caprinū cum myrrha, thure, & aloë, rosaceo & aceto addito cōmode subditur, ita ut his ablatis loci uino nigro austero abluantur. Vbi uerò quæ profluunt foetida sunt, post relatorum usum tetrapharmacū rosaceo dilutum adhibebimus, & per certa interualla uicissim tum prædicta auxilia, tum tetrapharmacū applicabimus. Si uerò fluxus sordidus fuerit, & dolorē intulerit, uitellos ouorū assatos cū modico croco & rosaceo subdemus. Aut malū coroneum assatū eodē modo. Et lēsculę decoctū cum plātaginis succo infundemus. At si quæ profluunt sordida quidē fuerint, & feci similia, dolorē tamē nō intulerint, infusa ad dysenteria idonea immittemus. Vbi autē loci purgati fuerint, adstringentibus elotionib⁹ cōfideret utemur. Locis uerò induratis asininū lac cū rosaceo aut susino oleo infundemus, & in pessum subdemus. Et si asininū defuerit, caprinū succedat. Lac uerò præstat quod ab animali per prata pascēte emulgetur. Aliquando etiā amyli ad crassitudinē comparandā, lacti ammiscemus. Pessi insuper nōdem, cataplasmataq̃ ac emplastra eadē quæ ad rubrū fluxū retulimus, huc transferantur. Præcipuā uerò fiduciā in recta uictus ratione habere oportet. Nec quantitatis solū, sed etiam qualitatis eduliorum ratio habēda est. Sicq̃ alimentū materia talis, quę & crassefaciat ac uires corroboret. Quales sunt sorbitiones è tritico ac lacte paratæ, nō aquosæ ac dilutæ, sed probe cōpactæ, quæ pro occasione etiā ex passo cretico parentur. Carnes uerò eligēdæ sunt siccadi uel præditæ, uelut aues mōtanæ, & ferarū animalium. Ceterū ubi fluxus cessauerit, à ueloci ambulatione, à multis pectinis ac lūborū frictionibus, ab acriū esu, à calfacientibus, à flatuosis, & ab his quę urinā proleat, diu abstinēdū est, & balneis raro utendū, neq̃ ueter mouēdus est, neq̃ spiritus retinēdus. Hęc em omnia malū reuocant. Partes autē superiores sensim ac leniter exerceantur, ac perfriantur. Infelsiones fiat in aqua nō adeo frigida. E' pessis autē subditijis elaboratiores ac medicamentosi uitentur. Verū post infelsiones rosaceū lana exceptū subdatur, & in ipso curationis tēpore ægroræ bibāt ea quę ad sanguinis per sputū reiectionē retulimus. Faciunt



& pæonię grana pallida x v. assidue pota. Aut coral-  
lorū dra. i. c. uino nigro. Aut uinacea trita cū uino.  
Aut leporis siue hœdi coagulum erui magnitudine  
in posca dilutum. Aut corticis loti arboris decoctū.  
Aliud Aspalix, ad mulieres quæ sinū pudendi ual-  
de humectū habēt, ut ex eo nō cōciplant. Gallas per  
octo dies aqua macerato, deinde lanā purā ac mollē  
in aqua illa siue cremore gallarū tingito, & nō expri-  
mito, sed siccatū finito, & lanā ita subdendā dato. Ex  
hoc mulier uelut uirgo reddetur, & hoc sæpe repe-  
tat. Aliud. Semē rumicis acuti cū pauca aqua subti-  
gito. Aut si uiride fuerit, per se terito, & subdēdū ex  
hibero, & fiet pudendum uelut uirginis adstrictum.

*De uteri strangulatione.*

*Cap. LXVIII.*

Uteri strāgulatio ab utero quidem inferne oritur. Ve-  
rū supernæ partes & principales præsertim, per con-  
sensum afficiuntur. Nam ad cor per arterias: ad cere-  
brum per spinæ mēbranas ac neruos: ad hepar per  
uenas affectio trāsit, uideturq; uterus uelut ad super-  
nas partes ascendisse. Cōsequitur affectus accedēte exa-  
cerbatione, mētis lāguor, pigritia ad agendū, debili-  
tas crurum, pallor faciei, tristis aspectus. Instāte uerō  
strāgulatione, sopor grauis ac pfundus, mētis ac sen-  
suū apprehēssio, cū uocis interceptiōe. Pulsus aut par-  
ui ac debiles sūt, & aliquādo penitus interceptiūtur.  
Quibusdā aut neq; respiratio sensibilis pmanet. Ali-  
quæ uerō alijs actionibus integris manentibus, ma-  
gnā respirationē ex hac affectione habēt. Et hinc ma-  
nifestū est, quod nō circa cor & stomachū cōpressio,  
aut morsus, aut perfrigeratio, à parvis ascensu fit, sed  
circa partes respirationis, & pulmonē hoc cōtingit.  
Quapropter neq; animi deliquium his uehemēs est,  
quū cor affectionis exors permāserit. Neq; enim fie-  
ri potest ut animi deliquiū citra cordis cōsensum in-  
gruat. Ceterū affectiōis differētiæ, pro causæ efficiē-  
tis differētia ac magnitudine sunt. Et sanē quidā expe-  
riri uolētes an aliqua adhuc supersit respiratio, lanā  
carptā naribus admoūēt, atq; inde ex lanæ motu col-  
ligunt, an aliqua inspiratio aut expiratio restet. Alij  
poculū aqua plenū ad os uentris ponūt, & cōsiderāt  
an aliquo motu aqua agitetur. Et profectō utriq;  
ignorāt, aliquādo sublata penitus oris ac nariū respi-  
ratione, superesse adhuc eam quæ in toto corpore ab  
arterijs perficitur. Id quod etiā in reptilibus uenenas  
tis cōtingere uidemus. Hęc em per totā hyemē mor-  
tuis simillima in cauernis latitant, per arterias tantū  
totius corporis respirātia. Sicut etiam in uteri strāgula-  
tione fieri potest, ut toto corpore frigefacto, oris ac  
nariū respiratio interdāt, supersit autē ea quæ ab ar-  
terijs fit. Sed & oris ac nariū respiratio adeo parua  
esse potest, ut sensum lateat. Profundissimo itaq; so-  
pore corripiūtur huiusmodi mulieres, uoce, sensu, ac  
motu interceptis. Stomachi etiā dolore uexantur, &  
saluā uomūt, si in stomacho aut capite humiditas si-  
ta est. Deinde uerō exolutis causis corpus firmari in-  
cipit, & malę rubescūt, & oculi post multā grauitatē  
attollūtur. Et ubi iā malū agrā relicturū est, humidi-  
tas quēdā ex locis muliebribus excurrēs, tactu perci-  
pitur, & intestina murmurant, & ipse uterus paula-  
tim laxatur. Atq; sic exurgens egra intellectu ac sen-  
sum recipit. Accidit hęc affectio omni quidē tēpore,  
sed hyeme p̄cipue ac autūno, iunioribus præsertim,  
salacibus, ac sterilibus, maxime si per medicamenta  
steriles fuerint. Oritur aut uel utero perfrigerato, dū

mēses prodeūt, uel propter abortū, uel sanguinis eru-  
ptione ab utero, ab aliquo repente suppressa. Atque  
hic morbus ubi inuadere assueuerit, comitialis mo-  
do diuturnus, & p̄ circuitū repetēs efficitur, & tutus  
quidē apparet, singulis tamē accessiōibus præceps  
periculum affert, ut nō eadem solū die, sed intra pau-  
cas horas interimat. Et pulsus quidem primum den-  
siores fiunt, & inordinate mouentur, deinde etiā pe-  
nitus interceptiuntur, & exigua quēdā humiditas cu-  
tis superficiem irrorat. Similiter & respiratio pri-  
mū obscuratur, postea penitus intercidit. Est autē hic  
morbus flatuosa perfrigeratio, nō inflāmatio, uelut  
Soranus putat. Semē enim in utero paulatim coacer-  
uatū, aut alia quēdā materia insita ac putrefacta,  
perfrigeratur: & ad cerebrum ac cor frigiditatē trāf-  
mitit, atque hæ partes principales frigefactæ relata  
accidentia inferunt. Et ego sanē mulierē uidi in hūc  
morbum collapsam, dum ab obstetrice laxantia ac  
odorata auxilia adhiberentur, & pudendi sinus digi-  
tis penitus confricaretur, tum ex auxiliorum admo-  
torum caliditate, tum ex digitorum contrētatione,  
se contraxisse cum dolore quodā uoluptate permix-  
to, deinde excreto multo crasso, uiscosoq; semine,  
protinus à molestijs ac afflictionibus liberatam esse.  
Neque mirum uideri debet, uel ex minima humorū  
mole tanta accidentia consequi. Si enim paucissima  
ueneni quātitas, & tā exiguum uirus reptilium per  
angustissimum foramen eiectū, mala longe sauiora  
inducit, non absurdum dictū est, semen corruptū aut  
menstruum sanguinem suppressum ac detentum, ta-  
lia inuadere accidentia. Sed & ex canum rabie facilis  
huius rei cōiectura est. Tāa enim inde humorum fit  
alteratio, ut si eorum canum saliuā solum corpus hu-  
manum cōiigerit, cōfestim rabiem inducat. At uerō  
scire opere precium est, hunc morbum nō solum ob  
uteri ascensum fieri, uictioso humore uelut diximus  
in eo collecto: sed sæpe etiam ex uentris repletionē  
utero affectionem transmitti. Et aliquando hepatis  
aut splenis causa, uasa ex quibus uterus dependet, re-  
trahi. Quum ergo uterus ex seipso laborat, pro se-  
minis uel menstrui sanguinis coaceruari quantitate,  
ac qualitate, alia aliās accidentia cōsequuntur. Si enim  
causa efficiens frigefaciendi uires habuerit, ita uniuersum  
corpus perfrigerabitur, ut respirationis ac pul-  
sum sensus penitus aboleatur. Si uerō humores as-  
fligentes crassi aut acres fuerint, conuulsio subsequen-  
tur, quemadmodū atrę bilis humores animi tristitia  
comitatur. At animi deliquia exacerbationum ue-  
hementia, & maxima p̄frigeratio, & oris uētris affli-  
ctio inducit. Aegra itaq; ceruice ac scapulis accliusus  
collocetur, femoribus ac inguinibus decliuis. Et  
in ipsis exacerbationibus extremę partes deligētur,  
& pedes ac crura fricentur. Naribus aut odorata ad-  
moueātur, uelut est galbanū, aut castorium, aut saga-  
penū, singula ex aceto trita, ac naribus illita. Aut ace-  
tum acerrimum, in quo pulegium, calaminthe, thymus,  
origanum, conyza tenuis, & alia huiusmodi  
acria decocta sunt, calefactum naribus adhibeatur.  
Hęc enim crassos uapores cerebri incidere & atte-  
nuare possunt, ac simul frigiditatem depellere, & in-  
spirata thoracem ac pulmonem expurgāt, & stoma-  
chum corroborāt. Excitentur etiā sternutationes, ca-  
storio, pipere, struthio, naribus per specillum admo-  
ro. Os autem agræ aperiat, ac medius digitus  
ad uomi



ad uomitum proliciendū intromittatur. Nares item castorio, bitumine, galbano, sulphure suffiantur, aut funiculo lucernario recens extincto, aut pennis ustis, aut soleis antiquis, aut ceparū, aut aliorum corticibus, aut capillis ipsius proprijs exustis. Aut cornu caprino incenso, aut pice ad prunas liquecente, cedriaq; ac ueratro: aut pane recens incenso, & similibus. Quidā etiam marulā urinariam inueteratā, & pannos sulphuratos incensos naribus admouent. Sinapi item tritum cū aceto, & gagates lapis aqua tinctus & incensus, ac oleo extinctus, naribus adhibeatur. Aut rutam uiridē manibus cōtritā suffito. Vterū uerò inferne per pudendū odoratis suffito, stōrace uidelicet, ac sandalis, & aloē ac similibus. Illinātur etiam intra pudendū ea quæ laxādī, calfaciendī, ac flatus dissoluēdi uires habēt, qualis est pelsus Eneapharmacus appellatus, & cæteri eiusmodi ad uteri duritias inferius descripti, amaracino, gleucino, irino, cyprino, aut capnistō oleo diluti, adiecta etiā rutæ aut cumini portione. Atq; hæc digitis excepta obstetrix usq; ad uteri os immittet, ac leniter & diu confricabit, ut hinc irritatus crassus humor qui in utero hæret, prouocetur, ac calefactus excernatur. In ipsum quoq; uterum per uteri fuforium elysterem, amaracinum, aut gleucinū, aut foliatum unguētum injiciatur. Et in sedem glandes indantur, ex ruta, cumīno, nitro & melle cum aliquo ex relatis ungentis & butyro præparatæ. Est & cucurbita primū inguinibus, ac femoribus, deinde utrinq; circa umbilicum, cum plurima flāma citra scarificationem affigenda. Et super hæc omnia mulier magnis uociferationibus excitetur, ac uocetur. Insefsiones quoq; parentur in decoctis baccarum, ac foliorū lauri, pulegij, calaminthes, marrubij, artemisiæ, conyzæ, fabianæ, centaureæ, dictamni, sampsuchi, foeni græci, altheæ, chamæmeli, aristolochiæ, tridis, serpylli. Insefsionū uerò tempore cerebri cura nō relinquatur, sed rosaceo & aceto caput irrigetur, & in aceto prius serpyllum, sphondyliū, ruta, baccæ lauri, interdum & castorium coquatur. Et naribus prædicta odoramenta assiduē adhibeantur, præsertim castoriū cum aceto. Præcordia item fascijs uinciantur, & distensis manibus os uteri comprimatur. At ubi exacerbatio instat, ægra ad uomitū cogatur. Omnes enim uomitu leuantur, sed præcipuē quæ cibo grauantur. Tercia uerò die cucurbitæ cum scarificatione pectini, ac lūbis affigantur, deinde loci scarificati sale cōspargantur. Et ubi ab huiusmodi auxilijs discesserimus, ad castorij portionē transibimus, quod assiduē potū sæpe penitus ab hoc morbo liberat. Dandū est quotidiē drachmæ pōdere, aliquando cum aqua mulla, aliquādo cum artemisiæ decocto, bituminis quoq; scrupulus utiliter ei ammiscetur. Nec parum iisdem confert ægetum scillinum assiduē potum. Atq; hæc curatio in morbi exacerbationibus adhibetur. Vbi uerò diuturnus factus fuerit, plerunq; à ueng sectione initiū facimus, præsertim si menstruæ purgationes fuerint deente. Deinde ad alui euacuationē progredimur. Achiera quidē ex colocynthide omnium efficacissima est. Mulieribus tamen & uteri affectionibus magis conueniētia ex aloē picra, hoc est, amara appellata, quæ habet aloēs drachmas centum, asari, croci, cinamomi, mastiches, spicæ nardi, xylobalsami, singulorū dra. vi. Hoc medicamentū aridū

seruari debet. Vfus uerò tempore ad integram alui ductionem, drach. iiii. ex eo cum aquæ mullæ cyathis sex propinentur. At si partitam purgationē maluerimus, drac. ii. tantum ex tribus aquæ mullæ cyathis exhibebimus. Ita enim stomachū firmat, uires reparat, ac morbum depellit. Neq; post adeptam sanitatem medicamenti usus statim deferendus est, sed quantitas solum paulatim imminuēda. Peracta euacuatione, cucurbitæ inanes quidē, sed cum plurima flāma affigendæ sunt, & uiolenter detrahendæ. Aliquando etiā scarificatio fit, & scarificati loci sale cōsparguntur, deinde cū cyprino cerato ad cicatricem perducuntur. Deinde emplastrū siue epithema emolliens pectini adhibeatur, quod ē seminibus præparatur, supra inter splenis auxilia descriptū, primum cum cerato dilutum, postea cerato paulatim detracto, ipsum solū per se imponatur, donec pustulæ uelut uari, in cutis superficie excitentur: quæ postquā emplastro albo, aut alio quopiam ad ambusta destitūto, fuerint sanatæ, iam locus est sinapismis & dropacismis acopisq; appellatis, ex euphorbio, pyrethro, adarce, ac piperis paratis. Multū uerò conferet ad medicamenta etiā recta uiuendi ratio, per deambulationes matutinas, gestationesq; in curru, uel nauis, uel iumento. A motu uerò gestationis prodest uociferatio, & lectio clara, modulata ac concinna. Item unctio, frictio, & exercitatio per congrua interualla repetita. Balneum autē raro, & non nisi sordis detergendæ gratia adhibeatur, & tamen bis, aut ter per totā curationem, ad morbū expellendum admitti potest. Postremum uerò cōfugiū est ad balnea naturalia, tum calida, tum frigida. Recuperata tandem sanitate mulier non omnino negligatur, sed præseruationis gratia per certa interualla, suspectis præsertim temporibus, insefsiones supra relatæ adhibeantur, & saluæ, pulegij, mercurialis, foeni græci decoctis, loci eluantur. Et pelsi calefacientes & emollientes post elutiones subdantur. Philosophus uerò inquit: ad mulierem ex uteri strangulatu colapsam, plurimis remedijs frustra tentatis, duos statim glomos in oleum anethinum feruens coniiecimus: Et alterum probè expressum calidissimum loco adhibuimus, & antequam frige fieret, alterum pro eo subiecimus, hocq; uicissim tam diu repetuimus, donec mulier citra dolorem exurgeret. Sed & ceratum ex araneis interdum umbilico imposuimus. Aliud, ad uteri strangulatus, ac dolores. Testudinis terrestris hepar tritum in pello subdito.

*Pelsi ad uteri strangulationem idonei. Cap. LXIX.*  
Pelsi ad strangulatum uteri idonei tales sunt. Adipis anserini sex uncem, mastiches, adipis phasiani, styradis, singulorum quadrantem, ceræ quadrātem. Vngenti nardini, spicæ nardi, croci, singulorum unciam unam, crocus cum uino odorato ueteri teratur, sitq; uinū adstrictionis omnis exors. Alius. Ceræ sex uncem, ammoniaci, mastiches, singulorum unciam unam, opobalsami, olei irini, singulorum quadrantem. Alius. Styracis sextantē, ceræ albæ dodrantem, cassiæ, spicæ nardi, amomi, croci, mastices, singulorum drach. i. adipis porcini, terebinthinæ, singulorū sex uncē, thuris sesquiunciam, adipis anseris & phasiani, singulorum quadrantem, opobalsami, olei liliorum, amaracini, cyprini, nardini, irini, singulorū unc. i. Quod si ualidiorem facere malueris, cardamomi



drachm. quatuor adijce, & seminis rutę tantundem. Oportet autem aëris constitutionis respectu, ea quę calefaciunt detrahare, uel addere.

*Unctioes ad uteri suffocationē, Philagrii. Cap. LXX.*

Unctioes post balnea pręseruationis gratia tales adhibeantur. Olei dulcis lib. i. seminis uiticis, rutę, cōtusorum singulorū quadrantē, casię tritę quadrantem. Omnia simul miscero, & sub canis estu per dies quadraginta insolato. Quod si pro temporis, anni, aut regionis, aut temperaturę calidioris siue frigidioris ratione, unctiois uim intēdere, uel minuere uolueris, addito ac detracto ex medicamentis quantum ex re esse iudicaueris. At si unctio pręparata non fuerit, irino ungento rutā, aut casiam, aut amomum, aut quicquam ex his quę supra dicta sunt amisceto, ac utitor. Possunt & citra balneum hę unctioes pectini, ac lūbis illini. Efficaciores autē euadent, si adarcen ustum, uel crudum, aut pyrethrum, aut piper tritum, aut oleū laurinum, aut cicinum, & reliqua eiusmodi addideris, ita ut unctio crassior fiat. Alia unctio ad eandē uteri strangulationē. Terebinthina, olei laurini, singulorum sex uncem, olei irini, anethini, singulorū lib. i. seminis cānabis, adarcę, singulorū sextantē, piperis, saluię, calaminthę, singulorū unc. i. Pyrethri sextantem, nigellę, calsię, singulorum unc. i. Arida tenuissimē trita liquabilibus liquatis ammisceto, unito, ac adseruato. Vtus autē tempore aliquo oleo calido diluito, pectiniq, ac lumbis illinito. Suffumigium uteri. Stercoris canini albi, & sabina, æquales porciones suffito. Et si torsiones successerint, morbi uexationes quiescent.

*Varia auxilia ad uteri strangulationē, Philagrii.*

*Cap. LXXI.*

Mulieres ad uteri strangulatū proclives, diospolitico pharmaco assidue uti debēt, & eo quod ex tribus piperis generibus cōstat, & quod ex calamintha appellationem habet. Singulis autē ammiscenda sunt quę semen minuunt, ac abolent, qualia sunt uiticis, rutę, cannabis semina, nymphę radix, ac reliqua huiusmodi, quę in uenereorum tractatu retulimus. Castorij quoq, drac. i. assidue potēt, modico aniso adiecto. At uerō si pręgnantibus respiratio intercepta fuerit, foris quidē ad corporis temperiem emendandam, auxilia adhibenda sunt, uerū potiones, & quę in uterum funduntur, aut subduntur, penitus uitare oportet, sicut etiā clysteres & sanguinis missionem. Ex omnibus enim his abortus periculum imminet. Cæterum meminisse oportet, ut his quę neq, cōtractionem, neq, declinationem uteri patiūtur, pro humiditatis, aut siccitatis ratione medicamenta idonea exhibeantur, & ualidiora: sicut his quę rarum, ac molle corpus habent imbecilliora, & rursus oppositis fortiora. Itidemq, iunioribus simpliciora, ætate prouectioribus efficaciora. Et his quidē quę totius corporis distentionem à flatu uēroso percipiunt, flatus leuantia exhibenda sunt. Quę uerō grauitatem perceptant, incidentia ac attenuantia. His autem quę humorum acrimonia uexantur, laxantia, ac pinguis. At si declinatio, aut contractio, aut inflammatio circa uterum fuerit, omnia imbecilliora offerantur. Fortiora enim morbum exacerbant, & seminis excretionem prohibent. Et contrā quę pro curandi corporis ratione moderata sunt, tum ipsi affectioni medentur, tum seminis excretionem adiuuant.

*De seminis fluxu, Sorani.*

*Cap. LXXII.*

Mulieres non aliter quā uiri ē seminis fluxu laborant. Est autē hęc affectio seminis citra concitationē ac tensionem uenerēā profluuium, ad quod uteri laxatio, ac debilitas, & totius corporis tabefactio consequitur. A toto enim corpore materia paulatim ad uterum cōfluit, atq, isthic modicē uelut in oculis lacryma mutatur. Et sæpe contingit ut affectio hęc diuturna fiat. Quapropter recentē adhuc reprimere, ac sedare conabimur, per ea quę sensim adstringūt, uelut est rosa, myrtus, rubus, lentiscus, & huiusmodi. Pectiniq, ac inguinibus acaciā, hypocisthidem, & similia cū uino austero imponemus. Cerata item ac cataplasmata ē palmulis, malis cotoneis, ac myrtibaccis adhibebimus. Laminam quoq, plumbeā latam, ac tenuem lumbis alligare oportet, & stratum nō sit delicatū, sed porius asperum. Vomitus à ieiuniis quidem fiat, à cibo tamen admitti quoq, potest. Præterea partes superne exerceantur, ac diu cōfricentur. Et cauendū ne affectę partes inungantur, aut calescant. In potu detur solani radix arefacta, aut uiticis, aut rutę, aut cannabis semē ex aqua, singula drachmę pondere. Cibi uitadi sunt exoluti, ac sorbiles, & ad seminis generationē, ac uenerem excitandam idonei. Vescatur autē solidioribus edulīs, & auiculis assatis utatur, ac uinū fuluum bibat. Et omnia uitet quę ad uenerem irritare possunt, ita ut neq, picturas, neq, signa formosa spectet, neq, de cōcubitu uerba faciat. Sed tetrica uiuēdi ratione, lectionibusq, ac colloquijs seueris utatur. Perseuerate uerō affectione, exercitia, sudorū profectiones, frictiones, & frigida balnea adhibeantur. Et rosaceū assidue pectini, ac lūbis illinatur. Si uerō aliquādo ob acriorē cōstitutionem, ac qualitatē irritas, ac quodāmodo mordens sensum, semen ipsis prodit, contrarijs cibis, ac potibus utatur, balneis item, ac lactis potu, & fructibus, & aquę potu, ac similibus. Transferantur etiam huc quę ad seminis profluuium in uiris, & ad seminis in somno effusionem supra relata sunt.

*De uteri debilitate, Sorani.*

*Cap. LXXIII.*

Quēadmodū alię corporis partes, ita etiā uterus aliquādo debilitatur. Cōsequitur ad hanc affectionē, fastidiū ueneris, flatus uērosi excernūtur, menses exuberant, & singulis mensibus bis, aut ter inordinate deferuntur, nigri & aquosi. Neq, semen uiri in lectū diutius deinetur, sed à concubitu defluit, aliquibus statim, quibusdā post aliquot dies. Quēdā abortū faciunt, aliquę nō abortientes gracilē, ac imbecillē fœtum generāt. Menstruorū uerō tēpore pectinis, lumborum, ac crurū grauitas adest, & stomachus male habet, & hinc uaporibus ad caput eleuatis aliquādo deliria succedūt, similesq, sunt harū uexationes his, quę ab utero strāgulantur. Quādoq, etiā uelut atrabile percitę desipiunt, ac furore aguntur. Qritur hoc malū ex assiduo partu, ac uteri distēctione, præsertim ubi fœt⁹ insignis fuerit magnitudinis. Curatio earū faciēda est, p ea quę firmadi, ac debiles partes corroboradi uires habēt. Infectiones itaq, adstringētes ad tactū tepidę, & uteri elotiones conueniunt. Et rosaceum oleū tepidum, aut narcissinū, aut melinū, aut susinum, & huiusmodi, pectini ac lumbis illinatur. Et mulier per congruos motus assidue exerceatur, & alimentis utatur paucis quidē, sed quę cum leui quadam adstrictione carnis copiā generant. Vinum

autem



autem fuluū adstringens parcissimè potet. Est enim sitis huic affectioni commoda. Omnem uerò lactis esum, & obsonia è caseo parata uitare oportet, uniuersas itē purgationes, atq; alui ductiones recusare.

De furore uterino, eiusdem.

Cap. LXXIII.

Furor uterinus est uteri intēperies, ad affectionis cōsensum cerebrū trahēs, ad quā rabiosum deliriū consequitur. Differt ab uteri strangulatione primū causa. neq; em̄ hic uterus sursum tractus principalē aliquā partē ad affectionis cōsensum ducit, aut cōpressionē, aut mōsu, aut uapore, sed eodē loco permanēs: per medullā spinālē, aut alias sibi insertas propagines, uiosam qualitatē quācūq; tandē ad cerebrū mittit. Deinde etiā signis ab uteri strāgulatione differt. Aegrotæ em̄ minimè in hac sicut in illa affectione mutæ, ac sine sensu decubunt, sed potius garrulæ, iracundæ, ac inquietæ fiunt. Differt etiā à furore nō per cōsensum, sed primario cerebrū impetente. Harū enim amētia tota in uenere uersatur, & nihil aliud imaginantur, aut loquūtur, q̄ de coitu, pruriēs q̄ pudendū habēt, eiusq; tactu mirū in modū delectātur. Accidit hæc affectio tēperatura calidis, ætate uigentibus, uirginibusq; ac castitatē seruātibus, & quę optimis edulijs uescūtur, & in delicijs ac animi uoluptate uersantur, p̄cipue si aliās libidini, ac ueneri aduetæ fuerint. Nihil em̄ aliud est hæc affectio q̄ ardor, & feruor uteri, ad cerebrū & totū corpus distribut⁹. Proinde q̄ supra ad calidā uteri intēperie relata sūt utero adhibēda, huc transferātur. Irrigationes autē capitis, & alia auxilia furori cōgrua, Sermonē sexto retulim⁹. Peculiariter autē huc facit pastillus Trigonus, cū equis portionib. crocomagmaris, ac cypheos aromatici. Facit & hydrorofaci potus. Et hoc medicamētū. Smyrni, croci, spice nardi, sing. unc. i. excipe diacodio, aut hydrorofato, & dra. ii. pōdus ieiunis exhibe cū coriādi decocto. Quod si ob corrupti seminis redūdantiā affectio contigerit, nitrū & cardamomū cerato excipito, ac pudēdis subdito. Saliuq; em̄ simile qd̄ elicitur, & affectio sedatur. Ruta uerò cū castorio in myrteo cerato supposita, genituram siue semē cōtrahit, & furorē mitigat. Sed & diacodium aceto aut solani succo ammixto subditū ardorē extinguit.

De uteri resolutione, eiusdem.

Cap. LXXV.

Uterus sæpe etiā ob alias causas, sed maximè ppter frequentes abortus resoluitur. Cōsequitur ueneris odiū, oris uteri frigefactio, eiusdēq; plenus, pinguis, & uelut infartus habitus, ceruicis itē laxitas ac stupiditas. Sæpe etiā mēses supprimūtur, aut ægre prodeūt. In cōgressu uiri, uel nihil omnino seminis in uterū immittitur, uel infectū uelut ex inanimato loco statim effluit. Aliquādo etiā urina & stercus importune prodit. Curatio autē similis est ei quā de mēstruorū stillitudo dixim⁹: facit & assiduus castorij potus, & peforū calefacientiū, elotionūq; ac unctionū adhibitio.

De uteri prolapsu, eiusdem.

Cap. LXXVI.

Prolapsi uterum dicimus, quum ita eueritur, ut foras promineat. Neq; enim totus à suis appēdicibus exolutus, uelut imperiti putat, excidit. Nā si ita procederet restitui nō posset. Quod autē procidit struthocameli ouo simile est, iuxta maioris, ac minoris differētiā, prout uiolēta euersio cōtingit. Sunt autē prolapsus causæ multæ. Ab alto enim delapsa mulier, & in coxas delata, diruptis pelliculis, ac ligamentis, quæ uterū continent, ac uicinis partibus cōnectunt;

hoc malo corripitur. Corripitur & ob uiolētiā secundæ extractionē, quod præcipue in abortibus cōtingit. Præterea inartificiosa foetus extractio, aut nimia spiritus detētio, aut immēsi oneris eleuatio, aut plaga, uteri prolapsum inducit. Sæpe etiā ob humoris plurimi, ac lenti defluxū, & ob partuū frequentiam, appendices ex quibus uterus dependet, laxatur, ac soluuntur. Quin & ob uehemētes animi affectus, uelut si liberorū amissio, aut hostium incursus nunciatur, aut ob periculofam nauigationē, aut eiusmodi quandā causam, mulieres toto corpore exolui solēt, ita ut uterus simul prolabaatur. Aliquādo etiā citra ullā eiusmodi causam partes debilitantur, ut propter pellicularū, ac musculorū uterū sustinētiū resolutionē, hæc affectio cōtingat, qd̄ inclinata ætate maxime fieri solet. In principio itaq; plurimus sanguis erūpit, deinde cōsequitur dolor p̄cordiorū, lūborū, imi uētris, ac pudēdorū, & periculū est ne p̄frigera-tis locis cōuulsio inferatur. Vbi uerò tēporis p̄gressu affectio inualefcit, & loci callosi facti fuerint, neq; conuulsionis periculū imminet, neq; dolor infestat. Quū ergo adhuc recēs est affectio, conari oportet, ut uulua ipsa cōtrahatur. In principio em̄ facile dirigetur, & recte locata pmanet, præcipue in uigoris ætate. Nā ætate prouectiorib. cōtrahitur qd̄, sed ex leui occasione rursus plabitur. Si itaq; durū stercus in recto intestino esse suspicaberis, per clysterē euacua-bis. Similiterq; si in uesica lotiū collectū fuerit, p̄ fistulā uesicę adaptatā euocabis. Cōtingit em̄ plerūq; ut illarū superfluitatū detēctione, uterus inter utrūq; rectū inquā intestinū, ac uesicā situs, cōprimatur ac coarctetur, & impediatur, ne repellī, & ad p̄priū sitū reduci possit. His autē peractis ægrā supinā collocabimus, coxis altioribus, reflexis poplitibus, ac cruribus disparatis. Deinde plapsam uteri partē oleo tepido, aut butyro, uel betæ, maluæ, althæę, fœni græci, seminis lini, aut similiū decocto fouebimus: & lanā cōuolutā figura ac crassitudine muliebri pudēdo correspondētē accipiem⁹, eāq; linteolo inuoluemus, & acacię, aut hypocythidis succo uino diluto intingemus, ac utero apponemus, & citra uiolētiā totum quod prolapsum est reprimemus, donec tota moles intra sinū recipiatur. Postea lanā in pudendū subdemus, & aliū lanę hapsū uino adstringente imbutū supponemus, atq; totū pectinē spōgijs ex posca expressis integemus, & mulierem reclinabimus crura extēsa, ac coaptata habentē, ita ut alterū alteri incumbat. Tutius tamē fuerit p̄ fasciā ad genua usq; cōstringere. Aliqui uterū recens prolapsū cucurbitæ domesticæ, ac betæ decocto, cum urina graueolēti, aut acri aceto, aut re aliqua foetida proluunt. At uerò si prolapsus uterus tēporis progressu intumuerit, plurimūq; humore refertus fuerit, ut præ tumore reduci nō possit, betarū decocto ipsum rigamus, deinde aceti affundimus, & salē tenuissimū inspergimus, & postea sedato tumore, eodē decocto p̄fusiū retrudimus. Deinde cucurbitas umbilico, & utriq; lateri cum plurima flamma affigimus, & odorata assiduē naribus admoouemus. Tertia uerò die lana adhuc intra pudendi sinum existente, mulier in uino nigro austero aliquatenus tepesfacto, aut in myrti, lentisci, rubi, ac malicorij decocto insideat. Et post infel-sionem rursus supina coxis altioribus locetur, & sublata ex pudendo priore lana, alia rursus eodem

*Eadem perie oia ex Paulo*



dem medicamento imbuta subdatur. Cataplasmata uerò forinsecus imponantur ad imū uentrem, ex palmulis, polenta, lēticula, ac malicorio, cū aceto mulso. Atq; hæc rursus tertia die fiāt, usq; ad perfectā curationem. Porro uteri crebrò prolabētes posca abluantur, in eademq; mulier diutius insideat. Deinde omnia relata fiant. Sæpe uerò ob locorū sensus subtilitatē, relecto aceto terram nigrā quā in lentibus reperimus aqua diluimus, & ex ea partē affectam plurimum fouemus, ac postea eadē medendi forma utimur. At uerò si uterus ob humorū lentorem difficulter repellitur, uini fecem ustam, aut nitrū lixiui permixtū obluimus, & cū decocto aliquo adstringente, aut cum prædicta terra aqua diluta fouemus. Deinde plumbi cremorem oleo myrteo, aut melino ammixto, parti prolapsæ illinemus, ac in sinum pudendi retrudemus. Locī insuper interni, ægra undiquaq; circumtectā rebus foetidis suffiatur. Naribus autē odoratissima quæq; admoueantur. Et cibi boni succi, & uina odorata tenuia offerantur. Ferūt torpedinis coriū recēs detractū, parti prolapsæ obuolutū, ipsam repellere: atq; idē posse pastinacæ marinæ aculeū cū hyoscyami succo illitū. Illud autē obseruandū est, ne alius nimis subducatur. Exoluūtur em̄ laxaturq; uicinæ partes, & uterus recidit. Si uerò pars prolapsa tēporis pgressu p negligentia cōputruerit, & ex assidua urinæ irrigatione & adhærentibus sordib; exulcerata fuerit, auferatur citra ullius periculi formidīnē. Narrāt em̄ totū uterū putrefactū aliquādo ablatū esse, & mulierē nihilominus superuixisse.

De reclamatione, auersione, ac recurso uteri,

Aspasie.

Cap. LXXVII.

Suppressis mēstribus necesse est uenas, & arterias ad uerum tendētes repleri. Nā sanguis usq; ad uasorum oscula accurrit quidem, uerū intra uterum prodire non potest, aut eò quod nimia crassitudine osculis impingitur, & grumofus fit: aut quod ipsa oscula clausa sunt, & transitū impediūt, ita ut uenæ humore refertæ extendantur, & uicinos uteri appēdices humectent, quorū extēsiōne uterus retrahitur. Si itaq; ex utraq; parte æqualis retractio fiat, reclinatio, aut reuulsio, siue recursus uteri æqualis cōtingit. Si uerò in alteram partem maior retractio fiat, alterum ē uisceribus his in causa est, splen uidelicet aut hepar, quorū uenæ superfluo sanguine extēte à suis partibus uterū retrahunt, hepaticæ uenæ ē dextris, splenicæ ē sinistris, prout alteræ magis fuerint repletæ. In utram uerò partē uterus declinauerit, digitorum admotione, & signis insequētib; cognoscemus. Si enim in obliquum declinauerit, propinqui femoris distentio, dolor, perfrigeratio, impedimentū, & torpor indicio erit. Aliquando uerò etiā eiūdem arefactio, & ad innitendum, ac ambulandū impotentia consequitur. Si uerò retro, aut infrā inclināt, torpor ac difficilis utriusq; cruris motus sequitur, sæpe etiā motus penitus intercipitur, & ingens uexat dolor. Alius etiā supprimitur, neq; clysterem admittit, nisi genibus innitatur ægra. Flatus item retinentur, & dolores inter sedendū acuuntur, præsertim si uersus anum reclinatio contigerit. At si ad pubem uergit, imus uenter, ac pecten extēditur, & dolores ibidem percipiuntur, aliquando etiam urina supprimitur. Quomocunq; igitur uterus retractus, ac inclinatus fuerit, eodē modo uelut inflamationes in exacer

bationibus curare oportet. In remissionibus autem & declinationibus, magis emollientibus utendū est. Perseuerante uerò affectione, his quæ ex alto attrahere, & corporis habitum mutare possunt. At uerò auersionem uersus anum ita curabimus. Primū obstetrici imperabimus, ut digito in anum immisso uterum propellat. Deinde glādem ano subdat quatuor digitorū longitudine, ex galbano & cera paratam, cuius extremitati filum extractionis gratia sit annexum. Aut castoriū aqua dilutum, & lana exceptum similiter subdatur. Aut bitumen aridum, aut pix liquida. Postridie uerò irinū, aut fusinū oleum tepidum, in uterum & intestina infundatur. Et loci aromatum, aut marrubij, aut conyzæ decocto foueantur, & ex eodē uterus eluatur. Postea ceratū rosaceum adhibeatur. Si uerò in obliquū retractio inclināt, primū eadem fomenta adhibeantur. Deinde obstetrici specillo cum digito subimmisso, uteri colū dirigat. Aegra uerò in cōtrarium partē affectæ latet, aut supina decumbat. Pessis insuper molliētibus aperiētibusq; utemur, & ex prædictis oleis aliquod infundemus, & pectini lanā uino, & rosaceo imbutam, aut succum seminis lini cerato exceptum imponemus. Et castorium cum aniso, aut cumino, aut nigella, aut pæoniæ radice, aut smyrnē, aut dauci semine, aut aristolochia, aut gentiana, aut helenio, ex aceto mulso propinabimus. Eadem etiā ad repentinos uteri dolores faciunt, nō singula solū per se, sed etiā simul coniūcta. Mulier autē accliu capite decubat, & si cōpositus rectē uterus rursus retrahatur, sordida statim naribus admoueantur, & sternutationes prouocentur. Et si urina supprimatur, fistula uesicæ ad hoc destinata proliciatur. Et si ab his exacerbatio fuerit exoluta, quiescendum est. Cæterum pro afflictionis magnitudine, si ægram adolescētem & sanguineam nacti fuerimus, considerabimus an cubiti uena sit secanda. Deinde menses prouocantia propinabimus, & pessis mitioribus utemur.

De uteri inflatione.

Cap. LXXVIII.

Uterus aliquando ex partu perfrigeratus flatu impletur, osculo ipsius concluso, aut grumo sanguinis in ipso impacto. Flatus autē ipse quandoq; in uteri cavitatē cōcluditur, quandoq; in corporis ipsius uteri angustijs cōtinetur. Cōsequitur pectinis, ac imi uentris tumor, uelut in hydropē tympanite, cum dolore pungitiuo, perpungēte usq; ad septum transversum, & stomachum, & nihilominus utrinq; in lateribus extēto, & sæpe ad alterū, sæpe ad utrumq; inguen se extēdente. Umbilicum item lumbosq; ac pectinem idem infestat, & caput quoq; per consensum afficit. Quandoq; uerò flatus per muliebre pudendū erumpit, ut ægre id percipiāt. Si itaq; flatus in uteri cavitatē fuerit conclusus, strepitus, ac sonitus quidam in corporis flexu auditur, qualis in intestinis cōtingit, quæ torminibus uexantur: & ad digitorū inflationem sonus tympani redditur. Si uerò intra uterū angustias cōtinetur, dolores uehementiores, ac curatu difficiliores infestant. Huiusmodi autē affectiones fame, ac olei dulcis calidi irrigatione, in quo ruta & anethū decocta sūt, curantur. Et nisi ætas, regio, & anni tēpus obstiterint, uena secetur. Infectionesq; in ruta, pulegiā, calaminthes, marrubij, thymi, artemisiæ, altheæ, ac caricarū decoctis fiant. Et corpus per hīerā Rufi, & Archigenis ex colocynthide euacuetur.

In exacer



In exacerbationibus autem uulua his colluatur, quæ laxandi, ac flatus discutendi vires habet, quale est oleum gleucini, & pessus eiusdem facultatis plurimo oleo dilutus, & per uteri fusoriū clysterem immisus. Cataplasmata etiā leuia ex caricis, hyssopo, ruta, ac nitro imponantur. At uerò si flatus ob impactos grumos fuerit cōclusus, postquā ægra in aliqua ex relatis infelsionibus diutius cōsedet, obstetrix digitū illitum in pudendi sinum immittat, & grumū sensim dissoluat, ac educat. Perseuerate uerò inflatione, in exacerbatione efficaciora adhibeantur, interpositis temporis spatio, illitionibus calidioribus, crurumq; ac affectorū locorum frictionibus utemur. Et lumbis ac pectini dropacem adhibebimus. Aut rubefactoriū ē sinapi & caricis. Aut farinā ordeaceam cum caricis, ruta, hyssopo, & melle coctā. Aut epithema ex seminibus, aut ex baccis lauri. Aut polyarchiū cerato cyprino exceptū. Aut postea etiam per se solum. Pessi quoq; eiusdem facultatis subdantur, ex terebinthina, galbano, iride, ruta, & œsypo. Et qui ex pulegi, nitri, mellis, fellis taurini, æquis portionibus paratur. Maxime autē cōuenit hic. Caricarum pinguiū probè cōtusarum, ut granula non percipiātur, drachmā unam, cumini drachm. duas, spumæ nitri albæ drachmam unam. Verum ad acrimoniam obtundendā, pessum hunc in lac prius immergere oportet. Cucurbitæ quoq; affigantur, & uio lenter detrahantur. Aliquādo etiam scarificatio fiat. Utendumq; est omnibus quæ ex alto materiam attrahere possunt, & balnearū naturalium aquis prius calidis, deinde frigidis ut corpus ad tolerandā frigiditatē sensim allidatur, & affectæ partes paulatim firmetur. Alimēta quoq; attenuantia, ac flatus discutientia exhibeantur. Et medicamētū diosporidicū, ac ex calamintha cōstans aliquādo exhibeatur. At uerò auxilia amplius medicata, & aromātū sufficit, tāquā capiti noxios reprobamus. Sed & epithemata adstringētia, qualia sūt quæ ex palmulis, ac malis cotoneis parantur, & similia, ad hanc affectionē inepta sūt.

Deuteri hydropē.

Cap. LXXIX.

Quum menses longo tempore fuerint suppressi, & impregnatō impedita, sæpe humoris copia in uterum confluit, & aliquādo corpuscula quædā uesicæ fellicis similima in ipso generantur, in quibus humor colligitur. Sequitur affectionem hanc, tumor circa imū uentrem amplus, latus, flatusosus, & murmura uelut in intestinis, in ambulando grauitas, & spirandi difficultas, alui recremēta graueolētia sunt, & menses ac cōceptus impediuntur, & quæ prodeūt nullo ordine seruato deferuntur. Vbi uerò uiolēter excernuntur, ruptis aliquādo paruis illis corpusculis, quæ uesicis similia diximus, uiscosa quædā, ac aquosa erumpunt. In quibus itaq; humorē in utero collectum ex proprijs signis cognoueris, decubitu quieto, mox uocatu, ac ualidis elotionibus utēdum est. Proinde corticis radicis thymalli myrtei sicci dra. ii. per se, uel cū radicis panacæ obolo propinabis. Et in uterum infundes quæ mucosos humores attrahūt, qualia sunt, grani cnidij grana decem, cum oleo irino & modico melle. Aut ueratri nigri drach. ii. cum irino aut cyprino, aut narcisino oleo, cum modico melle per uteri fusoriū clysterem infundito. Verū ante has elotiones, cardamomū cū sale, aceto mulso, thymo, pulegio, calamintha, aut simili quopiā bibendū da-

bimus. Deinde humorum copia per aluum excreta, prædictæ elotiones infundantur. Aut pessi eiusdem facultatis subdantur. Et postea sinus pudēdi aqua marina proluatur, primū sola, deinde addito aceto, & aliquo ex prædictis in ipsa cocto. Elotione peracta, ac locis probè deterfis, pudēdo ac femoribus oleum cyprinum illinatur. Medicamēta uerò hīdem cōuenientia hæc sunt. Pulegi drachmā unā, cum modico pipere. Aut gentianæ uel origani drachmas duas, cum semine dauci, uel smyrnæ, cum uino mulso, aut aqua mulsa in potu dentur. Salis præterea cōmunis loco alimentis inspergatur hoc. Hyssopi trientē, pulegi quadrantem, origani, cumini, singulorū sextantem, seminis ammi, spicæ nardi, singulorū unc. unā, salis costi quadrantē. Trita misce, ac utere. Sed & pudēdi sinus resina, myrrha, & amomo suffiatur. Pessis autē huiusmodi utendū est. Nitri, colocynthidis, singulorū quadratē. Melle excipe, & pessum inde paratū oleo cyprino tinctum subde. Alius. Cumini & nitri æquales portiones melle excipe. Potest & uiolæ albæ semen addi. Alius. Colocynthidis quadrantē, salis unc. i. pinguiū caricarū carne excipe, ut sit iuglādīs magnitudo, & inde pessum paratū subde. Humorē enim foetidum attrahit, ac mirifice prodest. Idem sedi inditus, stertoris & humorū, ac flatuum copiā elicit, & uterum leuat. Alius. Comæ absinthij, ammoniaci thymiamatis, singulorū dra. i. æris usti, nitri, singulorū drac. iii. melle excepta subdito. Hoc autē placidissimè & citra omnē dolorem attrahit. Cicutæ semen, aristolochiā, cuminū, salem, carne caricarū excipe & subde. Cæterū ad aquæ receptacula, eas uidelicet uesicas quas in utero generari diximus, fomētis utemur ex aromatibus, quæ menses eliciūt, & pessis sanguinē trahētibus. Ex quorum numero hic est. Cneori, quod est grani cnidij radix, aut illo nō præsentē, chameleæ, elaterij, casia, singul. dra. iiii. aluminis scissi, misyos, sādarchæ, myrrhæ, costi, croci, singulorū drac. iii. melle excipito, atq; aluo pridie euacuata per clysterē, pessum inde paratū subdito, integramq; diē, ac noctem finito. Et si semel parum eduxerit, rursus subdito. Si uerò mordacitatem induxerit, cētaurij decocto tepido sinus pudēdi foueatur, ac eluatur. Et mitigandi gratia pessus mollior subdatur. Aut cicutæ semē cū aristolochia, cumino, sale, ac caricis, uelut paulò antè diximus subiciatur. Mitissimū uerò omnium ad huiusmodi pelliculas & aqua refertas uesicas, est mercurialis mascule semē, cū modica myrrha, sale, ac melle, lana exceptū, & multis diebus subditū. Post harū autē educationē, exercitijs, sudoris puocatione, & ualidis totius corporis, & præcipuè imi uētris frictionibus utēdū est.

De mola uteri.

Cap. LXXX.

Quæ mola appellatur, tumor est uteri induratus, aliquādo prægressa inflammatione succedēs, aliquando post locale ulcus, cui caro superexcreuit. A motus autem difficultate & grauitate, molæ nomē accepit. Cōsequitur hūc tumorē, detractio partiū superincumbentiū, gracilitas, coloris uitiatio, & appetitus prostratus. Et primū sanè cōceptus suspicionē de se præbet. Nā & menses supprimuntur, & māmæ intumescunt, & stomachus subuertitur, & lumbi grauatur, uēterq; attollitur, uerū tēporis pgressu discernitur. Molā em̄ dolor pūctionis sensū inferēs subsequitur: Nec in ea motus ullus, uelut in utero conceptu percipitur

*It. g. sine  
seus g. in  
gall. iq.  
par. cap.*



capitur. Quin & postea toto corpore imminuto, ac uentre ampliato, hydropis imaginē prae se fert. Discernitur tamen ab illo per tumoris duritiā, & quod tumor hic ad digitorum appressiōē, ac pulsationē non cedit, neq; tympani sonū, uelut in hydrope edit. Et quod neq; ad manus contactum ulla fluctuatio percipitur. Aliquando tamen temporis progressu hepar perfrigeratur, & hydrops superuenit. Quidā uerò tradunt in quibusdam mulieribus carunculas ad iuglandis nucis magnitudinē per pudendum excretas esse, aliquando singulis mensibus, aliquando bimestres, aut trimestres. Hanc affectionem alij uelut incurabilem penitus reliquerunt. Alij incipientem tantū curari posse confidunt, negligenda tamen non est, sed omnia quae cōuenire uidebuntur, facienda. Cataplasmata igitur laxandi uiribus praedita, fomenta, elutiones mitigatorias, pessos mollitorios, ad duricias infra descriptos, infusions eiusdē facultatis, & cerata ex althea & oleo cyprino parata adhibebimus. Et malagma ex succis, & quod Mnasea inscribitur imponemus. Deinde cucurbitas cū scarificatione apponemus, & alimenta boni succi offeremus. Atq; haec quidē in ipsis exacerbationibus adhibere oportet. In interuallis autem corpus reficiendum est per ea quae id praestant, gestationē uidelicet, deambulationē, balnea, & cibos conuenientes, ac uini potum. Partibus item affectis dropaces adhibebimus, & nitro ac sale inspersis easdē insolabimus. Et per medicamentū ex sinapi, ac caricis rubificabimus. Epithematis insuper mollitorijs ex seminibus, ex baccis lauri, & polyarchio, ac similibus utemur. Sufficium etiā uaporis aquae marinae, aut muriæ adhibebimus, aut decocti foliorum, ac baccarū lauri, pulegij, thymi, hyssopi, saluiae, marrubij, artemisiae, centaureae, dictamni, scordij, polij. olla autem operculo perforato arundine inserta sellae supponatur, atq; inde per arundinem uapor intra pudendum recipiatur. Pessi item subdantur ex œsypo, butyro, adipe anserino, medulla, aut cerebro ceruino, melle, caricis pinguibus, uuis pallsis, cum oleo antiquo cyprino, irino, sampsuchino, amaracino, susino. Perseuerante uerò malo, acrium eduliorum esus assumatur, & innationes aquarum calidarum, & aquae marinae. Et ab acceptis raphanis uomendū. Pessos tamē & infusions acriores uitare oportet, ne loci ex assiduo eorum usu exulcerentur. His autem transactis, saepe plurima atri ac grumosi sanguinis copia repente excernitur, & affectio dissoluitur. Philosophus uerò detentis inquit uxoris amici cuiusdā mensibus, arbitrabar primū ipsam concepisse. Postea aucto amplius tumore, hydropē suspectū habui, quia totū corpus, ac pedes tumescere uidebā. At ubi tandē id affectionis genus esse depræhēdi, quod alij laterem, alij molā uocāt, rutā & anethū in uino ueteri fuluo odorato coxi, & abiectis herbis, uinū calidū bibendū dedi, & ferme aquae loco exhibui, statimq; mulier excreta sanguinis copia salutem adepta est.

De tumore uteri laxo, Sorani.

Cap. LXXXI.

Uteri tumor laxus pallidus, ac albus est, ad tactū mollis, & digitorū cōpressioni cedēs, seq; rursus paulatim attollēs, & cutis uētris manu appræhēsa facile attrahitur. Loci itaq; oleo cōmuni calido, aut irino, aut cyprino rigētur, & pessi subdantur, ac reliqua auxilia adhibeantur, quae supra de uteri inflatione retulimus.

De Satyriasi, eiusdem.

Cap. LXXXII.

Mulieribus quoq; satyriasis & tētigo accidit, qualē uiris fieri supra retulimus. Cōsequitur ad hanc ingens pudēdorū pruritus cū dolore, ita ut mulier locis assidue manus admoueat. Atq; ideo intolerabili ueneris desiderio cōturbescit, & falsi humoris effluentis acrimoniā, ac mordacitatē percipit. Et loci utero uicini inflāmātur. Illud uerò ardēs cōeundi desiderij seuiorē reddit affectionē. Quum enim partes affectae distētae sint, & semē excerni nō possit, quoniā meatus per inflātionem obturatur: maior materiē copia frustra ad locū attrahitur. Statim igitur a principio uena ipsis secāda est, & alimentū cōtrahendum: Et pubi, ac lumbis illinēda quae leniter refrigerāt, ac cōtrahūt. Caput aceto & rosaceo irrigetur. Et in potu aqua tepida exhibeatur. Cibi uerò sint sorbiles, omnis prorsus flatus, ac uenerae cōcitationis exortes. Duobus uerò a uenae sectione diebus, cucurbitae cū scarificatione affigantur. Reliqua uerò curatio eadē sit cū ea quā ad inflātionē uteri mox referem.

De uteri inflātionē, Philumeni. Cap. LXXXIII.

Uteri inflāmatio ob multas causas cōtingit. Nā & ex plaga, & mensiū suppressione, & abortu, ulceratione, nimio coitu, sellae durioris infessu, longa ac intensa ambulatione, frigidityteq; ac flatuositate oboritur. Indicāt hanc muliebriū locorū, pubis, imi uentris, ac lumborū dolores ardentes. Et si digitus in os uteri submitatur, occurrit ad contactum durū, clausum, seruēs, ac retractum, praesertim si in ipso, aut in collo fuerit inflāmatio. Nā ubi cauitas, aut fundū uteri inflāmatur, imi uētris dolor ostendit, ut ne cōtractū quidē foris admittat. Et plerunq; uterus ad inflāmatū locū retrahitur, atq; hāc ob causam os, & collū eius auertitur. Differt autē ab ea quā supra uteri retractionē appellauimus, quia in inflātionē febris est acuta, & ardor intensus. Si uerò posterior ipsius pars inflāmata fuerit, dolor circa spinā magis haeret, & cōpresso intestino recto stercora detinētur. Anteriorē autē parte inflāmata, urinae difficultas, aut stillicidium cōsequitur ex cōpressa uesica, praesertim si dolor pectinē affligit. At ubi obliquos laterū locos inflāmatio occuparit, inguina distēduntur, & crura grauātur, ac egre mouētur. Inualescētē uerò inflāmatōne, febres accedunt, dolor capitis, stomachi afflictio per cōsensum, imi uētris tumor, ardor, distēsiō, grauitas coxarū, lumborum, praecordiorum, inguinum, femorū, horrores discurrentes, ac pungentes, pedum torpor, genuū perfrigeratio, extremarū partiū exudatio, pulsus parui, ac densi, animi deliquiū, exolutio. In augmento uerò etiam singultus dolor tendinis, collī, maxillarū, lincipitis, oculorū praesertim in fundo. Vrinaq; ac stercorumcrementa supprimuntur. Et inflāmatōne adhuc magis aucta, febres augescunt, delirant, dentibus frendunt. In principio itaq; curationē aggressi, aegrotam in domicilio obscuro, & moderate tepido collocabimus, quietem imperātes, & omni crurum motu interdicentes. Deinde artus manuum contrectatione demulcebimus, & pedum, ac manū iūcturas fouebimus, irrigabimusq; ac lana pura integemus. Aluum autem eluamus, & molli infuso euacuabimus. In potum uerò & ad oris collutionē, aquam calidā, & ptisanā succum dabimus. At si uehementior inflāmatio fuerit, & neq; etas, neq; habitus, neq; anni tēpus obstiterit, neq;



neq; inflammatio post abortū, aut nimiam sanguinis euacuationē superuenit. Cubiti uena secetur, & sanguis pro uiriū ratione detrahatur, licetq; in secunda die uenam incidere, in tertia uerò detractionē repetere. Deinde alica ex aqua mulsa, aut pane loto, aut ouo sorbili, ægra alternis alatur, omnibus his moderatē exhibitis, feruēte inflāmatione lana succida uino & oleo, aut aceto & rosaceo imbuta, imo uētri, ac pubi imponatur. Aut palmulæ uino coctæ. Aut mala cydonia in posca cocta, cerato melino, aut rosaceo ammixta. Cataplasma uerò imponatur sic paratū. Melilotū in passo coquito, ac terito, & uitellos ouorum assatorū addito, & cum rosaceo, aut melino, aut crocino imposito. Aut palmulas uino diluto feruefactas, cum polentæ farina, & aliquo ex prædictis ungentis terito, ac imposito. Cæterū ad inflāmationes erysipelatas igneo ardore cognobiles, utendū est cataplasmatibus ex polenta, & intubo, perdicio, umbilico ueneris, sedo, polygono, pampinis uitis, portulaca, plantagine, & similibus præparatis. Et lana aliquo harū herbarū succo, cū rosaceo, aut melino oleo imbuta, in pudēdū subdatur. Quod si cataplasmatū onus loci nō tolerant, aqua rosaceo ammixto ex modicis interuallis affundatur. In exacerbationis declinatione totū corpus inungatur, & ægra in aqua tepida usq; ad lumbos insidere iubeatur. Deinde pessi subdatur ex aliquo ungeto leniter adstringēte parati, rosaceo uidelicet, melino, lētisciano, ac œnanthino, adiectis ouorū uitelis crudis siue assatis, & croco. Potest & ex prædictis succis aliquis ammisceri. Caput præterea rosaceo cū modico aceto irrigetur. Mitigata uerò inflāmatione, mulier in aqua oleo ammixto insideat, & pessos ex narcissi no, aut susino ungento paratos subdat. Et lanā oleo calido imbutā pectini, ac lūbis adhibeat. Interdum & cucurbitæ lumbis affigantur, & tumore magno existente, etiā scarificatio fiat. Postquam autē inflāmatio declinare incœperit, ad ea deueniemus quæ laxare, ac discutere possunt. Proinde in fœni græci, althæe, seminis lini, interdum etiā pulegij, marrubij, saluæ, artemisiæ decoctis, ægra insideat. Et ad imum uentrē, ac pubem, farinā ordeaceā cum fœno græco & lini semine, in aqua mulsa coctā, imponat. Aut caricarū decoctū adhibeat. Quæ uerò cataplasmatum grauitatem, ac calorē ferre nō possunt, in aqua tepida insideant, & rosaceo locos illinant, ac pessos subdant moderatē refrigerātes, ex adipe gallinaceo, rosaceo, ac uino præparatos. At his quæ calorē ferunt, ceratum nardinū adhibeatur, & infusiones injiciantur, ac pessi subdantur, ex œsypo, butyro, medulla ceruina, adipe anserino, ungento susino, & cera tyrrenica, ubi uerò curatio processerit, tenuis uictus & ciborū parsimonia tollatur, & manifesta iā facta declinatione, balneū ac uinū concedi possunt, & cibi reficiētes exhiberi, malagmataq; adhiberi, uelut est quod ex meliloto paratur, & quod ad Mnaseam, & quod ad Serapionē refertur. Pessi porro ad sedādos inflāmationū dolores uteri, tales sunt. Fœnū græcū madefacto, & prima ac secūda aqua diffusa, cū tera pura, ac dulci coquito, ac excolato, & ad decoctū adipē anserinū, uel gallinacū recētem addito, & ad prunas liquari finito. Et ubi frigefacta fuerint, cōcre tū adipē tollito, ac seruato, atq; usus tēpore spathula in manu subactū pello excipito, ac subdito. Alius

dolores sedāns. Papaueris capita passo coquito, & flaccida facta exprimito, & ad decoctū excolato medullā ceruinā liquatā ammisceto, ac utitor: si ceruina medulla defuerit, uitulīnā accipito. Alius. Fœni græci aridi triti, ac cribrati drach. iiii. in passo cretico, aut sapa coquito. Et terebinthinæ, adipis anseris, singul. drach. iiii. rosacei sesquiquartā accipito, & omnia simul liquefacito, & fœni græci decocto ammixta pello excipito, ac subdēda dato. Alius pessus soporifer, dolorē mitigās, & oēm duritiā molliens. Tria papaueris capita magnitudine mediocria in quatuor passi cyathis p biduū macerato. Deinde coquito, donec capita flaccescāt, & passum ad tertias redigatur, postea expressis & reiectis capitibus passū excolato, & galbanī, myrrhæ troglodyticæ, thuris, opij, singul. sesquidrachmā, casia drach. iiii. accipito, & singula seorsim primū, deinde simul probē terito, & capitulorū papaueris decoctū paulatim adstillo, donec omnia ad mellis cōpagē redigantur. Tum œsypī, medullæ ceruinæ, adipis anserini, singul. dra. iiii. oīa simul colliquata ammisceto, ac adseruato. Vfus autē tempore medicamētū hoc rosaceo dilutū pello excipe, ac subde. Oēm em̄ dolorē & uehementes inflāmationes statim mitigat, uteri stragulationi medetur, duritiās mollit, & somnū conciliat. Alius pessus somnū inducēs, ualēs ad inflāmationes. Musci quē etiā hypnō dicūt, in aqua feruefacti, expressi ac triti, panis aqua mulsa macerati, ac cōtusi, emplastrī basilici, emplastrī ex succis, ungenti nardini, adipis gallinacī, & quales partes liquefacito, ac utitor. Facit ad urinariū meatū ac uterū inflāmatū, & ad uteri declinationes. Ego uerò pro pane fermentū purissimū nō omnino acidū sine sale, in aqua mulsa macero, ac utor. Pessus aureus appellatus. Ad inflāmationes & uteri retractiōes siue declinationes. Ouorū assatorū uitellos sex, medullæ ceruinæ dra. iiii. croci dra. ii. œsypī dra. ii. cerę albę, terebinthinę, adipis anserini, sing. dra. i. Crocū cum modico uino dulci terito, & oua trita adijcito, & liquabilia liquefacta ammisceto ac adseruato. Vfus autē tempore medicamentum oleo nardino dilutū pello excipito, ac subdito. Alius pessus. Cera tyrrenicæ drach. xxiiii. adipis anserini, porcini, terebinthinæ, singulorum dra. sex, decocti capitū papaueris dra. quatuor, rosacei quantū satis est, aut irini, si calfactione ac discussione opus est. Alius. Adipis anserini trientē, cerati rosacei aut susini sextantē, uitellos ouorū assatorū, croci, singulorū unc. i. myrrhæ drach. iiii. opij obolos duos, aut pro opio, capitū papaueris decoctum. Alius. Cera tyrrenicæ, medullæ ceruinæ, singulorū drach. c. adipis anserini, terebinthinæ, singul. trientē, croci obolos quatuor, opij obolos duos, oui assati uitellū unum, olei susini, aut telini ex fœno græco parati, quantū satis est. Pessus Enneapharmacus appellatus, ad inflāmationes. Adipē anserinū, & bubulum, cerā albā, terebinthinā, butyrū, medullam ceruinā, mel, oleū rosaceum, & cicinū. Omnia recentia æquis portionibus liquefacito. Pessus ad feruentiores inflāmationes. Emplastrū ex succis cū rosaceo liquatū succo plātaginis ammisceto, & pessum formato. Si uerò plātago defuerit, senecionis aut intubi succū accipito. At si plurimū excāduerit, & ad erysipelatis naturā tēderit inflāmatio, solani folia tenera cū lacte mulieris trita supponito. Alius pessus ad inflamma



inflammationes. Lilij flores tritos ceratō rosaceo liquido excipito, & medullā ceruinā, ac adipem anserinum adijcito. Alius. Ex semine lini, foeno græco & althea, succū crassissimū parato, & crocū illi ammisceto. Deinde adipem anserinū liquefactū addito, unito, ac utitor. Cæterū butyrū, medullā, & adipē, omnia recētia ad pessos deligenda sunt. Antiqua em̄ dum liquātur nidorosa fiunt, ac calidiora euadūt, & inflammationes exacuunt. At uerō nec in distentionibus, neq; in inflammationibus uterī, mēses prouocādi sunt. Locī enim magis distendūtur, & quū ob inflammationē cōclusi sint, sanguinis transitū impediunt. Quin & tetrapharmacū ad uterī inflammationes com̄modē subditur, aut infunditur rosaceo dilutū. At si inflammationi ulcus cōiunctū fuerit, ceratū rosaceum ex cera alba cū tertia adipis anserini parte p̄paratū, albumine ouī quātū ei' capere potest ammixto, infundito. Sedata demū inflammationē, mēses prouocētur.

*De utero in scirrhi tumorem indurato, Sorani.*

Cap. LXXIII.

Induratur uterus aliquādo derepēte nullo praeindicio facto, plerūq; uerō inflammatione p̄gressa, quē neq; soluta est, neq; in abscessum trāsmutata. Est autē huius indurationis in scirrhi tumore species, ea duritia quē in uterī ceruice ut plurimū consistit, & tumore quidem similiter habet, sed minus renitente, & cū moderato dolore. At uerō ubi in scirrhu induratus tumor uterī fundum occupat, tumor uehemens, & tantū renitēs occurrit, cū grauitate, ac ægro motu, nō solum crurū, sed totius corporis: & seignicies ad omnes uitæ functiones. Quod si nō recto ductu tractentur, cōsequitur uisus corporis habitus, decolor, & ad similitudinē hydropis. Duritiæ itaq; circa os & collū uterī cōsistentes facile curātur, circa fundum uerō difficulter. In principio itaq; si nihil obstiterit, neq; ætas, aut uires prohibuerint, sanguinis mediocrē copiam a cubiti uena secta detrahemus: aut per Hierā Archigenis purgabimus. In fissionibusq; utemur ex foeni græci, seminis lini, pulegij, artemisiæ, foliorū sambuci, radicis & foliorū cucumeris syluestris, decoctis. Et aromatum uapore fomēta faciemus. Et uterū oleo susino, narcisino, irino, gleucino, adipe anserino, gallinaceo, suillo recenti, aliquo ungento ammixto. Itē lacte bubulo, aut caprino cū adipe anserino colluemus. Cataplasma quoq; imo uentri apponemus, ē caricis, hyssopo, nitro, & absinthio. Et cucurbitas cū scarificatione affigemus. Malagmate item polyarchio utemur, & eo quod ē seminibus cōstat, & quod ex baccis lauri paratur, de quibus paulō post agemus. Pessī uerō mitigatoriū & aperientes subdātur. Facit & is quē infra ad uterī condylomata describemus, ē lycio, ac œsypo paratus, & quē suprā retulimus ē tribus papaueris capitibus cōstans. Cui similis est hic. Duo papaueris capita passo per tridū macerato, deinde ad tertias coquito, & expressis capitibus, ad decoctū excolatum adijcito, galbani drac. i. casia, succi mādragoræ, singul. drac. tres, myrrhæ, thuris, singul. drac. i. Et postea medullæ ceruinæ, œsypi, adipis anserini, sing. simul liquefactorū dra. i. ammisceto, ac in plūbeo uase seruato. Vsu uerō postulatē ex hoc medicamento oliuæ magnitudinē rosaceo diluito, & bis aut ter quotidie tepidū subdito. Bene facit & tetrapharmacū, heptapharmacū, enneapharmacum, emplastrū Azanitæ,

& emplastrum ex succis. Omnia oleo susino, aut cyprino diluta. Pessus Libanus appellat' mollitorius. Cerae albæ quadrantē, olei nardini, gleucini, susini, medullæ ceruinæ, adipis anserini, singulorū sextantem, œsypi, butyri, nitri, singulorum drach. i. i. i. Alii qui ouī assati uitellum addūt. Alius pessus Titianus uocatus. Cerae sexuncem, colophonæ sesquiunciam, adipis taurini trientē, picis, terebinthinæ, singul. quadrantē, medullæ ceruinæ, ammoniaci thymiamatis, singul. unc. i. Ammoniacū aqua dissoluatur. Alius pessus mollitorius. Cerae albæ, ungētū nardini, singul. quadrantē, olei irini, gleucini, cyprini, adipis ursi, pinguedinis porci, singulorū sextantem, butyri, medullæ ceruinæ, œsypi, terebinthinæ, singul. trientem. Alius pessus ad duritias. Cerae albæ, terebinthinæ, medullæ ceruinæ, adipis gallinacei, anserini, butyri, ungenti nardini, susini, myrrhæ, æquales portiones excipe melle, ac utere. Si susinum oleū siue ungentum nō fuerit ad manū, telinum pro ipso succedat. Pessus aureus uocatus, mollitorius. Cerae trientem, medullæ ceruinæ, adipis anserini, singulorū unciam unā, œsypi drac. i. i. i. croci drac. i. myrrhæ, galbani, singulorum drac. i. olei susini quantum satis est. Alius, ad omnes diuturnas uterī affectiones. Myrrhæ drach. i. bdellij drac. ii. spicæ nardi, croci, singul. drac. i. i. i. casia, ladani, singul. drac. ii. meliloti drach. vii. carniū palmularū decem, uini dulcis cyathū, olei susini, rosacei, cyprini, singulorū trientē. Aridis cum uino dulci tritis olea ammisceto, & molli igne coctis utitor. Ad imum uerō uentrē epithemata uelut diximus imponātur, polyarchium, ē seminibus, ex baccis lauri, ex meliloto. Bene facit ad duritias, ac uterī inflationes & hoc. Resinæ pinus lib. i. i. i. cerae unc. x. apochymatis, fermenti acidi, singulorum lib. i. galbani quadrantē, ammoniaci thymiamatis, opopanacis, singul. sextantem, muria acerrimæ quantum satis est. Opopanacē & ammoniacum in muria coquito, & fermentū adijcito, ac aliquatenus dissoluito. Deinde liquabilia liquata ammisceto, & spatula donec frigeat agitato. Et in mortariū translata probē subigito ac utitor. Aliud Epithema ē micis panis, laxadi ac diffundendi uim habens, faciens ad omnes duritias quocunq; loco fuerint, & inflammationes duriores discutiens. Radicis altheæ, carniū palmularū quæ Nicolai appellantur, singul. libr. ii. foeni græci, seminis lini, singulorū lib. i. chamemeli, meliloti, singul. sexuncē, uini antiqui adstringentis sextar. vii. spumæ argenti, cerussæ, colophonæ, singul. lib. ii. cerae, terebinthinæ, singul. lib. i. olei antiqui lib. v. panis siliginei sicci contusi ac cribrati lib. v. Herbæ in uino maceratæ coquātur, & succus exprimitur. Et in hoc succo panis madefcat. post die uerō spuma argenti, & cerussa conteruntur, & oleo affuso coquuntur, donec nō amplius inquinēt. Et ad hæc liquabilia liquata adijciuntur. Et sublatis igne medicamentū panis, præmadefactus commollitur, ac paulatim reliquis ammiscetur, & per spatulā agitando unitur. Hoc itaq; modo ad duritias stomachi, alui profluuiū, ac dysenterię principiū, præparari solet, ad quas omnes affectioēs secure adhibetur. Verū ad uterī, ac cæterorū locorū duritias, uisceribus exceptis, ad prædicta hæc addimus. Aeruginis, floris salis, thuris, singul. sexuncē, iridis, aristolochiæ, singulorū quadrantē, terebinthinæ lib. i. Et terebinthina quidem



quidem reliquis liquabilibus ammiscetur. Arida uero trita, ac cribrata insperguntur, medicamento ab igne ablato. Et postremum panis madefactus adijcitur, & omnia probe per spatulā agitata uniuntur, frigefacta uero in mortario primū pistillo, deinde manibus subiguntur. Pessus ad uteri duritias. Cere, resinæ pinus, picis, terebinthinæ, butyri, olei rosacei, irini, nardini, mellis, singul. lib. i. nitri sextantē, & semunciā. Alius pessus, molliendo efficax. Cere, olei susini, rosacei, adipis anserini, singul. lib. i. iridis, terebinthinæ, adipis leonini, ursini, singul. sexuncē, medullæ ceruinæ trientē. Habet hic pessus ex toto libr. vi. & trientē. Pessus ex Archigenis scriptis, facit ad duritiā, debilitatē, maciēq; uteri, præ omnibus quos ego noui efficacissimē, & ad omnes ferme uteri affectiones, & ad neruos affectos comodissimus est. Et est acopon quoq; insigne. Olei irini, susini, cyprini, cere, singul. lib. i. mellis Attici quincuncē, unguē foliati, nardini, singul. trientē, adipis anserini quadrantem, medullæ ceruinæ, œsypi, sing. sextantē, terebinthinæ sesquiunciā. Oesypum & medullā cum melle subigito. Deinde cerā cū oleis liquefacito, & postea terebinthinā, & adipē, & cōsequēter preciosa ungenta, nardinū ac foliatū addito. Et in mortariū translata probe unito. Hoc si usq; ad exactā curationem ueteris, magnā laudē consequeris. Sed & post adeptā sanitatē aliquanto tēpore postea maioris securitatis gratia adhiberi potest. Ego uero etiā pro malagmate forinsecus impono, & ad prædicta ammisceto thuris, cere, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, floris iūci odorati sing. dra. viii. picis dra. xvi. galbani, opopanax sing. drac. iiii. thus, galbanū, opopanax, uino odorato adstringente terito, & ad œsypū & medullā, ac mel adijcito, & omnia simul rursus terito, deinde cerā cū preciosis ungentis liquato, & ammoniacū tritū resinamq; ac reliqua ammisceto. Et ablato ab igne medicamēto ac frigefacto, myrrhā & florem iūci odorati inspergito, unito ac utitor. Epithema Oribasii ē baccis lauri, facit ad duritias. Cere, resinæ pinus, picis, nitri, baccarū lauri, adipis taurini, ammoniaci thymiamatis, æquales portiones. Ammoniacū & nitrum & baccas lauri, sing. seorsim terito, ac cribrato, & reliquis liquatis ammisceto. Ego uero, inquit Oribasius, dimidium nitri accipio.

De uteri abscessu, Archigenis. Cap. LXXXV.

Abscessus in utero uelut in cæteris corporis partibus, præcedēte inflāmatōne generatur: primū igitur inflāmatōnis notæ apparebūt: Deinde circa puris generationem dolores augētur, febresq; cum horrore, plerūq; ad uesperam ingruunt, tumor attollitur, dolor punctorius adit, aliquando urina, aliquando stercoriscrementa supprimuntur, aut utraque simul. Dolor autem localis affectum locum indicabit, præinde si discuti non potest, citius suppurationi auxilium ferēdum est. Itaq; semen lini, fœnum græcū, farinā ordeī, caricas coctas, altheæ radicē, terebinthinā, in cataplasmate imponemus. Aliquādo etiam columbinū stercus cū oleo, & melle adhibebimus. Hæc autē cataplasmata imo uetri, ac lumbis imponantur. Et pudendi sinus per spongiā assidue foueatur, & uapores per arūdinē operculo ollæ perforato infertā intra pudendū recipiātur. Infusionesq; frequentes fiant, decoctis in aqua his quæ uim attractoriam habent, uelut est pulegiū, marrubium, laurus, saluia,

artemisia, dictamnus, cētaurea. Quod si dolor uehementius infestauerit, papaueris capita in aqua coquantur, & confusa cataplasmatibus ammiscantur. Caricæ item crudæ in mortario cū resina pinus, terebinthinæ, ac modico nitro tritæ imponantur, pessis autem utemur ex terebinthina, myrrha, œsypo, ac butyro paratis. Verū optimus ad uteri abscessus sic præparatur. Carnis caricarū pinguium, adipis anserini, olei irini, singul. drac. ii. terebinthinę drac. i. rutæ dra. iiii. myrrhæ, iridis, nitri, singul. obol. ii. possunt etiā pro caricis uuæ passæ ammisceri. Excipiuntur lana in pessum, qui oleo irino, aut cyprino tepido tinctus subditur. Est & ad hūc usum efficacissima cōpositio, Cyphoides appellata, & suprā ad hepatis abscessum descripta. Itemq; Enneapharmacū ad duritias paratum. Et Malagma polyarchiū, & alia huiusmodi, oleo susino aut telino diluta, & pello in uterū subdita. Imus item uenter, ac pecten assidue prædictis decoctis foueatur. At uero rupto abscessu, si pus ad uescicam fuerit delatū, & cū urina excernitur, lactis potu utendū est, & cucumeris semē propinandū. Et cataplasmata prædicta adhibenda, cerataq; emollientia, ac odorata. Si uero ad intestinū rectum progreditur, & cū stercore, uel per se egeritur, lentiū & malicorij decoctū per clysterē infundemus. Si uero in pudendi sinum erumpit, & purū est pus, rosaceum, aut tetrapharmacū cum butyro recētī, ac rosaceo infundatur. Et loci rosarū aut lentiū decocto, aut ptisanæ succo eluatur. Sin tenuis & foetida destillat sanies, uelut à noma, & ulcere depascēte, magis adstringens sit quod infunditur, uelut est baccarum myrti, palmularū, lentium, & malicorij decoctū. Quod si post humorū excretionē inflāmatō perseverauerit, perseverandū quoq; est in cataplasmatibus & infusionibus suprā relatis. At si inæqualia fuerint quæ prodeunt, fomenta & infusiones ex aqua multa fiant, in qua absinthiū, marrubiū, eruū, cētauriū, aut lentes sunt decoctæ. Locū uero ptisanæ succo eluantur, addito melle & rosaceo. Vteri uero os & anus cerato rosaceo, aut butyro inungatur, cui spodiū, aut stibij, aut plūbaginis, aut spumæ argenti aliquid, cū muliebri lacte sit ammixtum, facit & plumbi succus. Si uero profluēs humor foetidissimus fuerit, uino mulso pudendi sinus eluatur, & in eo usque ad exactam curationem perseverandum est.

Abscessus oris uteri chirurgia. Cap. LXXXVI.

Si circa osculum uteri abscessus cōstiterit, ut sub chirurgiam duci possit, nō prompte ad sectionē festinandum est, sed perfecta affectione, & inflāmatōne plurimum aucta, & partibus puri incumbētib; attenuatus. Atq; tū mulier locetur in sella supina, ut crura habeat ad uentrē contracta, & femora inter se disparata. Et cubiti ipsius poplitibus subiiciantur, & idoneis uinculis ad cerulcem relingentur. Et hoc ad clarā lucē fiat: alsideatq; ē dextris chirurgus & per dioptram instrumentū, pro etate cōmodum, ad pudendi diductionē speculetur, & per specillum sinus muliebris profunditatē dimetiatur, ut ne maior dioptræ tibia uterū comprimat. Et si reperta fuerit tibia eius sinu maior, lanæ conuolutæ labijs siue alis pudendi imponantur, ut in ipsis dioptra firmetur: oportet autem tibiam immittere, cochlea ad supernā partem uergente, & dioptram quidē à chirurgo teneri, cochleam uero per ministrum circūuerti, ut ductis



ribiæ plicis sinus distendatur, postquam autem occurrerit abscessus ad tactum lenis, & tenuis, apex eius scalpello uel acicula disseccetur, & excreto pure limniscus linamentum tenerrimum rosaceo tinctum in sectionem indatur, aut potius extra sectionem in muliebrem sinum citra impulsione. Extra uero pendendi labia ad pectinem, & lumbos lanæ succidæ, aut puræ oleo imbutæ imponantur, tertia deinde die ægra in aqua & oleo calidis insideat, aut in maluæ decocto. Et deterfione facta, limniscus tetrapharmaco per se, aut cum melle illitus, in sectionis fissuram leniter indatur. Sit autem tetrapharmacum butyro, aut rosaceo dilutum. Cataplasmata autem forinsecus imponantur, donec abscessus ab inflammatione liberetur, ac puri fiant. Si uero difficulter repurgetur, per auricularem clysterem iridis decocto eluantur. Et per emplastrum ex cadmia, aut ex ladano paratum, aut id quod ex ordeo usto constat, singulis rosaceo dilutis, ad cicatricem perducantur. Quod si intra uteri os abscessus fuerit, chirurgiam reprobamus, & curationem paulo ante relatam adhibemus.

*Abscessus uteri inter intestina, & peritonæum membranam, rupti curatio.* Cap. LXXXVII.

Eruptionem inter intestina, & peritonæum membranam aluum, ac intestina ambientem, indicat tumor circa illas partes magis hærens. Si uero intra uterum rumpitur abscessus, dolor quiescit, & os uteri ad tactum lenius occurrit. Eruptio itaque ad superficiem tendens adiuvanda est, & cutis postquam satis fuerit attenuata specillo in summo apice disseccanda, qua parte effluxum commodiorem fore speramus. At si sanguinis eruptionis tumor est, pro specillo siue scalpello, cauterium eminentiori loco adhibebimus, & ita pus educemus: plurimum enim ad totam curationem cauterium confert, post excretum autem & probe expressum humorem: ægra collocetur ut residuum commodè excerni possit, & sectio aqua mulsa eluatur, & postea bis quotidie ac semel in nocte spongiis foueatur. Interdum & in aqua calida ægra insideat, & uterus oleo cyprino calido eluatur. Reliqua uero curatio cæteris ulceribus similis fiat. Alimenta autem exhibeantur boni succi, & quæ non facile diffilantur, uelut est lac cum amylo, alica, oryza, pedes porcini in alica, aut pitana ad flacciditatem cocti, auculæ & pisces boni succi. Et nisi febris obstiterit, uinum etiam dulce antiquum concedemus. Balnea autem & alimenta quæ exulcerationes exacerbant, uitentur.

*De uteri exulceratione, Archigenis.* Cap. LXXXVIII.

Ulceratur uterus sæpe ex fluxione erodente, aut ab acris medicamentis, aut ex abscessibus ruptis, aut ob partus difficultatem, aut foetus extractionem, aut eiusdem corruptionem. Aegrotæ uero in affecta parte dolore punctorium perceptant, & ex interuallis foetidi, ac saniosi humores ab ulcere sordido prodeunt, & cõsequuntur etiam alia utero affecto peculiaris accidentia, uelut est capitis, ac præsertim principitis dolor. Ligamentorum item ac radicis oculorum dolor, qui ad manus usque ac digitos se extendit, & reliqua supra de inflammatione relata. Ulcus itaque expositum, per dioptræ usum deprehenditur. In profundo uero reconditum, humores qui excernuntur indicant. Non autem aliter huiusmodi ulcera curantur, quam in seccionibus, irrigationibus, cataplasmatibus ac pessis supra relatis, priuatim tamen commodum est hoc medicamentum. Crocus optimus cum muliebri lacte teritur, & cerato

excipitur, ex cera tyrrhenica, & rosaceo, aut fusino oleo, cum anserino adipe parato, & in pessum subditur. Hoc autem adhuc efficacius est, & ad dolores magis congruum, quod sequitur, papaueris capita decem in passo diluto, per triduum macerantur, deinde donec flaccida fiant coquuntur, & postea expressa teruntur, cum seminis, aut foliorum rosarum drach. v. croci drach. iiii. ammixto etiam inter terendum ipso decocto. Deinde ceratum ex ceræ sextante, & rosacei aut narcissini olei sextante ad ea affunditur, & medicamentum in stannea pyxide seruat. Vsu uero expetente, rosaceo, aut narcissino oleo dilutum, & in pessum excerptum subditur: facit & pessus supra relatus, ex croco, rosaceo, adipe anserino, & medulla ceruina paratus. talia enim dolores mitigant, & ulcera sanant. Philosophi medicamentum. Ad mulieris pudendum exulceratum, & ob acrium humorum influxum pruriginosum, plumbaginis sextantem, glaucij unc. i. cum succo hyoscyami terito, & olei myrti, aut rosacei quantum satis est ammisceto, utereque uel manu illinens, uel in passo subdens.

*Ulcera uteri carbunculosorum curatio.* Cap. LXXXIX.

Carbunculosi uteri ulceribus priuatim profunt lites, & oleæ folia, sine melle. Lupini in uino austero cocti. Inseccionibus in eorundem lupinorum decocto.

*Ad sordida uteri ulcera, Archigenis.* Cap. xc.

Ad sordida uteri ulcera emplastro Aegyptio utendum est, citra æruginem preparato. omnia enim mordacia, quemadmodum & crustas inducentia, utero aduersa sunt. Vtemur etiam eo quod ex melle, terebinthina, rosaceo aut fusino oleo & butyro constat, quibus aliqui etiam crocum addunt. Ad ulcera repurganda efficax est & iris illyrica cum melle imposita, & aristolochiæ decoctum per se, uel cum melle infusum. Pessus optimus ad sordida ulcera repurganda. terebinthinæ drach. iiii. adipis anserini drach. vii. myrrhæ drach. i. croci drach. iiii. medullæ bubulæ, & sypsi, singulorum drach. ii. mellis, olei cyprini, aut irini, singulorum drachm. xvi. thuris, radicis panacæ, iridis, singulorum drachmas duas, cyperi drachm. iiii.

*Ad humorem à muliebri pudendo profluentem.* Cap. xci.

Ordei usti, amyli, thuris, singul. unc. i. aluminis scissi drach. iiii. Minutissime terito, ac cribrato, & asinino lacte diluito, ac in pudendi sinu per uteri fustorium clysterem infundito. Quod si ulcus dolore intulerit, tale medicamentum adhibeatur. Rosarum siccarum tritarum, capitum papaueris paululum torrefactorum, sing. drach. iiii. croci, styracis, sing. dra. ii. farine foeni graeci, cenanthes, sing. dra. iiii. thuris dra. ii. oia cum passo cretico, ac oleo rosaceo paulatim affusis, ad mellis copagē conterendo redigito, & in pessum excerpta calida subdito.

*Ad uteri nomas, Aspasie.* Cap. xcii.

Nomæ uero & ulcera depascentia, ac efferata, equino aut asinino lacte recens multo eluatur. Et in penuria, quodcumque haberi potest recens, coctum accipiat. Duabus autem lactis heminis mellis hemina dimidia addenda est, & quatuor iridis drachmæ inspergenda, & tale infusum calidum sæpe singulis diebus infundendum. Idem facit aqua mulsa, in qua absinthium, aut calamus aromaticus, aut leucanthemum uel chamæmelum, aut buphthalmum decoctum est. Et ubi quod infusum est excretum fuerit, loci protinus maluæ decocto eluatur. Deinde pessus subdatur ex farinæ erui, iridis, singulorum dra. duabus, cum melle subactis,



subactis, & pello exceptis. Alius pessus. Melilorum in uino aquæ marinæ experte coctū terito, & melle ammixto subdito. Alius. Farinā lentum cum melle subdito. Alius. Oleæ folia cum uino trita, & melle ammixto subdito. Alius. Vuarum passarū carnes tritas cum melle subdito. Alius. Hederæ aureum florem habētis folia in uino cocta cū melle indito. Asclepiadæ medicamentū in puluilli forma, ad uterī nomas præcipuū. Lupinos amaros tritos, ac cribratos seruato, & usus tēpore sine ullo liquore subdito, uel melli ammisceto. Alius pessus optimus. Hederæ aureū florē habentis fasciculū, in umbra paululum siccātū in uas fictile cōjicito, idēq; undiq; oblinito, ac torreto, & eo cinere utitor. Alius ad humida ulcera. Aristolochiæ longæ tritæ drac. vi. rubricæ sinopicæ hepatis colorē referētis dra. viii. misce, & cum melle ad cerati crassitudinē redige, & panniculo attrito excepta deliga, & sub prunis exure. Et ubi optime assata fuerint, tere ac utere. Aut panniculum deligatū in ollā mitte, ac probe opertam, & oblitam in ignē pone, donec medicamentū ad carbonis speciem fuerit exustū: & deinde tritum serua. Vsu uerō expetente ad nomas subde, & breui contrahentur. Hoc usque ad inductam cicatricem idoneum est. Alius. Seminis tamaricis partē unam, nitri rubri tantundem, terito ac cribrato, & simul mixtis aridis utitor, aut rosaceum ammisceto. Vbi uerō nomē fuerint cohibite, adhibeātur ea quæ paulo antē ad ulcera repurganda relata sunt.

*Quæ ad cicatricem ducūt, Asclepiadæ. Cap. xciii.*

Postquam ulcera fuerint repurgata, utendū est his quæ ad cicatricem perducunt, primū mitioribus, postea efficacioribus. Ceratum cicatricē inducens. Ceræ albæ quadrantē, rosacei optimi dodrātem, ad prunas liquefacito, & quadrantenus refrigerato. Deinde in mortarium cōjicito, ac lacte muliebri, aut asinino, aut caprino recens multo affuso, cū pistillo subigito, donec totū inalbescat. Deinde diffuso priore lacte, nouum infundito, ac rursus subigito, & croci ad drac. i. ammisceto. Quod si magis mitigatorium facere uolueris, rosacei olei septuicem, adipis anserini, & medullæ eiusdē sing. unc. i. accipito, potes & pro rosaceo, melinū, aut susinū ammiscere. Medicamentum ex ordeo ad uterī ulcera. Ordei usti, ac triti, spumæ argenti lotæ, cerussæ lotæ, singulorū lib. i. adipis anserini lib. iiii. adipis capræ recētis lib. iiii. olei myrti libras ii. mellis despumati bessem, terebinthinæ quadratē siue triētem. Hoc etiā ad ardores, & ulcera pudendorū facit. Nec minus utendū est his quæ ad sedis affectiones, ex pompholyge & plūbo usto præparātur. Itēq; eo quod ex cadmia & qd ex ladano præparatur, singulis myrteo aut rosaceo oleo dilutis.

*De cancriis uteri, Archigenis.*

*Cap. xciiii.*

Canceratorū uterī tumorū aliqui ulcerati sunt, aliqui nō ulcerati, quēadmodum de mammis supra diximus. Itaq; in nō exulceratis, tumor circa os uterī reperitur durus, ad tactū renitens, inæqualis, eminēs, colore feculentus, ruber aut subliuidus, uehementēs dolores inducēs circa inguina, summū uentrem, pectinem, ac lumbos: qui ad manuū contactū, & medicamentorū uarietatem exacerbantur. Si uerō ulceratus est cancer, supra dolores duritiasq; ac tumorem, ulcera corrosa & inæqualia uidentur, plerunq; sordida, eminētia, albicantia. Quæ uerō pura putātur,

feculenta, liuida, rubicūda, & cruenta apparent. Excernitur autem ab ipsis sanies tenuis, aquosa, nigra, aut fulua graueolēs. Aliquādo & sanguis deferitur, & alia signa adsunt suprā de uterī inflammatione relata. Proinde affectio quidē hæc incurabilis est, uelut etiā Hippocrates pronūciavit: mitigari tamen ac leniri potest, infessionibus in foenigræci, ac malug decocto, & cataplasmatibus similibus. In exacerbationibus autē ualde mitigat malua, aut althea in aqua multa ad flacciditatē cocta, & cum modico rosaceo trita ac imposita. Et cataplasma ē caricis, meliloto, ac ruta paratum. Et quod ex palmulis paratur in passo coctis, ouorū uicellis, ac polenta ammixtis. Aut papaueris capita trita & cribrata, cū polygoni aut intubi, aut coriandrī succo. Aut solani folia tenera cum lacte muliebri imposita. Aut solanū cerato rosaceo exceptū, frigida aqua paulatim cerato instillata. Aut maluæ folia cū lacte muliebri trita, & rosaceo cerato excepta. Atq; hæc omnia in dolorū uexationibus sunt adhibēda, postea uerō ceratū imponatur ex rosaceo, aut myrteo, aut melino, aut oenanthino cū palmulis in passo coctis, facit & cataplasma ex ouis, & quod ex ordeo paratur, quibus etiā ad ambusta utimur: peculiariter autē conuenit id quod ex fece uasforū æreorū in quibus aqua coquitur, paratur. Hæc enim sex assata teritur minutissimē, & cerato rosaceo excipitur. Et hæc qdē forinsecus. Intrinsecus autē mitigat locos, ubi ulcerati fuerint, lac muliebre, aut asininū infusum, & plāraginis succus tepidus. Si uerō cruentati fuerint, polygoni succus cū modico thure. Idē faciunt etiā pessi ex croco, & lacte muliebri, succoq; papaueris, ac œsypo præparati. Omnibus autem præstat etiā ad sedis affectiones hoc. Spumæ argenti lotæ sexuncē, thuris masculi, œsypī, adipis porcini recētis, butyri recētis, ceræ tyrrhenicæ, sing. sextantē, rosacei trientē. Seruatur hoc medicamentū pyxide plūbea, & arefactū rosaceo diluitur. Ego uerō, inquit Archigenes, spumā argēti cū seridis succi hemina diluo, & ubi mellis spissitudinē habet, liquatis alijs ammisceto: utere etiā medicamentis ad sedis affectiones præscriptis. Optimū est & id quod suprā ad mammarū nomas descripsimus, ex uino, rhoē coriario, pilulis cupressi, ac galla præparatū, quod muliebri aut asinino lacte dilutū adhibetur. Philosophi medicamentū ad caneros uterī. Cancros fluuiatiles tres, aut quinq; impari numero, sub prunis exurito, & cum oleo cyprino tritos per pennam illinito.

*De uteri obturatione.*

*Cap. xc v.*

Obturbatio circa os, aut collū uterī fit, aut propter ulcerationē prægressam, aut ob inflammationē induratā, per quā loci adeo angustī fiunt, ut semē nō amplius admittant, uel admissum non retineant: ob callosam enim duritiā uterus cōtrahi nō potest. Aliquādo semen admissum, & intra angustissimū os cōtentū foetus causa est. Verūm hæc cōceptio prægnātī mortis causam inducit, quū ob nimias locorū angustias foetus prodire non possit. Infessiones itaq; ex oleo, & aqua & foeni græci decocto adhibeātur, & p cerata, ac pessos emolliētes ex œsypo, terebinthina, ac nitro præparatos, laxetur. At uerō si loci ad tactū molles fuerint, spōgiā siccā funiculo appēso intra locorū angustias dilatādi gratia indemus. Et si ea exciderit, alia crassiorē immitemus. Et ea de causa plures, ac diuersas spongas siccas paratas habere oportet, &



postea tale medicamentū spongię illinemus. Sandarachę, aluminis scissi, sing. drac. i. auripigmēti drac. iiii. omnia simul cōtrita melle excipito, & spongię indendę illinito. Quod si sublata spōgia locus non satis apertus uidebitur, inflāmatiōq; oborta fuerit, subiectū medicamētū spongię illinatur. Iridis drac. ii. adipis anserini, terebinthinę, thuris, olei irini, cerę, singul. drac. ii. Iridem primū, deinde thus minutissime terito, ac cribrato, & terebinthinā, adipem, ceram, cū oleo liquato, ac omnia simul unito. Vbi uerō inflāmatiō quieuerit, & locus apertus fuerit, ceratum ex oleo rosaceo, & adipe anserino paratū spōgię illinatur, in quo usq; ad inductā cicatricem persistendum est, ut locus paulatim consolidetur.

*De utero non perforato.*

*Cap. xcvi.*

Quedā à natiuitate uterū non perforatū habēt, & hoc trifariā contingit. Quibusdā enim in ipsius pudendi alis siue labijs, mēbrana aut caro obitūras enascitur. Alijs in ipso pudēdi sinu idem cōtingit. Alijs circa ipsum uterū osculū eadē obturatio fit. Quibus itaq; in pudendi labijs, mēbrana excreuit, eas curaturi supinas pro more reflexis ac diductis cruribus locabimus, & operientem membranā specillo dissecabimus, donec figura pudēdi ad naturalē dimētionem deueniat: postea linamētis cōuulsis sectionē replebimus, ac deligabimus, & curationē suppuratoriā per cataplasmata aliquot diebus adhibebimus. Deinde linamētis cerato rosaceo liqdo imbutis utemur. At si post sectionē pudendi alas carnosas partibus propinqs unitas esse senserimus, utrinq; excoriabimus, & per linamēta dilatabimus, eodēq; curationis modo utemur. Mulier uerō supina puluinar intra femora habēs, usq; ad cicatricē inductā permaneat. Si uerō pudēdi qdē figura externa aperta est, in sinu uerō caro innata locū obstruit, ut angustū foramen relinquantur, muliere eodē modo collocata, stylū in uteri ceruicē maioris tutelę gratiā immitemus, ne per errorē altiorē sectionē faciamus: atq; ita infra signatū per stylū locū dissecabimus, per specillū latū, donec sinus secundū naturā habere uideatur. Deinde labia dissectę carnis p uolsellā distēta ad quadrāgularem figurā circumcidemus. Et erectā mulierē diductis cruribus statuemus, ut humor in utero collectus cōmode profluat. Quod ubi sufficiēter factū fuerit, ægrā ad priorem decubitus formā reducemus, & linamentū uino & oleo imbutū in sectionē indemus, habeat autē hoc filum alligatum, quo facile extrahi possit, & loco probē deligato quietē imperabimus. Sequentibus uerō diebus locus cū aqua mulsā eluatur, & pharmacū suppuratorium linamēto intorto illitum indatur. Et ubi cicatrix inducēda est, canalis ex stanno indatur, ac alligetur, donec locus fuerit cōsolidatus. Quod si partes rursus inter se cōiuerint, ac rursus uterū os claudatur, spongiā siccam indito, donec callus fuerit obductus. Si uerō mēbrana ipsum uterū os obstruxerit, mulier in eodē situ locata, dioptra immissa sinus dilatetur, & membrana per uolsellam arrepta, ac extēta intorqueatur, ut tota simul colligatur, & lato specillo amputetur, & medicamentum siccū floridū inspergatur, & linamentū torium alligato filo indatur, & eadem curatio fiat. Quod si quid de membrana relictū fuerit, florido aut psaro appellato medicamēto cōsumatur. Repurgatis autē locis, hoc pharmaco linamēta tingito. Cerę, terebin-

thinę, adipis anserini, singulorū dra. ii. iridis, thuris singul. drac. i. croci dra. iiii. olei irini dra. xvi. Iridē, crocum, & thus cū passo terito, & liquabilia liquata ammisceto. Dioptra uerō assiduē immittenda est, ac cauendū ne caro superexcreseat, quę tali medicamento reprimatur. Squamę æris, æruginis, corticis thuris, singul. drac. ii. terito, unito, ac utitor. Aut æruginē, & squamā cū plumbi succo subige, & adhibe. Sed nec spōgię sicce usus omittatur, donec labijs callus obducatur. Stanneus itē canalis immittatur.

*De Hemorrhoidibus uteri, Aspasie. Cap. xcvi.*

Hæmorrhoides quandoq; in osculo uteri, quādoq; in collo, & aliquādo in ipso utero, & aliquando, licet raro, in pudendo cōtingunt. Atq; hæc etiā tactu, melius tamen per dioptram depræhēduntur, & eadem accidentia inducūt, quę reliquę in sede ortę inducere solēt. Et præterea sterilitatē, ac lumborū grauitatē tēpore purgationis inducūt. Varicofas itaq; ac malignas dimittere oportet: reliquę uerō non aliter curentur, q̄ quę in sede sunt, duris quidem ac modicū sanguinē fundētib; neq; uasis annexis, statim amputatis. His uerō quę multū sanguinis emittūt, circa fundū circūcirca scarificatis, & uolsella eleuatis, ac funiculo constrictis, & postea paulatim resectis, atq; hoc facto floridū medicamentū siccū inspergatur. At uerō si citra chirurgiam malueris hæmorrhoidas resiccare, ac excæcare, huiusmodi sicca apponito. Spodiū & rosas siccas terito & inspergito. Aut acaciā uino austero tritā. Aut terrā lemniam sigillū appellatā, cū aceto illinito. Aliud. Stibij belfem, rosarū siccarum, pollinis thuris, singul. sextāiē, cytinorū unc. i. Aliud. Balauftiorū torrefactorum sexuncē, malicorij quadrātem, florū rosarū, spodij, singul. drac. ii. Aliud ad hæmorrhoidas efficacius. Succū mandragorę, aluminis rotūdi, acacię, singul. drach. ii. cum uino terito, & in pastillos efformato, eosq; uino dilutos illinito. Aliud. Succū cicutę, succū hyoscyami, aluminis scissi, rubricę sinopicę, singulorū drac. ii. sandicis dra. i. cū uino terito & excipito. Et usus tempore uino item diluito. Aliud. Diaphrygis drac. vi. cerussę, spumę argēti, plumbi usti & loti, succū hypocisthidis, singulorū drac. iiii. Excipe succo cicutę, & cū uino adhibe. Vtere etiā medicamentis ad hæmorrhoidas sedis relatis, & præsertim eo quod Hippocrati inscribitur. Et portiones exhibeto ad sanguinis reiectionē descripras. Infectiones quoq; in decoctis adstringentibus adhibeto.

*De calculo uteri.*

*Cap. xcvi.*

Calculi aliquando rosacei in ipso utero generantur, quos si extrahere uolueris, aluum prius per clysterem stercoris eductoriū euacuato. Deinde sceni greci ac maluę decocto, rosaceo admixto, uterū eluito, & muliere supina disparatis crurib; locata duos longiores sinistrae manus digitos in ani foramē immittito: dextra uerō superiorem uentrem comprimito, calculumq; extrorsum cogito, ac propellito, simul per digitos in anum missos deducens, ac extrahēs. At uerō rosaceam substantiam extra in uteri collo, aut osculo agnatam, muliere rite locata, & locis per dioptram dilatatis, scalpello resiccare oportet, & florido medicamento sicco insperso curare.

*De calculo uesicę muliebri.*

*Cap. xcix.*

In uesicā muliebri raro oriūtur calculi, latiorē enim & rectiorē urinae meatum habent. Atque huius extractionem,



extractionem si forte innatus fuerit, ita facias. Mulier supina coxis decliuis ac cruribus reclinatis locetur, quo facto duos longiores sinistrae manus digitos in pudendum mittito. Dextra uero uescicæ superne cōprimito, & calculū uersus uescicæ collū expellito, & ut extra musculum uescicæ collū adstringentem prodeat cogito, & tunc paululū supra pudendi alas, quo loco calculus occurrit, sectionem facito, & per calcularium forcipem extrahito. postea uero sectionē māna thuris repleto, & lanam purā oleo calido imbutā uentri ac lumbis imposito ac deligato, & quorūdie bis aut ter, & nocte semel exoluito, & oleo calido perfundito, tertia die aridis medicamentis lenibus & incarnantibus usq; ad perfectam incarnationē uulnus explemus, & per emplastrum ex aceto & oleo paratum cicatricem inducimus. Optime autē huiusmodi locos & omne cauū ulcus incarnat hoc. Mannae thuris sextantem, colophoniae minutissime trite unc. i. Ex hoc arido totam uulneris cauitatē expleto.

*De hernia aquosa mulierum, Aspasie. Cap. c.*

Hernia aquosa circa pudendi alas cōsistit, inflationi similis, debili ac molli tumore. Et aliquando alteram tantum, quādoq; utrāq; partem occupat, ad cōtactū fluctuationis apparentiā quandā exhibens: primum itaq; discussoria adhibeantur, suprā ad hernias in uiris aquosas relata, praesertim in uirginibus. At si parū successerit, muliere rite locata sectionē rectā tumori congruā faciemus. Dissecta autē cute, subiectas tunicas paulatim excoiato, & uolsella arreptas distēdito, & membranam humorē continentem dissecato. Excreto humore sectionem membranæ ad myrti folij figuram facito, & labijs sectionis duabus aut tribus futuris adductis, suppurantia medicamenta adhibeto. Vtere & olei irrigatione, ac reliqua curatione, ad aquosas uirorum hernias suprā tradita.

*De hernia inguinis mulierum. Cap. ci.*

Fiunt & mulieribus herniae inguinis, circa dextrū maxime pudendi sinum, prominet his tumor durus immurmurans, ac premens, praecipue ubi mulieres crura dilatauerint, aut supine decubuerint. Et has quoq; cōgruis deligamentis ac medicamentis curare oportet, uelut dictū est in hernia uirorū intestinali ac inguinali. At si haec parū profecerint, ad chirurgiā ueniendū est. Mulier itaq; supina decliuis cruribus locetur, & rupulso intestino locus circa inguen oblique secetur, & tunicę cuti subiectę sensim excoiētur, atq; ita laxata peritonaei mēbranę pars attrahatur ac extēdatur, & intestinū diligēter repellatur, & quod superfluum est de peritoneo deligetur, ac cōsuatur, & tūc quod supra futurā extat superuacuum resecetur. Deinde labia sectionis cutis duabus aut tribus futuris adducatur, & unamēra indatur, lanaq; succida uino & oleo imbuta imponatur, & deligamenta congrua fiant, postea medicamentā suppurantia & repurgantia incarnandi uim habentia. Irrigationes item ac cataplasmata adhibeantur, donec inflammatio quiescat. Et inde ad cicatricem inducentia progressus fiat.

*De hernia uaricosa, Aspasie. Cap. cii.*

Hernia quoq; siue ramex uaricosus in pudendi alis nasci solet, & est uenarū ampliatio, similis uaricibus in cruribus fieri solitis. proinde in huius curatione sectionem rectā in superficie pro uasis figura facias: deinde tunicas uasi adherentes sensim excoiato, & denudatum uas cæca uolsella eleuato, & duobus

uinculis, altero superne, altero inferne deligato. Deinde uenam secato, uelut in uenæ sectione ad sanguinē auferendum fieri solet, & detracto sanguine, mediū uasis inter duo uincula superuacuum amputato. Atq; hoc sanè omnibus uasis in uaricum formam transgressis commune est. Deinde linamentis sectioni inditis, spongiā aceto aut posca imbutā adhibeto. Et deinceps ad puris generationem, ac reliquā uelut ulceris curationem progreditor.

*De nymphæ sectione.*

*Cap. ciii.*

Nympha substantia quaedā est musculosa, aut pelliculosa supra alarū pudēdi cōmissurā sita, quo loco urinaris est meatus. Hec in aliquibus mulieribus ad tāā magnitudinē augetur, ut deformitatē ac pudorē inducat. Quin & à uestimentorū cōtactu assiduo arrigitur, & ad uenerē ac coitū proritat. Quapropter Aegyptijs uisum est, ut antequā exuberet, amputetur: tūc praecipue quā nobiles uirgines sunt elocandae. Amputandi uero modū hunc tradunt. Virgini in sella locatae retro assideat adolescens robustus, qui brachia sua poplitibus uirginis subiiciat, cruraq; eius ac totū corpus regat. Et tū chirurgus ante ipsum stans, forcipe ampliori nymphā corripit, & per sinistrā manū distendat, per dextrā uero prope forcipis dētes resecet. Mēsurā autē resectionis eandē quā in columellae sectione seruare oportet, ut ne funditus ipsam resecemus, sed superuacua tātum pars amputetur: proinde prope dētes forcipis nymphā resecandā esse diximus, quoniā quum pelliculosa sit, plurimū extenditur, & nisi quis diligēter obseruet, facile ultra quā oportet amputationē faciet, atq; hinc carūculae decrementum, rhoada greci uocāt, cōsequitur: peracta chirurgiā, spōgia ex uino adstringēte aut aqua frigida expressa uulnus detergeatur, & manna thuris inspergatur, & linamentū posca madefactū indatur. Et spongia ex posca expressa superdeligetur. Post septimam uero, cadmiā minutissime tritā per se, aut cum rosarum floribus insperge. Aut siccum ex lapide phrygio paratum, & ad pudendorum fissuras descriptū. Aut cinerem ossium palmularum insperge.

*De cauda.*

*Cap. ciiii.*

In quibusdā mulieribus carnosā quaedam substantia ab uteri osculo exoritur, & muliebri pudendum replet. Aliquando etiā extrā progreditur instar caudę, unde etiam nomē habet. Mulier itaq; uelut in nymphæ amputatione dictum est, locetur, & prominens carūcula forcipe extēdatur, & tota ex basi resecetur: post chirurgiā curatio uelut in nymphæ peragatur.

*De thymis, & uerrucis tum alijs, tum formicarijs uteri, Philumeni.*

*Cap. cv.*

Thymus aut in alis pudendi, aut in ipso pudendo, aut in uteri osculo, aut collo generatur. Et est aspera quaedam eminentia thymi cacumini similis, in quibusdam mitis, in alijs maligna, rubra, cruenta, praecipue post concubitum aut deambulationes, & sanè moro maturo assimilatur, uisuq; deprehenditur, aliquādo sine ulla arte, aliquādo dioptra immissa, oblata. Huiusmodi igitur eminentias in principio curabimus, quemadmodum de reliquis thymis ac uerrucis diximus. Verum ubi diutius perseverat, chirurgiā adhibemus. Muliere itaq; recte locata, eminentiam uolsella extentā, totā funditus resecamus, deinde curationem cruentis uulneribus apiam facimus. Thymos autem in abdito reconditos, quum chirurgiæ



subijci non possint, medicamentis curabimus, supra ad torius corporis thymos & uerrucas formicarias relatis. Ad uerrucas autē formicarias pudendorum summē cōfert hoc. Capræ iugulatae recens oculos cōpungito, & humorē inde profluentem assidue illinito, & intra sex dierum spatium formicariae uerrucae extirpabuntur. Sed & bubulū stercus calidum illisum, formicarias in muliebri natura uerrucas sanat.

Aliud, quod ego in uxore mea expertus sum, & ipsas radicitus tollit. Origani festuca ad lucernā accēdito, & formicariae uerrucae admoveo, ut non inde incendatur, sed fumū solū suscipiat. Et hoc ter singulis diebus facito. Aliud, ad pudendi ac sedis thymos. Soleas ueteramentarias, & cucurbitam siccata exurit sigillatim, & minutissime trita paribus portionibus permisceto, & locis uino prius elotis inspergito. Experientia hoc cognitum est. Ceterum malignorū thymorū sectionē, ob eruptionis sanguinis periculū reprobare oportet: nō malignos autē tuto resecamus. Neq̃ em̃ hic sanguinis eruptionis timor est. Cauendum tamē est ne uterus a scalpri acie laedatur, quod facile uitare est, si thymus distentus prope uolfellae dentes amputetur, sicut in nymphae sectione diximus. Resectione uerō facta, ad desiccandos locos pharmacū quoddā sanguinē listēs adhibebimus. Humectatio enim causa est ut thymi regenerentur, sicut etiā pinguiū medicamentorū usus: proinde per totā curationē, laxantia ac pingua sunt fugienda. post chirurgiā protinus galla trita, aut alumen scissum, cū pari thuris pondere admoveantur. Deinde medicamento florido, ex stomomate ferri aut rosarum flore, & cytinis siccis parato utemur. Nā haec contrahunt, & quadatenus repurgant, & ulcera ad cicatricē ducunt.

*De condylomatis, Aspasie.*

Cap. cvi.

Condyloma est rugosa eminētia. Rugae enim circa os uteri existentes, dum inflammantur, attolluntur & indurantur, tumoremq̃ ac crassitudinem quandam in locis efficiunt: praecipue uerō dū menses prodeunt, & post partus attolluntur, & p̃ tactū facile cognoscuntur. Ad has igitur fomēta adstringētia, & eiusdem facultatis pessī subdantur, quae omnia supra ad sedis condylomata sunt relata. facit & pessus ē malicorio & butyro preparatus, & qui ex lycio indico ac oesypo paratur.

*De rimis, ac fissuris uteri.*

Cap. cvii.

Rimae circa os uteri ex uiolentis partibus ob magnitudinē capitis infantis fiunt. Sed & ex acriū humorū influxu locos rūpente ac corrodente fieri solent. Et primum quidē latent, dolore a partu adhuc recente, postea uerō paulatim ad sensum perueniunt. Nā & ad manū contactum, & in coitu dolores exciātur, quādo sanē ex affrictu cruciātur, deprehēduntur aut dilatato sinu, fissurae enim circa uteri osculū per ambitū uisuntur. In harum itaq̃ curatione chirurgiā, & omnia mordacia pharmaca reprobare oportet: talia em̃ inflammationes ac cōuulsiones inducūt, & infestio nibus simplicioribus ac pessīs uti, & medicamentis ad sedis rimas descriptis, praecipue eo quod ē pōpholyge, stibio, & plūbo usto paratur. Quod si callosae fuerint, medicamento ex charta usta utendū est plurimo rosaceo diluto: callos enim ex terit, & ulcera repurgat. Si uerō nimiam eius acrimoniam nō ferunt, iridem illyricam terebinthina exceptam inde: postquam autem cicatrix ulceribus inducta est, cōuenit

id quod ex cadmia constat, aut quoddam sedi destitutum: uelut est quod ex spuma argenti lota praeparatur, paulō ante ad caneros uteri a nobis relatum. Aut hoc quod ad rimas sedis, & muliebrium locorum condylomata praeparatur. Stibij, acaciae, singulorum drach. vi. passo excipe ac utere. Saepē & hoc utimur. Aloēs, opij, singulorum dra. xvi. stibij dra. vi. myrrhē dra. iiii. thuris, aeruginis, singulorum dra. ii. uino excipe & utere cum passo. Aliud cito conferens. Stibij, acaciae, plumbi usti, & loti, singulorum dra. xvi. spodij, pompholygis lotae dra. viii. fructus ericae, aluminis scissi, atramenti sutorij, thuris, myrrhae, opij, singulorum dra. viii. cū uino terito uelut collyrium, ac pastillos formato, & cum passo dilutis utitor. Aliud ad omnes pudendorum muliebriū ac sedis affectiones. Sistit etiā hemorrhoidas. Spumae argēti lotae, cerussae lotae, plūbi usti & loti, singulorum dra. xxv. stibij loti dra. ix. pōpholygis lotae dra. viii. cadmia lotae dra. v. Hec omnia primū seorsim, deinde simul terito, & uini ac olei myrtel singulorum lib. i. paulatim adstillato, ac probe terito, & unita in plumbea pyxide seruato, & uelut optimo medicamento utitor. Nos uerō, inquit Archigenes, ceratyrhenicae lib. i. & adipis anserini tantundem adijcimus. Quidam etiam plumbaginis drac. xx. addunt.

*De tuberculis uteri miliaribus.*

Cap. cviii.

Aliquando in collo aut osculo uteri, aut in ipso pudendo, miliares quaedam eminentiae enascuntur, ad tactum quidem occurrentes, uerum certius ad dioptrā patentes. Solentq̃ ex coitus affrictu, tum menses, iū conceptionem impedire. In his aluus primum purganda est. Deinde linteolo locus detergendus, & glās ex carne caricarum pinguiū ac alumine scisso subdenda. Aut pessus ex alumine & felle. Aut medicamenta ad concoquenda ac discutienda tubercula cōmoda illinenda. Elotiones quoque ex aqua mulsa, & aliquo aromatum decocto adhibeantur.

*De scabris uteri pustulis.*

Cap. cix.

In pudendo & uteri osculo scabrae pustulae oriri solēt, furfuraceas squamas reijcentes, pruritusq̃ inducentes, & calidae aquae affusione gaudentes. In his aluus asinino lacte purgetur. Vomitus a coena fiat. In balneo exudatio fiat, & in calidam infusus. Et loci uino calido cum nitro eluantur, & post uinum aqua calida infundatur. Et licium indicū, aut amurca, aut butyrum cum sulphure, aut ceratum myrticum cum spuma argenti, aut alumen rotundum cum melle, aut malicorium cum myrrha & melle illinatur. Squamas autem & furfures exterit, cyclamini radix cum melle illita. Ceterum in cibus omnia acrida, salsa, & acida cauenda sunt.

*De alarum pudendi muliebris abscessu.*

Cap. cx.

Si in muliebris pudendi alis siue labijs abscessus ortus fuerit, & uersus sedem declinauerit, sectionem eius uitare oportet. Nam ex eorum locorum sectione, quum rugosi sint, facile fistula generatur. Si uerō sursum ad urinarum meatum uergit, tuto secare licet.

*Ad umbilicum prolapsum.*

Cap. cxii.

Ammoniacum thymiana cum modico cumino ex uino tritum apponito ac deligato. Aut bupthalmum cum succo mori tritum imposito. Aliud. Bituminis drachm. xii. carniū caricarum pinguium tantundem, primum seorsim, deinde simul trita imposito.

Ad rugas



*Ad rugas uentris, rimasq; ac nigredines à partu exortas.*

Cap. CXII.

Adiantum & spumam nitri albam exactissime trita inspergito, & uenter nō corrugabitur. Hoc & in balneo, & extra balneum utendum est. Aliud. Narcissi bulbos cortice detracto concidito, & in umbra siccato, & de his sumito dra. viii. radicis struthii confusae, farinae ptisanæ, farinae fabarum, maxime Aegyptiarum, singulorū drac. x. radicis bryoniae, radicis ari, radicis cucumeris syluestris, costi, singulorū trientem, terito & cribrato, ac uentri per erui farinam detergo inspergito, & rursus affricando detergo. Nā & rugas & rimas generari non sinit, & genitas tollit. Maculas etiam ac nigredines in quauis corporis superficie exterit. In puerperis igitur uentrem oleo antea probe confricato, & postea chartam medicamentō cōspersam adhibeto, & fasciā deligato, ac post quartum diem exoluito. Deinde totū corpus in balneo detergo, & omnes nigredines ac rugas abolebis. Aliud, ad uentres à partu nigrefactos. Ostreorum ustorum partem i. farinae fabarum, maxime Aegyptiarum, partes ii. misce ac utere in balneo. Aliud. Nigellae, nitri, æquas portiones ad strigmenticiam spissitudinem cum aqua terito. Aliud. Scille ustae drach. viii. cornu cerui usti, aluminis scissi, fallis cappadocici, myrrhæ factes, nigellae, singulorum drach. ii. farinae ordeī drachm. xiiii. Vtus tempore melle excipito, & panniculo detricto infartum uentri adhibeto, & per dies septem finito. Octaua uerò abluito, ac rursus apponito, & totidem diebus finito.

Smegma faciei ac reliqui corporis. Granorum ricini, bulborū narcissi decorticatōrū ac resiccatorū, sing. drach. viii. similaginis drac. iiii. thuris drac. ii. ouorum albumina ii. misce ac utere. Smegma aliud efficax. Floris iunci odorati, iridis, sing. drac. ii. mastiches dra. i. terito, & ptisanæ succo excipito, ac pastillos formato, quos usus tempore aqua dilutos illi nito, et per interuallū frigida abluito. Aliud smegma ad corporis rugas, Ruffi. Caricarū pinguiū, radicis bryoniae, farinae erui, testarum sepiæ ustarum, singulorū æquales portiones. Terenda terito, & ad caricas in mortario confusas ammisceto. Hoc in balneo utendum est. Aliud. Vitem albam farinae erui ammisceto ac utitor. Smegma, ad defricandas nigredines multo usu cognitum. thuris sesquiunciā, cerussae lotae, spumae argenti lotae, amyli, scobis marmoris praeconesii, mastiches, spumae nitri albæ, testarū sepiæ, sing. unc. i. saponis gallici unc. xii. ouorum albumina x. omnia sapone excipe, & utere in quacūq; corporis parte. Smegma admirandum. Cutis superficiei exterit & illustrat. Farinae foeni greci, amyli, tragacanthæ, singulorum trientē, terrae samiae quæ Stella uocatur, ammoniaci thymiamatis, singulorū quadrātem, mastiches, medullae ceruinæ recentis, singulorū trientem. Tragacantham lacte macerato, & reliqua minutissimè trita ammisceto, ac pastillos formato, eosq; in umbra exiccato. Vtere etiam smegmatis Sermone octauo relatis, ubi habetur etiā ea quæ ad alarum ac oris foxtorem conferunt.

*Preparationes unguentorum siccorum, moschatorum. Item conditorum, ænanthariorum, ac suffumigiorum uariorum.*

Cap. CXIII.

Xeromyrum, hoc est, unguentū siccum, Beredrias appellatum. Arnabo, amomi, spicæ nardi, singulorum

quadrātem, folij malabathri, styracis, singulorum quadrātem, croci, caryophyllorum, singulorum sesquiunciā, opobalsami sexuncem, rosarum uiridum unc. xxv. misce. Xeromyrum moschatum. Folij malabathri, casiae, croci, styracis, arnabonis, amomi, spicæ nardi, singulorum sesquiunciā, caryophyllorum drachm. iiii. moschi scrup. iiii. opobalsami unc. i. olei indici aut similis quadrātem, rosarum siccarum sextātem, aut uiridium trientem. Compositio Arabica. Masuaphij, caryophyllorum, costi, singulorum sextātem, spicæ, folij, rosarum, sing. scrup. xii. amomi, styracis, singu. unc. i. gummi sextātem. arida terito ac cribrato, gummi uerò madefacito, & ad styracē in mortario tritum arida ammisceto, & cū gummi pilulas rotundas ad ciceris modū magnitudinem formato, easq; acu perforato, ac filum trañcito, & arefactas de collo suspēdendas præbeto. Xeromyron rosatum. Rosarum aridarum libr. i. costi, folij, caryophyllorum, hypni, cassami odorati, unguis aromaticorum, styracis, singulorum sextātem. Aliud. Folij, rosarum siccarum, amomi, costi, caryophyllorum, spicæ nardi, arnabo, croci, singulorum unc. i. hypni, styracis, opobalsami, singul. drachm. iiii. Aliud. Rosarum libras tres, hypni lib. i. styracis flauī & pinguis, unguis aromaticorum, singulorum unciam i. Xeromyron leucophyllon appellatum. Cuius usus ad collum & axillas est. Terræ samiae librā i. styracis, folij, opobalsami, singulorum sextātem. Styracem cum opobalsamo subigito, folium uerò terito ac cribrato. Et ad omnia simul in mortario probe permixta, succi rosarum quantum satis est adñcito ac utitor. Hygromyron, hoc est, liquidum unguentum, quo mulieres ad aures utuntur, folij, spicæ nardi, masuaphij, mastiches, caryophyllorū, singulorū unc. i. seru. xii. styracis pinguis, opobalsami, singulorū sextātem, croci scrup. vi. moschi scrup. i. olei salca electi trientem.

*Olei salca preparatio preciosa.* Cap. CXIII.

Olei omphacini sextar. xx. iridis illyrice lib. i. amomi sexuncem, aspalathi, hypni, sing. lib. i. cassami aromatici lib. ii. caryophyllorū, folij, carpobalsami, singulorum lib. i. xylocassiae quincuncem, casiae trientem, costi, styracis pinguis, croci, sing. unc. i. myrrhæ, arnabo, singulorum quadrātem, spicæ nardi trientē, omnia in aqua coquito. Modus autem præparandi habetur Sermone primo, ubi etiam aliam olei salca descriptionē, & unguētī nardini præparationē habes.

Hygromyri præparatio. Olei salca lib. ii. opobalsami lib. i. spicæ nardi, folij, singulorum trientem, carpobalsami, arnabo, amomi, ambræ, ligni aloës, singulo. sextātem, mastiches, moschi, sing. scrup. vi. quod si caphuræ copia fuerit, sextātem ex ea addito. Hoc ad axillas utitur, & in aures cum auriculario specillo indunt. Leucophylli siue xeromyri albi præparatio. Lapidis specularis lib. i. folij, spicæ nardi, caryophyllorum, singulorum scrup. vi. succini scrup. xii. moschi siliquas vi.

*Olei siue unguenti foliati, ac spicati præparatio.*

Cap. CXV.

Opobalsami lib. i. styracis, amomi, singulorū quadrātem, casiae trientē, lilia xx. simul terito ac utitor, & si crassius fuerit, cum oleo salca diluito. Alia foliati descriptio. Cerae lib. i. nardini olei cyziceni libr. iiii. picis brutiæ quincuncem, ladanī unc. i. styracis pinguis



pinguis quadrantem, costi, casiae, singulorum sextan-  
tem, cardamomi, folij, sing. unc. i. spicae nardi semun-  
ciam, croci, uini Aminaei, singul. unc. i. opobalsami  
quadrantem. Foliatum praeparatio ex Oribasio. Casie  
sexuncem, folij quadrantem, amomi, ladani, singul.  
unc. i. piperis grana quadraginta, myrrhae troglody-  
ticae unc. i. ungenti nardini libr. i. Arida terito, & te-  
nuissimo cribro excutito. Deinde nardinum addi-  
to, ac rursus probe terito, & ut nigrius reddatur me-  
dicamentum, iuglandium cortices ustos ac tritos am-  
misceto, & opobalsami cochlearia III. instillato, ac  
utitor. Facit etiam eximie ad resolutiones Spicati  
praeparatio. Amomi sextantem, myrrhae troglodyti-  
cae, costi, sing. unc. i. folij, casie, ungenti, foliatum aut sal-  
ca, singulorum quadrantem, spicae nardi unc. i. spice  
celticae trientem, ungenti nardini sexuncem, ceræ albæ  
quantum satis est, & ut compages liquidior fiat, opo-  
balsami quadrantem addito.

*Oenanthariorum preparationes. Cap. cxvi.*

Costi sextantem, casiae, carpobalsami, spice nardi, sing.  
unc. i. amomi quincuncem, nardi celticae trientem,  
ungenti spicati & foliatum, aut salca, singulorum qua-  
drantem. Ceræ albæ quantum satis est, & ut compages  
liquidior euadat, opobalsami quadrantem ammisce-  
to. Alia oenantharii descriptio. Costi sextantem,  
casiae, carpobalsami, masuaphij, myrrhae, sing. unc. .  
amomi quincuncem, spicae nardi, styracis, singulo-  
rum trientem, caryophyllorum sesquiunciam, opo-  
balsami sexuncem, lilia x l. uini adstringentis odora-  
ti sextar. xii. salis cappadocici sextantem. Folia lilio-  
rum croceo ipsorum ac unguibus demptis probe de-  
tergito, & in sindone pura inuoluta per diem ac no-  
ctem in umbra siccato, donec marcescant, deinde ad  
myrrhā in mortario cū uino subactā arida trita am-  
misceto, & pariter cum uino subigito. Et his postea  
styracē in minutissimas partes contusum addito, &  
omnia opobalsamo affuso unito. deinde lilia quoque  
ammisceto, & omnia in uitreū uas trāsfulsa cōcutito,  
& uino postea in idē uas infuso rursus cōcutito, &  
uas ipsū moscho aut hypno diligēter obturato, deli-  
gato, luto oblitato, & p dies quadraginta insolato.

*Absinthati siue rodabsinthati praeparatio sa-  
lubris.*

*Cap. cxvii.*

Spicae nardi scrupu. ii. folij, amomi, singulorū scrupu.  
i. mastiches scrupulos III. rosarum siccarum scrupu.  
vi. mellis sextarium i. uini sextar. IIII. aut ut alij ha-  
bent, quinque. Quidam pro amomo costum adij-  
ciunt. Aliud. Rosarum resectis unguibus, & in  
sindone per diem ac noctem resiccatarum libr. i.  
mellis optimi sextarium i. uini antiqui sextarios  
vi. Rosas in uino ad dies quindecim macerato, &  
quotidie uas ipsum ad solem exponito. Deinde ui-  
no excolato, spicae nardi scrupul. ii. & folij aut casiae  
scrup. i. ammisceto. Sint autem haec prius cum uino  
trita. Postea uerò mel adijcito, unito, ac utitor.  
Aliud rosatum. Rosarum exemptis unguibus in  
umbra siccatarum libr. i. uini antiqui ac splendidī  
sextar. v. mellis sextar. i. Rosas in uino per diem ac  
noctem macerato. deinde ad uinum excolato mel  
adijcito, & post triduum exhibeto. Quidam masti-  
ches scrupul. vi. addunt, & ita aluum mollit.

*Conditi purgatorii praeparatio. Cap. cxviii.*

Hoc cōdito ad pituitosos hyemis tēpore uteris. Mellis  
sextariū unū, uini sextarios v. piperis grana x lvi.

styracis calamitæ scrupul. III. Styracem ad prunas  
cum modico melle diluito, deinde in mortario cum  
pipere probe terito, & mel paulatim adstillato, ac  
postea uinum ammisceto. Eius uerò meminisse ope-  
rae precium est, quod mel nisi ualde purum fuerit,  
non permittit ut portio ex ipso praeparata desideat, ac  
pura & clara fiat. Proinde despumandum est mel, ac  
pulum faciendum: si enim despumatum fuerit, po-  
tio eadem die desidebit ac pura euadet. Alia absin-  
thati praeparatio. Spicae nardi scrupulos v. croci si-  
liquas III. absinthij drachm. i. mastiches scrupul. vii.  
mellis sextarios IIII. uini sextar. xxi. Alia con-  
diti praeparatio. Piperis scrupulos vi. spicae nardi  
scrupul. i. croci si libuerit, siliquam i. uini sextar. v.  
mellis sextarium unum. Mastichati ac cuminati  
praeparatio. Cumini scrup. xii. mastiches sesqui-  
unciam, uini sextar. v. mellis sextarium unum. Ani-  
sati praeparatio. Anisi scrupul. viii. spicae nardi  
scrupul. vii. uini sextar. v. mellis sextarium i. Citra-  
ti praeparatio. Corticis citri electi, uel foliorum  
eiusdem bessem, uini sextarios viii. mellis sextar. i.  
corticem aut folia in uino per dies septem macerato,  
deinde uino excolato mel ammisceto. Apicati prae-  
paratio. Seminis apij scrupul. xii. seminis rutæ scru-  
pul. vi. mellis sextar. i. uini sextar. IIII. aut v. pro ab-  
stemijs uini loco, aquam accipito.

*Rhodomeli praeparatio.*

*Cap. cxix.*

Succi malorum cotoneorum, dempto cortice & gra-  
nis siue medulla, expressi sextar. ii. succi rosarum  
sextar. i. aquae ad tertias decoctæ sextar. IIII. mellis  
sesquiseptarium. Succum malorum suo tempore ex-  
primio ac excolato, eiūq; mel ammisceto, & ad rosa-  
rum tempus seruato. In uere autem cum aqua ad ter-  
tias decocta, & rosarum succo, asseruatum cum mel-  
le, malorum succum unito, ac utitor.

*Mustati praeparatio.*

*Cap. cxx.*

Similaginis sextar. xvi. olei omphacini sextar. v. pipe-  
ris quincuncem, folij malabathri, caryophyllorum,  
sing. unc. i. musti dulcissimi sextar. III. mellis lib. II.  
ex his omnibus uelut placentulæ paruae efformantur.

*Gari praeparatio pro abstemijs.*

*Cap. cxxi.*

Aquae sextar. xxxi. salis sextar. ii. cicerum nigrorum  
siccorum sextar. IIII. amanitarum libr. ii. caricas  
quingenta, praeparato, excolato, ac seruato.

*Suffumigij moschati praeparatio.*

*Cap. cxxii.*

Rosarum uiridiū lib. vi. mellis Attici excolati lib. III.  
& quadrantem, folij sexuncem, amomi trientem, ca-  
ryophyllorum sextantem, spicae nardi trientem, co-  
sti bessem, unguium aromaticorum unc. i. carpobal-  
sami trientem, asari sextantem, aloës unc. i. calami  
indici sexuncem, nuces indicas tres, sandalorū scrupu-  
los xvi. ambræ unc. i. styracis pinguis libr. III. qui-  
dam pro styrace, ladani pinguis, & stactes myrrhae  
sing. lib. i. aut ut alij habet, dextrantē accipiunt. croci  
unc. i. mastiches quadrantem, moschi scrup. IIII. Ad ari-  
da trita ac cribrata, ladanum, styracem, stactem, myr-  
ram, & mel in mortario ammisceto, deinde ambrā  
liquefactam adijcito. Postea moschum aqua calida  
dissoluito, & partem eius addito, & partē ad pastil-  
lorū efformationē seruato, deinde manibus omnia  
probe subigito, ac cum moscho efformato. Suffu-  
migium regium. Styracis calamitæ lib. i. ligni aloës  
sexuncem, ambræ unc. i. moschi scrup. IIII. quidā ita prae-  
parant, styracis calamitæ libr. i. ligni aloës trientem,  
ambræ,



ambrae unc. i. moschi scrupul. iiii. & addunt succi rosarum quantum satis est. Suffumigium moschatum, Theopompi. Styracis pinguis dextantem, caryophyllorum, costi, rosarum siccarum, folij, mastiches, singul. unc. i. moschi siliquas quatuor. Ego uero inquit, moschi scrupulos iiii. & balsami quantum satis est adijcio.

Aliud suffumigium moschatum. Folij, costi, rosarum siccarum, hypni, spicae nardi, singul. unc. i. croci, unguium aromaticorum, caryophyllorum, amomi, casiae, singul. scrup. xii. carpobalsami, bdellij, singul. scrup. xii. styracis scrupulos xx. moschi scrupulos iiii. Rhodomelitis, hoc est, mellis rosacei quantum satis est. Suffumigium Moschatum in ecclesia usurpatum. Costi libras iiii. & dimidiam, caryophyllorum lib. ix. folij sesquilibram, spicae nardi tantundem, cassami unc. xiiii. styracis liquididi lib. xvi. aspri lib. iiii. croci dextantem, moschi, ambrae, singulorum sextantem. Caeterum princeps Orientis sic praeparat. Costi quadrantem, spicae nardi unc. i. folij unc. i. caryophyllorum sesquiunciam, cassami semunciam, aspri sextantem, styracis liquididi electi quincuncem, croci scrup. ii. moschi, ambrae, singul. scrup. ii. Suffumigium bonum rosatum. Foliorum rosarum aridorum, costi, mastiches, singulorum sexuncem, spicae nardi, amomi, opobalsami, singulorum sesquiunciam, croci, myrrhae, singul. unciam i. styracis dextantem. Vini odorati antiqui, & mellis, quantum satis est. Suffumigij ungentarij praeparatio. Costi sesquilibram, elenij, rosarum siccarum, nigellae, singulorum lib. i. carpobalsami, aspalathi, singulorum lib. ii. myrrhae sesquilibram, tari, hoc est, ligni aloes, ladanij, singulorum lib. iiii. amomi lib. i. mastiches bessem, ligni caryophyllorum sexuncem, foliorum scylmatis, hypni, singulorum lib. xii. myrrhae stactes libras v. bdellij libras ii. unguium aromaticorum, croci, singulorum trientem. Suffumigium ungentarium insigne. Costi sesquilibram, cassami lib. i. ligni caryophyllorum, foliorum scylmatis, spicae nardi, singulorum sexuncem, corticis aspalathi, rosa-

rum siccarum, singulorum quadrantem, mastiches chiae, bdellij, singulorum sextantem, ladanij lib. iiii. stactes nigrae lib. vi. croci scrupulos vi. ego uero inquit, pro stacte nigra, albae lib. ii. & styracis libras iiii. ammisceo. Suffumigium ualde amabile. Costi unc. xix. caryophyllorum trientem, ladanij lib. i. spicae nardi, folij, singulorum sexuncem, styracis lib. iiii. aspri unc. xvi. croci sexuncem, moschi bessem, mellis quincuncem. Suffumigium dominae Romulae. Styracis calamitae lib. ii. costi, stactes albae, singulorum sexuncem, caryophyllorum, tari, singulorum sextantem, spicae nardi sextantem & semunciam, croci trientem, ambrae drachm. iiii. succini unciam unam, moschi scrupul. iiii. uel quantum accipere uolueris. Suffumigium rosatum, Embularchi. Casiae, myrrhae, bdellij, arnabo, calami indici, succini, carpobalsami, ladanij pinguis, hypni, folij, singulorum quadrantem, caryophyllorum, unguium aromaticorum magnorum, mastiches, singulorum trientem, croci sextantem, spicae nardi, opobalsami, singulorum sexuncem, rosarum siccarum, styracis, singul. lib. i. rosarum uiridium lib. ii. uini odorati ueteris, & mellis Attici, singulorum quantum satis est. Suffumigium Pamphili Episcopi. Folij, caryophyllorum, hypni, ladanij pinguis, singulorum sextantem & semunciam, calami indici, spicae nardi, unguium aromaticorum magnorum, bdellij, carpobalsami, croci, casiae, singulorum quadrantem, amomi, mastiches, singulorum quincuncem, costi sesquiunciam, arnabo tantundem, succini unciam unam, opobalsami quadrantem, styracis pinguis lib. iiii. rosarum uiridium resectis unguibus lib. vi. uini mulsi quantum satis est. Sit autem mel electum, & uinum antiquum odoratum, ex quibus uinum mulsum parari debet.

Myrrhatio ad cadaueris conseruationem.

Cap. cxxiii.

Aloes, myrrhae, gummi, singulo lib. i. sarcocollae lib. ii. acaciae sesquilibram, thuris sexuncem, opobalsami quadrantem.

DECIMISEXTI AC VLTIMI SERMONIS AETII  
FINIS, IANO CORNARIO MEDICO  
PHYSICO INTERPRETE.

PONDERA IN AETIO VSVRPATA.

|                       |       |              |
|-----------------------|-------|--------------|
| Libra                 | habet | uncias xii.  |
| Deunx                 |       | unc. xi.     |
| Dextans               |       | unc. x.      |
| Dodrans               |       | unc. ix.     |
| Bes                   |       | unc. viii.   |
| Septunx               |       | unc. vii.    |
| Sexunx                |       | unc. vi.     |
| Quincunx              |       | unc. v.      |
| Triens                |       | unc. iiii.   |
| Quadrans              |       | unc. iiii.   |
| Sextans               |       | unc. ii.     |
| Vncia                 |       | drach. viii. |
| Semuncia uel semissis |       | drach. iiii. |

Reliqua pondera ac mensurae iuxta Pauli traditionem usurpata sunt.

DE PON



# DE PONDERIBVS AC MEN- SVRIS, EX PAVLO AEGINETA,

IANO CORNARIO Medico Physico  
Interprete.



**P**ONDV S, grauitatis mensu iudicatur. Mensura autem, uasculi capacitate. Vasculum uerò, tum aridæ, tum liquidæ quantitatis mensura existit. Quare tres omnino dimensæ quantitatis sunt differentiæ; una quidē ponderis; altera uerò rerum aridarum, utpote quæ uelut in aggerem accumulatur; tertia autem liquidorum. Cæterum quum penè infinita pondera ac mensuræ, tum pro locorum, tum pro eorum qui eis utuntur consuetudine, existant; de his saltem quæ omnibus maximè familiaria sunt, nobis sermo erit.

*De ponderum ac mensurarum notis.*

**V**ERVM quum quidam non integris literis, sed per notas hæc ipsa pondera ac mensuras significant, prestitit fortassis & nos in hac parte ueteres imitari, atque primum characteres ipsos declarare. Primum igitur litera  $\chi$  ubi  $\alpha$  literam habuerit incumbentem, Chalcum, id est, Aereum, significat: hoc modo,  $\chi$ . Si uerò, ipsi  $\chi$  incubuerit, Choa, id est, Congium, demonstrat: sic  $\chi$ . Si  $\alpha$  Chœnicem,  $\chi$ . Si  $\alpha$  Chemam  $\chi$ . K uerò litera, si incumbens habeat, & linea recta inferiorem ipsius apicem per obliquum secet, Ceratium, id est, Siliquam, significat: hoc modo  $\kappa$ . Quod si  $\nu$  ipsi  $\kappa$  incumbat, Cyathū significat, sic  $\nu\kappa$ . Si uerò  $\sigma$ , Cortalā, id est, Hemīnam,  $\sigma\kappa$ . Porro linea circumflexa, quam nihil aliud circumstat, & quæ omnino per obliquum ponitur, Obolum denotat,  $\omega$ . Si uero duæ sunt lineæ, quas nihil circumstat, duos obolos signant,  $\omega\omega$ . Qui Gramma, hoc est, scrupulū, faciunt, quod per literam  $\gamma$  quæ  $\rho$  adiectum habet denotatur, recta amplius linea ipsum  $\gamma$  secante, hoc modo  $\gamma\rho$ . Duæ autem lineæ iuxta alteram extremitatem confertæ, angulumq; cōstituentes, ad similitudinem duorum apicum, qui in ipsius K literæ pictura, ad rectam lineam adscribuntur, Drachmam significant, quæ & Holca cognominatur: hoc modo  $\lambda$ . Propriè autem Holca per  $\lambda$  literam notatur,  $\lambda$ . Altera medium eius occupante: hoc modo  $\lambda$ . Quod si, litera ad  $\lambda$  apponatur, libra significatur,  $\lambda$ . Aliqui tamē lum suum  $\rho$  literam habens, Vnciam significat,  $\rho$ . M autem iuxta medium ipsius  $\nu$  habens, Minam denotat,  $\nu$ . Si uerò  $\nu$  habeat, Mystrum,  $\nu$ . Si  $\nu$  Medimnum,  $\nu$ . Si  $\nu$  Modium,  $\nu$ . Porro  $\tau$  literam  $\rho$  complectens, &  $\nu$  incumbens habens, Trybliū significat,  $\tau\nu$ .  $\tau$  autē supra se habens, Xesten, id est, Sextarium, designat,  $\tau$ . Si uerò  $\tau$  habeat superscriptum. Oxybaphum, id est, Acetabulum,  $\tau$ . Aliqui tamen Xesten per  $\xi$  denotant, recta linea dissectum, hoc modo,  $\xi$ . H autem incumbens  $\mu$  habens, Hemīnam indicat,  $\mu$ . K uero cum  $\rho$  connexum in cumbente ipsi litera  $\mu$ , Ceramium signat,  $\mu\rho$ .

## DE PONDERIBVS.

M N A Attica & Aegyptia habet Vncias xvi

Mna Romana Vncias xx

Libra Vncias xii

Vncia Drachmas viii

Drachma Scrupulos iii

Scrupulus Obolos ii

Obolus Siliquas iii

Siliqua Aereos ii

duasq; tertij partes: ita ut obolus aereos octo complectatur.

## DE MENSVRIS LIQVIDORVM.

ITALICVM Ceramium habet Choas viii

Chus siue Congius Sextarios vi

Sextarius Cotulas ii. quæ & Tryblia appellantur.

Cotula autem siue Tryblium, Magna Mystra iii. Acetabula uero iii

Magnum enim mystrum continet Acetabulum i. & Drachmas vi

Acetabulum uerò Sesquicyathum habet.

Cyathus Chemas paruas, aut Mystra parua ii habet.

Quod si uelis liquidorum iuxta pondus scire dimensionem; multæ enim rerum liquidarum differentiæ iuxta lancis momentum existunt; id ipsum ex olei, uini, & mellis exemplo docebimus. Mel igitur uino grauius est quarta ampliusq; decima parte, quod ferè totum tertiam eius partem facit: habet enim eadem mellis ad uinū mensura totum uini pondus, accedente insuper tertia eius ponderis parte. Ad oleum autem mel dimensum, dimidia eius parte ponderosius existit: habet enim totum olei pondus, atq; insuper dimidiam eius ponderis partem. Vinum uerò nona parte oleum excedit: habet enim pondus ipsius totum, ampliusq; nonā eius ponderis partē. Quæ res ut magis euidens & manifesta fiat, omnium mēsurarum pondus sigillatim subiecimus, uelut in tabella depictum: ita ut manifestè constet, quod per pondera quæ singulis mensuris subiecta sunt, Oleum, Vinum



Vinum, & Mel, ex ordine demonstrantur.

Ceramium Italicum habet.

Vini

Mellis

Olei  
libras LXXII

libras LXXX

libras CVIII

Chus siue Congius habet

libras IX

libras X

libras XIII & dimidiam

Sextarius habet

uncias XXVII

uncias XX

uncias XXVII

Cotula siue Hemina habet

uncias IX

uncias X

uncias XIII & dimidiam

Magnum mystrum habet

uncias III

uncias III scrupulos VIII

uncias III & dimidiam

Acetabulum habet

drachmas XXVIII

uncias II scrupulos XII

uncias III scrupulos IX

Cyathus habet

drachmas XII

sesquunciam scrupulos IIII

uncias II drachmas II

Paruum mystrum habet

drachmas VI

scrupulos XX

drachmas IX

Oribasius autem iuxta Adamantium, Sextarium Italicum vini quidem iuxta mensuram Vncias uiginti quatuor habere ait: iuxta pondus uero Libram unam, Vncias octo. Sextarium autem mellis Librarum duarum & dimidia pondus habere tradit.

#### DE MENSVRIS ARIDORVM.

AEgyptia Artaba continet Modios III

Modius Aegyptius & Italicus habet Choenices VIII

Choenix, Sextarios II

Sextarius habet Semisextarios II. qui & heminae appellantur.

Hemina autem habet Cyathos VIII

Atticus Medimnus continet Hemiecta XII

Hemiectum autem seu Semodius, Choenices IIII. quo fit ut Medimnus habeat Modios VI. choenices XLVIII. sextarios XCVI.

Ceterum pondus harum mensurarum non facile est proferre, quod immensa diuersitas rerum aridarum iuxta lancis inclinationem existat.

#### FINIS EORVM QVAE PAVLVS AEGINETA

de ponderibus & mensuris tradidit, interprete IANO

CORNARIO Medico Physico.



# QVATVOR AETII TETRABLI

BLON, IDEST SERMONVM XVI. INDEX,  
in quo præter cætera ad Medicinam spectantia, Simpli-  
cium nomenclaturæ tam Græcè quàm Latine in-  
dicantur, iuxta Alphabeti ordinem.

|                                     |               |                                      |               |                                      |               |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>A</b>                            |               | Adamantis efficacia                  | 338           | Alimentorum ratio                    | 6             |
| Abacti infantes tempus              | 203           | Adarces cuius facultatis             | 85            | Alimentorum quæ sint facultates      | 125. usq; 136 |
| & quæ post                          |               | Adianti facultas                     | 10            | Alisma quali uirtute                 | 20            |
| Ablactationem uictus ratio sit ha-  |               | Adeps uulpinus qualis                | 171           | Allij propria conditio quæ           | 164           |
| benda                               | ibidem        | Adipis uirtus medica                 | 107. 108      | Aloë quæ præstantior                 | 117           |
| Abortiētes bimestres aut trimestres |               | Adipis animalium conditio            | 107           | Aloës qualitas                       | 11. 857       |
| foetus quomodo medendæ              | 965           | Adstrictionis actio                  | 3             | Aloës uis medicamentaria             | 149           |
| Abortum futurum signa præceden-     |               | Adstringentium medicamentorum        |               | Aloëdaria Oribasij                   | 259           |
| tia                                 | 964           | qualitas                             | 2             | Aloëdarium purgantium uariæ          |               |
| Abrotoni facultas, & abrotoni usti  | 9             | Adstringentia simplicia quæ          | 125           | compositiones                        | 161. 162      |
| Abcessuum signa iudicatoria         | 241           | Aeger seruandus quatuor morbi tem-   |               | Alopecia qualis affectio, undequæ    |               |
| Abcessus intestinorum ortus & re-   |               | pora superat                         | 231           | generetur, & eius cura               | 334. 335      |
| media                               | 598           | Aegris incurabilibus neque occasio   |               | Alphos quid & unde dictus, eiusq;    |               |
| Abcessus palpebrarum cura           | 403           | ne neque auxilia comodare            | 255           | cura 825. & quomodo differat         |               |
| Abcessuum sedis medicinæ            | 843           | Aegrotantes quomodo doleant, nul-    |               | lepra                                | 830           |
| Abcessuum generalis curatio         | 863           | lo forinsecus accedente quod do-     |               | Alfines facultas                     | 12            |
| Abinthium quale                     | 16            | lorem ipsis inducat                  | 273           | Altheæ qualitas                      | 21            |
| Abinthium quod præstantius          | 118           | Aegilopis uirtus                     | 10            | Alui animalium qualitas              | 103           |
| Abinthiorum uariarum descri-        |               | Aegilops quid, eiusq; cura           | 405.          | Alui adstrictionis remedia           | 545. 548.     |
| ptio                                | 155           | 406. 407                             |               |                                      |               |
| Abinthiorum oleorum præpara-        |               | Aegiros quibus uiribus               | 10            | Alui fluxione laborantis remedia     |               |
| tio                                 | 1027          | Aegyptiacæ terræ usus                | 76            |                                      | 584           |
| Acacia unde fiat                    | 10            | Aegyptium Andromachi empla-          |               | Aluminis species & efficaciæ         | 89            |
| Acaciæ facultas                     | 10            | strum                                | 923           | Aluminosa balnea quibus conue-       |               |
| Acacia quæ optima                   | 117           | Aegyptium pharmacum ad omnes         |               | niant                                | 186           |
| Acalyphes uirtus                    | 10            | aurium dolores                       | 350           | Alysson quibus uiribus               | 12. 150       |
| Acanthæ Aegyptiæ proprium           | 11            | Aequinoctium uernū quando            | 181           | Alyssus cur dicta syderitis heraclea |               |
| Acanthæ leuces uis                  | 11            | Aequinoctium autumnale quando        |               |                                      | 317           |
| Acanthi uirtus                      | 11            | 182                                  |               | Amaracinum oleum                     | 27            |
| Accipitrum quale fel                | 98            | Aeræ facultas                        | 10            | Amaranti uires                       | 12            |
| Acerbitas sincera ubi               | 3             | Aeris flos qualis                    | 90            | Amarorum natura                      | 7             |
| Acerbus sapor qualis                | 1. 2. 3. 4. 5 | Aeris qualitatis notio & differen-   |               | Amarus sapor qui                     | 3. 7          |
| Acerborum & dulcium natura          | 5             | tia & deinceps                       | 179           | Amazonum pastillus                   | 542           |
| Aceti facultas                      | 4. 5. 56. 135 | Aeris squamæ efficacia               | 87            | Ambigua morbi quomodo inuesti-       |               |
| Acetum ab uuæ immaturæ succo        |               | Aeris usti qualitas                  | 90. 854       | ganda                                | 234           |
| quo differat                        | 5             | Aeruginis æris qualitas              | 855           | Ambrosiæ qualitas                    | 12            |
| Aceti multi præparatio              | 211. 290      | Aeruginis rasæ usus                  | 87            | Ambustorum ab igne medelæ            | 895.          |
| Acetum mulsum qualis facultatis     |               | Aeruginis uermiculatæ facultas. ibi- |               |                                      | 79. 85. 100.  |
| 126. 132                            |               | dem                                  |               | Amomi facultas                       | 13            |
| Acetorum mulsum purgatorio-         |               | Aetitis lapidis energia              | 84            | Amomi electio                        | 117           |
| rum uariæ cōpositiones              | 156. 49       | Aetius prestigiatoris opinionem ne   |               | Ammium seu Ammi                      | 12            |
| Aceti purgatorii descriptio         | 156           | incurreret fugit                     | 91            | Ammodites quale animal, & qualis     |               |
| Acharista collyria                  | 423           | Aethyopas à natiuitate frontem cir-  |               | eius morsus                          | 773           |
| Acharistos antidotus                | 806           | cumcidere, ne oculorum fluxio-       |               | Ammoniæ qualitas                     | 13. 857       |
| Achores infantium quomodo cu-       |               | ne infestentur                       | 409           | Ammoniacum quod melius               | 117           |
| rentur                              | 202           | Affectiois principium & genera-      |               | Ampelitis terræ qualitas             | 79            |
| Achorum descriptio & curatio        | 343.          | tionem posse esse ex diuersis par-   |               | Ampelos leuce qua facultate sit præ- |               |
| 344. 345                            |               | tibus                                | 301           | dita                                 | 12            |
| Achoribus quæ cicatricem indu-      |               | Agarici proprietates                 | 152           | Ampeloprasij uirtus                  | 12            |
| cant                                | 345           | Agaricum quod præstantius            | 117           | Amphæmerina febris quæ, & cur sic    |               |
| Achrades quali uirtute              | 14            | Agerati lapidis efficacia            | 82            | dicta                                | 261           |
| Acidus sapor qualis                 | 2. 3          | Ageraton cuius facultatis            | 10            | Amphisbæna quale animalculū, &       |               |
| Acnæ, id est, faciei uari, quomodo  |               | Aglaidæ liquidum collyrium.          | 416           | quod à scythala chalcidica differat, |               |
| sanandæ                             | 449           | Agninæ carnis qualitas               | 102           | eiusq; noxa & cura                   | 775           |
| Aconiti energia                     | 11. 784       | Agnini pulmonis uis medica           | 108           | Amurcæ facultas                      | 12            |
| Aconitum, iris syluestris           | 340           | Agnos seu uitex                      | 9             | Amyli temperamentum                  | 61            |
| Acopa quæ dicantur                  | 170           | Agrostis qualibus uiribus            | 9             | Amylum cur dictum                    | ibidem        |
| Acopa podagrica diuersa             | 742. &        | Aizoi uires quæ                      | 10            | Amyli qualitas                       | 120           |
| inde                                |               | Alabandicus lapis qualis             | 84            | Amygdalorum uires                    | 12            |
| Acori facultas                      | 11            | Alabandici lapidis uis               | 338           | Amygdalinum oleum                    | 23            |
| Acris sapor qui                     | 2. 7          | Albi collyrij compositio & præstan-  |               | Anagallidis utriusq; qualitas        | 13            |
| Acrium saporum natura               | 7             | tia                                  | 424           | Anchusæ specierum facultas           | 9             |
| Acrochordon quid, & unde ei no-     |               | Albuginibus puerorum quæ cura        |               | Ancyloglossorum remedia              | 470. eo       |
| men inditum, eiusque curatio        |               | conueniat                            | 200           | rumq; affectio duplex                | ibidem        |
| 837. 838                            |               | Albuginum oculorum remedia ua-       |               | Ancylois quid, & cura eius           | 397           |
| Acron Agrigentinus quomodo aë-      |               | ria                                  | 383. 384. 385 | Andrachnes facultas                  | 13            |
| rem transmutauerit pestis tem-      |               | Albuginum tincturæ                   | 385           | Andromachi compositio ad dentes      |               |
| pore                                | 269           | Alcibiadium, aliàs onochilos         | 9             | molaes, quæ eadem hora dolo-         |               |
| Acæ qualibus uiribus                | 11            | Alcyoniorum species & uires          | 85            | res sedat                            | 467           |
| Acutorum morborū terminus deci-     |               | Alenum oleum quod                    | 398           | Androsæmon qua uirtute               | 16            |
| ma quarta dies                      | 233           | Alexandrinæ terræ usus               | 77            | Anemones qualitas                    | 13            |
| Acutorum morborum prædictiones      |               | Algæ conditio qualis                 | 70            | Anethi facultas                      | 13            |
| non esse tutas                      | 243           | Alicæ qualitas                       | 127           | Anethinum                            |               |



# AETII INDEX.

Anethinum oleum 25  
 Aneurysma quid 147.915  
 Aneurysma quō fiat & curetur 915  
 Aneurysmatis quæ sint indicia ibi.  
 Anginæ species & causæ, remediaq;  
 483.484.485.486  
 Anginæ medicinæ 87.99.101.117.  
 144.173.416  
 Anhelosis medentia 80 108.164.  
 173.501  
 Ani fistulas quomodo curare oportet 843  
 Anicetum emplastrum 940  
 Animalia uenenata quibus artibus tollantur 763  
 Animalium quis usus in medicinis 91. & inde  
 Animalium morbi unde deprehendantur 92  
 Animalium per singulas suas partes qualitas describitur, pagina 91. usq; 117  
 Animalium quæ præsaga sint & uenenum prodant 790  
 Animi deliquij remedia 537  
 Animi deliquium in balneo quomodo curandum ibidem  
 Animo linquentibus remedia 270. & deinceps usq; 278  
 Animo linqui quosdam propter crudorū humorū multitudinē 270  
 Animo linquētes ob flauā bilē 272  
 Anisati præparatio 128  
 Anisi facultas 14  
 Anserinus adeps qualis 3.108  
 Anserum carnis qualitas 104. item ouorum 105  
 Antiades, uide Glandularum.  
 Antidoti ex cancri fluuiatibus compositio 316  
 Antidoti ex nucibus cōpositio ibidem  
 Antidoti podagricæ 751. & inde  
 Antidoti mithridaticæ compositio & usus 801.802  
 Antidoti pæoniæ compositio 804  
 Antidotus aromatica optima Galli 805  
 Antidotus ex duobus piperis generibus ibidem  
 Antidotus Athanasia ibidem  
 Antidotus Esdræ qualis 802  
 Antidotus Hadriani 806  
 Antidotus Acharistos ibidem  
 Antidotus theriaca contra uenena quæ simplicia recipiat, & quō conficiatur 793. eiusq; usus 794  
 Anthomis qualis 14  
 Antoninus, collyrium 420  
 Anulus digito impactus quomodo detrahatur 901  
 Aparines uires 14  
 Apes & uespas fugantia  
 Aphronitri energia 86.87  
 Aphtha quid 197.200  
 Aphthorum remedia 471  
 Apiati præparatio 927  
 Apij qualitas 14.63  
 Apochyma quid 191  
 Apochymatis præparatio 947  
 Apogei uenti qui 181  
 Apollonij Memphytæ medicamentum 119  
 Apollonij naturale ad polypos medicamentum 355  
 Apollonij liquida compositio 417  
 Apomeli quid 252  
 Apomelitis præparatio & uis 289  
 Apophlegmatismorum pituita per os detrahentium descriptio 332  
 Apoplexia quid & qualis affectio,

eiusq; cura 318.319  
 Apoplexia quo differat à paralyfi 319  
 Appetitus perdit remedia 552  
 Appetitus caninus qualis, eiusq; species & cura 553.554.555  
 Appetitus uitiosi medicinæ 555  
 Aqua qualitatis expert 2  
 Aquosus sapor ibidem  
 Aqua nihil humidius 5  
 Aquam concoctioni maximè resistere 131  
 Aquæ frigide noxa & remedia 719  
 Aqua quō per fossas ducenda 183  
 Aqua quomodo emendetur 184. si ne aqua alimentum concoqui non posse ibidem  
 Aquæ lixiuij usus ibidem  
 Aquam ducentia remedia 153.656  
 Aquarū albularū potus utilitas 698  
 Aquarum dulcium iuxta temperaturam uis 184.185  
 Aquā horrentiū affectio & cura 314  
 Aquæ mulsæ usus 132.133.134  
 Aquarum potabilium differentia & notæ 182.183.184. & quibus comoda & incōmoda sit ibidem  
 Aquaticorū animalium alimentū 105  
 Aquilæ ortus & occasus 182  
 Aquilarum fel quale 98  
 Arabica compositio 1026  
 Araci facultas 15  
 Aranearum telæ ad quid utiles 111  
 Arborum fructus ferè omnis prima generatione acerbi sunt gustu 5  
 Arbuti, eiusq; fructus qualitas 43  
 Arceutos qualis 15  
 Archigenes quō suum præceptorē Agathinū delyrio liberarit 187  
 Arction, quod & Bunion 18  
 Arcturi occasus, ortusq; 182.183  
 Ardor æstuosus quō curādus 214  
 Arenæ ingestionis modus 143  
 Argemum quid, & eius cura 374  
 Argenti scoria 89  
 Argenti spumæ uis 88.789  
 Argenti uiui proprium 789  
 Aridorū collyriorū cōpositio 412  
 Aridum Danai 413  
 Arietina carnis qualitas 102  
 Aristolochia triplex, & qualis 14  
 Aristolochiæ clematidis seminis energia 152  
 Armeniaca mala 53  
 Armenij usus medicus 151  
 Armenij pictorū facultas 85.384  
 Armuthus lapis 86  
 Arnoglossi qualitas 15  
 Aromaticum collyrium 430.435  
 Aron quali uirtute 15  
 Artemisiæ uires 15  
 Arundo sepiaria 37  
 Arquatus morbus quid, & eius remedia 545.546  
 Arsenicum, auripigmentum 86  
 Arteriarū sectio quomodo fiat 147  
 Arteriarum sanguinis sistendi medicamentum ibidem  
 Arteriarum sectionis ratio 408  
 Arteriarum remedia 489  
 Arteriæ confectiones 491  
 Articularis morbus, uide Arthritis & Podagra  
 Articulorum incuruatorum quæ sit causa 718  
 Articulari morbo qualis perustio conueniat 723  
 Articulorum distortorum malagma 737  
 Articulos laxos & luxatos quomodo cures 898

Arthritis quid, & quomodo differat à podagra, ac eius causæ 716. cur in quibusdam paruus, in quibusdam magnus morbus, & alijs diu, alijs paruo tempore duret 717. uide Podagra, & Articularis  
 Artis circa hominis corpus uersantis duæ primæ ac maximæ partes quæ 195  
 Asari facultas 15  
 Ascarides quid, quomodoq; curentur 597.598  
 Ascites hydrops quid, eiusq; causæ  
 Ascitæ hydropis cura 651 (650)  
 Asclepius siue Aesculapius pastillus 877  
 Asellorum millepedum usus 328. 340.349  
 Aselli marini usus 116  
 Asiæ petræ flos flaccidas carnes consumit 121  
 Asininum lac quale 92.94  
 Asinorum domesticorum & syluestrium caro qualis 102  
 Aspalathi qualitas 15  
 Aspalathus quomodo probetur 117  
 Asparagus siue aspharagus 15  
 Asperæ arteriæ si qua infixæ, aut illapsæ fuerint, quō reuoces 489  
 Asperæ arteriæ descriptio & affectus eius remedia ibidem  
 Asphaltion cur trifolium dictum 69  
 Asphaltiti maris aqua qualis 7  
 Asphaltus, bitumen 86  
 Asphodeli facultas 16  
 Asperionum faciei ratio 187  
 Aspis acutias 417  
 Aspritudō palpebrarum unde oriatur, quomodo à densitate differat, & curetur 386.387  
 Asij lapidis & floris eius uis 82  
 Astaphys quali ui 16  
 Astaphys agria qualis ibidem  
 Aster siue stella samia, terræ samia  
 Aster Attricus 15 (species 78)  
 Aster Asclepiadæ 426  
 Aster Magni collyrium 427  
 Aster samius, collyrium 423  
 Asthmatici qui dicantur, & unde fiat, quomodoq; curentur 501  
 Athanasia antidotus 805  
 Athanasia collyrium 426  
 Atheromatum curatio 405  
 Atramenti scriptorij constitutio 88  
 Atramenti sutorij uis 90  
 Atramenti sutorij qualitas 855  
 Atræ bilis generatio, unde 302  
 Atræ bilis quō cognoscatur 239  
 Atram bilem quæ ducant 305  
 Atræ bile laborantium cura 732  
 Atræ bile stomachum infestatum habetibus quomodo medendū 531  
 Atractylis qua ui 16  
 Atraphaxis qualis ibidem  
 Atriplicis uirtus ibidem  
 Attenuatæ partes quō sanandæ 207  
 Attenuatoria alimenta quæ, & quibus conueniant 126  
 Attenuatoriorum & crassifacientium media quæ 127  
 Atractoria emplastra 849. & inde  
 Atractoria simplicia quæ 124  
 Auditus difficultatis cura 347.348  
 Auellana nux 39  
 Auenæ proprietates 18  
 Augustus, collyrium 426  
 Auium quæ optimæ 125.127  
 Aurea faciei circumlitio 44  
 Aureum Hygieni collyrium 435  
 Auricula muris, asine 12.54  
 Aures quæ purgent 172  
 X 2 Aurium



# AETII INDEX.

|                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aurium dolorum origo, item diuer-<br>fitas & curatio 346.347                                              | Britannicæ qualitas 18                                                                     | Canceri ulcerati medicinæ 982                                                                                               |
| Aurium infantium doloribus quo-<br>modo medendum 200                                                      | Bromium emplastrum 948                                                                     | Câceratorum tumorû nō tamen ul-<br>ceratorum remedia ibidem                                                                 |
| Auris suppuratæ curatio ibi. (280                                                                         | Bronchocele quid, & eius medica-<br>mina 912                                               | Cancerata ulcera oculorum quæ di-<br>cantur, & quibus accidunt 378                                                          |
| Aurium elotiones quibus fiant 349                                                                         | Bubastica ulcera in pueris 201. eo-<br>rumq; remedia 202                                   | quomodoq; curentur ibidem                                                                                                   |
| Auriû sordes quō expurgandæ 346                                                                           | Buprestis qualis & quomodo affi-<br>ciat hominem 782                                       | Canceratorum tumorum medicami-<br>na 889                                                                                    |
| Aurium sonitus causa & remedia<br>ibidem                                                                  | Bubonium, aliàs Aster atticus 15                                                           | Candidi nardinum collyr. 436                                                                                                |
| Auriû inflammationû medelæ 348                                                                            | Bubulæ carnes quales 102                                                                   | Canes rabiosi quō curentur 316                                                                                              |
| Auris meatus ulcerum cura 349                                                                             | Bubulum fel quale 98                                                                       | Canicule ortus occasusq; 182.183                                                                                            |
| Aurium foetores, item superexcre-<br>scentes in aurium ulcerib. carnes,<br>tum uermes aurium sanantia 350 | Bubulum lac quale 92                                                                       | Canis fluuiatilis testiculorum usus<br>115                                                                                  |
| Auribus humectis absq; ulceratione<br>remedia 349                                                         | Bubuli stercoris qualitas 100                                                              | Canis terrestris catuli utilitas ibidē                                                                                      |
| Auribus sanguine fluētibus, aut qui-<br>bus calculi aut aliud qd illapsum<br>fuerit, medelæ 350.351       | Buccellæ purgatoriæ cōpositio 160                                                          | Canû temperatura, & rabies 314                                                                                              |
| Aurium affectionib. extra meatû 351                                                                       | Buccinorum teste ad quid utiles 115                                                        | Canû rabiosorû signa quæ ibidem                                                                                             |
| Auricularis compositio ad dolores<br>magnos, & pus album 350                                              | Buglossi qualitas 18                                                                       | Canina cōuulsio, eiusq; remedium<br>173.187                                                                                 |
| Auribus purulentis & graueolenti-<br>bus, item Aurium diuturnis ulce-<br>rationibus remedia ibidem        | Bulbi proprietas 18                                                                        | Caninæ conuulsionis curatio 321                                                                                             |
| Auripigmenti qualitas 86.789.855                                                                          | Bulbus uomitorius ibidem                                                                   | Canina insania qualis 307                                                                                                   |
| Austerum quale 2.4.5                                                                                      | Bulimus quid 276                                                                           | Canini stercoris qualitas 99                                                                                                |
| Austorum uentorum qualitas 181                                                                            | Bulimos unde oriatur, & eius reme-<br>dia 536                                              | Canities ne eueniat 339                                                                                                     |
| <b>B</b>                                                                                                  |                                                                                            | Cantharidû haustus remedia 781                                                                                              |
| Alanos myrepfica qualis 16                                                                                | Bunij facultas 18                                                                          | Cantharidum usus 113                                                                                                        |
| Balaustium quid & uis 17                                                                                  | Buphthalmi flores & actio 18                                                               | Capnias lapis, qualis 84                                                                                                    |
| Balneorum ratio 184.185                                                                                   | Butyri qualitas 97                                                                         | Capnion, fumaria qualis 37                                                                                                  |
| Balneorum ingressus qualis sit 186                                                                        | <b>C</b>                                                                                   |                                                                                                                             |
| Balneorum usus in morbis oculo-<br>rum 365                                                                | Achexia quid, eiusq; indicia, ac<br>cura, & in quos morbos trāseat<br>649                  | Capparis facultas 37                                                                                                        |
| Balsami facultas 17                                                                                       | Cadmiz energia 87.855                                                                      | Capillos quæ tingant & nigrefaciāt<br>338. fuluos faciant 339                                                               |
| Barbā nigrefaciens pharmacû 339                                                                           | Calami aromatici præstātia quomo-<br>do discernenda 118                                    | Capillorum corruptio unde proue-<br>niat 334                                                                                |
| Barbari emplastri usus 76                                                                                 | Calamus aromaticus 37                                                                      | Capillorum defluuium qualis affe-<br>ctio, & quomodo curetur. 336. ui-<br>de etiam de pilorum defluuio                      |
| Basiliscus & eius plaga qualis 776                                                                        | Calamus phragmites ibidem                                                                  | Capræ ortus occasusq; 182                                                                                                   |
| Basilicum tetrapharmacum 947                                                                              | Calaminthæ qualitas 36                                                                     | Capræ cornu quale 101                                                                                                       |
| Balsi liquida 417                                                                                         | Calcis uirtus medica quæ 68. 89.<br>789                                                    | Caprinæ carnis temperamentû 102                                                                                             |
| Batrachij specierum uires 17                                                                              | Calculi palpebrarum cura 404                                                               | Caprini sanguinis usus in meden-<br>do 91                                                                                   |
| Batos seu Rubus ibidem                                                                                    | Calculi uesticæ muliebris cura 1020                                                        | Caprini seui usus 108                                                                                                       |
| Bdellij dinotio 118                                                                                       | Calculis exectis quæ diætā conue-<br>niat 679                                              | Caprini stercoris conditio 100                                                                                              |
| Bdellij energia 153.857                                                                                   | Calculi ne nascantur, aut renascan-<br>tur, diætā præseruatiua 671                         | Caprinum fel quale 98                                                                                                       |
| Bdellij utriusq; natura 17                                                                                | Calculis uesticæ remedia 673                                                               | Caprinum lac quale 92                                                                                                       |
| Besafa, ruta syluestris 54                                                                                | Calculis uesticæ & renum remedia<br>672.676.677                                            | Caprarum fimi præstantia 192                                                                                                |
| Beredrias unguentum 1025                                                                                  | Calculos uesticæ atterentia medica-<br>menta 673                                           | Caput p nares quæ purgēt 173.332                                                                                            |
| Berenices thymiana 809                                                                                    | Calculorû qui nec atteri nec excer-<br>ni possunt medicamina 679                           | Caput resiccantium medicamento-<br>rum compositio 333                                                                       |
| Beta stomacho quā in cōmoda 131                                                                           | Calculos renum ac uesticæ euacuan-<br>tia 175                                              | Capitis dinotio 218                                                                                                         |
| Betę uis 67                                                                                               | Calculosorum rhenum causæ & re-<br>media 668.669                                           | Capitis dolori in febribus quomo-<br>do medendum 277                                                                        |
| Betonicæ uirtus 40                                                                                        | Calfacientia alimenta 134                                                                  | Caput lædentia alimenta 136                                                                                                 |
| Bilis effusio quid, eius causæ & re-<br>media 544                                                         | Calfacientia moderatē, item primo,<br>secundo, tertio & quarto ordine,<br>quæ sint 120.121 | Capitis doloribus omnibus quæ me-<br>deantur uaria 330.331                                                                  |
| Bilem atram euacuantia 150. & inde.<br>159. & inde                                                        | Calidi temperamenti notæ 216                                                               | Capitis dolorû distinctiones 325                                                                                            |
| Bilem flauam quæ expurgenti 49. &<br>inde. 159. & inde                                                    | Calidorum temperamentorum cor-<br>rectionis modus 223                                      | Capitis doloris ex ardore aut calidi-<br>tate oborti, aut in febribus, siue<br>ex ebrietate aut meri potu, cura-<br>tio 325 |
| Bilis expurgatio quomodo confide-<br>randa & facienda 223                                                 | Calidi & ficci, itē calidi & humidi te-<br>peramenti notæ quæ sint 217                     | Capitis perfrigerati cura 326                                                                                               |
| Bilis influxu laborantes quomodo<br>medendi 727                                                           | Caligo oculi quid, eiusq; cura 373                                                         | Capitis dolori à stomacho, aut ob<br>plagam remedia ibidem                                                                  |
| Bithynus pastillus 878                                                                                    | Callyonimi fel quale 98                                                                    | Capiti quæ ex natura dolorem adfe-<br>rant 327                                                                              |
| Bituminis electio 118                                                                                     | Callositas palpebrarum quid, eiusq;<br>cura 387                                            | Capitis pustularum diuersarum re-<br>media 343.340                                                                          |
| Bituminis qualitas 86.856                                                                                 | Calor duplex 4                                                                             | Capitis scabritiei remedia 345                                                                                              |
| Bituminosa balnea quibus conue-<br>niant 186                                                              | Caluariæ circuncisionis ratio 409                                                          | Capitis ulcuscula parua, densa & ru-<br>bicunda quæ curent 345                                                              |
| Bliti qualitas 18                                                                                         | Caluities unde proueniat 334                                                               | Capitis totius illitionum modus &<br>ratio 411                                                                              |
| Bolæ collyrium 426                                                                                        | Camelinæ carnis qualitas 102                                                               | Capitum ex animalibus uis medica<br>108.109                                                                                 |
| Bolæ liquida 416                                                                                          | Camelinum lac quale 92                                                                     | Carabi seu locustæ usus 114                                                                                                 |
| Bolus Armeniæ cuius facultatis 79                                                                         | Canani radix qualis 48                                                                     | Carbunculi palpebrarum 377                                                                                                  |
| Boni succi quæ sint 129                                                                                   | Cancani quid, eiusq; cura 980                                                              | & quomodo curētur ibidē. & 378                                                                                              |
| Borealium uentorum qualitas 181                                                                           | Cancris qui facile & qui ægrè curen-<br>tur ibidem                                         | Carcinades, qualia animalcula 106                                                                                           |
| Brassicæ facultas 44                                                                                      | Cancris chirurgiæ 981                                                                      | Cardamines herbæ proprietates & ex<br>ea sinapismus qualis 710                                                              |
| Brassica quomodo preparāda ut aut<br>aluū subducatur aut listat 133.135                                   | Cancris post amputationē & inustio-<br>nem curatio 981                                     | Cardamines energia 193. 194                                                                                                 |
| Brathy qualis 18                                                                                          | Cancrorum citra chirurgiam sana-<br>tio 982                                                | Cardami uirtus 38                                                                                                           |
| Bryon qualis 18                                                                                           |                                                                                            | Carda                                                                                                                       |
| Bryon thalassion 19                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                             |
| Brionia, ampelos leuce 12                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                             |



|                                                                                       |                                                                                        |                                                                    |            |                                                                                      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cardamomum quod optimum                                                               | 118                                                                                    | Ceratorum diuersorum compo-<br>sitiones                            | 950        | accidat, tum quod medenda.                                                           | 959            |
| Cardamomi uis                                                                         | 38                                                                                     | Cerata podagrica                                                   | 741        | Clauus quid & cur sic dictus, eiusque<br>remedia                                     | 838            |
| Cardiacorum dinotio & remedia                                                         | 529                                                                                    | Cerati rosacei usus                                                | 24         | Clematidis qualitas                                                                  | 14             |
| Cardui facultas                                                                       | 64                                                                                     | Cerasti qualitas                                                   | 40         | Cleonis spodiaceum                                                                   | 428            |
| Cares quomodo serum parent                                                            | 95                                                                                     | Ceratia, Ceratonia                                                 | ibidem     | Cleopatrarum reginarum smegma                                                        | 444            |
| Caricarum uirtus                                                                      | 16.66.67.129                                                                           | Cerastes & eius plaga qualis & quae<br>remedia                     | 774        | Cleopatrarum pastilli ad defluuium ca-<br>pillorum                                   | 337            |
| Caries lignorum qualis                                                                | 63                                                                                     | Cereale seminum qualitas                                           | 126        | Clidion pharmacum                                                                    | 514            |
| Carnem duram habentia quibus coque-<br>riat, & quomodo praeparanda                    | 133                                                                                    | Cerebri inflammationis affectio &<br>cura                          | 317        | Cnici qualitas                                                                       | 42             |
| Carnes quadrupedum qua parte bo-<br>ni succi sint, & qua mali                         | 130                                                                                    | Cerebri erysipelas, eiusque curatio                                | 318        | Cnici seminis efficacia                                                              | 152            |
| Carnis in magno oculi angulo de-<br>crementum quomodo fiat                            | 407                                                                                    | Cerebri duae facultates                                            | 359        | Cnici syluestris natura                                                              | 16             |
| Carnis in oculi angulo excrecentis<br>medicamentum                                    | 396                                                                                    | Cerebri temperaturarum dinotio                                     | 219        | Cnide, quae urtica                                                                   | 10             |
| Carnis animalium praestantia quomo-<br>do exploranda                                  | 126                                                                                    | Cerebri membranarum glutinantia                                    | 328        | Cnidij cocci facultas                                                                | 42             |
| Carnium qualitas                                                                      | 102                                                                                    | Cerebrum palmarum                                                  | 70         | Cnipas quid perimat                                                                  | 79             |
| Carnium iuxta cocturam qualitatem<br>mutari                                           | 102                                                                                    | Cerium quid, eiusque cura                                          | 916        | Coaguli qualitas                                                                     | 97             |
| Carnium salutarum differentia                                                         | 108                                                                                    | Ceruinae carnis qualitas                                           | 102        | Coaguli diuersa efficacia in lacte                                                   | 789            |
| Carnositas quomodo liquanda aut<br>subuertenda sit                                    | 206                                                                                    | Ceruinarum cornuum uis medica                                      | 110        | Cocali facultas                                                                      | 48             |
| Caro animalium quomodo dijudi-<br>canda                                               | 104                                                                                    | Cerussa qualitas                                                   | 90.789.855 | Cocci cnidij, item tinctorij facultas                                                | 42             |
| Caroi proprietates                                                                    | 38                                                                                     | Cestri uirtus                                                      | 40         | Coccymeles qualitas                                                                  | 42             |
| Caros quid, & quomodo a lethargo<br>differat, eiusque curatio                         | 297                                                                                    | Chalbana seu galbanum                                              | 70         | Cochleae terrestres usus                                                             | 115            |
| Carpasi succus qualis efficacia                                                       | 785                                                                                    | Chalcanthus, qualis                                                | 90         | Cochleae mucus quid, quomodoque<br>colligendus, & ad quae utilis ibi.                | 620            |
| Carpesij uis                                                                          | 45                                                                                     | Chalcocanthos                                                      | 90         | Coeliaci qui dicantur                                                                | 620            |
| Carphias, quae tubercula                                                              | 50                                                                                     | Chalcos aesustum                                                   | 90         | Coeliaca affectio quae proprie dica-<br>tur, qualisque sit, & eius remedia           | 589            |
| Carya, nux arbor                                                                      | 38                                                                                     | Chalcitis qualis                                                   | 88.90.855  | Coitus ratio, item commoda & in-<br>commoda                                          | 141.142        |
| Caseorum qualitas                                                                     | 96                                                                                     | Chamaeacte qualis                                                  | 11         | Coitus mala                                                                          | 314            |
| Caseorum usus in medicamentis                                                         | 97                                                                                     | Chamaedryos qualitas                                               | 70         | Coitus potentiae indicia                                                             | 222            |
| Cassiae uirtus                                                                        | 38                                                                                     | Chamelae efficacia                                                 | 71.153     | Coitus impotentia quomodo sane-<br>tur                                               | 703            |
| Cassiae dinotio                                                                       | 118                                                                                    | Chamaeleuces temperamentum                                         | 71         | Colicorum affectionis causae uariae<br>& remedia uaria                               | 576. usque 586 |
| Cassij ficcum collyrium                                                               | 416                                                                                    | Chamaeleonis facultas. ibi. &                                      | 788        | Colis resoluti curatio                                                               | 322            |
| Castaneae quales                                                                      | 21                                                                                     | Chamaemeli qualitas                                                | 14         | Colliquatio quid, & quomodo ei<br>medendum                                           | 263.594        |
| Castorium, id est, testes castoris                                                    | 114.                                                                                   | Chamaelinum oleum ibi. &                                           | 25         | Colla, qualis uirtutis                                                               | 43             |
| 115. quibus sit uiribus praeditum. ibi.                                               | 115.                                                                                   | Chamaepitys energia                                                | 71.153     | Collyriorum aridorum descriptio-<br>nes                                              | 412.413.414    |
| Castratio, propter elephantiasim                                                      | 812                                                                                    | Characias quid, & eius usus                                        | 68         | Collyriorum liquidorum compo-<br>sitiones                                            | 415. & inde    |
| Catalepsis quid, eiusque cura                                                         | 297                                                                                    | Chartilagineorum piscium qualitas                                  | 108        | Collyrium ficcum Cassij                                                              | 416            |
| Cataplasmatum uariarum compo-<br>sitiones                                             | 159.190                                                                                | Chelidonij utriusque facultas                                      | 72         | Collyria ex croco & ex succis diuer-<br>sa                                           | 418            |
| Cataplasmatum usus                                                                    | 188.189                                                                                | Chersydri serpentis malitia                                        | 776        | Collyria monohemera                                                                  | 419            |
| Catarrhi remedia                                                                      | 494                                                                                    | Chezananze epithema, quale                                         | 170        | Contusorum medellae                                                                  | 897            |
| Catheter, instrumentum quo urina<br>prolicetur                                        | 322                                                                                    | Chiaca collyria                                                    | 429        | Coquere bis aliquid, quomodo co-<br>ueniat                                           | 134            |
| Catocha quid, & quomodo curet                                                         | 297                                                                                    | Chiae terrae efficacia                                             | 79         | Collyrium monomelum ibidem                                                           | ibidem         |
| Causus febris cur dicta                                                               | 240                                                                                    | Choeradolethron, quale                                             | 55         | Collyriorum sistentium descriptio                                                    | 420. & inde    |
| Causos quomodo differat ab exqui-<br>sita tertiana                                    | 253. item quomodo<br>differat a coctine putrida, tum quae<br>sint eius notae & remedia | Chiliodynami uirtus                                                | 60         | Colloriorum lenium compositio                                                        | 423            |
| Caucalis qualitas                                                                     | 48                                                                                     | Cholera quid, causae eius & reme-<br>dia                           | 544        | Collyriorum cygni, libianorum, spo-<br>diaceorum & rephricorum ratio<br>& compositio | 426.427        |
| Caudae muliebris resectio                                                             | 922                                                                                    | Chondrilla species seridis                                         | 63         | Collyria ex rosis uiridibus & al-<br>bis                                             | 428            |
| Cedri utriusque facultas                                                              | 39                                                                                     | Chryfocolla                                                        | 90         | Collyria diasmyrna & chiaca dicta,                                                   | 429            |
| Cedriae uirtus                                                                        | ibidem                                                                                 | Chryseletri energia                                                | 84         | Collyria ad aspritudines & exterso-<br>ria                                           | 431            |
| Cedrolei uis                                                                          | ibidem                                                                                 | Cibi quando febricitantibus porri-<br>gendi                        | 250        | Collyrium pressum                                                                    | 433            |
| Cedrides fructus cedri                                                                | 39                                                                                     | Ciborum qui optimi                                                 | 125.126    | Collyria enstacta, id est, instillatitia<br>appellata                                | 435            |
| Cele uocatur omnis tumor                                                              | 912                                                                                    | Ciborum uarietas uitanda                                           | ibidem     | Collyria ex cornu cerui                                                              | 435            |
| Cenchrias quale animal, & quam no-<br>xius eius morsus                                | 773                                                                                    | Ciborum qualitates                                                 | 125        | Collyria nardina & theodotia                                                         | 436            |
| Cenchrites & eius plaga qualis, tum<br>quae eius curatio                              | 774                                                                                    | Ciborum quid                                                       | 41         | Colocasij qualitas                                                                   | 42             |
| Cenchros, milium                                                                      | 39                                                                                     | Cicada ad quid commoda                                             | 117        | Colocynthidis energia                                                                | 43.151         |
| Centaureae maioris uirtus                                                             | 39                                                                                     | Cicatricem quae simplicia inducant                                 | 124        | Coloris consideratio                                                                 | 8              |
| Centaureae minoris facultas                                                           | 40                                                                                     | Cicatricibus in albidis remedia                                    | 248        | Columbas quibus edere liceat                                                         | 126            |
| Ceparum qualitas                                                                      | 46                                                                                     | Cicatricibus nigris ex ulceribus re-<br>lictis remedia             | 825        | Columbini sanguinis utilitas                                                         | 91             |
| Cephalaea quid, & qualis affectio,<br>eiusque uarietatis dinotio, tum cu-<br>ra       | 327.328.329                                                                            | Cicatricem uulneribus inducentia                                   | 1017       | Columbini stercoris qualitas                                                         | 100            |
| Cephalicorum emplastrorum compo-<br>sitionis & usus                                   | 922                                                                                    | Cicerbitae uis                                                     | 65         | Columellae affectae ablatio quomo-<br>do fiat                                        | 475            |
| Cephalicorum medicamentorum sic-<br>corum ad repurgandum & incar-<br>nandum confectio | 866                                                                                    | Cicerulae quales                                                   | 48         | Colymbades qua uirtute                                                               | 21             |
| Cephalus piscis qualis                                                                | 106                                                                                    | Ciceris natura                                                     | 32         | Colymbadum oliuarum muria ad<br>quid utilis                                          | 108            |
| Cera quae praestantior                                                                | 118                                                                                    | Cichorij uirtus                                                    | 63         |                                                                                      |                |
| Cerae facultas                                                                        | 41.87.855                                                                              | Cici, arbor                                                        | 22         |                                                                                      |                |
| Cerebri animalium qualitas                                                            | 103.104                                                                                | Cieis, id est, galla qualis                                        | 41         |                                                                                      |                |
|                                                                                       |                                                                                        | Cicinum oleum                                                      | 22         |                                                                                      |                |
|                                                                                       |                                                                                        | Cicis arboris fructus qualis                                       | 41         |                                                                                      |                |
|                                                                                       |                                                                                        | Cicutae efficacia                                                  | 48.785     |                                                                                      |                |
|                                                                                       |                                                                                        | Cimices prohibentia                                                | 778        |                                                                                      |                |
|                                                                                       |                                                                                        | Cimoliae terrae facultas                                           | 79         |                                                                                      |                |
|                                                                                       |                                                                                        | Cineris in genere uis                                              | 68.856     |                                                                                      |                |
|                                                                                       |                                                                                        | Cessos, hedera                                                     | 42         |                                                                                      |                |
|                                                                                       |                                                                                        | Cisthos siue Cistharus                                             | 41         |                                                                                      |                |
|                                                                                       |                                                                                        | Cisthus siue Ladanum                                               | 42         |                                                                                      |                |
|                                                                                       |                                                                                        | Citrea malus & citreum                                             | 53         |                                                                                      |                |
|                                                                                       |                                                                                        | Citta praegnantium quid, unde di-<br>cta, quur & quando mulieribus |            |                                                                                      |                |



# AETII INDEX.

|                                       |             |                                        |         |                                      |             |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|
| Coma quid, eiusq; cura                | 278         | Coriandri efficacia                    | 43.785  | Cymini facultas                      | 47          |
| Comarus arbutus                       | 43          | Corianum seu corion, quale             | 43      | Cynoglossæ facultas                  | 49          |
| Comes uiæ, collyrium                  | 420         | Coria animalium ad qd cōducāt          | 110     | Cynos orchis                         | 56          |
| Comitialium auxilia uaria             | 310         | Corij fomentatio quō fiat              | 143     | Cyparissi usus                       | 47          |
| Comitalis ex stomacho primario        |             | Corion, qualis affectio                | 343     | Cyperiperi facultas                  | 47          |
| affecta aut ex aliqua parte, quo-     |             | Corniformē oculi tunicam ex qua-       |         | Cyperiperi radice exploratio         | 119         |
| modo curentur                         | 311         | tuor constare corpusculis              | 375     | Cyprinum oleum                       | 27          |
| Comitalibus puerorū & senū quæ        |             | Cornuū ex animalib. uis medica         | 110     | Cyphi duplex                         | 808.809     |
| cura conueniat                        | ibidem      | Coronæ ortus, occasusq;                | 182     | Cypheos confectio                    | 801         |
| Comitialium qui curabiles & qui       |             | Coronopodij usus                       | 43      | Cyri archiatri Edeffæ pastillus ad   |             |
| incurabiles                           | 312         | Corpora ex quibus causis induren-      |         | ozenas                               | 354         |
| Comitialē morbum quæ arguāt           | 309         | tur                                    | 123     | Cyriacus pastillus                   | 877         |
| Comitiales collabentes quibus exci-   |             | Corporum quæ sit præstantissima        |         | Cytinus quid, & eius facultas        | 17          |
| tentur                                | ibidem      | constitutio                            | 196     | Cytisi uis                           | 48          |
| Comitalis morbi differentie tres      |             | Corpus odorum reddentia                | 445     |                                      |             |
| 308. item cura                        | 309         | Corroborantia simplicia quæ            | 123     | D                                    |             |
| Comitalis morbi puerorum reme-        |             | Corrodentia simplicia quæ              | 124     | D Amasonij facultas                  | 20          |
| dium                                  | 19          | Corrosiua medicamenta                  | 882     | Daphnes facultas                     | 20          |
| Comitalis morbi præseruatiua          | 313         | Corrupti facilia aut difficilia alimē  |         | Dauci qualitas                       | 65          |
| Commigummi                            | 43          | ta                                     | 133     | Dauci species & facultates           | 20          |
| Commorosos à cane rabioso quomo-      |             | Corydalis ad quid utilis               | 115     | Dauci syluestris uis                 | ibidem      |
| do deprehendas sanatos esse           | 316         | Costi dinotio & species                | 118     | Decamæron unguentum                  | 745         |
| Commorforum à rabioso cane affe-      |             | Costi facultas                         | 43      | Declinatio morbi quid                | 231         |
| ctio & cura                           | 314.315.316 | Cotyledonis qualitas                   | 44      | Declinationis totius morbi cogni-    |             |
| Complexio, uide Temperamentum         |             | Crambes utriusq; facultas              | 44      | tio                                  | 231         |
| Compositis medicamentis quando        |             | Crapula quid, eiusq; remedia           | 562     | Declinatio quorundam morborum        |             |
| utendum                               | 254         | Crapulæ quæ cura conueniat             | 215     | non potest cognosci                  | ibidem      |
| Compositorum mendicamentorum          |             | Craffarū partiū simplicia quæ          | 122     | Defluuium capillorum, qualis affe-   |             |
| quæ causæ                             | 853         | Craffefacientium & attenuantium        |         | ctio, & unde generetur, eiusq; cu-   |             |
| Conceptionem impredientium di-        |             | quæ sint media                         | 127     | ra                                   | 336         |
| uersarum affectionū curatio           | 973.        | Craffi succi alimenta quæ              | 127     | Defluuij pilorū species & curæ       | 364.        |
| 974.975                               |             | Craffo uictu qui uti possint citra di- |         | 403                                  |             |
| Conceptus tempus homini, quod         |             | scrimen                                | ibidem  | Deglutitionis resolutæ cura          | 322         |
| fit                                   | 959         | Craffi succi alimenta quæ sint ibidē   |         | Deglutiti metalli aut talis cuiuspiā |             |
| Conceptus indicia                     | 958.959     | Cretæ usus                             | 79      | rei remedia                          | 609         |
| Concipiente muliere quæ in utero      |             | Cretmon, quale                         | 44      | Delicatum collyrium                  | 428         |
| eius nascantur                        | 956         | Crimmon quid                           | 45      | Deliquijs animi, uide Animo linqui   |             |
| Concipientibus ægre aut non secu-     |             | Crini facultas                         | 45      | Delphini ortus & occasus             | 182.183     |
| re, quomodo auxiliandum               | 961         | Crithæ, ordeum                         | ibidem  | Delyrij causæ & medela               | 312         |
| Conchiliorum testarū qualitas         | 856         | Croci uis                              | 45      | Delyrij & fatuitatis differentia     | ibidē       |
| Concoctio quid                        | 556         | Croci exploratio                       | 118.879 | Dendromalache qualis                 | 51          |
| Concoctionis auxilia 557. & dein-     |             | Crocodilij qualitas                    | 45      | Désantia cutē simplicia quæ          | 124         |
| ceps                                  |             | Crocomagmatis preparatio               | 118     | Densitas & aspritudo palpebrarum     |             |
| Concoctionis signa semper esse bo-    |             | Crocomagmatis ad capitis dolores       |         | differunt                            | 387         |
| na                                    | 230         | preparatio                             | 330     | Dentes duabus contrarijs affectioni- |             |
| Concoctoria simplicia quæ             | 123         | Crommion, cepa                         | 46      | bus esse obnoxios                    | 457         |
| Concoctu facilia aut difficilia quæ   |             | Croton, arboris fructus                | 22.41   | Dentiū affectionibus remedia         | 457         |
| sint                                  | 130         | Crudi humores quales sint              | 211     | Dentium ex caliditate, frigiditate,  |             |
| Conditorum uariorum præparatio        |             | Crudi humoris generatiua quæ sint      |         | humiditateue affectorum reme-        |             |
| 1025.1027                             |             | 127                                    |         | dia                                  | 461.462.463 |
| Conditorum ad flauam bilem, ad pi-    |             | Cruditatis quid, & unde, eiusq; reme-  |         | Dentium à siccitate, item caliditate |             |
| tuitosos, ad melancholicos descri-    |             | dia 556. & inde                        |         | & humiditate simul affectorum        |             |
| ptio                                  | 155         | Cruditatis quomodo curanda             | 215     | medicinæ                             | 465.466     |
| Condyloma uteri quid, & quæ eius      |             | Cruris aut alterius cuiusdam mem-      |         | Dentium erosorum curatio             | 466         |
| medelæ                                | 1023        | bri resolutio                          | 323     | Dentes quō lima atterendi            | 465         |
| Condylomatum medelæ                   | 614.616     | Crustam inducentia 875. & inde         |         | Dens ut citra dolorem & absq; fer-   |             |
| Coni fructus qualis                   | 48          | Crustam inurentia                      | 879     | ro extrahatur                        | 468         |
| Conia stacte, qualis                  | 43          | Crustuminati præparatio                | 290     | Dentiū denigratorum, liuentium &     |             |
| Conij summa frigiditas                | 48          | Cucumis syluestris                     | 64      | rarefactorum smegmata                | 469         |
| Conizæ utriusq; facultas              | 43          | Cucumeris syluestris energia           | 152     | Dentitio puerorū quomodo iuuan-      |             |
| Cōstitutio corporis optima quæ        | 196         | Cucumerum facultas                     | 63      | da, & quando incipiat                | 199         |
| Cōstitutionis optimæ quæ nota         | 203         | Cucurbitæ uis                          | 43.189  | Desquamata quæ dicantur, & quo-      |             |
| Cōstitutiones corporis uitiosæ dupli- |             | Cucurbitularum quis usus               | 147     | modo curentur                        | 896         |
| ces                                   | 216         | Culicum ictus curatio                  | 778     | Destillationis remedia               | 495         |
| Conuulsio cur comitalem morbū         |             | Cuminati præparatio                    | 1028    | Diabete quid & eius cura             | 665         |
| sequatur 308. & quomodo cure-         |             | Cupholithos lapis                      | 89      | Diacenteton collyrium                | 435         |
| tur                                   | 309         | Cupressi uirtus                        | 47      | Diacodiō cōpositio 263. & usus       | 287         |
| Conuulsionis caninæ curatio           | 321         | Curari recte morbum non posse ci-      |         | Diacodion, non consequenter exhi-    |             |
| Cōuulsionū aut distentionū originis   |             | tra eius prænotationem                 | 228     | bendum, & cur                        | 301         |
| dinotio & nomina, tum cura            | 323         | Currus collyria                        | 452     | Diaria febris quæ & quō fiat         | 243         |
| Conuulsionū in febribus cura          | 286.        | Cutem quæ densent                      | 244     | Diariarum febrium tractatio          | 243.        |
| & unde causentur                      | ibidem      | Cutis densatæ curatio, & unde den-     |         | usq; 248                             |             |
| Continens febris quæ                  | 247         | setur cutis                            | 213     | Diaphanes, lapis specularis          | 87          |
| Cōtussio unde fiat                    | 273         | Cyamos, faba                           | 46      | Diasmyrna collyria                   | 429         |
| Corax pastillus                       | 877         | Cyani efficacia                        | 87      | Dictamni qualitas                    | 20 (234)    |
| Cordis animalium qualitas             | 103         | Cyclami qualitas                       | 46.153  | Dies iudicatorij boni aut mali qui   |             |
| Cordis mortificationem quæ denu-      |             | Cydonati præparatio                    | 290     | diei qua æger est moriturus præno-   |             |
| ciant                                 | 229         | Cygni pullus, ad quid utilis           | 115     | tio                                  | 242         |
| Cordis temperaturas quomodo di-       |             | Cygni seu cygnaria collyria quæ di-    |         | Dies prima morbi quæ dicatur siue    |             |
| noscas                                | 221         | cantur 424. & qualia 426               |         | principium                           | 229         |
| Cordis tremor, qualis affectio        | 506         | Cygnus reginæ, collyrium               | 425     | Diebus singulis differentias aeris   |             |
|                                       |             |                                        |         | feri                                 | 180         |
|                                       |             |                                        |         | Dionis                               |             |



# AETII INDEX.

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dionis' collyrium                                                               | 375        |
| Dionysia emplastrum                                                             | 933. & 945 |
| Dionysus collyrium                                                              | 430        |
| Diospolitici pharmaci compositio duplex                                         | 559        |
| Diphrygis conditio                                                              | 87. 855    |
| Diplos, qualis                                                                  | 20         |
| Dipsas quid, ac eius morsus auxilia                                             | 772        |
| Discussoria simplicia quæ                                                       | 124        |
| Discutientia quæ                                                                | 328. 353   |
| Discussoriorum emplastrorum compositio                                          | 942. 943   |
| Distentionum. uide Conuulsionum                                                 |            |
| Distichiasis quid                                                               | 397        |
| Diuites in plenitudinis morbis peius curari quàm pauperes                       | 188        |
| Diuitum peruersum iudicium ibid.                                                |            |
| Duritiei in artubus cura                                                        | 749        |
| Dolichi quales                                                                  | 20         |
| Dolere quomodo possint ægroti, nullo forinsecus accedente quod dolorem causetur | 273        |
| Dolor quid                                                                      | 273        |
| Dolorum iuxta situm causæ & differentiæ                                         | 273. 274   |
| Dorcadias herba, alio nomine Muscium                                            | 354        |
| Dorycnion quale                                                                 | 20. 784    |
| Dracones quales & ubi, & quæ ab eis noxa                                        | 776        |
| Draconis marini usus                                                            | 112        |
| Draconis marini plagæ medela                                                    | 777        |
| Dracontij qualitas & usus                                                       | 15. 21     |
| Dracontij sanguis                                                               | 413        |
| Dracunculus quid, & quomodo auferatur                                           | 904        |
| Dropacis usus & compositio uaria                                                | 191        |
| Drupæ oliuæ quales                                                              | 21         |
| Dryinus serpens & eius plaga qualis, quomodoq; curètur                          | 774. 775   |
| Dryos qualitas                                                                  | 21         |
| Dulce ulcus, quod aliàs Meliceris dicitur                                       | 202        |
| Dulcis sapor qui                                                                | 2. 4. 5. 6 |
| Dulcium & acerborum natura                                                      | 6          |
| Dulcis uocata compositio                                                        | 541        |
| Dulcia sitim inducere                                                           | 134        |
| Dulciū usus q̄s in cibis & potib.                                               | 127        |
| Durities quibus de causis corporibus accidat                                    | 123        |
| Dysentericæ ortus & curatio                                                     | 599        |
| item 603. & 607. & inde usq; 618                                                |            |
| Dystros, mensis Martius                                                         | 181        |
| Dysurias in febribus curatio                                                    | 281        |
| Dysuria quid & eius medicamenta                                                 | 684. 685   |
| Dysuriæ in febribus remedia                                                     | 685        |

## E

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| E Beni facultas                           | 21            |
| Ebiscus qualis                            | 21            |
| Ebrietatem quæ arceant                    | 326           |
| Ebrietatem quæ restinguant                | ibid.         |
| Ebrietas, epithema                        | 311           |
| Ebuli facultas                            | 11            |
| Echini marini usus                        | 108           |
| Ectropij qui dicantur                     | 364           |
| Eczerata quæ pustulæ, & quæ eorum remedia | 824           |
| Edeffenum collyrium                       | 420           |
| Eduiorum quæ optima                       | 126           |
| Edysari uirtus                            | 33 (238. 239) |
| Egestionum notæ ac iudicationes           |               |
| Elæa & elæon quali facultate sint         | 21. 22        |
| Elaphobosci facultas                      | 31            |
| Elate, palmæ germen                       | 70            |
| Elaterij temperamentum                    | 64            |
| Elaterij facultas                         | 152           |
| Electri uis medica                        | 84            |
| Elenium siue Helenium                     | 31            |

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Eleliphacos qualis                                                       | 31              |
| Ellebori qualitas                                                        | 31              |
| Ellebori utriusque dinotio                                               | 118             |
| Elephantiacus quomodo inopinato curatus                                  | 113             |
| Elephantiasis qd, & cur sic dicta                                        | 810.            |
| eius remedia                                                             | 811. usque 820  |
| Elephantinum emplastrum                                                  | 930             |
| Elxines facultas                                                         | 31              |
| Elymos qualis                                                            | 32              |
| Emerocallis, uel Hemerocallis                                            | 33              |
| Eminentiarum repressiua simplicia quæ                                    | 124             |
| Eminentijs corporis tumentibus illitiones                                | 814             |
| Emollientium emplastrorum compositio & usus                              | 927. & inde     |
| Empetri seu Epipetri uires                                               | 32              |
| Emplastica quæ dicantur                                                  | 2               |
| Emplastrum ex aspidibus                                                  | 940             |
| Emplastrorum uariorum præparatio & coctura, tum quæ in ipsa coniiciuntur | 853             |
| Emplastrorum diuersorum & plurimorum, uarijque usus descriptio           | 916. usque 952  |
| Emprossthotonus quid                                                     | 223             |
| Encanthus quid, curatioq; ipsi                                           | 396             |
| Encauma quid, & eius curatio                                             | 373             |
| Enneapharmacum                                                           | 947             |
| Enneapharmacus pessus                                                    | 1010            |
| Ephemeris efficacia                                                      | 784             |
| Ephestias emplastrum                                                     | 83              |
| Ephialtiæ usus                                                           | 19              |
| Epicauma oculi qd, ei' curatio                                           | 373             |
| Epinyctides quid & quomodo mendedæ                                       | 894             |
| Epithemata quæ post euacuatos corporis humores pro glutino sunt          | 655             |
| Epithematum purgatoriorum compositiones uariæ                            | 170. 171        |
| Epithematum ad capitis dolorem compositio                                | 331             |
| Epithymbrō flos eiusq; facultas                                          | 150             |
| Epithymi facultas                                                        | 32. 150         |
| Equi ortus in cœlo                                                       | 181             |
| Equinæ carnis qualitas                                                   | 102             |
| Equinum lac quale                                                        | 92              |
| Equiseti facultas                                                        | 35              |
| Equitationis modus & usus                                                | 141             |
| Erasistrati panchrestos liquida compositio                               | 416             |
| Erebinthi qualitas                                                       | 32              |
| Ericerum acharistum, collyriū                                            | 423             |
| Ericera etiam alia                                                       | ibidem          |
| Erigeron quali ui                                                        | 33              |
| Erosio unde fiat                                                         | 273             |
| Erypylos siue Herpylos                                                   | 32              |
| Eruca uis                                                                | 32              |
| Eruca pinus potata qualem dolorē inferat                                 | 782             |
| Eruici efficacia                                                         | 56              |
| Eringij qualitas                                                         | 34              |
| Erysimi qualitas                                                         | 32              |
| Erysipelas quis morbus                                                   | 262             |
| Erysipelatis ortus & species quot, earumq; medicamina                    | 892. 893        |
| Erysipelas cerebri                                                       | 318             |
| Erythrodani uirtus                                                       | 32              |
| Eidra antidoti confectio                                                 | 802             |
| Essentia, emplastrum                                                     | 928. 952        |
| Ebrietas, emplastrum                                                     | 928             |
| Euacuare per serū quō deceat                                             | 95              |
| Euacuatione q̄ op' habet, neq; tamē euacuatia ferūt, quō sanandi         | 272             |
| Euacuationis quæ sit mensura                                             | 145             |
| Euacuationum localium tractatio                                          | 172. & deinceps |
| Euphorbij energia                                                        | 153             |
| Euphorbium quod melius                                                   | 118             |

|                                                                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Eutonum collyrium                                                                                                      | 432      |
| Exacerbatio quid                                                                                                       | 230      |
| Exacerbationis particularis & universalis quatuor tēporum, id est, principij, augmenti, uigoris ac declinationis signa | 230. 231 |
| Exedentia medicamenta                                                                                                  | 882      |
| Exercitata omnia in exercitatis meliora                                                                                | 126      |
| Exercitatio qd, eiusq; usus                                                                                            | 138. 139 |
| Exercitationum species                                                                                                 | 139      |
| Exhalationum terræ ratio                                                                                               | 180      |
| Experientiæ certitudo                                                                                                  | 8        |
| Extorsoria quæ sint                                                                                                    | 123. 383 |
| Extergentia alimenta                                                                                                   | 132      |
| Extremæ partes animalium quæ dicantur, earumq; facultas                                                                | 102. 103 |
| Extremitatum ulcera ac callos quomodo sanes                                                                            | 875      |
| Exulcerantia simplicia                                                                                                 | 124      |
| Euchrun collyrium                                                                                                      | 418      |
| Eupatorij uis                                                                                                          | 33       |
| Euphorbij qualitas                                                                                                     | 33       |
| Euzomon quali uirtute                                                                                                  | 32       |

## F

|                                                                                |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| F Abæ facultas                                                                 | 46                                                                       |
| Facies ne à sole aut uento exuratur quomodo illinenda                          | 442. 443                                                                 |
| Faciei rugæ & nigredo quomodo præcaueantur aut tollantur                       | 443                                                                      |
| Faciem nitidam reddentia smegmata                                              | 443. 444                                                                 |
| Faciei lentigines, maculas solares & uaros sanantia                            | 446                                                                      |
| Faciei ficosi tumoribus quomodo medearis                                       | 450                                                                      |
| Fagi facultas                                                                  | 21                                                                       |
| Farinæ crassioris usus                                                         | 45                                                                       |
| Farris præparatio                                                              | 604                                                                      |
| Far clusinum quod                                                              | ibidem                                                                   |
| Fatuitas quid                                                                  | 312                                                                      |
| Fatuitatis origo & cura                                                        | 312                                                                      |
| Fatuitas quo differat à delyrio                                                | ibi.                                                                     |
| Fauonij flatus quando                                                          | 182                                                                      |
| Fauus quid, eiusq; cura                                                        | 343. 916                                                                 |
| Febris quid                                                                    | 230                                                                      |
| Febris continens quæ sit, & quibus peculiaris                                  | 247. 248                                                                 |
| Febris cōtinētis differētiæ tres                                               | 248                                                                      |
| Febris epiala quæ & cur sic dicta                                              | 261                                                                      |
| Febris lipyria quæ                                                             | 262                                                                      |
| Febris tertiana quibus familiarior                                             | 255                                                                      |
| Febris tertianæ rigor quo differat à quartanæ rigore                           | ibidem                                                                   |
| Febris tertianæ exquisitæ dinotio & quæ ita nominetur                          | ibidem                                                                   |
| Febris tertiana extenta, item tertiana dupla quæ dicatur                       | ibidem                                                                   |
| Febris tertianæ exquisitæ & spurie generatio & curatio, item semitertianæ      | 256                                                                      |
| Febrium diuifio                                                                | 243                                                                      |
| Febriū genera & causæ describūtur, tū diætæ & remedia                          | 243. usq; 273                                                            |
| Febrium cognitio & curatio                                                     | 227                                                                      |
| Febris putrida in quibus maximè locis generet, & quas ob causas                | 251                                                                      |
| Febrium putridarum septem iudicationes                                         | 251                                                                      |
| Febris hecticæ descriptio                                                      | 266. & curatio                                                           |
| Febris quartanæ dinotio                                                        | 257. quibusq; familiaris, & quod hominē nō plus quàm semel capiat ibidē. |
| item curatio                                                                   | 258                                                                      |
| Febris ardens quibus notis differat ab exquisita tertiana & continente putrida | 253                                                                      |
| Febris quotidianæ dinotio                                                      | 260. itē curatio                                                         |
| Fellis, id est, flauæ bilis conditio                                           | 97                                                                       |



# AETII INDEX.

Нептар



# AETII INDEX.

|                                      |             |                                      |                                         |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Heptapharmacum                       | 247         | Humorum omnium in corpore æ-         | Infantes stertentes quomodo me-         |
| Hepsema, siræum, sapa, idem          | 4           | qualiter redundantium purgato-       | dendi                                   |
| Heraclij lapidis facultas            | 83          | rij compositio                       | 199                                     |
| Herbæ sabinæ facultas                | 18          | Humorum permixtorum curatio          | Infantium uox intercepta quomo-         |
| Herbæ lanariæ efficacia              | 65          | 735.736                              | do restituatur                          |
| Herinacei marini caro qualis         | 108         | Humorum à capite in uentrem de-      | 196                                     |
| Herinacei marini usus                | 113         | stillantium remedia                  | Infantium dēitio, inflammationes        |
| Herinacei item terrestres            | ibidem      | Hyacinthi temperamentum              | oculorum, albugines, aurium in-         |
| Hermolaus paruus & Hermolaus         |             | Hyadū ortus occasusque               | flammationes, & sirialis quomo-         |
| magnus, collyria                     | 422         | Hyæna tota cocta quid proficiat      | do curentur                             |
| Hermonis emplastrum uiride           | 917         | Hyæne fel quale                      | 199.200                                 |
| Hernia aquosa quid & quomodo         |             | Hyæne pellis usus                    | Infantes quando ablaetandi              |
| generetur, ac curetur                | 849.850     | Hyæne uirtus                         | 203. &                                  |
| Herniæ mēstruorum cura               | 851.852     | Hyderus quid, & eius remedia         | quomodo post ablaetationem pa-          |
| Herniæ inguinis                      | ibidem      | Hydna, tubera                        | scendi                                  |
| Hernia aquosa mulieribus ubi acci-   |             | Hydrocephala affectio quæ, & un-     | ibidem                                  |
| dat, qualis sit, & quomodo medē-     |             | de dicta, eiusq; generatio           | Infantis recens nati sanitas quomo-     |
| dum ei                               | 1021        | 291.292                              | do cognoscatur, item eius educa-        |
| Herniæ inguinis muliebris medica-    |             | Hydromeli præparatio                 | tio qualis sit                          |
| mina                                 | ibidem      | Hydropiperis facultas                | 196                                     |
| Herniæ uaricosæ in mulieris pudē-    |             | Hydrops pro diabete                  | Infantibus spinas aut festucas deuor-   |
| dis curatio                          | ibidem      | Hydrops quid, eiusque differentia,   | atas quomodo eximas                     |
| Herpes quid, & quot eius species,    |             | & causæ 650. tum remedia 651.        | 200                                     |
| item quæ curatio                     | 893         | 652.653.654.655.656.657              | Infantium sternutationes & graue-       |
| Hieræ Rufi præstantia                | 313         | Hydropis subtercutis cura            | dines, tusses, profluuia, alius sup-    |
| Hierarum uariarum iuxta suos au-     |             | Hydrosati præparatio                 | pressa ac pustulæ quomodo curā-         |
| tores compositio                     | 163.164.165 | Hydrus qui & natrix                  | da                                      |
| Hieracitis lapidis energia           | 83          | Hygidiū nardinum collyrium           | ibidem. & 202                           |
| Hippocamporum marinorum usus         |             | 437                                  | Inflammata triplicem sanationem         |
| 113                                  |             | Hygieni aureum collyrium             | habent                                  |
| Hippocrates quomodo aërem pur-       |             | 435                                  | Inflammatiō cerebri                     |
| garit Athenis tēpore pestis          | 269         | Hyoscyami qualitas                   | 317                                     |
| Hippofelini potentia                 | 65          | Hyoscyami dinotio                    | Inflammationis cuiuscunq; reme-         |
| Hippuris qua uirtute                 | 35          | Hyperici efficacia                   | dia                                     |
| Hirci adeps qualis                   | 3           | Hypnon quale                         | 862                                     |
| Hircinæ carnis qualitas              | 102         | Hypnophori solani uis                | Inflammationis oculorum cura            |
| Hircinæ medullæ qualitas             | 109         | Hypocistis quali facultate           | 365                                     |
| Hircini sanguinis uirtus             | 91. 675     | Hypophthalmium quid                  | Inflammationibus incipientibus,         |
| Hircinum seuum quale                 | 109         | Hypopia quid, & cur sic dicta        | quomodo uenæ sectio debeat              |
| Hirudinū deuoratarū noxa quæ         | 383         | Hypopiorum curationes                | fieri                                   |
| Hirundines quando apparere inci-     |             | ibid.                                | 145                                     |
| piant                                | 182         | Hypopiatismus quid, eiusque usus     | Inflammationib. non ualde fruentib.     |
| Hirundinum usus medicus              | 117         | 409                                  | remedia parabilia                       |
| Hispidi pueri quō curandi            | 103         | Hyscas quid                          | 738                                     |
| Hoedi sanguis ad quid conferat       | 91          | Hyslopi temperamentum                | Inflammationum podagricarū cau-         |
| Hoedinum seuum quale                 | 109         | Hystera cur uterus dicatur           | sæ quæ                                  |
| Hoedorum carnis qualitas             | 102         | I                                    | 718                                     |
| Hoedorum ortus & occasus             | 182         | Iasme uel Iasmolæum                  | Inflationis cura                        |
| Holoschoeni constitutio              | 67          | Iasmolæon                            | 817                                     |
| Homini ætati cuique quid exerci-     |             | Iaspachates lapis qualis             | Inflationis uentris causæ & reme-       |
| tij conueniat                        | 103         | Iaspidis uiridis usus                | dia                                     |
| Homo, ceratum                        | 950         | Iaspidis uiridis proprietas          | 565                                     |
| Humanum stercus quale                | 99          | Iaspidis subuirdis                   | Infusionum sedis ratio                  |
| Humectantia alimenta                 | 135         | Iberidis herbæ descriptio, uires &   | 177                                     |
| Humectantium secūdi ordinis enu-     |             | sinapismus eius                      | Inguini inflammato quæ cura con-        |
| meratio                              | 122         | 193.710                              | ueniat                                  |
| Humectationum ratio                  | 188         | Icterus quid                         | 245                                     |
| Humectationis & irrigationis diffe-  |             | Icterus quid, unde dicatur & oria-   | Infaniæ origo & indicia                 |
| rentia                               | ibidem      | tur 645. eiusque cura                | 299                                     |
| Humidissimos, diutissime uiuere      |             | 646                                  | Infaniæ species infinitæ 300. & quo     |
| 224                                  |             | Iecoris animalium qualitas           | modo curanda                            |
| Humidæ temperaturæ præstantia i-     |             | Iecur sycotum seu ficatum            | ibidem                                  |
| bidem                                |             | Iecinoris debilitas, affectionesque  | Infania lupina seu canina qualis,       |
| Humiditatem ex ore quæ trahant       |             | & cura 620. uide Hepatis             | eiusq; indicia & remedia                |
| 173.332                              |             | Ignis sacer, erysipelas              | 307                                     |
| Humor melancholicus, frigidus &      |             | Illicis qualitas                     | Infessionum ratio                       |
| siccus                               | 304         | Illitiones ad tumentes corporis par- | 187.188                                 |
| Humoris, atrabiliarij, biliosi, cru- |             | tes                                  | Infessus in solium ex oleo ratio        |
| di, frigidi generatiua quæ sint      | 128         | Illitiones oculorum uariæ            | 187                                     |
| Humorem euacuantes, & post eua-      |             | 412                                  | Insolationis modus & utilitas           |
| cuatos humores adhibenda ma-         |             | Illitiones præseruatiuæ aduersus fe- | 143                                     |
| lagmata & epithemata                 | 655         | ras                                  | Instrumenti uocalis resolutio quo-      |
| Humores cur non excidant extra       |             | 763                                  | modo curanda                            |
| uasa in febribus continuis           | 250         | Illitionum stomaticarum cōfectio-    | 322                                     |
| Humoribus euacuatis cura quæ cō-     |             | nes                                  | Intemperaturæ ex morbo conflata         |
| ueniat                               | 659         | 477                                  | differunt à naturalibus                 |
| Humorum in podagricis dinotio        |             | Illitionum omnium stomaticarum       | 219                                     |
| 718.719.720                          |             | usus doctrina summaria               | Intemperaturam aliquā diutius per-      |
| Humorum in uentris amplitudine       |             | 478                                  | seuerare impossibile                    |
| & in uentris tunicis sitorum dif-    |             | Imber & uentus quando simul fiant    | 216                                     |
| ferentia                             | 220         | 180                                  | Intertriginis inter scēpora exorta      |
|                                      |             | Imbrium generatio                    | curationes                              |
|                                      |             | 180                                  | 844                                     |
|                                      |             | Impetiginis equorum utilitas         | Intertriginum medelæ                    |
|                                      |             | 110                                  | 896                                     |
|                                      |             | Impetiginosis corporis tumoribus     | Interuallum morbi                       |
|                                      |             | remedia                              | 230                                     |
|                                      |             | 451                                  | Intestina terræ quid                    |
|                                      |             | Incubus quid, eiusque curatio        | 198                                     |
|                                      |             | 308                                  | Intestina tenuia quæ euacuent           |
|                                      |             | Indarium collyrium                   | 174                                     |
|                                      |             | 437                                  | Intestini recti resoluti curatio        |
|                                      |             | Indicum regium collyrium             | 323                                     |
|                                      |             | 434                                  | Intestinatorum ex animalibus quali-     |
|                                      |             | Indici lapidis energia               | tas                                     |
|                                      |             | 83                                   | 103                                     |
|                                      |             | Indurancia simplicia quæ             | Intestinatorum abscessus unde pro-      |
|                                      |             | 123                                  | ueniat, & quomodo curetur               |
|                                      |             |                                      | 598                                     |
|                                      |             |                                      | Intestinatorum tormina, id est, dysen-  |
|                                      |             |                                      | tericæ, quomodo orientur & me-          |
|                                      |             |                                      | deantur 599.603.609. & inde us-         |
|                                      |             |                                      | que 618                                 |
|                                      |             |                                      | Intestinatorum leuor, id est, lienteria |
|                                      |             |                                      | quid, & quomodo curetur                 |
|                                      |             |                                      | 618                                     |
|                                      |             |                                      | Intyborum facultas                      |
|                                      |             |                                      | 35                                      |
|                                      |             |                                      | Ion, id est, uiola, qualis              |
|                                      |             |                                      | 35                                      |
|                                      |             |                                      | Ios xystos qualis                       |
|                                      |             |                                      | 87                                      |
|                                      |             |                                      | Ionthi, id est, uari faciei quomodo     |
|                                      |             |                                      | curandi                                 |
|                                      |             |                                      | 449                                     |
|                                      |             |                                      | Iordanes fluuius                        |
|                                      |             |                                      | 7                                       |
|                                      |             |                                      | Irinum oleum                            |
|                                      |             |                                      | 28                                      |
|                                      |             |                                      | Irionis facultas                        |
|                                      |             |                                      | 32                                      |
|                                      |             |                                      | Irrigationum ratio                      |
|                                      |             |                                      | 187                                     |
|                                      |             |                                      | Irrigationis & humectationis diffe-     |
|                                      |             |                                      | rentia                                  |
|                                      |             |                                      | 187                                     |
|                                      |             |                                      | Isatis                                  |



Ifatis utraq; qua ui prædita 36  
 Ifchiadici qui dicantur, & quomo-  
 do ipforū morbus oriatur ac un-  
 de 707  
 Ifchiadicorū auxilia 708. usque 717  
 Ifchiadic. uftionis modus 710  
 Ifidori Memphitæ collyrium 433  
 Ifij uirtus 152  
 Ifis, uiride emplastrum Hermonis  
 917  
 Ifophoton collyrium 429  
 Isotheon collyrium 429  
 Iſoſ quali uirtute 35  
 Ifchuria quid, & eius auxilia 686  
 Itea, falix quali uirtute 36  
 Iudæi emplastrum 935  
 Iudaicus lapis qualis 81  
 Iudicationis morbi modus & signa  
 232. & deinceps  
 Iudicationis euētus quomodo præ-  
 noſcendus 232  
 Indicatorij dies qui boni & qui ma-  
 li 233  
 Iulides piſces quales 107  
 Iunci acuti qualitas 67  
 Iunci leuis temperamentū ibidem  
 Iunci odorati facultas 47  
 Iunci rotundi qualis flos 67  
 Iuniperi uirtus 15  
 Ixiæ efficacia 787  
 L  
 Labiorum fiſſuris remedia 456  
 Labrum ueneris quale 20  
 Lac optimum quod 128.129  
 Lac cur febricitantibus nociuū 131  
 Lac generantia ac mouentia 173  
 Lac uitiatū quomodo mamas lædat,  
 & quomodo curandum 977  
 Lac ad quid utile 92.93  
 Lac quibus conueniat 93. quibus  
 non 94  
 Lactis utendi ratio 93  
 Lactis coctura 94.96  
 Lactis ſerum quale 94  
 Lactis acidi qualitas 96  
 Lactis concreti conditio ibidem  
 Lac primarium quod 96  
 Lac pyriaton uel pyriephthon quod  
 ibidem  
 Lactis nutritis probatio 197  
 Lactis uſus & differentiæ uarię 92.93  
 Lactis coagulati mala, eorūque re-  
 media 789  
 Lactis defectui quomodo ſuccur-  
 rendum 976  
 Lac in mammis ne grumeſcat ibidē  
 Lacti in mammis coagulato quomo-  
 do medendum ibidem  
 Lactis purgatorij compositio 158  
 Lacti quæ in coctione admiscēt 96  
 Lacti nutriti deficienti, aut tenui,  
 ſeu craſſiori facti, quomodo me-  
 dendum 198  
 Lactis item alijs uitijſ ibidem  
 Lactuæ facultas 34  
 Lagophthalmi qui, & eorum medi-  
 camenta 363.367  
 Lanæ lotæ, puræ, ſuccidæ, & uſtæ  
 quis uſus & quō uenda ſit 110  
 Lapathi uis 48  
 Lapis Phrygius 82  
 Lapidum uariorū nomina & faculta-  
 tes medicæ 80.81.82.82.83.84.85  
 De lapidibus omnibus generalis do-  
 ctina 80  
 Lapides qui emplaſtris immittan-  
 tur 856  
 Lapidis ſpecularis uirtus 87  
 Lapidis qui nec atteri nec excerni  
 poteſt curatio 679  
 Lapidibus exectis quæ diætā conue-

niat ægroto ibidem. & 680  
 Lapides ne aut naſcantur, aut rena-  
 ſcantur, diætā 671  
 Lapides. uide Calculos  
 Lappæ qualitas 55  
 Lapaſanæ qualitas 48  
 Lapſorum ex alto remedia 790  
 Laſer qualis facultatis 56  
 Laſſitudinum uariæ ſpecies, & ua-  
 rię curationes 207.208.209.210.  
 211.212  
 Laſſitudinum ſpontaneorum ſpe-  
 cies tres 210  
 Lauri facultas 20  
 Laurinum oleum 23  
 Lathyri & Lathyris qualis 48.152  
 Leæna emplaſtrum 713  
 Leniſ facultatis quæ ſint 423.424  
 Leoninum ſeuum 109  
 Leonis ſtella illuſtris quando occi-  
 dat 182  
 Leontiaſis quid, & cur ſic dicta, ac cu-  
 ra ipſius 810.811  
 Leontopetali qualitas 49  
 Leontopodij uirtus 49  
 Lens ſtagnorum ſeu paluſtris cuius  
 qualitatis 70  
 Lentæ qua facultate 69  
 Lenticulæ coctura qualis 134  
 Lentiginibus faciei medentia 446  
 Lentiſci temperamentum 67  
 Lentiſcinum oleum 23  
 Lepidij qualitas 49.193  
 Lepis duplex, & qualis 87  
 Leporis capitis uis medica 110  
 Leporinæ carnis qualitas 102  
 Leporini coaguli præſtantia 97  
 Lepus marinus qualis & quā ue-  
 nenatus 722  
 Lepra quo differat ab alpho, leu-  
 ce, ſcabiæ & impetigine ſylueſtri  
 829.830  
 Lepræ remedia plurima 829.830  
 Lepræ generatio 829  
 Lethargus unde cauſetur 295. quæ  
 habeat accidentia, & quomodo  
 curandus 295.296  
 Lethargus & caros quomodo dif-  
 ferant 298  
 Leucacanthæ facultas 11  
 Leucanthemi facultas 150  
 Leuce, populus alba 49  
 Leuce quid, & unde, ac cur ſic dicta,  
 eiſque medelæ 827.828  
 Leuce quomodo differat à lepra &  
 ab alpho 830  
 Leucographis lapis 77.81  
 Leucophyllon unguentum 1026  
 Leucoij uirtus 49  
 Libanoti qualitas 49  
 Libanoti fuligo qualis 49  
 Libanotidis temperamentum 50  
 Libidiniſ extinctæ prouocamenta  
 703  
 Libræ in ſuas partes diuiſio 1030  
 Libyana collyria quæ dicantur 424.  
 & qualia 426  
 Lichen ſeu muſcus petrarum 49  
 Lichen morbus, ſui nominis herba  
 curatur ibidem  
 Lienis affectionum cognitio 631  
 Lienis animalium qualitas 103  
 Lienis intemperierum cura 632.  
 inflationis 633. & inde  
 Lienoſorum uſtio & diætā, tum iu-  
 xta morbi uarietatem curationes  
 643.644.645  
 Lienteria quid, & quomodo curan-  
 da 618  
 Ligamentorum induratorum me-  
 delæ 909

Lignorum cariei aut putredinis u-  
 ſus 62  
 Lignyos facultas 50  
 Liguſtici uſus 50  
 Liguſtri qualitas 47  
 Liliij temperamentum 45  
 Liliaceum oleum 25  
 Limniſcorum uſus 293  
 Lingua aſperitas quomodo curan-  
 da ſit 278  
 Lingua principium & finis intera-  
 neorum eſt 279  
 Lingua inflammata, deſquamata &  
 tumentis remedia 471  
 Lingua reſolutæ curatio 321  
 Lini ſeminis uis 50  
 Linozoſtis qualis 50  
 Lini ſeminis oleum 22  
 Lipothymia quid, eiſq; cauſæ 274  
 & quomodo differat à ſyncope  
 ibidem  
 Lippitudiniſ in febrib; curatio 280  
 Lippitudiniſ ſpecies & curatio 401  
 Lipyria febris quæ 262  
 Liqueſcieri quid 75  
 Liquidorum collyriorū deſcriptio-  
 nes 415. & inde  
 Litri ſpumæ qualitas 86.88  
 Lixuij facultas 43  
 Lobi quales 20  
 Loculus, uide Secunda  
 Locuſtæ uſus in medicina 114  
 Localium euacuationum tractatio  
 172. & inde  
 Lolij uirtus 10  
 Lonchitis ad quid conducatur 50  
 Lopima, caſtanæ 21  
 Loquentium difficulter affectio du-  
 plex, item quæ remedia ipſis con-  
 ueniant 470  
 Lotiarboris qualitas 51  
 Loti herbæ facultas 51  
 Lucernarum oleum 22  
 Lucij malagma ad articulos diſtor-  
 tos 737  
 Lumborum doloris curatio 282  
 Lumbricorum generatio, diuerſi-  
 tas & remedia 594  
 Lumbricus latus quid, unde gene-  
 retur & curetur 597  
 Lumbricos educentia 176.179  
 Luna ſecundum menſem quatuor  
 differentiis in aëre operatur 180  
 Lupi piſcis qualitas 106  
 Lupini qualitas 34  
 Lupinus erraticus 34  
 Lupini ſtercoris qualitas 100  
 Lupinus morbus qualis 307  
 Luxatorum membrorū curatio 897  
 Lycij deſcriptio 50  
 Lycopſos, Anchusæ ſpecies 9  
 Lycos, paſtillus 614  
 Lymonij uires 49  
 Lyncurij facultas 84  
 Lyræ ortus, occaſusq; 182  
 Lyſimachium quæ 51  
 Lythargyri uis 88

M  
 Acer quid & qualis 51  
 Macies & tabes oculorū quid  
 & quomodo differant, curen-  
 turq; 393  
 Maculis ſolarib. cōmoda 406.407  
 Madaroſis quid 364.368  
 Madefieri quid 75  
 Mænularum muriæ uſus 108  
 Mænularum capitum quæ uirtus  
 109.116  
 Magneris lapidis efficacia 83  
 Magos emplaſtrum 83.655  
 Magnum collyrium 428  
 Malaba



# AETII INDEX.

Malabathri folium quale 51  
 Malabathri foliū qd̄ præstātius 119  
 Malabathrinum oleum 30  
 Malaches uirtus 51  
 Malagmata humorē euacuātia 655  
 Mali Armeniacæ qualitas 53  
 Mali Medicæ facultas ibidem  
 Mali nauis occasus 182  
 Mali punici qualitas 62  
 Mali persicæ proprietates 53  
 Malorum in genere tractatio 53  
 Maluæ efficacia 51  
 Maluæ syluestris energia 153  
 Malua syluestris, ebiscus 21  
 Malus habitus corporis quid, eius  
 que indicia & remedia, tum in  
 quos morbus transeat 649  
 Mammis ob lactis abundantia tur-  
 gētibz quomodo auxiliādū 976  
 Mammarum inflammatarum reme-  
 dia 977  
 Mammarum inflammationum in-  
 duratarum medicinæ ibidem  
 Mammarum abscessuum, fistularū,  
 ulcerum depascentium, ac cācro-  
 rum curæ 979.980  
 Māmarū induratarū medelæ 983  
 Mandragoræ uis 51.786  
 Manna quid, & quomodo differat  
 à thure 383  
 Manus emplastrum 948  
 Man zizanion, colocasion 42  
 Marasimus quid 267  
 Marathri facultas 51  
 Marciaton unguentum 744  
 Mare mortuum 7  
 Marrubij uires 60  
 Masculo gignēdo quid agēdū 976  
 Mastichati præparatio 1018  
 Mastiche duplex & qualis 52  
 Mastiche, lentisci resina 173  
 Mastiche, resinarū præstātissima 61  
 Mastichinum oleum 26  
 Masuaphij confectio 809  
 Matrix. uide Vterus  
 Maza quid 45 (tate 45)  
 Maturitas fructuum ex solis calidi-  
 Meconis natura 52  
 Meconis ceratitidis qualitas 53  
 Meconium quid 197  
 Media quæ sint in quatuor qualita-  
 tibus 120.122  
 Medica siue citrea malus qua-  
 lis 53  
 Medicamentorū quæ sint qualita-  
 tes ex uirtute simpliciu 125. & ide  
 Medicamenta purgantia componē-  
 di methodus 153  
 Medicamenti ex papaueris capiti-  
 bus præparatio & usus 286  
 Medicamentorū electio, quæ tradit  
 quæ sint præstantiora 117. & inde  
 Medicamentorum qualitatū or-  
 dines quatuor 1  
 Medicamentorum diuisio, & qua-  
 litates 3  
 Medicinæ practicæ duæ partes ma-  
 ximæ quæ 195  
 Medicinæ, naturæ operum esse gna-  
 tum debere 227  
 Medullæ usus ex animalibus 109  
 Medullarū differētia efficaciaq; 109  
 Medullarum quæ optima 119  
 Megaleum oleum 27  
 Mei radicum usus 54  
 Melamphylli facultas 11  
 Melan quale 88  
 Melancholiæ generatio & uarietas,  
 indiciaque 302.303  
 Melancholiæ species quot 303. eius  
 quæ sit cura ibid. & 304.305.306

Melancholici qui dicantur 164  
 Melancholici cur plures cibos ap-  
 petant &c. 303  
 Melancholicus sanguis nū cerebrū  
 tantū, an totū corpus occuparit,  
 quomodo cognoscas 304  
 Melantheria qualis 88  
 Melantheriæ exploratio 119  
 Melanthij qualitas 52  
 Melanthij noxa 790  
 Meleæ armeniacæ proprietates 53  
 Meleæ persicæ qualitas 53  
 Meliceridum remedia 405  
 Meliceris qualis affectio, & cur sic  
 dicta 343  
 Meliceridis puerorum cura 202  
 Meliloti uires 52  
 Melines qualitas 32  
 Melinum oleum 24  
 Melystophyllon, quale 52  
 Melitites lapis qualis 80  
 Mellis facultas 52.854  
 Mellis emollientis præparatio 157  
 Mellis rosacei cōpositio 155. & 288  
 Mellis in Heraclæa Pontinati pro-  
 prietas 785  
 Melli quō adimat extensoria uis 52  
 Memæcydon quid 43  
 Membranam cerebri sauciata quæ  
 glutinent 327.328  
 Membrorū resolutorum cura 323  
 Memoria amissæ differentia & re-  
 media 312.313  
 Mendesium oleum 27  
 Mensis cuiuslibet quatuor esse dif-  
 ferentias secundum lunam 180  
 Menses quibusdam mulieribus sup-  
 primi naturaliter, aut præter na-  
 turā 984  
 Menses qua ætate fluere incipiant  
 & desinant ibidem  
 Menstruis purgationibus quæ mu-  
 lieres careant ibidem  
 Menstrua quibus de causis suppri-  
 mantur, & quomodo curēt ibid.  
 Menstruis quæ non purgantur, qui-  
 bus accidetibus obnoxia sint 985  
 Menses ducentia remedia 986  
 Menses quibus mulierib. non fluūt,  
 uel ob plenitudinem, uel ma-  
 ciem, uel uiciatos humores, uel  
 ob sanguinis ad nares, aut sedē  
 delationē: uel ob nimium otium  
 aut aliquam uteri affectionem,  
 remedia 987.988  
 Mensium stillicidij medicinæ 989  
 Mensiū nimia purgationi quomo-  
 do subueniendum 990  
 Menses quæ ducant in potu sum-  
 pta 176  
 Mensium fluxu morbum sæpe fuisse  
 solutum 240  
 Menstruæ mulierum purgationis  
 ratio 957  
 Menstruæ purgationis in uirgini-  
 bus indicia 958  
 Mensura quomodo iudicetur 1031  
 Mensurarum liquidorum descri-  
 ptio 1031  
 Mensurarum notæ 1031  
 Metiendæ quantitatis differentias  
 esse tres ibidem  
 Mentæ facultas 33  
 Menti papulas manātes quomodo  
 cures 451  
 Menti scabriei medela 446  
 Mercurij herbæ usus 57  
 Mercurialis quali uirtute 50.  
 152.153  
 Mergi uentriculus ad quid utilis 111  
 Merula piscis qualis 107

Mespili natura 53  
 Metallī aliūsiue similis rei degluri-  
 tionis remedia 609  
 Metallica quæ dicantur, & quæ eo-  
 rum uirtus 85. & inde  
 Metopium oleum 27  
 Metasyncritica quæ dicantur 690  
 Metasyncritica curatio 194  
 Metra cur uterus dicatur 861  
 Miliaris, species herpetis quid, &  
 quomodo medenda 893.894  
 Milij constitutio 39  
 Milphosis quid, & unde dicta 364.  
 403  
 Miltos, id est, rubrica 78  
 Minthe, quæ menta 33  
 Miscendorum medicamentorū quæ  
 sit ratio 153  
 Misy quale 88.855  
 Mola uteri quid, unde dicta, quæ  
 affectiones eam consequantur, &  
 quomodo curentur 1006.1007  
 Molares dolentes quomodo citra  
 forcipem tollas 112  
 Mollientia simplicia quæ 123  
 Mollium piscium qualitas 107  
 Moly quale 54  
 Molybdenæ & molybdi usus 88  
 Moni collyrium 431  
 Monohæmera collyria 419  
 Monomelum collyrium 420  
 Morbi prima dies quæ dicatur 229  
 Morborum principium trifariam  
 dici 229.230  
 Morbi principium, augmentum, ui-  
 gor & declinatio quæ & quomo-  
 do dinoscantur 230.231  
 Morborum causæ quomodo consi-  
 derandæ 205.206  
 Morborum perfectæ aut imperfectæ  
 solutorum signa 242  
 Morbum recte curari non posse ci-  
 tra ipsius prænotationem 228  
 Morbus utrum tardius aut citius  
 iudicetur 231. item an iudicari  
 possit, quomodo & quando præ-  
 noscatur ibidem  
 Moroxus lapis cuius uirtutis 81  
 Morsus hominis medela 759  
 Morsus canis 760  
 Morsui leonum, pantherarum, aut  
 urforum antidoti 761  
 Morsus suum, felis, crocodili, & be-  
 stiarum uenenatarū remedia 762  
 Morsui stellionis, salamandre, lacer-  
 tæ, chalcitidis, murisq; aranei me-  
 dentia 766  
 Morsuum aspidis & uiperæ utriusq;  
 remedia 770  
 Mortem non esse prædicendam in  
 acutis morbis 243  
 Mortis & diem & horam præno-  
 scere posse doctum medicum  
 241.242  
 Mortis signa ex atræ bilis motu  
 239  
 Morus & mora 54  
 Moschatorum unguentorum com-  
 positiones 1025  
 Motus externus & internus qui di-  
 cantur 234  
 Mucus ex qua nasi parte excole-  
 tur 357  
 Mugil qualis piscis 106  
 Mulieris uirilis notæ 984  
 Mulierum quæ non purgantur acci-  
 dentia & remedia 985  
 Mulierum fecundarum dinotio  
 958  
 Muliebres purgationes sæpe solue-  
 re morbum 140  
 Mulus



# AETII INDEX.

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Mulus qualis piscis                                            | 106    |
| Muralij siue Muralis herbe uirtus                              | 31     |
| Murenæ morsus medela                                           | 778    |
| Muriæ uis medicamentaria                                       | 108    |
| Muscæ æreæ quæ dicantur                                        | 413    |
| Muscas necantia                                                | 778    |
| Musci marini facultas                                          | 19.70  |
| Muscium, aliàs Dorcadias                                       | 354    |
| Muscus arborum qualis                                          | 19     |
| Muscus petrarum                                                | 49     |
| Mustati olei præparatio                                        | 1028   |
| Mustellarum usus medicus                                       | III    |
| Musti usus                                                     | 55     |
| Mutum, emplastrum                                              | 935    |
| Myacanthus, qui asparagus                                      | 15     |
| Mycetes quales                                                 | 55     |
| Mydryasis quid                                                 | 364    |
| Mydryasis quid, eiusq; cura                                    | 392    |
| Myle quid, & eius usus                                         | 49     |
| Myocephalō quid, & cur sic dictū, & quomodo differat à pustula | 380    |
| Myopes quæ dicantur                                            | 388    |
| Myopiam esse incurabilem.                                      | ibid.  |
| Myos otis qualis                                               | 54     |
| Myricæ usus medicus                                            | 54     |
| Myrmecia unde dictæ                                            | 17     |
| Myrobalani facultas                                            | 16     |
| Myrobalaninum oleum                                            | 23     |
| Myrrhæ temperamentum                                           | 65.857 |
| Myrrhæ dinotio                                                 | 119    |
| Myrrhatio ad cadauerum conseruationem                          | 1030   |
| Myrsine siue myrtus                                            | 54     |
| Myrteum oleum                                                  | 26     |
| Mysterium, alio nomine tetrapharmacum                          | 754    |

N

|                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>N</b> Apy quale                                                              | 55          |
| Narcissi uirtus                                                                 | 55          |
| Narcissinum oleum                                                               | 26          |
| Nardi celticæ uirtus                                                            | 55          |
| Nardi cretici conditio                                                          | 70          |
| Nardi spicæ facultas                                                            | 55          |
| Nardinum oleum & eius præpara-<br>tio                                           | 28.29       |
| Nardinum secundarium                                                            | 28          |
| Nardostachi quale                                                               | 55          |
| Naribus ulceratis quæ cõueniât                                                  | 350         |
| Narium affectionum tractatio                                                    | 352         |
| & inde                                                                          |             |
| Narium muci remedia                                                             | 495         |
| Narium obturationis medelæ                                                      | 357         |
| Nariũ ulcera quomodo cures                                                      | 356.        |
| 357 item sanguinem fluentem<br>ibidem                                           |             |
| Narthex qualis                                                                  | 55          |
| Nasus quomodo cõstructus sit                                                    | 357         |
| Nasturtij facultas                                                              | 38          |
| Nauseæ origo & cura                                                             | 539. & inde |
| Nausearum cataplasmata & epithe-<br>mata                                        | 543         |
| Nauseas, esse communia accidentia<br>omnium redundantium in uen-<br>tre humorum | 220         |
| Natrix qualis                                                                   | 776         |
| Naturalium operum per se nullum<br>esse nocuum                                  | 141         |
| Naxiæ cotis retrimenti uis                                                      | 83          |
| Nechepfi regis ad carnem in nari-<br>bus enatam medicamētum                     | 355         |
| Nechepson Aegyptius                                                             | 14          |
| Nerij efficacia                                                                 | 55          |
| Neruorum sauciatorum cura                                                       | 859         |
| Neruorum contusorum cura                                                        | 861         |
| Nicarium Zoili collyrium                                                        | 436         |
| Nictalopes qui dicantur & quomo-<br>do curandi                                  | 388         |
| Nigellæ uis                                                                     | 52          |
| Nilamnon collyrium                                                              | 426         |
| Nilei epithema                                                                  | 551         |
| Nili aquæ præstantia                                                            | 183         |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Nili collyrium                     | 428     |
| Nitri qualitas                     | 856     |
| Nitri spumæ uis                    | 86.87   |
| Nitrosa balnea quibus conueniant   |         |
| 185                                |         |
| Niuis generatio                    | 180     |
| Noctis quatuor esse differētiās    | 180     |
| Nommarum oculi remedia             | 378     |
| Nubecula oculi quid, eiusque cura  |         |
| 373                                |         |
| Nucis arboris qualitas             | 38      |
| Nucis pineæ uis                    | 48      |
| Nuclei pinei quales                | 59      |
| Nucum oleum                        | 23      |
| Nux auellana                       | 39      |
| Nux iuglans seu regia              | 38      |
| Nux parua, auellana                | 39      |
| Nux pontica, auellana              | ibidem  |
| Nux pinea seu picea                | 59      |
| Nutricis electio & uictus, tum ex- |         |
| ercitia                            | 197.198 |
| Nutrientia multum & item parum     |         |
| quæ sint                           | 128     |
| Nympha quid, & eius sectio         | 1022    |
| Nymphææ qualis actio               | 55      |

**O** Bducentium meatus medicamen-  
torum qualitas 3  
Obfuscatio oculorum quid & unde, curatioque ipsius 390.391  
Obolum continere filiquas tres 323  
Obscuratio oculorum quid 364  
Obturantia, aut obturatione liberantia 132  
Occidentalium uentorum qualitas 181  
Ochrorum facultas 70  
Oculorum obscurationis in febris. remedia 281  
Oculorum infantium inflammacionibus quid conueniat 200  
Oculos quæ pungent, & lachrymas prouocent 172  
Oculos humectos & flentes quomodo cures 407  
Oculorum lippientium cataplasmata 411  
Oculorū illitiones & collyria 412. 413. 414. 415 & inde  
Oculorū ulcera cancerata, itē maligna quomodo curētur 378.379  
Oculorum ulcerib. quomodo cicatricem inducas 382  
Oculorum cicatrices & albugines quomodo curandæ. ibidē & 383  
Oculos glaucos quomodo nigricantes facias 385  
Oculorum fluxionibus, suppuracionib. ficosis eminentijs 387  
Oculi debiles qui dicantur, debilitatisq; curatio, & quomodo differant a fluentibus 388  
Oculorum hebetudo & obfuscatio quid, quomodoq; curanda 379  
Oculorum resolutio, & ipsius curatio 391. item quæ curabilis & quæ non ibidem  
Oculorum macies, expressio & confusio quid, quomodoq; curentur 383.384  
Oculi albis innata quomodo tollenda 394.395  
Oculorum quæ sit natura 363  
Oculi singulæ partes quot & quibus affectionibus infestētur ibi.  
Oculi humores tres ibidem  
Oculorum perturbationis cura 364  
Oculorū inflāmatiois medela 365  
Ocularium morborum curæ uariæ 364.365.366.367.368.369

Oculorum frigida intemperiei cura-  
ratio 369  
Oculorum inflationis, tumoris, &  
tumoris indurati cura 369. 370  
Oculorum ulcera, & ulcerationes  
ab igne, item si qua oculis illapsa  
fuerint, quō curanda 370. 371  
Oculis infixa quomodo extrahan-  
tur 371  
Oculorum sugillatio, punctura &  
uulnera profundiora quomodo  
curentur 372  
Oculi humor ouiformis quomodo  
exiccandus 373  
Oculi prolapsus, item ulcerationū  
superficialium, nubeculae, caligi-  
nis, epicaumatis & encaumatis  
curatio 373. 374  
Oculorum argemum, fossulae, con-  
caua ulcera, tum suppuratio &  
unguis quomodo sananda 374  
Oculi pustularum origo, dinotio,  
curaq; 375. 376  
Oculorum nomae quomodo cu-  
randa 378  
Ocymi basilici constitutio 72  
Odoramentorum uariorum com-  
positio 1025  
Odoratus & gustus conspiratio 8  
Odoratus oblaesionis medelae 357  
Odorum corpus reddentia, & odo-  
rem corporis foetentem tollen-  
tia 445  
Oenanthariorum uariorum con-  
fectio 1027  
Oenanthe quid 23  
Oenanthinum oleum 23  
Oenos, uinum 55  
Oesypi praeparatio 948  
Oesypi praeparatio, & usus 101  
Oleae qualitas 21  
Olei uirtus & quid proprie 22  
Olei purgatorij compositio 171  
Oleorum salca, foliati, & spicati praeparatio 1026  
Oleum alenum 398  
Oleorum diuersorum praeparatio-  
nes & qualitates describuntur pa-  
gina 22 & deinceps  
Oleum amaracinum 27  
Oleum amygdalinum 23  
Oleum anethinum 25  
Oleum chamamelinum 25  
Oleum cicinum 22  
Oleum cyprinum 27  
Oleum foeni graeci 25  
Oleum foliatum quomodo fiat 30  
Oleum lasma dictum 26  
Oleum irinum 28  
Oleum malabathrinum 30  
Oleum laurinum 23  
Oleum lentiscinum 23  
Oleum liliaceum seu lirinon 25  
Oleum lini seminis 22  
Oleum mastichinum 26  
Oleum megaleum 27  
Oleum melinum 24  
Oleum mendesium 27  
Oleum metopium 27  
Oleum myrobalaninum 23  
Oleum myrteum 26  
Oleum narcissinum 26  
Oleum nardinum Cyzicenum 28  
Olei nardini praeparatio 28. 29  
Oleum nucum 23  
Oleum oenanthinum 23  
Oleum populi nigrae 22  
Oleum raphaninum 22  
Oleum rosaceum 24  
Oleum sabinum 22  
Oleum salcas 29  
Olei



# AETII INDEX.

|                                    |                               |                                         |                                  |                                      |                                      |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Olei sampsuchini præparatio        | 212                           | positiones                              | 158                              | Paroxysmi quatuor esse tempora       | 230.231                              |
| Oleum sesaminum                    | 23                            | Oxychoenos qualis                       | 67                               | Paroxysmi particularis ac uniuer-    | lis, id est, principij, augmenti, u- |
| Oleum sicyonium                    | 27                            | Ozænarum ortus & cura                   | 352.353.                         | goris, & declinationis signa         | 230                                  |
| Oleum styracinum                   | 26                            | 354.355.356                             |                                  | Parthenij proprietates               | 31.150                               |
| Olei suffumigabilis præparatio     | 30                            | P                                       |                                  | Parientes quomodo in enixu se ge-    | rere debeant                         |
| Oleum susinum                      | 25                            | Paccianum collyrium                     | 435                              | Partus instantis indicia             | 951                                  |
| Oleum telinum                      | 25                            | Paccijs asclepiadum.                    | 429                              | Pasiphilum, medicamentum sic-        | cum                                  |
| Oleum uiolatum                     | 26                            | Pæderotis uires                         | 11                               | Pastilli ex acacijs & ueratri com-   | positio                              |
| Olerum nullum esse boni succi      | 130                           | Pæoniæ facultas                         | 19                               | Pastilli flauam bilem purgantis com- | positio                              |
| Oliuarum esus qualis               | 126.127.128                   | Pæoniæ antidoti compositio              | 804                              | Pastillorū ad hemicranias & omnes    | capitis dolores compositio           |
| Oliuarum purgatoriarum compo-      | sitio                         | Pæoniæ radices uis                      | 311                              | Pastillorum scilliticorum præpara-   | tio                                  |
| Oliuarum salfarum uirtus           | 133                           | Palati remedia                          | 471                              | Pastillorum theriacorum præpara-     | tio                                  |
| Olympionici collyrium              | 423                           | Paliuri facultas                        | 57                               | Pastillus Cyri archiatri Edeffe ad   | ozænas                               |
| Omotribes oleum                    | 22                            | Palmae temperamentum                    | 70                               | Pastinaca, daucus                    | 20                                   |
| Omphacij & aceti differentia       | 5                             | Palpebrarum morborum omnige-            | narum differentia & curatio-     | Pastinacæ uirtus                     | 65                                   |
| Omphacinum oleum                   | 22                            | nes                                     | 386                              | Pastinacæ caro qualis                | 108                                  |
| Omphacomelitis præparatio          | 288                           | Palpebrarum sutura quomodo fiat         | tam sursum quam deorsum          | Pastinacæ marinæ uulneris reme-      | dia                                  |
| Omphacocarpos, quæ Aparine         | 14                            | 340                                     |                                  | Patos quæ sordes                     | 62.98                                |
| Onochilos, Anchusæ species         | 9                             | Palpebræ euerfio qualis & eius cu-      | ratio                            | Paulina antidotus Aristarchi         | 517                                  |
| Onoclea, Anchusæ species           | 9                             | 340                                     |                                  | Pauonis caro qualis                  | 104                                  |
| Operis huius institutum            | 8                             | Palpebrarum concretio & contra-         | ctio quomodo sananda             | Pectus purgantia                     | 173                                  |
| Ophiasis qualis affectio, & unde   | proueniat, quomodoque curetur | 334                                     |                                  | Pedicularis morbi generatio & cu-    | ratio                                |
| Ophitis lapidis energia            | 83                            | Palpebrarum pediculis & pilis quo-      | modo medendum                    | Pediculorum in palpebris origo &     | curatio                              |
| Opisthobares collyrium             | 432                           | ibidem                                  |                                  | Pediculorum capitis & totius corpo-  | ris remedia                          |
| Opisthotonos quid                  | 323                           | Palpebræ pilorum ordo duplex &          | multiplex                        | Pediculos omnis generis circa cor-   | poris superficiem deuastantia        |
| Opos qualis                        | 56                            | ibidem                                  |                                  | Pegani uirtus                        | 58                                   |
| Opopanax qualis                    | 57.857                        | Palpebrarum aspritudines unde fiât      | & quomodo curentur               | Pelagiæ patritiæ sapo                | 444                                  |
| Opopanax fructus qui               | 66                            | 386                                     |                                  | Pelaria collyria                     | 431.432                              |
| Orchestæ unguentum                 | 745                           | Palpebrarum ganglia, atheroma-          | ta, steatomata, melicerides, ua- | Pelecinus qualis                     | 33                                   |
| Orchis cynos qualis                | 56                            | rices & reliqua mala quomodo            | cures                            | Pellium animalium qualis usus        | 110                                  |
| Orchis altera                      | ibidem                        | 405                                     |                                  | Pentamæron unguentum                 | 745                                  |
| Ordei facultas                     | 45                            | Palpebrarum abscessus & calculi cu-     | ra                               | Pentaphilli facultas                 | 57                                   |
| Ordeoli tuberculi sedes            | 377                           | 403.404                                 |                                  | Pentatheton emplastrum               | 949                                  |
| Ordeoli oculorum cura              | 404                           |                                         |                                  | Pentorobos, aliâs pæonia             | 19                                   |
| Orientalium uentorum qualitas      | 181                           | Palumbi sanguis ad quid conferat        | 91                               | Peplij usus                          | 57                                   |
| Origani uires                      | 56                            | Pampathes emplastrum                    | 938                              | Peplij uirtus quæ sit                | 150                                  |
| Orionis ortus                      | 182                           | Pamphili Episcopi suffumigium           | 1030                             | Peponis facultas                     | 57                                   |
| Oris foetori remedia               | 455                           | Panacæa emplastrum                      | 936                              | Perca piscis qualis                  | 107                                  |
| Oris illitionum, quæ stomaticæ di- | cuntur, descriptiones & usus  | 477                                     |                                  | Perdiciū quali ui                    | 31                                   |
| Oris inflammationū remedia         | 476                           | Panacis radicem & succi explora-        | tio                              | Perdicum esus quomodo conue-         | niat                                 |
| Orobanchæ temperamentum            | 56                            | 119                                     |                                  | Perdicum quale fel                   | 98                                   |
| Orobi facultas                     | ibidem                        | Panax Herculeus                         | 57                               | Perfusionis usus & ratio             | 188                                  |
| Orophe Siris, crocodilias          | 667                           | Pancratij temperamentum                 | 57                               | Peripneumonicorum affectio & re-     | media                                |
| Orthopnoici qui, & unde fiant, ac  | quomodo curentur              | 501                                     |                                  | Peristereonis qualitas               | 58                                   |
| Oryzæ actio                        | 56                            | Panchreston fuluum collyrium            | 434                              | Periscyphisinus quid, & eius ra-     | tio                                  |
| Oscula uasorum aperientia simpli-  | cia quæ sint                  | 123                                     |                                  | Peritonæon quid                      | 626                                  |
| Ossium lasitudo quæ                | 208                           | Panchrestos Erasistrati, cur sic appel- | lata                             | Pernionum medicinæ                   | 898                                  |
| Ossium ustorum uis quis            | 110                           | 349.416                                 |                                  | Perseæ foliorum facultas             | 58                                   |
| Ostracitis lapidis uires           | 83                            | Pani circa quam oculi partem pro-       | ueniant                          | Pes cornicis quali uirtute           | 43                                   |
| Ostracodermorum qualitas           | 107                           | 377                                     |                                  | Pestis futuræ signa                  | 269                                  |
| Ostreorum testarum usus            | 116                           | Panicum quale                           | 32                               | Pestilentes morbi qui dicantur, &    | unde generentur, tum quomodo         |
| Osyridis uirtus                    | 57                            | Panis usus in cataplasmate              | 190                              | cauere liceat                        | 268.269                              |
| Ocium quantum obsit sanitati       | 126                           | Panum ordeaceorum qualitas              | 45                               | Petri Archiatri collyrium            | 433                                  |
| Oua animalium qualia 105. item uis | medica ibidem                 | Papaueris qualitas                      | 52                               | Petroselinum quale                   | 58                                   |
| Oui candidum quale                 | 3                             | Papaueris cornuti uis                   | 53                               | Peucedani uires                      | 58                                   |
| Ouorum iuxta cocturam quæ me-      | liora & quæ deteriora         | 105                                     |                                  | Phaci, id est, lentes                | 69                                   |
| Ouillæ carnis temperamentum        | 102                           | Papaueris succi uis                     | 787                              | Phacos palustris qualis              | 70                                   |
| Ouillæ pellis usus                 | 110                           | Papaueris Thebani proprietates          | 53                               | Phagi uirtus                         | 21                                   |
| Ouilli stercoreis qualitas         | 100                           | Papularum ortus & cura                  | 895                              | Phalangosis quid, & quomodo cu-      | retur                                |
| Ouillum fel quale                  | 98                            | Papularum menti eruptionibus ma-        | nantibus quomodo medendum        | 397                                  |                                      |
| Ouillum lac quale                  | 92                            | 451                                     |                                  | Pharmaca uehementiora quæ            | 205                                  |
| Oxallidis efficacia                | 310                           | Papulis ex sudore aut feruore auxi-     | lia                              | Pharmaci ex pice Brutia Galeni cō-   | positio                              |
| Oxos, acetum                       | 56                            | 824                                     |                                  |                                      |                                      |
| Oxygala quale                      | 96                            | Papulis ulcerosis crurum medica-        | menta                            |                                      |                                      |
| Oxygalactini casei utilitas        | 96.97                         | 824. uide Pustulæ                       |                                  |                                      |                                      |
| Oxylapathi uirtus                  | 48                            | Paralij efficacia                       | 53                               |                                      |                                      |
| Oxylipes panes                     | 246                           | Paralyseos affectio & cura              | 319                              |                                      |                                      |
| Oxyporium medicamentum             | 246                           | Paralyfis quomodo ab apoplexia          | seu syderatione differat         |                                      |                                      |
| Oxyporium polyetes                 | 560                           | 319                                     |                                  |                                      |                                      |
| Oxyporij ad inflationes præpara-   | tio                           | 307                                     |                                  |                                      |                                      |
| Oxyporiorum purgatoriorum cō-      |                               |                                         |                                  |                                      |                                      |



# AETII INDEX.

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| positio                             | 315      |
| Pharmaci ex tribus piperis generi-  |          |
| bus compositio                      | 560      |
| Pharmacum qui biberūt, & non pur-   |          |
| gantur, quomodo curandi             | 165      |
| Pharmacitidis terræ uis             | 79       |
| Phaselorum facultas                 | 20.70.   |
| Phasganij qualitas                  | 55       |
| Phasiacorum caro qualis             | 104. oua |
| qualia                              | 105      |
| Phemus, pharmacum                   | 611      |
| Philadelphus pastillus              | 613      |
| Philanthropi qualitas               | 14.55    |
| Philetærij efficacia                | 60       |
| Philinus præses quo medicamento     |          |
| curatus                             | 78       |
| Philotimus quomodo melancholi-      |          |
| cum se caput non habere putan-      |          |
| tem curauerit                       | 302      |
| Phlomos qualis                      | 70       |
| Phlogini linamēti compositio        | 414      |
| Phoenix palma                       | 70       |
| Phoenix collyrium                   | 150      |
| Phoenix niger, collyrium            | 435      |
| Phœnicinum, epithema                | 311      |
| Phœnigmorū compositiones            | 642      |
| Phosphorus collyrium                | 418      |
| Phrenitis quid, quōtque eius dif-   |          |
| ferentiæ, & quomodo curanda         | 293      |
| Phrygius lapis qualis               | 82       |
| Phu qualis efficaciæ                | 70       |
| Phucæ pisces quales                 | 107      |
| Phycos, fucus                       | 89.90    |
| Physema pinus                       | 62       |
| Phycotyche emplastrum               | 949      |
| Phycos qualis                       | 70       |
| Pica prægnantium quid, unde di-     |          |
| cta, cur & quando mulieribus ac-    |          |
| cidat                               | 959      |
| Picæ quomodo medendum ibidem        |          |
| Picationis usus & compositio        | 191      |
| Picis efficacia 59. & quomodo ex    |          |
| ea fuligo præparetur ibidem         |          |
| Picra ex aceto mulso, Oribasij      |          |
| 808                                 |          |
| Picris qualis & cur sic dicta       | 63       |
| Pili palpebrarum uarij, & euulsi ne |          |
| renascantur, medicamenta            | 397.     |
| 398                                 |          |
| Pilorum agglutinatoria              | 398      |
| Pilos quæ nigros, aut fuluos, aut   |          |
| albos faciant                       | 338.339  |
| Pili ut crispi fiant                | 339      |
| Pilos quæ corrumpant, quæ extir-    |          |
| pent, & quæ attenuent               | 340.     |
| 341                                 |          |
| Pilos corrumpentia, triplicia sunt  |          |
| 339                                 |          |
| Pilorum in palpebris defluuij spe-  |          |
| cies & curæ                         | 403.404  |
| Pilos pulchros & densos quid faciat |          |
| in pueris                           | 337      |
| Pilularum ex fimo, caprarum præ-    |          |
| stantia                             | 192      |
| Pilorum ustorum usus                | 110      |
| Pinguedinis animalium usus & dif-   |          |
| ferentiæ                            | 108.109  |
| Pinguedinum qualitates & differē-   |          |
| tia                                 | 3        |
| Pinguedo & seuum quomodo dif-       |          |
| ferant                              | 109      |
| Pinguis sapor qui                   | 2        |
| Pini corticis usus                  | 59       |
| Piperis differentia & efficacia     | 57       |
| Piri uires & pirorum                | 14       |
| Pira syluestria, qualia             | 14       |
| Piscatoria emplastra                | 945      |
| Pisces molles qui, eorumque usus    |          |
| 107.108                             |          |
| Pisces saxatiles                    | 106      |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Piscium descriptio 105. usque         | 109             |
| Piscium optimi qui                    | 127.128         |
| Piscium salforum qualitas             | 128             |
| Piscium pinguedinis usus              | 109             |
| Pistaciæ facultas                     | 59              |
| Pituita laborantium cura              | 730             |
| Pituitam per os à capite ducentium    |                 |
| descriptio                            | 333             |
| Pituitam ducentia quæ sint            | 151             |
| & inde                                | 160             |
| Pityides quale                        | 59              |
| Placitis stypteria                    | 89              |
| Plaga capitis quomodo curanda         | 327             |
| Plagæ scolopendræ, araneæ, tetra-     |                 |
| gnathi & phalangij medicamen-         |                 |
| ta                                    | 766.767         |
| Plantaginis qualitas                  | 15              |
| Plantarum rimis utilia                | 902             |
| Platani qualitas                      | 60              |
| Platycoria quid                       | 364             |
| Pleiadum ortus occasusq;              | 182             |
| Plenitudinis dinotio unde sumatur     |                 |
| 144.                                  |                 |
| Pleuritis qualis affectio & cura      | 522.            |
| & inde                                |                 |
| Pleuritis quæ uidetur & tamen non     |                 |
| est, quomodo dinoscenda & cu-         |                 |
| randa                                 | 525             |
| Plintitis stypteria                   | 89              |
| Plumbaginis qualitas                  | 88.854          |
| Plumbi usus                           | 88.875          |
| Plumbi succus quomodo fiat            | 726             |
| Plumbum quomodo augefcatur            | 88              |
| Pluuia aqua qualis                    | 182             |
| Pluuiarum generatio                   | 181             |
| Pluuia. cur aliquando post uentum,    |                 |
| aliquando ante fiat                   | ibidem          |
| Podagra quid, & quo differat ab       |                 |
| arthritide, eiusq; cura               | 716             |
| Podagra cur aliquibus magnus          |                 |
| morbis, aliquibus paruus exi-         |                 |
| stat, item alijs diu, alijs breui tem |                 |
| pore duret                            | 717             |
| Podagricorum accidentiū quæ sint      |                 |
| rationes                              | 718             |
| Podagrica cerata                      | 741             |
| Podagrica unguenta & acopa di-        |                 |
| uerfa                                 | 742. & inde     |
| Podagricæ antidoti                    | 751. & inde     |
| Podagricorum qui lauandi & quo-       |                 |
| modo                                  | 756             |
| Podagricorum humorum dinotio          |                 |
| 718.719                               |                 |
| Podagricorum præseruatiua, diæta      |                 |
| & medicamina                          | 721.722.741.    |
| 742                                   |                 |
| Polemonij uires                       | 60              |
| Polentæ ordeaceæ uis                  | 45              |
| Polij qualitas                        | 60              |
| Polyarchiorum compositio              | 583.            |
| 584                                   |                 |
| Polygoni temperamentum                | 60              |
| Polypodij facultas                    | 60.150          |
| Polypodites uinum                     | 154             |
| Polypus qualis affectio, eiusque cau- |                 |
| sa & cura                             | 352.353.354.355 |
| Pomorum fructus qui optimi            | 126             |
| Pompholygis constitutio               | 89.855          |
| Pompholygis exploratio                | 368             |
| Ponderum descriptio                   | 1031            |
| Ponderum notæ                         | 1031            |
| Pondus quomodo dijudicetur            | 1031            |
| Populi albæ qualitas                  | 40              |
| Populi nigrae facultas                | 10              |
| Populi nigrae oleum                   | 22              |
| Porcinarum carniū qualitas            | 206             |
| Porcini pulmonis uis medica           | 109             |
| Porri efficacia                       | 60              |
| Porri capitati succus quid efficiat   |                 |
| 153                                   |                 |
| Porri syluestris facultas             | 12              |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Porriginis affectio, origo, & cura- |         |
| tio                                 | 341.342 |
| Portulacæ uirtus                    | 13      |
| Poscarum aluum purgantium com-      |         |
| positio                             | 157     |
| Potamogeton qualis                  | 60      |
| Potionum iucundarum & commo-        |         |
| darum in febrib. compositio         | 286     |
| Potus intempestiue sumptus stim-    |         |
| auget                               | 279     |
| Præcocia quid                       | 53      |
| Prædicere mortem in acutis mor-     |         |
| bis non decet                       | 243     |
| Prægnantes quomodo se gerere de-    |         |
| beant                               | 960     |
| Prægnantis utero quæ innascan-      |         |
| tur                                 | 956     |
| Præputiolum seu ordeolum quid,      |         |
| & quomodo curetur                   | 404     |
| Præst efficacia                     | 60      |
| Præstion qua ui                     | 60      |
| Præstoides, qualis                  | 32      |
| Priapismus quid, & eius cura        | 699     |
| Principis orientis suffumigium      |         |
| 1029                                |         |
| Principium morbi quid, & trifariâ   |         |
| dici                                | 229.230 |
| Procidentiarum sedis remedia        | 842     |
| Procidentis sedis perustio quando   |         |
| fiat                                | 842     |
| Procyonis ortus                     | 182     |
| Prolapsus oculi qualis              | 373     |
| Prophetæ doctoris antidotus         | 802     |
| Propolis qualis                     | 61      |
| Proteus collyrium                   | 434     |
| Pruinæ generatio                    | 180     |
| Pruna Hispanica qualia              | 205     |
| Prunorum facultas                   | 42      |
| Pruritiū omnis generis curando-     |         |
| rum remedia                         | 819     |
| Pseudobunij facultas                | 18      |
| Pseudodiētami qualitas              | 20      |
| Psychotrophi facultas               | 40      |
| Psidracibus pustulis quæ auxiliē-   |         |
| tur                                 | 824     |
| Psilothra quæ dicantur, eorumq;     |         |
| compositio                          | 340     |
| Psilothrum, ampelos leuce           | 12      |
| Psilothrum ex herinaceo terrestri   |         |
| quomodo fiat                        | 113     |
| Psoricum quomodo fiat, & eius co-   |         |
| ditio                               | 90.91   |
| Psyllij efficacia                   | 72.864  |
| Psymmithium cuius uirtutis          | 90      |
| Pteleæ temperamentum                | 61      |
| Pterios facultas                    | 61      |
| Pterygium quid, curatioque eius     |         |
| 395.396                             |         |
| Pterygiorum medelæ                  | 899     |
| Ptilosis quid                       | 364.403 |
| Ptisanae ordeaceæ uirtus            | 45      |
| Ptolemæi psoricum collyrium         | 435     |
| Pubes puerorum quomodo diutif-      |         |
| sime maneat imbutis                 | 46      |
| Pudendorum inflammationes, no-      |         |
| mæ, carbunculi, interna in uri-     |         |
| næ meatu ulcera, quomodo sa-        |         |
| nes                                 | 847.848 |
| Pudendorum thymi, rimæ & ulcera     |         |
| quomodo curanda                     | 845.846 |
| Pumicis qualitas                    | 83.856  |
| Puer febriens ut exudet             | 200     |
| Pueri quomodo in literis & disci-   |         |
| plinis exercendi, & qua æta-        |         |
| te                                  | 203     |
| Puerorum comitialium cura           | 311     |
| Puerorum uictus ratio iuxta æta-    |         |
| tem                                 | 203     |
| Pulegij uires                       | 19.150  |
| Pulices necantia                    | 778     |
| Pulmonem purgantia                  | 173     |
| Pulmo                               |         |

phrygia fol. sig.



# ARTII INDEX.

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Pulmonis qualitas                                          | 109           |
| Pulmonis uis medica                                        | 109           |
| Pulmonis animalium qualitas                                | 103           |
| Pulmonis uenarum rupturæ unde cognoscantur                 | 107           |
| Pulmonis temperaturę dinotio                               | 220           |
| Puls farinæ crassioris                                     | 45            |
| Pulsuum signa                                              | 234           |
| Puluillorum ad ozænas compositio                           | 353           |
| Puluillorum inspersilium caput dentantium compositio       | 332           |
| Puluillorum pilos attenuantium compositio                  | 341           |
| Puluis Theodosij, caput resiccans                          | 333           |
| Pupillæ dilatatio quid, & curatio ipsius                   | 392           |
| Pupillæ tabes quid, & unde, eiusque chirurgia              | 393           |
| Purgandi rationes                                          | 148. & inde   |
| Purgantia medicamēta componendi methodus 153. & inde       |               |
| Purgationi inhabiles                                       | 194           |
| Purgatoria omnia stomachum infestare, præter aloē          | 149           |
| Purgatio ob quinque causas nihil proficit in uentre        | 165           |
| Purgationis excessui quomodo medendum                      | 155. 170. 171 |
| Purgationi nihil efficienti quomodo succurrendum           | 165           |
| Purgationis aut uenæ sectionis impatientes quomodo curandi | 726           |
| Purgationis usus in morbis oculorum                        | 367           |
| Purgatiua medicamenta articularibus morbis conuenientia    | 750           |
| Purpurorum testæ ad quid utiles                            | 117           |
| Pustularum ortus & cura                                    | 895           |
| Pustularum in febribus curatio                             | 283           |
| Pustularum capitis diuersarum descriptio & medelæ          | 343. 344      |
| Pustularum diuersi generis remedia                         | 823. 824      |
| Puteana aqua qualis                                        | 183           |
| Putrefactio quid                                           | 250           |
| Putrida febris quæ                                         | 243           |
| Pyrethri temperamentum                                     | 61            |
| Pyri qualitas                                              | 61            |
| Pyriaton uel pyriephton lac quod                           | 96            |
| Pyriepton lac                                              | 127           |
| Pyrites lapis qualis                                       | 81            |
| Pyxanthos qualis                                           | 50            |
| Pyxis emplastrum                                           | 935           |

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| <b>Q</b> Valitarum medicamentorum ordines quatuor | 1    |
| Quantitatis dimetiendæ tres differentias esse     | 1031 |
| Quartana, uide Febris                             |      |
| Quercus qualitas                                  | 21   |
| Quid cani & balneo comune, pro uerbium unde ortum | 315  |
| Quinquefolij qualitas                             | 57   |
| Quotidianæ febris, uide Febris                    |      |

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>R</b> Abies canum unde causetur                                                      | 314 |
| Rabiosorum canum indicia ibidem                                                         |     |
| Radiciis dulcis usus                                                                    | 19  |
| Ramex uaricosus quid, ubi oriatur mulieribus, & quomodo curetur 1021. uide etiam Hernia |     |
| Ranarum usus                                                                            | 111 |
| Ranæ palustris attractus quid mali inferat                                              | 777 |
| Ranunculi species quali ui                                                              | 17  |
| Ranunculi sub lingua remedia                                                            | 470 |

|                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Raphani qualitas                                                                             | 61            |
| Raphani uomitorij præparatio                                                                 | 166           |
| Raphaninum oleum                                                                             | 12            |
| Rapi facultas                                                                                | 20            |
| Rarefacientia cutem simplicia                                                                | 124           |
| Recidiuæ signa                                                                               | 242           |
| Reduillarum medelæ                                                                           | 899           |
| Regium medicamentum                                                                          | 109           |
| Regium suffumigium                                                                           | 1028          |
| Remissio morbi quid, eamque dici dupliciter                                                  | 230           |
| Renale emplastrum                                                                            | 668           |
| Renale unguentum                                                                             | 672           |
| Renibus è lapide laborantibus corporis constitutione gracili existente remedia               | 672           |
| Renum inflammationis medicamenta                                                             | 681           |
| Renū duricie & suppuracionis medicinæ                                                        | 682. 683      |
| Renēs purgantia                                                                              | 175           |
| Renum calculosorum affectio, & causæ & remedia                                               | 668. 669      |
| Renum in animalibus qualitas                                                                 | 103           |
| Renum cruentam urinam excrementum debilitas & remedia                                        | 666. 667      |
| Repellentia quæ sint                                                                         | 328. 352      |
| Reprimentia eminentias simplicia quæ sint                                                    | 124           |
| Resinæ qualitas                                                                              | 856           |
| Resinarum facultates                                                                         | 61            |
| Resinæ quomodo urantur                                                                       | 62            |
| Resinæ fuligo qualis                                                                         | ibidem        |
| Resolutio seu paralytis quomodo differat ab apoplexia 319. eiusque affectio & curatio ibidem |               |
| Respirationis signum                                                                         | 228           |
| Reuulsionis modus                                                                            | 328           |
| Rha cuius temperamenti                                                                       | 61            |
| Rhamni temperamentum                                                                         | 61            |
| Rheoponticum quale                                                                           | 61            |
| Rhinarium collyrium                                                                          | 433           |
| Rhinema collyrium                                                                            | 433           |
| Rhoa qualis                                                                                  | 62            |
| Rhodabintapi præparatio                                                                      | 1027          |
| Rhododaphnes proprietas                                                                      | 55            |
| Rhodomeli præparatio                                                                         | 1028          |
| Rhoeas quid Græcis                                                                           | 407           |
| Rhoeadis uires                                                                               | 52            |
| Rhoidarij præparatio                                                                         | 89            |
| Rhois facultas                                                                               | 62            |
| Rhypos qualis sordes                                                                         | 62            |
| Ricinus, arboris fructus                                                                     | 41            |
| Ricininum oleum                                                                              | 41            |
| Ridiculum medicamentum                                                                       | 489           |
| Rimarum in pudendis medicinæ                                                                 | 833. 834. 835 |
| Rimis platarum quomodo medeantur                                                             | 902           |
| Robur hominis omne debilius reddi in coitus usu                                              | 141           |
| Robur hominis quid                                                                           | ibidem        |
| Romulæ suffumigium                                                                           | 1030          |
| Roris generatio                                                                              | 180           |
| Rosæ qualitates                                                                              | 8             |
| Rosarum facultas                                                                             | 62            |
| Rosacei cerati usus                                                                          | 24            |
| Rosacei mellis compositio                                                                    | 155           |
| Rosaceum emplastrum                                                                          | 949           |
| Rosaceum oleum                                                                               | 24            |
| Rosati flauam bilem ducentis descriptio                                                      | 155           |
| Rosatun pituitam & atram bilem trahens                                                       | 155           |
| Rosatun xemomyron                                                                            | 1026          |
| Rosatorum præparatio                                                                         | 1027.         |
|                                                                                              | 1028          |
| Rubeta quid, ac quotplex, & læsionis ab ea quæ sit cura                                      | 777. 783      |
| Rubi qualitas                                                                                | 17            |

|                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rubiæ tinctorum facultas                                                                    | 32           |
| Rubificantia quæ sint                                                                       | 192          |
| Rubricæ facultas                                                                            | 78. 855      |
| Rubrica Sinopica                                                                            | 78           |
| Rumicis qualitas                                                                            | 48           |
| Ruptio quid, & quo à sinu differat, eiusque medelæ                                          | 897          |
| Ruptoria emplastra                                                                          | 941          |
| Ruptura unde fiat                                                                           | 273          |
| Rutæ temperamentum                                                                          | 58. 126      |
| Rutæ syluestris facultas                                                                    | 54           |
| Rutæ syluestris noxa                                                                        | 790          |
| <b>S</b> Abinum oleum                                                                       | 22           |
| Sacræ herbæ proprietas                                                                      | 58           |
| Sagapeni qualitas                                                                           | 857          |
| Sagapenum quale & quid                                                                      | 63           |
| Salamandraquale animalculum, & quæ ab ea homini mala obueniant                              | 782          |
| Salcas oleum                                                                                | 29           |
| Salca olei compositio                                                                       | 1026         |
| Salicis uirtus                                                                              | 36           |
| Salis fomentatio quomodo fiat                                                               | 143          |
| Salis generum differentia                                                                   | 7            |
| Salis morsus qualis                                                                         | 179          |
| Salis specierum differentia & facultates                                                    | 85           |
| Salis usti usus                                                                             | ibidem       |
| Salis floris qualitas                                                                       | ibidem       |
| Salis spumæ efficacia                                                                       | ibidem       |
| Salis purgatorij compositio quadruplex                                                      | 161          |
| Salis qualitas                                                                              | 856          |
| Sales Iamblichi                                                                             | 561          |
| Sales Poletis                                                                               | ibidem       |
| Salis dodecathei compositio                                                                 | 562          |
| Sales theriaci quomodo conficiantur                                                         | 797          |
| Salsamentorum ex animalibus qualitas                                                        | 108          |
| Salforum natura                                                                             | 7            |
| Salfuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ                                     | 108          |
| Salsus sapor qui                                                                            | 2. 7         |
| Saluæ energia                                                                               | 31. 153      |
| Sambuci facultas                                                                            | 11           |
| Samia terræ facultas                                                                        | 78           |
| Samius after collyrium                                                                      | 423          |
| Sampsuchi uirtus                                                                            | 63           |
| Sampsuchini olei præparatio                                                                 | 212.         |
|                                                                                             | 744          |
| Sanalia, alio nomine Meliceris                                                              | 202          |
| Sandarachæ efficacia                                                                        | 89. 789. 855 |
| Sandyx, collyrium                                                                           | 427          |
| Sandycis natua uis                                                                          | 90           |
| Sanguine euacuato, si rursus fluat sanguis, quomodo auxiliadū                               | 724          |
| Sanguinem quæ purgent                                                                       | 153          |
| Sanguinem per nares educens epithema                                                        | 170          |
| Sanguinis animalium diuersitas, & quæ ex eo remedia                                         | 91           |
| Sanguinis uiscosi generatiua alimēta quæ sint                                               | 127          |
| Sanguinis ex naribus erumpentis prænotio & significatio                                     | 240          |
| Sanguinis narium fluxus in febribus curatio                                                 | 281          |
| Sanguinis in homine alteratio quomodo fiat, aliquando particulatim, aliquando uniuersaliter | 302          |
| Sanguinis ex auribus eruptioni                                                              | 350          |
| Sanguinis ex naribus eruptioni quomodo medeantur                                            | 356          |
| Sanguis quomodo è naribus elicitur                                                          | 357          |
| Sanguinis ex oculorum angulis eruptio quomodo sistenda                                      | 397          |



# AETII INDEX.

|                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sanguis draconij                                                | 413              | Sedis fissuris & tuberculis quæ remedia conueniant                                                                                                                              | 835                         | Sinapi quale, & quod optimum                                           | 55            |
| Sanguinis ex pectore aut pulmone reiectatio unde proueniat      | 506.             | Sedis omnigenis malis auxiliantia                                                                                                                                               | ibidem. 836. 837. usque 844 | Sinapi uim consimilem quæ habeant                                      | 192           |
| quomodo curetur                                                 | 508              | Sedem infantium procidentem quomodo cures                                                                                                                                       | 202                         | Sinapismus quid, eiusq; usus & præparatio                              | 191. 192      |
| Sanguinis reiectionis cuiuscunq; auxilia                        | 510. 511. & inde | Sedis infusionu ratio & differentia                                                                                                                                             | 177                         | Singultus unde sit & eius remedia                                      | 535           |
| Sanguinem meientium per circuitum, remedia                      | 667              | Sedis thymis, uerrucis formicarijs, clauis, ficubus, hæmorrhoidibus, procidentijs, abscessibus, ulceribus proserpèribus & depascèribus, & fistulis quæ medicinae sint adhibendæ | 837. usque 843              | Sinon qualis uirtutis                                                  | 64            |
| Sanguinis hircini efficacia                                     | 675              | Selachia quæ Græcis dicantur                                                                                                                                                    | 108                         | Sinus ulcerum quomodo curandi                                          | 893. 894. 895 |
| Sanguinis ex uelica erumpentis auxilia                          | 690. 691         | Selini temperamentum                                                                                                                                                            | 63                          | Sion quo temperamento                                                  | 64            |
| Sanguinem meientium cura                                        | 691              | Selinusæ terræ uirtus                                                                                                                                                           | 79                          | Siphon quid Græcis                                                     | 346           |
| Sanguinis abundantis causa ægrotantium auxilia                  | 722. 723         | Semen prouocantia simplicia                                                                                                                                                     | 125                         | Sira, que pars corporis dicatur                                        | 322           |
| Sanguinis testudinis marinæ præparatio & usus                   | 773              | Semen quæ inhibeant                                                                                                                                                             | ibidem                      | Siræum, hepsema, sapa, idem                                            | 4             |
| Sanguinis taurini proprietates                                  | 788              | Semen qua ætate appareat, & quæ ad generationem aptum fiat                                                                                                                      | 958                         | Siriasis infantium quid, & quomodo curetur                             | 200           |
| Sanguinis erumpentis cura & deinceps                            | 879.             | Seminis fluxus quid, mulieribus & uiris æque communis, ac quomodo medearis                                                                                                      | 1000                        | Siros quid Græcis                                                      | ibidem        |
| Sanguisugarum usus qualis                                       | 148              | Seminis profluuium quid, & eius remedia                                                                                                                                         | 700                         | Siroma quid                                                            | 30            |
| Sanitatem esse duplicem                                         | 195              | Seminis profluuium in somno quibus & quas ob causas contingat                                                                                                                   | 701. eiusq; cura            | Sisymbrij natura                                                       | 64            |
| Sapa quid                                                       | 25               | Semperuiui facultas                                                                                                                                                             | 10                          | Sitis duplex                                                           | 5             |
| Sapa, hepsema, siræum, idem                                     | 4                | Senecionis uirtus                                                                                                                                                               | 33                          | Sitis quibus corporis partibus causetur, eiusq; dinotio                | 220           |
| Saponis Constantini, fluxiones reficcantis compositio           | 333              | Senecta ex morbo quæ dicatur                                                                                                                                                    | 267                         | Sitis sanorum cura                                                     | 279           |
| Saponis Andree comitis ad eadem compositio                      | ibidem           | Senecta naturalis quid                                                                                                                                                          | 204                         | Sitis in febribus curatio                                              | 279           |
| Sapores obscuri quomodo deprehendendi                           | 2                | Senum uictus ratio                                                                                                                                                              | 204                         | Sitim esse duplicem                                                    | ibidem        |
| Saporum alteratio                                               | 25               | Senum comitialium cura                                                                                                                                                          | 311                         | Sitriculorum remedia                                                   | 534           |
| Saporum proprietates                                            | 2                | Sepiæ usus medicamentarius                                                                                                                                                      | 117                         | Smaragdi uirtus                                                        | 84            |
| Saprotæ xylon, id est, caries lignorum                          | 63               | Seps quale animalculum, & quàm nocuus eius ictus, tum quæ cura                                                                                                                  | 774                         | Smegmata ad achoras, furfures, asperitates ac scabritiem               | 345           |
| Sapphiri energia                                                | 84               | Septica quæ Græcis dicantur                                                                                                                                                     | 39                          | Smegmatum caput densantium compositio                                  | 332           |
| Sarcites hydrops quid, eiusq; causas & remedia                  | 650. 651         | Serum lactis quale, & quomodo præparandum                                                                                                                                       | 94. 95                      | Smegmatis ad cutem illustrandam & pilos lanuginosos compositio         | 341           |
| Sarcocolla quid & qualis                                        | 63               | Serum lactis quomodo uentrè subducatur                                                                                                                                          | 133                         | Smilax hortenſis                                                       | 20            |
| Sardonis herbæ efficacia mirabilis                              | 785              | Serpilli proprietates                                                                                                                                                           | 32                          | Smilacis natia uis quæ                                                 | 785           |
| Satureiæ uis                                                    | 35               | Sesami conditio qualis                                                                                                                                                          | 63                          | Smiridis efficacia                                                     | 83            |
| Satyriasis quid, cur sic uocata, ipsiusq; curatio               | 699. 810. 811    | Sesaminum oleum                                                                                                                                                                 | 23                          | Smirna, myrrha                                                         | 65            |
| Satyrii facultas                                                | 63               | Seselli quale                                                                                                                                                                   | 63                          | Smyrnijs qualitas                                                      | 65            |
| Scammonie uirtus, & qualitas                                    | 149              | Serapias qualis                                                                                                                                                                 | 56                          | Solani efficacia                                                       | 69            |
| Scandicis conditio                                              | 64               | Seris qualis                                                                                                                                                                    | 63                          | Solani furiosi efficacia                                               | 784           |
| Scarificationis quis usus                                       | 647. 148         | Seridis nomine quæ herbæ ueniant                                                                                                                                                | 127                         | Soleorum coria usta ad quid profint                                    | 202           |
| Scarus piscis qualis                                            | 107              | Seueri album collyrium                                                                                                                                                          | 421                         | Solstitium æstiuum quando                                              | 182           |
| Schinus, lentiscus                                              | 67               | Seuum quomodo differat à pinguedine                                                                                                                                             | 109                         | Solstitium hybernium quando                                            | 182           |
| Schistos lapis qualis                                           | 80               | Seui ex animalibus usus                                                                                                                                                         | 109                         | Solutionis morborum signa                                              | 242           |
| Scillæ uis                                                      | 64               | Siccantia alimenta                                                                                                                                                              | 135                         | Sonchi constitutio                                                     | 65            |
| Scinci ad quid conducant                                        | 117              | Siccantia citra mordacitatem, item simpliciter & secundum quatuor ordines quæ sint                                                                                              | 121. 122                    | Sorbitum ex eruo præparatio, ad ulcera depascentia                     | 607           |
| Schoeni flos qualis                                             | 67               | Sicci medicamenti ad scabros oculorum angulos compositio                                                                                                                        | 402                         | Sordis balneorum usus                                                  | 19            |
| Schœnos lea qualis                                              | 67               | Sicci temperamenti notæ                                                                                                                                                         | 217                         | Sordis in ouium lanis innutritæ usus                                   | 101           |
| Scolimi facultas                                                | 64               | Siccitas corpora animalium citò ad senectam producit                                                                                                                            | 224                         | Sordium qualitas                                                       | 62            |
| Scordij qualitas                                                | 64. 153          | Sicya quali potentia                                                                                                                                                            | 63                          | Sori qualis facultatis                                                 | 88. 855       |
| Scoriæ conditio qualis                                          | 89               | Sicyos agrios qualis                                                                                                                                                            | 64                          | Soporis grauis curatio                                                 | 278           |
| Scorodon quale sit                                              | 64               | Sicyonium oleum                                                                                                                                                                 | 27                          | Sparti qualitas                                                        | 65            |
| Scorpij marini fel quale                                        | 98               | Sideritis Heraclea                                                                                                                                                              | 12                          | Spathiuros & eius morsus qualis, quomodoq; curetur                     | 775           |
| Scorpionis marini plagæ medela                                  | 778              | Sideritis qualis                                                                                                                                                                | 63                          | Sphacelus quid, quæq; eius medicamina                                  | 888           |
| Scorpionis plagæ opè ferentia                                   | 769              | Sigilli lemnij usus                                                                                                                                                             | 78                          | Sphæron emplastrum                                                     | 949           |
| Scorpium sputo ieiuni hominis occisum                           | 99               | Sigillum Coracium                                                                                                                                                               | 878                         | Spinæ ortus                                                            | 182           |
| Scribentes turpia, peiores quàm qui perpetrarint                | 91               | Signa bona & mala quæ sint                                                                                                                                                      | 228. 229                    | Spinæ nardi facultas                                                   | 55            |
| Scroti scabiosi & pruriginosi, tum inflammari medelæ            | 847. 848         | Siliquæ lobi                                                                                                                                                                    | 20                          | Spicati olei compositio                                                | 1026          |
| Scutulare collyrium                                             | 422              | Siliquæ facultas                                                                                                                                                                | 40                          | Spinæ albæ uires                                                       | 11            |
| Scylacium collyrium                                             | 430              | Silphij proprietates                                                                                                                                                            | 64                          | Spinæ Aegyptiæ qualitas                                                | 611           |
| Scytala Chalcidica qualis                                       | 775              | Silulorum muria quibus conferat                                                                                                                                                 | 108                         | Spinæ deuoratae ac tonsillis infixæ quomodo excerni possint            | 489           |
| Secantia alimenta                                               | 132              | Similaginis qualitas                                                                                                                                                            | 127                         | Splanchnon, qualis                                                     | 19            |
| Secundæ cur sic uocata, & hæ in utero detetæ quomodo eijciantur | 969              | Simplicium medicamentorum facultas traditur, pigina 9. & deinceps                                                                                                               | 424. 427                    | Splenis affectionum cognitio                                           | 631           |
| Secundarum generatio                                            | 956              |                                                                                                                                                                                 |                             | Splenis intemperieru remedia                                           | 633           |
| Securidacæ qualitas                                             | 33               |                                                                                                                                                                                 |                             | inflationis 634. in scirrhum indurati 636. & inde                      |               |
| Sectio arteriarum, uide Arteriarum                              |                  |                                                                                                                                                                                 |                             | Splenicorum uisio & diæta, tum iuxta affectionis uarietatem curationes | 643. 644. 645 |
| Sectio uenæ, uide Venæ                                          |                  |                                                                                                                                                                                 |                             | Spodiaca collyria unde dicantur, & qualia sint                         | 424. 427      |
| Sedis affectionum causæ                                         | 833              |                                                                                                                                                                                 |                             | Spodia                                                                 |               |
| Sedis inflammationu medelæ                                      | 833              |                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                        |               |



# AETII INDEX.

Spodiaceum coll. Demosthenis 428  
 Spongiæ uirtus medica 89.187  
 Spongiarū lapillorum facultas 83  
 Splenem euacuantia 175  
 Spumæ argenti qualitas 854  
 Sputi hominis uis 99  
 Sutorum signa 241  
 Squamæ æris uirtus 87.153.854  
 Squamæ ferri usus 87  
 Squatinæ marinæ usus 117  
 Squama stomomatis ferri 87  
 Stactæ quid & qualis 65  
 Stactæ myrrha quæ bona 119  
 Stagnina aqua qualis 183  
 Staphis quæ & Astaphis 16  
 Staphyles usus 65  
 Staphylomata quid, eorumq; differe-  
 rentiæ & curatio 380.381  
 Staphylinus, daucus 20  
 Staphylinus quali ui 65  
 Steatoma quid, eiusq; cura 914  
 Steatomatum remedia 405  
 Stella samina, terræ samia species 79  
 Stellarū ortus & significatio 181  
 Stercoris diuersorum animalium qua-  
 litas 99.100.101  
 Stercus exigentia 11.154.163.176  
 Sterilitatem fœminis quæ inducant 973  
 Sterilitatis & in uiro & muliere cau-  
 sæ & remedia 970  
 Sternutationem quæ moueant 360  
 Sternutationis usus & ratio 359  
 Sternutationes redundantes quo-  
 modo sedandæ 360  
 Stertentibus pueris quomodo auxi-  
 liandum 199  
 Stibij facultas 89  
 Stibiū ornandis palpebris 413.414  
 Stibium Alexandri regis 407  
 Stibia alia 407.408  
 Stillicidium urinæ quid, & eius re-  
 medium 684  
 Stœchadis temperamentū 65.330  
 Stomachus, id est, gula 322  
 Stomachi adstrictionis remedia 546  
 Stomachi imbecillitas, supinitas &  
 subuersio quomodo curetur 538  
 Stomachi exusti remedia 534  
 Stomachi dissoluti, item inflamma-  
 ti remedia 548  
 Stomachi exulcerati medicamenta 551  
 Stomacho si qui conuellantur, comi-  
 tialis modo, curæ 551  
 Stomacho atra bile grauato reme-  
 dia 531  
 Stomacho commodantia aut incom-  
 modantia 131  
 Stomachici qui dicantur 620  
 Stomaticarum illitionum cōfectio-  
 nes 477.478  
 Stomomatis ferri facultas 87  
 Strangulati quomodo reuocentur 488  
 Strangulorum auxilia 790  
 Stranguria quid & quomodo curan-  
 da 684  
 Stratiotæ collyrium 435  
 Strobili uirtus 48  
 Strumæ quid, eorum ortus & medi-  
 camina 910.911  
 Strumarum inter se differentiæ 910  
 Struthij facultas 65  
 Struthocamelorum caro qualis 104  
 Struthocamelorum oua qualis ali-  
 menti 104  
 Strychni facultas 65  
 Stupefacientia medicamenta 729.

Post horum usum qualibus un-  
 guentis sit utendum ibidem  
 Styraqui melior 119  
 Styraquis efficacia 65.153  
 Styraquinum oleum 26  
 Stypteria, alumen 89  
 Subsidentia urinæ alba non semper  
 bona 235  
 Subsidentiarum urinæ signa 237  
 Substantiam simplicem & incom-  
 mixtam inuenire impossibile 75  
 Subtercus hydrops quomodo cure-  
 tur. 660.661.662  
 Succu boni aut mali qui 129.130  
 Succini uirtus 84  
 Succus Cyrenaicus qualis 56  
 Succus Medicus 56  
 Succus siriacus ibidem  
 Sudor, & ex eo pharmacum 98  
 Sudores excludentia 176  
 Sudores quomodo sedentur 170  
 Sudorum significationes 240  
 Suffusiones ad tussim 501  
 Suffusum ratio 174  
 Suffocati quomodo reuocentur 488.  
 489  
 Suffumigabilis olei præparatio 30  
 Suffumigij moschati præparatio, &  
 aliorum 1028  
 Suffumigiorum uariarum præpara-  
 tio 1025  
 Suffusio oculorum quid, & eius in-  
 dicia ac species, tum cura 392  
 Sugillatio quid 372  
 Sugillationum sub oculis curatio-  
 nes 441  
 Sugillatorum medelæ 897  
 Suilla pinguedo qualis 109  
 Suillæ carnis præstantia 102  
 Suillum fel quale 98  
 Suillum lac quale 92  
 Suillus talus ad quid conducatur 110  
 Suis pinguedo qualis 3  
 Sulphuris conditio 87.856  
 Sulphurulentæ balneæ quibus conue-  
 niant 186  
 Supercilij resolutionis cura 321  
 Supercilij denudatis quomodo pi-  
 los inducas 337  
 Supercilij ornandis remedia 441  
 Superfluitatibus quæ redundant, &  
 quæ careant 128  
 Suppuratoria simplicia quæ 123  
 Suppuratorum affectio & dinotio,  
 curaq; 515  
 Surditatis curatio 347.348  
 Susinum oleum 25  
 Syca, qualis constitutionis 66  
 Sycofis qualis affectio, eiusq; cura 90.386  
 Sycamina qualia 54  
 Sycomora qualia 54.57  
 Syderon quid, & qualis affectio,  
 eiusq; cura 318.319  
 Syderationis præseruatua 313  
 Sydero quomodo differat à resolu-  
 tione, eiusq; affectio & cura 319  
 Syderū ortus & significatio 181.182  
 Syluestria satiniis fortiora 44  
 Syluestriū animalium caro qualis 103  
 Symphytum petraeum 67  
 Synerotis collyrium 429  
 Syncope quid 300  
 Syncope & lipothymia quo diffe-  
 rant 274  
 Syncoptici sudores ibidem  
 Synochos febris quæ 247  
 Syriaci lapidis uis 81  
 Syricum, Cerussa 90  
 Syricum collyrium 427

**T** Abes siue tabida febris quæ di-  
 catur 267  
 Tamarix 54  
 Tauri adeps qualis 3  
 Taurinæ carnis qualitas 102  
 Taurinæ medullæ qualitas 109  
 Taurinum fel quale 98  
 Taurinæ adeps medullæq; qualis 109  
 Taxi efficacia quæ 785  
 Tecolithos qualis 81  
 Telamonium emplastrum 949  
 Telis, id est, fœnum græcum 68  
 Telinum oleum 25  
 Tellinorum usus medicus 117  
 Temperamentorum corporis hu-  
 mani dinotio 216. & deinceps  
 Temperamentorum omnium cor-  
 rectio & medela 223.224  
 Temperaturæ alterationis ratio di-  
 uersa 302  
 Tempora inurere an liceat 408  
 Temporum quatuor anni, singulo-  
 rum tres esse differentias 180  
 Temporum musculis quæ cataplas-  
 mata agglutinatoria, illitiones cō-  
 ueniant 410  
 Tendinum induratorum medelæ 909  
 Tenesmus quid, & ei⁹ cura 601.602  
 Tenuium partium simplicia quæ 122  
 Tephra, id est, cinis 68  
 Tephrica collyria unde dicta, & qua-  
 lia sint 424.426  
 Tephron collyrium 427  
 Terebinthi efficacia 67  
 Terminthus quid, quomodoq; me-  
 dendus 895  
 Terra quid, eiusq; qualitas 75  
 Terræ differentiæ quæ sint 75  
 Terra quomodo lauanda 76  
 Terræ agrorum quis usus in medi-  
 camentis ibidem  
 Terra lemnia seu sigillata 78  
 Terra samia 78  
 Terra selinusia & chia 79  
 Terra cimolia 79  
 Terra Ampelitis siue Pharmacitis  
 ibidem  
 Terra Cretica seu Creta 79  
 Terræ ustæ uis ibidem  
 Terræ exhalationum seu uaporum  
 ratio 181  
 Terræ quæ in emplastra commiscē-  
 tur 856  
 Terræ intestina ad quid cōferat 111  
 Tertiana, uide Febris  
 Testarum clibani usus 83  
 Testa intectorum naturam esse ex-  
 contrarijs facultatibus compo-  
 sitam 133  
 Testæ ouorū ad quid cōducant 105  
 Testa intectorū pisciū qualitas 107  
 Testa mollitestorum conditio ibi.  
 Testarum conchiliorū qualitas 856  
 Testarum fictilium qualitas 856  
 Testamentū aurifabri collyriū 437  
 Testamentum, collyrium ibidem  
 Testes animalium qualis tempera-  
 menti, quiq; esu optimi 103.104  
 Testium temperamenti indicia 222  
 Testiculus canis qualis 56  
 Testiculorum castoris usus 114  
 Testiculorū canis fluuiatilis usus 115  
 Testudinis fel quale 98  
 Tetanica conuulsio quos non in-  
 uadat 324  
 Tetanus quid 324. unde proueniat  
 & quomodo curetur, ibidem  
 Tetragnathus quid, eiusq; ictus me-  
 dela 767



# AETII INDEX.

|                                     |         |                                     |         |                                      |                 |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|
| Tetrapharmacum basilicum            | 947     | Triaxo qualis naturæ                | 70      | Venenatorum plagis omnibus com-      |                 |
| Tetrapharmacum medicamen            | 109     | Trychiny facultas                   | 69      | munia remedia                        | 764             |
| Tetrapharmaci compositio            | 751     | Tubera qualia sint                  | 69      | Venter quinque de causis purga-      |                 |
| Teutlon quale                       | 67      | Tumores pedum grauidarum quo-       |         | torio accepto, nihil excernit        | 165             |
| Thalassorum Hermophili, collyriū    |         | modo curandi                        | 960     | Ventris suppressionem, plurimo-      |                 |
| 434                                 |         | Tumores faciei ficosos quomodo      |         | rum malorum esse causam, quæ-        |                 |
| Thapsiæ facultas                    | 34.857  | cures                               | 450     | que ea sint, & eorum cura            | 177             |
| Theion sulphur                      | 87      | Tumoris gutturis medelæ             | 912     | Ventrem subducentia                  | 133             |
| Theodoretos antidotus triplex       |         | Tumori pultacei ac mellei humo-     |         | Ventrem supprimentia                 | 134             |
| 807.808                             |         | ris curatio                         | 912.913 | Ventris temperaturæ dinotio          | 220             |
| Theodotium magnum                   | 438     | Tumori adiposorum medelæ            | 914     | Venti cur aliquando post, aliquan-   |                 |
| Theodotium Seueri                   | ibidem  | Tumorum canceratorum medica-        |         | do ante pluuiam ueniant              | 181             |
| Theodotion nardinum coll.           | 436     | mina                                | 889     | Venti multi & assidui boreales cur   |                 |
| Theodotium Placianum                | 437     | Tumorum durorum, item crudorū       |         | æstate fiant                         | ibidem          |
| Theophilium collyrium               | 431     | & inconcoctilium medicamenta        |         | Ventos locales uniuersalibus mor-    |                 |
| Terebinthina resina                 | 62      | 735.736                             |         | bosiores esse                        | 181             |
| Theriaces confectio, usus & proba-  |         | Tumorum laxorum medelæ              | 905     | Venti apogei qui                     | ibidem          |
| tio 792.793.794                     |         | Turdi pisces quales                 | 107     | Ventorum iuxta situs qualitas        | 181             |
| Theriace exhibitionis modus quis    |         | Turturis sanguinis usus             | 91      | Ventorum generatio, numerus &        |                 |
| 795                                 |         | Turturis marini plage auxilia       | 777     | nomina                               | 181             |
| Theriace ex uiperis Andromachi      |         | Turturum esus qualis fiet           | 126     | Ventus & imber quomodo simul         |                 |
| compositio                          | 791     | Tulsis causæ & remedia 497. &       |         | fiant                                | 181             |
| Theriace Oribasij, qua Marcus Imp.  |         | inde                                |         | Venus, emplastrum                    | 936             |
| est usus, compositio                | 805     | Tympanites hydrops quid, eiusq;     |         | Venerem emortuam quomodo ex-         |                 |
| Theriaca eiusdem alia               | 806     | causæ & remedia                     | 650.651 | cites                                | 703             |
| Thermus satiuus                     | 34      | Tyrrhenicum, emplastrum             | 938     | Veneri quæ naturæ ac diætæ com-      |                 |
| Thermus syluestris                  | 34      | V                                   |         | modiores, item quod tempus           |                 |
| Thlaspi quali uirtute               | 34      | Vaporum ratio                       | 7       | 142                                  |                 |
| Thryallis, uerbasci species         | 70      | Vaporum terræ ratio                 | 180     | Veneris herbæ uires                  | 58              |
| Thridaxis qualitas                  | 34      | Vaporariorum fomentorum usus et     |         | Veneri rei signa                     | 222             |
| Thronus Marcellius pastillus        | 614     | modus                               | 143     | Veratri qualitas                     | 31              |
| Thuris facultas                     | 49.857  | Vari circa quam oculi partem orian- |         | Veratri nigri uirtus                 | 150             |
| Thuris dijudicatio                  | 119     | tur                                 | 377     | Veratrum quomodo & quando qui-       |                 |
| Thuris cortex qui melior            | ibidem  | Varos faciei tollentia              | 446     | busq; dandum, & quibus non,          |                 |
| Thytes lapis qualis                 | 81      | Varices quid, & quō curentur        | 903     | quidq; facere possit, ac quæ pro-    |                 |
| Thylacitidis facultas               | 52      | Varices palpebrarum                 | 405     | bati sint notæ                       | 167             |
| Thymus niger, elleborus             | 35      | Vasculi mensuratio                  | 1031    | Veratri purgandi ratio, eiusq; exhi- |                 |
| Thymi proprietas                    | 35.153  | Vasorum dilatatio ubi, & quomodo    |         | bendi differentia                    | 168.169         |
| Thymi pudendorum quomodo sa-        |         | fiat, & quomodo curanda             | 915     | Veratri cremor, decoctum, ramenta    |                 |
| nandi                               | 845     | Vasorum oscula quæ simplicia ape-   |         | &c. qualia                           | 168             |
| Thymi sedis quid, unde dicti, & quæ |         | riant                               | 123     | Veratro purgadis quæ sit diætæ præ-  |                 |
| eorum cura                          | 837     | Vasorum sectionis usus              | 410     | scribenda                            | ibidem          |
| Titanus, id est, calx               | 68.89   | Venam in anno sæpe incidere, incō-  |         | Verbasci species & facultas          | 70              |
| Tithymalli uirtus                   | 151     | modum & cur                         | 147     | Verbenacæ usus                       | 58              |
| Tithymallorum efficacia             | 68      | Venæ sectionis usus in oculorum     |         | Verberum uibices seu notæ quomo-     |                 |
| Titianus pessus                     | 1012    | morbis                              | 366     | do curandæ                           | 449             |
| Toforum in artubus quæ sit causa    |         | Venæ sectionis aut purgationis im-  |         | Vermes ulcerum quid curet            | 36              |
| podagricis                          | 718     | patientes quō curandi               | 726     | Verruca, & uerruca formicaria quid   |                 |
| Toforum in artubus cura             | 749     | Venæ sectionis usus in febrib.      | 248     | & unde uocata                        | 837             |
| Tomentorū subditiorū ratio          | 179     | Venæ sectioni quod corpus aptum     |         | Verrucarum, tum uerrucarum for-      |                 |
| Tonillarum inflammationum re-       |         | ibidem                              |         | micariarum remedia                   | 838             |
| media                               | 479     | Venæ sectioni quæ obstant           | ibide   | Vertigo unde oriatur, & quomodo      |                 |
| Tonillarum ulcera qualia, quomo-    |         | Venæ sectio quibus conueniat, &     |         | curanda                              | 298             |
| do fiant & curentur                 | 480.481 | cur fiat, quæq; in ea sint confide- |         | Vesica bilis susceptrix              | 97              |
| Tonillis infixas spinas quomodo     |         | randa                               | 144.145 | Vesicæ collum ubi situm              | 322             |
| educas                              | 489     | Venæ quales secandæ, & quo modo     |         | Vesicæ doloris in febribus curatio   |                 |
| Tonisoris emplastrum                | 654     | 145                                 |         | 281                                  |                 |
| Torminum intestinorum ortus &       |         | Venæ sectionis quæ magnitudo, fi-   |         | Vesicæ calculorum remedia            | 672             |
| cura 599. & 601. 608. & inde usq;   |         | gura, & quod tempus sit             | 146     | Vesicæ calculis & etiam renum si-    |                 |
| 618                                 |         | Venæ sectionis iteratio quomodo     |         | mul                                  | 673.676.677.678 |
| Torpedinis qualis caro              | 108     | fiat & quando                       | 146.147 | Vesicæ calculos atterentia medica-   |                 |
| Torpedinis usus                     | 116     | Venarum pulmonis rupturæ unde       |         | menta                                | 673             |
| Torpor. uide Lethargus.             |         | cognoscantur                        | 507     | Vesicæ inflammatio, qualis affectio  |                 |
| Troxicum unde dictum, & quæ eius    |         | Venarum apertio & corrosio unde     |         | & cura                               | 689.690         |
| uis                                 | 787     | proueniat                           | 507     | Vesicæ sanguinis floris auxilia      |                 |
| Tragacanthæ dinotio                 | 119     | Venas eleuatas & incuruas ex mem-   |         | 690                                  |                 |
| Tragacanthus, qualis                | 69      | bris fluxione infestatis auferen-   |         | Vesicæ tubercula quomodo ad ma-      |                 |
| Tragorigani facultas                | 56.150  | das                                 | 723     | turritatem producenda                | 692             |
| Transeuntia tarde quæ sint          | 132.133 | Venenata animalia quibus artibus    |         | Vesicæ ulcerum curatio ibidem, &     |                 |
| Tremorum in febrib. curatio         | 285     | tollas 763. eorum morsibus quo-     |         | inde                                 |                 |
| Tribuli efficacia                   | 69      | modo medearis                       | ibidem  | Vesicæ laborantium diætæ             | 697             |
| Trichiasis quid                     | 364     | Venenata animalia quæ fugēt & quæ   |         | Vesicæ fluxionis auxilia             | 698             |
| Trichiasis quid & quomodo curan-    |         | occidant                            | 764     | Vesicæ resolutæ curatio              | 322             |
| da                                  | 364     | Venenatorum animalium quæ leta-     |         | Vesicæ scabiosæ medicamenta          | 687             |
| Trifolij facultas                   | 51.69   | liter corrumpant                    | 778     | Vesicæ paralyti dissolutæ auxilia    | 688             |
| Trifolium pro satyrio               | 63      | Venenosum pharmacum ne lædat        |         | Vesicam quæ purgent                  | 175             |
| Trigla piscis qualis                | 106     | præseruatiua                        | 779     | Vespas & apes fugantia               | 765             |
| Triphyllon, trifolium               | 69      | Venenum qui sumpserint quomo-       |         | Vibicum à uerbere illatarum reme-    |                 |
| Tritici facultas                    | 61      | do cognoscendi                      | 779     | dia                                  | 449             |
| Triticeæ farinæ usus in cataplasma- |         | Veneni omnis curationes commu-      |         | Victus ratio cuiq; ætati             | 203.204         |
| tis                                 | 190     | nes                                 | 780     | Vigiliarū in febribus remedia        | 277             |
|                                     |         |                                     |         | Vigo                                 |                 |



# AETII INDEX.

Vigor totius morbi cognitio 231  
 Vinaceorum facultas 19  
 Vini uis 55  
 Vinorum qualitas iuxta colorem 134.135  
 Vinum cur acescat 5  
 Vina quomodo alant 127.128  
 Vina qualia fenibus cōueniant 198  
 Vini bilē & pituitam purgantis præparatio 154  
 Vinum quod melancholicis auxilietur quomodo componatur ibidē  
 Vini potus usus in morbis oculorū 366  
 Vinum polypodites 154  
 Vinū mulsum stercus exigēs ibidē  
 Vinū mulsum flauū, itē quod atrā bilē, itē quod pituitā expurget 155  
 Vinum scybelites quod 561  
 Vindemiatoris ortus 182  
 Violæ qualitas 35  
 Violæ albæ energia 153  
 Violatum oleum 26  
 Viperæ usus & qualitas 112  
 Viperarum adeps qualis 109  
 Viperarū capitū usus medicus 110  
 Viperarū esus & præparatio in elephantiafi 812  
 Viridis iaspidis usus 552  
 Viscerum animalium qualitas 103  
 Visci uis & constitutio 35  
 Viscum optimum quod 118  
 Vitex siue Agnos 9  
 Vitis albæ uires 12  
 Vitis nigræ facultas ibidem  
 Vitiliginum origo, & curatio 826. 827  
 Vitulinarum carnis qualitas 102  
 Vitulinum seuum quale 109  
 Vitri uis medica 83  
 Vitri leuissimē triti usus 406  
 Vlcerationis circa os sacrum, item circa scrotum & anum, in febribus curatio 282.283  
 Vlcerum sedis proserpentium & depascentium medicinæ 843  
 Vlcerum, & cautorum ulcerum curā dorum ratio 864.865  
 Vlcerum suppurandorum, repurgandorum ac incarnandorum medicamenta 865  
 Vlcerum carne excrescentium remedia 867  
 Vlceribus cicatricē inducentia 868. 869.870  
 Vlcerum quæ citra mordacitatem exciccent 871  
 Vlceribus medicamentorum adhibendorum ratio ibidem  
 Vlcerum ligamenti ratio 872  
 Vlceribus malignis qualia emplastra conueniant 873  
 Vlcerum post cicatricem obductam rursus ruptorum cura 874  
 Vlcerum uermes ac nomas ac putredines quomodo sanes 875  
 Vlcerosæ lassitudinis causa & cura 210  
 Vlmi qualitas 61  
 Vlophoni efficacia 787  
 Umbilici puerorum procidetiæ causa & cura 202  
 Umbilici ueneris uirtus 44  
 Vnguenta odorata quibus commo-

dent, eorumq; ratio 30  
 Vnguenta recalcfactoria post stupefactiuorum medicamentorū usum adhibenda qualia 729  
 Vnguenti purgatorij cōpositio 171  
 Vnguentorum siccorum moschatorū ac uariorū præparatio 1025  
 Vnguentorum quæ cocturam sustineant, & quæ non 856  
 Vnguis oculi quid, ipsiusq; cura 395.174  
 Vnguuium abscessuum medelæ 899  
 Vnguuium contusorum, subcruentorum, motorum, scabrorum ac leproforum cura 900  
 Vnguibus reparandis quid conueniat 901  
 Vnguuiū ex animalib. quis usus 110  
 Vocalis instrumenti resolutio quomodo curetur 322  
 Vociferatio quid, eiusq; usus 139  
 Vocis suppressæ & asperæ, aut raucae & cæt. 492. & inde  
 Voluceriū animalium caro qualis 104  
 Volucrum animalium partes quomodo differant 104  
 Voluulus quid, eiusq; generatio & remedia 567  
 Vomentes ægrè quō iuuandi 223  
 Vomitus ratio & usus insignis, item quibus conueniat & quibus non 165.166  
 Vomitur quæ iuuent, quæq; sedent 166.167.168. & inde  
 Vomitoria qualia debeāt esse 166  
 Vomitus prænotio & significatio 239  
 Vomitus cataplasmata & epithemata 543  
 Vranium collyrium 427  
 Vrentia medicamina 882  
 Vrinarum qualitas 98  
 Vrina an bibenda 98  
 Vrinæ notæ 139  
 Vrinæ proliciendæ qualis glans præparetur 175  
 Vrinā cientia remedia 656.673  
 Vrinarum signa 234.237. & inde  
 Vrina naturalis & optima quæ tam in sanis quàm ægris 235  
 Vrinæ subsidentia alba non semper bona ibidem  
 Vrinæ subsidentiarum signa 237  
 Vrinarum oleosarum differentiæ & significationes ibidem  
 Vrinæ difficultas quid, & eius remedia 684  
 Vrinæ difficultatis in febribus auxilia 695  
 Vrinæ suppressio quid 686. eius medicinæ 686  
 Vrinam in somno emittentium auxilia 689  
 Vrinæ mucosæ, capillis aut lanis similis, medicamenta 698  
 Vrsinum fel quale 98  
 Vrsinum seuum quale 109  
 Vrticæ uires 10  
 Vsta quomodo mutant qualitatem suam 76  
 Vstoria simplicia quæ 124  
 Vteri animalium qualitas 104  
 Vteri situs, magnitudo & forma 955

Vtero prægnantis quæ & quo ordine innascantur 956  
 Vteri frigidioris signa & medicinæ 972  
 Vteri calidioris indicia & curatio 972  
 Vteri humidioris ac siccioris medelæ 973.974  
 Vteri strangulationis remedia 995. & inde usq; 999  
 Vteri suffocationis auxilia 999  
 Vteri debilitatis sanatio 1000  
 Vteri furor, resolutio & prolapsus quomodo medeantur 1001  
 Vteri reclinationis, auersionis & recursus medicamenta 1003  
 Vteri inflatio & hydrops quomodo curentur 1004.1005  
 Vteri tumoris laxi & inflammationis pharmaca 1007.1008  
 Vteri in tumorem indurati medicamina 1011  
 Vteri abscessuum uariorum medelæ 1013.1014  
 Vteri exulceratio, ulcera carbunculosa & sordida, quomodo curentur 1015.1016  
 Vteri humor profluus & nomæ quomodo medenda 1016  
 Vteri cancri obturationisq; medelæ 1017.1018  
 Vterus non perforatus tripliciter contingit, & quomodo curetur 1019  
 Vteri hæmorrhoidum & calculorū medicinæ 1020  
 Vteri thymorum, uerrucarū, & uerrucarum formicarum medelæ 1022  
 Vteri condylomata, rugæq; ac fissuræ quomodo curentur 1023  
 Vterum euacuantia 175  
 Vuæ temperamentum 65  
 Vuæ immaturæ succus quo differat ab aceto 5  
 Vuæ passæ qualitas 16  
 Vuarum reponendarum ratio 65  
 Vulcania quid 411  
 Vulnerum cruentorū remedia 857  
 Vulneribus cruentis glutinandis ac comoda emplastra 916  
 Vulpes quem usum in medicamentis præstent 111  
 Vulpini pulmonis uis medica 109  
 Vulpinus adeps qualis 171  
 Vulsio quomodo fiat & curetur 897

X  
 Anthij qualitas 55  
 Xeromyron ad capitis fluxionem 333  
 Xiphion quale 55  
 Xylocollæ dinotio 118  
 Xyster collyrium 431.432

Z  
 Arinaca, bolus Armenicus 80  
 Zarnacha idem ibidem  
 Zea quid 33  
 Zigir, species Cassiæ 118  
 Zingiberis uirtus 33  
 Zoili nardinum collyrium 436  
 Zoili Nicarium, collyrium 436  
 Zygis serpylli species 32  
 Zyma, id est, fermentum, quale 33  
 Zythi qualitas 33

## FINIS INDICIS.

*Lugduni excudebant Godefridus & Marcellus  
 Beringi fratres, M. D. XLIX.*



















1855